Nomenclator botanicus.

Nominum ad finem anni 1858 publici juris factorum, classes, ordines, tribus, familias, divisiones, genera, subgenera vel sectiones designantium enumeratio alphabetica.

Adjectis

Auctoribus, Temporibus, Locis systematicis apud Varios, Notis literariis atque etymologicis et Synonymis.

Conscripsit

Ludovicus Pfeiffer,

M. D. Cassellanus, Academiae Leop. Carol. Naturae Curiosorum etc. socius.

Vol. I. Pars altera.

CASSELLIS.

Sumptibus Theodori Fischeri.

1874.

Codonocephalum Fenzl 1843. Flora p. 397: nov. g. Euinulear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 68. n. 2425/$_1$. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 141.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: g. Inulear.
Synon. Sprunnera Schultz Bip.

Codonocrinum Willd. mss. ex Steud. 1840. Nomencl. I. p. 393; II. p. 795.
= Yucca (acaulis H. & B.)

Codonophora Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. n. 1110: nov. g. Gesneriear. (G. tomentosa L.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 175.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3243: g. Gesnerear.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 205: g. Rhytidophyllear. (Gesnera prasinata Ker.)
Oersted 1858. Gesn. centroam. p. . . .: g. Moussoniear.
Synon. Paliavana Vell.; Prasanthea DC.

Codonophorus Desv. vid. *Codriophorus Palis.*

Codonoprasum*) Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. 538: sect. Allii. (A. carinatum, oleraceum, flavum.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1137 *c*. p. 147; 1841. Ench. p. 84. — Koch 1837. Syn. p. 719. Ed. II. p. 831. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 396. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 243. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 207.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1379; 1830. Fl. exc. p. 114; 1841. Nom. p. 48. n. 1768: g. Alliacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: g. Scillear.
Webb 1850. Canar. III. p. 345: subsect. Crommyi.
Synon. Gethioides Col.

Codonopsis Wallich 1824 in Roxb. Fl. Ind. II. p. 103: nov. g. Pentandr. Monogyn. (C. viridis et purpurea.)
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 736: g. Jasionear. Sect.: Megasanthes, Microsanthes.
Benth. & Royle . . . . Ill. Himal. bot. Part VII. p. 254.
Endl. 1838. Gen. n. 3075. p. 515; 1841. Ench. p. 266: g. Lightfootiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 242 (149).
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 536: g. Campanulacear. (*Synon. Glossocomia Don.*)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691: g. Lightfootear.
= Wahlenbergiae sect. Megasanthes A. DC.

Codonopsis „Wallich Herb. n. 1300. 1301" A. DC. 1830. Mon. Camp. p. 120: g. Campanulear. (exclusa sect. 1 Wallichii.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 103. n. 4037: g. Canarinear. Sect. (1841): Codonopsis, Apochlaena.
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 423: g. Wahlenbergiear. Sect.: Synchlaena, Apochlaena. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 565.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 757: subg. Campanulae.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1392. n. 3074 *b*: sect. Campanumaeae. Subsect. ut A. DC.
Synon. Microsanthes G. Don.

Codonoraphia Oersted 1858. Gesn. centroam. p. . . .: g. Eurytidophyllear. (ex Müll. Ann. bot. V. p. 431.)

Codonorchis Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 410: nov. g. Euarethusear. (Pogonia tetraphylla Pöpp.) — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 383 (287).
Endl. 1841. Spl. I. n. 1601/$_1$. p. 1367; 1841. Ench. p. 114: g. Arethusear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Pogonidar.

Codonostigma „Klotzsch mss." Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 709: nov. g. Salaxidear.
Endl. 1839. Gen. n. 4297. p. 751; 1841. Ench. p. 369: g. Coilostigmear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442: g. Ericear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4901. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 364 (Eleutherostemonum).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.

Codonostigma Endl. Ench. p. 369. n. 4296 *c* (sect. Scyphogynae): err. pro *Blepharophyllum Kl.*

Codoriocalyx Hassk. ex Vriese 1841. Del. sem. hort. Amst.: nov. g. Desmodio aff. (C. conicus.) *Cf.* Linnaea 1841. Litt. p. 80.
Walp. 1842. Rep. I. p. 744: g. Hedysarear.
Meisn. 1843. Comm. p. 351: g. Euhedysarear.
Conf. Codariocalyx.

Codriophorus Palis.-Beauv. 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 445: nov. g. Ectopogonor., inter Dicranum et Trichostomum medium. (C. acicularis et pulvinatus.) *Cf.* Leman 1824. Dict. v. 33. p. 187 et Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 219, ubi corrigitur *Codonophorus.*
= Grimmiae spec.

Codylis Rafin. 1819. Amer. monthly mag.; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 258: nov. g. vel subg. ex typo Nicotianae quadrivalvis Nutt.
= Nicotiana Linn.

Coelachne*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 187. Ed. Nees p. 43: nov. g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 38 (*Caelachne*). — Poir. 1817. Dict. v. 7. p. 348. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 21. 413. n. 249. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 297. n. 309; 1830. Gen. I. p. 68. n. 331.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 28. — Endl. 1837. Gen. n. 882. p. 99; 1841. Ench. p. 59. — Meisn. 1843. Gen. p. 425 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 164.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 167: g. Festucacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 150. — Kunth 1830. Gram. p. 119. t. 143; 1833. Agrost. p. 370. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 138. 365. — Steud. 1854. Glum. I. p. 284.
Trin. 1820. Fund. p. 163: g. Triandr. Digyn.

*) πράσον, porrum.

*) κοῖλος, cavus, ἄχνη, palea.

Coelachne R. Brown cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1016: g. Melicacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1389: g. Poariar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 399: g. Festucinear.

Coelachyrum*) Hochstett. & Nees 1842. Linnaea XVI. p. 221: nov. g. Festucacear., Eragrostidi peraff. (C. brevifolium.)
Hochstett. 1855. Flora p. 430: g. Chloridear., Eleusinae proximum.
Synon. Coelochloa Hochst. olim.

Coelantha „Fröl." Bunge 1829. Mém. soc. Mosc. VII. (1824.) p. 206. 210: sect. Gentianae. (G. purpurea, bilobata, punctata, etc.) — Par. Koch 1837. Syn. p. 486. Ed. II. p. 559 (*Coelanthe*). — Endl. 1838. Gen. n. 3528 *b*. p. 600; 1841. Ench. p. 302.
Synon. Coilantha Borckh.; Coilanthe DC.; Pneumonanthe Borckh.; Dasystephana Ren.; Cuttera Rafin.; Gentianae coelanthae Fröl.

Coelanthe (*Κοιλανθη*) Renealm. 1611. Spec. hist. pl. p. 65.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 297; 1844. Rumel. II. p. 64; 1845 in DC. Pr. IX. p. 116: sect. Gentianae praecedente restrictior. Typus: Gentiana purpurea L. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 68.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 21: subg. Gentianae.

Coelanthum „E. Meyer mss." Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 353; 1838. ibid. II. p. 267: nov. g. Molluginear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162. n. 6300. (genuinar.) — Meisn. 1838. Gen. p. 131 (95. 357). — Endl. 1838. Gen. n. 5190. p. 953; 1841. Ench. p. 502. — Walp. 1843. Rep. II. p. 248. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 72.

Coelanthus Willd. reliq. teste Schult. 1830. Syst. VII. p. XLVI: nov. g. Hexandr. Monogyn. (C. complicatus), ab Endlicher aliisque ad Hypoxidem relatum.
Herb. 1837. Amaryll. p. 65. 85: g. Hypoxidear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 115.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 282: g. Hyacinthear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 254.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Scillear.

Coelastrum Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 97: g. Pediastrear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 195. n. 150: g. Desmidiear.

Coelebogyne J. Smith 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 509: nov. g. Euphorbiacear., Sapio aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281: g. Hippomanear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 416: g. Crotonidear.
Synon. Caelebogyne Rchb. etc.

*) *κοῖλος*, cavus; *ἄχυρον*, gluma.

Coelestina Hill 1769. Hort. kew. p. 8: g. Radiatar., inter Doronicum et Verbesinam collocatum. (C. ovata.)
= ?

Coelestina Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 10; 1817. Dict. v. 6. spl. p. 8 (*Caelestina*); 1820. v. 16. p. 10: nov. g. Eupatoriear.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 150: g. Eupatorear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 438.
Link 1822. En. II. p. 308: g. Corymbiferar.
Cass. 1823. Dict. v. 26. p. 227; 1830. v. 60. p. 585: g. Ageratear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 155. — DC. 1836. Pr. V. p. 107. Sect.: Isocarphoides, Ageratoides. — Meisn. 1838. Gen. p. 180 (124). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 285. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 64. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 152.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 446. n. 2696; 1831. Gen. II. p. 614. n. 3037: g. Eupatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2231. (Archetypar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 136. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 46.
Synon. Coelestinia Endl.; Agerati sp. Auct.

Coelestinia Endl. 1838. Gen. n. 2258. p. 366; 1841. Ench. p. 233: g. Ageratear. Sect.: Isocarphoides, Ageratoides. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 545. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 73.
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3814: g. Steviear. Sect.: Isocarpheia, Coelestinia.
= Coelestina Cass.

Coelia*) Lindl. 1830. Orchid. gen. p. 36: nov. g. Pleurothallear. (Epidendrum tripterum Sm.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1343. p. 190; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1931. — Meisn. 1842. Gen. p. 369 (277). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 25. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 73.
Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. t. 36: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Coelidium „Vogel mss." Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 472; 1842. Rep. I. p. 582; 1843. II. p. 834: nov. g. Genistear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6467. p. 1261; 1841. Ench. p. 667. — Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5891. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 350. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 73.
Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 453: g. Liparicar. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553.
Synon. Ingenhoussiae sp. Meyer; Amphithaleae sp. Eckl. & Zeyh.

Coeloblasteae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phycol. gener. p. 302. 438: subordo Eremospermear. Fam.: Vaucherieae, Caulerpeae, Codieae, Anadyomeneae,

*) *κοῖλος*, cavus.

Coeloblasteae Kütz. cont. Polyphyseae, Dasycladeae, Chareae. — Par. Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 249; 1849. Sp. Alg. p. 486. Fam.: Vaucherieae, Caulerpeae, Codieae, Valonieae, Anadyomeneae, Dictyosphaerieae, Characeae.

Coeloblasteae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 105; 1843. Phycol. gener. p. 413; 1845. Phycol. germ. p. 330; 1849. Sp. Alg. p. 859: ordo Choristocarpear. Fam.: Chondrosipheae, Champieae.

Coelocaules Nees 1844. Syn. Hepat. p. 13: subtrib. Jungermanniear. Gen. unicum: Gottschea. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 548. Gen. id.

Synon. Jungermanniae aligerae Nees olim.

Coelocaulon Link 1833. Handb. III. p. 165. = Cornicularia Hoffm.

Coelochloa Hochstett. in pl. Schimp. = Coelachyrum Hochst. & Nees.

Coeloclina Rchb. vid. *seq.*

Coelocline*) A. DC. 1832. Mém. soc. Genèv. V. p. 208. t. 5: nov. g. Anonacear. *Cf.* Flora Lit. III. p. 110. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 496.

Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 193. n. 7317 (*Coeloclina*): g. Uvariear.

Endl. 1839. Gen. n. 4716. p. 832; 1841. Ench. p. 422: g. Xylopiear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 74.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 422: g. Xylopear.

Synon. Unonae sp. Auct.; Uvariae sp. A. Rich.

= Xylopia Linn. (Hook. & Thw.)

Coelocrinon Koch 1837. Synops. p. 705. Ed. II. p. 814: sect. Convallariae. = Convallaria Adans.

Coelocystis „Nägeli mss." Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 209. n. 161: nov. g. Palmellear.

Coelodepas**) Hasskarl 1857. Flora II. p. 531; 1858. Hort. Bogor. p. 44: nov. g. Acalyphear. (C. bantamense.)

Baill. 1858. Euphorb. p. 653: inter Euphorbiaceas incertae sedis.

Coelodictyon Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 287: g. Callithamniear. pro Halydictyo mirabili Zan. constitutum. = Halydictyon Zanard.

Coelodiscus Baillon 1858. Et. Euphorb. p. 293: nov. g. Ricinidear. (Ricinus dioicus Roxb.)

Coeloglossum Hartm. 1820. Scand. Fl. ed. I. p. 329: nov. g. Orchidear. (Satyrium viride L.)

Koch 1844. Syn. ed. II. p. 795: g. Ophrydinear.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 61: g. Ophrydear.

Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 189: sect. Peristyli. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 713.

Synon. Diplorrhiza Ehrh.; Entaticus Gray; Peristylus Blume; Benthamia A. Rich.; Streptogyne Rchb.; Orchidis, Habenariae et Herminii sp. Auct.

*) κλίνη, lectum, pulvinar.
**) κοῖλος, cellula; δέπας, cupula.

Coeloglossum Lindl. 1835. Bot. Regist. n. ser. VII. n. 1701; 1835. Orchid. gen. p. 302: nov. g. Ophrydear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1520. p. 209; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1862. — Meisn. 1842. Gen. p. 380 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 75.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Gymnadenidar.

= Lindblomia Fries.

Coelogyge Bot. Zeit. 1847. p. 47: err. pro *Coelogyne.*

Coelogyne Lindl. 1825. Collect. p. 33; 1825. Bot. Regist. 868; 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1561. — A. Rich. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 16.

Spreng. 1827. Cur. post. p. 305; 1831. Gen. II. p. 667. n. 3365: g. Orchidear. — Par. Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 201. t. 42 A.

Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear. — Par. Lindl. 1841. Bot. Regist. t. 31; 1854. Fol. Orchid. (21. Jan.). Sect.: Neogyne, verae, Pleione. — Meisn. 1842. Gen. p. 372 (279). — Miq. 1858. Ind. bat. III p. 665. Sect. ut Lindl. 1854.

Lindl. 1830. Orchid. p. 38: g. Pleurothallear. Sect.: Gomphostylis, Panisea. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1347. p. 190; 1841. Ench. p. 109. Sect. eaed. et Chelonanthera. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1935. Sect.: Chelonanthera, Gomphostylis. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 25. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 75.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Coelogynidar.

Synon. Pleione Don; Chelonantherae sect. 2 et 3 Blume.

Coelogynidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 181: sect. Epidendrear. Gen.: Acanthoglossum?, Coelogyne, Panisea, Pleione, Trichosma, Dilochia, Pholidota, Otochilus, Earina. *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 170.

Coeloma DC. 1845. Prodr. IX. p. 556: sect. Heliophyti.

Coelophylla Planchon 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 93. 206: sect. Droserae. (D. glandulifera Lehm.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 73.

Coelopleurum Ledeb. 1845. Fl. Ross. II. p. 361: nov. g. Smyrnear. (Archangelica Gmelini DC.)

Walp. 1846. Rep. V. p. 920: g. Scandicinear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.

Endl. 1850. Spl. V. p. 15. n. 4535/$_1$: g. Eusmyrnear.

Coelopyrum „Jack" Hook. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 220: nov. g. Octandr. Monogyn. (C. coriaceum.)

Endl. 1841. Gen. n. 6880. p. 1332; 1841. Ench. p. 685: inter genera dialypetala vix nota. — Simil. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 364. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 76.

Coelopyrum Jack cont.
Meisn. 1843. Comm. p. 372: g. Pleiopetalar. obscurum.

Coelorachis Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 64. t. 14: nov. g. inter Ischaemum et Rottbölliam medium. (Rottböllia muricata Retz.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 213 (*Coelorrhachis*).
Endl. 1837. Gen. n. 927 *c.* p. 105 (*Coelorhachis*); 1841. Ench. p. 60: sect. Rottböllae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1365. 3.
Synon. Apogonia Nutt.

Coelorhachis Endl., Rchb. vid. *praeced.*

Coelorrhachis Wittst. vid. *praeced.*

Coelorutis*) Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 186: sect. Meliloti. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3870 *a.* — G. Don 1834. Gen. syst. II. p. 177. — Endl. 1840. Gen. n. 6510 *a.* p. 1268; 1841. Ench. p. 668.

Coelorytis Koch 1843. Synops. ed. II. p. 182: sect. Meliloti. (*Coelorutis* et *Plagiorutis Ser.*)

Coelosiphonia Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 104; 1843. Phycol. gener. p. 422; 1845. Phyc. germ. p. 317; 1849. Sp. Alg. p. 817: sect. Polysiphoniae. Subsect.(1843): Leptoclonia, Dasyclonia, Botryoclonia.

Coelospermae DC. 1830. Prodr. IV. p. 249: subordo 3 Umbelliferar. Tribus unica: Coriandreae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 381. — Koch 1836. Syn. p. 320. Ed. II. p. 352. — Meisn. 1838. Gen. p. 151 (108). — Endl. 1839. Gen. p. 792; 1841. Ench. p. 381. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 97.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 385: series Umbelliferar. Gen.: Bifora.
Synon. Coilospermae Rchb.

Coelospermum Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 994 (*Caelospermum*): nov. g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 497.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 209: g. Guettardacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375.
DC. 1830. Pr. IV. p. 468: g. Guettardear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 558. — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2861. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3211. p. 541; 1841. Ench. p. 273: g. Euguettardear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 77.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 301: g. Chasaliear.

Coelosphaerium Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 54: nov. g. Chroococcacear.

Coelosporium Link 1824. Spec. I. p. 46: nov. g. Hymenomycetum. (Helmisporium cavispermum Link.)
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Conopleacear.

*) ῥυτίς, ruga.

Coelosporium Link cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 113: g. Psiloniaceor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 11; 1842. Mycol. p. 45: g. Psiloniacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44 (*Caelosporium*): g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 501: g. Dematiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Menisporeor.
= Dematii Fries pars?

Coelostachys „A. Juss." Meisn. Gen. Comm. p. 316: vid. *Coleostachys A. Juss.*

Coelostyleae Endl. 1841. Gen. Suppl. I. p. 1395; 1841. Ench. p. 289: trib. Strychnear. Gen.: Spigelia, Coelostylis.
= Spigelieae A. DC.

Coelostylis „Torrey & A. Gray mss." Endl. 1839. Nov. stirp. Mus. Vindob. dec. nr. 41: nov. g. Loganiacear.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 43: g. Loganiear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 3363/1. p. 1395; 1841. Ench. p. 289. n. 3363/2; 1842. Spl. II. p. 56: g. Coelostylear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 77.
Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5217: g. Labordiear.? — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 365.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 7: Spigeliae injungit.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424: g. Strychnear.

Coelostylis A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 325: sect. Bunchosiae. (B. eglandulosa.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7866. 2.
= Echinopterys A. Juss.

Coelotheca A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 421: sect. Microcodonis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3078 *b.* p. 1392; 1841. Ench. p. 266. — Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4033. 2.

Coenocarpus*) „Rebent. Neom. p. 350" Fries 1825. Pl. homon. p. 297: g. Rhizomorphear. — Par. Leman 1827. Dict. v. 45. p. 385 (*Caenocarpus*).
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 95: g. Rhizomorpheor.

Coenogoneae Fries 1825. Pl. homon. p. 299: trib. Byssacear. Gen.: Lichina, Cora, Cilicia, Coenogonium, Thermutis, Gausapia; Ozonium?

Coenogonei Rchb. 1828. Consp. p. 5: subdiv. Byssaceor. genuinor. Gen. Coenogonear. Fries.

Coenogonieae Montagne 1842. Pl. cell. Cub. p. 107; 1842 in Orb. Dict. II. p. 792; 1849. ibid. IV. p. 78: trib. Byssacear. Gen.: Coenogonium, Cilicia, Ephebe, Thermutis, Rhacodium. — Par. Babingt. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 310. Gen.: Coenogonium.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 122: div. Byssacear. Gen. scand.: Thermutis.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 351: trib. Collemacear. Gen.: Coenogonium, Cilicia, Ephebe, Micaraea, Thermutis.

*) κοινός, communis.

Coenogonium Ehrenb. 1820. Hor. phys. Berol. p. 120. t. 27: nov. g. Lichenum. *Cf.* Flora 1821. II. p. 522. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 15 (*Caenogonium*).
Fries 1825. Pl. homon. p. 301: g. Coenogonear. *Cf. Dichonema Fries.*
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 188: g. Hymenocarpor.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 87: g. Coenogoneor.
Endl. 1836. Gen. n. 164. p. 14; 1841. Ench. p. 10: g. Collemacear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 561: g. Usneacear.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 107; 1842 in Orb. Dict. II. p. 792; 1849. ibid. IV. p. 78; 1849. ibid. VII. p. 351: g. Coenogoniear. — Par. Babingt. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 310.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Ephebidar.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 394: g. Byssaceor.
(= Mougeotia Agdh.? Kütz. Spec. p. 434.)

Coenolophium Rchb., Bartl. vid. *Cenolophium Koch.*

Coenopteris Leman vid. *Caenopteris.*

Coenorachis DC. 1837. Prodr. VI. p. 85: sect. Hymenolepidis. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 169, corr. *Cenorrhachis.*
Endl. 1838. Gen. n. 2689 *c.* p. 438 (*Coenorhachis*); 1841. Ench. p. 242 (*Coenorhachys*): sect. Metagnanthi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3846. 3. (?)

Coenorhachis Endl. vid. *praeced.*

Coenorhachys Endl. vid. *praeced.*

Coenosantheae Blume 1825. Bijdr. Nr. 10. p. 485: sect. Urticear. Gen.: Celtis, Broussonetia, Morus, Epicarpurus, Trophis, Antiaris, Urtica, Procris, Gunnera, Aporosa, Sciaphila.

Coenothalameae Gray Arr. brit. pl. I. p. 277: vid. *Cenothalameae Gray.*

Coenothalami Achar. 1803. Meth. Lich. p. xxxii: ordo Lichenum. Gen.: Thelotrema, Sphaerophoron, Isidium, Urceolaria, Parmelia; Sticta, Peltidea, Cetraria, Cornicularia, Usnea; Stereocaulon, Baeomyces. — Par. Achar. 1810. Lich. univ. p. 19; 1814. Syn. p. xii. Ordines: Phymatoidei, Discoidei, Cephaloidei. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 58.

Coenothalamia Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 41: ordo Aspidocarpor. Gen.: Baeomyces, Stereocaulon, Usnea, Cornicularia, Parmelia, Sticta, Peltidea, Cetraria.

Coenothalamii Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 88: ordo Choriophytor.

Coeoma Agardh vid. *Caeoma Link.*

Coeomideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 533: div. Protomycear. Gen.: Röstelia, Aecidium, Ustilago, Uredo, Albugo, Coeomurus, Dicaeoma, Puccinia, Podisoma.

Coeomurus Gray Arr. brit. pl. I. p. 533. 540: vid. *Caeomurus Link.*

Coetocapnia*) Link & Otto 1828. Ic. plant. rar. I. 3. p. 35. t. 18 (*Zetocapnia* ex Steud.): nov. g. Amaryllidear. (C. geminiflora.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 7.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 277. n. 1437: g. Spathaceis aff. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1188.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 19. 245: subg. Bravoae.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 136 (*Cactocapnia*): g. Narcissear.
= Bravoa Llav. & Lex.

Cofea Adans. 1763. Fam. II. p. 145: g. Aparinium. (Mala correctio: *Café* vid. ibid. p. 500.)
= seq.

Coffe „Raj. 1691. Hist. pl. II." Juss. 1713. Act. Ac. Paris. p. 291 (*Café*).
DC. 1830. Pr. IV. p. 498: sect. Coffeae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 579. — Endl. 1838. Gen. n. 3152 *a.* p. 533; 1841. Ench. p. 572.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 449: subg. Coffeae.
Synon. Cofea et Café Adans.; Coffea A. Rich.

Coffea*) Linn. 1737. Gen. p. 55. n. 158; 1737. Cliff. p. 59; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 41; 1753. Sp. I. p. 172; 1759. Syst. ed. X. p. 929. n. 209; 1762. Sp. ed. II. p. 245; 1764. Gen. ed. VI. p. 92. n. 230; 1767. Syst. ed. XII. p. 165. n. 229: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 179; 1784. Syst. p. 215. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 150. t. 57. 58. — Reich. 1778. Gen. p. 94. n. 247. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 126. n. 314. — Lour. 1790. Coch. I. p. 144. — Gmel. 1791. Syst. p. 365. — Pers. 1797. Syst. p. 223. — Willd. 1797. Sp. I. p. 973. n. 353; 1809. En. p. 219. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 63. t. 214—218. (reform.)
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 202. n. 835: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 504.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 204; 1820. Mém. Mus. VI. p. 379. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 583. — Beauv. 1804. Dict. v. 6. p. 140 (*Cafier*). — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 444. — Pers. 1805. Ench. I. p. 208. n. 467. — Hedw. 1806. Gen. p. 143. n. 617. (restrict.) — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. xi. 196. n. 894. Sect.: genuinae, Potima. — Link 1821. En. I. p. 224; 1829. Hdb. I. p. 658. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 755. n. 806; 1830. Gen. I. p. 171. n. 862. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 965. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 774. Subgen.: verae (sect. ut DC.), Chasalia. — Boit. 1849 in Orb. Dict. III. p. 19 (*Caféier*).

*) Dicat. alicui nomen geronti Stubenrauch. (*κοιτείν*, cubile; *καπνός*, fumus.)

*) Nomen teste Ritter a provincia africana Caffa.

Coffea Linn. cont.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 34: g. Fraxinos et Loniceras conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 144: g. Opulinar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 118. t. 25. f. 3 (arabica).
Neck. 1790. El. I. p. 141. n. 245: g. Sphanidophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 233: g. Coffeacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 602. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 371. — Kunth 1824. Syn. III. p. 31. — Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2034. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 435. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 448. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49.
Cram. 1803. Disp. p. 37 in Tetrandr. Monogyn.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Coffeariae.
Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 32: g. Psychotriacear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118).
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear. — Par. Cham. 1834. Linnaea IX. p. 222. — Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 75. n. 2802. Sect. fere ut DC.
DC. 1830. Pr. IV. p. 498: g. Coffeear. Sect.: Coffe, Hornia, Pancrasia, Straussia. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 579. Sect. eaed. — Endl. 1838. Gen. n. 3152. p. 533; 1841. Ench. p. 272. Sect. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 304: g. Coffeinear. Sect.: genuinae, Straussia, Paracoffea.
Synon. Carpothalis E. Meyer?

Coffea A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 168: g. Coffeacear. restrict.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2802. 1: sect. Coffeae.
= Coffe DC.

Coffeaceae Batsch 1802. Tab. affin. p. 233: fam. Rigidar. Gen.: Chimarrhis, Chiococca, Psychotria, Coffea, Paederia, Coprosma, Chomelia, Pavetta, Ixora, Coussarea, Cunninghamia, Antirhea.
DC. (1806. Diss. ined.) 1807. Ann. Mus. IX. p. 217; 1830. Pr. IV. p. 472: trib. Rubiacear. Subtrib. (1830): Coffeeae, Cephaëlideae. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 164. Gen.: Chasallia, Coffea, Rudgea, Ronabea, Psychotria, Cephaëlis, Mapouria, Palicurea, Faramea, Coussarea, Saprosma, Rutidea, Strempelia, Pavetta, Chomelia, Siderodendrum, Baconia, Polyosus, Chiococca, Schiedea, Canthium, Plectronia, Psydrax, Marquisia, Nescidia, Declieuxia, Paederia, Lecontea, Stipularia, Evea, Amaracarpus, Hypobathrum, Jackia. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 562. Subtrib. ut DC. — Meisn. 1838. Gen. p. 168 (118). Subtrib.: Psychotriaceae, Cephaëlideae. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49. Gen.: Cephaëlis, Psychotria, Coffea, Saldinia, Rutidea, Pavetta, Ixora, Chiococca.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 600: ordo Rubiacear. Gen.: Frölichia, Scolosanthus, Tetramerium, Chomelia, Pavetta, Ernodea, Dunalia, Hydrophylax, Coffea, Psychotria, Chiococca, Machaonia, Chimarrhis, Canthium, Webera, Plocama, Stenostomum, Gärtnera.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 352: sect. Rubiacear. Gen.: Chiococca, Declieuxia, Psychotria, Palicourea, Coffea, Tetramerium, Patabea, Cephaëlis, Nerteria. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 20. Gen. ead. — Rchb. 1827 ap Mössl. I. p. xxxi; 1828. Consp. p. 94. Gen. 1827: Ernodea, Ixora, Coffea, Psychotria, Chiococca. Accedunt 1828: Knoxia, Plocama, Richardsonia, Cuncea, Spermacoce, Bigelovia, Mithracarpus, Staëlia, Diodia, Hydrophylax, Mitchella, Nertera, Siderodendron, Polyosus, Faramea, Baconia, Chomelia, Pavetta, Declieuxia, Psyllocarpus, Dunalia, Lasianthus, Helospora, Hydrophytum, Tetramerium, Frölichia, Coussarea, Malanea, Antirrhea, Scolosanthus; Stenostomum, Rutidea, Cattutella?, Jackia, Argostemma, Palicourea, Chasallia, Canthium, Geophila, Rudgea, Ronabea, Lygodisodea, Chimarrhis, Machaonia, Alseis. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376. 435. Gen. Coffeear. DC. et Psilostoma, Mapouria.
Endl. 1838. Gen. p. 521; 1841. Ench. p. 270: subordo Rubiacear. Tribus: Opercularieae, Stellatae, Anthospermeae, Spermacoceae, Psychotrieae, Paederieae, Guettardeae, Cordiereae. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 239. Trib.: Morindeae, Vanguerieae, Guettardeae, Pavetteae, Psychotrieae, Anthospermeae, Spermacoceae, Stellatae.

Coffeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 764: subordo Cinchonacear. Trib.: Operculariidae, Anthospermidae, Spermacocidae, Psychotridae, Paederidae, Guettardidae.

Coffearia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: subfam. Apariniae. Gen.: Rubia, Peteria, Chiococca, Coffea, Canthium, Dychotria, Ronabea, Pederia, Coprosma, Simira, Palicuria, Ernodea, Putoria, Sclerodendron, Taramea, Erythrodanum, Hippotis?, Serissa?

Coffeariae Rchb. 1837. Handb. p. 180; 1841. Nomencl. p. 74: div. Rubiacear. Subdivis.: Spermacoceae, Coffeinae, Cinchoneae.

Coffeeae DC. 1830. Prodr. IV. p. 472: subtrib. Coffeacear. Gen.: Amaracarpus, Damnacanthus, Canthium, Plectronia, Psydrax, Marquisia, Nescidia, Diplospora, Epithinia, Siderodendron, Eumachia, Declieuxia, Tertrea, Chiococca, Margaris, Saldinia, Scolosanthus, Chomelia, Baconia, Ixora, Pavetta, Saprosma, Coussarea, Polyozus, Grumilea, Rutidea, Faramea, Strempelia, Coffea, Rudgea, Antherura, Ronabea, Psychotria, Palicourea, Chasalia. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 562 Gen. ead. et Antonia, Jackia.
Endl. 1838. Gen. p. 532; 1841. Ench. p. 271: subtrib. Psychotriear. Gen. ut DC. et Mapouria, Psilostoma. Accedit 1843 (Spl. III. p. 72) Mitriostigma.

Coffeinae Rchb. 1837. Handb. p. 180; 1841. Nomencl. p. 75: subdiv. Coffeariar. Sect.: Cephaëlideae, Psychotrieae, Guettardeae.

Coffeineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XVII. 48: class. Gamopetalar. perigynar. Fam. unica: Rubiaceae.

Coffeineae Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 302: subtrib. Psychotriear. Gen.: Saprosma, Antirrhoea, Amaracarpus, Coffea, Hydnophytum, Myrmecodia.

Cogswellia Schult. f. 1820. Syst. VI. p. XLVIII: g. Selinear. (*Lomatium Rafin.*)
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3760: g. Hermadear.
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar. desciscens. *Cf.* Meisn. 1838. Comm. p. 102.
= Ferularia DC.

Cogylia Molina 1810. Saggio ed. II. p. 300.
= Lardizabala Ruiz & Pav.

Cohautia Endl. vid. *Kohautia Cham.*

Cohnia*) Kunth 1850. Enum. V. p. 35: nov. g. Dracaenear. (Dracaena flabelliformis Bory? etc.)

Cohnia Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 928; 1858. Xen. Orchid. p. 238. t. 100: nov. g. Vandear. (Cohniacear.)

Cohniaceae Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 928: fam. Orchidear. Gen.: Cohnia.

Coiceae Rchb. 1828. Consp. p. 51: subdiv. Panicear. Gen.: Coix.

Coilantha „Ren. sp. 65" Borckh. 1796 in Römer Arch. I. p. 25: g. pro Gentiana purpurea L. admissum.
DC. 1805. Franç. III. p. 650 (*Coilanthe*): sect. Gentianae.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 184: g. Gentianear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5130. 2 *e*: subsect. Gentianae.
Vid. Coelanthe Renealm.

Coilanthe „Fröl." DC. vid. *praeced.*

Coilmeroa „Reut." Endl. vid. *Colmeiroa Reut.*

Coilocarpicae (*Resedeae*) Rchb. 1828. Consp. p. 186: div. Tetradynamar. Gen.: Sesamella, Reseda, Singana, Calispermum?

Coilophyces Rchb. vid. *Coilophyses Corda.*

Coilophyllum Morris . . . . Hist. III. p. 533.
= Sarracenia Linn.

Coilophyses Corda 1839. Icon. Fung. III. p. 27: sect. Nemasporae. (N. leucomyxa.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 48. 3 (*Coilophyces*).

Coilosperma Rafin. 1836. Fl. Tell. p. 43.
= Deeringiae R. Brown pars. (Moq. in DC. Pr. XIII. 2. p. 236.)

Coilospermae Rchb. 1832. Fl. exc. p. 440: trib. Umbelliferar. (Coriandreae.)
= Coelospermae DC.

Coilostigma Endl. 1838. Gen. n. 2129 *a*. p. 338; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 79: sect. Spatallae. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 306.

*) Dicat. Dr. Ferd. Jul. Cohn, Wratislaw.

Coilostigma Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 234: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442.
Endl. 1839. Gen. p. 751. n. 4298 *a*: sect. Coilostigmatis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4900. 2.
= Eucoilostigma Benth.

Coilostigma Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 708: g. Salaxidear. ampliat. Sect.: Thamnium, Eucoilostigma.
Endl. 1839. Gen. n. 4298. p. 751; 1841. Ench. p. 369: g. Coilostigmear. Sect. similes. — Par. Lemaire 1849 in Orb. Dict. IV. p. 83.
Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4900: g. Ericear. genuinar. Sect. ut Endl. 1839.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.
Synon. Coilostigma et Thamnium Klotzsch.

Coilostigmeae Endl. 1839. Gen. p. 751; 1841. Ench. p. 369: div. Salaxidear. Gen.: Salaxis, Lagenocarpus, Scyphogyne (1841 Omphalocaryon), Codonostigma, Coilostigma.

Coilotapalus P. Browne 1756. Jamaic. p. 111. (Ficus surinamensis Pluk., Amboiba Plumeri.)
= Cecropia Linn.?

Coinogyne*) Lessing 1831. Linnaea VI. p. 520: nov. g. Anthemidear. (C. carnosa.) *Cf.* Hook. & Arn. 1833. Beech. voy. Bot. p. 150, et Wittst. Etym. Handw. p. 223 (*Conogyne*).
Less. 1832. Syn. p. 251: g. Chrysanthemear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 41. — Endl. 1838. Gen. n. 2658. p. 432; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 211 (135). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 410. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3079. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 276: g. Pyrethrear.

Coix**) Linn. 1737. Gen. p. 280. n. 704; 1737. Cliff. p. 437; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 281; 1753. Sp. II. p. 972; 1759. Syst. ed. X. p. 1261. n. 927; 1763. Sp. ed. II. p. 1378; 1764. Gen. ed. VI. p. 481. n. 1043; 1767. Syst. ed. XII. p. 615: g. Monoec. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 703; 1784. Syst. p. 842. — Reich. 1778. Gen. p. 476. n. 1135. — Lour. 1790. Coch. II. p. 550. Schreb. 1791. Gen. II. p. 623. n. 1405. — Pers. 1797. Syst. p. 885. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 202. n. 1638; 1809. En. p. 953. — Trin. 1820. Fund. p. 199. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 568.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 19. n. 73: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Scop. 1777.

*) „E vocabulis κοινός et γυνή. Conis, quibus rami styli terminantur, alluditur."
**) κόϊξ Theophrasto palmae genus.

Coix Linn. cont.
Intr. p. 78. (spurior.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Link 1822. En. II. p. 377.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 406. — Juss. 1789. Gen. p. 34. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 112. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 89. — Pers. 1807. Ench. II. p. 533. n. 2032. — Palis. 1812. Agrost. p. 137. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 10. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 238. n. 243; 1831. Gen. II. p. 688. n. 3469. — Link 1829. Hdb. I. p. 96.
Adans. 1763. Fam. II. p. 39: g. Maïdum.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 37: g. Triandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 149.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 321. *Cf. Lacryma Medic.*
Neck. 1790. El. III. p. 230. n. 1614: g. Achyrophytor.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 75: g. Olyrear. — Par. Nees 1829. Agrost. Bras. p. 310.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 183: g. Oryzear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 153.
Link 1827. Hort. I. p. 252: g. Diclinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 940: g. Coicear.
Kunth 1830. Gram. p. 13; 1833. Agrost. p. 20: g. Phalaridear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 743. p. 80; 1841. Ench. p. 56. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1245. — Meisn. 1843. Gen. p. 415 (318). — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 29; 1850 in Webb Canar. III. p. 378. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 175. — Steud. 1854. Glum. I. p. 9.
Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838.) p. 79.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 131. 234: g. Phalaroidear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 11: g. Panicear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 476: g. Maydear.
Synon. Lacryma Job Tourn.; Lacryma Medic.; Lithagrostis Gärtn.

Coix Linn. 1751. Phil. bot. p. 27: g. Palmar. (Quid?)

Cola Bauh. 1623. Pin. p. 507.
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 33: g. Sterculiear. (Sterculia acuminata Palis., etc.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 31 (25). — R. Brown 1844 in Horsf. pl. jav. rar. Pt. 3. p. 236. — Walp. 1846. Rep. V. p. 106.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 511: g. Sterculiacear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 616. — Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. $5321/_6$.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Southwelliear.
Endl. 1840. Gen. n. 5320 *f.* p. 994; 1841. Ench. p. 516: sect. Sterculiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7699. 6.
Synon. Bichy Lunan; Culhamia Forsk.?; Edwardia Rafin.; Lunanea DC.

Colacastrum Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 542: sect. Maxillariae. (M. sulphurina Lemr. et leptosepala Hook.)

Colax*) Lindl. . . . . Bot. Regist. t. 897.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 727. n. 2998: g. Orchidear., serius (Gen. II. p. 673) ad Maxillariam reductum.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. n. 1549; 1833. Orchid. p. 145: sect. Maxillariae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1407 *a.* p. 197; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2010. 1.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.
Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 107. t. 41.

Colbertia**) Salisb. 1807. Parad. n. 73.
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 14: g. Dilleniacear. — Par. Blume 1825. Bijdr. Nr. 1. p. 6. — D. Don 1825. Nepal. p. 226.
DC. 1818. Syst. I. p. 435; 1824. Pr. I. p. 75: g. Dillenear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 77. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (5). — Endl. 1839. Gen. p. 840. n. 4747. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.
Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4988: g. Hibbertiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 250: g. Dilleniear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7287. (genuinar.) — Endl. 1841. Ench. p. 431. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 86.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 425: g. Dillenineear.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 70: sect. Dilleniae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 33.

Colchicaceae DC. 1805. Fl. franç. III. p. 192: fam. (19) Monocotyledonum phanerogamar. Gen.: Tofieldia, Veratrum, Colchicum, Merendera, Bulbocodium, Erythronium. *Cf.* Orb. Dict. IV. p. 87.
DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Endogenar. phanerogamar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 171: fam. plant. endogenar. phanerogamar. Gen.: Tofieldia, Colchicum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: fam. Thalamauliae.
Bartl. 1830. Ord. p. 51: ordo (36) Liliacear. Gen.: Colchicum, Hermodactylum, Merendera, Monocaryum, Bulbocodium, Kolbea, Melanthium, Erythrostictis, Androcymbium, Cymation, Burchardia, Ornithoglossum, Wurmbea, Calochortus, Zigadenus, Xerophyllum, Helonias, Veratrum, Nolina, Tofieldia, Pleea; Peliosanthes?
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 158. Novum gen.: Hamelinia.
Koch 1837. Syn. p. 723. Ed. II. p. 835: ordo Endogenear. Gen.: Bulbocodium, Colchicum, Veratrum, Tofieldia.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 233: fam. (210) Liliacear. Trib.: Colchiceae, Veratreae.
= Melanthaceae R. Brown.

---

*) κόλαξ, parasita.
**) Dicat. Jean Bapt., marquis de Seignelay Colbert.

Colchiceae Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 15: fam. Monoperigynar. Gen.: Nolina, Pleea, Calochorthus, Helonias, Melanthium, Wurmbea, Funckia, Anguillaria, Veratrum, Peliosanthes, Merendera, Colchicum, Burchardia, Schelhamera; Astelia?
Dumort. 1827. Fl. Belg. p. 141.
Rchb. 1828. Consp. p. 64 (1830. Fl. exc. p. 98); 1837. Hdb. p. 152: subdiv. Melanthear. Gen.: Hermodactylos, Bulbocodium, Merendera, Monocaryum, Colchicum.
Nees & Eberm. 1830. Hdb. I. p. 50: trib. Colchicacear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 234. Gen. ut Kunth. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 87. Gen. ut Endl.
Endl. 1837. Gen. p. 137: trib. Melanthacear. Gen.: Monocaryum, Bulbocodium, Colchicum. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1358) Weldenia. — Par. A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York IV. p. 107. 110. Gen. amer.: Leucocrinum. — Bernh. 1840. Flora II. p. 425. — D. Don 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 514. — Meisn. 1842. Gen. p. 404 (308). Gen. ut Endl. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 137. Gen. ead. et Merendera, Leucocrinum. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 17. Gen.: Bulbocodium, Colchicum. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199. Gen. ut Endl.
Endl. 1841. Ench. p. 79: subordo Melanthacear. Gen. ut 1837.
Rchb. 1841. Nom. p. 47: div. Juncacear. Gen. ut Endl. 1841 et Hermodactylus.
Colchicineae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 61.
= Colchiceae Nees & Eberm.
Colchicum*) Tourn. 1700. Inst. p. 345. t. 181: g. pl. class. IX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 34. Ed. Hall. 1745. p. 35: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 107. n. 304; 1737. Cliff. p. 140; 1740. Syst. p. 22; 1748. Ups. p. 90; 1753. Sp. I. p. 341; 1759. Syst. ed. X. p. 992. n. 415; 1762. Sp. ed. II. p. 485; 1764. Gen. ed. VI. p. 180. n. 457; 1767. Syst. ed. XII. p. 256. n. 452: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 265. — Murr. 1774. Syst. p. 287; 1784. Syst. p. 349. — Reich. 1778. Gen. p. 182. n. 492. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 241. n. 621. — Gmel. 1791. Syst. p. 588. — Pers. 1797. Syst. p. 371; 1805. Ench. I. p. 398. n. 886. — Willd. 1799. Sp. II. p. 272. n. 707; 1809. En. p. 401. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 469. 599.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 282: g. Liliacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 86. — Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 26. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 238.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 222. n. 921: g. Petalostemonum. Simil. Mönch 1794. Meth. p. 631.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: g. Denudatar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.

*) Plurimum apud Colchos nascitur. (Dioscor.)

Colchicum Tourn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 54: g. Hyacinthor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Spathacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 274.
Hill 1769. Ht. kew. p. 334: g. Monopetalar. incompletar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 70. t. 18. f. 2 (autumnale).
Juss. 1789. Gen. p. 47: g. Juncor.
Neck. 1790. El. III. p. 184. n. 1542: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 155: g. Juncacear.
Batsch 1802. Tab. p. 145: g. Bulbiflorar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 116: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 250. n. 1014.
DC. 1805. Franç. III. p. 194: g. Colchicacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 172. — Bartl. 1830. Ord. p. 52. — Koch 1837. Syn. p. 723. Ed. II. p. 835. — Kunth 1838. Berol. II. p. 272.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 329: g. Bulbocodear. — Par. Steven 1829. Mém. Mosc. VII. p. 261. t. 13—16.
Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 15 et Lois. ibid. p. 16: g. Colchicear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1311; 1830. Fl. exc. p. 98; 1841. Nom. p. 47. n. 1719. — Endl. 1837. Gen. n. 1086. p. 137; 1841. Ench. p. 79. Sect.: Colchicum (1841 Eucolchicum), Hermodactylus. — Meisn. 1842. Gen. p. 404 (308). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 138. Sect. ut Endl. 1837. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 17. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 235. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 87. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 203. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 170.
Link 1821. En. I. p. 348; 1829. Hdb. I. p. 148: g. Melanthacear. — Par. R. Brown 1826. App. Oudn. et Denh. p. 241. (Verm. bot. Schr. IV. p. 65.) Sect.: Bulbocodium, Merendera, Hermodactylus, Monocaryum. — Schult. 1830. Syst. VII. p. xcvi. 1507. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 377.
Agdh. 1823. Aphor. p. 167: g. Veratrear.
Tristan 1823. Mém. Mus. X. p. 36. (Evolutio gemmae.)
Spreng. 1825. Syst. II. p. 142. n. 1358: g. Coronariar.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 289. n. 1498: g. Asphodeleis et Junceis aff. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1210.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Colchicum Endl. 1837. Gen. p. 137. n. 1086 *a*: sect. Colchici. — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 139.
= Eucolchicum Endl.
Colchitropis Steud. vid. *Cochlitropis Benth.*
Coldenia*) Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 119: nov. g. plant.
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 28. n. 69 (Nov. gen. zeyl. p. 6. n. 1043); 1753. Sp. I. p. 125; 1759. Syst. ed. X. p. 901. n. 159; 1762. Sp. ed. II. p. 182; 1764. Gen.

*) Dicat. Cadwallader Colden.

Coldenia Linn. cont.
ed. VI. p. 67. n. 173; 1767. Syst. ed. XII. p. 130: g. Tetrandr. Tetragyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 140; 1784. Syst. p. 168. — Reich. 1778. Gen. p. 70. n. 185. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 92. n. 233. — Gmel. 1791. Syst. p. 288. — Pers. 1797. Syst. p. 174. — Willd. 1797. Sp. I. p. 712. n. 268.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 130. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 299. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 20. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 933.
Adans. 1763. Fam. II. p. 178: g. Borraginum.
Gled. 1764. Syst. p. 170. n. 694: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 157: g. Asperifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 489. — Batsch 1802. Tab. p. 188. — Lehm. 1818 in Berl. Mag. VIII. p. 91; 1818. Asperif. I p. 7. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV p. VI. 52. n. 627. — Spreng. 1825. Syst. I p. 538. n. 580; 1830. Gen. I. p. 123. n. 610. — Bartl. 1830. Ord. p. 197. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 592.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 329. t. 68. f. 3 (procumbens).
Neck. 1790. El. I. p. 283. n. 447: g. Trachytophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 33 in Tetrandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 450: g. Echiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2956.
Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 468; ed. 1832. I. p. 448: g. Tetrandr. Digyn.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 365: g. Heliotropear. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 558. Sect.: Eucoldenia, Tiquilia?, Stegnocarpus.
Endl. 1839. Gen. n. 3749. p. 646; 1841. Ench. p. 320: g. Tournefortiear. Sect.: Coldenia (1841 Eucoldenia), Tiquilia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 279 (187). — Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4367. Sect. ut Endl. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 89.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653: g. Tournefortear.
Synon. Goldenia Räusch.? (Steud.)

Coldenia Pers. 1805. Enchir. I. p. 153. n. 347: g. restrict. Tetrandr. Tetragyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 83. n. 384: g. Borraginear.
Endl. 1840. Gen. p. 646. n. 3749 *a*: sect. Coldeniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4367. 1.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 32: g. Tournefortiear.
= Eucoldenia Endl.

Colea*) Bojer 1837. Hort. Maurit. p. 220: novum gen. Colearum.
DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 134; 1845. Pr. IX. p. 240: g. Tanaeciear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 301 (210).

*) Dicat. G. Lowry Cole, gubernatori ins. Mauritii.

Colea Bojer cont.
Endl. 1841. Spl. I. n. 4171/3. p. 1409; 1841. Ench. p. 350: g. Crescentiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4723. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 759.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 674: g. Crescentiacear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 89: g. Gesneriacear.

Coleae Bojer 1837. Hort. Maurit. p. 200. = Tanaecieae DC.

Coleanthinae Link 1827. Hort. I. p. 269: fam. Graminear. Gen.: Schmidtia.

Coleanthus*) Seidel 1817 in Röm. & Schult. Syst. II. p. 11. 276. n. 210: g. Triandr. Digyn. (Schmidtia subtilis Tratt.)
Schult. 1822. Mant. p. 70: g. Diandr. Digyn.
Agdh. 1823. Aphor. p. 147: g. Agrostidear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 28. — Kunth 1830. Gram. p. 65; 1833. Agrost. p. 204. — Endl. 1837. Gen. n. 805. p. 89; 1841. Ench. p. 57. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 29. — Meisn. 1843. Gen. p. 419 (320). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161.
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 911: g. Miliacear.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 30: g. Oryzear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 780. Ed. II. p. 900. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 80.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 134. 311: g. Agrostoidear.
Trin. 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 35: g. Vilfeor.
Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1169: g. Agrostear. — Par. Lindl. 1847. Vg. kd. p. 115.
Steud. 1854. Glum. I. p. 147: g. Vilfear.
Synon. Schmidtia Tratt.; Wilibalda Sternb.

Colebrockia „Roxb.“ Steud. vid. *Colebrookea Smith.*

Colebrockia „Don“ Steud., Lestib. vid. *Colebrookia Donn.*

Colebrookea**) Smith 1806. Exot. bot. II. p. 111. t. 115: nov. g. Didynam. Gymnosperm. (Viticum.) *Cf.* Steud. Nom. I. p. 396 (*Colebrockia*). — Par. Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 40. t. 245; 1832. Ind. III. p. 25.
Synon. Buchanania Smith; Sussodia Hamilt.; Colebrookia Spreng.

Colebrookia Donn 1796. Cat. hort. Cantabr. p. 1. (*Colebrockia* Steud. Nom. I. p. 396.)
Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 335 (*Colebrockia*). 341: g. Mantisiear. (Globba Careyana et marantina.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 22. n. 1621 *d*: sect. Globbae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear.
Synon. Ceratanthera Horn.; Hura Kön.; Sphaerocarpus Gmel.; Manitia Gis.

*) κολεός, vagina.
**) Dicat. Henry Thomas Colebrooke.

Colebrookia Spreng. 1825. Syst. II. p. 713. n. 2077; 1831. Gen. II. p. 470. n. 2313: g. Labiatar.
D. Don 1825. Nepal. p. 104: g. Verbenacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2853: g. Nepetear.
Bartl. 1830. Ord. p. 180: g. Verbenear.
Benth. 1833. Labiat. p. 165: g. Menthoidear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 715. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 352. 404.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188; 1841. Nom. p. 104. n. 4049: g. Menthear. (genuinar.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3590. p. 612; 1841. Ench. p. 306. — Meisn. 1840. Gen. p. 283 (192). — Walp. 1845. Rep. III. p. 584. 979.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Menthidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 158: g. Elsholtziear.
= Colebrookea Smith.

Colensoa*) Hook. f. . . . . in Hook. Icon. t. 555. 556; 1853. Fl. New-Zeal. I. p. 156: nov. g. Lobeliacear. (Lobelia physaloides DC.)

Coleochaete Brébiss. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 29: nov. g. Chaetophoroidear. (C. scutata.)
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . .: g. Cladophorear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Chaetophoridar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Coleochaetear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 424. n. 263: g. Confervear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 509.

Coleochaeteae Nägeli 1847. Neuere Alg. Syst. p. . . .: trib. Confervacear. Gen.: Coleochaete.

Coleofissae Wiggers 1780. Prim. fl. Holsat. p. 81: ordo 7 Cryptogamiae. Gen.: Jungermannia, Conocephalum, Marchantia, Anthoceros.

Coleogyne Torrey 1853. Pl. Fremont. p. 8 (Flora 1853. p. 705): nov. g. Chrysobalanear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 641.

Coleoides Benth. 1832. Labiat. p. 32; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 63: sect. Plectranthi. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 677. Endl. 1838. Gen. n. 3575 *b* p. 609; 1841. Ench. p. 306. — Walp. 1845. Rep. III. p. 501. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 947.
Synon. Camptanthus Rchb.

Coleonema**) Bartl. & Wendl. 1824. Diosm. p. 12. 55: nov. g. Diosmear. (Diosma alba Thunb.) *Cf.* Flora 1827. p. 414. — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 471.
Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5160; 1837. Hdb. p. 282. — Bartl. 1830. Ord. p. 388. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 783. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 328. — Meisn. 1837. Gen. p. 61 (45). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 83.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 185: sect. Diosmae. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 828.
Endl. 1840. Gen. n. 6016. p. 1157; 1841. Ench. p. 612: g. Eudiosmear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 507. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7506: g. Agathosmear.

Coleophora „Miers" Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 531: g. Thymelaeacear.?
Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 196: g. Thymelaeacear. — Par. Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 70.
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 548: g. Daphnear. diplostemonear.

Coleophyllum Klotzsch 1840 in Gartenzeit. p. 185: nov. g. Amaryllidear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 15. n. 1281/$_1$: g. Amaryllear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 371. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 9. 53.
= Chlidanthus Herb.

Coleophyta Rchb. 1837. Handb. p. 141; 1841. Nomencl. p. 31: class. IV. plantar. (*Acroblastae Rchb.* 1828.) Ordines: Rhizo-Coleophyta, Caulo-Coleophyta, Phyllo-Coleophyta.

Coleosanthus Cassini 1817. Bull. soc. philom. Avr. p. 67; 1820. Dict. v. 16. p. 10: nov. g. Eupatoriear.
Cass. 1818. Dict. v. 10. p. 36; 1823. v. 26. p. 228; 1830. v. 60. p. 586: g. Liatridear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37.
Bartl. 1830. Ord. p. 136: g. Eupatorinar.
= Bulbostylis et Hebeclinium DC.

Coleosporium Léveillé 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 373; 1849. Flora p. 278; 1849 in Orb. Dict. XII. p. 786: nov. g. Uredinear. (Uredinis sp.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 512: g. Epiteor.
Tulasne 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 179: g. Melampsoreor. *Cf.* Flora 1855 p. 740.

Coleostachys A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 329; 1843. Arch. Mus. III. p. 313. t. 5; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 100: nov. g. Malpighiear. (C. genipaefolia.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7872. — Endl. 1842. Spl. II. p. 84. n. 5588/$_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 346 (*Coelostachys*). — Walp. 1846. Rep. V. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Malpighear.

Coleostephus Cassini 1826. Dict. v. 41. p. 43; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: nov. g. Chrysanthemear. (verar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24.
= Myconia Neck.

Coleostylis Sonder 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 391: nov. g. Stylidear. (Stylidium stipitatum Benth.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 696: g. Stylidiacear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 370: g. Stylidiear.

*) Dicat. Rever. W. Colenso.
**) κολεός, vagina; νῆμα, filamentum.

Coleroa Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 422: subg. Stigmateae. (St. Chaetomium.)
Rabenh. 1851. Herb. viv. myc. Cent. XV. *Cf.* Bot. Zeit. 1851. p. 180.

Coletia Fl. Flum. I. p. 79: g. Triandr. Monogyn. (madida) ex Steud. Nom. I. p. 396.
= Mayaca Aubl. (Endl. Gen. p. 1355.)

Coleus*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 372. Ed. Willd. p. 451: nov. g. Didynam. Gymnosperm. (C. amboinicus.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 135. n. 1416: g. Labiatar. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 57.
Benth. 1832. Labiat. p. 47: g. Ocymoidear. Sect.: Calceolus, Aromaria, Solenostemon. — Par. Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1520. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 682. Sect. eaed. — Rchb. 1837. Hdb. p. 189. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 162. (restrict.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 351. 382.
Endl. 1838. Gen. n. 3576. p. 609; 1841. Ench. p. 306: g. Plectranthear. Sect. eaed. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 282 (191). — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4140. Sect. ut Benth. (Coleus loco Calceoli.) — Walp. 1845. Rep. III. p. 513. Sect. ut Benth.
Brongn. 1843. En. genr. p. 68: g. Ocimoidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Plectranthidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 70: g. Ocimear. Sect. ut antea. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 948. Sect. eaed.
Synon. Solenostemon Schum.; Colus Räusch. (Steud.)

Coleus Endl. 1836. Gen. n. 355 *b*. p. 30; 1841. Ench. p. 17: sect. Clathri. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 410. 2.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 28; 1842. Mycol. p. 115: g. Clathracear.
Fries 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 138: g. Gasteromycetum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Phalloideor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Clathraceor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 260. — Bail 1858. Syst. p. 13. t. 23.
= Colus Caval. & Sech.

Colicodendron Martius 1837. Herb. Brasil. p. 201.
Endl. 1839. Gen. n. 4999. p. 893; 1841. Ench. p. 456: g. Capparear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 197. — Meisn. 1843. Comm. p. 342. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358.
Rchb. 1841. Nom. p. 185. n. 7114: g. Morisoniear.
Synon. Calanthea DC.?; Quadrella Meisn.

Colignonia Endl. 1837. Gen. n. 2001. p. 311; 1841. Ench. p. 193 (*Collignonia*): nov. g. Nyctaginear. (Abronia parviflora HBK.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 516.
Meisn. 1841. Gen. p. 318 (230): g. Mirabilear.

Colignonia Endl. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 69. n. 2597: g. Allioniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 507 (*Collignonia*): g. Nyctaginacear.
Choisy 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 439: g. Boerhaaviear.

Colinil Adans. 1763. Fam. II. p. 327: g. Phaseolor.
= Cracca Linn.

Colinsonia Juss. 1789. Gen. p. 112: g. Labiatar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 257. — Hedw. 1806. Gen. p. 16. 351.
= Collinsonia Linn.

Collabium Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 357: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1831. Orchid. p. 96: g. Epidendrear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1370. p. 193; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1963. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (278). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 677.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Bletidar.

Collacystis Kunze 1827 in Güntz Leichn. d. Neugeb. I. p. 212.
Rchb. 1828. Consp. p. 8. n. 155 b: g. Apiosporior.
Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 307: g. Apiosporeor. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 407: g. Myxothecieor.

Colladea Pers. 1805. Ench. I. p. 107. n. 193: g. Triandr. Digyn.
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 65: g. Graminear.
= Anthephora Schreb.

Colladoa*) Cavan. 1799. Icon. V. p. 36. t. 460: nov. g. Triandr. Digyn. (C. distachia.)
Willd. 1805. Sp. IV. p. 946. n. 1872: g. Polygam. Monoec.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 80: g. Graminear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 42. 363. — Palis. 1812. Agrost. p. 112. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 47. 790. n. 359.
Agdh. 1823. Aphor. p. 149: g. Paniceär. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 112.
Rchb. 1828. Consp. p. 47. n. 832: g. Cenchrinar.
= Ischaemum Linn.?

Colladoa „Pers.“ Endl. Gen. p. 86 in synon. Anthephorae: vid. *Colladea Pers.*

Colladonia Spreng. 1825. Syst. I. p. 516. 757. n. 812: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Psychotria trifolia Willd. herb.)
Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1983: g. Lonicerear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 172. n. 868: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 780.
= Palicourea Aubl.

Colladonia**) DC. 1830. Prodr. IV. p. 240:

*) κολεός, vagina: a filamentis stylum vaginantibus.

*) Dicat. Ludov. Collado.
**) Dicat. T. F. L. Colladon, botan. Genev.

Colladonia DC. cont.
nov. g. Smyrnear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 375. — Endl. 1839. Gen. n. 4527. p. 790; 1841. Ench. p. 380. — Brongn. 1843. En. genr. p. 114.
Tausch 1834. Flora I. p. 345: g. Angelicear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 134.
Rchb. 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5345: g. Smyrniear.
Meisn. 1838. Gen. p. 151 (108): g. Pleurospermear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 364: g. Pleurospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 14. n. 4526 *b*: sect. Prangi.
Synon. Perlebia DC.; Laserpitii sp. Vent.; Cachrydis sp. Spreng.

Collaea Lindl. 1823. Bot. Regist. IX. n. 760 not.
= Pelexia Poit. (Cf. Endl. Spl. II. p. 20.)

Collaea*) DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 96: nov. g. Leguminosar. (Cytisus speciosus Lois.)
DC. 1825. Pr. II. p. 240: g. Clitoriar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 220.
Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3965: g. Glycinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 410: g. Clitoriear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 87 (62).
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 127: g. Dioclear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6657. p. 1293; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5813. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Synon. Galactiae sp. Auct.

Collaea Spreng. 1826. Syst. III. p. 364. 622. n. 2866; 1831. Gen. II. p. 642. n. 3224: nov. g. Radiatar. (Bidens apiifolia L.)
= Chrysanthellum Rich.

Collandra**) Lemaire 1847. Fl. d. serr. t. 223: nov. g. Gesneracear. — Par. Hanst. 1854 in Otto's Gartenz. Nr. 21. p. 162. (Bot. Zeit. 1855. p. 429.)
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 209: g. Hypocyrtear.

Collania Schult. f. 1830. Syst. VII. 2. p. LIII. 893. n. 1439: nov. g. Amaryllidear. (Crinum urceolatum Rz. & Pav.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1606. — Brongn. 1843. En. genr. p. 21.
Endl. 1837. Gen. n. 1277. p. 177; 1841. Ench. p. 103: g. Amaryllear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 394 (296). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 405. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 10. 54.
Kunth 1850. Enum. V. p. 644: g. Pancratiear.
= Urceolina Rchb.

*) Dicat. Aloysio Colla, Taurin.
**) κόλλα, gluten.

Collania Herbert 1837. Amaryll. p. 67. 103: g. Alströmeriear., a Meisn. (Comm. p. 295) ad Alströmeriam revocatum. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158.
Conf. Wichuraea Röm.

Collarium*) Link 1809. Berl. Mag. III. p. 17. f. 11: nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 10. p. 66. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 339. — Agdh. 1821. Aphor. p. 80.
Nees 1816. Syst. p. 47; 1817. Ueberbl. p. 12: g. Trichomycor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Leptomycetum.
Fries 1832. Syst. III. 2. p. 440: g. Sepedonicor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 215. p. 18; 1841. Ench. p. 14. Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 98. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 70. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 496: g. Sepedoniaceor. Subg.: Leptiola.
Bonord. 1851. Hdb. p. 148: g. Myxonemeor.
Synon. Coccotrichum Link; Sporotrichi sp. Link.

Collelia Batsch Tab. affin. p. 70: vid. *Colletia Comm.*

Collema Wiggers 1780. Prodr. fl. Holsat. p. 89: nov. g. Aspidoferar. (Lichen crispus, fascicularis L., etc.)
Schreb. 1791. Gen. II. p. 767: sect. Lichenis. (*Nostoch Hall.*) — Par. Pers. 1794 in Usteri n. Ann. I. p. 21 (*Callema*). — Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 834.
Hoffm. 1795. Deutschl. Fl. II. p. 98: g. Scutellator. — Par. Achar. 1814. Syn. Lich. p. XIII. 308. Sect. ut 1810.
Achar. 1798. Lich. suec. p. 125: g. Lichenum. (foliaceor.) — Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 17. 182. — DC. 1805. Franç. II. p. 380; 1815. V. p. 185. — Mart. 1817. Erlang. p. 229. (scutellator.) Sect.: Placynthium, Enchylium, Lathagrium, Leptogium. — Leman 1818. Dict. v. 10. p. 71. Sect. ut Achar. 1810. (Enchelyum loco Enchylii.)
Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXIV: sect. Parmeliac. — Par. Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 545.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 129. 628: g. Peltator. Sect.: Placynthium, Enchylium, Scytinium, Mallotium, Lathagrium, Leptogium, Polychidium.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 324: g. Discoideor.
Agdh. 1821. Aphor. p. 92: g. Lobiolatar.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 20: g. Parmeliacear. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 368.
Fries 1825. Pl. homon. p. 255: g. Collemacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 397; 1841. Nom. p. 16. n. 557. — Endl. 1836. Gen. n. 162. p. 14; 1841. Ench. p. 10. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 109; 1842 in Orb. Dict. II. p. 792; 1849. ibid. IV. p. 112; 1849. ibid. VII. p. 351. (verar.) — Rabenh. 1845.

*) κόλλα, gluten.

Collema Wiggers cont.
Krypt. II. 1. p. 48. Sect.: Ephebe, Micarea, Leptogium, Mallotium, Collema. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 49 not. — Bayrh. 1849. Taun. p. 57. — Babingt. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 308.

Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 188: g. Hymenocarpor.

Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 131: g. Byssacear.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 121: g. Collemear. — Par. Flot. 1850. Linnaea XXIII. p. 151. Sect.: Placynthium (in adnot. ad Lecideam reductum), Enchylium, Lathagrium. — Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 9. (Flora 1854. p. 232.) — Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 402. — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 374. Sect.: Collema, Synechoblastus, Mallotium, Leptogium, Polychidium, Ephebe, Obryzum.

Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 247: g. Collemaceor.

Math. 1853. Belg. II. p. 102: g. Lichenear. sect. 2.

Synon. Geissoideae sp. Vent.; Lemniscii Wallr. pars; Collematideae Gray.

Collema Anders. mss.
= Goodenia Smith.

Collemaceae Fries 1825. Pl. homon. p. 254: trib. Hymenothalamor. Gen.: Leptogium, Collema, Ephebe, Micarea. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 14; 1841. Ench. p. 10. Gen. ead. et Coenogonium.

Rchb. 1828. Consp. p. 21: div. Parmeliacear. Gen. ut Fries. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 48. Gen.: Collema.

Rchb. 1837. Hdb. p. 133; 1841. Nom. p. 16: fam. Apotheciopsorar. Gen. ut antea.

Mont. 1842 in Orb. Dict. II. p. 792; 1849. ibid. IV. p. 113: trib. Byssacear. Gen.: Collema, Leptogium, Nostoc.

Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465): ordo Algar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 48 adnot.: div. Lichenalium. Gen.: Collema, Leptogium, Synalyssis, Myxopuntia, Omphalidium, Paulia, Lichina, Myriangium.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p 351: fam. (vel subfam.) Lichenum. Trib.: *verae* (gen.: Collema, Mallotium, Leptogium, Stephanophorus, Omphalaria, Myriangium, Myxopuntia), Coenogonieae, Lichineae.

Bayrh. 1849. Taun. p. 57: fam. Lichenum. Gen.: Collema. — Par. Nyl. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 8. (Flora 1854. p. 232.) Tribus: Collemeae, Phyllisceae. *Cf.* Nyl. in Flora 1858. I. p. 337.

Flot. 1850. Linnaea XXIII. p. 149: trib. Lichenum. Divis.: Collemeae, Bysseae.

Babingt. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 307: trib. Byssacear. Gen.: Leptogium, Collema.

Arnold 1858. Flora I. p. 86: ordo Phycolichenum. Trib.: Collemeae, Leptogieae, Omphalarieae.

Collemacei Schärer 1850. Enum. Lich. eur. p. 247: vid. *Lichenes Schärer.*

Collematideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 395: div. Homothalamear. Gen.: Placynthium, Enchylium, Scytenium, Mallotium, Lathagrium, Leptogium, Polychidium.

Collemeae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 121: div. Byssacear. Gen.: Lichina, Collema, Leptogium, Nostoc.

Flot. 1850. Linnaea XXIII. p. 149: div. Collemacear. Gen. ead. et Atichia, Obryzum, Mallotium.

Nyl. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 9 (Flora 1854. p. 232): trib. Collemacear. Gen.: Synalissa, Omphalaria, Collema, Leptogium, Obryzum. — Par. Arnold 1858. Flora I. p. 86. (restrict.)

Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 400: fam. Lichenum Gelatinosor. Gen.: Lempholemma, Collema, Synechoblastus.

Colletia Scopoli 1777. Introd. p. 207. n. 907: nov. g. Dumosar. (Rhamnus iguanaeus Jacq.)
= Momisia Dumort.

Colletia*) „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 380: nov. g. Rhamnor. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 70.

Gmel. 1791. Syst. p. 408: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 1113. n. 411. — Pers. 1805. Ench. I. p. 244. n. 544.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 472: g. Rhamnoidear.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 271: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 175. n. 733. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 73. — Spreng. 1818. Anl. II 2. p. 660; 1825. Syst. I. p. 771. n. 840; 1830. Gen. I. p. 181. n. 917. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLI. 511. n. 1023. — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 58. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 178. — Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 365. — Bartl. 1830. Ord. p. 376. — Hook. 1830. Bot. Misc. I. p. 151; 1838. Bot. Mag. n. 3644. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 34. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 439. — Lindl. 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1776. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 811.

DC. 1825. Pr. II. p. 28: sect. Colletiae.

Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3807: g. Ceanothear.

Endl. 1840. Gen. n. 5730. p. 1099; 1841. Ench. p. 581: g. Colleticar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5603. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 113. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 436.

Brongn. 1843. En. genr. p. 122: g. Phylicear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.

Colletia DC. 1825. Prodr. II. p. 28: g. Rhamnear., latius definitum. Sect.: Colletia, Retanilla?
= Colletia Comm. et Retanilla Brongn.

Colletia Fl. Flum. ex Endl. Ench. vid. *Coletia.*

*) Dicat. Gallo Collet.

Colletieae Reissek 1840 in Endl. Gen. p. 1099; 1841. Ench. p. 581: trib. Rhamnear. Gen.: Colletia, Discaria, Adolphia, Ochetophila, Retanilla, Talguenea. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 87. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 144: subdiv. Frangulear. Gen. ead.

Colletonema*) Brébiss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 418: nov. g. Schizonemear.
Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 105. n. 57: g. Naviculear. (Naunema Ehr. pt.)
Rabenh. 1853. Süssw. Diatom.: g. Naviculacear.

Colletosporium Link 1824. Spec. I. p. 25: nov. g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 316. (entosporor.)
Fries 1825. Pl. homon. p. 304: g. Racodiacear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Conopleacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 81: g. Racodiaceor.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 10; 1842. V. p. 8; 1842. Mycol. p. 28: g. Sporotrichacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 121: g. Sporotricheor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 77. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494.
Bonord. 1851. Hdb. p. 109: g. Polyactideor.

Colletostemones Lemaire 1849 in Orb. Dict. V. p. 50: trib. Iridacear. Gen.: Diplarrhena.

Colletothrichum Corda vid. *seq.*

Colletotrichum Corda 1837 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 41 (*Colletothrichum*). t. 21 (nomen correctum): nov. g. Fungor. (C. lineola.)
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 16; 1840. IV. p. 27; 1842. V. p. 11; 1842. Mycol. p. 41: g. Psiloniacear. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 73.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 107: g. Psiloniaceor.
= Vermiculariae Tode pars.

Collicuaja Gmel. vid. *Colliguaja Molin.*

Collignonia Endl. vid. *Colignonia Endl.*

Colliguaia A. Juss. vid. *seq.*

Colliguaja Molina . . . . Chili p. 129. (An *Colliguaya?*)
Gmel. 1791. Syst. p. 640 (*Collicuaja*): g. Octandr. Trigyn.
A. Juss. 1824. Euphorb. p. 62: g. Euphorbiacear. (minus cognitum.) *Cf.* A. Juss. in Ann. sc. nat. XXV. 1832. p. 22 et in Orb. Dict. IV. p. 113 (*Colliguaia*). — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5105 (*Colliguaya*). — Hook. 1830. Bot. Misc. I. p. 139. t. 39. 40.
Endl. 1840. Gen. n. 5771. p. 1109; 1841. Ench. p. 587: g. Hippomanear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 338 (251). — Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7335. — Brongn. 1843. En. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281 (*Colliguaya*).

*) κολλητός, junctus, conglutinatus.

Colliguaja Molina cont.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 534: g. Stillingiidear.

Colliguaya Rchb., Meisn., etc. vid. *praeced.*

Collinaria Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 32; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Poa cristata L.) = Köleria Pers.

Collinia „Liebm. mss. ap. Martius" Klotzsch 1852 in Otto's Gartenz. Nr. 46. p. 362: subg. Chamaedoreae. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 457.
Oerst. 1858. Palm. Centro-Am. p. 5: g. Chamaedoreear.

Collinsia*) Nuttall 1817. Journ. Ac. Philad. I. p. 189: nov. g. Antirrhinear. (C. verna.) *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 163. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3192. — Endl. 1839. Gen. n. 3897. p. 674; 1841. Ench. p. 338. (anomalar.) — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267. — Brongn. 1843. En. genr. p. 59. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 358. 497. — Walp. 1845. Rep. III. p. 231. 960.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 45: g. Didynam. Angiosperm.
Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. t. 1082: g. Scrophularinear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 2: g. Salpiglossidear. — Par. Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 94.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111: g. Gratiolear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 555.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Digitalear.
Meisn. 1840. Gen. p. 305 (216): g. Collinsiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4503: g. Cheloniear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 317; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Chelonear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 114: g. Scrophulariacear.

Collinsieae Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 305 (216): trib. Scrophularinear. Gen.: Collinsia, Schizanthus.

Collinsonia**) Linn. 1737. Gen. p. 334. n. 835; 1737. Cliff. p. 14; 1740. Syst. p. 17; 1753. Sp. I. p. 28; 1759. Syst. ed. X. p. 855. n. 38; 1762. Sp. ed. II. p. 39; 1764. Gen. ed. VI. p. 17. n. 40; 1767. Syst. ed. XII. p. 67: g. Diandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 67; 1784. Syst. p. 72. — Reich. 1778. Gen. p. 19. n. 43. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 23. n. 51. — Gmel. 1791. Syst. p. 48. — Pers. 1797. Syst. p. 73; 1805. Ench. I. p. 29. n. 65. — Willd. 1797. Sp. I. p. 152. n. 64; 1809. En. p. 45. — Vahl 1805. Enum. I. p. 282. n. 57.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129 (*Collisonia*); 1764. Syst. p. 157. n. 645: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 379.

*) Dicat. Zachaeo Collins, Philadolph.
**) Dicat. Petro Collinson, Anglo.

Collinsonia Linn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 187: g. Labiatar. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 331. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 58. 264. n. 97. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 77. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 18. — Link 1821. En. I. p. 17; 1829. Hdb. I. p. 498. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 69. n. 96; 1830. Gen. I. p. 19. n. 73. — Hook. 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 508. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 96.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Personatar. (?) — Par. Gis. 1792. Prael. p. 487.
Hill 1769. Ht. kew. p. 249: g. Monopetalar. irregular.
Scop. 1777. Intr. p. 165: g. Verticillatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 190.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 317. t. 66. f. 5 (canadensis).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 187; 1789. Phil. bot. I. p. 31.
Neck. 1790. El. I. p. 300. n. 470: g. Corythophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 431: g. Salviear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2808. — Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. xxxv: g. Melissear.
Benth. 1834. Labiat. p. 357: g. Satureinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 773. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 67.
Rchb. 1837. Hdb. p. 190: g. Verbenear.
Endl. 1838. Gen. n. 3613. p. 618; 1841. Ench. p. 307: g. Cunilear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 284 (193). — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4063. — Walp. 1845. Rep. III. p. 711. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 114.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Cunilidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 252: g. Satureiear. anomalar.
Synon. Colinsonia Juss.

Collioreas Endl. vid. *Callioreas Cham.*

Collisonia Gled. vid. *Collinsonia Linn.*

Collococcus P. Browne 1756. Jamaic. p. 167: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Cerasa americana foliis rugosis Pluk., Malpigia ramis divaricatis Mill.)
= . . . ?

Collolechia Massalongo 1854. Geneacaena Lich. p. 7: nov. g. Lichenum.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 397: g. Lecotheciear.
Arnold 1858. Flora I. p. 94: g. Racoblennear.

Collomia*) Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 126: nov. g. Polemonidear.
Juss. 1828. Dict. v. 42. p. 307 (*Cullomia*): g. Polemoniacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3023. — Bartl. 1830. Ord. p. 189. — Benth. 1833. Bot. Regist. n. 1622. *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 26 et Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 88. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 246. — Endl. 1839. Gen. n. 3820. p. 657; 1841. Ench. p. 327. — Hook. . . . . Fl. bor. am. II.

*) κόλλα, gluten: ob seminis qualitatem.

Collomia Nuttall cont.
p. 75. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 54. — Benth. 1845 in DC. Pr. IX. p. 307. Sect.: Eucollomia, Gilioides. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 636. — Griseb. 1856. Abh. Gött. Ges. VI. p. 129. Nova sect.: Myotoca.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 686: g. Polemoniear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179).
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 108: g. Giliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4383.

Collomia „Sieb." Steud. vid. *Cullumia Sieb.*

Collomioides Endl. 1839. Gen. n. 3821 *a*. p. 657; 1841. Ench. p. 327: sect. Giliae. — Par. Benth. 1845 in DC. Pr. IX. p. 310.
Synon. Hügelia Benth.; Welwitschia Rchb.

Collophora Martius 1828 in Buchn. Repert. d. Pharm. (Féruss. Bull. sc. nat. Janv. 1831. p. 64): nov. g. Apocynear. (C. utilis.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 29.
Endl. 1838. Gen. n. 3376. p. 578; 1841. Ench. p. 293: g. Carissear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 501. — Meisn. 1840. Gen. p. 262 (171). — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5193.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 322: g. Willughbeiar.? — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601.

Collybaria*) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 170: subtrib. Omphaliae. — Simil. Fries 1836. Epicr. p. 120.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 519: div. Omphaliae.

Collybia Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 129; 1825. Pl. homon. p. 67; 1828. Elench. I. p. 19: trib. Leucospori.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *II c*; 1841. Nom. p. 13. n. 502. 6 *d*: subsect. Leucospori. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 453. VII. *d*. p. 41; 1841. Ench. p. 22. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 529. — Math. 1853. Belg. II. p. 366.
Fries 1836. Epicr. p. 81; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 279: subg. Leucospori. — Par. Bail 1858. Syst. p. 39. t. 38.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.

Collybia Fries 1838. Epicr. p. 373: subg. Marasmii.
= Corniola Gray?

Collyria Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 340: g. Tremellineor.
Synon. Guepinia Schwein.

Collyris Miquel vid. *Colyris Vahl.*

Colmeiroa**) „Reuter mss." Boissier & Reut. 1842. Diagn. pl. nov. Hisp. p. 33: nov. g. ex typo Rhamni buxifolii Poir.
Meisn. 1843. Comm. p. 370: g. Buxear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 81: g. Phyllanthear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 99. n. 5865/1 (*Coilmeroa*).

*) κόλλυβος, moneta parva.
**) Dicat. Miguel Colmeiro, botanico.

Colmeiroa Reuter cont.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 115: g. Euphorbiacear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 552: g. Colmeiroidear.

Colmeiroideae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 552: div. Euphorbiacear. biovulatar. Gen.: Colmeiroa, Caletia, Micranthea, Pseudanthus, Pierardia.

Colobachne*) Palis. 1812. Agrost. p. 22. t. 6: nov. g. Graminear. (Polypogon vaginatum W.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 16. 374. n. 230. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 80. — Link 1829. Hdb. I. p. 28.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Agrostidear.
Trin. 1820. Fund. p. 100; 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 671): sect. Alopecuri. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 747 *b*. p. 80; 1841. Ench. p. 56. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1228. 2. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 465; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 460. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 382. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 452.
Link 1827. Hort. I. p. 73: g. Phalaridear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 947. — Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 31: g. Oryzear.

Colobandra Bartl. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 357: nov. g. Prostantherear. (C. robusta, etc.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 674.
= Atelandra Lindl.

Colobanthium Rchb. 1841. Nomencl. p. 235: nomen pro *Colobantho Trin.* propositum.

Colobanthus Bartl. 1830 in Reliq. Hänk. II. 1. p. 13. t. 49. f. 2; 1830. Ord. p. 305: nov. g. Alsinear. (1825 in Beitr. z. Bot. II. p. 191 adnot. pro Sagina quitensi HBK. aliisque indicatum). — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205. — Meisn. 1837. Gen. p. 25 (22).
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 83: g. Portulacear. — Par. Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 37. 48. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 321.
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 352; 1838. ibid. II. p. 273: g. Molluginear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 130 (95)? — Endl. 1839. Gen. n. 5193. p. 954; 1841. Ench. p. 502. — Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6303. (genuinar.) — Walp. 1843. Rep. II. p. 249. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 116. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 9.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 27: g. Caryophyllear.

Colobanthus Trinius 1831. Mém. Ac. Petersb. 6e sér. I. p. 66: sect. Triseti. (Köleria pensylvanica DC.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 863 *a*. p. 96; 1841. Ench. p. 58. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1212. 1 (serius *Colobanthium Rchb.*).

*) κολοβός, truncatus, ἄχνη, palea.

Colobanthus Trinius cont.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163: g. Avenacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear.

Colobatus Walp. vid. *Colobotus E. Meyer.*

Colobium*) Roth 1796 in Römer Arch. I. 1. p. 36: nov. g. pro Leontodonte hirto propositum.
= Thrincia Roth.

Coloboma A. DC. 1846. Prodr. X. p. 126: sect. Eritrichii. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 150.

Colobophyllum Fisch. & Meyer 1839. Ind. sext. sem. h. Petrop. (Linnaea XIV. Litt. p. 163): subg. Pteropogonis. (P. chilense F. & M.)

Colobotropis**) E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 13: sect. Pelecynthidis. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6460 *a*. p. 1261; 1841. Ench. p. 667.

Colobotus E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 156: nov. g. Genistear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 82 (58). — Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 478 (*Colobatus*); 1842. Rep. I. p. 608. — Endl. 1840. Gen. n. 6481. p. 1263; 1841. Ench. p. 668. — Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5876 (*Calobotus*). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 120.

Colocasia***) (Raii 1682. Meth. p. 157) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 289. n. 1682: g. Emproophytor., ab Aro L. disjunctum.
Link 1829. Hdb. I. p. 267: g. Aroidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1095. 1: sect. Colocasiae.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 40: g. Colocasinar. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 202.
Synon. Eucolocasia Schott.

Colocasia Schott 1832. Melet. bot. p. 18: g. emendat. Colocasiear. Sect.: Eucolocasia, Alocasia. *Cf.* Brongn. 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 155. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1683. p. 236; 1841. Ench. p. 128. Sect. eaed. — Kunth 1841. Enum. III. p. 36. Sect. eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1095. Sect. eaed. — Meisn. 1842. Gen. p. 362 (270). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 14. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 44.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Caladiear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 120.
Synon. Colocasia et Alocasia Neck; Ari sp. Linn.

Colocasieae Schott 1832. Melet. bot. p. 18: subtrib. Caladiear. Gen.: Remusatia, Colocasia, Caladium, Peltandra, Xanthosoma, Acontias, Syngonium, Denhamia. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 236; 1841. Ench. p. 128. Gen. ead. (Culcasia loco Denhamiae.) Accedit 1842 (Spl. II. p. 23) Gonatanthus. — Kunth 1841. Enum. III. p. 35. Gen. ut Endl. 1837 et Gonatanthus. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. Gen. ut Endl. (Phyllocasia loco Acontiae.) —

*) κολοβός, mutilus, deficiens.
**) τρόπις, carina.
***) Nomen a Dioscoride ac Plinio mutuatum.

Colocasieae Schott cont.
Meisn. 1842. Gen. p. 361 (270). Gen. ut Endl.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 13: trib. Aracear. Gen.: Richardia, Aglaonema, Atherurus, Dieffenbachia, Philodendron, Syngonium, Acontias, Xanthosoma, Caladium, Colocasia, Gonatanthus, Amorphophallus, Dracunculus, Sauromatum, Typhonium, Arum, Biarum, Arisaema, Arisarum, Ambrosinia.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 39: sect. Caladiear. Gen. ut Endl. 1837 et Alocasia.

Colocasinae Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 40: subtrib. Caladiear. Gen.: Ariopsis, Colocasia, Remusatia.

Colocynthis Tourn. 1700. Inst. p. 107: g. pl. class. I. — Par. Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 46.
= Citrullus Neck.

Cologania*) HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 411: nov. g. Papilionacear. — Par. Kunth 1823. Mimos. p. 205; 1825. Syn. IV. p. 87.
DC. 1825. Pr. II. p. 236: g. Clitoriar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 217.
Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3971: g. Glycinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 410: g. Clitoriear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 54. — Meisn. 1837. Gen. p. 87 (62). — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 112. — Endl. 1841. Gen. n. 6633. p. 1288; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5789. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 121. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 551.

Colomandra Necker 1790. Elem. bot. II. p. 142. n. 831: g. Coryphophytor.
= Aiouea Aubl.

Colona**) Cavan. 1797. Icon. IV. p. 47. t. 370: nov. g. Polyandr. Monogyn. (C. serratifolia.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 95 (*Colonna*): g. Tiliacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 817.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 335 in adnot.
Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Tiliariar. genuinar.
= Columbia Pers.

Colonna St. Hilaire vid. *praeced.*

Colonnaria Rafin. 1809. Journ. bot. II. p. 176 (NewYork med. repos. II. Hex. V. p. 250): nov. g. Fungor., a Clathro disjunctum. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 10. p. 93.
= Clathri sect. Laternea Endl.

Colonnea „Buchoz" Endl. Gen. p. 421 in synon. Gaillardiae: vid. *Calonnea Buchoz.*

Colophermum Rafin. .... g. Algar., a Ceramio disjunctum, teste Leman 1818. Dict. v. 10. p. 93.

Colophonia „Comm. mss." Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 352 (Gen. Tereb. p. 20): nov. g. Burseracear. — Par. HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 25 adnot. — DC. 1825. Pr. II. p. 79. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 230. — Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56).
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3844: g. Burserear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 394.
Schult. 1829. Syst. VII. p. XIII. 77: g. Terebinthacear.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 84: g. Burseriacear.
Endl. 1840. Gen. p. 1137 genus Canario Linn. injungit.

Colosanthera Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. indescriptum.

Colostephanus Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 417: novum nomen pro Cynoctono capensi propositum.

Colpias „E. Meyer" Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 53: nov. g. Digitalear. (C. mollis.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3912. p. 677; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Meisn. 1840. Gen. p. 308. (219). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 506. — Walp. 1845. Rep. III. p. 254. 961.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4509: g. Cheloniear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 259; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Hemimeridear.

Colpocoelium*) Trevisan 1842. Syn. gen. Alg. p. ...: nov. g. Algar.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 433: subg. Scytosiphonis. (Asperococcus sinuosus Bory.)

Colpodium Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 119. t. 7: nov. g. Triandr. Digyn. (Agrostis verticillata.) — Par. Schult. 1824. Mant. II. p. 11.
Trin. 1821 in Spreng. N. Entd. II. p. 37: sect. Vilfae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 912 *a.* — Spreng. 1830. Gen. I. p. 58.
R. Brown 1824. Suppl. Parry's voy. App. 11. p. CCLXXXVI (Verm. bot. Schr. I. p. 414): g. Graminear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 35.
Link 1827. Hort. I. p. 90: g. Agrostidear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 66; 1833 Agrost. p. 205. — Endl. 1837. Gen. n. 807. p. 89; 1841. Ench. p. 57. — Meisn. 1843. Gen. p. 419 (321). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161.
Ledeb. 1829. Alt. I. p. 99: g. Graminum. — Par. Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 392; 1838. ibid. IV. p. 70.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 134. 311: g. Agrostoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1171: g. Agrostear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 176.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 384: g. Poëar. Sect.: Eucolpodium, Arctophila.

Colpoma Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 422: nov. g. Hymenomycetum angiosporor.
= Clithris Fries.

---

*) Dicat. familiae Cologan Orotavae in insula Teneriffa.
**) Dicat. Christoph. Columbo.

*) κόλπος, sinus.

Colpomenia Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 26. n. 98 *b*: sect. Asperococci. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 183.
Synon. Stilophorae sp. Agdh.

Colpoon Berg. 1767. Fl. cap. p. 38. t. 1.
Scop. 1777. Intr. p. 100: g. Disparium.
A. DC. 1857. Prodr. XIV. 2. p. 634: sect. Osyridis.
= Osyris Linn.

Colpophyllos Trew 1761. Act. Nat. Cur. II. p. 332: nomen pro „planta Lithospermo aff." sine nomine ab Ehret (ibid. p. 330. t. 67. f. 1) descripta propositum.
= Ellisia Linn.

Colposoria Presl 1836. Pterid. p. 128: sect. Davalliae.
Endl. 1841. Spl. I. n. 643 *c γ*. p. 1350; 1841. Ench. p. 37: subsect. Eudavalliae.
= Wibelia Bernh.

Colpotella Corda . . . .
= Euastri Ehrenb. pars. (Rabenh. Alg. p. 53.)

Colpoxylon Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 109: nov. g. Cycadear. foss. (C. aeduense.)

Colquhounia*) Wallich 1822. Linn. Trans. XIII. p. 608; 1824. Tent. fl. Nepal. I. p. 13: nov. g. Labiatar. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 745. n. 2107; 1831. Gen. II. p. 476. n. 2349.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2892: g. Nepetear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 183.
Benth. 1834. Labiat. p. 644: g.- Stachydear.? — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 857. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 356. 463. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 977.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188; 1841. Nom. p. 106. n. 4113: g. Phlomitear.
Endl. 1838. Gen. n. 3672. p. 630; 1841. Ench. p. 308: g. Ballotear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 289 (197). — Walp. 1845. Rep. III. p. 895.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Ballotidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 457: g. Lamiear.

Colsmannia**) Lehm. 1817. Berl. Mag. VII. t. 4 (VIII. p. 92); 1818. Asperif. II. p. 356: nov. g. Asperifoliar. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. VIII. 64. n. 633. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 556. n. 590; 1830. Gen. I. p. 124. n. 620. — Bartl. 1830. Ord. p. 198. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 603.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 448: g. Echiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2950; 1841. Nom. p. 111. n. 4327.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 313: g. Symphytear.
Endl. 1839. Gen. n. 3764. p. 648; 1841. Ench. p. 321: g. Anchusear.
DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 280 (189): g. Craniospermear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31: g. Asperifoliear.

*) Dicat. Sir Rob. Colquhoun.
**) Dicat. prof. Christ. Colsmann, Hafniensi.

Colsmannia Lehm. cont.
DC. 1846. Pr. X. p. 67: g. Lithospermear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.

Coltricia „Micheli" Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 597. 644: nov. g. Boletidear. (Boletus perennis L., nummularius et leptocephalus Pers.)
= Boleti Fries pars.

Colubrina „L. C. Rich." Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 368: nov. g. Rhamnear. (Rhamnus colubrinus L.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 36. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 165. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 439. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50). — Schltd. 1841. Linnaea XV. p. 468. — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 126.
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3809: g. Ceanothear.
Endl. 1840. Gen. n. 5728. p. 1098; 1841. Ench. p. 581: g. Frangulear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5599. (genuinar.) — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 648.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 122: g. Phylicear.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 357: g. Colubrinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.
Synon. Tubanthera Comm.; Ceanothi sp. Auct.

Colubrinae Batsch 1802. Tab. affin. p. 203: fam. Nudar. Gen.: Strychnos, Ignatia, Lasiostoma, Theophrasta.

Colubrineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: fam. Thalamitubiae. Gen.: Strychnos, Theophrasta.

Colubrineae A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 357: trib. Rhamnear. Gen.: Colubrina, Gouania.

Columbaria Thuill. 1790. Fl. Paris. ed. I. (Fl. franç. I. p. 72?)
„Lob." Gray 1821. Brit. pl. II. p. 476: g. Dipsacear.
= Succisae Coult. pars.

Columbea Steud. vid. *Colymbea Salisb.*

Columbia Pers. 1807. Ench. II. p. 66. n. 1267: g. Tiliacear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 85. — DC. 1824. Pr. I. p. 512. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 582. n. 1902; 1830. Gen. I. p. 427. n. 2122. — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 552. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 3. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 238.
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5448; 1841. Nom. p. 209. n. 7954: g. Tiliear. (genuinar.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 37 (28).
Blanco 1837. Fl. Filipin. p. 654: g. Gynandr. Polyandr.
Endl. 1840. Gen. n. 5378. p. 1010; 1841. Ench. p. 523: g. Grewiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.
Synon. Colona Cavan.; Colonna St. Hil.

Columbinum Koch 1836. Syn. p. 140. Ed. II. p. 153: sect. Geranii. (G. columbinum L.) — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 122.

Columbra Comm. mss.
= Cocculus DC.

Columella*) Loureiro 1790. Fl. Cochinch. I. p. 85. Ed. Willd. p. 107: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (C. pedata.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 273: g. Rhamneis aff.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 20. 329. n. 518: g. Rhamnor.
= Cissus Linn.

Columella Comm. mss.
= Malache Trew.

Columella Arrab. Fl. Flum. IV. t. 17: g. Octandr. Monogyn. (rustica) ex Steud. Nom. I. p. 398.
= Pisonia Plum.

Columella Vahl, Röm. & Schult., Dietr. vid. *Columellia Ruiz & Pav.*

Columellea Jacquin 1798. Hort. Schönbr. III. p. 28. t. 301. *Cf.* Steud. Nomencl. I. p. 399 (*Columellia*).
Willd. 1803. Spec. III. 3. p. 2216. n. 1512 (*Columellia*): g. Syngenes. Superfl. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 470. n. 1894 (*Columellia*).
Cass. 1818. Dict. v. 10. p. 102; 1822. v. 23. p. 565; 1827. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Inulear. (1827 Archetypar. verar.)
= Stephanopappus Less.

Columelleae Rchb. 1837. Handb. p. 213: subdiv. Jasminear. Gen.: Columellia.

Columellei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: trib. Cystosporeor. Sect.: Crateromycei, Ascophorei.

Columellia**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 3. t. 1; 1798. Fl. peruv. I. p. 28. t. 8. 12: nov. g. Diandr. Monogyn. — Par. Vahl 1805. Enum. I. p. 300 n. 62 (*Columella*). — Pers. 1805. Ench. I. p. 13. n. 48. — Hedw. 1806. Gen. p. 11. n. 52. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 101.
Spreng 1817. Anl. II. 1. p. 479: g. Gentianear.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 59. 270. n. 102 (*Columella*): g. Rhamnacear.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 388: g. Scrophularinar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 139.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 89. n. 111; 1830. Gen. I. p. 25. n. 106: g. Gesnerear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3229.
D. Don 1828. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 46: g. Columelliear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 131. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 58.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 239; 1847. Veg. kd. p. 760: g. Columelliacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4264. p. 745; 1841. Ench. p. 366. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 549. — Meisn. 1839. Gen. p. 256 (165).
Rchb. 1837. Hdb. p. 213: g. Columellear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 64 (*Columella*): g. Personatar.
Synon. Uluxia Juss.

*) Nomen ab antiquo de re rustica scriptore Gaditano.
**) Dicat. Junio Moderato Columellae.

Columellia Willd., Pers. vid. *Columellea Jacq.*

Columellia „Lour.“ Endl. Gen. p. 797 in synon. Cissi: vid. *Columella Lour.*

Columelliaceae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (203) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo Campanalium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 239; 1847. Veg. kd. p. 759: ordo Cinchonalium. Gen.: Columellia.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 549: ordo (111) Calyciflorar. Gen. unicum: Columellia.
Endl. 1839. Gen. p. 745; 1841. Ench. p. 366: fam. Petalanthar. Gen. id.
Meisn. 1839. Gen. p. 256 (164): ordo Ligustrinar.? Gen. id.
Synon. Columellieae D. Don; Columelleae Rchb.

Columellieae D. Don 1828. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 46: nova fam. plant. Gen.: Columellia, Menodora.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 57: ordo Corollaeflorar. Gen. ead. et Bolivaria.

Columnaea Gled. vid. *Columnea Plum.*

Columnantherae Agardh 1825. Aphor. p. 239; 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 586: class. IV. Phanerocotyledonear. Ordines: Pistiaceae, Asarinae, Myristiceae.

Columnaria Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. xxv: g. foss. Equisetacear. (Palmacites et Calamites sp. Schloth.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 343. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 103.

Columnariae Batsch 1802. Tab. affin. p. 15: ordo Rosacear. Fam.: Gruinales, Malvaceae, Festivae, Sensitivae, Columniferae.

Columnea*) Plumier 1703. Gen. p. 28. t. 33. (Ic. t. 89.)
Linn. 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 296. n. 618; 1753. Sp. II. p. 638; 1759. Syst. ed. X. p. 1123. n. 710; 1763. Sp. ed. II. p. 891; 1764. Gen. ed. VI. p. 326. n. 792; 1767. Syst. ed. XII. p. 427: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 484; 1784. Syst. p. 579. — Reich. 1778. Gen. p. 328. n. 856. — Swartz 1788. Prodr. p. 93; 1791. Obs. bot. p. 248. Char. emend. — Lour. 1790. Coch. II. p. 384. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 429. n. 1064. — Gmel. 1791. Syst. p. 964. — Pers. 1797. Syst. p. 616. — Willd. 1800. Sp. III. p. 396. n. 1210.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 180. n. 740 (*Columnaea*): g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 211. — Scop. 1777. Intr. p. 171. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 279. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 90. — Link 1822. En. II. p. 145. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 842. n. 2245; 1831. Gen. II. p. 506. n. 2488.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Acanthor.

*) Dicat. Fabio Columnae.

Columnea Plumier cont.
Juss. 1789. Gen. p. 121: g. Scrophulariis aff.
Neck. 1790. El. I. p. 354. n. 553: g. Chasmatophytor.
Pers. 1807. Ench. II. p. 164. n. 1482: g. Antirrhinear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 396: g. Scrofularinar. (1818. ibid. II. 2. p. 891 Orobanchear.)
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3232: g. Gesnerear. — Par. Mart. 1829. Gen. III. p. 65. *Cf.* Flora Lit. I. p. 12. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672.
Bartl. 1830. Ord. p. 175: g. Besleriear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 652. — Endl. 1839. Gen. n. 4157. p. 720; 1841. Ench. p. 349. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 541. — Benth. 1839. Pl. Hartweg. p. 232 (sect.: Ortholoma, Columneae verae); 1846. Lond. journ. bot. V. p. 359. — Meisn. 1840. Gen. p. 304 (213). — Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4687. — Brongn. 1843. En. genr. p. 62. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 576. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 404.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257: g. Gesneriear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 1. t. 201.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 211: g. Columnear. — Par. Oerst. 1858. Gesn. centroam.
Synon. Loboptera Colla.

Columnea Roxburgh 1832. Fl. Ind. III. p. 97: g. Didynam. Angiosperm.
= Limnophilae R. Brown et Stemodiae sp.

Columneae Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 199: subtrib. Besleriear. Gen.: Asteranthera, Pterygoloma, Pentadenia, Columnea. — Par. Oersted 1858. Gesn. centroam. p. ... Gen. ead.

Columniferae Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 37 plant. Gen. §. 1: Malva, Alcea, Althaea, Lavatera, Malope, Melochia, Sida, Napaea, Pentapetes, Bombax, Adansonia, Gossypium, Hibiscus, Urena, Triumfetta, Heliocarpus, Bixa, Corchorus, Waltheria, Turnera, Hermannia, Helicteres, Kleinhovia, Ayenia, Theobroma, Grevia, Microcos, Muntingia. §. 2: Camellia, Thea, Stevartia, Tilia, Kiggelaria. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 451. Gen. ead. (exclusa Alcea) et in §. 1: Malachra?, Palavia, Anoda, Ruizia, Assonia, Dombeya, Carolinea, Ochroma, Pavonia, Achania, Lagunaea, Cienfugosia?, Myrodia?, Aubletia, Antichorus, Mahernia, Büttneria, Marila, Bubroma, Abroma, Symplocos; in §. 2: Gordonia, Malacodendron, Eroteum, Ternströmia.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 274: class. XIV. plantar. Gen. sibir.: Geranium, Malva.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 68. 143: ordo Multi-staminum. Gen.: Malva, Althaea, Lavatera.
Scop. 1777. Intr. p. 280: trib. 25 plant. Gentes: *A. Involucro floris triplice.* Gen. §. 1: Lavatera, Urena, Alcea, Althaea, Malva, Malope, Malachra, Ferberia, Prestonia. §. 2: Parita, Malvaviscus, Ketmia, Lagerströmia, Gossypium. *B. Involucro floris duplici.* Gen. §. 1: Walteria, Pachira, Crossostylis, Abroma, Theobroma, Brownea, Melistaurum, Swietenia, Turraea, Kleinhovia, Erythroxylon, Aleurites, Murraea, Hugonia, Elcaia, Winterania, Gerberia, Ticorea, Argophyllum, Guarea, Melicope, Binectaria, Melia, Nothria. §. 2: Dayena, Napaea, Abutilon, Sida; Stewartia, Camelia, Gordonia, Moranda, Adenia, Adansonia, Bombax, Durio, Mesua, Pentapetes, Plagianthus, Hermannia, Melochia, Connarus, Oxalis, Geranium, Melianthus, Paullinia, Tamarix, Enourea, Acioa, Impatiens, Hybanthus, Tropaeolum, Viola, Lignonia, Trigonia.
Batsch 1802. Tab. p. 22: fam. Columnariar. Gen.: Passiflora, Sterculia, Ayenia, Helicteres, Kleinhovia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV: series Schizocarpicar. Fam.: Malvaceae, Geraniaceae, Oxalideae.
Bartl. 1830. Ord. p. 337: class. (54) Gymnoblastor. Ordines: Tiliaceae, Sterculiaceae, Büttneriaceae, Hermanniaceae, Dombeyaceae, Malvaceae.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 339; 1835. IV. p. 1: class. VII. Dicotyledoneor. Familiae ut Bartl.
Endl. 1840. Gen. p. 978; 1841. Ench. p. 510: class. Acramphibryor. dialypetalor. Ordines: Malvaceae, Sterculiaceae, Büttneriaceae, Philippodendreae.
Meisn. 1843. Gen. p. 438: class. VII. Diplochlamydear. Ordines: Malvaceae, Büttneriaceae, Sterculiaceae, Tiliaceae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 99: ordo Choristopetalar. Fam.: Malvaceae, Tiliaceae, Büttneriaceae, Dipterocarpeae.

Columniferae Lindley 1833. Nix. plant. p. 26: cohors Incompletar. Nixus: Nepenthales, Aristolochiales.

Columniferi Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: ordo 34 plant. Gen.: Camellia, Xylon, Gossypium, Urena, Hibiscus, Turnera, Malope, Lavatera, Althaea, Alcea, Malva, Melochia, Sida, Napaea, Waltheria, Mentzelia, Hermannia, Helicteres, Stewartia.

Columniflorae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 32: class. Thalamiflorar. Fam.: Tiliaceae, Malvaceae, Gruinales, Hypericineae, Cistineae, Violariae, Droseraceae, Silenaceae, Alsinaceae, Elatineae.

Coluppa Adans. 1763. Fam. II. p. 268: g. Amaranthor.
= Gomphrena Linn.

Colura Dumortier 1831. Syll. Jungerm. p. 32: sect. Lejeuniae. (Jung. calyptrifolia Hook.)

Coluria R. Brown 1823 in Parry's first voy. App. p. CCLXXVI (Verm. bot. Schr. I. p. 392): nov. g. Rosacear. (Geum potentilloides.) — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 10. 194.
Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 262: g.

Coluria R. Brown cont.
Dryadear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 528. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 453. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73). — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6506. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125.
Endl. 1840. Gen. n. 6388. p. 1246; 1841. Ench. p. 659: g. Eudryadear. — Par. Ledeb. 1844. Ross. II. p. 21.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Potentillidar.
Synon. Laxmannia Fisch.; Stictogeum Ser.; Gei sp. Auct.

Colus Räusch. ex Steud. Nomencl. I. p. 399 (amboinicus).
= Coleus Lour.

Colus Cavalier & Sechier 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. III. p. 253. t. 8: nov. g. Clathroidar. (C. hirudinosus.)
Synon. Coleus Endl., Rchb., Corda, Fries, Bon.

Colutea*) Tourn. 1700. Inst. p. 649. t. 418: g. pl. class. XXII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 255. Ed. Hall. 1745. p. 265: g. pl. class. XI.
Linn. 1737. Gen. p. 224. n. 593; 1737. Cliff. p. 365; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 228; 1753. Sp. II. p. 723; 1759. Syst. ed. X. p. 1161. n. 776; 1763. Sp. ed. II. p. 1045; 1764. Gen. ed. VI. p. 379. n. 880; 1767. Syst. ed. XII. p. 490: g. Diadelph. Decandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 57. — Murr. 1774. Syst. p. 856; 1784. Syst. p. 668. — Reich. 1778. Gen. p. 378. n. 954. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 501. n. 1196. — Gmel. 1791. Syst. p. 1116. — Pers. 1797. Syst. p. 706; 1807. Ench. II. p. 312. n. 1725. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1139. n. 1365; 1809. En. p. 771.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 575: g. Leguminosar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 306. — Juss. 1789. Gen. p. 369. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 412. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1804. Dict. v. 3. p. 401 (*Baguenaudier*); 1805. Expos. II. p. 229. — DC. 1805. Franç. IV. p. 561. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 431. 527.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415.
Adans. 1763. Fam. II. p. 323: g. Genistar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 303: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 47. n. 1365: g. Cyteophytor.
= Colutea Medic. et Sutherlandia R. Brown.

Colutea Medic. (Vorles. II. p. 365) 1789. Phil. Bot. I. p. 210: g. disjuncta Colutia restrict. (C. arborescens L.)
Mönch 1794. Meth. p. 159: g. Thalamostemonis.
R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 325: g. disjuncta Sutherlandia a Linnaeano discrepans.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 754; 1826. Syst. III. p. 241. n. 2549; 1831. Gen. II. p. 581. n. 2851: g. Leguminosar. — Par. Link 1822. En. II. p. 243.
Bronn 1822. Diss. p. 124: g. Galegear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 270. — Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3912; 1832. Fl. exc. p. 514; 1841. Nom. p. 148. n. 5750. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 244. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 271; 1842 in Orb. Dict. II. p. 419 (*Baguenaudier*). — Koch 1836. Syn. p. 179. Ed. II. p. 199. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6561. p. 1276; 1841. Ench. p. 669. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 573. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 129. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 48. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 454.
Link 1831. Hdb. II. p. 201: g. Galegoidear.

Coluteocarpus Boissier 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 378: nov. g. Cruciferar. (Alyssum Vesicaria L.)
Boiss. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 162: g. Alyssinear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 340. — Endl. 1843. Spl. III. p. 86. n. $4869/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Alyssidar.

Colutia Medicus (Vorles. II. p. 366) 1789. Vorles. IV. 1. p. 355; 1789. Phil. Bot. I. p. 210: nov. g. ex typo Coluteae frutescentis L.)
Mönch 1794. Meth. p. 159: g. Thalamostemonis.
= Sutherlandia R. Brown.

Colvillea*) „Bojer mss." Hook. 1834. Bot. Mag. t. 3325. 3326: nov. g. . . . . . . (C. racemosa.) *Cf.* Ann. sc. nat. 1835. 2e sér. IV. p. 294 et Steud. Nomencl. I. p. 399 (*Colvilleia*).
Boj. . . . . Mon. Iconogr. (fol.)
Meisn. 1837. Gen. p. 99 (70): g. Cassiear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Eucaesalpiniear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 558. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. (?)
Endl. 1841. Gen. n. 6767. p. 1313; 1841. Ench. p. 674: g. Caesalpiniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6069. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 132.

Colvilleia Steud. vid. *praeced.*

Colymbada Hill 1769. Hort. kew. p. 65: nov. g. Associatar. (C. centauroides et sicula.)
= Rhapontici DC. et Centaureae Linn. sp.

Colymbea Salisb. 1807. Linn. Trans. VIII. p. 315. *Cf.* Steud. Nomencl. I. p. 398 (*Columbea*).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 213: g. Pinear.
Bertol. 1820. Piant. Brasil. p. 7.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 888. n. 3146: g. Coniferar. (1831. Gen. II. p. 712 ad Araucariam reductum.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 26. n. 1800 *a*; 1847.

---

*) Κολουτεα Theophrasti.

*) Dicat. Car. Colville, gubernatori insulae Mauritii.

Colymbea Salisb. cont.
Syn. Conif. p. 185; 1847. Spl. IV. p. 6. n. 1804 *a*: sect. Araucariae.
Synon. Araucaria Link.

Colymboxylon Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 140. 190: g. Araucariear. foss. (Dadoxylon stigmolithos Ung., etc.)

Colyris Vahl 1810. Danske Selsk. Skrivt. VI. p. 111: nov. g. plant. (C. major = Pustula arborum Rumph., C.minor = Nummularia lactea minor Rumph.)
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 513 (*Collyris*): g. Ceropegiear. (C. major.)
= Dischidia R. Brown?

Colysis*) Presl 1850. Epimel. bot. p. 506 (146): nov. g. Grammitidear. (Selligueae sp.)
Fée 1852. Gen. Fil. p. 175: g. Antrophyear.

Colythrum Schott 1834. Rutac. p. 13. t. 7: nov. g. Rutacear. (Esenbeckia pumila Pohl, etc.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 234.
Meisn. 1837. Gen. p. 63 (45): sect. Esenbeckiae.
≐ Esenbeckiae HBK. pars.

Coma aurea Ponted. 1720. Dissert. (Linn. 1747. Class. pl. p. 529): g. Flosculosor.
= Chrysocoma Linn.

Comacephalus Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 224: nov. g. Ericear. Eleutherostemonum. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442 (*Comocephalus*).
= Acrostemon Klotzsch.

Comaclinium Scheidw. et Planch. 1852. Fl. d. serr. VIII. p. 19. t. 756: nov. g. Tagetinear. (Tithonia splendens Hortul.)

Comacum Adans. 1763. Fam. II. p. 345: g. Pistaciar.
= Myristica Linn.

Comandra**) Nuttall 1818. Gen. am. I. p. 157. nov. g. Santalacear. (Thesium umbellatum L.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2076. p. 326; 1841. Ench. p. 207. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 138. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 788. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 128.
Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1708 b; 1841. Nom. p. 62. n. 2351: g. Osyridear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 460: g. Santalear.
Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240): g. Thesiear. — Par. A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 635. Sect.: Eucomandra, Darbya.

Comantes Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV: fam. Vaginulator. acrocarpor. Gen.: Pohlia, Weberae pars.

Comaropsis Rich. 1816 in Nestl. Potent. p. 16. t. 1: nov. g. Fragariacear., Waldsteiniae proximum.
DC. 1825. Pr. II. p. 555: g. Dryadear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 403. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 529. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 453. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (74). — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6501. (genuinar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 125.

Comaropsis Rich. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII; 1828. Consp. p. 167. n. 4441: g. Potentillear.
Endl. 1840. Gen. n. 6383. p. 1246; 1841. Ench. p. 659: g. Eudryadear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Potentillidar.
Synon. Dalibardae sp. Michx.; Waldsteiniae sp. Tratt.

Comarostaphylis*) Zuccarini 1837. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. II. p. 331: nov. g. Ericinear.
Endl. 1839. Gen. n. 4328. p. 757; 1841. Ench. p. 370: g. Andromedear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 444. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 129.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 584: sect. Arctostaphyli. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4917. 2.
Meisn. 1839. Gen. p. 247 (155): g. Arbutear. — Par. Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 73. — Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1105.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 71: g. Ericear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Andromedidar.
Synon. Xylococcus Nutt.

Comarum**) Linn. 1737. Gen. p. 148. n. 417; 1737. Cliff. p. 195; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 502; 1759. Syst. ed. X. p. 1066. n. 563; 1762. Sp. ed. II. p. 718; 1764. Gen. ed. VI. p. 257. n. 638; 1767. Syst. ed. XII. p. 353: g. Icosandr. Polygyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 399; 1784. Syst. p. 481. — Reich. 1778. Gen. p. 261. n. 694. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 343. n. 869. — Pers. 1797. Syst. p. 516; 1807. Ench. II. p. 57. n. 1245. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1119. n. 1004; 1809. En. p. 558. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 311. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 296. 409. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 521.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 337: g. Gymnopolyspermar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 278. n. 1145: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Senticosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Batsch 1802. Tab. p. 10. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 328.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 106. — Link 1822. En. II. p. 66. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 194.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 186: g. Calyciflorar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 186: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 220: g. Calycanthemar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 349. t. 73. f. 7 (palustre).
Juss. 1789. Gen. p. 338: g. Potentillar.
Neck. 1790. El. II. p. 95. n. 759: g. Sarcodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 861: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 235.

*) κώλυσις, interruptio.
**) κόμη, capilli; ἀνήρ, mas.

*) κόμαρον, fructus arbuti; σταφυλίς, uva.
**) Nomen ex Apulejo mutuatum.

Comarum Linn. cont.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 347: g. Dryadear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 469. — Bartl. 1830. Ord. p. 402. — Link 1831. Hdb. II. p. 107. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 562. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 453. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 535.
Tausch 1823. Ut. Canal. fasc. I: sect. Potentillae. — Par. Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 583.
Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4437; 1832. Fl. exc. p. 596; 1841. Nom. p. 167. n. 6497: g. Potentillear. (genuinar.) — Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 191.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 447: g. Fragariear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6362. p. 1242; 1841. Ench. p. 659. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 62. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 129.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 564: g. Potentillidar.
Synon. Pentaphylloides Rupp.; Pancovia Adans.; Potentillae sp. Spreng.; Dactylophylli Spenn. pars.

Comasperma Pers., Spreng. vid. *Comesperma Labill.*

Comaspermum Pers. vid. *praeced.*

Comatoglossum Karsten & Triana 1856. Linnaea XXVIII. p. 436: nov. g. Sapindear. (C. strictum.)

Comatricha Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 140: nov. g. Stemonitidear. (C. obtusata et alta.) *Cf.* Preuss 1852. ibid. XXV. p. 161.

Comatulina C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 503: subsect. Hypnodendri. (Hypnum comosum Labill.)

Combea De Notaris 1851. Giorn. bot. it. II. 1. p. 223: nov. g. Lichenum. (Dufourea pruinosa N.)

Combesia Rich. herb. et 1847. Fl. abyssin. I. p. 307: nov. g. Crassulacear. (C. abyssinica.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 667: g. Crassulear.
= Disporocarpa Mey.

Combilium Rumph. 1747. Amboin. V. p. 354.
= Dioscorea Plum.? (Meisn. Comm. p. 308.)

Combodia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 422: nov. g. Phyllosticteor. (Sphaeriae sp. trop.)

Combretaceae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 351. Ed. Nees p. 207; 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 548 (Verm. bot. Schr. I. p. 39): novus ordo plant. Gen.: Bucida, Terminalia, Chuncoa, Quisqualis, Combretum, Cacoucia, Laguncularia, Getonia, Conocarpus. *Cf.* Juss. 1818. Dict v. 10. p. 110.
DC. 1819. Théor. élém. p. 245; 1828. Pr. III. p. 9; 1828. Mém. soc. Genève IV. p. 1: ordo (68) Calyciflorar. Trib.: Terminalieae, Combreteae. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. Clav. (syncarpar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 322. Divis. ut DC. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 655. Trib. eaed. — Endl. 1840. Gen. p. 1179; 1841. Ench. p. 631. Trib. eaed.
Agdh. 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 592: ordo Calycanthemar.
A. Rich. 1825. Dict. class. IV. p. 353.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: div. Onagrear. Gen.: Lopezia, Circaea; Fuchsia, Combretum, Quisqualis, Guiera, Terminalia, Bucida, Nyssa.
Rchb. 1828. Consp. p. 171: subdiv. Myrobalanear. Sect. ut DC. et Gyrocarpeae.
Link 1831. Hdb. II. p. 63: ordo 22 Perigynar. Gen.: Combretum.
Lindl. 1833. Nix. p. 16: ordo Onagralium.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 294: fam. (61) Calyciflorar. Trib. ut DC.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 38) 1847. Veg. kd. p. 717: ordo Myrtalium. Trib.: Terminaleae, Combreteae, Gyrocarpeae.
Meisn. 1838. Gen. p. 110 (78): ordo 74 plant. (p. 440 Calycanthemar.) Trib. ut DC.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 119: fam. Oenotherinear. Trib. ut DC.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 131: fam. Dicotyledonear. perigynar. Trib.: Myrobalaneae, Combreteae.

Combreteae DC. 1828. Prodr. III. p. 18: trib. Combretacear. Gen.: Combretum, Cacoucia, Lumnitzera, Quisqualis, Ceratostachys, Bruguiera, Bobua? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 323. Gen. Candolleana 4 prima. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 662. Gen. ut Bartl. et Laguncularia, Guiera, Chrysostachys. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 296. 308. Gen. ut DC. — Meisn. 1838. Gen. p. 110 (78). Gen.: Bobua, Ceratostachys, Cacoucia, Quisqualis, Sphalanthus, Combretum. — Endl. 1840. Gen. p. 1182; 1841. Ench. p. 632. Gen. ut Meisn. et Agathisanthes, Bigamea? — Brongn. 1843. Én. genr. p. 119. Gen.: Quisqualis, Combretum, Poivrea. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718. Gen. ut Endl. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 132. Gen.: Lumnitzera, Guiera, Poivrea, Combretum, Cacoucia, Quisqualis, Sphalanthus.
Rchb. 1828. Consp. p. 171: sect. Combretacear. Gen. ut DC. exceptis 3 ultimis.

Combreteae Rchb. 1837. Hdb. p. 247: subdiv. Circaeear. Sect.: *genuinae* (gen. Combretear. 1828), Terminalieae, Granateae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 171. Sect.: Terminalieae, *genuinae* (gen. Combretacear. Endl.), Rhizophoreae.

Combretum*) Löfling 1758. It. p. 308.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 999. 1366. n. 1129; 1762. Sp. ed. II. p. 496; 1764. Gen. ed. VI. p. 189. n. 475; 1767. Syst. ed. XII. p. 265. n. 467: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 297; 1784. Syst. p. 359. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 137. — Reich. 1778. Gen. p. 191. n.

*) Nomen ex Plinio mutuatum.

Combretum Löfling cont.
509. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 251. n. 641. — Gmel. 1791. Syst. p. 609. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 43. t. 59; 1832. Ind. II. p. 225. — Pers. 1797. Syst. p. 384; 1805. Ench. I. p. 411. n. 924. — Willd. 1799. Sp. II. p. 319. n. 734. — Ham. 1825. Ind. occ. p. 35.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Onagrar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 320. — Batsch 1802. Tab. p. 77. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 705. (desciso.) — Link 1821. En. I. p. 379.
Gled. 1764. Syst. p. 87. n. 361: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 105: g. Strictar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 176. t. 36. f. 1 (laxum).
Neck. 1790. El. II. p. 138. n. 824: g. Coryphophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 110 in Decandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 154: g. Onagrariar.
Hedw. 1806. Gen. p. 265. n. 1066: g. Onagrear.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 351. Ed. Nees p. 207: g. Combretacear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 108. — Kunth 1824. Syn. III. p. 397. — D. Don 1825. Nepal. p. 219. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 640. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 246. — Link 1831. Hdb. II. p. 63. — Wight 1833 in Hook. Bot. Misc. III. p. 86. t. spl. 22. — Tulasne 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 83.
Poir. 1817. Dict. v. 8. p. 573 (*Chigomier*): g. Myrtacear.
D. Don 1824. Edinb. n. phil. journ. p. 344; 1827. Linn. Trans. XV. 2. p. 412. Revisio generis. *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 139.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 331. n. 1618; 1830. Gen. I. p. 316. n. 1614: g. Combretear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 18. (Mém. soc. Genèv. IV.) — Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4530; 1837. Hdb. p. 247; 1841. Nom. p. 171. n. 6608. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 323. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 662. Sect.: Eucombretum, Poivrea. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 317. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 308. — Meisn. 1838. Gen. p. 110 (78). — Endl. 1840. Gen. n. 6087. p. 1182; 1841. Ench. p. 632. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1302. — Brongn. 1843. En. genr. p. 119. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 132. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 607. Sect.: vera, Kaloëdron.
Synon. Actia Adans.; Forsgardia Fl. Flum.

Comelina Bunge vid. *Commelina Plum.*

Comelineae Bunge in Mém. étr. Ac. Pet. II. p. 141: lege *Commelineae.*

Comesperma Labill. 1806. Nov. Holl. II. p. 21. t. 159. 162.
Pers. 1807. Ench. II. p. 275. n. 1662 (*Comaspermum*, p. 658 *Comasperma*): g. Diadelph. Octandr.
Juss. 1815. Mém. Mus. I. p. 388: g. Polygalear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 128 (*Comosperma*); 1828. v. 56. p. 384 (*Urule*). — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 738 (*Comasperma*); 1826. Syst. III. p. 171. n. 2488; 1831. Gen. II. p. 569. n. 2772. — DC. 1824. Pr. I. p. 334. — A. St. Hil. & Moq. 1828. Mém. Mus. XVII. p. 351; 1829. Fl. Bras. II. p. 53; 1830. Mém. Mus. XIX. p. 329. — Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3031; 1841. Nom. p. 175. n. 6782. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 257. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 362. — Meisn. 1837. Gen. p. 23 (20). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 111. — Endl. 1840. Gen. n. 5649. p. 1078; 1841. Ench. p. 568; 1850. Spl. V. p. 81 (*Comespermea*). Sect. (1850) ex Steetz. — Steud. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 206. — Steetz 1847. Pl. Preiss. II. p. 291. Sect.: Eucomesperma, Isocalyx, Disepalum, Comespermastrum. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 82. Sect. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 378: g. Polygalacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 133.

Comespermastrum Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 313: sect. Comespermae. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 81. n. 5649 *d.* — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 85.

Comespermea Endl. vid. *Comesperma Labill.*

Cometeae Meisn. 1838. Gen. pl. vasc. p. 133 (97): trib. Paronychiear. Gen.: Cometes, Pteranthus.

Cometella „Schw." Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 505: nov. g. Sporidesmicor. (C. caricina.)
Synon. Soredospora Corda?

Cometes Linn. 1767. Mant. p. 4. n. 1243; 1767. Syst. ed. XII. p. 127: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 137; 1784. Syst. p. 163. — Reich. 1778. Gen. p. 64. n. 167. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 85. n. 211. — Gmel. 1791. Syst. p. 266. — Pers. 1797. Syst. p. 169; 1805. Ench. I. p. 147. n. 314. — Willd. 1797. Sp. I. p. 687. n. 246. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 347. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 112. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 30. 475. n. 576. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 111. n. 558. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 543.
Burm. 1768. Fl. Ind. p. 39. t. 15. f. 3.
Scop. 1777. Intr. p. 239: g. Tricoccar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 474. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 454. n. 489.
Juss. 1789. Gen. p. 437: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 78. n. 364.
Neck. 1790. El. II. p. 351. n. 1151: g. Cyrtosiphytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 886: g. Euphorbiear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 193: g. Euphorbiacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5110 (?).

Cometes Linn. cont.
R. Brown 1829 in Wall. Pl. As. rar. I. p. 17 (Verm. bot. Schr. V. p. 375): genus novae tribus cum Pterantho constituendae. *Cf.* Flora Lit. I. p. 179.
Meisn. 1838. Gen. p. 133 (97): g. Cometear.
Endl. 1839. Gen. n. 5207. p. 959; 1841. Ench. p. 504: g. Pteranthear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 145.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebraceear.
Synon. Saltia R. Brown.

Cometia Baillon 1858. Et. Euphorb. p. 642: nov. g. Phyllanthidear. (C. Thouarsii.)

Cominia P. Browne 1756. Jamaic. p. 205: g. Heptandr. Monogyn.
= ...?

*Comizophytum**) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 421: gen. 34 plant. Spec. natur.: Mahernia, Hermannia, Melochia, Ayenia, Kleinhovia, Ticorea, Connarus, Hugonia, Brownea, Melia, Winterania, Erythroxylon, Swietenia, Turraea, Gerberia, Trichilia, Abroma, Theobroma, Murraya, Guarea, Piccia, Aytonia, Geranium, Ramphocarpus, Oxalis, Ekebergia, Waltheria, Geunzia, Samyda.

Commelales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 34: nixus Hypogynar. Ordo: Commelineae.

Commelina**) Plumier 1703. Nov. gen. p. 48. t. 38.
Dill. 1732. Ht. Eltham. p. 93.
Linn. 1737. Gen. p. 11. n. 30; 1737. Cliff. p. 21; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 18; 1753. Sp. I. p. 40; 1759. Syst. ed. X. p. 864. n. 58; 1762. Sp. ed. II. p. 60; 1764. Gen. ed. VI. p. 28. n. 62; 1767. Syst. ed. XII. p. 79: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 80; 1784. Syst. p. 94. — Reich. 1778. Gen. p. 29. n. 68. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 38. n. 86. — Lour. 1790. Coch. I. p. 38. — Gmel. 1791. Syst. p. 120. — Pers. 1797. Syst. p. 95; 1805. Ench. I. p. 55. n. 112. — Willd. 1797. Sp. I. p. 249. n. 104; 1809. En. p. 67. — Vahl 1806. Enum. II. p. 165. n. 106. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 27. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 174. Ed. 1832. I. p. 170. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 4.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 9. n. 29: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 236.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 47. — Juss. 1789. Gen. p. 45. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 346. 528. n. 156.
Hill 1769. Ht. kew. p. 317: g. Hexapetalar. irregular.
Scop. 1777. Intr. p. 82: g. Liliacear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 49. t. 15. f. 1.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 231; 1789. Phil. Bot. I. p. 77.

Commelina Plumier cont.
Neck. 1790. El. III. p. 170. n. 1524: g. Ymnodiphytor. Disjungitur Stickmannia.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 152: g. Juncacear.
Batsch 1802. Tab. p. 125: g. Ephemeror.
Cram. 1803. Disp. (p. 11 in Diandr. Monogyn. et) p. 78 in Hexandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 249.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 112: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 29. 357.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 269. Ed. Nees p. 125: g. Commelinear. (Disjungitur Aneilema.) — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 258. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 253; 1825. Syst. I. p. 171. n. 185; 1830. Gen. I. p. 42. n. 190. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 113. - Link 1821. En. I. p. 61; 1829. Hdb. I. p. 150. — Kunth 1822. Syn. I. p. 267. — Agdh. 1823. Aphor. p. 168. — D. Don 1825. Nepal. p. 44. — Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 1. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 129. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 171. — Meisn. 1842. Gen. p. 407 (311). — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 531.
Schrank 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 64.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 65: g. Ephemerear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1167. Sect.: Anisanthina, Isanthina.
Bartl. 1830. Ord. p. 40: g. Commelinacear. — Par. Mart. & Gal. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 372. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 146. — Seub. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XV. p. 260.
Bunge 1835. Mém. étr. Ac. Pet. II. p. 141 (*Comelina*): g. Comelinear.
Synon. Hedwigia Med.; Erxlebia Med.; Lechea Lour.; Lechaea Hill?; Stickmannia Neck.; Ananthopus Raf.; Commelyna Hoffmsg.

Commelinaceae Rchb. 1828. Consp. p. 57; 1830. Fl. exc. p. 140 (11); 1837. Hdb. p. 148: fam. Glumacear. Divis.: Restioneae (1837 Restiaceae), Xyrideae, Commelineae.
Bartl. 1830. Ord. p. 39: ordo (28) Juncinar. Gen.: Commelina, Aclisia, Campelia, Tradescantia, Cyanotis, Callisia, Aneilema, Palisota, Dichorisandra, Mayaca, Cartonema; Xiphidium, Rapatea, Hagenbachia, Pollia, Philydrum, Flagellaria.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 354.
Meisn. 1842. Gen. p. 406 (311): ordo Enantioblastar. Trib.: Tradescantieae, Commelineae.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 121: fam. (218) Juncinear. Gen.: Commelyna, Aneilema, Palisota, Pollia, Aclisia, Lamprocarpus, Callisia, Dithyrocarpus, Murdannia, Tradescantia, Tinantia, Spironema, Cyanotis, Campelia, Dichorisandra, Cartonema, Forrestia, Floscopa.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 146: fam. Monocotyledonear. Gen. Commelynacear. Endl.
Seub. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XV. p. 233. Gen. bras.: Dichorisandra, Campelia, Tradescantia, Dithyrocarpus, Callisia, Aneilema, Commelina.

*) κομίζω, gero; φυτόν, planta.
**) Dicat. Joanni et Casparo Commelino, Amstelodam.

Commelineae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 268. Ed. Nees p. 124: ordo Monocotyledonum. Gen.: Commelina, Aneilema, Cartonema. — Par. Salisb. 1812. Hort. Trans. I. (1815.) p. 271. Gen.: Zygomenes, Aphylax, Callisia, Tradescantia.

Rich. 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 258: ordo pl. Gen.: Commelina, Callisia, Tradescantia, Campelia.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 252: ordo Coronariar. Gen.: Commelina, Tradescantia, Syena, Callisia, Philydrum.

Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 121: fam. Monoperigynar. Gen.: Callisia, Commelina, Campelia, Tradescantia, Cartonema, Aneilema, Pollia?

DC. 1819. Théor. élém. p. 249: ordo Endogenar. phanerogamar.

Agdh. 1823. Aphor. p. 168; 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 585: ordo Liliiflorar. Gen.: Philydrum, Cartonema, Bonapartea, Floscopa, Syena, Callisia, Tradescantia, Commelina, Pollia, Cyanella.

Rchb. 1828. Consp. p. 58; 1830. Fl. exc. p. 140 (11); 1837. Hdb. p. 148: div. Commelinacear. Subdivis.: Philydrinae, Xiphidieae, Ephemereae.

Link 1829. Hdb. I. p. 150: ordo 5 Endogenear. Gen.: Commelina, Tradescantia, Campelia.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (232) Tripetaloidear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: trib. Liliacear. Gen. ut Agdh., exclusis 2 ultimis.

Lindl. 1833. Nix. p. 34: ordo unicus Commelalium.

Meisn. 1842. Gen. p. 407 (311): trib. Commelinacear. Gen.: Callisia, Murdannia, Palisota, Commelina, Pollia.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Enantioblastear.

Commelyna „Hoffmsg." Endl. 1837. Gen. n. 1028. p. 125; 1841. Ench. p. 70: g. Commelynacear. Sect.: Commelyna, Aneilema. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 188. (restrict.) — Hassk. 1852. Pl. Jungh. II. p. 136. (restrict.) — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 656.

Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1527: g. Commelynear. (genuinar.) — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 13. — Kunth 1845. Enum. IV. p. 35; 1846. Abh. Berl. Ak. f. 1844. p. 79. (restrict.) — Webb 1850. Canar. III. p. 356.

Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 122: g. Commelinacear.

= Commelina Plum.

Commelynaceae Endl. 1837. Gen. p. 124: ordo Enantioblastar. Gen.: Commelyna, Pollia, Callisia, Tradescantia, Cyanotis, Campelia, Dichorisandra, Cartonema, Forrestia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1355 et Ench. p. 70) Murdannia, Tinnantia, Spironema et 1843 (Spl. III. p. 58) Lampra. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 656.

Rchb. 1841. Nom. p. 42: fam. Glumacear. Divis.: Restiaceae, Xyrideae, Commelyneae.

Commelynaceae Endl. cont.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 188: ordo Xyridalium. Gen. ut Endl.

Conf. Commelineae R. Brown; Commelinaceae Rchb.; Commelyneae Mart.; Ephemera Batsch.

Commelyneae Martius 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 172: fam. Enantioblastar.

Kunth 1841. Ber. Ak. Berl. p. 244. Revisio familiae. Nov. gen.: Dithyrocarpus.

Rchb. 1841. Nom. p. 42: div. Commelynacear. Subdivis.: Philydreae, Pontedereae, *genuinae* (gen.: Commelyna, Aneilema, Pollia, Callisia, Murdannia, Tradescantia, Tinantia, Spironema, Cyanotis, Campelia, Dichorisandra, Cartonema, Forrestia).

Brongn. 1843. En. genr. p. 13: fam. Juncinear. Gen. ex Rchb.

Kunth 1843. Enum. IV. p. 34 (1846 in Abh. Berl. Ak. f. 1844. p. 87 char. emend.): ordo Monocotyledonum. Gen.: Commelyna, Callisia, Anilema, Aclisia, Pollia, Lamprocarpus, Dithyrocarpus, Tradescantia, Tinantia, Spironema, Cyanotis, Campelia, Dichorisandra, Cartonema; Forrestia?, Floscopa?

Commersona Sonnerat 1782. Voy. t. 8. 9.

= Butonica Lam.

Commersonia Commers. mss.

= Polycardia Juss.

Commersonia*) Forster 1776. Char. gen. p. 43. t. 22: nov. g. Pentandr. Pentagyn. — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 26. n. 1380. — Murr. 1784. Syst. p. 300. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 208. n. 530. — Gmel. 1791. Syst. p. 510. — Pers. 1797. Syst. p. 318; 1805. Ench. I. p. 340. n. 755. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1566. n. 596. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 355. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIX. 768.

Scop. 1777. Intr. p. 209: g. Dumosar.

Juss. 1789. Gen. p. 428: g. incerti ordinis. — Par. Vent. 1799. Tabl. IV. p. 17. — Hedw. 1806. Gen. p. 214. n. 878.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 79. t. 94.

Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 122: g. Tiliacear. (sphalm. Liliacear.) — Par. Link 1821. En. 1. p. 302.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 669: g. Diosmear.

HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 310 in adnot.: g. Büttneriacear. (verar.) — Par. Steud. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 237.

Gay 1823. Mém. Mus. X. p. 205: g. Buttneriacear. verar.

DC. 1824. Pr. I. p. 486: g. Byttneriear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 523. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 487. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 147.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 954. n. 1142; 1830. Gen. I. p. 236. n. 1242: g. Büttnerear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1017.

St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 140 in adnot.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV: g. Byttneriacear.

---

*) Dicat. Philibert Commerçon.

Commersonia Forst. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5294; 1837. Hdb. p. 292; 1841. Nom. p. 202. n. 7715: g. Theobromear.
Bartl. 1830. Ord. p. 342: g. Büttneriear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 32 (26). — Endl. 1840. Gen. n. 5329. p. 997; 1841. Ench. p. 519. — Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 358.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 79: g. Buttneriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: g. Byttnerear. *Synon.* Medusa Lour.?; Medusula Pers.; Jürgensia Spreng.
Commia*) Loureiro 1790. Fl. Cochinch. II. p. 605. Ed. Willd. p. 742: nov. g. Dioec. Monandr. (C. cochinchinensis.)
Batsch 1802. Tab. p. 169: g. Tricoccar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 899. n. 3159; 1831. Gen. II. p. 703. n. 3544.
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 123: g. Euphorbiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 53; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 147.
Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5020; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 193. n. 7338: g. Hippomanear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 527. — Endl. 1840. Gen. n. 5774. p. 1109; 1841. Ench. p. 587. — Meisn. 1841. Gen. p. 338 (251). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 27: g. Euphorbiear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baillon 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 200; 1858. Ét. Euphorb. p. 548: g. Anthostemidear.
Commia (arillata) Hamilt. mss.
= Lepidostachys Wall. (Meisn. Comm. p. 258.)
Commianthus Bentham 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 223; 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 232: nov. g. Cordierear. (C. Schomburgkii.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 53. n. 3220/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 360. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 50. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 114.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.
Commidendron Lemaire vid. *seq.*
Commidendrum**) „Burch." DC. 1833 in Guillem. Arch. II. p. 334; 1836. Prodr. V. p. 344: nov. g. Solidaginear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2378. p. 385; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 188 (127). — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3332. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 147 (*Commidendron*).
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

*) κόμμι, gummi.
**) Anglice: *gum-wood*, unde Burch. nomen finxit DC.)

Commilobium Bentham 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 110: nov. g. Dalbergiear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6729. p. 1306; 1841. Ench. p. 673. — Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6022. — Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 101. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 147.
= Pterodon Vog.? (Lindl.)
Commiphora Jacquin 1797. Hort. Schönbr. II. p. 67. t. 249. (Jacq. ibid. t. 294 ab Endl. in synon. Balsamodendri citata.)
Willd. 1805. Sp. IV. p. 807. n. 1810: g. Dioec. Octandr. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 124. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 905. n. 3189; 1831. Gen. II. p. 709. n. 3574.
Agdh. 1823. Aphor. p. 195: g. Euphorbiacear.
Endl. 1841. Gen. p. 1332. n. 6881 inter genera dialypetala parum nota. *Cf.* Meisn. 1843. Comm. p. 372.
Communes Linn. 1747. Class. plant. p. 415: ordo 5 meth. calycinae. Gen.: Milleria, Tetragonotheca, etc.
Comocarpa Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 445: sect. Potentillac. (P. fruticosa et tridentata.)
Comocephalus Spach vid. *Comacephalus Klotzsch.*
Comocladia*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 124: nov. g. Triandr. Monogyn. — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 12. t. 173. f. 4. — Linn. 1767. Syst. ed. XII. p. 74. — Murr. 1784. Syst. p. 82. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 31. n. 66. — Gmel. 1791. Syst. p. 99. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 25. Char. emend. — Pers. 1797. Syst. p. 83. n. 49; 1805. Ench. I. p. 39. n. 86. — Willd. 1797. Sp. I. p. 187. n. 82. — Vahl 1806. Enum. II. p. 35. n. 84. — Blanco 1837. Filipin. p. 29.
Adans. 1763. Fam. II. p. 224: g. Jasminor.
Juss. 1789. Gen. p. 370: g. Terebintacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 444. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 251. — Hedw. 1806. Gen. p. 31. 359. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 348. 547. n. 163. — Tussac 1818. Dict. v. 10. p. 125. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 653; 1825. Syst. I. p. 176. n. 193. — Link 1821. En. I. p. 64. — Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 341 (Gen. Tereb. p. 9); 1825 in HBK. Nov. gen. VII. p. 15; 1825. Syn. IV. p. 153.
Batsch 1802. Tab. p. 66: g. Terebinthinacear.
DC. 1825. Pr. II. p. 65: g. Anacardicar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 396. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 67. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 186.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVI: g. Cassuvicar. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 75 (54).
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3857: g. Lentiscear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 43. n. 199: g. Terebinthear.

*) κομός, ornamentum. (?)

Comocladia P. Browne cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 224; 1841. Nom. p. 145. n. 5659: g. Pistaciear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 84.
Endl. 1840. Gen. n. 5896. p. 1129; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 148.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 377: g. Anacardiar.
Synon. Dodonaea Plum.; Camocladia Linn.; Brasiliastrum Lam. (Steud.)

Comolia*) DC. 1828. Prodr. III. p. 114: nov. g. Rhexiear. (Rhexia berberifolia Humb. & Bonpl.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 220 (*Comollia*). — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4581. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 741. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 205. — Meisn. 1838. Gen. p. 115 (82).
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1276: g. Melastomacear.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 25: g. Lasiandralium. Injunguntur Tricentrum et Arthrostemmatis sp. DC.
Synon. Hostmannia Steud.

Comollia Wittst. vid. *praeced.*

Comopyrum Jaub. & Spach 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 357: subg. Aegilopis. (A. comosa Sibth.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 790.

Comosae Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: ordo 36 plant. Gen.: Spiraea, Filipendula, Aruncus.
= Spiraea Linn.

Comosperma Poir. vid. *Comesperma Labill.*

Comostemum Nees 1834. Linnaea IX. p. 283; 1842. in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 3: nov. g. Cyperear. (Cyperus montevidensis Link.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119.
Endl. 1837. Gen. p. 119. Cypero L. injungit.
= Androtrichum Brongn.

Comparettia**) Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 42. t. 72. 73: nov. g. Orchidear. (C. saccata et falcata.)
Endl. 1837. Gen. n. 1454. p. 202; 1841. Ench. p. 111: g. Vandear. — Par. Lindl. 1838. Bot. Regist. XXIV. t. 68. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2058. — Meisn. 1842. Gen. p. 379 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 148.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Ionopsidar.

Comperia C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 287: nov. g. Ophrydear. (Orchis Comperiana Stev.)

Comphoropsis Moq. in DC. Prodr. XIII. 2. p. 200 in synon. Nanophyti: vid. *Camphoropsis Moq.* (ibid. p. 462.)

Comphrena Aubl. vid. *Gomphrena Linn.*

Compositae Vaillant 1718. Act. Ac. Paris. p. 143: div. plantar. Classes: Cynarocephalae, Corymbiferae, Cichoraceae. — Par Juss. 1805. Ann. Mus. VI. p. 307. Sect. eaed.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 1: class. VI. plant. Ordines: 1. Semiflosculosae, 2. Capitatae, 3. Floribus nudis et 4. Floribus radiatis.
Adans. 1763. Fam. II. p. 103: fam. 16 plant. Sect.: Lactucae, Echinopi, Cardui, Xeranthema, Ambrosiae, Tanaceta, Conysae, Jacobeae, Calthae, Bidentes.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 49 plant. Divis.: Capitatae, Semiflosculosae, Discoideae, . . . *) (gen.: Corymbium, Helenium, Othonna, Calendula, Arctotis, Osteospermum), Oppositifoliae, Nucamentaceae. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538. Divis. eaed.
Rüling 1774. Ord. nat. Tab.: ordo plant. Divis.: Cardui, Artemisiae, Achilleae, Helianthi, Hieracia.
Scop. 1777. Intr. p. 118: trib. 9 plant. Gentes: *A. Staminum filamentis libris.* Gen.: Chesnea, Evea, Ancistrum, Rolandra, Cephalanthus, Tapogomea, Dipsacus, Knautia, Allionia, Pterocephalus, Scabiosa, Asterocephalus. *B. Staminibus connatis.* Divis.: Semiflosculosae, Flosculosae, Radiatae.
De la Marck 1785. Act. Ac. Paris. p. 444: class. III. plant. Fam.: Dipsaceae, Cinarocephalae, Corymbiferae, Semiflosculosae.
Batsch 1802. Tab. p. 247: class. VII. plant. Ordines: Lepidocephalae, Cynarocephalae, Asterocephalae.
DC. 1805. Franç. IV. p. 1: fam. (57) Dicotyledonum. Ordines ut Vaill.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 135. Tribus: Cichoraceae, Labiatiflorae, Tubulosae.
R. Brown 1817. Linn. Trans. XII. p. 76—142. (Verm. bot. Schr. II. p. 499—604.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 527: fam. 55 plant. Ordines.: Cynareae, Eupatorinae, Perdicieae, Radiatae, Cichoreae.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246; 1836. Pr. V. p. 4: ordo (102) Calyciflorar. Subord.: Tubuliflorae, Labiatiflorae, Liguliflorae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 348. Ed. II. p. 381. Subord. ut Vaill.
Kunth 1820 in HBK. Nov. gen. IV. p. 1: fam. plant. Sect.: Cichoraceae, Carduaceae, Eupatoreae, Jacobeae, Heliantheae, Anthemideae. *Cf.* Cass. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 5 et Kunth ibid. p. 278.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 412: fam. Calyciflorar. Divis. ut Vaill.
Rchb. 1828. Consp. p. 97; 1831. Fl. exc. p. 211: fam. Campanacear. Trib.: Homoianthae, Amphigynanthae, Amphicenianthae, Amphicarpanthae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (186) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 132: class. (29) Gymnoblastor. Ordines: Calycereae, Synanthereae.

---

*) Genus in Endlicheri operibus omissum. Ratio nominis desideratur. (Dicat. Gius. Comolli Comensi: Wittstein.)
**) Dicat. Andr. Comparetti, prof. Patavin.

*) „Non potui nomen aliquod excogitare, quod naturam hujus sectionis exprimeret, eoque ab aliis distingueret". (Linn. Prael. ed. Gis. p. 538 in adnot.)

Compositae Vaill. cont.
D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 171: class. plant. Fam.: Cichoraceae, etc.
Lindl. 1833. Nix. p. 31: ordo Asteralium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 251.
Rchb. 1837. Hdb. p. 182; 1841. Nom. p. 79: div. Synanthercar. Subdivis.: Amphigynanthae, Amphicenianthae, Homoianthae.
Endl. 1838. Gen. p. 355; 1841. Ench. p. 230: ordo Aggregatar. Subord. ut DC.
Meisn. 1838. Gen. p. 174 (121): ordo 113 plant. (p. 441 Aggregatar.) Subord. iid.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 1: class. (34) Dicotyledonum. Fam. ut Bartl.
Brongn. 1843. En. genr. p. 32: fam. unica Asteroidear. Trib.: Chicoraceae, Nassauviaceae, Mutisiaceae, Cynareae, Calendulaceae, Senecionideae, Asteraceae, Eupatoriaceae, Vernoniaceae.
Decne 1849 in Orb. Dict. IV. p. 148: fam. Monopetalar. epigynar. Conspectus systematis Endlicheriani.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 158: ordo Gamopetalar. Fam.: Synanthereae, Ambrosiaceae.
Conf. Compositi Linn.; Compositiflorae Gärtn.; Synanthereae Rich.; Actinophytum, Glossariphytum et Siphoniphytum Neck.

Compositi Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: ordo 21 plant. Divis.: Semiflosculosi, Capitati, Corymbiferi, Oppositifolii.
= Compositae Vaill.

Compositiflorae Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 353: class. plantar. Divis.: Ligulatae, Tubulosae, Radiatae.
= Compositae Vaill.

Compsanthe*) Rchb. 1828 in Mössl. Handb. ed. sec. II. p. 1564: sect. Gymnadeniae. (G. odoratissima, conopsea et erubescens.)
= Gymnadenia R. Brown emend.

Compsanthus Spreng. 1827. Cur. post. p. 130: g. Hexandr. Monogyn. (*Compsoa Don.*)
Spreng. 1830. Gen. I. p. 270. n. 1405: g. Sarmentacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1157.
= Tricyrtis Wall.

Compsoa**) D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 50: nov. g. Liliacear. (C. maculata.) — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. xxx. 372.
Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1217: g. Hypoxidear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 42.
= Tricyrtis Wall.

Compsoneura A. DC. 1856. Prodr. XIV. 1. p. 199: sect. Myristicae. *Cf.* A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 697.

Compsopogon***) Montagne .... Fl. Algér. p. 154; 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 298: nov. g. Algar. *Cf.* Flora 1852. p. 380.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Ulvacear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 432. n. 270 (*Campsopogon*): g. Confervear.
Synon. Pericystis Liebm.

*) κομψός, ornatus.
**) κομψός, elegans.
***) κομψός, elegans; πώγων, barba.

Compsoteia Harv. „1847. Ner. austr." 1853. Ner. bor. am. II. p. 59: subg. Dasyae.
Synon. Eupogonii Kütz. pars.

Comptonia*) „Banks mss." Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 58. t. 90. (Liquidambaris sp. L.)
Schreb. 1791. Gen. II. p. 811. n. 1764: g. Monoec. Triandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 320. n. 1644; 1809. En. p. 962. — Pers. 1807. Ench. II. p. 549. n. 2040. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 206.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 558: g. Amentacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 319. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 161. — Link 1822. En. II. p. 383.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 203: g. Monoec. Polyandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 219: g. Taxear.
Agdh. 1825. Aphor. p. 208: g. Myricear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 79. n. 1699; 1841. Nom. p. 65. n. 2456. — Bartl. 1830. Ord. p 99. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 264. — Brongn. 1843. En. genr. p. 134.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 835. n. 3095: g. Coniferar.
Link 1831. Hdb. II. p. 460: g. Juliferar.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 693. n. 3497: in Monoec. Hexandr.
Endl. 1837. Gen. n. 1839 c. p. 272; 1841. Ench. p. 158: sect. Myricae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 256: g. Myricacear.
Conf. seq.

Comptonia Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 143; 1828. Prodr. p. 133: g. Amentacear. foss.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 213; 1846. Chlor. prot. p. LXXVII: g. Myricear. (An idem ac praecedens?) — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 126.
Synon. Asplenium et Aspleniopteris Sternb.; Comptonites Nilss.?

Comptonites Nilss. 1831. Act. Ac. Holm. p. 346. t. 1. f. 8.
Hisinger 1837. Lethaea suec. p. 111. t. 34.
= Comptonia Brongn.?

Conami**) Aublet 1775. Guian. II. p. 926. t. 354: nov. g. Dioec. Polyandr. (C. brasiliensis.)
Gmel. 1791. Syst. p. 834: g. Polyandr. Trigyn.
= Phyllanthus Linn.

Conandron***) Sieb. & Zuccar. 1843. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. III. p. 729: nov. g. Scrophularinar.
Endl. 1843. Spl. III. p. 79. n. 4024: g. Scrophularinear.
Walp. 1845. Rep. III. p. 437: g. Rhinanthear.
DC. 1845. Pr. IX. p. 273: g. Ramondiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.

Conangium Rchb. vid. *Coniangium Fries.*

Conanthera Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 68. t. 301: nov. g. Hexandr.

*) Dicat. Henry Compton, episcopo Londin.
**) Nomen brasiliense *Conami.*
***) κῶνος, conus, meta.

Conanthera Ruiz & Pav. cont. Monogyn. (C. bifolia.) *Cf.* Schrad. n. Journ. III. 3. p. 149. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 370. n. 811. — Hedw. 1806. Gen. p. 235. n. 952. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 278. n. 1444. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1196.
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 163: g. Narcissear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 170: g. Haemodorear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 90. n. 1247: g. Asphodelear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. xxxiii. 430. — Bartl. 1830. Ord. p. 51 (desciscens)?
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1395: g. Abamear.
D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 236: g. Conanthercar. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1156. p. 149; 1841. Ench. p. 84. — Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1812. — Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 630: g. Anthericear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 256.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 164: g. Anthericeis aff.

Conanthereae D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 256: trib. Asphodelear. Nova genera: Zephyra, Pasithea.
Endl. 1837. Gen. p. 149; 1841. Ench. p. 84: fam. Anthericeis aff. Gen.: Zephyra, Cummingia, Conanthera, Pasithea, Echeandia.
Rchb. 1841. Nom. p. 49: subsect. Anthericear. Gen. ut Endl.
Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301): ordo Liliacear. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: trib. Liliacear. Gen. ead. (excepta Echeandia.)

Conanthodium A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 272: nov. g. Helichrysear. (C. Drummondii.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 259 inter Angiantheas.

Conanthus A. DC. 1845. Prodr. IX. p. 295: sect. Eutocae?

Conapia Dochnahl 1856. Obstk. II. p. 128: g. Pyror. (*Zapfenbirne, Verte longue.*)

Conceveiba*) Aublet 1775. Guian. II. p. 923. t. 353: nov. g. Dioec. Polyandr. (C. guianensis.)
Gmel. 1791. Syst. p. 826: g. Polyandr. Monogyn.
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 165: g. Euphorbiacear.? — Par. A. Juss. 1824. Euphorb. p. 43 in adnot. et 1849 in Orb. Dict. IV. p. 164.
Endl. 1840. Gen. n. 5791. p. 1112; 1841. Ench. p. 588; 1842. Spl. II. p. 89: g. Acalyphear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 338 (252). — Klotzsch 1841. Arch. f. Nat. I. p. 191. — Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7355. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Baill. 1858. Euphorb. p. 414: g. Crotonidear.

Conceveibum „Rich." A. Juss. 1824. Euphorb. p. 42: nov. g. Euphorbiacear. *Cf.* Ann. sc. nat. I. 1824. p. 158.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 614: g. Crotonear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 101. n. 3168; 1831. Gen. II. p. 705. n. 3553: g. Tricoccar.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5039; 1837. Hdb. p. 281: g. Acalyphear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 487.
= Aparisthmium Endl.

Concharia Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 180: subtrib. Pleuroti.

Conchidium „Griff." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 181: g. Dendrobidar.

Conchium Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 215.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 480: g. Protear.
Hedw. 1806. Gen. p. 73. n. 347: g. Proteacear.
Willd. 1809. Enum. p. 140: g. Tetrandr. Monogyn. (Hakea pugioniformis Pers.)
= Hakea Schrad.

Conchocarpus*) Mikan 1820. Del. fl. Bras. I. t. 2: nov. g. Diandr. Monogyn., Raputiae Aubl. aff. *Cf.* Flora 1821. I. p. 114. — Par. Schult. 1824. Mant. II. Add. p. 189.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 158: g. Fraxinellar.
= Galipeae St. Hil. pars.

Conchochilus Hasskarl 1842 in Hoev. & Vriese Tijdschr. IX. p. 146: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.?

Conchophyllum Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1060: nov. g. Asclepiadear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 134: g. Hoyacear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 630: g. Ceropegiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.
Synon. Dischidiae sp. Endl.

Concinnae Rchb. 1828. Consp. p. 169; 1832. Fl. exc. p. 437. 632; 1837. Hdb. p. 217; 1841. Nomencl. p. 169: ordo Calycanthar. Formationes: Onagriflorae, Myrtiflorae.

Concordia Benth. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 202: sect. Pithecolobii. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 611. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 37.

Condalia**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 11. t. 2: g. Triandr. Monogyn. *Cf.* Hedw. 1806. Gen. p. 32.
Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 54. t. 84: g. Tetrandr. Monogyn.
= Coccocypselum Swartz.

Condalia Cavan. 1799. Anal. cienc. nat. I. p. 39. t. 4; 1801. Icon. VI. p. 15. t. 525: nov. g. Pentandr. Monogyn. (C. macro-

---

*) Nomen caribaeum *Conceveibo.*

*) κόγχη, concha.
**) Dicat. Ant. Condal.

Condalia Cavan. cont.
phylla.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 241. n. 533.
Hedw. 1806. Gen. p. 151. n. 646: g. Rhamnear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLI. 513. n. 1024. — DC. 1825. Pr. II. p. 28. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 825. n. 937; 1830. Gen. I. p. 203. n. 1033. — Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 355. — Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 27. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 439. — Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 873.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 319: g. Amarantear.
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3818: g. Frangulacear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 685: g. Rhamnacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582.
Endl. 1840. Gen. n. 5718. p. 1096; 1841. Ench. p. 581: g. Frangulear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5589. (genuinar.) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 169. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 433.
Brongn. 1843. En. genr. p. 122: g. Zizyphear.

Condaminea*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 402: nov. g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 511. — Endl. 1838. Gen. n. 3262. p. 553; 1841. Ench. p. 274. — Meisn. 1838. Gen. p. 158 (114). — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2898. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 170.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 418: g. Hedyotidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
Synon. Macrocnemi sp. Ruiz & Pav.; Macrocnemi sect. 2 Kunth; Macrophyllum A. Rich.

Condea Adans. 1763. Fam. II. p. 504: nov. g. Labiatar. (Satureia amer. H. R. Par.) = Hyptis Jacq.

Condylocarpon**) Desfont. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 119. t. 11: nov. g. Apocinear. (C. guyanense.)
Endl. 1838. Gen. n. 3392. p. 581; 1841. Ench. p. 294: g. Ophioxylear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. — Meisn. 1840. Gen. p. 263 (171.) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 170 (*Condylocarpum*).
Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5210 (*Condylocarpum*): g. Rauwolfiear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 380: g. Tabernaemontanear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.

Condylocarpum Rchb., Lemr. vid. *praeced.*

Condylocarpus Hoffm. 1816. Umbellif. ed. II. p. 202: nov. g. Umbelliferar. (Tordylium apulum W.) *Cf.* Schult. Syst. VI. p. XL. LIII. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 235.

*) Dicat. Charles Marie de la Condamine.
**) κόνδυλος, articulus.

Condylocarpus Hoffm. cont
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 86: g. Tordylinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3685: g. Peucedanear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 198: sect. Tordylii. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 452; 1841. Nom. p. 142. n. 5488. 2. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 346. — Koch 1836. Syn. p. 309. Ed. II. p. 339. — Endl. 1839. Gen. n. 4482 *b*. p. 782; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 11. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 379.

Condylocarpus Salisb. mss. = Sequoia Endl.

Condylocarpus „Desf." Endl. 1850 vid. *Cordylocarpus*.

Condylocarya Besser mss. = Rapistrum Boerh.

Conferva*) Dillen. 1719. Nov. gen. p. 78; 1741. Hist. musc. p. 11: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 10. p. 265. — Par. Neck. 1771. Meth. musc. p. 3. 243 (frondescentium).
Linn. 1737. Gen. p. 326. n. 804; 1740. Syst. p. 32; 1751 Phil. bot. p. 35; 1753. Sp. II. p. 1164; 1759? Syst. ed. X. p. 1346. n. 1070; 1763. Sp. ed. II. p. 1633; 1764. Gen. ed. VI. p. 567. n. 1207; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 720: g. Algar. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 135. — Scop. 1772. Carn. II. p. 405. — Murr. 1774. Syst. p. 818; 1784. Syst. p. 972. — Reich. 1778. Gen. p. 562. n. 1323. — Lour. 1790. Coch. II. p. 689. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 768. n. 1672. — Gmel. 1791. Syst. p. 1392. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Mönch 1794. Meth. p. 770. — Pers. 1797. Syst. p. 1011. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 32. — Roth 1800. Germ. III. p. 483. (restrict.) — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 15. 155. — Rebent. 1804. Neom. p. 285. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 16. — DC. 1805. Franç. II. p. 52.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 1: g. pl. class. I.
Adans. 1763. Fam. II. p. 2: g. Byssor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 6.
Gled. 1764. Syst. p. 300. n. 1208: g. Algacear. (vesicularium.) — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 449.
Scop. 1777. Intr. p. 61: g. Filamentosar.
Wigg. 1780. Holsat. p. 91: g. Aspermar.
Neck. 1790. El. III. p. 352. n. 1780: g. Athrosophytor. Sejungitur Enarthrum.
Bory 1797. Mém. s. l. genres Conferve et Byssus.
Batsch 1802. Tab. p. 271: g. Byssinor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 44: g. Hypepidermidocarpor.
Leman 1816. Dict. v. 1. spl. p. 117: g. Confervar. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 30.
Mart. 1817. Erlang. p. 294: g. Algar. vegetantium emend. Sect.: Haplosporae, Tetrasporae.
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XXIX. 71; 1821. Aphor. p. 98: g. Confervoidear. emend. —

*) Nomen a conferruminare: Plin.

Conferva Dillen. cont.
Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 303. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 906. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 149.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 135: g. Siphonigonator.
Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 196: g. Confervear. — Par. Agdh. 1824. Syst. p. xxvi. 86. — Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 226. — Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 467 (sect.: Conferva, Chloronitum); 1841. Nom. p. 19. n. 661. — Endl. 1836. Gen. n. 56. p. 5; 1841. Ench. p. 4; 1843. Spl. III. p. 15. n. 34. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 404; 1841. Brit. Alg. p. 124. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. . . . — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 184; 1842. Pl. cell. cub. p. 12; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 174; 1849. ibid. X. p. 53. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 12. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 130 (Fl. scan. p. 326). Sect.: genuinae, Myxonemata. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 103. (genuinar.) — Aresch. 1850. Nov. Act. Upsal. XIV. p. 419. — Math. 1853. Belg. II. p. 510.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71: g. Confervacear. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 191. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327. (Flora 1843. p. 92.) — Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 263.
Fries 1825. Pl. homon. p. 338: g. Ulvacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 354. n. 3421; 1831. Gen. II. p. 753. n. 3823: g. Confervinar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 85.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 33: g. Arthronematum.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 466): g. Euconfervear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Confervidar. *Conf.* Polysperma Vauch.; Chloronitum Gaill.; Annulina Link.

Conferva Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 4: g. Confervar. restrict. (C. atropurpurea, fucicola, ericetorum, setacea, aurea.) *Cf.* Flora 1821. II. p. 510.
— Hydranthema Link.

Conferva Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 90; 1843. Phycol. gener. p. 257; 1845. Phycol. germ. p. 201; 1849. Sp. Alg. p. 370. n. 249: g. Confervear. („Omnes species formae forte steriles Oedogonii".) — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 20.

Confervaceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71: fam. Granuliniae. Gen.: Conferva.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 191: subordo Algar. Gen.: Conferva etc.
Rchb. 1828. Consp. p. 26: fam. Gongylophycear. Divis.: Echinelleae, Fragilarinae, Oscillatorinae, Ulvaceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 135. Divis.: Oscillatorinae, Conferveae, Zygnemeae. — Rchb. 1841. Nom. p. 18. Divis.: Leptomiteae, Oscillarieae, Lyngbyeae, Cadmeae, Diatomeae, Conferveae, Zygnemeae, Hydrodictyeae.

Confervaceae Dumort. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 10: ordo Algar. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 4; 1841. Ench. p. 3. Trib.: Leptomiteae, Oscillatorinae, Batrachospermeae, Conferveae, Ceramieae. — Endl. 1843. Spl. III. p. 10. Subordines: Palmelleae, Nostochineae, Oscillatorieae, Confervoideae, Siphoneae, Ulvaceae. (*Synon. Zoospermeae J. Agdh.*, *Zoosporeae et Synsporeae Decne*, *Confervoideae Agdh.*) — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 1; 1846. Chlor. prot. p. xxv. Gen.: Confervites, Caulerpites. — Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . Trib.: Conferveae, Acetabularieae, Coleochaeteae.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. Arthrosporar. Sect.: Oscillatorinea, Diatomea, Conjugatea, Confervacea, Ectospermea.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327. 333 (Flora 1843. p. 92): trib. Zoosporear. Gen.: Conferva, Sphaeroplea, Microdictyon.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 2: fam. Zoosporear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 14: ordo Algalium. Subord.: Palmelleae, Nostocheae, Oscillatoreae, Conferveae, Siphoneae.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 96: fam. Gonidiophycear. Sect.: Conferveae, Zygnemeae, Hydrodictyeae.
Harv. 1858. Ner. bor. III. p. 67: ordo Chlorospermear. Subord.: Chaetophoreae, Conferveae.

Confervae Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 52: ordo quintus Cryptogamiae.
Leman 1816. Dict. v. 1. spl. p. 117: sect. prima Algar. Gen.: Vaucheria, Arthrodia, Spirogyra, Conferva, Oscillatoria, Batrachospermum, Thorea, Draparnaldia, Chantransia, Lemanea, Diatoma, Ceramium.
Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 4: fam. Algar. Gen.: Bacillaria, Annulina, Conferva, Lysigonium, Globulina, Conjugata, Spirogyra, Oscillatoria, Hydrolinum, Ectosperma, Oedogonium, Hydrodictyon, Enteromorpha, Batrachospermum, Charospermum, Rivularia, Agarum, Ceramium, Mertensia. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 30. Gen.: Nodularia?, Conferva, Protonema.

Conferveae Bonnemais. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 193: sect. Hydrophytar. loculatar. Gen.: Bulbocheta, Macrocarpa, Conjugata, Hydrodiction, Conferva, Diatoma, Echinella, Spermogonia.
Agdh. 1824. Syst. p. xxv: div. Confervoidear. Gen.: Nodularia, Zygnema, Mougeotia, Hydrodictyon, Dictyonema, Conferva, Bulbochaete. — Simil. Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 466.) Subtrib.: Euconferveae, Zygnemeae. — Endl. 1843. Spl. III. p. 15. Gen.: Myxonema, Conferva, Hormiscia, Nodularia, Tiresias, Draparnaldia.
Fries 1825. Pl. homon. p. 340: trib. Ulvacear. Gen.: Ectocarpus, Chantransia, Bulbochaete, Conferva. — Simil. Rchb.

Conferveae Bonnemais. cont. 1828. Consp. p. 27. Gen. ead. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 130. (Seirogonimicar.) Gen.: Draparnaldia, Conferva, Hormiscia, Erythrotrichia.

Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 224: ordo Hydrophytor. articulator. Gen.: Scytonema, Sphacellaria, Conferva.

Endl. 1836. Gen. p. 5; 1841. Ench. p. 4: trib. Confervacear. Gen.: Nodularia, Zygnema, Hydrodictyon, Conferva. — Simil. Rchb. 1837. Hdb. p. 135; 1841. Nom. p. 19. Gen.: Protonema, Conferva, Nodularia. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 96. Subsect.: Myxonemeae, *genuinae* (p. 101. Gen.: Chionyphe, Saprolegnia, Oedogonium, Conferva, Hormiscia, Fischeria), Ectocarpeae. — Nägeli 1847. Alg. Syst.

Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 404; 1841. Brit. Alg. p. 10. 124: trib. Chlorospermear. Gen.: Conferva et 1841 Hydrodictyon, Mougeotia, Tyndaridea, Zygnema, Sphaeroplea, Aphanizomenon.

Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 184: trib. Phycear. Gen.: Conferva, Zygnema.

J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 12: trib. Zoospermear. Gen.: Conferva.

Zanard. 1843. Classif. Fic. Tab.: trib. Goniciophycear.

Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 90; 1843. Phyc. gener. p. 253: fam. Dermatosiphear. Gen.: Oedogonium, Psichohormium, Conferva, Spongopsis, Rhizoclonium, Sphaeroplea, Cladophora, Crenacantha, Aegagropila, Spongomorpha, Periplegmatium, Pilinia, Fischeria. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 6 (entospermear.) Gen.: Fischeria, Bulbochaete, Aegagropila, Cladophora, Sphaeroplea, Rhizoclonium, Conferva, Psichohormium, Oedogonium.

Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 199; 1849. Sp. Alg. p. 363: fam. Confervinar. Gen. 1845: Oedogonium, Psichohormium, Conferva, Chaetomorpha, Hormotrichum, Rhizoclonium, Cladophora, Aegagropila, Bulbochaete, Periplegmatium, Pilinia, Fischeria. Accedunt 1849: Gloeotila, Allogonium, Cymatonema, Crenacantha, Gongrosira. Herposteiron, Phyllactidium, Coleochaete. Chroolepus, Bulbotrichia, Chantransia, Chlorotylium; Campsopogon.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: subordo Confervacear. Trib.: Hydrodictidae, Zygnemidae, Confervidae, Chaetophoridae.

Trevis. 1848. Alghe cocot. p. 100: trib. Confervinar.

Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 174; X. p. 52: trib. Zoospermear. Gen.: Oedogonium, Myxonema, Conferva, Cladophora, Diplonema, Chaetomorpha, Psichormium, Crenacantha, Nodularia, Hormiscia, Sphaeroplea, Fischeria.

Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 219: fam. Chlorosporear. Nov. gen.: Microspora.

Aresch. 1850. Nov. Act. Upsal. XIV. p. 419: fam. Syntamiidear. Gen.: Conferva, Erythrotrichia.

Math. 1853. Belg. II. p. 508: trib. 18 Algar.

Conferveae Bonnemais. cont. Gen.: Chroolepus, Auduinella, Bulbochaete, Coleochaete, Cladophora, Conferva.

Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 69: subordo Confervacear. Gen. amer.: Cladophora, Chaetomorpha, Hormotrichum, Rhizoclonium.

Conferridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 18: trib. Confervear. Gen.: Myxonema, Conferva, Hormiscia, Nodularia, Aphanizomenon, Tiresias, Draparnaldia, Leptomitus, Achlya, Hygrocrocis.

Confervideae Gray Arr. brit. pl. I. p. 279: vid. *Confervoideae.*

Confervinae Spreng. 1827. Syst. IV. p. 312: fam. Algar. Gen.: Cladostephus, Ectocarpus, Polysiphonia, Champia, Griffithia, Ceramium, Bulbochaete, Conferva, Zygnema, Hydrodictyon, Nodularia. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 752. Gen. ead. (excepta Nodularia) et Sphacelaria, Dasia, Chroolepus.

Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 156. 191: div. Tiloblastear. (antea *Dermatosipheae Kütz.*) Fam.: Hormidieae, Ulothricheae, Conferveae, Zygnemaceae, Hydrodictyeae, Protonemeae, Chantransieae, Draparnaldieae, Ectocarpeae, Sphacelarieae. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 344. Fam.: Ulothricheae, Sphaeropleaceae, Conferveae, Zygnemaceae, Hydrodictyeae, Ectocarpeae.

Trevis. 1848. Alghe cocot. p. 100: div. Trichothallar. Tribus: Bangieae, Ulothriceae, Conferveae, Chlorotylieae, Zygnemeae, Hydrodictyeae.

Confervites Brongn. 1828. Prodr. p. 211; 1828. Hist. vég. foss. I. p. 86. t. 9; 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 56: g. Algar. foss. — Par. Unger 1843 in Endl. Spl. III. p. 53. n. $122/_{91}$; 1845. Chlor. prot. p. 127. t. 39.

Endl. 1836. Gen. n. 75. p. 6; 1841. Ench. p. 4: g. Confervacear. foss. — Par. Unger 1845. Syn. p. 1; 1846. Chlor. prot. p. xxv.

Sternb. 1838. Vers. II. p. 19: g. Confervoiditum.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Phycear. foss.

Confervoideae Agardh 1817. Syn. Alg. p. xxv. 53: sect. Algar. Gen.: Rytiphlaea, Cladostephus, Hutchinsia, Ceramium, Griffitsia, Lemania, Bulbochaete, Conferva, Hydrodictyon, Zygnema, Oscillatoria, Scytonema, Diatoma, Gloionema, Thorea, Batrachospermum, Draparnaldia.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 301 (p. 279 *Confervidae*): div. Hydrophytar. Gen.: Chaetophora, Leathesia, Myriodactylon, Draparnaldia, Conferva.

Agdh. 1821. Aphor. p. 98: ordo Algar. Gen.: Draparnaldia, Batrachospermum, Thorea, Gloionema; Echinella, Fragilaria, Diatoma; Scytonema, Oscillatoria, Lyngbya, Zygnema, Bangia; Hydrodictyon, Conferva, Bulbochaete; Chara, Hydatiphora, Sphacelaria, Ceramium; Lemania, Griffitsia, Borya, Hutchinsia, Rhodocoma, Cladostephus, Rytiphlea, Champia. — Par. Agdh. 1824.

Confervoideae Agardh cont. Syst. p. xx. 31. Divis.: Funginae, Lichenoideae, Byssoideae, Leptomiteae, Batrachospermeae, Oscillatorinae, Conferveae genuinae, Characeae, Ceramieae, Ectocarpeae.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 796: div. Algar. aquaticar. Gen.: Ceramium, Lemania, Conferva, Hydrodictyon, Zygnema, Oscillatoria, Scytonema, Diatoma, Batrachospermum.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 466): subordo Ulvacear. Trib.: Batrachospermeae, Conferveae, Hydrodictyeae.
Endl. 1843. Spl. III. p. 14: subordo Confervacear. Trib.: Hydrodictyeae, Zygnemeae, Conferveae, Chaetophoreae.

Confervoidites Sternb. 1838. Vers. II. p. 19: subordo Algacitum. Gen.: Confervites.

Confines Rchb. 1828. Consp. p. 158; 1832. Fl. exc. p. 437. 545; 1837. Handb. p. 217; 1841. Nomencl. p. 157: ordo Calycanthar. Formationes: Sediflorae, Rosiflorae.

Congea Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 90. t. 293: nov. g. (Didynam. Angiosperm.) Viticum. (C. tomentosa.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 485.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 754. n. 2115; 1831. Gen. II. p. 478. n. 2358: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2911. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 372. 619.
Bartl. 1830. Ord. p. 180: g. Viticear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227.
Endl. 1838. Gen. n. 3715. p. 638; 1841. Ench. p. 312: g. Aegiphilear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4216.
Meisn. 1840. Gen. p. 292 (200): g. Symphoremear. — Par. Walp. 1845. Rep. IV. p. 116. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 623. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 911.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664: g. Verbenacear.
Synon. Roscoea Roxb.; Calochlamys Presl.

Congregatae Batsch 1802. Tab. affin. p. 236: fam. Rigidar. Gen.: Mitchellia, Canephora, Cephaëlis, Callicocca, Morinda, Opercularia, Nauclea.

Conia Vent. 1799. Tabl. II. p. 32: g. Algar., a Bysso L. segregatum.

Coniandra*) Schrad. 1836 in Eckl. & Zeyh. Enum. pl. Afr. austr. II. p. 275; 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 403: nov. g. Cucurbitear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91). — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 273. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 267. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Endl. 1839. Gen. n. 5124. p. 935; 1841. Ench. p. 491: g. Coniandrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3965. — Walp. 1843. Rep. II. p. 195. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 8. 22. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 177.

*) κονία, pulvis.

Coniandra Schrad. cont. Brongn. 1843. Én. genr. p. 116: g. Cucurbitacear.

Coniandreae Endl. 1839. Gen. p. 935; 1841. Ench. p. 491: div. Cucurbitear. Gen.: Coniandra, Cyrtonema.
Rchb. 1841. Nom. p. 101: sect. Cucurbitear. genuinar. Gen. ead.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 6. 7: trib. Cucurbitear. Gen. ead.

Coniangeae Arnold 1858. Flora p. 695: trib. Opegraphacear. Gen.: Arthonia, Coniangium.

Coniangium*) Fries 1821. Kongl. Vet. Ak. Handl. II. p. 330: nov. g. Variolariar. *Cf.* Flora 1823. II. Beil. p. 47.
Fries 1825. Pl. homon. p. 275; 1831. Lich. eur. p. 6. 377: g. Graphidear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 382 (*Conangium*); 1841. Nom. p. 15. n. 539. — Endl. 1836. Gen. n. 131. p. 12; 1841. Ench. p. 10. — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 177; 1849. ibid. VII. p. 350.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 121: in appendice ad Lichenes nucleiferos.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Graphidar.
Massal. 1855. Framm. Lich.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 298: g. Arthoniear.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 348: sect. Arthoniae.
Arnold 1858. Flora II. p. 695: g. Coniangear.

Conianthos Beauv. (ubi?) *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 10. p. 275 et *seq.*

Conianthus „Palis." Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 532 *b*: sect. Jungermanniae.

Conida Massalongo 1856. Miscell. lich. (Flora 1857. p. 488): nov. g. Celidiear. = Phacopsis Tul. (Trevis.)

Coniferae Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 145: ordo 1 class. III. Gen.: Ephedra, Taxus, Juniperus, Abies, Larix, Pinus.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: ordo 15 plant. Gen.: Abies, Pinus, Cupressus, Thuja, Juniperus, Taxus, Ephedra.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 63 plant. Gen. ut Linn. 1751 (Thuya) excepta Abiete.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 51 plant. Gen. ut 1751 (excepta Abiete) et Equisetum? — Par. Gis. 1792. Prael. p. 586. Gen. ead.
Scop. 1777. Intr. p. 353: trib. 34 plant. Gen. ut Linn. 1764.
Juss. 1789. Gen. p. 411: ordo 5 class. XV. Gen. §. 1: Ephedra, Casuarina, Taxus. §. 2: Juniperus, Cupressus, Thuya, Araucaria, Pinus, Abies. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 573. Gen. ead.
Batsch 1802. Tab. p. 165: fam. Juliferar. Gen.: Pinus, Casuarina, Cupressus, Thuya, Araucaria.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 325. t. 112. Gen. ut Juss. 1789.
DC. 1805. Franç. III. p. 270: fam. (24) Dicotyledonum. Gen. ut Hall. 1742. Accedit 1815 (ibid. V. p. 335) Cupressus. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 906. (apetalar.)

*) κόνις, cinis; ἀγγεῖον, vasculum.

Coniferae Hall. cont.
Typi sectionum: Taxus, Juniperus, Pinus. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 178. (gymnospermar.) Fam.: Cupressineae, Abietineae. Taxineae.
Cassel 1810. Nat. fam. p. 101.
Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 296: ordo plant. Sect.: Taxinae, Cupressinae, Abietinae.
Rich. 1811. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 188: ordo Synorhizar. Divis. (ibid. p. 121): Monocarpae, Galbuliferae, Strobiliferae, Cycadeae; Ceratophyllum.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 2: ordo plant. Sect.: Taxinae, Cupressinae s. Galbuliferae, Abietinae s. Strobiliferae.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 209: fam. 17 plant. Ordines: Pineae, Junipereae, Taxeae.
DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Monochlamydear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 664. Ed. II. p. 763. Trib.: Ephedrinae, Taxineae, Cupressineae, Abietineae.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 53: fam. Julaciae.
Agdh. 1825. Aphor. p. 211; 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 585: ordo Micranthar. Trib.: Cupressinae, Pineae, Taxinae.
A. Rich. 1826. Comm. de Conif. p. 10. 122. Sect.: Taxineae, Cupressineae, Abietineae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXVII: fam. Ambiguar. Divis.: Junipereae, Pineae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 168 (in tab. Strobilaceae); 1841. Nom. p. 62. Divis.: Cupressinae (1841 Cupressineae), Abietinae, Araucarieae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.; 1833. Nix. p. 32: ordo (228) Gymnospermar.
Bartl. 1830. Ord. p. 92: class. (22) Gymnoblastor. Ordines: Cycadeae, Abietinae, Cupressinae, Taxinae.
Endl. 1837. Gen. p. 258; 1841. Ench. p. 138: unica class. Acramphibryor. gymnospermor. Ordines: Cupressinae, Abietinae, Taxineae, Gnetaceae.
Meisn. 1842. Gen. p. 351. 442 (263): class. (38) Monochlamydear. Ord.: Gnetaceae, Cupressineae, Abietineae, Taxineae, Cycadeae.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 274: class. (42) Dicotyledoneor. Fam. ut Rich. 1810 et Cycadeae.
Zuccar. 1843. Abh. phys. math. Cl. Ak. Münch. III. p. 751. Ordines: Abietineae, Cunninghamieae, Cupressineae, Taxineae.
Brongn. 1843. En. genr. p. XXXII. 135: class. Gymnospermar. Fam. ut A. Rich. 1826 et Gnetaceae.
Endl. 1847. Syn. Conif.; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 1. Tribus ut Brongn. 1843 et Podocarpeae.
Karst. 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 216: div. Gymnospermar. restricta. Fam. unica: Abietinae.

Coniferites Sternb. 1838. Vers. II. p. 201: ordo plant. foss. Gen.: Pinites, Steinhauera, Cunninghamites, Dammarites, Araucarites, Taxodites.

Coniocarpeae Arnold 1858. Flora II. p. 694: trib. Opegraphacear. Gen.: Coniocarpon.

Coniocarpi Meyer 1825. Entw. Flecht. p. 322: ordo 1 Lichenum. Gen.: Lepra, Coniocarpon, Coniocybe, Calicium, Sphaerophoron.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 184: subordo Lichenum. Gen.: Calycium.
Genth 1836. Nass. I. p. 315: div. Lichenum. Ordines: Sphaerophoreae, Caliciеae.

Coniocarpicae Rchb. 1828. Consp. p. 19 (1832. Fl. exc. p. L); 1837. Handb. p. 131: fam. Blastopsorar. Gen.: Coniocarpon, Trachylium; Arthonaria, Incillaria, Naevia.
Rchb. 1841. Nom. p. 14: fam. Crateropsorar. Gen.: Spiloma, Lecanactis, Coniocarpon. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 75. Gen.: Coniocarpon.

Coniocarpon DC. 1805. Fl. franç. II. p. 323: nov. g. Lichenum. (C. cinnabarum, olivaceum, nigrum.) — Par. Leman 1818. Dict. v. 10. p. 277.
Meyer 1825. Entw. Flecht. p. 323: g. Coniocarpor. Char. emend.
Fries 1825. Pl. homon. p. 276: g. Coniothalamor.
Rchb. 1828. Consp. p. 19. n. 351; 1841. Nom. p. 14. n. 514: g. Coniocarpicar. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 75. — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 222 (*Coniocarpum*).
Spreng. 1831. Gen. II. p. 746. n. 3780: g. Gymnosporor.
Fries 1831. Lich. eur. p. 6. 376; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 118: g. Graphidear. — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 168; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 183; 1849. ibid. VII. p. 350.
Endl. 1836. Gen. n. 127. p. 12; 1841. Ench. p. 9: g. Calyciear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Calycidar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 242 in App.: g. Lichenum crustaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 155: g. Lichenear. sect. 5.
Arnold 1858. Flora II. p. 694: g. Coniocarpear.
Synon. Conioloma Flörke.

Coniocarpum Wittst. vid. *praeced.*

Coniocephalum Wallroth mss. olim. *Cf.* Wallr. Fl. crypt. I. p. 564. = Embolus Batsch.

Coniochiton Hassk. vid. *Coniogeton Blume.*

Coniocybe*) Achar. 1816. Vet. Ak. Handl. p. 283.
Agdh. 1821. Aphor. p. 92: g. Cephaloidear.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ak. Handl. II. p. 323: g. Calicior.
Meyer 1825. Flecht. p. 323: g. Coniocarpor.
Fries 1825. Pl. homon. p. 276: g. Coniothalamor.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 306. n. 3381; 1831. Gen. II. p. 747. n. 3781: g. Gymnosporor.

*) κυβή, caput, cupa.

Coniocybe Achar. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 19. n. 361: g. Crateroidear.
Fries 1831. Lich. eur. p. 6. 382; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 119: g. Caliciear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350.
Endl. 1836. Gen. n. 130. p. 12; 1841. Ench. p. 9: g. Calyciear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 14. n. 511. — Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 74. — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 183. — Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 318. — Théob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 343.
Rchb. 1837. Hdb. p. 132: g. Coniocybear. — Par. Arnold 1858. Flora II. p. 700.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: g. Sclerophorear.
Lindl. 1847. Veg. kd p. 50: g. Calycidar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 174: g. Calicioideor. — Par. Th. Fries 1856. Oefvers. K. Ak. Förh. XIII. (Flora 1857. p. 633.)
Math. 1853. Belg. II. p. 123 (*Conyocybe*): sect. Calicii.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 10 (Flora 1854. p. 233): g. Calicioidear.
Synon. Sclerophora Chev.; Fulgia Chev.; Strongylium Achar.

Coniocybeae Rchb. 1837. Handb. p. 132: fam. Crateropsorar. Gen.: Coniocybe.
Arnold 1858. Flora II. p. 700: trib. Caliciacear. Gen. id.

Coniocymatii Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 563: ordo 3 Lichenum. Gen.: Embolus, Calycium, Sphaerophoros.

Coniogasteres Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 22: fam. Hyphomycetum. Gen.: Physarum, Tripotrichia, Trichia.

Coniogastri Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: trib. Entobasidum. Sect.: Podaxinei, Battarrei, Tylostomei, Geastrei, Broomeici, Lycoperdei, Hippoperdei, Phellorinei, Polysaccei, Sclerodermei, Trichodermei, Reticularici, Spumarici, Physarei, Trichiacei, Cribrarici, Licei.

Coniogeton Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1156: nov. g. Terebintacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1617.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 65: g. Anacardicar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5693. — Walp. 1842. Rep. I. p. 556.
Meisn. 1837. Gen. p. 75 (55): g. Cassuviear.?
Endl. 1840. Gen. p. 1134; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiaccar. — Par. Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 246 (*Coniochiton*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 183.

Coniogramme Fée 1852. Gen. Filic. p. 167: nov. g. Hemionitidear. (Gymnogramme serrulata Bl., etc.)

Conioloma Flörke Lich. Germ. II. p. 3: nov. g. Lichenum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 267.
Mart. 1817. Erlang. p. 284: g. Lichenum difformium.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ak. Handl. II. p. 323: g. Variolariar.

Conioloma Flörke cont.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 19. f. 28: g. Trypetheliacear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 271: g. Glyphidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 390. — Genth 1836. Nass. I. p. 387.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 185: g. Hymenocarpor.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: g. Graphidear.
= Coniocarpon DC.?

Coniomorpha Endl. Gen. p. 973; Ench. p. 506 et Suppl. III. p. 93: vid. *Conoïmorpha Otth.*

*Coniomycetes**) Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 308: ordo 10 Cryptogamiae. Sect.: *elementares* (gen.: Xyloma, Cacoma, Puccinia, Podisoma; Fusidium, Stilbospora, Seiridium, Illosporium), *suffulti* (gen.: Aegerita, Fusarium; Melanconium, Epicoccum, Didymosporium, Exosporium; Tubercularia, Calycium, Gymnosporangium).
Fries 1821. Syst. myc. I. p. xxxvii: class. Fungor. Ordines: Entophytae, Sporodesmia, Coniosporia, Tuberculariae. — Par. Fries 1832. Syst. III. 2. p. 455. Ordines: Tubercularini, Stilbosporei, Sporodesmiei, Hypodermii.
Agdh. 1821. Aphor. p. 78; 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 583: div. Fungor. Gen.: Cocoma, Spilocea, Phragmidium, Podisoma, Melanconium, Fusidium, Stilbospora, Nemaspora, Seiridium, Sporodesmium, Exosporium, Conisporium, Bactridium, Prosthemium, Sclerococcum, Aegerita, Fusarium, Atractium, Tubercularia.
Fries 1825. Pl. homon. p. 164: cohors Sporomycetum. Ordines: Tubercularini, Mucorini, Mucedines, Entophyti.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 382; 1831. Gen. II. p. 784: ordo Mycetum. Sect. A. *Suffulti.* Gen. (1827): Cronartium, Gymnosporangium, Exosporium, Didymosporium, Epicoccum, Tubercularia, Melanconium, Fusarium. (Gen. 1831 ead. [excluso Cronartio] et Phragmotrichum, Coryneum, Dermosporium, Aegerita, Atractium, Pyrenium, Chaetostroma.) B. *liberi.* Gen. 1827: Puccinia, Siridium, Cylindrospora, Fusidium, Stilbospora, Uredo, Achitonium (1831 gen.: Accidium, Sporidesmium, Siridium, Cryptosporium, Fusidium, Stilbospora, Uredo).
Bartl. 1830. Ord. p. 6: ordo Fungor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 1. Fam.: Praeformativi, Uredinei, Tubercularii. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 1; 1842. Mycol. p. LII. 1. Fam.: Byssini, Caeomaceae, Phragmidiaceae, Torulaceae, Septonemeae. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 1. Fam. ut Rchb. — Bonord. 1851. Hdb. p. 31. Fam.: Protomycetes, Caeomacei, Phragmidiacei.
Fries 1836. Epicr. p. 1: fam. sexta Fungor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 12: ordo Fungalium. (*Synon. Uredinaceae.*) Subord.: Sphaeronemei, Melanconiei, Phragmotrichacei, Torulacei, Pucciniaei, Caeomacei.

*) κονία, pulvis; μύκης, fungus.

Coniomycetes Martius cont.
Lenn. 1849. Schul-Naturg. II. p. 221: fam. (175) Funginar.
Fries 1849. Summ. Veg. Scand. II. p. 486: series altera Haplomycetum. Ordines: Dematiacei, Sporidesmiacei, Hypodermii.
Bail 1858. Syst. Pilz. p. 6: ordo Basidiosporear. Fam.: Aecidiaceae, etc.
= Gymnomycetes Link, Endl.

Coniomyci Nees 1817. Syst. Ueberbl. p. 1: circulus I Protomycor. Gen.: Caeoma, Puccinia, Podisoma; Fusidium, Stilbospora, Sporidermium, Sciridium.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 8: ordo 1 Fungor.

Coniopagae (*Koniopagen*) Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 292: ordo Orchidear. Gen.: Limodorum, Pogonia, Corysanthes, Genoplesium, Vanilla, Lyperanthus; Listeria, Thelymitra, Diuris, Epiblema, Cryptostylis, Cranichis, Prasophyllum, Neottia, Caladenia, Microtis, Acianthus, Glossodia, Chiloglottis, Pterostylis, Caleya, Lepanthes.
Agdh. 1823. Aphor. p. 189: div. Orchidear. Gen. §. 1: Limodorum, Corysanthes, Vanilla, Lyperanthus. §. 2: Thelymitra, Diuris, Orthoceras, Epiblema, Cryptostylis, Cranichis, Prasophyllum, Neottia, Calochilus, Caladenia, Microtis, Acianthus, Cyrtostylis, Glossodia, Chiloglottis, Pterostylis, Caleana, Lepanthes. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125. Gen. ead. et in §. 1 Myrobrama, in §. 2 Genoplesium, Ponthieva, Goodyera.

Coniophora DC. 1815. Fl. franç. V. p. 34: nov. g. Gymnocarpor. (C. membranacea.) *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 10. p. 278.
= Merulius Hall. (Fries.)

Coniophora Pers. 1822. Mycol. I. p. 153: g. Thelephoreor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 82: g. Papillariar.
Fries 1825. Pl. homon. p. 83: g. Auricularinor. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 41; 1842. Mycol. p. 174.
Fries 1828. Elench. I. p. 193: subtrib. Thelephorae.
Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 326: g. Auricularior.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 312: g. Hyphomycetum synsporor.
Endl. 1836. Gen. n. 437 *d.* p. 38; 1841. Ench. p. 21: sect. Thelephorae.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 335: subg. Corticii.
Math. 1853. Belg. II. p. 320: g. Auricularinear.
Synon. Tomentella Pers.; Athelia Pers.; Auriculariae sp. Sow.

Coniophoreae Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 10: series Lichenacear. Tribus: Calicioideae, Sphaerophoreae. *Cf.* Flora 1854. p. 233.

Coniophorus „Palis.“ Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 124: g. Trichomatar. (Dematii et Byssi sp.) *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 10. p. 278.

Coniopsidei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: trib. Ectoclinor. Sect.: Uredinei, Ustilaginei, Phragmidiei.

Coniopsorae Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 13: ordo Lichenum. Fam.: Leprariaceae, Variolariaceae, Arthoniaceae.

Coniopteris Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 75: g. foss. Filicum. (Pecopteris §. 6 Sphenopteroides et Sphenopteridis sp.)

Coniorchideae Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 55; 1844. Fl. sax. p. 82: subtrib. Orchidear. Divis.: Neottieae, Arethuseae, Vanillaceae.

Conioselinum „Fisch. mss.“ Hoffm. 1816. Umbellif. ed. II. p. 185. tit. f. 5: nov. g. Umbelliferar. (C. tataricum.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Wimm. & Grab. 1828. Flora p. 215.
Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3721: g. Amminear. genuinar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 163: g. Seselinear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 321. — Koch 1836. Syn. p. 299. Ed. II. p. 329. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5441. — Meisn. 1838. Gen. p. 145 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4448. p. 777; 1841. Ench. p. 379. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 619. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 290. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 184.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 461: sect. Selini. (S. Gmelini Bray.)
Tausch 1834. Flora I. p. 347: g. Peucedanear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 135.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Coniosporia Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XL: ordo Coniomycetum. Gen.: Conisporium, Bactridium, Prosthemium, Sclerococcum.

Coniosporium Fries 1825. Pl. homon. p. 156: g. Apiosporior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 8. n. 155.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 256: g. Apiosporiar.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 773. n. 3972: g. Atrichor.
Endl. 1836. Gen. n. 273. p. 23; 1841. Ench. p. 16: g. Apiosporeor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 304. (genuinor.)
Rchb. 1841. Nom. p. 1. n. 7: g. Uredineor. genuinor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 14.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Math. 1853. Belg. II. p. 408: g. Sclerotiear.
= Conisporium Link.

Coniosporum Wittst. vid. *Conisporium Link.*

Coniothalamae Wahlenb. 1826. Fl. suec. II. p. 795: div. Algar. terrestrium. Gen.: Variolaria, Byssus.

Coniothalameae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: div. Lichenalium. Trib.: Pulveraridae, Calycidae.

Coniothalami Fries 1821. Kongl. Vet. Ak. Handl. II. p. 321: ordo Lichenum. Series: Leprariae, Variolariae. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 275. Gen. (*genuina*):

Coniothalami Fries cont.
Coniocybe, Calicium, Trachylia, Coniocarpon? *Status deformati*: Isidium, Variolaria, Arthonia, Naevia, Inciliaria, Arthonaria. — Bartl. 1830. Ord. p. 8. — Endl. 1836. Gen. p. 11; 1841. Ench. p. 9. Subord.: Pulveraricae, Calycieae.
Synon. Hyphopsorae Rchb.

Coniothecium Corda 1836 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 71. t. 36: nov. g. Fungor. (C. atrum.)
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 2; 1842. V. p. 3; 1842. Mycol. p. 12: g. Caeomacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 101.
Rchb. 1841. Nom. p. 1. n. 8: g. Uredineor. genuinor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 14.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Torulaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 42: g. Caeomaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 424: g. Stilbosporear.

Coniothele*) DC. 1836. Prodr. V. p. 531: nov. g. Parthenicar. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2487. p. 404; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3039. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 184.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18: g. Coreopsidear.

Coniothyrium Corda 1840. Icon. Fung. IV. p. 38. t. 8. f. 105—108: nov. g. Pyrenomycetum.
Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 265: g. Cytisporeor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 143.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 30; 1842. Mycol. p. 123: g. Sphaeronemear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Sphaeronemeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Actinothyrieor.

Conisporium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 8: g. Epiphytar. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 10. p. 279.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 31: g. Mucedinum Conisporar.
Nees 1817. Ueberbl. p. 6: g. Goniomycor. liberor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: g. Pulverariar.
Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XL: g. Coniosporior.
Agdh. 1821. Aphor. p. 79: g. Coniomycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 525: g. Bactridiear.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 1; 1842. V. p. 3; 1842. Mycol. p. 11: g. Caeomacear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.?
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 222 (*Coniosporum*): g. Lycoperdacear.
Synon. Coniosporium Fries.

*) κονία, pulvis; θηλή, papilla.

Conites Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXXIX: g. Dicotyledonum foss.
= Bucklandia Brongn. et Pitys Endl.

Conites Münst. . . . . Beitr. V. p. 106: g. foss. Coniferar. dubiae affinitatis. (Unger Syn. pl. foss. p. 212.)

Conium*) Linn. 1737. Gen. p. 73. n. 209; 1737. Cliff. p. 92; 1740. Syst. p. 20; 1753. Sp. I. p. 243; 1759. Syst. ed. X. p. 956. n. 299; 1762. Sp. ed. II. p. 349; 1764. Gen. ed. VI. p. 132. n. 336; 1767. Syst. ed. XII. p. 206. n. 333: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 229; 1784. Syst. p. 278. — Reich. 1778. Gen. p. 137. n. 367. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 183. n. 469. — Gmel. 1791. Syst. p. 475. — Pers. 1797. Syst. p. 294. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1395. n. 533; 1809. En. p. 305. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 202.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 53. n. 212: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 95.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 94. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 308. n. 685. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 180. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 167. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 22. 408.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Umbelliferar. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 206; 1777. Intr. p. 114. — Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 99. (Sejungitur Krubera.) — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 103. (divis. 1.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 513. — Link 1821. En. I. p. 267. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 14. — Kunth 1824. Syn. III. p. 97. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Neck. 1790. El. I. p. 176. n. 294: g. Scadiophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 640; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLV. 545; 1825. Syst. I. p. 907. n. 1079; 1830. Gen. I. p. 226. n. 1180: g. Amminar.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 135; 1836. Syn. p. 319. Ed. II. p. 351: g. Smyrnear. — Par. Ledeb. 1829. Alt. I. p. 362; 1845. Ross. II. p. 359. — DC. 1830. Pr. IV. p. 242. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 376. — Kunth 1838. Berol. I. p. 288. — Endl. 1839. Gen. n. 4532. p. 790; 1841. Ench. p. 380. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 987. — Brongn. 1843. En. genr. p. 114. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 750.
Bluff & Fingerh. 1825. Comp. I. p. 408: g. Smyrniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3743; 1832. Fl. exc. p. 441; 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5351. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 460. — Parlat. . . . . in Webb & Berth. Canar. II. p. 169. — G. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 185.

*) Nomen Cicutae apud Theophrastum et Dioscoridem. Conf. Ht. Cliff.

Conium Linn. cont.
Link 1829. Hdb. I. p. 338: g. Amminear. Par. Tausch 1834. Flora I. p. 354. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 179.
Meisn. 1838. Gen. p. 150 (108): g. Cachrydear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 370: g. Pleurospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 15: g. Eusmyrnear.
Synon. Cicuta Tourn.

Conium Desfont. 1798. Fl. atlant. t. 66.
= Krubera Hoffm.

Coniza Vaillant vid. *Conyza Tourn.*

Conizaea Achar. 1810. Lich. univ. p. 293: sect. Verrucariae. (V. farrea Ach.)

Conjugata Vauch. 1803. Conferv. p. 37.
Mart. 1817. Erlang. p. 292: g. Algar. vegetantium.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 297: g. Conjugatidear.
Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 194: g. Confervear.
= Spirogyra Link, Zygnema Agdh. et Mougeotia Agdh.

Conjugata Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 5: g. Confervar. (Confervae sect. 3 Vauch.)
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 466 *c*: sect. Zygnemae.
= Mougeotia Agdh.

Conjugatae Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 190: subordo Algar. Gen.: Spirogyra, Zygnema, Mougeotia, Sphaeroplea.
Rudolphi 1829. Flora I. p. 366 (*Conj.* s. *Zygnemateae*): sect. Confervoidear. Gen.: Mougeotia, Spirogyra, Zygnema, Hydrodictyon.
Bory . . . . trib. Arthrodiear. Gen.: Leda, Tendaridea, Salmacis, Zygnema. (Brébiss.)

Conjugateae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71: fam. Granuliniae. Gen.: Zygnema.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . . : trib. Algar. filiformium. Gen.: Zygnema, Tyndaridea, Mesocarpus, Mougeotia, Zygogonium, Staurocarpus.

Conjugatideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 296: div. Hydrophytar. Gen.: Zygnema, Conjugata, Choaspis, Agardhia, Serpentinaria.

Connaraceae R. Brown 1818. Narr. exp. Cong. App. V. p. 431 (Verm. bot. Schr. I. p. 201): ordo plant., a Terebinthaceis sejunctus. Gen.: Connarus, Cnestis, Rourea.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 359 (Gen. Tereb. p. 27): fam. Terebinthacear. Gen. ead. *Affinia*: Brunellia, Brucea?
DC. 1825. Pr. II. p. 84: trib. Terebinthacear. Gen.: Connarus, Omphalobium, Eurycoma, Cnestis, Brunellia, Brucea, Tetradium, Ailantus. *Cf.* DC. 1826. Mém. soc. h. n. Par. II. 2. p. 380. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 78 (56). Gen.: Connarus, Omphalobium, Cnestis, Deinbollia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLV: div. Terebinthacear. Gen. ut DC. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 146. Gen. ut R. Brown et Eurycoma?, Tetradium.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (110) Thalamiflorar. apocarpar.
Bartl. 1830. Ord. p. 394: ordo (234) Terebinthinar. Gen.: Connarus, Omphalobium, Eurycoma, Cnestis; Tetradium?
Link 1831. Hdb. II. p. 129: ordo 38 Perigynar. Gen.: Brucea, Ailantus.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 89: ordo Calyciflorar. Gen. ut Bartl. *Affine*: Tapiria.
Lindl. 1833. Nix. p. 22: ordo Rosalium.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 227: fam. (13) Terebinthinear. Gen. ut Bartl. (excepta Cnestide).
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 157) 1847. Veg. kd. p. 468: ordo Rutalium. Gen. ut Endl.
Endl. 1840. Gen. p. 1139; 1841. Ench. p. 604: ordo Terebinthinear. Gen.: Connarus, Omphalobium, Cnestis; Thysanus?, Eurycoma?
Brongn. 1843. En. genr. p. 84: g. Therebinthinear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 186: fam. Dicotyledonum polypetalar. Gen.: Connarus, Omphalobium, Cnestis.
Benth. 1849 in Hook. Niger Fl. p. 288. Gen. ut R. Br.
Planch. 1850. Linnaea XXIII. p. 411. (Monogr.) Tribus: Connareae, Cnestideae.

Connareae Rchb. 1837. Handb. p. 227: div. Terebinthacear. Gen.: Connarus, Rourea, Eurycoma, Cnestis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 145. Gen.: Connarus, Omphalobium; Thysanus?, Eurycoma?; Surianeae; Cneoreae.

Connareae Planchon 1850. Linnaea XXIII. p. 411: trib. Connaracear. Gen.: Byrsocarpus, Bernardinia, Rourea, Roureopsis, Connarus, Agelaea. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 294. Gen. ead. et Tricholobus.

Connarus*) Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 133: nov. g. plant.
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 112. n. 248 (Nov. gen. zeyl. p. 12. n. 1063); 1753. Sp. II. p. 675; 1759. Syst. ed. X. p. 1141. n. 744; 1763. Sp. ed. II. p. 944; 1764. Gen. ed. VI. p. 349. n. 830; 1767. Syst. ed. XII. p. 452: g. Monadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 510; 1784. Syst. p. 612. — Reich. 1778. Gen. p. 349. n. 895. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 457. n. 1116. — Gmel. 1791. Syst. p. 1014. — Pers. 1797. Syst. p. 650; 1807. Ench. II. p. 237. n. 1607. — Willd. 1800. Sp. III. p. 691. n. 1268. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 78. n. 2407. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 139.
Gled. 1764. Syst. p. 138. n. 580: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 290: g. Columniferar.
Cavan. 1789. Diss. VII. p. 375. t. 221—222.

*) Nomen arboris apud Athenaeum.

Connarus Linn cont.
Juss. 1789. Gen. p. 369: g. Terebintacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 250. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 282. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 654. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1166.
Neck. 1790. El. II. p. 427. n. 1252: g. Comizophytor.
Thunb. 1796 in Röm. Arch. I. 1. p. 1.
Batsch 1802. Tab. p. 66: g. Terebinthinacear.
R. Brown 1818. Narr. exp. Cong. App. V. p. 431 (Verm. bot. Schr. I. p. 201): g. Connaracear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 84; 1826. Mém. soc. h. n. Par. II. 2. p. 383. — Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3826. — Bartl. 1830. Ord. p. 395. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 89. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 143. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 228. — Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 157; 1847. Veg. kd. p. 468. — Meisn. 1837. Gen. p. 78 (56). — Endl. 1840. Gen. n. 5948. p. 1139; 1841. Ench. p. 604. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1617. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 186. — Benth. 1849 in Hook. Niger Fl. p. 288. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 17. p. 264. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 451.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 547. n. 2682: g. Terebinthear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 224; 1841. Nom. p. 145. n. 5622: g. Connarear. — Par. Planch. 1850. Linnaea XXIII. p. 424. Distinguitur Rourea. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 300.
Synon. Kalawaël Adans.; Anisostemon Turcz.

Connarus Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 360 (Gen. Tereb. p. 28): g. Connaracear. — Par. HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 40 adnot.
= Omphalobium Gärtn.

Conobaea Bert. in sched. herb. chil. ex Steud. Nomencl. I. p. 390. 404.
= Coccoloba Linn.

Conobea Aublet 1775. Guian. II. p. 639. t. 258: nov. g. Didynam. Angiosperm. (C. aquatica.) — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 420. n. 1042 (*Conopea*). — Gmel. 1791. Syst. p. 936. — Willd. 1800. Sp. III. p. 344. n. 1182. — Pers. 1807. Ench. II. p. 168. n. 1500.
Scop. 1777. Intr. p. 172: g. Personatar. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 285. — Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 43.
Juss. 1789. Gen. p. 97: g. Lysimachiis aff.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 224: g. Primulaceis aff.
A. St. Hil. 1815. Mém. Mus. II. p. 50; 1815. Bull. soc. philom. p. 18: g. Scrophularinear. — Par. Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7 (minus notum).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 397: g. Scrofularinar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 771. n. 2149; 1831. Gen. II. p. 485. n. 2392: g. Primulear.

Conobea Aublet cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3180: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111 (*Conobia*): g. Gratiolear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 552. — Meisn. 1840. Gen. p. 311 (222). — Walp. 1845. Rep. III. p. 298.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 390; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Eugratiolear. Sect.: Sphaerotheca, Leucospora.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 187: g. Lysimachiear.?
Synon. Blanckia Neck.; Leucospora Nutt.; Sphaerotheca Cham., Endl.

Conobia D. Don vid. *Conobea Aubl.*

Conocalyx Willkomm .... Ic. pl. Hisp. p. 74: subg. Silenes. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 277.
= Conoimorpha Otth.

Conocarpodendron „Boerh. Lugd. Bat. II. t. 196. 198" Endl. 1838. Gen. n. 2124 *a*. p. 338; 1841. Ench. p. 215: sect. Leucospermi. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 253.

Conocarpus Linn. 1737. Gen. p. 376. n. 929; 1737. Cliff. p. 485: nov. g. ex *Rudbeckia Houst.* format. *Cf.* Juss. 1824. Dict. v. 31. p. 461.
Linn. 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 176; 1759. Syst. ed. X. p. 930. n. 213; 1762. Sp. ed. II. p. 250; 1764. Gen. ed. VI. p. 94. n. 236; 1767. Syst. ed. XII. p. 167. n. 235: g. Pentandr. Monogyn. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 159. — Murr. 1774. Syst. p. 181; 1784. Syst. p. 217. — Reich. 1778. Gen. p. 97. n. 253. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 129. n. 321. — Gmel. 1791. Syst. p. 372. — Pers. 1797. Syst. p. 226; 1805. Ench. I. p. 211. n. 479. — Willd. 1797. Sp. I. p. 994. n. 366.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 49. n. 191: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Thymelear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 832. n. 951.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Aggregatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 528.
Scop. 1777. Intr. p. 100: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 75: g. Elaeagnor. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLIX. 573. n. 1057.
Neck. 1790. El. III. p. 113. n. 1446: g. Daphonophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 183: g. Elaeagnear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 286.
Cram. 1803. Disp. p. 110: in Decandr. Monogyn. — Par. Roxb. 1832. Ind. II. p. 442.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 177: g. Eleagnor. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 172. n. 721.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 351. Ed. Nees p. 207: g. Combretacear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 113. — Kunth 1824. Syn. III. p. 400. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 578. 879. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 484.

Conocarpus Linn. cont.
DC. 1828. Pr. III. p. 16: g. Terminaliear. Sect.: Euconocarpus, Leiocarpus (Leiocarpaea in Add.), Anogeissus. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4538. Sect. eaed. — Bartl. 1830. Ord. p. 323. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 661. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 315. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 303. — Meisn. 1838. Gen. p. 110 (79). — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 525. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 605.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 206. n. 1051: g. Combretear.
Synon. Rudbeckia Houst.; Rudbechia Adans.; Conocarpus et Anogeissus Endl.

Conocarpus Adans. 1763. Fam. II. p. 284: g. Thymelaear.
= Leucadendron Herm.

Conocarpus Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 470. t. 177.
Endl. 1840. Gen. n. 6081. p. 1181; 1841. Ench. p. 632: g. Terminaliear., disjuncto Anogeisso restrict. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 171. n. 6602. — Brongn. 1843. En. genr. p. 119. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 187.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718: g. Terminalear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 132: g. Myrobalanear.
Synon. Euconocarpus DC.

Conocephala Hassk. vid. *Conocephalus Blume.*

Conocephaleae Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 78: trib. Artocarpear. Gen.: Cecropia, Dicranostachys, Conocephalus, Coussapoa. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 797. Gen. ead. et Myrianthus? — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 650.

Conocephalum „Hill" Wiggers 1780. Prim. fl. Holsat. p. 82: g. Coleofissar. (Marchantia conica L.)
= seq.

Conocephalus Hill .... Syst. p. 119.
Neck. 1790. El. III. p. 344. n. 1759: g. Athrosophytor., a Marchantia L. sejunctum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 115; 1831. Syll. Jungerm. p. 7: g. Cephalothecear.
Hübener 1834. Hepat. germ. p. 9: g. Marchantiear. — Par. Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 971. 977. — Genth 1836. Nass. I. p. 57.
Endl. 1836. Gen. p. 44. n. 465: g. Marchantiacear. — Par. Pfeiff. 1855. Fl. Niederhess. II. p. 241.
Synon. Hepatica 1 Mich.; Conocephalum Wigg.; Anthoconum Palis.; Fegatella Raddi; Hepaticella Leman; Strozzius Gray pt.; Nemoursia Mérat?

Conocephalus Blume 1825. Bijdr. Nr. 9. p. 483: nov. g. Artocarpear. (Urtica naucleiflora Roxb.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1869. p. 281; 1841. Spl. I. p. 1375; 1841. Ench. p. 168. — Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 47. t. 12. — Meisn. 1842. Gen. p. 350 (261). — Brongn. 1843. En. genr. p. 99. — Hassk. 1844. Catal. Bogor. alt. p. 78 (*Conocephala*). — Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 43.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 109. n. 547: g. Urticear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 540 (*Corocephalus*).
Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2532: g. Brosimear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 38: g. Artocarpidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 271: g. Artocarpacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 188.
Tréc. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 87: g. Conocephalear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 654.

Conoclinium DC. 1836. Prodr. V. p. 135: nov. g. Adenostylear. (Eupatorium coelestinum, etc. L.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2275. p. 369; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1839. Gen. p. 181 (124). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 92. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3834. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 188.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37: g. Eupatoriear. verar.

Conoclinium Meisn. 1840. Linnaea XIV. p. 413; 1857 in DC. Prodr. XIV. 2. p. 577: sect. Lachnaeae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2441. 2. — Endl. 1842. Spl. II. p. 36. n. 2101 *b*; 1847. Spl. IV. p. 65. n. 2103 *B*.
= Stroboclinium Rchb.

Conodaphne Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 24. p. 376: sect. Tetrantherae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 944.

Conodiscus Hook. f. 1845. Antarct. voy. I. p. 30: subg. Helichrysi. An genus proprium? — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 241.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 137: sect. Gnaphalii.

Conogyne R. Brown 1830. Prodr. Suppl. p. 21 (Verm. bot. Schr. V. p. 97): sect. Grevilleae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2143 *e*. p. 341; 1841. Ench. p. 215. — Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2393. 5. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 549.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Grevillear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 83: subsect. Aphanopterae.
Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 385: subg. Grevilleae, includens Anadeniam R. Brown.

Conogyne „Less." Wittst. vid. *Coinogyne Less.*

Conohoria*) Aublet 1775. Guian. I. p. 239. t. 95: nov. g. Pentandr. Monogyn. (C. flavescens.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 396.
Scop. 1777. Intr. p. 279: g. Icosandrar.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. xxv. 324. n. 953: g. Berberidear.
DC. 1824. Pr. I. p. 312: g. Alsodinear. - -

*) Nomen caribaeum *Conohorié*.

Conohoria Aublet cont.
Par. Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4894. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 318. 340 (*Gonohoria*). — Meisn. 1837. Gen. p. 21 (18).
A. St. Hil. 1829. Fl. Bras. II. p. 148: g. Violacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 187. n. 945: g. Violear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 831.
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187. n. 7154: g. Conohoriear.
Synon. Passoura et Riana Aubl.; Conoria Juss.; Alsodeiae sp. Endl.

Conohoricae Rchb. 1837. Handb. p. 269; 1841. Nomencl. p. 187: sect. Alsodinear. genuinar. Gen.: Conohoria, Rinorea, Tachibota.

Conoïmorpha Otth 1824 in DC. Prodr. I. p. 371: sect. Silenes. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 401. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 813; 1841. Nom. p. 206. n. 7828. 2. — Endl. 1840. Gen. n. 5248 *c.* p. 973 (*Coniomorpha*); 1841. Ench. p. 506; 1843. Spl. III. p. 93. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 314 (*Coniomorpha*). — Boiss. 1842. Diagn. pl. or. I. p. 37 (*Conomorpha*). — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 171. — Walp. 1843. Rep. II. p. 778 (*Conomorphe*). — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 204.
Synon. Conocalyx Willk.

Conomitra Fenzl 1839. Nov. stirp. Mus. Vindob. dec. nr. 74: nov. g. Asclepiadear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 3447/1. p. 1397; 1841. Ench. p. 298: g. Metastelmear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4998. — Meisn. 1843. Comm. p. 366.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 188: g. Cynanchear.
= Glossonema Decne.

Conomitrion Schwägr. vid. *seq.*

Conomitrium*) Montagne 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VIII. p. 245: nov. g. Muscor. (Octodiceras Julianum Brid.) — Par. Schwägr. 1842. Suppl. IV. t. 313 (*Conomitrion*).
Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 977: g. Calyptrobryor.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 304: g. Fissidentear. — Par. C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 524. Sect.: Octodiceras, Reticularia, Sciarodium. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 63.
Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 188: g. Schistophyllear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: g. Drepanophyllear.

Conomorpha A. DC. 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 102; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 292; 1841. ibid. XVI. p. 78. 92; 1844. Prodr. VIII. p. 113: nov. g. Ardisiear. (Wallenia laxiflora Mart.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 8. — Endl. 1839. Gen. n. 4218. p. 735; 1841. Ench. p. 559. — Meisn. 1839. Gen. p. 253 (162). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 374. — Rchb. 1841. Nom. p. 124. n. 4853. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 189. — Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 301. Sect.: Conomorphida, Aconomorpha, Euconomorpha.
Synon. Conostylus Pohl.

Conomorpha Boiss. vid. *Conoimorpha Otth.*

Conomorphe Walp. vid. *praeced.*

Conomorphida Miquel (Stirp. sur. sel. 111) 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 302: sect. Conomorphae.

Conopea Schreb. vid. *Conobea Aubl.*

Conophallus Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 34: nov. g. Pythoniear. (Amorphophallus giganteus Blume.) — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 198. Sect.: veri, Eumorphophallus.
= Adenophallus Kunth.

Conopharyngia*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 94: nov. g. Tabernaemontanear. (Plumeria retusa Lam.) — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 377. (?)
Endl. 1841. Spl. I. n. 3398/1. p. 1396; 1841. Ench. p. 294: g. Plumeriear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 365.
Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5174: g. Vincear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.?

Conopholis**) Wallroth 1825. Orobanch. p. 78: nov. g. ex typo Orobanches americanae L.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 b. n. 3054 b: g. Orobanchear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4184. p. 726; 1841. Ench. p. 353. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 261. — Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4663. (genuinar.)
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 628. 634 (*Canopholis*): g. Orobanchiear.
Meisn. 1840. Gen. p. 314 (225): g. Euorobanchear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 611: g. Orobanchaceear. — Par. Reut. 1847 in DC. Pr. XI. p. 14. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 189.

Conophora DC. 1837. Prodr. VI. p. 329: sect. Cacaliae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2806 *b.* p. 458; 1841. Ench. p. 244. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 434. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3360. 2.
Synon. Cacalia Nutt.; Mesadenia Rafin.

Conophorus Petiv. 1703. Gazophyl. III. n. 458. t. 25. f. 7.
= Aulax Berg. (Meisn.)

Conoplea Pers. 1797. Tent. disp. p. 55: g. Dermatocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. xv. 234: g. Gymnospermor.
DC. 1805. Franç. II. p. 73: g. Gymnocarpor. — Par. Leman 1818. Dict. v. 10. p. 289.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 32: g. Mucedinum Sphaerobasium.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11. 23: g. Parasporior.

*) κῶνος et μίτριον; ob formam calyptrae conicam.

*) κῶνος, conus; φάρυγξ, gula.
**) φολίς, squama.

Conoplea Pers. cont.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 10: g. Trichomycor. Sect.: Blepharia, Conopleae verae.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 540: g. Chloridicar.
Fries 1825. Pl. homon. p. 187: g. Sporomycor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 106.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 490: g. Sporodesmicor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 243: g. Sporomycetum perisporor.
Endl. 1836. Gen. n. 192. p. 17; 1841. Ench. p. 13: g. Sporodermeor.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 42: g. Torulaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 39. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 475: g. Coryneaceor.

Conoplea Link 1824. Spec. I. p. 46: g. Hyphomycetum restrict. (C. hispidula Pers.)
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Conopleacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 554. n. 3560; 1831. Gen. II. p. 780. n. 4029: g. Byssoideor.
Math. 1853. Belg. II. p. 467: g. Chloridear.
= Dematii Pers. pars.

Conopleaceae Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 166: fam. Mucedinum. Gen.: Acrothamnium, Colletosporium, Gonytrichum, Menispora, Circinotrichum, Helicotrichum, Scolicotrichum; Chloridium, Cladosporium, Oedemium, Myxotrichum, Campsotrichum, Actinocladium, Conoplea, Coelosporium, Myxosporium, Helicosporium, Arthrinium, Helminthosporium; Phycomyces; Spondylocladium; Dematium.

Conopodium Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 118: nov. g. Amminear. (Sison canadense L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3737. — Tausch 1834. Flora I. p. 355.
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar.
= Conopodium et Cryptotaenia DC.

Conopodium DC. 1829. Coll. Mém. V. p. 41; 1830. Prodr. IV. p. 117: sect. Bunii, an gen. proprium? — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 290. — Endl. 1839. Gen. n. 4407 *c.* p. 771; 1841. Ench. p. 378. — Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5394. 3. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 344.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 742: g. Scandicinear.
Synon. Conopodii sect. 1 Koch.

Conopsidium Wallroth 1840. Linnaea XIV. p. 147; 1842. Beitr. z. Bot. I. p. 79 (Monogr.): novum nomen pro Platantherae speciebus propositum.
= Platanthera Rich.

Conopterides Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 5: ordo 2 Filicum. Gen.: Equisetum.
= Equisetaceae DC.

Conoria Juss. 1789. Gen. p. 287: g. Berberidum.
Batsch 1802. Tab. p. 114: g. Berberinar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 86: g. Berberidear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 157. n. 670.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 386. t. 491: g. Alsodinar. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 305.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 523: g. Alsodinear. (Alsodeiam, etc. complectens.)
= Conohoria Aubl.

Conosiphon Pöppig & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 27. t. 233: nov. g. plant. (C. aureus.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 54. n. 3306/1: g. Eugardenicar.
Meisn. 1843. Comm. p. 360: g. Gardenicar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Synon. Sphinctanthus Benth.; Genipae sp. DC.

Conospermeae Endl. 1838. Gen. p. 338; 1841. Ench. p. 215: trib. Proteacear. Nucamentacear. Gen.: Synaphaea, Conospermum, Stirlingia. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 401. Gen. ead. et Chilurus, Isomerium. — Meisn. 1841. Gen. p. 332 (244); 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 314. Gen. ut Endl. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565. Gen.: Synaphaea, Conospermum, Simsia.
Rchb. 1841. Nom. p. 64: subdiv. Persoonicar. Gen. ut Endl.

Conospermidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 533: trib. Proteacear. Nucamentacear. Gen. Conospermear. Endl.

Conospermum Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 213: nov. g. Protear. *Cf.* Nöhden 1800 in Schrad. Journ. I. p. 260.
Pers. 1805. Ench. I. p. 116. n. 215: g. Tetrandr. Monogyn.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 479: g. Thymelaear.
Hedw. 1806. Gen. p. 71. n. 341: g. Proteacear. — Par. R. Brown 1809 in Linn. Trans. X. (1811) p. 153 (Verm. bot. Schr. II. p. 244); 1810. Prodr. I. p. 368. Ed. Nees p. 224. Sect.: Conospermum, Chilurus. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 292. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 24. 406. n. 545. Sect. ut R. Br. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 474. n. 517; 1830. Gen. I. p. 105. n. 527. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Endl. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 207. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 525. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 518. (II. p. 248.) Sect. ut Endl.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 334: g. Ceclismenar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1733: g. Synaphecar.
Endl. 1838. Gen. n. 2132. p. 339; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 80: g. Conospermear. Sect.: Euconospermum, Chilurus, Isomerium. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2408. Sect. eaed. — Meisn. 1841. Gen. p. 332 (445); 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 316. Sect. eaed. — Lemaire 1849 in Orb. Dict. IV. p. 192.
Lindl. 147. Veg. kd. p. 533: g. Conospermidar.

Conospermum R. Brown 1810. Prodr. I. p. 368. Ed. Nees p. 224: sect. Conospermi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2408. 1.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 401: g. Conospermear. restrict.
= Euconospermum Endl.

Conosporae Meyer 1836. Chlor. hann. p. 665: cohors Cryptogamar. vascularium. Unica fam.: Equisetaceae.

Conostegia*) D. Don 1823. Mem. Wern. Soc. IV. 2. p. 316: nov. g. Melastomaceear. (Melastoma glabra Forst., etc.)
DC. 1828. Pr. III. p. 173: g. Miconiear. Sect.: Eriostegia, Euconostegia. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 785. Sect. eaed. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 206. — Meisn. 1838. Gen. p. 112 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6248. p. 1219; 1841. Ench. p. 647. Sect. eaed. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1460. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6757. Sect. sim. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 192.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4634: g. Blakeaceear. Sect. ut DC.
Bartl. 1830. Ord. p. 330: g. Melastomear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 340. n. 1719.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 557: g. Miconiar.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 105: g. Clidemiear. Excluditur sect. Eriostegia. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 702.
Synon. Calycotomus et Bruguiera Rich.; Melastomata calyptrata Bonpl.

Conostemum „Nees" Steud. Nomencl. I. p. 405: err. pro *Comostemum Nees.*

Conostephium Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 76: nov. g. Epacridear. (C. pendulum.)
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 739: g. Styphelicar. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4266. p. 746; 1841. Ench. p. 367. — Meisn. 1839. Gen. p. 248 (157). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 433. — Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4801. — Sonder 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 303. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 192.

Conostomea Rchb. 1828. Consp. p. 36: sect. Bartramiaceor. Gen.: Bartramia, Philonotis, Glyphocarpa, Cryptopodium, Plagiopus, Conostomum, Timmia.

Conostomum Swartz 1806 in Schrad. n. Journ. I. 3. p. 24: nov. g. Muscor. (Bryum tetragonum Dicks.) — Par. Leman 1818. Dict. v. 10. p. 294. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 719. — Agdh. 1822. Aphor. p. 107. — Schwägr. 1824. Suppl. II. vol. I. 2. p. 108. — Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 221. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 163. n. 3311; 1831. Gen. II. p. 730. n. 3704. (frondosor.)
„Swartz mss." Brid. 1806. Musc. rec. Suppl. I. p. 127: g. Aploperistomator.

*) κῶνος, conus; στέγη, tectum: a forma singulari calyc.

Conostomum Swartz cont.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 36: g. Mitrocarpor.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 27: g. Peristomor. acrocarpor.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 762: g. Bryoideor.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 150: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLV: g. Mnioideis aff.) — Par. Nees & Hornsch. 1827. Bryol. germ. II. 1. p. 20.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 272: g. Bryoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 659: g. Conostomeor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Bartramioidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 157: g. Aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 554. p. 53; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 932: g. Calyptrobryor.
Mont. 1842 in Orb. Dict. II. p. 481; 1849. ibid. IV. p. 192; 1849. ibid. VIII. p. 400: g. Bartramiear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 89.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 469: g. Bartramiacear. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 87.
Bruch., Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47: subg. Bartramiae.
Synon. Grimmiae sp. Smith.

Conostyleae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 153: trib. Haemodoracear. Gen.: Dilatris, Lachnanthes, Lanaria, Anigosanthus, Androstemma, Conostylis, Blancoa, Aletris, Tribonanthes.

Conostylis R. Brown 1810. Prodr. I. p. 300. Ed. Nees p. 156: nov. g. Haemodoracear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 43. — A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 80. — Endl. 1837. Gen. n. 1258. p. 172; 1841. Ench. p. 100; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 16. — Lindl. 1839. Swan-River p. XLIV. t. 6. f. A. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1198. — Brongn. 1843. En. genr. p. 23. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 109.
Elliott 1817. Sketch I. p. 402: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 217.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 240; 1825. Syst. II. p. 26. n. 1174; 1830. Gen. I. p. 279. n. 1447: g. Haemodorear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 171. — Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1221. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXIII. 293.
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 294: g. Iridear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Dilatridear.
Herb. 1837. Amaryll. p. 66. 87: g. Lanariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1661. — Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 153: g. Conostylear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 192: g. Aletridear.

Conostylium Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 161: sect. Ribis. (R. petraeum et multiflorum.)

Conostylus Pohl mss.
= Conomorpha A. DC.

Conothamnus Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. IX: nov. g. Myrtacear. polyadelphar. (C. trinervis.)
Endl. 1840. Gen. n. 6297. p. 1228; 1841. Ench. p. 650: g. Leptospermear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 737. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 193.
Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6815: g. Melaleucear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 354. — Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 147.
Schauer 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 6: g. Calothamnear.

Conotrema Tuckerm. 1847. Syn. Lich. p. ...: nov. g. ex typo Lecideae urceolatae Ach.

Conotrichia A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 277: nov. g. Cinchonear. (Nacibea alba Aubl.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 158 (113).
= Manettiae Mut. pars.

Conradia Rafin. 1825. Nov. gen. p. 3.
= Tofieldia Huds.

Conradia*) Martius 1829. Nov. gen. III. p. 38: nov. g. Gesnerear. (Gesnera humilis Plum., etc.) *Cf.* Flora Lit. I. p. 7. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672. — Regel 1848. Flora p. 246.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 650: g. Conradiear. Sect.: Synanthera, Dittanthera, Chorisanthera.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 525: g. Gesneriear. Sect. ut Don. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 258. — Meisn. 1840. Gen. p. 303 (213). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 575. — Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 358.
Endl. 1839. Gen. n. 4169. p. 722; 1841. Ench. p. 349: g. Eugesnerear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 194.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4676: g. Gloxiniear.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 205: g. Rhytidophyllear. (C. humilis Mart.)
Oersted 1858. Gesn. centroam. p. ...: g. Eurytidophyllear.
Synon. Pentaraphia Lindl.?; Gesnerae sp. Plum. etc.

Conradia Nuttall 1834. Journ. Ac. Philad. VII. p. 88.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111: g. Gerardiear.
= Macranthera Torr.

Conradieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 650: subtrib. Gesneriear. Gen.: Rytidophyllum, Conradia.

Conringia**) (Heist.?) Link 1822. Enum. II. p. 172: g. Tetradynam. Siliquos.
Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4812; 1832. Fl. exc. p. 686: g. Sisymbrear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323: g. Siliquosar. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 262.
Endl. 1839. Gen. n. 4908 *c.* p. 875; 1841. Ench. p. 450: sect. Erysimi. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 192. — Walp. 1842. Rep. I. p. 169. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 90.
Rchb. 1841. Nom. p. 182. n. 7028: g. Erysimear. Sect.: Thaliana, Conringia.
Conf. Couringia „Heist." Adans.; Coringia Pers., DC.; Gorinkia Presl; Crantzia Lag.

Consana Adans. 1763. Fam. II. p. 420: g. Lunariar.
= Draba muralis Linn. et Subularia Linn.

Consiligo*) DC. 1818. Syst. I. p. 224; 1824. Prodr. I. p. 24: sect. Adonidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4934 *b*; 1832. Fl. exc. p. 726. — C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 24 (*Consoligo*). — Koch 1836. Syn. p. 10. Ed. II. p. 11. — Endl. 1839. Gen. n. 4778 *b.* p. 846; 1841. Ench. p. 434. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 24 (*Consoligo*). — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 302 (*Consoligo*). — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 16.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 228: sect. Adonanthes (restricta).
Synon. Adonanthe Spach.

Consolida „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 8. Ed. Hall. 1745. p. 8: g. pl. class. I.
= Symphytum Tourn.

Consolida DC. 1818. Syst. I. p. 341; 1824. Prodr. I. p. 51: sect. Delphinii. — Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 455. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 50. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 735; 1841. Nom. p. 190. n. 7225. 2. — Koch 1836. Syn. p. 22. Ed. II. p. 24. — Endl. 1839. Gen. n. 4796 *a.* p. 849; 1841. Ench. p. 435. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 58. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 319.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 711: g. Helleborear.
Synon. Calcatrippa Matth., Rchb.; Delphinium et Aconitella Spach.

Consoligo G. Don Gen. syst. I. p. 24 („nomen a consolido?"), Ledeb., Griseb.: vid. *Consiligo DC.*

Constantinea**) Post. & Rupr. 1840. Illustr. Alg. p. 17: nov. g. Gastrocarpear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phyc. gener. p. 400: g. Gigartinear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 40. n. $122/_{13}$ *b*: sect. Kallymeniae.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Gasterocarpear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 173: g. Kallymeniear.
Rupr. 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 38: g. Rhodophycear.
= Neurocaulon Zanard.

Consuegria Caldas 1810. Sem. Nov. Gran.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 17: inter genera indescripta.

---

*) Dicat. Conrado Gesner.
**) Dicat. Herm. Conring, prof. quondam Helmstad.

*) Nomen a Dalechampio et Bauhino mutuatum.
**) Dicat. Magno Principi Constantino.

Contarea Rafin. vid. *Coutarea Aubl.*

Contarena Adans. 1763. Fam. II. p. 120: g. Tanacetor.
= Corymbium Linn.

Contarenia Vandell. 1788. Dicc.; 1796 in Röm. Script. p. 125. t. 7. f. 20: nov. g. Didynam. Angiosperm. *Cf.* Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 301.
„Vand. Fr. bras. t. 3. f. 20" St. Hil. 1805. Expos. II. p. 346 (*Contrarenia*): g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806 Gen. p. 375 (*Contrarenia*). — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 17. 294. n. 500.

Contarinia Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 45: nov. g. Algar., Peyssonelliae vicinum. (C. peyssonneliaeformis.)
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108: g. Peyssoneliear.
= Peyssonellia Decne? (Kütz. Sp. Alg. p. 694.)

Contarinia Endl. & Diesing 1845. Bot. Zeit. p. 289: nov. g. Cystoseirear.
J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 261 in adnot.: g. Fucacear.? (An = Carpophyllum Grev.?)
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 593. n. 406: g. Fucear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Synon. Oerstedtia Trevis.

Contortae Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 30 plant. Gen.: Genipa, Gardenia, Cerbera, Rauvolfia, Macrocnemum, Vinca, Nerium, Echites, Plumieria, Tabernaemontana, Cameraria, Periploca, Apocynum, Cynanchum, Ceropegia, Asclepias, Stapelia. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402. Gen. §. 1: Tabernaemontana, Cameraria, Plumeria, Echites, Nerium, Ceropegia, Vinca, Apocynum, Asclepias, Cynanchum, Periploca, Pergularia, Stapelia, Embothrium, Rhopala, Plectronia? §. 2: Allamanda, Macrocnemum, Manettia, Cinchona, Portlandia, Rondeletia, Hillia. §. 3: Genipa, Gardenia, Mussaenda (Randia), Fagraea, Carissa, Paederia, Arduina, Lycium, Cestrum, Gynopogon, Willughbeja, Melodinus. §. 4: Rauwolfia, Cerbera.
Scop. 1777. Intr. p. 153: trib. 12 plantar. Gentes: Monocarpiae, Dicarpiae.
Batsch 1802. Tab. p. 201: fam. Nudar. Gen.: Ochrosia, Tabernaemontana, Cameraria, Plumeria, Vinca; Nerium, Echites, Ceropegia, Pergularia, Cynanchum, Apocynum, Asclepias, Periploca, Stapelia; Willughbeja, Allamanda, Melodinus, Gynopogon, Rauwolfia, Ophioxylon, Cerbera, Carissa.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 479: fam. 49 plant. Ordines: Asclepiadeae, Apocyneae, Carisseae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI: fam. Stelliflorar. Divis.: Menyantheae, Gentianeae, Ophiorrhizeae, Jasmineae, Apocyneae, Carisseae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 132; 1831. Fl. exc. p. 419; 1837. Hdb. p. 209; 1841. Nom. p. 132. Divis.: Gentianeae, Apocyneae, Carisseae.
Bartl. 1830. Ord. p. 198: class. (36) Gymnoblastor. Ordines: Gentianeae, Asclepiadeae, Apocyneae, Loganieae.
Endl. 1838. Gen. p. 570; 1841. Ench. p. 284: class. Acramphibryor. gamopetalor. Ordines: Jasmineae, Bolivarieae, Oleaceae, Loganiaceae, Apocynaceae, Asclepiadeae, Gentianeae.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 479: class. (XXVI) Dicotyledoneor. monopetalor. Fam. ut Bartl.
Meisn. 1839. Gen. p. 257. 441 (166): class. 29 Diplochlamydear. Ordines: Roussaeaceae, Loganiaceae, Gentianaceae, Apocynaceae, Asclepiadeae.

Contorti Linn. 1751. Phil. Bot. p. 31: ordo 29 plant. Gen.: Rauwolfia, Tevetia, Cerbera, Plumiera, Tabernaemontana, Cameraria, Nerium, Vinca, Apocynum, Cynanchum, Ceropegia, Asclepias, Stapelia.

Contortuplicata Medic. (Vorles. II. p. 378) 1789. Phil. Bot. I. p. 207: nov. g. ex typo Astragali contortuplicati L.
= Astragalus Linn.

Contrarenia St. Hil., Hedw. vid. *Contarenia Vand.*

Conuleum „L. C. Rich." A. Rich. 1823. Mém. soc. h. n. Par. I. p. 391. t. 25: nov. g. Elaeagnear. (C. guianense.) — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 231. — Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1718; 1841. Nom. p. 64. n. 2422. — Bartl. 1830. Ord. p. 114. — Endl. 1838. Gen. n. 2114. p. 334; 1841. Ench. p. 212. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 454. — Meisn. 1841. Gen. p. 329 (242).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 257: g. Elaeagnacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 195. — Schltd. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 608.

Convallaria*) Linn. 1737. Gen. p. 96. n. 272; 1737. Cliff. p. 124; 1740. Syst. p. 21; 1753. Sp. I. p. 314; 1759. Syst. ed. X. p. 983. n. 383; 1762. Sp. ed. II. p. 451; 1764. Gen. ed. VI. p. 169. n. 425; 1767. Syst. ed. XII. p. 246. n. 421: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 250. — Murr. 1774. Syst. p. 275; 1784. Syst. p. 334. — Reich. 1778. Gen. p. 171. n. 459. — Roth 1788. Germ. I. p. 147 (disjuncto Maianthemo). — Schreb. 1789. Gen. I. p. 224. n. 575. — Gmel. 1791. Syst. p. 559. — Pers. 1797. Syst. p. 356; 1805 Ench. I. p. 372. n. 817. — Willd. 1799. Sp. II. p. 160. n. 649; 1809. En. p. 376. — Michx. 1803. Fl. amer. I. p. 201. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 467. 526.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 34: g. Lilior. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 205. Sect.: Convallaria, Polygonatum, Majanthemum. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 96. n. 1258; 1830. Gen. I. p. 262.

*) Levis mutatio nominis „*Lilium convallium*" aliorum. (Linn. Fl. lapp. p. 80.)

Convallaria Linn. cont.
n. 1364. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 566. Sect.: Convallium, Polygonatum. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 41. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1119.
Gled. 1764. Syst. p. 223. n. 927: g. Petalostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 331: g. Monopetalar. incompletar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 462: g. Liliatar.
Scop. 1777. Intr. p. 84: g. Liliacear.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 270. 277. 280. *Cf. Convallaria Adans.*, *Polygonatum Tourn.* et *Unifolium Dill.*
Juss. 1789. Gen. p. 42: g. Asparagor.
Neck. 1790. El. III. p. 189. n. 1550: g. Gonoophytor. Sejunguntur Evallaria et Tovaria.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 145: g. Asparagoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 136: g. Hyacinthinar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 104: g. Smilacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 236. n. 957. — Agdh. 1823. Aphor. p. 161. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 448. Sect.: Convallaria, Polygonatum. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXIV. 295. Sect. ut DC. 1805. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 401. Sect. ut Rchb. 1827.
DC. 1805. Franç. III. p. 175; 1815. V. p. 309: g. Asparagear. Sect.: Polygonatum, Lilium-Convallium. — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 46. — Koch 1837. Syn. p. 705. Ed. II. p. 814. Sect.: Polygonatum, Coelocrinon. — Kunth 1838. Berol. II. p. 267. Sect. ut Bluff & Fing. (Distinguitur Smilacina.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 225: g. Ruscinar.
Lois. 1824. Dict. v. 33. p. 286 (*Muguet*): g. Asparaginear.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 99: g. Convallarinar. Sect. ut 1827.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
= Convallaria Adans., Polygonatum Tourn. et Maianthemum Wigg.

Convallaria Adans. 1763. Fam. II. p. 54: g. Hyacinthor., disjunctis Unifolio et Polygonato restrict.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 59. t. 16. f. 6 (majalis).
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 118.
Desfont. 1807. Ann. Mus. IX. p. 46. Distinguuntur Polygonatum, Smilacina et Maianthemum.
Elliott 1817. Sketch I. p. 395: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 224.
Link 1821. En. I. p. 342: g. Asparaginar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 187: g. Smilacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1321.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 205: sect. Convallariae. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 448. — Kunth 1838. Berol. II. p. 268.
Link 1829. Hdb. I. p. 184: g. Convallariacear.

Convallaria Adans. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 53: g. Asparagear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Brongn. 1843. En. genr. p. 18. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 211. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. — Math. 1853. Belg. I. p. 534.
Endl. 1837. Gen. n. 1182. p. 154; 1841. Ench. p. 88: g. Convallariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1731. — Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 41; 1850. Enum. V. p. 130. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 126. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 229.
Synon. Lilium convallium Tourn.; Majanthemum Siegesb.?; Convallium Rchb.; Coelocrinon Koch; Polygonati sp. Hall.

Convallariaceae Link 1829. Handb. I. p. 184: subordo Liliacear. Gen.: Convallaria, Polygonatum, Maianthemum, Smilacina, Dianella, Streptopus.

Convallariae Rchb. 1837. Handb. p. 153: subdiv. Smilacinar.

Convallarieae Endl. 1837. Gen. p. 154: trib. Smilacear. Gen.: Drymophila, Streptopus, Polygonatum, Convallaria, Smilacina, Smilax, Ripogonum, Luzuriaga, Callixene, Ruscus. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1358 et Ench. p. 88) Prosartes. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 652. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 47: subdiv. Smilacinar. Gen. ut Endl. et Danaida; Herrerieae; Eriospermeae; Roxburghieae; Philesieae.
Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 40; 1850. Enum. V. p. 129: trib. Smilacinear. Gen.: Convallaria, Polygonatum, Majanthemum, Smilacina, Asteranthemum, Jocaste, Medora, Clintonia.

Convallarinae Rchb. 1830. Fl. exc. p. 99: div. Sarmentacear. Gen.: Convallaria, Streptopus.

Convallarites Brongn. 1828. Ann. sc. nat. XV. p. . . .; 1828. Dict. v. 57. p. 129; 1828. Prodr. p. 128: g. Liliacear. foss.
Endl. 1837. Gen. n. 1787. p. 257; 1841. Ench. p. 137: g. Acrobryor. foss., dubii ordinis.
= Schizoneura Schimp. & Moug.

Convallium Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. 566; 1830. Fl. exc. p. 100: sect. Convallariae. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 401.
= Convallaria Adans.

Convolvolus Beckm. vid. *Convolvulus Tourn.*

Convolvulaceae Vent. 1799. Tabl. II. p. 394: ordo 13 class. VIII. Gen. §. 1: Convolvulus, Ipomoea. §. 2: Evolvulus, Cressa. *Cf.* Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 257.
Batsch 1802. Tab. p. 210: fam. Patular. Gen.: Retzia, Convolvulus, Ipomoea, Endrachium.
DC. 1805. Franç. III. p. 639: fam. (48) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Convolvulus, Cressa, Cuscuta. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 880.

Convolvulaceae Vent. cont.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 481. Ed. Nees p. 337: ordo Dicotyledonum monopetalar. Nova gen.: Calystegia, Breweria, Polymeria, Wilsonia. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 196. Gen. Convolvulear. Endl.
Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 303: fam. Hypocorollear. Gen. §. 1: Argyreia, Maripa, Murucoa, Retzia, Endrachium, Convolvulus, Ipomaea, Polymeria, Calboa. §. 2: Evolvulus, Dichoandra, Nama, Erycibe, Porana, Cladostyles, Sagonea, Cressa, Falckia; Cuscuta?
DC. 1819. Théor. élém. p. 247: ordo Corolliflorar. — Par. Koch 1837. Syn. p. 493. Ed. II. p. 568. Trib.: *genuinae* (gen.: Convolvulus), Cuscutinae. — Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 325. Trib. ut 1833.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 343: fam. Corolliflorar. Sect.: Convolvuli, Cuscutae.
Agdh. 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 586: ordo Tubiflorar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 190. Gen.: Convolvulus, Calystegia, Ipomoea, Mouroucoa, Calboa, Breweria, Porana, Bonamia, Polymeria, Evolvulus, Cladostyles, Cressa, Endrachium, Menais, Argyreja, Cortesia, Diplocalymma, Prevostea, Wilsonia, Falkia, Dichondra. — Endl. 1839. Gen. p. 651; 1841. Ench. p. 322. Subord.: Dichondreae, Convolvuleae. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (181). Trib. ut Endl. et Argyreieae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. xxxvii: fam. Tubiferar. Gen.: Cressa, Dichondra, Falkia, Evolvulus; Convolvulus, Ipomoea. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 177; 1841. Nom. p. 113. Divis.: Polemoniariae (1841 Polemonieae), Hydroleeae, Convolvuleae.
Rchb. 1828. Consp. p. 119; 1831. Fl. exc. p. 347: fam. Tubiflorar. Divis.: Convolvuleae, Hydroleaceae, Polemoniaceae. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 92. Trib. ut Endl.
Link 1829. Hdb. I. p. 589: ordo (33) Hypanthar. Subord.: *genuinae* (gen.: Convolvulus, Ipomoea, Cressa), Cuscutinae, Cobaeaceae, Diapensiaceae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (199) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo Volvalium.
Choisy 1833. Mém. soc. Genève VI. p. 383: ordo plant. Sect.: Argyreieae, Convolvuleae, Dichondreae, Cuscuteae. *Cf.* Flora Lit. V. p. 122.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 231) 1847. Veg. kd. p. 630: ordo Solanalium. Trib.: Convolvuleae, Dichondreae.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 252: ordo Corollaeflorar. Trib. ut Choisy.
Walk.-Arn. 1837. Madras Journ. n. 14. p. 15. *Cf.* Linnaea 1838. Litt. p. 212.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 55: fam. Convolvulinear. Trib. eaed.

Convolvulastrum Griseb. 1844. Spicil. fl. Rumel. II. p. 74: sect. Convolvuli. (C. arvensis, althaeoides, tenuissimus, Cantabrica, lineatus.)

Convolvuleae Necker 1770. Act. Ac. Palat. II. p. 477: ordo plant. Gen.: Convolvulus.
Jaume St. Hil. 1805. Expos. fam. I. p. 306. t. 48: fam. plant. Gen. §. 1: Maripa, Murocoa, Retzia, Endrachium, Convolvulus, Ipomaea. §. 2: Evolvulus, Nama, Hydrolea, Dichondra, Sagonea, Cressa. §. 3: Cuscuta, Diapensia, Löselia.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 460: fam. 46 plant. Gen.: Convolvulus, Calystegia, Ipomoea, Macrostema, Maripa, Humbertia, Argyreia, Cladostyles, Breweria, Porana, Evolvulus, Polymeria, Cressa, Erycibe, Falkia, Dichondra; Ehretia, Cordia, Cortesia; Cuscuta; Retzia, Hydrolea, Reichelia, Löselia; Polemonieae.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: fam. Thalamitubiae.
Rchb. 1828. Consp. p. 119 (1831. Fl. exc. p. 348); 1837. Hdb. p. 194: div. Convolvulacear. Gen.: Dichondra, Falkia; Polymeria, Evolvulus; Cressa, Wilsonia, Prevostea, Neuropeltis, Lonchostoma, Sagonea, Cervia, Erycibe, Cortesia, Menais, Retzia, Humbertia, Breweria, Bonamia, Porana, Convolvulus, Calystegia, Diplocalymma?, Argyreia, Ipomea, Mouroucoa, Navarretia? (Excluduntur 1837 Lonchostoma et Sagonea.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 113. Subdivis.: Dichondreae, *genuinae* (gen. Convolvulear. Endl. 1841 et Ipomaea, Elytrostamna, Piptostegia, Exogonium, Dinetus, Erycibe).
Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 433: sect. Convolvulacear. Gen.: Quamoclit, Batatas, Pharbitis, Calonyction, Exogonium, Lepistemon, Ipomaea, Jacquemontia, Convolvulus, Aniseia, Polymeria, Calystegia, Shutereia, Skinneria, Porana, Neuropeltis, Prevostea, Breweria, Bonamia, Cressa, Evolvulus, Wilsonia?
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 258: trib. Convolvulacear. Gen. fere ut Choisy. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 274 (181). Gen. fere ead. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 94. Gen. fere ut Endl. et Cladostyles, Stylismus, Erycibe. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 55 Gen. ex Choisy et Cuscuta. — Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 335. Gen. ut antea et Mina, Duperreya, Seddera, Stylisma. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631. Gen. ut Endl. et Stylisma, Seddera, Neuropeltis, Skinneria, Rhodorhiza, Jacquemontia, Exogonium, Ipomoea, Mina, Legendrea, Marcellia.
Endl. 1839. Gen. p. 652; 1841. Ench. p. 323: subordo Convolvulacear. Gen. fere ut Choisy 1833 et Dufourea, Duperreya, Palmia, Rivea, Blinkworthia, Moorcroftia, Merremia? Accedunt 1842 (Spl. II. p. 59) Rhodorhiza et 1843 (Spl. III. p. 78) Mina.

Convolvuli B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 32 plant. Gen.: Convolvulus, Ipomaea, Evolvulus, Polemonium, Phlox, Diapensia, Löselia, Pennea.
Juss. 1789. Gen. p. 132: ordo 10 class. VIII. Gen. §. 1: Maripa, Mouroucoa, Retzia,

Convolvuli B. Juss. cont.
Endrachium, Convolvulus, Ipomaea. §. 2: Evolvulus, Nama, Hydrolea, Sagonea, Cressa. *Affinia*: Cuscuta, Diapensia, Löselia.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 343: sect. Convolvulacear. Gen.: Calystegia, Convolvulus.

Convolvulinae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 593: trib. Convolvulear. Gen.: Quamoclit, Pharbitis, Calonyction, Batatas, Ipomoea, Hewittia, Skinneria, Convolvulus, Aniseia, Calystegia, Polymeria, Porana, Neuropeltis, Breweria, Cressa, Evolvulus.

Convolvulineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XVIII. 54: class. Gamopetalar. hypogynar. Fam.: Polemoniaceae, Nolaneae, Convolvulaceae.

Convolvuloides Mönch 1794. Meth. p. 451: nov. g. Petalostemonis. (Convolvulus purpureus L., etc.)
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 100: subg. Convolvuli.
= Pharbitis Choisy.

Convolvulus*) Tourn. 1700. Inst. p. 82. t. 17: g pl. class. I. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 27. Ed. Hall. 1745. p. 27.
Adans. 1763. Fam. II. p. 212: g. Personatar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 590. n. 643; 1830. Gen. I. p. 151. n. 755: g. Convolvulear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3803. p. 653; 1841. Ench. p. 324. Sect.: Convolvulus, Jacquemontia, Ipomaea, Exogonium. — Meisn. 1840. Gen. p. 275 (181). Sect. eaed.
= Convolvulus et Ipomoea Linn.

Convolvulus Linn. 1737. Gen. p. 47. n. 134; 1737. Cliff. p. 66; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 38; 1753. Sp. I. p. 153; 1759. Syst. ed. X. p. 922. n. 198; 1762. Sp. ed. II. p. 218; 1764. Gen. ed. VI. p. 86. n. 215; 1767. Syst. ed. XII. p. 155. n. 214: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 140 (sph. *Covolvulus*). — Murr. 1774. Syst. p. 168; 1784. Syst p. 200. — Reich. 1778. Gen. p. 89. n. 231. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 116 n. 287. — Lour. 1790. Coch. I. p. 106. — Gmel. 1791. Syst. p. 339. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 135; 1818. Fl. cap. II. p. 15. — Pers. 1797. Syst. p. 207; 1805. Ench. I. p. 177. n. 416. — Willd. 1797. Sp. I. p. 844. n. 323; 1809. En. p. 202. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 123. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 45. Ed. 1832. I. p. 466. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 24. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 8. 138.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 488: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 209. n. 872: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 450. Sejungitur Convolvuloides.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Campanaceor.

*) Quod plurimae species se convolvant, quare rectius *Convolvolus*. (Beckmann Lex. bot. p. 63.)

Convolvulus Linn. cont.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Convolvulor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 133.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Campanacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 393.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 95: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 116: g. Monopetalar.
Neck. 1770. Act. Ac. Palat. II. p. 477: g. Convolvulear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 307. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 222. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 663. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 96. Subgen.: Calystegia, Scammonia, Euconvolvulus, Batatas, Convolvuloides.
Scop. 1777. Intr. p. 181: g. Luridar.
Neck. 1790. El. II. p. 22. n. 641: g. Darinyphytor. Disjungitur Stevogtia.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 396: g. Convolvulacear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 210. — DC. 1805. Franç. III. p. 639; 1815. V. p. 423. — Hedw. 1806. Gen. p. 102. n. 456. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 94. — Lois. 1823. Dict. v. 27. p. 31 (*Liseron*). — Kunth 1823. Syn. II. p. 211. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 724. — Link 1829. Hdb. p. 589. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 348. — Koch 1837. Syn. p. 494. Ed. II. p. 568. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 499.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 130: g. Columniferar.?

Convolvulus (Medic. 1791) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 482. Ed. Nees p. 238: g. Convolvulacear., disjuncta Calystegia restrict. — Par. Link 1821. En. I. p. 201. — Bartl. 1830. Ord. p. 191. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 76. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 185.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 461: g. Convolvulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3011. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631. — Webb . . . . Canar. III. p. 22. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 87.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXII. 255. n. 690: g. Convolvulor. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 344.

Convolvulus Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 404. 477 (*cf.* Flora V. Lit. p. 133); 1845 in DC. Prodr. IX. p. 399: g. Convolvulear., emissis multis restrict. Sect.: Orthocaulos, Strephocaulos. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 283. Sect. eaed. — Kunth 1838. Berol. II. p. 29. — Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4406. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 55. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 401.
Endl. 1839. Gen. n. 3803 *a*. p. 654; 1841. Ench. p. 324: sect. Convolvuli. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 275 (181).
Vriese 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 346: g. Convolvulacear.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 621: g. Convolvulinar.
Synon. Merremia Dennst.; Rhodorrhiza Webb.

Conyocybe Mathieu vid. *Coniocybe Ach.*

Conysa Adans. 1763. Fam. II. p. 122: g. Conysar.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 511: g. Corymbiferar.
= Conyza Tourn.

Conysae Adans. 1763. Fam. II. p. 121: sect. 7 Compositar. Gen.: Filago, Elichrysum, Conysa, Anaschovadi, Marsea, Chrysocome, Petasites, Cacalia, Senecio, Porophyllum, Eupatorium, Carelia.

Conyza*) Tourn. 1700. Inst. p. 454. t. 259: g. pl. class. XII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 182. Ed. Hall. 1745. p. 192: g. pl. class. VIII. (Conyza et Tarchonanthus L.)
Vaill. 1719. Act. Ac. Par. p. 298: g. Corymbiferar. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 704. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1772. Carn. II. p. 154. — Juss. 1789. Gen. p. 180. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 397. — DC. 1805. Franç. IV. p. 139; 1815. V. p. 468. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 462. — Link 1822. En. II. p. 321. — Math. 1853. Belg. I. p. 276.
Linn. 1737. Gen. p. 251. n. 646; 1737. Cliff. p. 405; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 257; 1753. Sp. II. p. 861; 1759. Syst. ed. X. p. 1212. n. 854; 1763. Sp. ed. II. p. 1205; 1764. Gen. ed. VI. p. 422. n. 950; 1767. Syst. ed. XII. p. 547: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 626; 1784. Syst. p. 752. — Reich. 1778. Gen. p. 419. n. 1030. — Lour. 1790. Coch. II. p. 495. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 553. n. 1286. — Gmel. 1791. Syst. p. 1220. — Pers. 1797. Syst. p. 792; 1807. Ench. II. p. 425. n. 1847. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1918. n. 1480; 1809. En. p. 870. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 145. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 426.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 250. n. 1033: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 574.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 188. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 8. 261.
Hill 1769. Ht. kew. p. 17: g. Radiatar. (et p. 33 inter Tubulatas.) — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 559; 1826. Syst. III. p. 507. n. 2759; 1831. Gen. II. p. 627. n. 3114.
Scop. 1777. Intr. p. 129: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 76. n. 136: g. Siphoniphytor.
Cass. 1818. Dict. v. 10. p. 305; 1822. v. 23. p. 564; 1827. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Inulear. (1827 Archetypar. verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2456. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Koch 1837. Syn. p. 361. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 193.

*) *Κόνυζα*, nomen plantae apud Theocr., a *κνύζω*, pruritus, scabies. (Vaill.)

Conyza Tourn. cont.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 69: g. Vernoniacear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 388. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 895.
Link 1829. Hdb. I. p. 725: g. Elichrysear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 235: g. Asterear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 953: g. Conyzear. (legitimar.) — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 40. Subgen.: Blumea, Pluchea.
Synon. Conysa Adans.

Conyza Burm. 1768. Fl. ind. p. 179.
= Gonotheca Blume. (DC. Pr. IV. p. 429.)

Conyza D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 176: g. Carduacear. (C. Cappa.)
= Inulae sect. Cappa DC.

Conyza Lessing 1832. Syn. Compos. p. 203: g. emendat. Conyzear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3582. (genuinar.) Sect.: Andryalopsis, Conyza, Tubifera, Fimbrillaria. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
DC. 1836. Pr. V. p. 377: g. Euconyzear. Sect.: Andryaloides, Dimorphanthes, Tubifera, Fimbrillaria. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2405. p. 390; 1841. Ench. p. 236. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 190 (128). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 498. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 197.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 257: g. Baccharidear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 44.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 96: g. Erigerinear.

Conyzeae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 200: div. Baccharidear. Gen.: Centipeda, Sphaeranthus, Grangea, Pycarda, Ceruana, Cyathocline, Laestadia, Laennecia, Conyza, Phagnalon. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 368. Subdivis.: Sphaerantheae, Grangeineae, Euconyzeae. — Endl. 1838. Gen. p. 387; 1841. Ench. p. 235. Subdivis. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 189 (127). Subdivis. eaed.
Rchb. 1841. Nom. p. 91: div. Tubuliflorar. Subdivis.: Neurolaeneae, Erechtiteae, Petasiteae, Plucheinae, Sphaerantheae, Grangeineae, *genuinae* (gen. Euconyzear. DC.), Solenogyneae, Baccharideae, Tarchonantheae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Asteroidear. Gen. Euconyzear. DC. et Leucopodum, Parastrephia.

Conyzeae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 952: subtrib. Asteroidear. Divis.: Micropeae, Deneckieae, Euconyzeae.

Conyzeae legitimae Schultz Bip. 1843 in Walp Repert. II. p. 953: div. Euconyzear. Gen: Conyza, Laggera, Tessaria; Monenteles, Monarrhenus; Schizogyne; Asteridea; Karthemia.

Conyzella Dillen. 1719. Nov. gen. p. 42. t. 8: nov. g. herbar. flore composito discoideo.

Conyzella Dillen. cont.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 208: sect. Erigerontis. (Euerigerontis sp. DC.) Subsect.: Euconyzella.

Conyzoides Tourn. 1706. Mém. Ac. Paris. p. 86: nov. g. plant.
Dillen. 1719. Nov. gen. p. 142. 158: g. ab Astere distinctum.
DC. 1837. Pr. VI. p. 281: sect. Carpesii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2775 *a*. p. 453; 1841. Ench. p. 244. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 618.

Conyzopsis Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 162: subsect. Oxytripolii. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 573.

Coockia Batsch vid. *Cookia Sonn.*

Cookia*) Sonnerat 1782. Voy. II. p. 130. t. 131.
Juss. 1789. Gen. p. 261: g. Aurantior. (veror.) — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 791; 1825. Syst. II. p. 314. n. 1568; 1830. Gen. I. p. 345. n. 1745. — Link 1821. En. I. p. 398. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1372. 1410.
Willd. 1799. Sp. II. p. 558. n. 844; 1809. En. p. 447: g. Decandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 466. n. 1054 (*Kookia*). — Roxb. 1832. Ind. II. p. 382.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 155: g. Hesperidear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 53 (*Coockia*). — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 35. — Hedw. 1806. Gen. p. 311. n. 1229.
Mirb. 1813. Bull. soc. philom. p. 380: g. Aurantiacear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 307. — DC. 1824. Pr. I. p. 537. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVIII (*Kookia*). — Bartl. 1830. Ord. p. 393. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 585. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 253. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 85. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 215.
Rchb. 1828. Consp. p. 212. n. 5525: g. Aurantiear.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 95: g. Clausenear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 46 (34). — Rchb. 1837. Hdb. p. 314; 1841. Nom. p. 213. n. 8105. — Endl. 1840. Gen. n. 5507. p. 1045; 1841. Ench. p. 548. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 33. 46 (restrictum). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 197.
Synon. Quinaria Lour.; Aulacia Lour.?; Gallesioa et Dioxippe Römer.

Cookia Gmel. 1791. Syst. p. 24: g. Diandr. Monogyn., pro *Banksia Forst.* substitutum.
= Pimelea Banks.

Cooperia Herbert 1836. Bot. Mag. t. 3482. 3727; 1837. Amaryll. p. 72. 178: nov. g. Amaryllidear. (Hippeastriformium.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1600. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 197.

*) Dicat. James Cook, navigatori insigni.

Cooperia Herbert cont.
Herb. 1836 in Bot. Regist. XXII. t. 1835: g. Amaryllidacear. schistandr. (C. Drummondii.)
Endl. 1837. Gen. n. 1272. p. 176; 1841. Ench. p. 103: g. Amaryllear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 393 (296). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 405. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 11. 64.
Kunth 1850. Enum. V. p. 478: g. Hippeastrear.
Synon. Sceptranthus Grah.; Sceptranthes Grah. ex Steud.

Copaia Endl. 1839. Gen. n. 4115 *a*. p. 711; 1841. Ench. p. 346: sect. Jacarandae. (Bignonia Copaia Aubl.)
Miq. 1844. Linnaea XVIII. p. 260: sect. Bignoniae.

Copaiba Pison. 1648. Brasil. p. 56 et Marcgr. ibid. p. 130.
Adans. 1763. Fam. II. p. 341: g. Pistaciar. = Copaifera Linn.

Copaifera Linn. 1762. Spec. ed. II. p. 557; 1764. Gen. ed. VI. p. 216. n. 542; 1767. Syst. ed. XII. p. 302. n. 548: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 341; 1784. Syst. p. 409. — Reich. 1778. Gen. p. 226. n. 601. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 299. n. 757. — Gmel. 1791. Syst. p. 700. — Pers. 1797. Syst. p. 438. — Willd. 1799. Sp. II. p. 630. n. 880.
Gled. 1764. Syst. p. 104. n. 427: g. Thalamostemonum.
Juss. 1789. Gen. p. 365: g. Leguminosar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 430. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 244. — Pers. 1805. Ench. I. p. 462. n. 1031. — Hedw. 1806. Gen. p. 324. n. 1277. — Tussac 1818. Dict. v. 10. p. 311. — Desfont. 1821. Mém. Mus. VII. p. 375. — Link 1821. En. I. p. 405. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 357. n. 1677; 1830. Gen. I. p. 368. n. 1861. — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 265. t. 659. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 260. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1515.
Neck. 1790. El. II. p. 452. n. 1287: g. Chorisophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 66: g. Terebinthinacear.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 508: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 455. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (69). — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 504. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 197.
Hayne 1826. Linnaea I. p. 418. Char. emend.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4107; 1841. Nom. p. 154. n. 6050: g. Ceratoniear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 135.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 116: g. Caesalpiniear. (verar.) — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6806. p. 1320; 1841. Ench. p. 675. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 133.

Copaifera Linn. cont.
Benth. 1840. Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Cynometrear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Synon. Copaiba Pis.; Coapoiba Marcgr.; Copaiva Jacq.

Copaiva Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 123. t. 86: g. Decandr. Monogyn. = Copaifera Linn.

Copernicia*) „Martius Palm. t. 50" Endl. 1837. Gen. n. 1757. p. 253; 1841. Ench. p. 136: g. Sabalinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2295. — Meisn. 1842. Gen. p. 357 (266).
Mart. . . . . Palm. p. 243.
Kunth 1841. Enum. III. p. 242: g. Coryphinar.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 105: g. Coryphinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Sabalidar.
Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 424: g. Sabalinear.
Synon. Caranaiba Pis.; Coryphae sp. Humb.

Copholepida DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 199: sect. Hieracii. (Pilosella et Hieracium sect. Rchb. 1841.)

Copisma**) E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 132: nov. g. Phaseolear. (Rhynchosiae sp. DC.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 94 (67).
Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 536: g. Rhynchosiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5838.
Endl. 1841. Gen. n. 6692 *a*. p. 1300; 1841. Ench. p. 672: sect. Rhynchosiae. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 785.
Synon. Eurhynchosia Wight. & Arn.

Copnitis „E. Meyer" Endl. Gen. et Ench. in synon. Leobordiae; vid. *Capnitis Meyer.*

Coppoleria Todaro 1845. Atti Ac. Palerm. I. p. 14: nov. g. Viciear. (Ervum monanthos L.)

Coprinarius Fries 1821. Syst. myc. I. p. 300; 1825. Pl. homon. p. 75; 1828. Elench. I. p. 42: tribus Pratellae.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *A*; 1841. Nom. p. 12. n. 502. 1: sect. Agarici. Subsect. (1841): Psathyrella, Panaeolius.
Endl. 1836. Gen. n. 453 III *a*. p. 40; 1841. Ench. p. 21: subsect. Pratellae. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 458.
Fries 1838. Epicr. p. 234; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 297: series Agarici. Subgen.: Panaeolus, Psathyrella. — Par. Bail 1858. Syst. p. 36. Subgen. ead.
Math. 1853. Belg. II. p. 352: subsect. Pratelli.
Synon. Bolbitius Fries.

Coprinus Pers. 1797. Tent. disp. p. 62: nov. g. Hymenotheeii. *Cf.* Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 1. p. 12 et Leman 1818. Dict. v. 10. p. 314.

Coprinus Pers. cont.
Pers. 1801. Syn. Fung. p. XVI. 395: sect. Agarici. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 145. — Nees 1816. Syst. p. 210; 1817. Ueberbl. p. 53. — Mart. 1817. Erlang. p. 441. — Leman 1820. Dict. v. 17. p. 204. — Endl. 1836. Gen. n. 453 II. p. 40; 1841. Ench. p. 21. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 454. — Math. 1853. Belg. II. p. 351.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 37: g. Fungor. primae seriei.
Fries 1818. Obs. mycol. II. p. 185: fam. Agarici.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 20: g. Agaricor.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 306; 1828. Elench. I. p. 43: subg. Agarici.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 632: g. Pratellidear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 75; 1836. Epicr. p. 241; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 297: g. Agaricinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 348; 1841. Nom. p. 12. n. 500. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 71. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 182. 184. — Bail 1858. Syst. p. 35. t. 34.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 25: g. Agaricinear.
Wallr. 1844. Beitr. z. Bot. I. H. 2. p. 154: g. Entomomycetum pileator.

Coprosanthus Kunth vid. *Coprosmanthus Torr.*

Coprosma*) Forst. 1776. Char. gen. p. 137. t. 69: nov. g. Polygam. Dioec. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 733. n. 1593. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 1001. n. 1896.
Scop. 1777. Intr. p. 198: g. Speciosar.
Linn. f. 1781. Suppl. p. 24. n. 1377: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 274. — Gmel. 1791. Syst. p. 471. — Pers. 1797. Syst. p. 290; 1805. Ench. I. p. 298. n. 665.
Juss. 1789. Gen. p. 205; 1820. Mém. Mus. VI. p. 381: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 445. — Hedw. 1806. Gen. p. 189. n. 778. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 315. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XXI. 210. — Endl. 1833. Norf. p. 59. — A. Cunningh. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 206. — Hook f. 1853. N.-Zeal. I. p. 103.
Batsch 1802. Tab. p. 233: g. Coffeacear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 495; 1825. Syst. I. p. 835. n. 959; 1830. Gen. I. p. 207. n. 1054: g. Carissear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 205. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 578; II. p. 882.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 86: g. Coffeariae.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3572: g. Cerberear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 137; 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 261: g. Anthospermear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 578. — G. Don 1834. Gen.

*) Dicat. Nic. Copernico, astronomo.
**) κοπίς, cultrum; κοπίζω.

*) κόπρος, stercus; ὀσμή, odor.

Coprosma Forst. cont. syst. III. p. 465. 634 (*Caprosma*). — Endl. 1838. Gen. n. 309. p. 525; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 172 (120). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 48. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 327. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 103.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 74. n. 2757: g. Coprosmear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Anthospermidar.
Synon. Pelaphia Banks. (A. Cunn.)

Coprosmanthus Torrey 1843. Fl. New-York II. p. 303: sect. Smilacis.
Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 35 (*Coprosanthus*); 1850. Enum. V. p. 263: g. Smilacear. (Smilax peduncularis Mühl. et herbacea L.)

Coprosmeae Rchb. 1837. Handb. p. 180; 1841. Nomencl. p. 74: subdiv. Anthospermear. Gen.: Coprosma.

Coprotrichum Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 76: nov. g. Torulaceor. (C. purpurascens et cinereum.)

Coptis*) Salisb. 1807. Linn. Trans. VIII. p. 305.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 22: g. Polyandr. Polygyn.
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 316: g. Ranunculacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 98. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 217. 338.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 734; 1825. Syst. II. p. 659. n. 2041; 1830. Gen. I. p. 461. n. 2271: g. Ranunculear. (descisc.)
DC. 1818. Syst. I. p. 321; 1824. Pr. I. p. 47: g. Helleborear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4956. — Bartl. 1830. Ord. p. 254. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 46. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 28. Sect.: Chryza, Chrysocoptis, Pterophyllum. — Endl. 1839. Gen. n. 4792. p. 848; 1841. Ench. p. 435. Sect eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 191. n. 7251. Sect. eaed. (Coptis loco Chryzae.) — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 52. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 97. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 42. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 26.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX: g. Isopyrear.
Link 1831. Hdb. II. p. 386: g. Aconitear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277: g. Helleborastror.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 324: g. Helleborinear.
Synon. Chryza Rafin. 1819.

Coptocheile Hoffmsg. 1842. Nachtr. Verz. p. 25 (ex Linnaea XVI. p. 279): nov. g. Gesneriae comparatum. (C. macrorrhiza.)

Coptophyllum**) Gardn. 1842. Lond. journ. bot. I. p. 133: nov. g. Schizaeacear. (Anemia millefolium Gardn.) *Cf.* Meisn. 1843. Comm. p. 372 et Bot. Zeit. 1843. p. 316 (*Cryptophyllum*).
Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 339: sect. Aneimiae. — Par. Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 115.

Coptophyllum Korthals 1851. Nederl. kruidk. Arch. IV. p. 161: nov. g. Hedyotidear. *Cf.* Flora 1851. p. 527.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 777: g. Rondeletiear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 175.

Coptosapelta Korthals 1850. Nederl. kruidk. Arch. II. p. 112: nov. g. Cinchonear., aff. Bouvardiae et Manettiae. (C. flavescens.) *Cf.* Flora 1851. p. 525. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 155.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 779: g. Eucinchonear.

Coquebertia*) Brongn. 1833. Ann. sc. nat. XXX. p. 180: nov. g. Swartziear. (C. ilicifolia.) *Cf.* Isis 1836. p. 463.
Meisn. 1837. Comm. p. 69: g. Cassiear. minus notum.
= Zollernia Nees.

Cora Fries 1825. Pl. homon. p. 300: nov. g. Coenogonear. (Ulva Pavonia Sw.)
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 89: g. Coenogoneor.
= Zonaria Agdh.

Cora Fries 1838. Epicr. p. 556; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 333: g. Auricularinor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 113. Sect.: Eucora, Cilicia. — Bonord. 1851. Hdb. p. 164.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 459: g. Hydneor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Thelephoreor.

Coral Dillen. 1732. Hort. Eltham. t. 90. f. 106. (*Carolinensis hastato folio Petiv.*)
= Erythrina Linn.

Corallia Roxb. 1814. Hort. Bengal. p. 92. (teste Tulasne 1856.)
Rchb. 1841. Nom. p. 171. n. 6662: g. Rhizophorear.
= Carallia Roxb., R. Brown.

Corallideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 339: div. Thalassiophytar. Gen.: Jania, Corallina.

Corallina Tourn. 1700. Inst. p. 570. t. 338: g. pl. class. XVII.
Batsch 1802. Tab. p. 271: g. Byssinor.
Lam. 1815. Mém. Mus. II. p. 227: g. Polyporum corticiferor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 339: g. Corallidear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 752. n. 3812: g. Geophytar.
Menegh. 1838. Cenni p. 33: g. Corallinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 682. — Dcne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 93); 1842. ibid. XVIII. p. 119. — Endl. 1843. Spl. III. p. 48. n. 122/71. — Kütz. 1843. Linnaea

---

*) κόπτω, ferio, disseco, findo.
**) κόπτω, seco.

*) Dicat. Carolo Coquebert-Montbret, ejus fratri et filiis.

Corallina Tourn. cont.
XVII. p. 101; 1843. Phyc. gener. p. 388; 1845. Phyc. germ. p. 297; 1849. Sp. Alg. p. 705. n. 470. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 126. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 130. (genuinar.) — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 223; 1849. ibid. X. p. 54. — Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 83.
Post & Rupr. 1840. Ill. Alg. t. 40: g. Zonariear.
Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 287: g. Rhodomelear.
Harv. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 237: g. Corallinacear.
Synon. Nodolara Imper.; Titanephlium Nardo (Titanephyllum Endl.); Haliptylon Decne; Haliptilon Endl.

Corallinaceae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 80: ordo Desmiospermear. Subord.: Corallineae, Nulliporeae.

Corallinae genuinae Rabenh. Krypt. II. 2. p. XII: vid. *Corallineae*.

Corallineae Meneghini 1838. Cenni org. Alghe p. 33: fam. Algar. Gen.: Galaxaura, Jania, Corallina, Cymopolia?, Amphiroa?
Rchb. 1841. Nom. p. 19: div. Ulvacear. Gen. ead. et Acetabularia, Polyphysa?, Udotea, Halimeda, Nesea? — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 129. Sect.: Acetabularieae, Spongiteae, *genuinae* (gen.: Corallina, Jania).
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): ordo Choristosporear. Gen.: Melobesia, Mastophora, Jania, Amphiroa, Corallina, Arthrocardia. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 225.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 96: ordo ampliat. Gen.: Halimeda, Udotea, Avrainvillea, Penicillus, Espera, Neomeris, Cymopolia, Chamaedoris, Galaxaura, Actinotrichia, Liagora; Corallina, Jania, Amphiroa, Melobesia.
Endl. 1843. Spl. III. p. 48: div. Rhodomelear. Gen.: Corallina, Jania, Amphiroa, Melobesia. — Simil. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. Gen. ead. et Haliptilon, Arthrocardia, Eurytion, Cheilosporum.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phyc. gener. p. 382. 387; 1845. Phyc. germ. p. 296; 1849. Sp. Alg. p. 699: fam. Epiblastear. Gen.: Amphiroa Corallina, Jania.
Zanard. 1844. Sulle corallinee.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 126: div. Rhodomelaenear. Gen.: Corallina, Jania, Melobesia, Hildebrandtia.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108: trib. Centrothalamar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: trib. Floridear. Gen. ut Endl. 1843 et Arthrocardia, Mastophora.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 82: subordo Corallinacear. Gen. ut Kütz.

Corallinites Unger 1846. Chlor. protog. p. 127. t. 39. f. 6. 7: nov. g. Algar. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 58.

Coralliodendron Kütz. 1841. Polyp. calcif. p. 11.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465): g. Codiear.
= Corallocephalus Kütz.

Corallocephalus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 95; 1843. Phycol. gener. p. 310; 1849. Sp. Alg. p. 505. n. 319: g. Codiear.
Synon. Penicillus Lam.; Nesea Lamx.; Coralliodendron Kütz.; Haligraphium Endl.

Corallodendron Tourn. 1700. Inst. p. 661. t. 446. App.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 257: g. pl. class. XI.
Endl. 1841. Gen. n. 6667 *b*. p. 1295; 1841. Ench. p. 672: sect. Erythrinae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5823. 2.
Synon. Gelala Rumph.; Mouricou Adans.; Mauricon Wittst.

Corallodendron Junghuhn (1839. Verh. Bat. Genootsch.) 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 307: nov. g. Hyphomycetum. (C. leucocephalum.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. Add. p. 103.
Corda 1842. Mycol. p. 196: g. dubium Isariear.?, an Stilbinor.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Stilbaceor.

Coralloides Tourn. 1700. Inst. p. 564. t. 332: g. pl. class. XVII. — Par. Mich. 1729. Nov. gen. p. 209. t. 88.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 14: g. pl. class. I.
Gmel. 1791. Syst. p. 1376: sect. Lichenis.
= Clavaria Vaill., etc.

Coralloides Dillen. 1741. Hist. musc. p. 75. t. 14—17: g. Muscor. restrictum, varia tamen complectens.

Coralloides Hoffm. 1791. Pl. lich. t. 31. f. 2. 3.
= Sphaerophorus Pers.

Corallomyces Junghuhn 1838. Jav. p. 7. t. 5.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 468: g. Stilbeor.

Corallophyllum HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 275. t. 660 bis: nov. g. incertae sedis. (C. caeruleum.) — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 267. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 225.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 145: g. Octandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5547 inter genera incognita.
Endl. 1841. Gen. n. 6861. p. 1329; 1841. Ench. p. 685 inter genera gamopetala minus nota.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 452: g. Monotropacear.?
= Lennoa La Llave & Lex.

Corallopsis Greville 1830. Alg. synops. p. LIII.
Endl. 1836. Gen. n. 93. p. 8; 1841. Ench. p. 6: g. Floridar.
Menegh. 1838. Cenni p. 39: g. Floridear. — Par. Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg.
Decne 1841 Arch. Mus. II. p. 184: g. Gasterocarpear.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 732: g. Plocamiear.

Corallopsis Greville cont.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): g. Chondriear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 225.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Lomentariear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 785. n. 521: g. Sphaerococcear. — Par. Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 111.
Sond. 1852. Linnaea XXV. p. 687: g. Sphaerococcoidear.

Corallorhiza Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 278: g. Orchidear. — Par. R. Brown 1813. Ht. kew. ed. sec. V. p. 209. (Verm. bot. Schr. II. p. 33.) — Rich. 1818. Mém. Mus. IV. p. 43. 53; 1818. Orch. eur. p. 31. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 374. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 214. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 733. n. 3017; 1831. Gen. II. p. 675. n. 3409. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 564. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1553. 1577. — Link 1829. Hdb. I. p. 253. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 422. 484.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 26 (*Corallorrhiza*): g. Palmar.
Chatelain 1760. Specimen inaug. de Corallorhiza.
Hall. 1768. Hist. Helv. II. p. 159. t. 44.
Scop. 1772. Carn. II. p. 207: g. Gynandr. Diandr.
Scop. 1777. Intr. p. 92. g. Satyrior.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 284: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 197: g. Gynandr. Monandr. Sect.: Corallorrhiza, Aplectrum.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 10 (Linnaea II. p. 528): g. Arethusear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1454.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 131: g. Limodorear.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Endl. 1837. Gen. n. 1339. p. 189; 1841. Ench. p. 109: g. Pleurothallear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1926. — Meisn. 1842. Gen. p. 369 (277). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 226.
Koch 1837. Syn. p. 696. Ed. II. p. 803: g. Malaxidinear.
Kunth 1838. Berol. II. p. 251: g. Malaxidear. — Par. Klotzsch . . . . in Hayne Arzneigew. XXIV. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 49. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 274.
Lindl. 1840. Orchid. p. 533: g. Malaxear.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 92: g. Ceriorchidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Corallorhizidar.
Synon. Orobanche spuria Rupp.; Rhizocorallon Hall.; Cymbidium DC.

Corallorhizidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 181: sect. Malaxear. Gen.: Corallorhiza, Aplectrum, Aphyllorchis. *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 169.

Corallorrhiza Gmel., R. Brown, etc. vid. *Corallorhiza Hall.*

Corallum Tourn. 1700. Inst. p. 572. t. 339: g. pl. class. XVII.

Coralluma Schrank, Rchb. vid. *Caralluma R. Brown.*

Corbichonia Scopoli 1777. Introd. p. 264. n. 1196: nov. g. Polyandrar. (Orygia decumbens Forsk.)
= Orygia Forsk.

Corbularia Salisb. 1812 in Trans. hort. soc. I. p. 349: nov. g. Narcissear. (Narcissus tenuifolius Haw., etc.) — Par. Herb. 1837. Amaryll. p. 79. 296. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Kunth 1850. Enum. V. p. 704. — Gay 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. X. p. 77.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 332 (Ed. Schrank 1819. p. 336); 1819. Suppl. p. 120: g. Narcissor.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 932: sect. Narcissi. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1289 *a*. p. 179; 1841. Ench. p. 103. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1611. 1. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (297).
Haw. 1831. Mon. Narciss. p. 1: g. Narcissinear. — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 17. 189.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 431: subg. Narcissi.

Corchoreae Rchb. 1837. Handb. p. 303: subdiv. Tiliariar. Gen.: Corchorus.

Corchoropsis Sieb. & Zuccar. 1843. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. III. p. 737: nov. g. Tiliacear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 93. n. 5371/1: g. Grewiear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 118.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.

Corchorus*) Tourn. 1700. Inst. p. 259. t. 135: g. pl. class. VI.
Linn. 1737. Gen. p. 156. n. 442; 1737. Cliff. p. 209; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 147; 1753. Sp. I. p. 529; 1759. Syst. ed. X. p. 1079. n. 599; 1762. Sp. ed. II. p. 746; 1764. Gen. ed. VI. p. 272. n. 675; 1767. Syst. ed. XII. p. 369: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 416; 1784. Syst. p. 501. — Reich. 1778. Gen. p. 275. n. 730. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 364. n. 917. — Lour. 1790. Coch. I. p. 334. — Gmel. 1791. Syst. p. 827. — Pers. 1797. Syst. p. 537. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1214. n. 1052; 1809. En. p. 572. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 581.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 112. n. 462: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 248.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Culminiarum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Tiliar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 382.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 452.
Hill 1769. Ht. kew. p. 202: g. Pentapetalar.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 34: g. Cistos et Malvas conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 324: g. Disciferar.

*) Nomen ex Plinio.

Corchorus Tourn. cont.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 307. t. 64. f. 2 (olitorius et aestuans.)
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 236. 239; 1789. Phil. Bot. I. p. 86. 87.
Juss. 1789. Gen. p. 290: g. Tiliacear. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 207. — Batsch 1802. Tab. p. 62. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 92. — Pers. 1807. Ench. II. p. 67. n. 1273. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 421. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 820; 1825. Syst. II. p. 583. n. 1907; 1830. Gen. I. p. 428. n. 4127. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 335. — Link 1822. En. II. p. 72; 1831. Hdb. II. p. 349. — Kunth 1824. Syn. III. p. 275. — DC. 1824. Pr. I. p. 504. Sect.: Coreta, Coretoides, Ceratocoreta, Ganja, Guazumoides. — St. Hil. 1827. Fl. Bras. I. p. 279. — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 542. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. II. p. 72. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 7. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 239. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 199. — Brongn. 1843. En. genr. p. 76. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 243.
Neck. 1790. El. II. p. 254 n. 1004: g. Dapsilophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 105 in Decandr. Monogyn., p. 119 in Dodecandr. Monogyn. et p. 139 in Polyandr. Trigyn.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5445: g. Tiliear. Sect. ut DC. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 36 (28). — Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7968 (genuinar.) Sect.: Corchorus, Coretropsis, Ceratocoreta.
Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Corchorear.
Endl. 1840. Gen. n. 5371. p. 1008; 1841. Ench. p. 522: g. Grewiear. Sect.: Antichorus, Coreta, Guazumoides, Ganja? — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 233.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.

Corckia Endl. vid. *Corokia A. Cunn.*

Corcodilium Rchb. vid. *Crocodilium Vaill.*

Cordaea Spreng. 1831. Gen. II. p. 581. n. 2847: nov. g. Leguminosar. (Dolichos fabaeformis L'Her.)
= Cyamopsis DC.

Cordaea*) Nees 1833. Flora II. p. 401; 1833. Eur. Leberm. I. p. 102: nov. g. Frondosar.
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 35: g. Dermatophyllinar.
Corda 1835 in Sturm. Jungerm. p. 125: g. Hepaticinor.
= Pallavicinius Gray.

Cordana Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 129; 1852. ibid. XXV. p. 728: nov. g. Arthrobotrydear. (C. polyseptata, pauciseptta et pedunculata.)
Bonord. 1851. Hdb. p. 285. 293: g. Basidiophoror.

Cordia**) Plumier 1703. Gen. p. 13. t. 14.
Linn. 1737. Gen. p. 52. n. 149; 1737. Cliff. p. 63; 1753. Sp. I. p. 190; 1759. Syst. ed X. p. 936. n. 228; 1762. Sp. ed. II. p. 273; 1764. Gen. ed. VI. p. 101. n. 256; 1767. Syst. ed. XII. p. 176. n. 255: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 191; 1784. Syst. p. 230. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 219. t. 86—90. — Reich. 1778. Gen. p. 104. n. 276. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 139. n. 350. — Gmel. 1791. Syst. p. 392. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 43. t. 58; 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 330. Ed. 1832. I. p. 588. — Pers. 1797. Syst. p. 240; 1805. Ench. I. p. 165. n. 367. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1072. n. 396; 1809. En. p. 247. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 23. (restrict.)
Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 520. n. 1002: g. incertae sedis.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 212. n. 883: g. Petalostemonum.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 202: g. Hexandr. Monogyn.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 128. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 296. — Hedw. 1806. Gen. p. 118. n. 518. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 401.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Asperifoliar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 157. — Gis. 1792. Prael. p. 489. — Batsch 1802. Tab. p. 188.
Neck. 1790. El. I. p. 277. n. 436: g. Trachytophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 382: g. Sebestenar.
Cram. 1803. Disp. p. 33 in Tetrandr. Monogyn.
= Cordiae R. Brown pars.

Cordia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 498. Ed. Nees p. 354: g. Borraginear., injuncta Varronia emendat. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 68. Sect.: Sebestenae, Cordiae verae, Varroniae, Dasycephalae. — Link 1821. En. I. p. 161. — Kunth 1823. Syn. II. p. 191. Sect. eaed. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 842.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 465: g. Convolvulear.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XL. 446. n. 766: g. Boraginear. Sect.: genuinae, Varroniae, Cerdanae.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 648. n. 708; 1830. Gen. I. p. 128. n. 637: g. Asperifoliar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 611. Sect.: verae, Varroniae.
Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2987: g. Hydrophyllear.
Link 1829. Hdb. I. p. 569: g. Cordiacear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1491; 1847. Veg. kd. p. 629. (restrict.) — Endl. 1839. Gen. n. 3738. p. 643; 1841. Ench. p. 318. Sect.: Gerascanthus, Sebestena. — Meisn. 1840. Gen. p. 278 (186). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 44. — Brongn. 1843. En. genr. p. 55. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 233. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 473 (*Sébestier*). — Fres. 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIX. p. 3. Sect.:

*) Dicat. Aug. J. Corda, botan. Pragensi.
**) Dicat. Valerio Cordo, Hasso.

Cordia R. Brown cont.
Gerascanthus, corymbiformes, Physoclada, spicaeformes, subcapitatae, dasycephalae.
Cham. 1829. Linnaea IV. p. 471; 1830. ibid. V. p. 115: g. Cordiear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 374. Sect.: Sebestenae, Gerascanthus, Varronia. — Rchb. 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 112. n. 4371. Sect.: Cordia, Sebestenea. — A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 656. — DC. 1845. Pr. IX. p. 471. Sect.: Gerascanthus, Rhabdocalyx, Pilicordia, Physoclada, Sebestenoides, Myxa, Cordiopsis. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 914. Sect.: Sebestenoides, Myxa.
Bartl. 1830. Ord. p. 197: g. Tournefortiear.
Synon. Sebestena Bauh.; Sebesten Adans.; Cordia et Varronia Linn.; Firensia Scop.; Borellia Neck.; Cerdana Ruiz & Pav.; Pavonia Domb. (Steud.)

Cordia „Fl. mexic.“ Rchb. vid. *Cerdia.*

*Cordiaceae**) Link 1829. Handb. I. p. 569: ordo (31) Hypanthar. Subord.: *genuinae* (gen.: Cordia), Arguzieae, Hydrophylleae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (225) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 29: ordo Echialium.
Mart. 1835. Consp. p. 23: ordo 127.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 272) 1847. Veg. kd. p. 628: ordo Solanalium. Gen. (1847): Gynaion, Cordia, Geraschanthus, Rhabdocalyx, Pilicordia, Physoclada, Myxa, Varronia, Sebestena, Diacoria, Sacellium?
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 374: ordo Corollaeflorar. Trib.: Cordieae, Ehretiaceae, Erimatalieae.
Endl. 1839. Gen. p. 643: ordo Nuculiferar. Gen.: Cordia; Sacellium?, Cordiopsis?, Patagonula?, Menais? Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1401 et Ench. p. 318) Varronia et Cortesia.
Meisn. 1840. Gen. p. 278 (185): ordo Tubiflorar. Gen.: Ropourea?, Cordiopsis, Cordia, Varronia, Patagonula, Saccellium.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 32. 44: trib. Borraginear. Gen.: Cordia, Sacellium.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 55: fam. Asperifoliear. Gen.: Cordia.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 913: ordo Dicotyledonum monopetalar. Trib.: Cordieae, Ehretieae.
Fres. 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIX. p. 1: Gen. bras.: Cordia, Patagonula.

Cordieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25.
Cham. 1829. Linnaea IV. p. 471; 1830. ibid. V. p. 315: div. Boraginear. Gen.: Cordia, Patagonula.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 374: trib. Cordiacear. Gen. ut Cham. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 914. Gen.: Cordia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 193: subdiv. Idiocarpicar. Gen. ut Cham. et Varronia, Cardiopsis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 112. Gen. Cordiacear. Endl. 1839.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 656: subordo Borraginear. Gen.: Cordia. *Aff.*: Sacellium, Cordiopsis, Patagonula, Menais.
DC. 1845. Pr. IX. p. 467: trib. Borraginear. Gen.: Gynaion, Varronia, Cordia; Saccellium?

Cordiera A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 222. t. 20. f. 2: nov. g. Cordierear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 445. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 543. — Endl. 1838. Gen. n. 3220. p. 545; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2870. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 234.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180: g. Guettardear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Cordiereae A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 107. 222: trib. 7 Rubiacear. Gen.: Cordiera, Myrmecodia, Tricalysia. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 445. Gen.: Cordiera, Tricalysia. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 543. Gen. ead. — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (116). Gen. ead. et Baumannia? — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. Gen. ut DC.
Endl. 1838. Gen. p. 545; 1841. Ench. p. 273: trib. Coffeacear. Gen. ut DC. Accedit 1842 (Spl. II. p. 53) Commianthus.
Rchb. 1841. Nom. p. 76: subsect. Guettardear. Gen. ut DC.

Cordierites*) Montagne 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIV. p. 330; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 234: nov. g. Pyrenomycetum. (C. guianensis.)
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 37; 1842. Mycol. p. 154: g. Pezizear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 1. n. $388/_1$: g. Strigulinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Phacidiaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 399: g. Dichaenaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 206 (*Cordieritis*): g. Pezizeor.

Cordieritis Bonorden vid. *praeced.*

Cordiopsis „Desvaux“ Hamilt. 1825. Pr. fl. Ind. occ. p. 23: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Varronia bullata Jacq.)
Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2989: g. Hydrophyllear.
Bartl. 1830. Ord. p. 197: g. Tournefortiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 193 (*Cardiopsis*); 1841. Nom. p. 112. n. 4373: g. Cordiear.?
Endl. 1839. Gen. n. 3740. p. 644; 1841. Ench. p. 319: g. Cordiacear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 278 (185). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 234.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 656: g. Cordieis aff.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 498: sect. Cordiae.

Cordisperma „Poit. mss.“ Meisn. Comm. p. 131 in synon. Wulffiae: vid. *Crodisperma Poit.*

---

*) Ordo a R. Brown (1810. Prodr. I. p. 492) et Mart. (1828. Nov. gen. II. p. 138) absque nomine indicatus.

*) Dicat. Dr. Cordier, Persoonii alumno.

Cordyceps Fries 1823. Syst. myc. II. p. 323; 1828. Elench. II. p. 54: tribus Sphaeriae. Series: Hypocrea, Hypoxylon.
Fries 1825. Pl. homon. p. 105: sect. Hypocreae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 279 *d*; 1841. Nom. p. 7. n. 301. 4.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 33; 1842. Mycol. p. 136: g. Sphaeriaceor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 381. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 224: g. Sphaerinor.
Synon. Cordylia Fries.

Cordyla*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 411. Ed. Willd. p. 500: nov. g. Monadelph. Polyandr. (C. africana.) *Cf.* Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 235.
DC. 1825. Pr. II. p. 521: g. Detariear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV; 1828. Consp. p. 156. n. 4156; 1841. Nom. p. 156. n. 6114. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 466. — Meisn. 1837. Gen. p. 100 (71). — Endl. 1841. Gen. n. 6817. p. 1322; 1841. Ench. p. 681.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 247: g. Leguminosis aff.
Bartl. 1830. Ord. p. 417: g. Mimosear. desciscens.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Swartziear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Synon. Cordylia Pers.; Calycandra Rich.

Cordyla Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 416: nov. g. Orchidear.
= Roptrostemon Blume.

Cordylanthus „Nutt. mss." Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 597: nov. g. Castillejear.
Synon. Adenostegia Benth.

Cordylanthus Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 27: nov. g. Homalinear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 440.

Cordylecladia „J. Agardh" Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 155: g. Rhodymeniacear. (Gracilaria erecta Grev.)

Cordylestylis Falconer 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 74: nov. g. Neottiear. (C. foliosa.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181 (*Cordylostylis*).
Endl. 1843. Spl. III. p. 62. n. 1566/1: g. Physuridar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Spiranthidar.
Synon. Oncidiochilus Falc.

Cordylia Pers. 1807. Ench. II. p. 260. n. 1652: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 412.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 442 n. 2190: g. Polyandr. Monogyn. (1831. Gen. II. p. 564. n. 2756 Leguminosar.)
Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 269: g. Leguminosar.
= Cordyla Lour.

Cordylia Fries 1818. Obs. myc. II. p. 316: g. Sphaerioideor. Sect.: Creatocaulon, Hypoxylon.

Cordylia Fries cont.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Sphaeriar.? An subg. Sphaeriae?
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Sphaeriaceor.
= Cordyceps Fries.

Cordyline „Royen" Adans. 1763. Fam. II. p. 54: g. Hyacinthor. (= Aloë Linn. spec. 321. n. 4.)
? Pers. 1805. Ench. I. p. 372. n. 815: g. Hexandr. Monogyn. (Nonne ad seq. referenda?)
= Aloës spec.

Cordyline „Comm., Pet.-Th." Hedwig 1806. Gen. p. 243. n. 986: g. Smilacear.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 280. Ed. Nees p. 136: g. Asphodelear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 230; 1830. Gen. I. p. 261. n. 1359. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXVII. 347. — Endl. 1833. Norf. p. 28. — Dietr. 1840. Syn. II. p 1042. 1115.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 269: g. Asparagear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 414. — Kunth 1822. Syn. I. p. 276. — Agdh. 1823. Aphor. p. 162. (verar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Endl. 1837. Gen. n. 1166. p. 151; 1841. Ench. p. 84. — Meisn. 1842. Gen. p. 403 (306). — Brongn. 1843. En. genr. p. 18. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 210. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 235.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1394: g. Abamear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1825: g. Dracaenear. — Par. Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 29; 1850. Enum. V. p. 22. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 555.
Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 139: g. Liliacear. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 257.
Synon. Charlwoodia Sweet; Terminalis Medic., Dracaenae sp. Linn.

Cordyloblaste Henschel 1848. Bot. Zeit. p. 604: nov. g. Meliacear.? — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 228.
Griseb. 1849. Arch. f. Nat. II. p. 418: g. Styracinear.?

Cordylocarpus Desfont. 1800. Fl. Atlant. II. p. 79. t. 152.
Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 490: g. Siliquosar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 209. n. 1578. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 727.
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 415: g. Crucifear.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 237; 1821. Syst. II. p. 434; 1824. Pr. I. p. 186: g. Cakilinear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 200. — Endl. 1839. Gen. n. 4901. p. 873; 1841. Ench. p. 449.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 854. n. 2270; 1831. Gen. II. p. 513. n. 2514: g. Synclistar.
Rchb. 1828. Consp. p. 181. n. 4714; 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 179. n. 6906: g. Cakilear.

*) κορδύλη, clava: a germinis et baccae forma.

Cordylocarpus Desfont. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentaceae.
Meisn. 1837. Gen. p. 12 (12): g. Chorisporear.?
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 322: g. Lomentosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Cakilidar.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 236: g. Euclidiear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 40. n. 4969/1 (*Condylocarpus*): g. Raphanear.

Cordylocarpus Willd. 1800. Spec. III. p. 563. n. 1248: g. Tetradynam. Siliquos. dilatatum.
Smith 1815. Pr. fl. Graec. II. p. 33 in adnot. (C. tenuifolius.)
= Erucaria Gärtn. et Cordylocarpus Desf.

Cordylogne Lindl. vid. *seq.*

Cordylogyne*) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 218: nov. g. Asclepiadear. verar. — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626 (*Cordylogne*).
Endl. 1838. Gen. n. 3466. p. 592; 1841. Ench. p. 299: g. Cynoctonear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 236.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 128. n. 4963. (genuinar.)
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 518: g. Haplostemmar.

Cordylophorum „Nuttall mss.“ Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 488: sect. Epilobii. (E. suffruticosum.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 90.

Cordylostylis Spach vid. *Cordylestylis Falc.*

Corema Don 1828. Edinb. n. phil. journ. II. p. 63: nov. g. Empetrear. (Empetrum album L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5115; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 196. n. 7466. (genuinar.) Bartl. 1830. Ord. p. 373. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 483. — Endl. 1840. Gen. n. 5760. p. 1106; 1841. Ench. p. 585. — Meisn. 1841. Gen. p. 336 (249). — A. Gray 1848. Mem. Amer. Ac. n. ser. III. p. ... Injungitur Oakesia. *Cf.* Flora 1849. p. 692.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 285: g. Empetraceae. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 237. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 354.

Coremiei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: trib. Hormiscineor. Gen.: Coremium, Stysanus.

Coremium**) Link 1809. Berl. Mag. III. p. 19: nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 10. p. 419. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 80. — Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 42. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Nees 1816. Syst. p. 86; 1817. Uebcrbl. p. 23: g. Cephalotrichor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 365. — Simil. Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 544. n. 3546; 1831. Gen. II. p. 778. n. 4013.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 563: g. Isariadear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83: g. Cephalosporear..
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 54: g. Isariear.
Link 1824. Spec. I. p. 71: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 303. (synsporor.)
Fries 1825. Pl. homon. p. 182: g. Botrytideor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 120.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Aspergillacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Leptomycetum.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 17; 1842. V. p. 16; 1842. Mycol. p. 64: g. Aspergillinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 156.
Corda 1839. Prachtfl. p. 51. t. 25 (vulgare).
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 93: g. Mucedineor. genuinor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Coremieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 140: g. Stilbinor.
Math. 1853. Belg. II. p. 454: g. Botrydear.
= Penicillium Link?

Coreocarpus Benth. 1841 in Beech. voy. Bot.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711: g. Verbesinear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 156: g. Parthenicar.

Coreoloma Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 346: sect. Coreopsidis. Subsect.: Calliopsidium, Eublepharis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 982.

Coreopsideae Cassini 1818. Dict. v. 10. p. 419; 1821. v. 20. p. 347; 1825. v. 38. p. 17: div. Helianthear. Gen.: Aspilia?, Baillieria?, Bidens, Chrysanthellina, Coreopsis, Cosmos, Espeletia?, Georgina, Glossocardia, Guardiola?, Heterospermum, Kerneria, Leachia, Mnesiteon?, Narvalina, Neuractis, Parthenium, Peramibus?, Silphium, Synedrella, Tetragonotheca? — Par. Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 319; 1830. v. 60. p. 575. Subdivis.: Silphieae, Synedrelleae, *verae* (gen.: Coreopsis, Calliopsis, Leachia, Peramibus? Heliophthalmum?, Aspilia?, Campylotheca, Cosmos, Kerneria, Bidens). — Less. 1832. Syn. p. 228. Gen.: Coreopsis, Actinomeris, Viguieria, Helianthus, Tithonia. — DC. 1836. Pr. V. p. 569. Gen. ead. et Agarista, Armania, Oyedaea, Simsia, Leighia, Harpalium, Flourensia. — Endl. 1838. Gen. p. 411. Gen. ut DC. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1382 et Ench. p. 238) Epilepis et 1843 (Spl. III. p. 43) Tuckermannia. — Meisn. 1839. Gen. p. 203 (131). Gen. ut DC. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18. 124.
Rchb. 1828. Consp. p. 109: subdiv. Helianthear. Gen ut Cass. 1825 et Chrysanthellum, Calliopsis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 92. Gen. ut DC. et Prestinaria.

---

*) Nomen a forma stigmatis clavata.
**) κόρημα, quisquiliae.

Coreopsideae Cassini cont.
Link 1829. Hdb. I. p. 768: ordo Anthodiatar. Gen.: Ageratum, Stevia, Athanasia, Spilanthes, Bidens, Coreopsis, Tithonia, Helianthus, Rudbeckia, Georgina, Gazania, Cryptostemma, Galinsogea, Zinnia, Helenium, Bellium, Tagetes.
Less. 1830. Linnaea V. p. 153: subtrib. Senecionear. Gen.: Heliopsis, Acmella, Gymnolomia, Aldama, Verbesina, Bidens, Zinnia, Melananthera, Tridax.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711: subtrib. Senecionidear. Gen. ut Endl. 1843.

Coreopsis*) Linn. 1737. Gen. p. 263. n. 670; 1737. Cliff. p. 420; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 269; 1753. Sp. II. p. 907; 1759. Syst. ed. X. p. 1228. n. 879; 1763. Sp. ed. II. p. 1281; 1764. Gen. ed. VI. p. 440. n. 981; 1767. Syst. ed. XII. p. 570: g. Syngenes. Polygam. Frustran. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 651; 1784. Syst. p. 782. — Reich. 1778. Gen. p. 436. n. 1062. — Lour. 1790. Coch. II. p. 508. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 574. n. 1325. — Gmel. 1791. Syst. p. 1260. — Pers. 1797. Syst. p. 823; 1807. Ench. II. p. 477. n. 1918. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2251. n. 1538; 1809. En. p. 922. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 179.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 258. n. 1070: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 593. Disjungitur Coreopsoides.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Oppositifolior.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 188. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 528. — Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 414. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1352. 1536. Sect.: Coreopsis, Actinomeris.
Adans. 1763. Fam. II. p. 130 (*Coropsis*): g. Bidentum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540. — Link 1822. En. II. p. 353.
Hill 1769. Ht. kew. p. 10: g. Radiatar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 570; 1826. Syst. III. p. 613. n. 2848; 1831. Gen. II. p. 640. n. 3206.
Scop. 1777. Intr. p. 132: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 33. n. 63: g. Actinophytor. Segregantur Acispermum et Wulffia.
Cass. 1818. Dict. v. 10. p. 419; 1825. v. 38. p. 17: g. Coreopsidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2606; 1841. Nom. p. 92. n. 3611. — Link 1829. Hdb. I. p. 770. — Less. 1832. Syn. p. 228. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 311. — DC. 1836. Pr. V. p. 569. — Endl. 1838. Gen. n. 2529. p. 411; 1841. Ench. p. 238; 1842. Spl. II. p. 43. — Meisn. 1839. Gen. p. 203 (131). — Spach 1841. Vég. phan. X.

Coreopsis Linn. cont.
p. 133. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 237.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 228: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 477. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Brongn. 1843. En. genr. p. 42.
Synon. Coreopsoides Mönch; Acispermum Neck.; Leachia Cass.; Chrysomelea Tausch; Anacis sp. Schrank.

Coreopsis Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 320. 326; 1830. v. 60. p. 576: g. Coreopsidear. verar. restrict.

Coreopsis Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 357: g. Coreopsidear., emissis Diodonta et Cosmidio restrict. Sect.: Eucoreopsis, Chrysomelea, Gyrophyllum, Eublepharis, Rabdocaulis, Calliopsis. *Cf.* Endl. Spl. II. p. 42.

Coreopsis Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 338: g. Coreopsidear., aliter circumscriptum. Sect.: Eucoreopsis, Calliopsis, Coreoloma, Cosmella. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 979.

Coreopsoides Mönch 1794. Meth. p. 594: nov. g. Petalostemonis. (Coreopsis lanceolata L.)
= Coreopsis Linn.

Coreosma Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 22: nov. g. Grossularicar. (Ribes floridum Her.) — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 154 (injuncta Calobotrya Spach).
= Ribesia DC.

Coreta P. Browne 1756. Jamaic. p. 147: nov. g. Tetrandr. Monogyn.
DC. 1824. Pr. I. p. 504: sect. Corchori. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5445 *a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 542.
= Eucoreta Endl.

Coreta Endl. 1840. Gen. n. 5371 *b*. p. 1008; 1841. Ench. p. 522: sect. Corchori. Subsect.: Eucoreta, Coretoides, Ceratocoreta.

Corethrodendron Fisch. & Basin. 1851. Mém. Ac. Petersb. VI. p. 90: nov. g. ex typo Hedysari scoparii F. & M.

Corethrogyne*) DC. 1836. Prodr. V. p. 215: nov. g. Euamellear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2293. p. 372; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125).
Nutt. 1841. Am. phil. trans. n. ser. VII. p. 289: g. Asterinear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Bellidear.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 97: g. Euasterear.
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3306: g. Amellear. — Par. Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 954. (legitimar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 238.

Corethropis Corda vid. *Corethropsis Corda.*

Corethropsis DC. 1837. Prodr. VI. p. 596: sect. 25 Centaureae. (C. scoparia Sieb.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *z*. p. 474; 1841. Ench. p. 247.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 4 *c*: subsect. Calcitrapae.

*) κόρις, cimex: quia semina faciem cimicis gerunt. (Linn. Ht. Cliff. p. 420.)

*) κόρηθρον, scopae.

Corethropsis Corda 1839. Prachtfl. Schimm. p. 1. t. 1 (*Corethropis*): nov. g. Fungor, Polyactidi simile. (C. paradoxa.)
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 173: g. Dendryphicor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 14; 1842. Mycol. p. 56: g. Polyactidear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 102: g. Mucedineor. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494 (*Chorctopsis*): g. Cephalosporeor.

Corethrostylis Endl. 1839. Nov. stirp. Mus. Vind. Dec. nr. 1; 1840. Gen. n. 5326. p. 997; 1841. Ench. p. 519: nov. g. Lasiopetalear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7708. — Meisn. 1843. Comm. p. 344. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364. — Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 317. 343. (verar.) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 238.
Steud. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 236: g. Büttneriacear.

Corethrum Vahl 1810. Danske Nat. Selsk. Skrivt. IV. p. 85: nov. g. plant. (C. bromoides.)
== Euraphis Trin.

Coretoides DC. 1824. Prodr. I. p. 504: sect. Corchori. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5445 *b*; 1841. Nom. p. 209. n. 7968. 2 (*Coretropsis*, an sphalm. pro *Coretopsis*?). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 543.
Endl. 1840. Gen. n. 5371 *b β*. p. 1008; 1841. Ench. p. 522: subsect. Coretae.

Coretropsis Rchb. vid. *praeced.*

Coriales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 16: nixus Gynobasicar. Ordo: Coriarieae.

Coriandreae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 82: trib. Umbelliferar. Gen.: Coriandrum, Bifora.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIII: div. Umbelliferar. Gen.: Coriandrum, Biforis.
Rchb. 1828. Consp. p. 142: subdiv. Umbelliferar. genuinar. (costatar.) Gen. ut 1827 et Exoacantha? — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 218. Gen.: Lagoecia, Coriandrum, Atrema, Astomaea, Bifora. — Rchb. 1841. Nom. p. 138. Gen.: Coriandrum, Biforis, Cymbocarpum, Astomaea, Apiastrum, Atrema.
DC. 1830. Pr. IV. p. 249: trib. unica Coelospermar. Gen.: Bifora, Astoma, Atrema, Coriandrum. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 381. Gen. ead. et Cymbocarpum. — Koch 1836. Syn. p. 320. Ed. II. p. 352. Gen. ead. ac 1824. — Meisn. 1838. Gen. p. 151 (108). Gen. ut DC. (Astomaea loco Astomae.) — Endl. 1839. Gen. p. 792. Gen. ut Meisn. et Cympocarpum. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1415 et Ench. p. 381) Apiastrum, 1842 (Spl. II. p. 106) Schrenkia, Cryptodiscus et 1850 (Spl. V. p. 16) Hormosciadium. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 97. Gen. ut Endl. 1841.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 440: div. Coilospermar. Gen. ut Koch.

Coriandreae Koch cont.
Tausch 1834. Flora I. p. 342: subtrib. Ceramospermar. Gen. ead.
Brongn. 1843. En. genr. p. 114: trib. Campylospermear. Gen. ead.

Coriandridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 779: trib. Apiacear. Gen. Coriandrear. Endl. 1842 et Ormosciadium.

Coriandrineae Dietr. 1839. Syn. pl. I. p. 587: div. Campylospermar. Gen. Coriandrear. DC.

Coriandrum*) Tourn. 1700. Inst. p. 316. t. 168: g. pl. class. VII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 271. Ed. Hall. 1745. p. 285: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 78. n. 223; 1737. Cliff. p. 100; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 63; 1753. Sp. I. p. 256; 1759. Syst. ed. X. p 960. n. 318; 1762. Sp. ed. II. p. 367; 1764 Gen. ed. VI. p. 142. n. 356; 1767. Syst. ed. XII. p. 213. n. 353: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 237; 1784. Syst. p. 287. — Reich. 1778. Gen. p. 144. n. 386. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 191. n. 488. — Gmel. 1791. Syst. p. 486. — Pers. 1797. Syst. p. 303. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1448. n. 552; 1809. En. p. 317. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 93.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 56. n. 277: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 105.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 98. — Lour. 1790. Coch. I. p. 180. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 319. n. 709. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 22. 414.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Umbelliferar. — Par. Crantz 1767. Cl. Umbell. p. 95; 1769. Stirp. Austr. p. 210. — Scop. 1777. Intr. p. 116. — Juss. 1789. Gen. p. 220. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 16. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 469. — DC. 1805. Franç. IV. p. 292. — Hedw. 1806. Gen. p. 200. n. 824. — Hoffm. 1816. Umbell. ed. II. p. 186. — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 426. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 97. (Divis. 1.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 521. — Link 1821. En. I. p. 280. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 13. — Kunth 1824. Syn. III. p. 95. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Adans. 1763. Fam. II. p. 99: g. Daucor.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 93. t. 22. f. 2 (sativum).
Neck. 1790. El. I. p. 188. n. 318: g. Scadiophytor. Sejungitur Anidrum.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 634; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXVIII. 448; 1825. Syst. I. p. 893. n. 1053; 1830. Gen. I. p. 223. n. 1154: g. Smyrniear.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 82; 1836. Syn. p. 321. Ed. II. p. 353: g. Coriandrear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 363. — Rchb. 1828. Consp.

*) Nomen e Plinio.

Coriandrum Tourn. cont.
p. 142. n. 3701; 1832. Fl. exc. p. 440; 1837. Hdb. p. 218; 1841. Nom. p. 138. n. 5313. — DC. 1830. Pr. IV. p. 250. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 382. — Tausch 1834. Flora I. p. 342. — Meisn. 1838. Gen. p. 151 (108). — Endl. 1839. Gen. n. 4549. p 793; 1841. Ench. p. 381. — Brongn. 1843. En. genr. p. 114. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 367. — Parlat. .... in Webb Canar. II. p. 170. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 678. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 239.
Link 1829. Hdb. I. p. 341: g. Silerinar.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 141: g. Ceramospermear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 990: g. Coriandrinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Coriandridar.

Coriaria Nissole 1711. Act. Ac. Paris. p. 320. t. 12: nov. g. plant. (*Rhus myrtifolia monspeliaca C. Bauh.*)
Dill. 1719. Nov. gen. p. 158. t. 12.
Linn. 1737. Gen. p. 310. n. 761; 1737. Cliff. p. 462; 1748. Ups p. 299; 1753. Sp. II. p. 1037; 1759. Syst. ed. X. p. 1296. n. 1002; 1763. Sp. ed. II. p. 1467; 1764. Gen. ed. VI. p. 529. n. 1129; 1767. Syst. ed. XII. p. 658: g. Dioec. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 747; 1784. Syst. p. 891. — Reich. 1778. Gen. p. 525. n. 1235. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 698. n. 1540. — Pers. 1797. Syst. p. 933; 1807. Ench. II. p. 626. n. 2261. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 818. n. 1821; 1809. En. p. 1020. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 391. — Lois. 1827. Dict. v. 45. p. 11 (*Redon*).
Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 204. n. 458: g. Decandr. Pentagyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 728. — Cram. 1803. Disp. p. 113. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 440. n. 1741; 1830. Gen. I. p. 385. n. 1940.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 101. n. 422: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 219.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salsolar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 446: g. Cistor.
Linn. 1764. Ord. nat.: in Miscellanear. sect. 4. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 594.
Scop. 1777. Intr. p. 232: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 441: g. incertae sedis. Par. Vent. 1799. Tabl. IV. p. 3. — DC. 1805. Franç. IV. p. 920. — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 364.
Neck. 1790. El. III. p. 372. n. 1807: g. Osariphytor.
Link 1822. En. II. p. 430: g. Euphorbiaceis aff.
Agdh. 1823. Aphor. p. 195: g. Euphorbiacear.
DC. 1824. Pr. I. p. 739: g. Coriariear. — Par. HBK. 1825. Nov. gen VII. p. 167. t. 636. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 202. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII; 1828. Consp. p. 199. n. 5181; 1832. Fl. exc. p. 767; 1837. Hdb. p. 283; 1841. Nom. p. 197. n. 7533. — Bartl. 1830. Ord. p.

Coriaria Niss. cont.
361. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 818. — Link 1831. Hdb. II. p. 439. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 80. — Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40). — Endl. 1840. Gen. n. 5596. p. 1065; 1841. Ench. p. 558. — Schltd. 1842. Linnaea XVI. p. 485. — Brongn. 1843. En. genr. p. 82. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 475. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 331. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 44.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 239: g. Coriariacear.
Synon. Heterocladus Turcz.; Heterophylleia Turcz.

Coriariaceae Lemaire 1849 in Orb. Dict. IV. p. 239: ordo Malpighiaceis aff. Gen.: Coriaria.

Coriarieae DC. 1824. Prodr. I. p. 739: ordo (54) Thalamiflorar. Gen. unicum: Coriaria. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (apocarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 818.
HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 167: ordo pl. Gen. id.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII: subdiv. Ochnacear. Gen. id.
Rchb. 1828. Consp. p. 199 (1832. Fl. exc. p. 767); 1837. Hdb. p. 283; 1841. Nom. p. 197: subdiv. Simarubear. Gen. id. (et 1828 Pedicellia?)
Bartl. 1830. Ord. p. 361: ordo (210) Malpighinar. Gen.: Coriaria. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40). Gen. id.
Link 1831. Hdb. II. p. 439: ordo 11 Apetalar. Gen. id.
Lindl. 1833. Nix. p. 16: ordo unicus Corialium.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 79: fam. (37) Malpighinear. Gen. id.
Endl. 1840. Gen. p. 1065; 1841. Ench. p. 558: fam. Acerum. Gen. id.
Brongn. 1843. En. genr. p. 82: fam. Geranioidear. Gen. id.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 475: div. Ochnacear. Gen. id.
Chatin 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 264. 272: trib. Coriarinear.

Coriarineae Chatin 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 271: fam. ampliata. Trib.: Coriarieae, Limnantheae.

Corideae Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nomencl. p. 124: subdiv. Primulear. Gen.: Coris.

Coridiae Rchb. 1831. Fl. exc. p. 410: subdiv. Anagallidear. Gen.: Coris.

Coridium Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 358: sect. Hyperici. (H. empetrifolium W.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 210. n. 7994. 5.
Endl. 1840. Gen. p. 1033. n. 5464 *A b* †; 1841. Ench. p. 539. n. 5464 *B d* †: subsect. Hyperici.

Coridochloa „Nees" Meisn. Comm. p. 319 in synon. Urochloae: vid. *Caridochloa Nees.*

Corinaldia Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: nov. g. Corinaldiear. (Mertensia lumbricalis R.)
= Champia Lamx.

Corinaldieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Sphaerococcear. Gen.: Corinaldia.

Corindum Tourn. 1700. Inst. p. 431. t. 246: g. pl. class. XI. — Par. Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 273.
Adans. 1763. Fam. II. p. 388: g. Geranior.
Medic. 1787. Malv. p. 110: g. Monadelph. Octandr. (Cardiospermum Halicacabum L.)
Mönch 1794. Meth. p. 281: g. Thalamostemonis.
= Cardiospermum Linn.

Coringia Pers. 1807. Ench. II. p. 206: sect. Brassicae.
DC. 1821. Syst. II. p. 507; 1824. Pr. I. p. 199: sect. Erysimi. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 213. — Koch 1836. Syn. p. 53. Ed. II. p. 58.
Presl 1826. Sicul. I. p. 79: g. Sisymbrear.
Conf. Couringia (?) Heist.

Corinocarpus Poir. vid. *Corynocarpus Forst.*

Corinophoros Massalongo 1856. Flora I. p. 212: nov. g. Omphalariear.
= Peccania Massal.

Corinostylis A. Juss. vid. *Corynostylis Mart. & Zucc.*

Corioceratium Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 272: sect. Auriniae. (Alyssum gemonense et saxatile L.)

Corioderma Erhard 1849. Flora I. p. 249: subsect. Correiae.

Corion Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 208: nov. g. plant., ab Arenaria L. disjunctum.

Corion Link & Hoffmsg. 1820. Fl. portug. II. p. 457.
Link 1821. En. I. p. 280: g. Umbelliferar.
= Bifora Hoffm.

Coriospatha C. Koch 1857. Berl. Gartenz. p. 220: sect. Monsterae.

Coris*) Tourn. 1700. Inst. p. 652. t. 423 in App.: nov. g. plant.
Linn. 1737. Gen. p. 338. n. 846; 1737. Cliff. p. 68; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 46; 1753. Sp. I. p. 177; 1759. Syst. ed. X. p. 931. n. 216; 1762. Sp. ed. II. p. 252; 1764. Gen. ed. VI. p. 97. n. 243; 1767. Syst. ed. XII. p. 168. n. 242: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 182; 1784. Syst. p. 219. — Reich. 1778. Gen. p. 99. n. 260. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 131. n. 329. — Gmel. 1791. Syst. p. 377. — Pers. 1797. Syst. p. 228; 1805. Ench. I. p. 171. n. 387. — Willd. 1797. Sp. II. p. 1000. n. 374; 1809. En. p. 223.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 205. n. 848: g. Petalostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 96.
Adans. 1763. Fam. II. p. 207: g. Personatar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 137: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 188: g. Speciosar.
Neck. 1790. El. II. p. 26. n. 649: g. Darinyphytor.

*) Nomen ex Dioscoride.

Coris Tourn. cont.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 288: g. Primulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 220. — DC. 1805. Franç. III. p. 437. — Hedw. 1806. Gen. p. 94. n. 424. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XIII. 115. n. 650. — Link 1821. En. I. p. 156; 1829. Hdb. I. p. 407. — Bartl. 1830. Ord. p. 166. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 368.
Batsch 1802. Tab. p. 208: g. Anagallidear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 387; 1825. Syst. I. p. 570. n. 608; 1830. Gen. I. p. 136. n. 679: g. Primulear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 631. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 69. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 59.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL: g. Epacridear.
Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3101: g. Selaginear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 410: g. Coridiar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 124. n. 4822: g. Coridear.
Endl. 1839. Gen. n. 4211. p. 733; 1841. Ench. p. 356: g. Lysimachiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 242. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 465.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 646: g. Primulidar.

Corisandra Reissek 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 289: subg. Cryptandrae. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 269. — Simil. Endl. 1850. Spl. V. p. 85. n. 5742 *c*.

Corisanthera „Oersted Gesn. centroam." Müll. Ann. bot. V. p. 431: vid. *Chorisanthera Don.*

Corisantherae Juss. 1824. Dict. v. 30. p. 463: class. XI. Dicotyledonum. (Epicorollear.)

Corisantheria Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 76: subclass. Endogyniae. Ordines: Nantiandria, Polyspia, Sphanidia.

Corispermeae Link 1831. Handb. II. p. 407: ordo 4 Apetalar. Gen.: Corispermum, Agriophyllum.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. . . .; 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 138: trib. Cyclolobear. Gen. ead., Anthochlamys et (1849) Wallinia. — Par. A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 315. Gen. ead.
Meisn. 1841. Gen. p. 320 (232): subtrib. Chenopodiear. Gen. ut Link.

Corispermum*) „Juss." Dillen. 1719. Nov. gen. plant. p. 160. t. 12.
Linn. 1737. Gen. p. 1. n. 3; 1737. Cliff. p. 3; 1740. Syst. p. 16; 1748. Ups. p. 2; 1753. Sp. I. p. 4; 1759. Syst. ed. X. p. 844. n. 12; 1762. Sp. ed. II. p. 6; 1764. Gen. ed. VI. p. 6. n. 12; 1767. Syst. ed. XII. p. 52: g. Monandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 51; 1784. Syst. p. 53. — Reich. 1778. Gen. p. 6. n. 12. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 8. n. 16. — Gmel. 1791. Syst. p. 16. — Pers. 1797. Syst. p. 52; 1805. Ench. I. p. 5. n. 25. —

*) κόρις, cimex.

Corispermum Juss. cont.
Willd. 1797. Sp. I. p. 288. n. 26. — Vahl 1805. Enum. I. p. 15. n. 13. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 3. — Marsch.-Bieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 4. (restrict.) — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 281.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 1. n. 3: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 366.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Holeracear.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salsolar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 261: g. Blitor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 10: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 157: g. Dipetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 338: g. Defloratar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 361. t. 75. f. 7 (hyssopifolium).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 176; 1789. Phil. Bot. I. p. 24.
Neck. 1790. El. II. p. 199. n. 919: g. Sysellophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 261: g. Chenopodear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 397. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 311; 1825. Syst. I. p. 21. n. 44; 1830. Gen. I. p. 12. n. 42. — Agdh. 1825. Aphor. p. 215. — Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4324. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 27. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 125. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 312.
Batsch 1802. Tab. p. 172: g. Oleracear.
Cram. 1803. Disp. p. 15 in Diandr. Digyn. et p. 24 in Triandr. Digyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 6: g. Chenopodiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 7. 45. n. 38: g. Atriplicum.
Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 445: g. Atriplicear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI.
Link 1821. En. I. p. 7: g. Atriplicinar.
C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 9: g. Chenopodeis aff. (?) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1951. p. 300; 1841. Ench. p. 182. — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6405. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 213.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 603. Ed. II. p. 694.
Link 1831. Hdb. II. p. 407: g. Corispermear. — Par. Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 103; 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 140. — Meisn. 1841. Gen. p. 320 (232). — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 758.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 584; 1837. Hdb. p. 237: g. Amaranthear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 101: g. Cyclolobear.
Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 26: g. Camphorosmear.
Synon. Coryspermum Ant. Juss. 1712 et A. L. Juss. 1789.

Coristospermum Bertol. 1837. Fl. ital. III. p. 466.
Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5435: g. Seselinear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 363: sect. Cnidii.

Cormigonus Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 83: nov. g. Diervillariae. (Portlandia tetrandra.)
= Bikkia Reinw.

Cormonema*) „Reissek mss." Endl. 1840. Gen. n. 5727. p. 1098; 1841. Ench. p. 581: nov. g. Frangulear. (Caesia spinosa Fl. Flum.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5598. (genuinar.) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 243.
Meisn. 1843. Comm. p. 348: g. Rhamnear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.
Synon. Arrabidaea Steud.

Cormophorum Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 333: sect. Homochroospermi. (Carduus pycnocephalus, etc.)

Cormophyta Endl. 1836. Gen. p. 42; 1841. Ench. p. 23: regio altera plantar. Sect.: Acrobrya, Amphibrya, Acramphibrya. — Par. Unger 1838. Aphor. p.... (*Chorobrya*). Sect. eaed.

Cormothecium Massalongo 1854. Geneacaena Lich.: nov. g. Lichenum.
= Psora DC.? (Trevis.)

Cormus Spach 1834. Hist. vég. phan. II. p. 96 (*cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. III. 1835. p. 106): nov. g. Pomacear. (Sorbus domestica.) — Par. Römer 1847. Fam. nat. III. p. 103. 162.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 685: subg. Sorbi.

Cornacchinia**) Savi 1837. Mem. soc. Modena XXI. p. 179: nov. g. Verbenacear. *Cf.* Linnaea XIV. Litt. p. 85.
= Clerodendrum R. Brown.

Cornacchinia Endl. 1840. Nov. stirp. Mus. Vindob. p. 18 in adnot. (*Cornachina*); 1841. Gen. Suppl. I. n. 3437. p. 1397; 1841. Ench. p. 298: g. Periplocear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 366. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 246.
Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5064: g. Gymnantherear.
Synon. Brachylepis Wight & Arn.; Baeolepis Decne.

Cornaceae Link 1831. Handb. II. p. 2: ordo 2 Perigynar. Gen.: Cornus.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 49) 1847. Veg. kd. p. 782: ordo Umbellalium. Gen.: Benthamia, Cornus, Aucuba, Decostea, Pukateria, Corokia, Curtisia?, Mastixia?, Votomita?
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 86: fam (117) Umbelliflorar. Gen.: Aucuba, Cornus, Benthamidia, Benthamia, Mastyxia, Polyosmia, Marlea, Votomita?
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 649: ordo Dicotyledonum. Gen.: Cornus. —

*) *κορμός*, truncus.
**) Dicat. Marc. Cornacchini, prof. Pisano.

Cornaceae Link cont.
Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 246. Gen. fere ut Lindl.
Conf. Corneae HBK.

Cornachina Endl. vid. *Cornacchinia Endl.*

Cornales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 17: nixus Epigynar. Ordines: Hamamelideae, Corneae, Lorantheae.

Cornea Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 57. 83: nov. g. Fucor. (C. spinosa, filicina, etc.)
= Laurenciae Lamx. pars.

Corneae HBK. 1818. Nov. gen. am. III. p. 430: sect. Caprifoliacear. Gen.: Cornus. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 75. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 202. Gen. id.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. xxx: div. Dipsacear. Gen. id.
DC. 1830. Pr. IV. p. 271: ordo (95) Calyciflorar. Gen.: Cornus, Aucuba, Votomita, Mastixia, Polyosma. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 398. Gen. ead. exclusa Aucuba.
Rchb. 1862. Fl. exc. p. 485: div. Araliacear. Gen.: Cornus.
Lindl. 1833. Nix. p. 17: ordo Cornalium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 221: subdiv. Cissear. Gen. ut DC. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. Gen. ut Endl.
Meisn. 1838. Gen. p. 153 (110): ordo 104 plant. (p. 440 Umbelliflorar.) Gen. ut DC. et Benthamia.
Endl. 1839. Gen. p. 798; 1841. Ench. p. 396: ordo Discanthar. Gen.: Benthamia, Cornus. *Affinia*: Aucuba, Decostea. *Dubia*: Curtisia, Mastixia, Polyosma, Votomita. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 17. Subord.: *verae* (Gen.: Benthamia, Cornus, Curtisia, Alangium, Marlea), Aucubeae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 114: fam. Umbellinear. Gen.: Benthamia, Cornus, Aucuba, Curtisia.

Cornelia Arduin. 1764. Specim. II. p. 9. t. 1. *Cf.* Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 469. (Hard. Spec. II. p. 1. t. 1 ex DC. Pr. III. p. 77.)
Endl. 1840. Gen. n. 6146 *b*. p. 1200; 1841. Ench. p. 643: sect. Ammanniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6642. 2. — Walp. 1843. Rep. II. p. 102. — Blume 1855. Mus. bot. Lugd. II. p. 132.
Synon. Haplocarpaea et Ditheca Wight & Arn.

Cornicia „DC." Steud. Nomencl. I. p. 421: sphalm. pro *Cornicina*.

Cornicina DC. 1825. Prodr. II. p. 170 (Leg. mém. VI.): sect. Anthyllidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4025 *a*; 1841. Nom. p. 151. n. 5909. 1. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 166. — Kunth 1838. Berol. I. p. 221 (*Corvicina* — an genus proprium?). — Endl. 1840. Gen. n. 6506 *d*. p. 1267; 1841. Ench. p. 668.
Boiss. 1843. Diagn. pl. nov. or. I. Nr. 2. p. 15: g. Leguminosar. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 243.

Cornicina DC. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Trifoliear.
Conf. Hymenocarpus Savi; Circinus Medic.

Cornicularia Hoffm. 1789. Pl. lichen. t. 34. f. 1.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 768: sect. Lichenis. (Corniculatus Hall.) — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 831.
Achar. 1798. Lich. suec. p. 212: g. Lichenum (caulescentium). *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 10. p. 475. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 328; 1815. V. p. 179. — Mart. 1817. Erlang. p. 236. (scutellator.)
Achar. 1803. Meth. Lich. p. xxxv: g. Coenothalamor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 313.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 42: g. Coenothalamior.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 124. 610; 1814. Syn. Lich. p. 299: g. Peltator.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 404: g. Ramalinidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 93: g. Ramalinear.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 20: g. Parmeliacear. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 330.
Fries 1825. Pl. homon. p. 235: sect. Usneae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 410 *c*.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 188: g. Hymenocarpor.
Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 405 *c*; 1841. Nom. p. 16. n. 565. 1: sect. Cetrariae. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 175 *b*. p. 16; 1841. Ench. p. 11.
Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 409 *c*: sect. Everniae. — Par. Fries 1831. Lich. eur. p. 1. 20.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 118: g. Usneacear. — Par. Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 3; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 7.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349: g. Usneear.
Bayrh. 1849. Taun. p. 60: g. Peltopsorar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 4: g. Cornicularior.
Bonord. 1851. Hdb. p. 166: g. Clavariaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 110: g. Lichenear. sect. 2.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 12 (Flora 1854. p. 235): g. Cornicularicar.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 352: g. Usnear. — Par. Arnold 1858. Flora I. p. 101.
Synon. Coelocaulon Link.

Cornicularieae Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 12 (Flora 1854. p. 235): trib. Phylloidear. Gen.: Platysma, Cornicularia.

Cornicularii Schärer 1850. En. Lich eur. p. 4: fam. Lichenum discoideor. Gen.: Cornicularia, Roccella, Ramalina, Physcia.

Corniculatae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. xliii: series Confinium. Fam.: Corniculatae, Loaseae, Cacteae.
= Sediflorae Rchb.

Corniculatae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. L: fam. Corniculatar. Divis.: Sedeae, Saxifrageae, Cunoniaceae, Bruniaceae.
Rchb. 1828. Consp. p. 158; 1832. Fl. exc. p. 545: fam. Sediflorar. Divis.: Crassulaceae, Saxifrageae, Bruniaceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 229; 1841. Nom. p. 157. Divis.: Saxifragariae, Crassulariae, Cunoniariae.
Endl. 1839. Gen. p. 808; 1841. Ench. p. 404: class. Acramphibryor. dialypetalor. Ord.: Crassulaceae, Francoaceae, Cephaloteae, Saxifragaceae, Rousseaceae, Brexiaceae, Ribesiaceae.
Meisn. 1843. Gen. p. 440: class. XVII. Diplochlamydear. Ord.: Saxifragaceae, Crassulaceae, Surianeae, Francoaceae, Ficoideae.

Cornidia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 53. t. 35 (et Fl. peruv. IV. t. 335 ined.): nov. g. Octandr. Trigyn. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 477.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 132: g. Saxifrageis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 284. n. 1141.
Hook. & Arn. 1833. Bot. Miscell. III. p. 344.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 234: g. Hydrangear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4671. p. 821; 1841. Ench. p. 409. — Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6169. — Walp. 1843. Rep. II. p. 377. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 251.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 10. t. 17: g. Hydrangeae proximum.
Guillem. 1837 in Deless. Icon. sel. III. p. 46. t. 79: g. Saxifragacear.
Meisn. 1838. Gen. p. 137 (100): g. Hydrangeacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 570.
Synon. Sarcostyles Presl.

Corniola Adans. 1763. Fam. II. p. 321: g. Genistar. (Genista tinctoria L.)
Medic. (Vorles. II. p. 342) 1789. Phil. Bot. I. p. 203: genus adoptat. — Par. Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 566.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 221: g. Genistear.
= Genistae Linn. pars.

Corniola Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 596. 637: nov. g. Merulidear. (Merulius muscigenus With. et lobatus Pers.)
= Collybia Fries?

Cornion Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 103: sect. Corni. (C. suecica et canadensis.)
= Arctocrania Endl.

Cornucopia Adans. 1763. Fam. II. p. 31: g. Phalaridum.
Scop. 1777. Intr. p. 74: g. Graminum legitimor.
Neck. 1790. El. III. p. 213. n. 1583: g. Achyrophytor.
= seq.

Cornucopiae Linn. 1737. Gen. p. 13. n. 35; 1737. Cliff. p. 490; 1740. Syst. p. 17; 1753. Sp. I. p. 54; 1759. Syst. ed. X. p. 869. n. 67; 1762. Sp. ed. II. p. 79; 1764. Gen. ed. VI. p. 31. n. 72; 1767. Syst. ed. XII. p. 85: g. Triandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 88; 1784. Syst. p. 103. — Reich. 1778. Gen. p. 33. n. 78. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 44. n. 101. — Gmel. 1791. Syst. p. 151. — Pers. 1797. Syst. p. 105. — Willd. 1797. Sp. I. p. 319. n. 120. — Vahl 1806. Enum. II. p. 392. n. 129. — Trin. 1820. Fund. p. 99.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 16. n. 55: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1802. Suppl. p. 66.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 135. — Link 1821. En. I. p. 40.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 33. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 89. — Hedw. 1806. Gen. p. 37. 362. — Palis. 1812. Agrost. p. 3. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 9. 251. n. 199. — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 332 (*Coqueluchiole*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 239. n. 248; 1830. Gen. I. p. 56. n. 273. — Link 1829. Hdb. I. p. 30.
Pers. 1805. Ench. I. p. 71. n. 133 in Triandr. Monogyn.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Agrostidear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 150. — Agdh. 1823. Aphor. p. 148.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 671): g. Vilfaceor.
Link 1827. Hort. I. p. 73: g. Phalaridear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 941; 1841. Nom. p. 36. n. 1241. — Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Kunth 1830. Gram. p. 4; 1833. Agrost. p. 21. — Endl. 1836. Gen. n. 744. p. 80; 1841. Ench. p. 56. — Meisn. 1843. Gen. p. 415 (318). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 251. — Steud. 1854. Glum. I. p. 9.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 131. 234: g. Phalaroidear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 11: g. Panicear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.
Synon. Cornucopia Adans.

Cornulaca*) Delile 1813. Fl. Aegypt. p. 312. t. 22; 1824. Descr. de l'Eg. XIX. p. 234: nov. g. Pentandr. Digyn.
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 485: g. Atriplicear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. XXIV. 251.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 816. n. 920; 1830. Gen. I. p. 199. n. 1009: g. Chenopodear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4329. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 865.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.
Moq.-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 211 (*Cornulacea*): g. Salsolear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234).
Endl. 1837. Gen. n. 1948. p. 299; 1841. Ench. p. 182: g. Anabasear. — Par.

*) Dicat. Jos. Cornido.

*) Nomen synonymum Tragi vel Salsolae apud Dioscoridem.

Cornulaca Delile cont.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. mon. p. 162; 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 218. — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6402. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 252.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.

Cornulacea Moq.-Tand. vid. *praeced.*

Cornus Tourn. 1700. Inst. p. 641. t. 410: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 81. Ed. Hall. 1745. p. 92: g. pl. class. IV.
Linn. 1737. Gen. p. 29. n. 80; 1737. Cliff. p. 38; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 29; 1753. Sp. I. p. 117; 1759. Syst. ed. X. p. 897. n. 139; 1762. Sp. ed. II. p. 171; 1764. Gen. ed. VI. p. 59. n. 149; 1767. Syst. ed. XII. p. 124: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 112. — Murr. 1774. Syst. p. 134; 1784. Syst. p. 159. — Reich. 1778. Gen. p. 60. n. 155. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 62. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 80. n. 194. — Pers. 1797. Syst. p. 164; 1805. Ench. I. p. 143. n. 296. — Willd. 1797. Sp. I. p. 660. n. 228; 1809. En. p. 164. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 98. — Wall. 1820 in Roxb. Ind. I. p. 432. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 818. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 375. 449.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 463: g. Stellatar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat. — Gis. 1792. Prael. p. 520.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 28. n. 110: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 107.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Dipsacear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 158: g. Caprifolior. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 214. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 622; 1825. Syst. I. p. 450. n. 474; 1830. Gen. I. p. 100. n. 499. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 149. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 503.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 163: g. Fructiflorar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172⁵: g. Tetrapetalar.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 34: g. inter Galia, Scabiosas et Sambucos intermedium.
Scop. 1777. Intr. p. 107: g. Strictar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 126. t. 26. f. 4 (sanguinea et mascula).
Herit. 1788. Monogr. (fol.)
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 298; 1789. Phil. Bot. I. p. 150.
Neck. 1790. El. II. p. 367. n. 1173: g. Osariphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 605: g. Caprifoliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 460. — DC. 1805. Franç. IV. p. 277. — Hedw. 1806. Gen. p. 69. n. 334. — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 479. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 18. 318. n. 513. — Link 1821. En. I. p. 140. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 490. — D. Don 1825. Nepal. p. 140.
Batsch 1802. Tab. p. 44: g. Hederacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 239.
Cram. 1803. Disp. p. 56 in Pentandr. Monogyn. (C. albida.)

Cornus Tourn. cont.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 888: g. Caprifoliear.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 430: g. Cornear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 75; 1838. Berol. I. p. 292. — DC. 1830. Pr. IV. p. 271. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 202; 1832. ibid. p. 485; 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 143. n. 5562. Sect. ut Endl. (Cornus loco Thelycraniae.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 398. — Koch 1836. Syn. p. 322. Ed. II. p. 354. — Meisn. 1838. Gen. p. 153 (110). — Endl. 1839. Gen. n. 4574. p. 798; 1841. Ench. p. 397. Sect.: Arctocrania, Tanycrania, Thelycrania. — Brongn. 1843. En. genr. p. 114. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 388. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 377. Sect.: Orctocrania, Tanycrania, Thalycrania. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 2.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 98: g. inter Stellatas et Dumosas fere medium.
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1944: g. Schraderear.
Link 1831. Hdb. II. p. 3: g. Cornacear. — Par. Lindl. 1836. Nat. syst. p. 49; 1847. Veg. kd. p. 783. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 90. Sect.: Microcarpium, Macrocarpium, Cornion. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 649. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 251 (*Cornouillier*).
Synon. Ossea Riv., Rupp.; Virga sanguinea Dill.

Cornus Catesb. (ubi?)
= Bumelia Swartz. (Hedw. Gen. p. 116.)

Cornuta Linn. 1764 vid. *seq.*

Cornutia*) Plumier 1703. Gen. p. 32. t. 17. (Icon. p. 96 t. 106. f. 1.)
Linn. 1737. Cliff. p. 319; 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 303. n. 633; 1753. Sp. II. p. 628; 1759. Syst. ed. X. p. 1116. n. 684; 1763. Sp. ed. II. p. 875; 1764. Gen. ed. VI. p. 316. n. 766 (*Cornuta*); 1767. Syst. ed. XII. p. 418: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 474; 1784. Syst. p. 567. — Reich. 1778. Gen. p. 318. n. 825. — Lour. 1790. Coch. II. p. 387. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 414. n. 1028. — Gmel. 1791. Syst. p. 946. — Pers. 1797. Syst. p. 603; 1807. Ench. II. p. 143. n. 1439. — Willd. 1800. Sp. III. p. 322. n. 1167; 1809. En. p. 652.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 181. n. 746: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 170. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Verbenar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 199.
Hill 1769. Ht. kew. p. 276: g. Monopetalar. irregular.
Juss. 1789. Gen. p. 107: g. Viticum.

*) Dicat. Jacobo Cornuto, Enchiridii parisiensis auctori.

Cornutia Plum. cont.
Neck. 1790. El. I. p. 352. n. 550: g. Chasmatophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 319: g. Pyrenacear.
Duchesne 1804. Dict. v. 1. p. 299 (*Agnante*): g. Verbenacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 247. — Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 423; 1830. Gen. I. p. 20. n. 76: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2916.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 39. n. 74: g. Viticear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 680.
Endl. 1838. Gen. n. 3714. p. 638; 1841. Ench. p. 312: g. Aegiphilear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 292 (200). — Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4215. — Brongn. 1843. En. genr. p. 65. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 125. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 252.
Synon. Agnanthus Vaill. Conf. Hosta Jacq.
Cornutia N. L. Burm. 1768. Fl. ind. t. 41.
= Premna Linn.
Cornutia Gärtn. 1805. Fruct. III. p. 173. t. 213.
Bot. Mag. t. 2611.
= Hosta Jacq.
Cornutioides Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 195. n. 416: g. Didynam. obscurum. (*Mindi, Midi Herm.* zeyl. 14.)
= ?
Corocephalus Dietr. vid. *Conocephalus Blume.*
Corokia*) A. Cunningh. 1839. Ann. nat. hist. III. Jun. p. 249: nov. g. Rhamneis aff. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5751. p. 1103; 1841. Ench. p. 582. — Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5609. — Meisn. 1843. Comm. p. 349. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 252.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 783: g. Cornacear.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 359: g. Cornear. — Par. Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 98. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 90.
Endl. 1850. Spl. V. p. 18. n. 4578/1 (*Corckia*): g. Aucubear.
Corollaeflorae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 1.
= seq.
Corolliflorae DC. 1818. Syst. I. p. 124; 1819. Théor. élém. p. 246; 1844. Prodr. VIII. p. 1: tertia subclass. Dicotyledonear. Ordines: Lentibularieae, Primulaceae, Myrsineaceae, Aegiceraceae, Theophrastaceae, Sapotaceae, Ebenaceae, Styracaceae, Oleaceae, Jasmineae, Apocynaceae, Asclepiadeae.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 1: series prima Dicotyledonear. Classes: Seminiflorae, Annuliflorae, Tubiflorae.
Corona Imperialis Tourn. 1700. Inst. p. 372. t. 197. 198: g. pl. class. IX.

*) Nomen vernaculum *Korokia-taranga.*

Corona Imperialis Tourn. cont.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 135. Ed. Hall. 1745. p. 148: g. pl. class. VI.
= Petilium Linn.
Corona Regalis Dillen. 1732. Hort. Eltham. t. 92. 93.
= Eucomis L'Herit.
Corona Solis Tourn. 1700. Inst. p. 489. t. 279: g. pl. class. XIV.
Vaill. 1720. Act. Ac. Paris. p. 333: g. Corymbiferar.
= Helianthus Linn.
Coronales Batsch 1802. Tab. affin. p. 144: ordo Liliacear. Fam.: Bulbiflorae, Liria, Leucojaceae, Tubiflorae.
Coronaria Linn. 1737. Gen. p. 135. n. 380; 1737. Ht. Cliff. p. 174; 1740. Syst. p. 23; 1742. Gen. ed. II. p. 200. n. 450; 1748. Upsal. p. 115: g. Decandr. Monogyn., serius Agrostemmati insertum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Caryophylleor.
Adans. 1763. Fam. II. p. (22): g. Alsinium. (Spec.: Agrostemma coronaria et flos jovis L.)
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 52.
A. Braun 1843. Flora p. 367: g. Lychnidear. Sect.: Pseudagrostemma, Coccyganthe.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498: g. Silenear.
Synon. Muscipula Rchb.
Coronaria Adans. 1763. Fam. II. p. 254: g. Alsinium, serius p. (22) *Flox* dictum. (*Synon. Lychnis Moris.* S. 5. t. 36. f. 2.)
= ?
Coronaria Fries 1842 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora p. 122: g. Silenear. (Agrostemma coeli rosa), serius Auctori *Pontinia* dictum.
= Eudianthe Rchb.
Coronariae Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: ordo 9 plantar. Gen.: Ornithogalum, Scilla, Hyacinthus, Asphodelus, Anthericum, Polianthes.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 10 plant. Gen.: Polianthes, Asphodelus, Albuca, Cyanella, Ornithogalum, Scilla, Hyacinthus, Alethris, Aloë, Yucca, Agave, Bromelia, Tillandsia, Burmannia, Hypoxis, Hemerocallis, Anthericum, Veratrum, Melanthium, Helonias, Fritillaria, Lilium, Tulipa. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283. Gen. ead. et Lanaria, Lachenalia, Phormium, Hepetis, Wurmbea, Eucomis.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 231: fam. 19 plant. Ordines: Liliaceae, Spathaceae, Commelineae, Bromeliae.
Agdh. 1823. Aphor. p. 165; 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 585: ordo Liliiflorar. Gen.: Lilium, Tulipa, Fritillaria, Erythronium, Bulbocodium, Callixene, Gloriosa, Lichtensteinia, Yucca. Subordo: Hemerocallideae.
Eckl. 1827. Verz. p. 1: fam. plant. Ord.: Liliaceae, Haemodoreae, Spathaceae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. xxiv; 1828. Consp. p. 65; 1830. Fl. exc. p. 101: fam. Liliacear. Divis.: Methoniceae, Tulipaceae, Asphodeleae. — Par. Rchb. 1837. Hdb.

Coronariae Linn. cont. p. 153. Divis.: Hemerocallideae, Tulipaceae, Asphodeleae.
Endl. 1837. Gen. p. 129; 1841. Ench. p. 74: class. Amphibryor. Ordines: Juncaceae, Philydreae, Melanthaceae, Pontederaceae, Liliaceae, Smilaceae. *Cf.* Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 253. — Par. Unger 1845. Syn. p. 168; 1846. Chlor. prot. p. LXVI.
Meisn. 1842. Gen. p. 397. 442 (300): class. (45) Monocotyledonear. Ordines: Pontederiaceae, Liliaceae, Dioscoreaceae, Ophiopogoneae, Taccaceae, Melanthaceae, Juncaceae, Philydreae.

Coronatrices Linn. 1747. Class. plant. p. 419: ordo 8 methodus calycinae. Gen.: Linnaea, Corymbium, Aristolochia, etc.

Corone „Hoffmsg." Rchb. 1832. Fl. exc. p. 812: sect. Silenes. (S. gallica, silvestris, anglica, cerastoides, brachypetala, nocturna.)
= Stachymorpha Otth.

Coronia Ehrenb. 1840. Ber. Berl. Ak. p. 206: sect. Campylodisci.
= Campylodisci Ehrenb. sp.

Coronida Dochnahl 1855. Obstk. I. p. 293: g. Malorum. (*Kronapfel.*)

Coronilla Tourn. 1700. Inst. p. 650. t. 419: g. pl. class. XXII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 257. Ed. Hall. 1745. p. 267: g. pl. class. XI.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 209.
Neck. 1790. El. III. p. 18. n. 1319: g. Cyteophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 120: g. Thalamostemonis.
Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 121: g. Leguminosar.
DC. 1825. Pr. II. p. 309: sect. Coronillae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3978 *a*; 1841. Nom. p. 152. n. 5951. 1. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 274. — Koch 1836. Syn. p. 187. Ed. II. p. 208. — Endl. 1840. Gen. n. 6585 *b*. p. 1280; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 695.
= Coronillae Linn. pars.

Coronilla Linn. 1737. Gen. p. 227. n. 599; 1737. Cliff. p. 363; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 234; 1753. Sp. II. p. 742; 1759. Syst. ed. X. p. 1168. n. 789; 1763. Sp. ed. II. p. 1046; 1764. Gen. ed. VI. p. 380. n. 883; 1767. Syst. ed. XII. p. 491: g. Diadelph. Decandr. (ampliat.) — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 71. — Murr. 1774. Syst. p. 557; 1784. Syst. p. 669. — Reich. 1778. Gen. p. 379. n. 956. — Lour. 1790. Coch. II. p. 452. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 502. n. 1198. — Gmel. 1791. Syst. p. 1118. — Pers. 1797. Syst. p. 707; 1807. Ench. II. p. 313. n. 1728. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1145. n. 1367; 1809. En. p. 773.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 573: g. Leguminosar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 307. — Juss. 1789. Gen. p. 361. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 422. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 237. — DC. 1805. Franç. IV. p. 605; 1815. V. p. 583. — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 494. — Link 1822. En. II. p. 244. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 324. n. 2602; 1831. Gen. II. p. 595. n. 2937. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 432. 556.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 137. n. 577: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 430. — Gis. 1792. Prael. p. 415. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 459.
Adans. 1763. Fam. II. p. 328: g. Coronillar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 289: g. Tetrapetalar. irregular.
Rebent. 1804. Neom. p. 185: g. Decandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 758: g. Coronillear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 133. — DC. 1825. Pr. II. p. 309. Sect.: Emerus, Coronilla. — Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3978; 1832. Fl. exc. p. 541; 1841. Nom. p. 152. n. 5951. Sect. eaed. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 274. Sect. eaed. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 280. — Koch 1836. Syn. p. 187. Ed. II. p. 208. Sect. eaed. — Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). — Kunth 1838. Berol. I. p. 238. — Endl. 1840. Gen. n. 6585. p. 1280; 1841. Ench. p. 670. Sect. eaed. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 694. Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 253.
Link 1831. Hdb. II. p. 209: g. Hedysarear. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 61. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 129. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 493.
Synon. Coronilla et Emerus Tourn.; Securidaca Riv., Rupp.

Coronillae Adans. 1763. Fam. II. p. 327: sect. 5 Leguminosar. Gen.: Aldina, Hedysarum, Gajati, Hippocrepis, Coronilla, Ornithopodium, Alhagi, Scorpioides.

Coronilleae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 758: div. Leguminosar. Gen.: Coronilla, Aeschynomene, Smithia, Ornithopus, Scorpiurus, Hippocrepis, Hedysarum, Zornia, Müllera, Diphysa, Nissolia.
Bronn 1822. Diss. p. 133: subtrib. Curvembryar. diadelphar. Gen.: Alhagi, Onobrychis, Flemmingia, Hallia, Lespedeza, Zornia, Stylosanthes, Christia, Hedysarum, Scorpiurus, Hippocrepis, Ornithopus, Coronilla, Ormocarpum, Smithia, Patagonium, Aeschynomene, Sesbania.
DC. 1825. Pr. II. p. 308: subtrib. Hedysarear. Gen.: Scorpiurus, Coronilla, Astrolobium, Ornithopus, Hippocrepis, Securigera. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 99. 273. Gen. ead. — Koch 1836. Syn. p. 187. Ed. II. p. 207. Gen. ead. (praeter Astrolobium.) — Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). Gen. ut DC. — Endl. 1840. Gen. p. 1280; 1841. Ench. p. 670. Gen. ut Rchb. 1828. Accedunt

Coronilleae Spreng. cont.
1842 (Spl. II. p. 96) Antopetitia et 1843 (Spl. III. p. 103) Hammatolobium. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 270. Gen. ut Endl. 1843.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVII: subdiv. Hedysarear. Gen. ut DC. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 151; 1832. Fl. exc. p. 540; 1837. Hdb. p. 226; 1841. Nom. p. 152. Gen.: Scorpiurus, Coronilla, Arthrolobium, Ornithopus, Hippocrepis, Bonaveria. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. Gen. ut DC. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155. 279. Gen. ead.

Coronocarpus Schumacher 1827. Beskriv. Guin. pl.; 1829. Danske Vid. Selsk. Afh. IV. p. 167: nov. g. plant. (C. helianthoides = Wedelia africana Pers ?)
Benth. 1849. Niger Fl. p. 433: g. Ecliptear.? An Coreopsidear.? (Blainvilleae, Wedeliae et Viguierae aff.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 845: g. Ecliptear. (*Synon. Harpephora Endl.*)
Synon. Dipterotheca Schultz.

Coronopifolia Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 57. 85; 1816. Ner. brit. Ed. alt.: nov. g. Fucor. (C. cartilaginea.) *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 10. p. 498 et Spreng. 1820. N. Entd. I. p. 97.
= Rhynchococcus Kütz.

Coronopus*) Tourn. 1700. Inst. p. 128. t. 49: g. pl class. II.
Cram. 1803. Disp. p. 12: g. Diandr. Monogyn.
DC. 1805. Franç. III. p. 417: sect. Plantaginis. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 394. — Koch 1837. Syn. p. 599. Ed. II. p. 689. — Endl. 1838. Gen. n. 2170 *b*. p. 348; 1841. Ench. p. 223. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 305. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 479. — (Gren. &) Godr. 1850. France II p. 722. — Decne 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 729.
Rchb 1837. Hdb. p. 202; 1841. Nom. p. 122. n. 4780: g. Plantagear.
Synon. Asterogeum Gray; Eriantha Barn.

Coronopus Rupp. 1718. Fl. jen. p. 77. Ed. Hall. 1745. p. 86: g. pl. class. IV.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 542: g. Tetrapetalar. cruciatar.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 293. t. 242.
Mönch 1794. Meth. p. 220: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 109: g. Alyssoidear.
Smith 1800. Fl brit. II. p. 591.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 420. 472: g. Tetradynam. (Pericarpiferar.) — Par. Marsch.-Bieb. 1808. Taur. cauc. II. p. 92. (Siliculos.) — Nutt. 1818. Gen. II. p. 64. — Elliott 1822. Sketch II. p. 139.
St. Hil. 1805 Expos. I. p. 507: g. Cruciferar. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 703. — Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 474. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew.

Coronopus Rupp. cont.
ed. sec. IV. p. 76. (Verm. bot. Schr. V. p. 9.) — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 496. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 689. Sect.: Coronopus, Senebiera.
Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 483: g. Siliculosar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 723. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 408. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1101. 1119. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 188. 202.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 337: g. Nauciferar.
Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4749 *b*: sect. Senebierae.
Webb 1836. Canar. I. p. 95: g. Iberidear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 577: g. Carcerulosar.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 31: g. Lepidinear.
A. Spreng. 1848. Fl. Hall. p. 327. 331: g. Brachycarpaear.
Conf. Carara Medic.

Coropsis Adans. vid. *Coreopsis Linn.*

Corothamnus Koch 1839. Deutschl. Fl. V. p. 92; 1843. Syn. ed. II. p. 166: sect. Genistae. (G. prostrata L.)
Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. III. p. 567: g. Genistear. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 220.

Corozo Jacquin 1763. Stirp. Amer. hist. p. 282. t. 171. f. 4. (Palma incolis sic dicta.)
Gis. 1792. Prael. p. 42: g. Palmar.
= Elaeis Jacq.

Corpodetes Rchb. vid. *Carpodetes Herb.*

Corradoria Martius 1825. Fl. Bras. I. p. 16. (An *Carradoria*? ex Kütz. Spec. p. 828.)
= Polysiphonia Grev. (Endl.)

Corradoria*) Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 131: nov. g. Caulerpear. (Caulerpa pinnata, plumaris Agdh., etc.)
Synon. Ptilerpa Harv.

Corradorus „Gray" Endl. in synon. Hydruri: vid. *Carrodorus Gray.*

Corraea Edwards 1815. Botan. Regist. I. nr. 3: g. Octandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 668: g. Diosmear. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 181. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 790.
Link 1821. En. I. p. 382: g. Rutacear.
= Correa Smith.

Correa**) Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 219. (An *Corraea*? ex Reuss Rep. comm. II. p. 10.)
Willd. 1799. Sp. II. p. 324. n. 741; 1809. En. p. 411: g. Octandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 419. n. 959.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 106: g. Rutaceis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 268. n. 1078 (et p. 277. n. 1114 denuo inter Rhodoraceas: *Corraea*).
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 155. t. 210.

*) κορώνη, cornix; πούς, pes.

*) Dicat. G. Corradori, botanico toscanensi.
**) Dicat. Joao Franc. Correa de Serra.

Correa Smith cont.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 35): g. Diosmear. — Par. DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140; 1824. Pr. I. p. 719. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 478; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 256. — Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5173. — Meisn. 1837. Gen. p. 60 (44). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 83.
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 554: g. Rutaceear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 215. n. 1436; 1830. Gen. I. p. 303. n. 1551. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227. 1269. — Colla 1843. Obs. s. la fam. d. Rutacées, etc.
Bartl. 1830. Ord. p. 388: g. Boroniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 335. — Rchb. 1837. Hdb. p. 283. — Endl. 1840. Gen. n. 6012. p. 1156; 1841. Ench. p. 612. — Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7523. Sect.: Correa, Automarchia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Synon. Antommarchia Colla (Antomachia Steud., Antomarchia Link); Mazeutoxeron Labill.; (Mazentoxeron Wittst.); Corraea Edw., Spreng.; Correas Hfmsg.; Euphocarpus Anders. (Steud.)
Correas Hoffmsg. 1824. Verzeichn. I. p. 168: nomen pro *Correa* propositum. *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 229.
= Correa Smith.
Correia Vellozo ex Vand. 1788. Dicc.; 1796 in Röm. Script. p. 106. t. 6. f. 11: nov. g. Decandr. Monogyn.
Erhard 1849 Flora I. p. 241: sect. Gomphiae. Subsect.: Xyloderma, Corioderma, Leptoderma.
= Gomphiae Schreb. pars.
Correoides Endl. 1840. Gen. n. 6009 *a*. p. 1156; 1841. Ench. p. 612: sect. Phebalii.
Corrigiola*) Dillen. 1719. Nov. gen. p. 169: nov. g. herbae Gymnomonospermae.
Linn. 1737. Gen. p. 340. n. 851; 1737. Cliff. p. 112; 1740. Syst. p. 21; 1753. Sp. I. p. 271; 1759. Syst. ed. X. p. 965. n. 340; 1762. Sp. ed. II. p. 388; 1764. Gen. ed. VI. p. 149. n. 378; 1767. Syst. ed. XII. p. 220. n. 375: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 245; 1784. Syst. p. 297. — Reich. 1778. Gen. p. 152. n. 409. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 202. n. 516. — Gmel. 1791. Syst. p. 505. — Pers. 1797. Syst. p. 315; 1805. Ench. I. p. 329. n. 738. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1506. n. 578; 1809. En. p. 330. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 233. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 25. 451.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 391: g. Dicotyledonum, Diplostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 40. n. 158: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 54.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.
Scop. 1777. Intr. p. 332: g. Caryophyllear.

*) Corrigiola synonymon Polygoni. (Ht. Cliff.)

Corrigiola Dillen. cont.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 358. t. 75. f. 3 (littoralis).
Juss. 1789. Gen. p. 313: g. Portulacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 262. — Batsch 1802. Tab. p. 36. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 140. — DC. 1805. Franç. IV. p. 401; 1815. V. p. 527. — Hedw. 1806. Gen. p. 210. n. 862. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 898. — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 566. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 841. — Link 1821. En. I. p. 292.
Neck. 1790. El. II. p. 155. n. 848: g. Catotaphytor.
Cram. 1803. Disp. p. 62 in Pentandr. Digyn.
Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 390: g. Paronychieis aff.
Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIV. 683: g. Paronychiear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 942. n. 1120; 1830. Gen. I. p. 233. n. 1224. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1009. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 216.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 547: g. Paronychidear. verar.
Bartl. 1825. Beitr. II. p. 157; 1830. Ord. p. 302: g. Telephiear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 366. — Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4300; 1832. Fl. exc. p. 574; 1837. Hdb. p. 237; 1841. Nom. p. 163. n. 6335.— G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 86. — Koch 1836. Syn. p. 253. Ed. II. p. 279. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 238. — Meisn. 1838. Gen. p. 132 (96). — Kunth 1838. Berol. I. p. 142. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 105.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: g. Corrigiolacear.
Link 1831. Hdb. II. p. 45: g. Telephiacear.
Endl. 1839. Gen. n. 5197. p. 956; 1841. Ench. p. 504: g. Corrigiolear. — Par. Fenzl 1844 in Ledeb. Ross. II. p. 158. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 256.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.
Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 613: g. Illecebrear.
Synon. Polygonifolia Vaill.
Corrigiolaceae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LI: div. Portulacear. Gen.: Corrigiola, Telephium.
Corrigioleae Endl. 1839. Gen. p. 956; 1841. Ench. p. 504: subtrib. Illecebrear. Gen. unicum: Corrigiola.
Corruda Webb 1850. Phytogr. Canar. III. p. 326: sect. Asparagi. (A. umbellatus Link.)
Corsinia*) Raddi 1818. Opusc. scient. Bologn. II. p. 354; 1820. Mem. soc. Moden. XVIII. p. 17: nov. g. Hepaticar. (Riccia coriandrina Spreng.) — Par. Lindenb. 1829. Syn. Hepat. p. 114; 1833. Flora I. p. 161.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 236. n. 3354; 1831. Gen. II. p. 740. n. 3749: g. Muscor. hepaticor.

*) Dicat. principi Thomae Corsini.

Corsinia Raddi cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 523: g. Epiphyllinor.
Corda 1829 in Opiz Beitr. I; 1830 in Sturm Jungerm. p. 5: g. Corsiniacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Dysbryor.
Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 7: g. Ricciacear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 457. p. 43; 1841. Ench. p. 25. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 57.
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 22: g. Corsiniear. — Par. Bory & Mont. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 235. — Nees 1846. Syn. Hepat. p. 596.
Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 1037. 1038: g. Ricciear. — Par. Lindenb. 1836. Nov. Act. Leop. XVIII. 1. p. 413. 484. — Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. xxxii. 373. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 65; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 257. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 796.
Synon. Güntheria Trevir.; Brissocarpus Lindenb.; Tesselinae sp. Dumort.

Corsiniaceae Corda 1829 in Opiz Beitr. I (Linnaea V. Litt. p. 77): ordo Stromatopteridear. Gen.: Corsinia, Rupinia.
Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 5: trib. Peltopteridear. Gen. ead.

Corsinieae Hübener 1834. Hepat. germ p. 22: div. Homallophyllar. Gen.: Corsinia, Oxymitra.
Bory & Mont. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 235: sect. Ricciear. Gen. ead. et Sphaerocarpus. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 257. — Par. Nees 1846. Syn. Hepat. p. 594. Gen. ead.

Cortesia*) Cavan. 1797. Icon. IV. p. 53. t. 377: nov. g. Pentandr. Monogyn. (C. cuneifolia.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 249. n. 562.
Hedw. 1806. Gen. p. 154. n. 659: g. Borraginear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 568. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. xlix. 522. n. 804.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 465; 1825. Syst. I. p. 668. n. 726; 1830. Gen. I. p. 131. n. 652: g. Convolvulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3004.
Bartl. 1830. Ord. p. 192: g. Convolvulacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 623.
D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 240: g. Cordiaccear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3742/1. p. 1401; 1841. Ench. p. 319. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 258.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 390: g. Ehretiacear.
Meisn. 1840. Gen. p. 278 (186): g. Tournefortiear.
DC. 1845. Pr. IX. p. 512: g. Ehretiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653: g. Tournefortear.

Corthumia**) Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 201. n. 7658: g. Pelargoniear.
= Peristera DC.

*) Dicat. Ferd. Cortes.
**) Dicat. Corthum, de re hortensi meritissimo.

Corthusa Rchb. vid. *Cortusa Linn.*

Corthusina Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3361 *d*: sect. Primulae.

Cortia*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 186: nov. g. Peucedanear. *Cf.* Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 258. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 337. — Tausch 1834. Flora I. p. 347. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5467. — Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). — Endl. 1839. Gen. n. 4468. p. 780; 1841. Ench. p. 379. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 135.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
Synon. Schultziae sp. Wall.

Cortica Endl. vid. *Corticia Fries.*

Corticalia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 53: subclass. Staminaciae. Stirpes: Solitegmia, Flosculacia, Bitegmia.

Corticia Fries 1823. Syst. myc. II. p. 192: subg. Stictidis.
Endl. 1836. Gen. n. 423 *d*. p. 37 (*Cortica*); 1841. Ench. p. 20: sect. Stictidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 439. 3. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 333.
Synon. Melanostroma Corda.

Corticium Pers. 1796. Obs. mycol. I. p. 37; 1797. Tent. disp. p. 30: nov. g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. Fung. p. xviii. 573; 1822. Mycol. eur. I. p. 128: sect. Thelephorae. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 105. — Fries 1818. Obs. myc. II. p. 276 (Cort. lividum Pers.) — Leman 1828. Dict. v. 53. p. 448. — Math. 1853. Belg. II. p. 317.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 653: g. Thelephoridear. (Thelephora quercina Pers.)
= Alytosporium Link et Leiostroma Fries.

Corticium Fries 1838. Epicr. p. 556; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 333; 1851. Nov. Act. Upsal. ser. tert. I. 1. p. 113: g. emend. Auricularinor. Sect.: Apus, Himantia, Leiostroma. — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 371. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 457: g. Hydneor. Sect. ut Fries.
Bonord. 1851. Hdb. p. 200: g. Rhizinaceor.

Corticularia Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 237; 1849. Sp. Alg. p. 460. n. 282: nov. g. Ectocarpear. *Cf.* Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 171.

Cortinaria Pers. 1801. Syn. Fung. p. xvi. 276: sect. Agarici. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 195. — Leman 1820. Dict. v. 17. p. 211. Endl. 1836. Gen. n. 453 *V*. p. 40; 1841. Ench. p. 22. Subsect. ut Fries 1821.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 6: fam. Agarici. Trib. (ibid. 1818. II. p. 26): Desmopus, Leptopus, Steropus, Violascentes.
Nees 1816. Syst. p. 208; 1817. Ueberbl. p. 53: subsect. Pratellae. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 436.

*) Dicat. Bonav. Corti, Moden.

Cortinaria Pers. cont.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 627: g. Pratellidear.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 10: series Agarici. Tribus: Telamonia, Inoloma, Phlegmacium, Dermocybe.
Synon. Cortinarius Fries.

Cortinaria Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 386: sect. Boleti. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 448 *d.* p. 40; 1841. Ench. p. 21. — Math. 1853. Belg. II. p. 328.
= Ochrosporus Fries.

Cortinarius Fries 1825. Pl. homon. p. 68: subg. Agarici. Sect. ut antea (sub Cortinaria).
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *F*: sect. Agarici. Subsect. eaed. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 488. Subsect. ut Fries 1838. — Math. 1853. Belg. II. p. 360. Subsect.: Dermocybe, Inoloma, Telamonia.
Fries 1838. Epicr. p. 255: g. Agaricinor. Sect.: Phlegmacium, Myxacium, Inoloma, Dermocybe, Telamonia, Hydrocybe (p. 601 Hygrocybe). — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 73. — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 498. Sect.: Hygrocybia, Telamonia, Desmocybe, Inoloma, Myxacium, Phlegmacium. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. Sect. ut Fries. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 299. Tribus ut antea. — Bonord. 1851. Hdb. p. 182. 185. — Bail 1858. Syst. p. 34. t. 34.
= Cortinaria Pers.

Cortusa*) Plumier 1703. Nov. gen. p. 26. t. 8.
= Thalia Linn.

Cortusa Linn. 1737. Gen. p. 40. n. 113; 1737. Cliff. p. 50; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 144; 1759. Syst. ed. X. p. 918. n. 181; 1762. Sp. ed. II. p. 206; 1764. Gen. ed. VI. p. 81. n. 198; 1767. Syst. ed. XII. p. 151: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 163; 1784. Syst. p. 193. — Reich. 1778. Gen. p. 83. n. 211. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 106. n. 259. — Gmel. 1791. Syst. p. 328. — Pers. 1797. Syst. p. 200; 1805. Ench. I. p. 170. n. 381. — Willd. 1797. Sp. I. p. 807. n. 294.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 205. n. 851: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Preciar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 347.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Scrophulariar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 230: g. Anagallidum.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 79: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 132: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 186: g. Speciosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 231. t. 50. f. 7 (Matthioli et Gmelini).
Juss. 1789. Gen. p. 96: g. Lysimachiar.

*) Dicat. Jac. Antonio Cortuso. Conf. Linn. Hort. Cliff. p. 50.

Cortusa Linn. cont.
Neck. 1790. El. II. p. 29. n. 654: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 290: g. Primulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 222. — DC. 1805. Franç. III. p. 451. — Hedw. 1806. Gen. p. 95. n. 428. — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 570. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XIII. 115. n. 651. — Link 1821. En. I. p. 158; 1829. Hdb. I. p. 415. — Bartl. 1830. Ord. p. 166. — Koch 1837. Syn. p. 591. Ed. II. p. 679. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 349.
Batsch 1802. Tab. p. 207: g. Primulariar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 384; 1825. Syst. I. p. 570. n. 609; 1830. Gen. I. p. 140. n. 700: g. Primulear. — Par. Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 206. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 640. — Brongn. 1843. En. genr. p. 69. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 55. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 21.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 128. n. 3362 (*Corthusa*); 1831. Fl. exc. p. 405: g. Androsacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4200. p. 731; 1841. Ench. p. 356. — Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 259.
Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 124. n. 4829: g. Cortusear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 625: g. Primulidar.

Cortusales Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 637: nixus Exogenar. perigynar. Ordines: Hydrophyllaceae, Plumbaginaceae, Plantaginaceae, Primulacecae, Myrsinaceae.

Cortuseae Rchb. 1837. Handb. p. 204; 1841. Nomencl. p. 124: subdiv. Primulear. Gen.: Cyclamen, Dodecatheon, Cortusa, Soldanella.

Cortusina DC. 1824. Prodr. I. p. 665: subsect. Pelargii. (Isopetaloideor.)
Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. p. 77: g. Pelargoniear.
Walp. 1842. Rep. I. p. 458: sect. Pelargonii.

Corvicina Kunth vid. *Cornicina DC.*

Corvinia Stadtm. ex Willemet 1796 in Usteri n. Ann. XII. p. 28: nov. g. Heptandr. Monogyn.

Corvisaria Koch vid. *seq.*

Corvisartia*) Mérat 1813. Fl. Paris ed. 2. II. p. 261: nov. g. ex typo Inulae Helenii L.
Cass. 1818. Dict. v. 10. p. 572: g. Inulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2458 (Icon. fl. Germ. XVI. p. 12.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 201.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1507 (*Corvisatica*); 1831. Fl. exc. p. 238; 1841. Nom. p. 87. n. 3396. 4: sect. Inulae. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 463. — Koch 1837. Syn. p. 358. Ed. II. p. 392 (*Corvisaria*). — Endl. 1838. Gen. n. 2426 *a.* p. 393; 1841. Ench. p. 236. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 189. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 500. — C. Koch 1850. Linnaea

*) Dicat. Joh. Nic. Corvisart-Demarets, prof. Paris.

Corvisartia Mérat cont.
XXIII. p. 707. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 173. — Math. 1853. Belg. I. p. 277.
Synon. Helenium Vaill.

Corvisatica Rchb. vid. *praeced.*

Coryanthes*) Hook. . . . . Bot. Mag. t. 3102
Lindl. 1833. Orchid. p. 159; 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1793: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1423. p. 199; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2029. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 259 (corr. *Corythanthes*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.
Lindl. 1852. Fol. Orchid. (Oct.) Revisio generis.
Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 110: g. Catasetear.
Synon. Gongorae sp. Hook.

Coryanthus Nuttall . . . . Amer. phil. trans. V. p. 186.
= Cheilyctis Benth.

Corybas Salisb. 1805. Parad. Lond. I. t. 83. (Corysanthes bicalcarata R. Br.)
Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 573: g. Orchidear.
Endl. 1837. Gen. n. 1597 c. p. 218; 1841. Ench. p. 114: sect. Corysanthis. — Par. Lindl. 1840. Orchid. p. 394. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2165. 3.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182: g. Arethusear.
Synon. Calcearia Blume?

Corycarpus Zea 1806. Act. Madrid.
Lagasca 1816. Gen. et spec. p. 4 (*Korycarpus Zea*): g. Triandr. Digyn. (Festuca diandra Hornem.)
Spreng. 1825. Syst. I. p. 123. n. 135; 1830. Gen. I. p. 32. n. 146: g. Graminum.
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1009: g. Festucacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear.
= Diarrhena Palis.

Corycidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Ophrear. Gen.: Pterygodium, Corycium, Disperis, Ceratandra, Arnottia.
Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172: sect. Ophrydear. Gen. ead.

Corycium**) Swartz 1800. Act. Ac. Holm. p. 220; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 41. t. 1: nov. g. Orchidear. (Arethusa crispa Thunb.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 161. — Pers. 1807. Ench. II. p. 509. n. 1982. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 573. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 699. n. 2940; 1831. Gen. II. p. 655. n. 3300.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 60. n. 1594: g. Gynandr. Monandr.
Thunb. 1807. Fl. Cap. I. p. 99: g. Diandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 291: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.

*) κόρυς, galea.
**) „κωρυς, cassis, galea."

Corycium Swartz cont.
Agdh. 1823. Aphor. p. 189: g. Massulatar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 13 (Linnaea II. p. 539); 1839. Orchid. p. 368: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1484; 1841. Nom. p. 51. n. 1893. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1540. p. 211; 1841. Ench. p. 113. — Meisn. 1842. Gen. p. 380 (285). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 260.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Corycidar.
Synon. Ophrydis sp. Linn.

Corydaleae Rchb. 1837. Hdb. p. 264: subdiv. Fumariear. Gen.: Corydalis, Bulbocapnos, Phacocapnos, Capnoides, Cysticapnos, Sarcocapnos. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 184. Gen.: Corydalis, Borkhausenia, Phacocapnos, Cysticapnos, Sarcocapnos.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 752: div. Fumariacear. Gen.: Dicentra, Dactylicapnos, Adlumia, Cysticapnos, Corydalis.

Corydales Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: ordo 28 plant. Gen.: Melianthus, Epimedium, Hypecoum, Fumaria, Impatiens, Leontice, Monotropa?, Utricularia?, Tropaeolum?
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 24 plant. Gen.: Melianthus, Monnieria, Epimedium, Hypecoon, Fumaria, Leontice, Impatiens, Utricularia, Pinguicula. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 371. Gen. ead. et Calceolaria?

Corydalideae Endl. 1839. Gen. p. 859; 1841. Ench. p. 444: subtrib. Fumariear. Gen.: Phacocapnos, Corydalis, Discocapnos, Sarcocapnos, Cysticapnos, Fumaria, Platycapnos.

Corydalidium C. Koch 1841. Linnaea XV. p. 252: sect. Corydalidis. (C. alpina.) — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 745.

Corydalineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 60. 71: sect. Fumariear. Gen. Corydalear. Rchb. 1837 et Calocapnos.

Corydalis*) Dillen. 1719. Nov. pl. gen. p. 129. t. 7.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 96. *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 252: Fumaria vesicaria.
Neck. 1790. El. III. p. 60. n. 1380: g. Amorphophytor.
= Cysticapnos Boerh.

Corydalis „Vent." DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 636; 1815. V. p. 586: g. Papaveracear. (Fumaria bulbosa, lutea et claviculata L.) — Par. Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 473. — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 574. — Link 1822. En. II. p. 218. — D. Don 1825. Nepal. p. 198.
Pers. 1807. Ench. II. p. 268. n. 1658: g. Diadelph. Hexandr. — Par. Willd. 1809. En. p. 739. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 85. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 178. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 427. 435.

*) κορυδαλλίς s. κορυδαλός, alauda cristata.

Corydalis Vent. cont.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 726: g. Papaverear.
DC. 1821. Syst. II. p. 113; 1824. Pr. I. p. 126: g. Fumariacear. Sect.: Leonticoides, Capnites, Capnoides. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 36. — Bartl. 1830. Ord. p. 260. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 141. Sect. ut DC. — Link 1831. Hdb. II. p. 275. — Koch 1836. Syn. p. 31. Ed. II. p. 33. Sect. (1843): Bulbocapnos, Capnoides, Corydalis. — Kunth 1838. Berol. I. p. 34. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 68. Sect.: Capnites, Haltricosia, Capnoides. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 97. Sect. ut DC. et Corydalidium. — Brongn. 1843. En. genr. p. 94. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 64. Sect.: Bulbocapnos, Capnoides, Sarcocapnos. — Hook. f. & Thoms. 1855. Ind. I. p. 258.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 700: g. Fumaridear.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 441: g. Rhoeadear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 159. n. 2484; 1831. Gen. II. p. 568. n. 2767: g. Fumariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4833 (sect.: Capnoides, Neckeria, Leonticoides); 1832. Fl. exc. p. 698 (sect.: Claviculella, Corydalis, Capnites). — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 240. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 288. Sect.: Capnites, Leonticoides. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436.
Rchb. 1837. Hdb. p. 264; 1841. Nom. p. 184. n. 7057: g. Corydalear. Sect.: Corydalis, Bulbocapnos, Zygocapnos. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 753.
Endl. 1839. Gen. n. 4839. p. 860; 1841. Ench. p. 444: g. Corydalidear. Sect.: Capnoides, Capnites, Bulbocapnos, Leonticoides? — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 184.
= Neckeria Scop.

Corydalis Bernhardi 1832. Linnaea VII. p. 604: g. restrict. Fumariacear. (C. aurea, Gebleri, etc.)
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 469: g. Monocentrear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 8 (10.)
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 61: g. Corydalinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 184. n. 7057. 1: sect. Corydalidis. — Par. Koch 1843. Syn. ed. II. p. 35.
Pfeiff. 1857. Bot. Zeit. p. 649: sect. Neckeriae.
Synon. Capnites Endl.; Capnoides DC. pt.

Corydandra*) Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 53. n. 2047: g. Vandear.
= Galeandra Lindl.

Corylaceae Mirbel 1815. Élém. II. p. 906: fam. Dicotyledonum apetalar. Typi sectionum: Fagus, Corylus.
Agdh. 1825. Aphor. p. 208: trib. Amentacear. Gen.: Fagus, Castanea, Quercus, Corylus, Hedyosmum.

*) Nomen Lindleyanum ex verbo hybrido.

Corylaceae Mirbel cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 290: ordo Quernalium. Gen.: Carpinus, Ostrya, Corylus, Fagus, Castanea, Quercus, Lithocarpus, Synaedrys.

Coryleae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 346 (257): trib. Cupuliferar. Gen.: Ostrya, Carpinus, Corylus.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 205: sect. Betuloidear. Gen.: Corylus.

Corylideae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 244: fam. Monochlamydear. Gen.: Carpinus, Corylus, Quercus; Fagus, Castanea.

Corylineae Kunth 1838. Fl. Berol. II. p. 196: div. Cupuliferar. Gen.: Carpinus, Corylus.

Corylopsis Sieb. & Zuccar. 1835. Fl. japon. I. p. 45. t. 19. 20: nov. g. Hamamelidear. (C. spicata et pauciflora.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 81. — Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2640.
Endl. 1839. Gen. n. 4589. p. 804; 1841. Ench. p. 401: g. Euhamamelear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 434. — Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 323.
Meisn. 1843. Comm. p. 359: g. Hamamelear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 784.

Corylus*) Tourn. 1700. Inst. p. 581. t. 347: g. pl. class. XIX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 311: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 329 in class. XVI.)
Linn. 1737. Gen. p. 293. n. 730; 1737. Cliff. p. 448; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 286; 1753. Sp. II. p. 998; 1759. Syst. ed. X. p. 1273. n. 953; 1763. Sp. ed. II. p. 1417; 1764. Gen. ed. VI. p. 498. n. 1074; 1767. Syst. ed. XII. p. 631: g. Monoec. Polyandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 244. — Murr. 1774. Syst. p. 718; 1784. Syst. p. 859. — Reich. 1778. Gen. p. 494. n. 1172. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 648. n. 1450. — Pers. 1797. Syst. p. 904. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 201. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 470. n. 1699; 1809. En. p. 983. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 216. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 7. 169.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 159: g. Juliferar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 464. — Rabenh. 1837. Linnaea XI. p. 242.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 150: g. Amentacear. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 351. — Juss. 1789. Gen. p. 410. — Gis. 1792. Prael. p. 578. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 562. — Batsch 1802. Tab. p. 163. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 320. — DC. 1805. Franç. III. p. 307. — Pers. 1807. Ench. II. p. 571. n. 2102. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 349; 1826. Syst. III. p. 853. n. 3118; 1831. Gen. II. p. 694. n. 3500. — Lois. 1818. Dict. v. 11. p. 154 (*Coudrier*). — Link 1822. En. II. p. 401. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 628.

*) Nomen ex Virgilio.

Corylus Tourn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 125. n. 517: g. Thalamostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 375: g. Castanear. — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 492.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 160: g. Octandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 637. — Rebent. 1804. Neom. p. 173.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 187; 1789. Phil. Bot. I. p. 32.
Neck. 1790. El. III. p. 256. n. 1647: g. Axonophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 52. t. 89.
Mönch 1794. Meth. p. 692: g. Calycostemonis.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 906: g. Corylacear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 209. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 291.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 246: g. Corylidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 83. n. 1795; 1831. Fl. exc. p. 175; 1841. Nom. p. 66. n. 2469: g. Faginear. (genuinar.)
Bartl. 1830. Ord. p. 100: g. Cupuliferar. — Par. Koch 1837. Syn. p. 640. Ed. II. p. 738. — Endl. 1837. Gen. n. 1844. p. 274; 1841. Ench. p. 160; 1847. Spl. IV. p. 23. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 340. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 665 (*Noisetier*).
Kunth 1838. Berol. II. p. 198: g. Corylinear.
Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 98. Revisio generis. Sect.: Avellana, Tubo-Avellana, Acanthochlamys. *Cf.* Ann. and Mag. n. h. VIII. 1842. p. 344.
Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257): g. Corylear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 205. Sect. ut antea. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 587.
Döll 1842. Flora II. p. 725: g. Carpinear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 134: g. Quercinear. — Par. Math. 1853. Belg. I. p. 493.
Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 20. p. 309: g. Cupuliferear. — Par. Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 119.

Corymbidae Miquel 1858. Fl. Ind. bat. III. p. 736: subtrib. Neottear. Gen.: Corymbis.

Corymbieae Rchb. 1837. Hand. p. 182: subdiv. Segregatar. Gen.: Corymbium.

Corymbiferae Vaillant 1719. Act. Acad. Paris. p. 277: class. Compositar. Gen. §. 1: Balsamita, Tanacetum, Absinthium, Artemisia, Cotula, Ananthocyclus, Sphacranthos. §. 2: Helichrysum, Filago, Helichrysoides, Coniza, Eupatorium, Petasites, Cacalia, Senecio, Porophyllum, Sparganophoros, Elephantopus. §. 3: Tarchonanthos, Santolina, Santolinoides, Baccharis, Gnaphalium, Pterophorus. (Contin. 1720. ibid. p. 277.) §. 4: Bellis, Dimorphotheca, Bellidioides, Matricaria, Caltha, Monilifera. §. 5: Tussilago, Solidago, Jacobaea, Jacobaeoides, Jacobaeastrum, Doronicum, Helenium, Virga aurea, Aster, Asteropterus, Heleniastrum, Tagetes. §. 6: Bellidiastrum, Chamaemelum, Achillea, Asteroides, Eupatoriophalacron, Ceratocephalus, Ceratocephaloides, Obeliscotheca.

Corymbiferae Vaill. cont.
§. 7: Arctotheca, Asteriscus, Corona solis, Hysterophorus.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. p. 35; II. p. 693: trib. Gymnomonospermar. Divis.: Discoideae, Radiatae.
Juss. 1789. Gen. p. 177: ordo 3 class. X. Gen. §. 1: Kuhnia, Cacalia, Eupatorium, Ageratum, Elephantopus, Chuquiraga, Mutisia, Barnadesia, Xeranthemum, Gnaphalium, Filago, Leysera, Shawia, Seriphium, Staebe, Conyza, Baccharis, Chrysocoma. §. 2: Erigeron, Aster, Solidago, Inula, Perdicium, Tussilago, Brachyglottis, Senecio, Cineraria, Othonna, Didelta, Tagetes, Pectis, Bellium, Doronicum, Arnica, Gorteria. §. 3: Osteospermum, Calendula, Chrysanthemum, Matricaria, Bellis, Cenia, Lidbeckia. §. 4: Cotula, Adenostemma, Struchium, Grangea, Ethulia, Carpesium, Hippia, Tanacetum, Artemisia. §. 5: Tarchonanthus, Calea, Athanasia, Micropus, Santolina, Anacyclus, Anthemis, Achillea, Eriocephalus, Buphtalmum, Osmites, Encelia, Sclerocarpus, Unxia, Flaveria, Milleria, Sigesbeckia, Polymnia, Baltimora, Eclipta. §. 6: Spilanthus, Bidens, Verbesina, Coreopsis, Zinnia, Ballieria, Silphium, Melampodium, Chrysogonum, Helianthus, Helenia, Rudbeckia, Tithonia, Galardia, Wedelia, Oedera, Agriphyllum. §. 7: Arctotis, Tridax, Amellus, Pardisium, Ceruana. §. 8 et 9: *Anomalae* (gen.: Iva, Clibadium, Parthenium; Ambrosia, Xanthium, Nephelium). — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 508. Gen. §. 1: Cacalia, Eupatorium, Ageratum, Conysa, Baccharis, Chrysocoma; Elichrysum, Filago, Argyrocome, Antennaria. §. 2: Micropus, Evax, Gnaphalium, Xeranthemum, Athanasia, Santolina, Anacyclus. §. 3: Anthemis, Achillea, Eriocephalus, Buphtalmum, Encelia, Milleria, Sigesbeckia, Polymnia, Baltimora, Eclipta. §. 4: Spilanthus, Bidens; Verbesina, Coreopsis, Sanvitalia, Zinnia, Silphium, Helianthus, Helenium, Rudbeckia, Galardia, Alcina, Agriphyllum. §. 5: Arctotis, Ursinia, Tridax, Amellus. §. 6: Erigeron, Aster, Solidago, Inula, Pulicaria, Tussilago, Senecio, Cineraria, Othonna, Tagetes, Pectis, Bellium, Doronicum, Arnica, Gorteria. §. 7: Osteospermum, Calendula, Madia, Chrysanthemum, Pyrethrum, Matricaria, Bellis, Cenia, Lidbeckia. §. 8: Cotula, Grangea, Carpesium, Tanacetum, Balsamita, Artemisia. §. 9: Absinthium, Tarchonanthus. §. 10: Iva, Parthenium.
Batsch 1802. Tab. p. 203: fam. unica Asterocephalar. Gen.: Gnaphalium, Filago, Leyssera, Seriphium, Stoebe, Mutisia, Kuhnia, Eupatorium, Ageratum, Elephantopus; Chrysocoma, Conyza, Bacharis, Aster, Solidago, Inula, Erigeron, Perdicium, Tussilago, Senecio, Cacalia, Cineraria, Othonna, Pectis, Bellium, Doronicum, Arnica, Gorteria; Melampodium, Chrysogonum, Helianthus, Rudbeckia, Helenium, Wedelia, Oedera; Osteospermum, Calendula, Bellis, Chrysanthemum, Matricaria,

Corymbiferae Vaill. cont.
Boltonia, Anthemis, Anacyclus, Buphthalmum, Tarchonanthus, Calea, Santolina, Athanasia, Micropus, Eriocephalus, Osmites, Sphaerocarpus, Millera, Siegesbeckia, Polymnia, Baltimora, Eclipta; Spilanthus, Verbesina, Bidens, Coreopsis, Silphium; Zinnia, Tagetes; Arctotis, Tridax, Amellus; Cotula, Ethulia, Carpesium, Hippia, Tanacetum, Artemisia; Iva, Clibadium, Parthenium; Ambrosia, Xanthium.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 391. t. 60. 61. Gen. ut Juss. et in §. 1: Kleinia, Evax, Actinea, Hymenopappus. §. 2: Chaptalia. §. 5: Alcina. §. 6: Sanvitalia, Gallinsoga §. 8: Rhanterium.
DC. 1805. Franç. IV. p. 126: ordo 3 Compositar. Gen.: Cacalia, etc.
L. C. Rich. 1810. Prael. publ.: sect. Distigmatiae. (teste Cass.)
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 146: sect. Tubulosar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 444: div. Compositar. Gen.: Calendula, Helianthus, Bidens, Tanacetum, Artemisia, Absinthium, Diotis, Chrysanthemum, Leucanthemum, Pyrethrum, Matricaria, Chamomilla, Bellis, Chamaemelum, Maruta, Anthemis, Achillea, Antennaria, Gnaphalium, Filago, Conyza, Pulicaria, Inula, Eritheis, Eurybia, Solidago, Erigeron, Trimorpha, Chrysocoma, Doronicum, Cineraria, Senecio, Tussilago, Petasites, Eupatorium.
Agdh. 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 590: ordo Subaggregatar.
Koch 1837. Syn. p. 348: subordo Compositar. Trib.: Eupatorieae, Tussilagineae, Astereae, Heliantheae, Inuleae, Anthemideae, Senecioneae, Calendulaceae. — Par. Koch 1843. Syn. ed. II. p. 381. Trib.: Eupatoriaceae, Asteroideae, Senecionideae.

Corymbiferi Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: div. Compositor. Gen.: Stoebe, Santolina, Chrysocoma, Tanacetum, Kleinia, Stähelina, Xeranthemum, Gnaphalium, Carpesium, Tarchonanthus, Baccharis, Erigeron, Tussilago, Doronicum, Solidago, Senecio, Inula, Aster, Gerberia, Othonna, Chrysanthemum, Matricaria, Buphthalmum, Anacyclus, Cotula, Anthemis, Achillaea, Eriocephalus, Helenia, Arctotis, Bellis, Tagetes.

Corymbis Petit-Thouars 1822. Hist. Orch. Afr. t. 37. 38.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 183: g. Orchidacear. minus notum.
Rchb. f. 1849. Bot. Zeit. p. 868: g. Neottiear.
Lindl. 1854. Fol. Orchid. 21. Jan.
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 736: g. Corymbidar.
Synon. Hysteria Reinw.; Corymborchis Blume.

Corymbium Linn. 1737. Coroll. p. 14. n. 976: g. Syngenes. Polygam. Aequal.
Linn. 1737. Cliff. p. IX. 494; 1740. Syst. p. 29; 1753. Sp. II. p. 928; 1759. Syst. ed. X. p. 1236. n. 895; 1763. Sp. ed. II. p. 1317; 1764. Gen. ed. VI. p. 455. n. 1004; 1767. Syst. ed. XII. p. 582: g. Syngenes. Monogam. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 665; 1784. Syst. p. 779. — Reich. 1778. Gen. p. 450. n. 1089. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 595. n. 1361. — Pers. 1797. Syst. p. 841.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 239. n. 980: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Capitator.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Compositar. quartae sect. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540.
Scop. 1777. Intr. p. 136: g. Flosculosar.
Juss. 1789. Gen. p. 176: g. Cinarocephalar. (anomalar.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 389. — Hedw. 1806. Gen. p. 88. n. 402.
Neck. 1790. El. III. p. 372. n. 1808: g. Siphoniphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 42. t. 86.
Gmel. 1791. Syst. p. 373: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 1106. n. 408.
Batsch 1802. Tab. p. 251: g. Capitatar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 501. n. 1974: g. Syngenes. Segregat.
Cass. 1818. Dict. v. 10. p. 580: g. Gundeliear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 553: g. Eupatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2183.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. III. 6. n. 621: g. Cynarocephalar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 538. n. 578; 1830. Gen. I. p. 122. n. 608: g. Aggregatar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 591.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 343; 1830. v. 60. p. 587: g. Rolandrear. — Par. Less. 1831. Linnaea VI. p. 691; 1832. Syn. p. 150. — DC. 1836. Pr. V. p. 88. — Endl. 1838. Gen. n. 2233. p. 362; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 261.
Less. 1829. Linnaea IV. p. 330: g. Vernoniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 135.
Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3930: g. Lagascear.
Synon. Contarena Adans.

Corymbocephalon Meisn. 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 60; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 130: subsect. Cephalophili. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1986 *c β.* p. 307; 1841. Ench. p. 188.
Synon. Ampelygonum Lindl.

Corymborchis Blume .... Fl. jav. p. 105. = Corymbis Pet.-Thouars. (Miq.)

Corymbosia Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 315: sect. Diphyis. (D. laxiflora.)

Corynandra*) Schrad. 1826 in Rchb. Ic. exot. t. 147: nov. g. Capparidear. (Cleome Chelidonii L.) — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 201; 1830. Gen. I. p. 424. n. 2105. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 232.

*) κορύνη, clava.

Corynandra Schrad. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Cleomear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 275. — Meisn. 1837. Gen. p. 17 (15). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 303.
Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4865: g. Capparear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 266.
Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. 48: sect. Cleomes.
Rchb. 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 185. n. 7108: g. Corynandrear.
Endl. 1840. Gen. n. 4988 *a*. p. 891; 1841. Ench. p. 456: sect. Polanisiae.
Corynandreae Rchb. 1837. Handb. p. 267; 1841. Nomencl. p. 185: subdiv. Cleomear. Gen.: Corynandra et 1841 Isomeria.
Corynanthelium Kunze 1847. Linnaea XX. p. 19: nov. g. Adenostylear., Mikaniae aff. (C. Moronoa.) *Cf.* Bouché 1848. Verh. Berl. Gart. Ver. XIX. 1. p. 90. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 404.
Synon. Moronoa Hort.
Corynanthes Karsten 1848. Auswahl t. 1: nov. g. Orchidear. (Bot. Zeit. 1848. p. 65.)
Coryne Nees 1816. Syst. p. 157; 1817. Ueberbl. p. 40: stirps Tremellae. — Simil. Mart. 1817. Erlang. p. 395.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 595: g. Tremellidear.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 106: sect. Tremellae. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 403 *b*. p. 35; 1841. Ench. p. 20. — Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 420. 2. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 310.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 216: subg. Tremellae.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 34; 1842. V. p. 39; 1842. Mycol. p. 166: g. Tremellinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Tremellinor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 149: g. Myxonemeor.
Synon. Acrospermi sp. Tode; Tremellae sp. Schäff.
Coryneaceae Corda 1839. Icon. Fung. III. p. 36; 1840. IV. p. 46: fam. Hymenomycetum. Gen.: Coryneum, Podisoma.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 39; 1842. Mycol. p. CI. 164: fam. Basidiophoror. Gen.: Selenosporium, Exosporium, Coryneum, Podisoma. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 150.
Coryneacei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 473: ordo Gymnomycetum. Gen.: Gymnosporangium, Podisoma, Bactridium, Coryneum, Phragmotrichum, Conoplea, Exosporium, Epiclinium, Blennoria, Rhopalidium.
Corynelia „Achar. in litt." Fries 1818. Obs. mycol. II. p. 343: nov. g. Sphaerioideor.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 354: g. Sphaeriaceor. (Mucor clavatus L.) — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 134. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Bonord. 1851. Hdb. p. 268.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 584 (*Corynella*): g. Sphaeriacear.

Corynelia Achar. cont.
Fries 1825. Pl. homon. p. 110: g. Strigulinor. — Par. Leman 1827. Dict. v. 51. p. 103. — Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 271; 1841. Nom. p. 7. n. 293. — Endl. 1836. Gen. n. 388. p. 33; 1841. Ench. p. 19.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 536. n. 3529: g. Gastromycetum obscuror. desciscent.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeropsideor.?
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 401: g. Rhaphidosporeor.
Corynelia Rchb. 1841 vid. *Corynella DC.*
Corynella Brongn. vid. *Corynelia Achar.*
Corynella DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 93: nov. g. Leguminosar. (Robinia polyantha Sw.)
DC. 1825. Pr. II. p. 267: g. Galegear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3907; 1841. Nom. p. 148. n. 5745 (*Corynelia*). — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 242. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6556. p. 1275; 1841. Ench. p. 669. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 262.
Synon. Corynitis Spreng.; Corynites Wittst.
Corynelobos R. de Römer 1852. Linnaea XXV. p. 7: nov. g. Brassicear., Sinapi aff. (A. boeticus.)
Corynephora Agardh 1824. Syst. Alg. p. XIX. 24: nov. g. Nostochinar. (Tremella difformis L.)
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 8: g. Myxophysalidum.
Menegh. 1838. Cenni p. 27: g. Rivulariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 590.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 190: g. Nostochinear.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 46: g. Chordariear. — Par. J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 33. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 262.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 96; 1843. Phyc. gener. p. 331; 1845. Phyc. germ. p. 266: g. Mesogloeacear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 179: sect. Leathesiae.
= Leathesiae Gray sp.
Corynephorus Palis. 1812. Agrost. p. 90. t. 18. f. 11: nov. g. Graminear. (Aira canescens L.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 40. 688. n. 331. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 583. — Link 1829. Hdb. I. p. 49.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72 (*Corynophorus*); 1830. Gram. p. 97; 1833. Agrost. p. 286; 1838. Berol. II. p. 377: g. Avenacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 137. — Link 1827. Hort. I. p. 123. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 49; 1841. Nom. p. 35. n. 1205. — Koch 1837. Syn. p. 793. Ed. II. p. 915. — Endl. 1837. Gen. n. 856. p. 95; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137 (*Corynophorus*). 337. — Meisn. 1843. Gen. p. 423

Corynephorus Palis. cont.
(323). — Brongn. 1843. En. genr. p. 8. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 390. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 262. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 423. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 501.
Trin. 1820. Fund. p. 158: g. Triandr. Digyn.
Link 1821. En. I. p. 79: g. Graminum.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 554: sect. Airae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1036 *a*. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 322. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 69. — Steud. 1854. Glum. I. p. 218.
Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Bromear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 78: g. Melicear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear. — Par. Math. 1853. Belg. I. p. 605. (verar.)
Synon. Aira Gärtn.; Weingärtneria Bernh.

Corynepodium Rchb. „H. bot. ic. t. 6." 1841. Nomencl. p. 111. n. 4330 *c*: sect. Myosotidis.

Corynesphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 92: g. Sphaeriear. (Sphaeria alutacea, militaris, etc.)

Coryneum Nees 1816. Syst. p. 34; 1817. Ueberbl. p. 8: g. Sphaeromycor. concretor.
Kunze & Schmidt 1817. Mykol. Heft I. t. 2. f. 17. 18.
Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 12: g. Exosporior.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Sclerotacear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 527: g. Stilbosporear.
Link 1825. Spec. II. p. 124: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 191: g. Sporodesmior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 30.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Exosporeor.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 784. n. 4062: g. Coniomycetum suffultor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Spondylomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 227: g. Sporomycetum hyposporor.
Endl. 1836. Gen. n. 203 *a*. p. 18; 1841. Ench. p. 13: sect. Corynei.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 8: g. Phragmidiacear.
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 36; 1840. IV. p. 46; 1842. V. p. 39. 81; 1842. Mycol. p. 165: g. Coryneacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 150.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 25: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 31.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Melanconieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 474: g. Coryneaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 131: g. Tubercularinor.

Coryneum Nees cont.
Math. 1853. Belg. II. p. 422: g. Sporidesmiear.
Synon. Clasterisporium Schwein.?

Coryneum Fries 1832. Syst. mycol. III. 2. p. 473: g. Tubercularinor., injuncto Seiridio auctum. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 203. p. 18; 1841. Ench. p. 13. Sect.: Coryneum, Seiridium.

Corynites Berk. & Curt. 1853. Ann. nat. hist. XI. p. 136: nov. g. Phalloideor.

Corynites Wittst. vid. *seq.*

Corynitis Spreng. 1827. Cur. post. p. 263; 1831. Gen. II. p. 584. n. 2872: g. Leguminosar.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 231 (*Corynites*): g. Papilionacear.
= Corynella DC.

Corynocarpus Forst. 1776. Char. gen. p. 31. t. 16: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 21. n. 1373. — Murr. 1784. Syst. p. 242. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 155. n. 394. — Gmel. 1791. Syst. p. 418. — Pers. 1797. Syst. p. 253; 1805. Ench. I. p. 233. n. 517. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1178. n. 451. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 179. n. 906. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 804.
Scop. 1777. Intr. p. 255: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 288: g. Berberidibus aff.
Batsch 1802. Tab. p. 114: g. Berberinar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 87: g. Berberideis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 158. n. 673: g. Berberidear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 441 (*Corinocarpus*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 781. n. 858.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. xxix. 345. n. 968: g. Berberidum.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 365: g. incertae sedis.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 23: g. Myrsineacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 262.
Meisn. 1839. Gen. p. 252 (161): g. Theophrastear.? — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4232/1. p. 1140; 1841. Ench. p. 359. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4868. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648. (?)
A. Cunn. 1840. Ann. nat. hist. IV. p. 260: g. Myrsineis aff.?
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 145: g. Theophrastacear.?
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 48: g. Anacardiacear.
Synon. Merrettia Sol.

Corynocladus Leidy 1849. Proc. Philad. Ac. IV. p. 250; 1853. Smiths. Contr. V. Art. 2. p. 38. t. 8–10: nov. g. Algar.?, in animalium intestinis vivens.

Corynodesmium „Wallr." Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 35[b]: g. Entophytor. ambiguor. (*Cephalaeodium Kunze* olim.)
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 301 in not.: g. Hyphomycetum synsporor., non descriptum.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 32: g. Phragmidiaceor.
= Exosporium Link?

Corynoides Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 654: nov. g. Clavaridear. (Clavaria cornea, fabae, farinosa, byssoides Sow.)
Endl. 1836. Gen. n. 415 *a*. p. 36; 1841. Ench. p. 20: sect. Clavariae.
Synon. Syncoryne Fries.

Corynophlaea*) Kütz. (1843. Linnaea XVII. p. 96: *Corynophloea*) 1843. Phycol. gener. p. 331; 1845. Phyc. germ. p. 266; 1849. Sp. Alg. p. 543. n. 350: nov. g. Mesogloeacear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 179 (*Corynophloea*): sect. Leathesiae.

Corynophloea Kütz., Rabenh. vid. *praeced.*

Corynophorus Kunth 1815, Dietr. vid. *Corynephorus Palis.*

Corynostigma Presl 1850. Epimel. bot. p. 578 (218): nov. g. inter Sphaerostigma, Oenotheram et Jussiaeam intermedium. (Jussiaeae sp. Pohl.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 861: g. Epilobiear.

Corynostyleae Rchb. 1837. Handb p. 269; 1841. Nomencl. p. 187: subdiv. Violear. Gen.: Corynostylis.

Corynostylis Martius & Zucc. 1824. Nov. gen. I. p. 25. t. 17. 18: nov. g. Ionidior. (Viola Hybanthus Aubl.) *Cf.* Flora 1824. II. p. 569. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 805. n. 898.
Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4890: g. Violear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 284. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 191. n. 965. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 497. — Meisn. 1837. Gen. p. 20 (18) — Endl. 1840. Gen. n. 5045. p. 910; 1841. Ench. p. 471. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 837. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 339. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 263. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 242 (*Corinostylis*).
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187. n. 7141: g. Corynostylear.
Synon. Calyptrion Ging.

Corynotrichum DC. 1837. Prodr. VI. p. 642: sect. Cirsii. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 478. n. 2887 *d*; 1841. Ench. p. 247. n. 2887 *e*. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3905. 5.

Corypha**) Linn. 1737. Gen. p. 354. n. 888; 1737. Cliff. p. 482; 1751. Phil. bot. p. 27; 1753. Sp. II. p. 1187; 1759. Syst. ed. X. p. 1354. n. 1086; 1763. Sp. ed. II. p. 1657; 1764. Gen. ed. VI. p. 572. n. 1221; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 729: g. Palmar. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 827; 1784. Syst. p. 984. — Scop. 1777. Intr. p. 69. — Reich. 1778. Gen. p. 566. n. 1337. — Juss. 1789. Gen. p. 39. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 773. n. 1690. — Gis. 1792. Prael. p. 28. 38. — Pers. 1797. Syst. p. 1022. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 124. — Batsch 1802. Tab. p. 127. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 96. — Hedw. 1806. Gen. p. 226. n. 921. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 267. Ed. Nees p. 123. — Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 584. —

Corypha Linn. cont.
Link 1821. En. I. p. 343; 1829. Hdb. I. p. 263. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 137. n. 1338; 1830. Gen. I. p. 283. n. 1466. — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1202.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 190: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Lour. 1790. Coch. I. p. 212. — Gmel. 1791. Syst. p. 569. — Willd. 1799. Sp. II. p. 201. n. 666. — Pers. 1805. Ench. I. p. 382. n. 842. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 51. t. 255. 256; 1832. Ind. II. p. 174.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 18. t. 7. f. 1.
Neck. 1790. El. III. p. 305. n. 1703: g. Pocilmophytor.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 298: g. Coryphinar. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 301; 1841. Enum. III. p. 235. — Mart. 1824. Gen. palm. bras. fasc. II. p. 56. t. 49. 50; 1824. Palm. fam. p. 10. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXVIII. 1308. — Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 49.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 203: g. Coryphear.
Rchb. 1828. Consp. p. 73. n. 1658: g. Coryphacear.
Endl. 1837. Gen. n. 1753. p. 252 (ex Mart. mss.); 1841. Ench. p. 136: g. Sabalinar. — Par. Mart. . . . . Palm. p. 231. t. 102. 127. — Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2299. — Meisn. 1842. Gen. p. 357 (267).
Brongn. 1843. En. genr. p. 16: g. Coryphinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 401.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Sabalidar.
Duchart 1849. in Orb. Dict. IX. p. 424: g. Sabalinear.
Synon. Codda-Pana Adans.; Gembanga Blume; Taliera Mart.

Coryphaceae Rchb. 1828. Consp. p. 73: subdiv. Palmar. genuinar. Gen. Coryphinar. Mart. 1824 excepta Phoenice.

Coryphaea Lindl. 1838. Orchid. gen. p. 347. 350: sect. Disae.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1537 *b* ε. p. 1365; 1841. Ench. p. 112: subsect. Calodisae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1882. 2 *e*.

Coryphaeae Rchb. 1837. Handb. p. 158: sect. Coryphariar.

Coryphaei Holmskiold 1790. Coryphaei, Clavarias Ramariasque complectentes, etc.: div. Fungor. Gen.: Clavaria, Ramaria. *Cf.* Usteri n. Ann. XI. p. 30.

Coryphanta Müll. vid. *seq.*

Coryphantha Engelm. 1856. Syn. Cact. p. 264 (Emory Cact. p. 10): subg. Mamillariae. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 33 (*Coryphanta*).

Coryphariae Rchb. 1837. Handb. p. 158: subdiv. Palmar. genuinar. Sect.: Sabalinae, Borasseae, Coryphaeae.

Corypheae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 203: ordo Palmar. Gen.: Corypha, Thrinax, Licuala, Chamaerops, Rhapis, Latania, Borassus, Mauritia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: trib. Palmacear. Subtrib.: Sabalidae, Phoenicidae.

*) *φλοιά*, cortex.
**) *κορυφή*, vertex capitis, cacumen.

Coryphinae HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 298 (Kunth 1822. Syn. I. p. 301): sect. Palmar. Gen.: Corypha, Chamaerops.
Mart. 1824. Palm. fam. p. 7: series 2a Palmar. Gen.: Morenia; Rhapis, Chamaerops, Livistona, Corypha, Taliera; Phoenix. *Cf.* Flora 1824. I. p. 351.
Endl. 1837. Gen. p. 252 (ex Mart. mss.); 1841. Ench. p. 136: trib. Palmar. Subtrib.: Sabalinae, Phoenicinae. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 235. Gen.: Corypha, Licuala, Livistona, Copernicia, Brahea, Sabal, Trithrinax; Chamaerops, Rhapis, Thrinax; Phoenix. (*Synon. Sabalinae Mart.*) — Meisn. 1842. Gen. p. 357 (266). Subtrib. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 58: div. Palmacear. Subdivis.: Manicarieae, Sabalinae, Borassinae.

Coryphineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 16: trib. Palmar. Gen. ex Coryphinis Kunth. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 62. 100. Gen. Coryphinarum Kunth. — Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 424. Trib.: Sabalineae, Phoenicineae.

*Coryphophytum**) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 128: gen. 20 plant. Spec. natur.: Circaea, Ludwigia, Trapa, Guilleminia, Sanguisorba, Plectronia, Ribes, Gronovia, Jussieua, Neurada, Strumpfia, Oenothera, Mentzelia, Epilobium, Combretum, Gaura, Ophira, Memecylon, Phylica, Bockia, Hambergia, Colomandra, Blakea, Bellucia, Decumaria, Sirium, Escallonia, Bäckea, Clavenna.

Corypta Necker 1790. Elem. bot. III. p. 344. n. 1758: g. Athrosophytor. (*Anthoceros Linn.*, mutato nomine, quia flores non adsunt.)

Corysanthera Wallich 1832. Catal. n. 6411.
Endl. 1839. Gen. p. 719. n. 4153: g. dubium Cyrtandrear. *Cf.* Meisn. 1840. Comm. p. 211. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 367. 582. = Rhynchothecum Blume.

Corysanthes R. Brown 1810. Prodr. I. p. 328. Ed. Nees p. 184; 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 610 (Verm. bot. Schr. I. p. 160): nov. g. Orchidear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 10. p. 595. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 704. n. 2951; 1831. Gen. II. p. 658. n. 3314.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 292: g. Coniopagar. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 189. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 10 (Linnaea II. p. 528): g. Arethusear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1450; 1841. Nom. p. 55 n. 2165. Sect. 1841 ut Endl. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1597. p. 218; 1841. Ench. p. 114. Sect.: Corysanthes, Steleocorys, Corybas. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 264. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 714.

*) κορυφή, cacumen; φυτόν, planta.

Corysanthes R. Brown cont.
Lindl. 1840. Orchid. p. 393: g. Euarethusear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 382 (286).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Acianthidar. *Synon.* Corybas Salisb.; Calcearia Blume.

Coryspermum*) Ant. Juss. 1712. Mém. Ac. Paris. p. 185: nov. g. plantar.
Juss. 1789. Gen. p. 86: g. Atriplicum.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 203: g. Atriplicear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 344. = Corispermum Dill.

Corythacanthus**) Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 444.
Endl. 1839. Gen. n. 4067. p. 702; 1841. Ench. p. 343: g. Barleriear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 295 (204). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 145. — Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4264. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 265.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Barleridar. = Clistax Mart.

Corythaeolon Rchb. 1832. Fl. exc. p. 739: sect. Aconiti. (A. palmatifidum, exaltatum, Störkianum.)

Corythaeolum Link 1822. Enum. II. p. 82: sect. Aconiti.

Corythanthes Lemaire vid. *Coryanthes Hook.*

Corytholobium Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 93: nov. g. Dalbergiear. *Cf.* Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 265. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6702. p. 1302; 1841. Ench. p. 672. — Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 5994. — Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Corytholoma Benth. 1839. Pl. Hartweg. p. 230: sect. Gesneriae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 399.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 203: subg Gesnerae. (G. sceptrum et rupicola Mart.)

*Corythophytum****) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 291: gen. 13 plantar. Spec. natur.: Verbena, Abena, Patya, Amethystea, Monarda, Salvia, Rosmarinus, Lycopus, Cunila, Ziziphora, Collinsonia, Melissa, Melittis, Trichostema, Prasium, Scutellaria, Brunella, Cleonia, Phryma, Denisaea, Ocymum, Clinopodium, Thymus, Lamium, Phlomis, Leonurus, Molucella, Balotte, Beringeria, Thymbra, Hyssopus, Origanum, Cephaloma, Dracocephalon, Stachys, Bonamya, Horminum, Sideritis, Betonica, Galeopsis, Psilopsis, Nepetha, Lavendula, Perilla, Glechoma, Satureia, Mentha, Ajuga, Teucrium.

Cosaria Gmel. vid. *Kosaria Forsk.*

Coscinieae Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 177: trib. Menispermacear. Gen.: Coscinium.

Coscinium†) Colebr. 1821. Linn. Trans. XIII. 1. p. 65: nov. g. ex typo Menispermi fenestrati Gärtn. *Cf.* Isis 1825. p. 970.

*) „κορίς, cimex: sémence de punaises".
**) κόρυς, galea.
***) κόρυς, galea; φυτόν, planta.
†) κοσκίνιον, parvum cribrum.

Coscinium Colebr. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1893; 1841. Nom. p. 70. n. 2623: g. Menispermear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 243 (desciscens). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 109. — Meisn. 1837. Gen. p. 5 (7). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 7. — Walp. 1842. Rep. I. p. 95. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 266.
Endl. 1839. Gen. n. 4692. p. 827; 1841. Ench. p. 415: g. Menispermacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 309.
Miers. 1851. Ann. and Mag. 2d ser. VII. p. 35: g. Heteroclinear.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 177: g. Cosciniear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 122.
Synon. Pereira Lindl.; Pereiria Wittst.

Coscinium Endl. 1836. Gen. n. 312 *a*. p. 26; 1841. Ench. p. 17: sect. Stemonitidis.

Coscinocladium*) Kunze 1846. Flora II. p. 768: nov. g. Endocarpear.

Coscinodisceae Kütz. 1844. Bacill. p. 130; 1845. Phycol. germ. p. 112; 1849. Spec. Alg. p. 122: fam. Diatomear. Gen. 1845: Coscinodiscus, Actinocyclus, Actinoptychus et (1849) Systephania, Asterolampra, Odontodiscus, Asteromphalus, Halionyx, Symbolophora, Heliopelta, Omphalopelta.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: subtrib. Lysigoniear. Gen. ut Kütz. 1845.

Coscinodiscus Ehrenb. 1838. Kreideth.; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 206; 1844. ibid. p. 78: g. Bacillarior.
Kütz. 1844. Bacill. p. 131; 1845. Phyc. germ. p. 112; 1849. Sp. Alg. p. 122. n. 76: g. Coscinodiscear. — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 45: g. Melosirear.
Synon. Endictya, Auliscus, Craspedodiscus et Dictyopyxis Ehrenb.

Coscinodon Spreng. 1804. Einl. Krypt. p. 281: nov. g. Muscor. (C. pulvinatus.) *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 267. — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 107.
Brid. 1822. Meth. Musc. p. 48: g. Peristomor. acrocarpor. (C. nudus = *Discelium Brid.*) *Cf.* Leman 1825. Dict. v. 38. p. 422 (*Percilelle*).
Brid. 1826. Bryol. I. p. 370: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIV Weissioideor.)
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 608: g. Weissiaceor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Orthotrichoidear.
Endl. 1836. Gen. n. 519. p. 50; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 9.
Bruch & Schimp. . . . . Bryol. eur. Fasc. II. III. (vol. III. p. III. g. Grimmiacear.)
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 897: g. Calyptrobryor.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 91: g. Orthotrichear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401.

*) κόσκινον, cribrum.

Coscinodon Spreng. cont.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 173: g. Coscinodontear. (Grimmia pulvinata.)
C. Müll. 1849. Syn. Musc. 1. p. 764: g. Grimmiear.
Conf. Trimalium Fröl.

Coscinodonteae Rabenh. 1848 Krypt. II. 3. p. 172: subsect. Orthotrichoidear. Gen.: Coscinodon, Ptychomitrium.

Cosmanthus Nolte 1838. Catal. sem. hort. germ.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 296: g. Hydrophyllacear. Sect.: Gymnobythus, Eucosmanthus. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 639.
Synon. Polemonii sp. Willd.; Phaceliae sp. Mich.; Eutocae sp. Br.

Cosmarium*) Corda 1835. Carlsb. p. 121.
Menegh. 1838. Cenni p. 34; 1840. Linnaea XIV. p. 217: g. Desmidiear. (nudar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 649. — Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 136; 1849. Sp. Alg. p. 174. n. 128. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 267. — Math. 1853. Belg. II. p. 527.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): g. Eumicrasteriear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Micrasteriear.
Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 114: sect. Euastri.
Synon. Heterocarpella Turp. pt.; Ursinella Turp.

Cosmea Willd. 1803. Spec. III. 3. p. 2250. n. 1537; 1809. Enum. p. 922: g. Syngenes. Frustran.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 570; 1826. Syst. III. p. 615. n. 2849; 1831. Gen. II. p. 640. n. 3207: g. Radiatar.
Link 1822. En. II. p. 353: g. Oppositifoliar.
Less. 1832. Syn. p. 230: g. Bidentidear.
= Cosmos Cavan.

Cosmelia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 535. Ed. Nees p. 391: nov. g. Epacridear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 2. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIII. 488. n. 784. — Bartl. 1830. Ord. p. 158. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 155. n. 778 (in Pentandr. Monogyn.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 689. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 267.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 518: g. Epacridum.
Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3346: g. Sprengeliaccar.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 784: g. Epacriear.
Lindl. 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1822: g. Epacridacear.
Endl. 1839. Gen. n. 4285. p. 749; 1841. Ench. p. 368: g. Epacrear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 766. — Meisn. 1839. Gen. p. 249 (157). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 434. — Sond. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 330. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449.

*) κοσμάριον, parvum ornamentum.

Cosmelia R. Brown cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4818: g. Sprengeliear.
Synon. Epacridis sp. Spreng.

Cosmella Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 348: sect. Coreopsidis. (C. nudata et rosea.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 982.

Cosmia Domb. mss. ex Juss. Gen. p. 312.
= Calandrinia HBK.

Cosmibuena Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 10. t. 2: nov. g. Triandr. Monogyn. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 11. p. 2.
= Hirtella Linn.

Cosmibuena Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 2. t. 226: nov. g. Pentandr. Monogyn., a Cinchona disjunctum. *Cf.* Schrad. n. Journ. II. 1. p. 47.
Pers. 1805. Ench. I. p. 197. n. 437: g. Rubiacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 138. n. 595. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. III. 7. n. 860.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2066: g. Cinchonear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 211. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 283. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 479. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372.
D. Don 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 141. Char. emend.
Endl. 1838. Gen. n. 3275. p. 556; 1841. Ench. p. 274: g. Eucinchonear.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2911: g. Quinquinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.
Synon. Buena Pohl.

Cosmidium „Gray mss." Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 361: nov. g. Coreopsidear. (Coreopsis filifolia Hook.) *Cf.* Endl. 1842. Spl. II. p. 43. — Par Walp. 1843. Rep. II. p. 615; 1847. VI. p. 164.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 350: g. Bidentidear.
A. Gray 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 252: sect. Thelespermae.

Cosmium Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 344: sect. Dendrolirii.

Cosmocladium*) Brébiss. 1856. Liste p. 133. t. 1. f. 20: nov. g. Algar. (ex Rabenh. Alg. aq. dulc.)

Cosmophyllum C. Koch 1854. Ind. sem. h. Berol. App.: nov. g. Verbesinear. (C. cacaliaefolium.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 219.
= Ferdinanda Lag.

Cosmos Cavan. 1791. Icon. I. p. 9. t. 14. 79: nov. g. Syngenes. Polygam. Frustran. (C. bipinnatus.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 477. n. 1917 (*Cosmus*).
St Hil. 1805. Expos. I. p. 415: g. Corymbiferar.
Cass. 1818. Dict. v. 11. p. 4; 1825. v. 38. p. 17; 1829. v. 59. p. 321; 1830. v. 60. p. 576: g. Coreopsidear. (1829 verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2607. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 135.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 239. t. 382: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 483. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Brongn. 1843. En. genr. p. 41.
DC. 1836. Pr. V. p. 606: g. Bidentidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2542. p. 413; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 203 (132). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 349. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 2007 (*Cosmus*): g. Senecionidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3598: g. Bidentear.
Synon. Cosmea Willd.; Coreopsidis sp. Jacq.

Cosmostemon Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 134: sect. Melaleucae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 745.

Cosmostigma Wight 1834. Contrib. p. 41.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 132: g. Hoyacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3506. p. 596; 1841. Ench. p. 299: g. Tylophorear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (177). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5046.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: g. Pergulariear.
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Ceropegiear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 613: g. Pergulariar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.

Cosmus Pers., Lindl. vid. *Cosmos Cavan.*

Cossignea Willd. vid. *seq.*

Cossignia*) „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 248: nov. g. Sapindor.
Gmel. 1791. Syst. p. 577: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 226. n. 675 (*Cossignea*). — Pers. 1805. Ench. I. p. 388. n. 853 (*Cossinia*).
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 12: g. Saponacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 220. n. 897.
Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 5: g. Sapindear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 614. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 125. n. 1302; 1830. Gen. I. p. 252. n. 1314 (*Cossinia*). — Schult. 1829. Syst. VII. p. XII. 71. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 41.
Link 1821. En. I. p. 344: g. Sapindacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1040. 1070 (*Cossinia*).
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5210: g. Cupaniear.
Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 33.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 672: g. Dodonaeacear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38). — Endl. 1840. Gen. n. 5623. p. 1072; 1841. Ench. p. 561.

*) κόσμος, ordo, ornamentum.

*) Dicat. D. de Cossigny.

Cossignia Comm. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 198. n. 7580: g. Dodonaeear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385: g. Dodonear.
Cossignieae Blume 1849. Rumphia III. p. . . .: trib. Sapindacear. propriar. Gen.: Harpullia, Otonychium, Blancoa, Kölreuteria.
Cossinia Pers., Spreng., Dietr. vid. *Cossignia Comm.*
Cossonia Durieu 1853. Ann. sc. nat. 3e sér. XX. p. 82: nov. g. Raphanear. (C. africana.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 220.
= Raffenaldia Godr.
Costa Flor. Flumin. I. t. 48 (aromatica = Galipea Arrabidae ex Steud. Nom. I. p. 426).
= Ticorea Aubl.
Costae Blume En. pl. Jav. p. 41: vid. *Costi Blume.*
Costaea A. Rich. . . . . Pl. vasc. Cub. II. p. 75. t. 83.
= Purdiaea Planch.
Costaria Greville 1830. Alg. synops. p. xxxix. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 271.
Menegh. 1838. Cenni p. 43: g. Laminariear. — Par. Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 161. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 778. — Endl. 1843. Spl. III. p. 28. n. 112. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phyc. gener. p. 347; 1849. Sp. Alg. p. 580. n. 387. — J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 139. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. 12: g. Agaroidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Laminaridar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 103: g. Eulaminariear.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 89: g. Laminariacear.
Costeae A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: sect. Zingiberacear. Gen.: Costus.
Rchb. 1841. Nom. p. 57: subdiv. Amomear. Gen. id.
Meisn. 1842. Gen. p. 389 (291): trib. Zingiberacear. Gen. id.
Costi Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 61 (p. 41 *Costae*): div. Scitaminear. Gen.: Costus.
Endl. 1837. Gen. p. 225; 1841. Ench. p. 119: sect. Zingiberacear. Gen. id.
Costia*) Willkomm 1858. Bot. Zeit. p. 377: nov. g. Triticear. (Agropyrum cristatum R. S.)
Costoideae Ledeb. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341: div. Scitaminear. Gen.: Zerumbet, Costus, Jacuanga.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 356: trib. Zingiberacear. Gen. ead.
Costus**) Linn. 1737. Gen. p. 331. n. 825; 1737. Cliff. p. 2; 1740. Syst. p. 16; 1748. Ups. p. 2; 1753. Sp. I. p. 2; 1759. Syst. ed. X. p. 842. n. 3; 1762. Sp. ed. II.

*) Dicat. prof. A. Costa, Barcelon.
**) Graece κόστος, arabice *koost.*

Costus Linn. cont.
p. 2; 1764. Gen. ed. VI. p. 3. n. 3; 1767. Syst. ed. XII. p. 50: g. Monandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 49; 1784. Syst. p. 81. — Reich. 1778. Gen. p. 3. n. 3. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 3. n. 4. — Gmel. 1791. Syst. p. 7. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 3. — Pers. 1797. Syst. p. 50. — Willd. 1797. Sp. I. p. 10. n. 7; 1809. En. p. 4. — Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 2. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 57. Ed. 1832. p. 58.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 149. n. 618: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27: g. Scitaminum. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 276. (veror.).
Adans. 1763. Fam. II. p. 66: g. Zingiberum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Scitaminear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 94. — Gis. 1792. Prael. p. 188. — Batsch 1802. Tab. p. 104. — Roxb. 1812. Asiat. research. XI. p. 518. *Cf.* Link Jahrb. I. p. 98. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 3. 24. — Agdh. 1823. Aphor. p. 184. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 13. n. 13; 1830. Gen. I. p. 6. n. 13. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 16.
Hill 1769. Ht. kew. p. 279: g. Tripetalar. irregular.
Juss. 1789. Gen. p. 63: g. Cannar.
Medic. 1790. Act. Theod. Pal. VI. p. 387: g. Gynandriae Diandro-Monogynae.
Neck. 1790. El. III. p. 142. n. 1483: g. Cratoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 204: g. Drymyrrhizar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 156: g. Amomear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 2. 342. — Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 11. — Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1594. — Bartl. 1830. Ord. p. 61. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 169.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 277: g. Cannear.
Link 1821. En. I. p. 4: 1829. Hdb. I. p. 232: g. Alpiniacear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 65: g. Drymyrhizear.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 61: g. Costor. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1638. p. 225; 1841. Ench. p. 119. Sect. (1842. Spl. II. p. 22): Costus, Jacuanga.
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: g. Costear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2227. — Meisn. 1842. Gen. p. 389 (291).
Brongn. 1843. Én. genr. p. 25: g. Zingiberacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 609.
Synon. Tsjana Gmel.; Planera Gis.; Banksea Kön.; Hellenia Retz.; Gissanthe Salisb.
Costus Pers. 1805. Ench. I. p. 2. n. 7: g. Scitaminear.
= Alpinia Linn.
Costus Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e ser. XV. p. 329: g. restrict. Scitaminear., p. 341 Costoidear. (C. speciosus.)

Costus Lestib. cont.
Endl. 1842. Spl. II. p. 225. n. 1638 *a*: sect. Costi.

Cosymbe*) Tulasne 1844. Arch. Mus. IV. p. 168: sect. Tachigaliae. (Chrysostachydis sp. Pöpp., Leptolobii sp. Mart.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 569.

Cota „Gay in Guss. Syn. II. p. 866" (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 155: nov. g. Chamomillear. (Anthemis tinctoria L.)
Boiss. 1856. Diagn. pl. nov. or. III. Ser. 2. Nr. 3. p. 20: g. Corymbiferar.

Cothestecum Spach vid. *Cathestecum Presl.*

Cotinus**) Tourn. 1700. Inst. p. 610. t. 380: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 89. Ed. Hall. 1745. p. 100: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 84. n. 242; 1737. Cliff. p. 111; 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 125. n. 288: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 220.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125: g Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 73.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Dumosar., serius Rhoi insertum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 345: g. Pistaciar.
Neck. 1790. El. II. p. 226. n. 965: g. Eredophytor.
DC. 1825. Pr. II. p. 67: sect. Rhois. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3850 *a*; 1832. Fl. exc. p. 489; 1841. Nom. p. 146. n. 5668. 1. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 69. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 210. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 216. — Endl. 1840. Gen. n. 5905 *a*. p. 1131; 1841. Ench. p. 599. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 134.
Synon. Coccygria Magnol.

Cotoneaster „Bauh." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 123. Ed. Hall. 1745. p. 137: g. pl. class. V.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 155: g. Mespilor. (Mespilus Cotoneaster L.)
Medic. 1793. Gesch. Bot. p. 85; 1794 in Usteri n. Ann. III. p. 92: g. Antho-Mallonandriae.
Lindl. 1822. Linn. Trans. XIII. p. 101; 1827. Bot. Regist. XIII. t. 1114; 1847. Veg. kd. p. 560: g. Pomacear. *Cf.* Flora 1823. I. p. 167. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 214. — Kunth 1824. Syn. III. p. 463. — DC. 1825. Pr. II. p. 632. — Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4465; 1832. Fl. exc. p. 629; 1841. Nom. p. 168. n. 6534. — — Bartl. 1830. Ord. p. 400. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 414. n. 2066. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 218. — Link 1831. Hdb. II. p. 78. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 603. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 73; 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. III. p. 105. — Koch 1836. Syn. p. 234. Ed. II. p. 259. — Meisn. 1837. Gen.

*) Κοσύμβη: flos T. aureae in modum rosae minimae explicatur.
**) Nomen ex Plinio.

Cotoneaster Bauh. cont.
p. 106 (75). — Endl. 1840. Gen. n. 6347. p. 1238; 1841. Ench. p. 656. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 156. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 124. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 90. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 91. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 104. 220.' — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 368. — Orb. 1849. Dict. IV. p. 273.
Gaud. 1828. Helv. III. p. 326: sect. Mespili.
Schltd. 1856. Linnaea XXVII. p. 534.
Synon. Mespilus Wahlenb.

Cottaea Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 452: nov. g. Filicum foss.
Endl. 1841. Ench. p. 44. n. $687/_{24}$: g. Caulopteridum.
Schimp. & Moug. 1844. Pl. foss. Vosg. p. 69.
Corda 1845. Fl. Vorw. p. 76: g. Protopteridear.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 111; 1846. Chlor. prot. p. LII: caudex Filicis foss.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 84: g. Caulopteridear.

Cottaea Endl. 1837. Gen. n. 831. p. 92; 1841. Ench. p. 58: g. Pappophorear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1305. — Meisn. 1843. Gen. p. 421 (322). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 162. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Conf. Cottea Kunth.

Cottaites Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 101; 1845. Syn. pl. foss. p. 265; 1846. Chlor. prot. p. XC: g. lignorum foss. ex ordine Leguminosar.

Cottea*) Kunth 1830. Rev. Gram. p. 84; 1833. Agrost. p. 256: g. Pappophorear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 136. 328. — Steud. 1854. Glum. I. p. 201.
Conf. Cottaea Endl.

Cottendorfia Schult. f. 1830. Syst. VII. p. LXIV. 1193. n. 1471: nov. g. Bromeliacear. (C. florida.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1311. p. 184; 1841. Ench. p. 106. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 148.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1626: g. Tillandsiear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299). — A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 740.

Cottonia**) Wight 1851. Icon. V. t. 1755: nov. g. Vandear. *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 880.

Cotula Tourn. 1700. Inst. p. 495. t. 282: g. pl. class. XIV.
Linn. 1737. Gen. p. 256. n. 657; 1737. Cliff. p. 417; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 266; 1753. Sp. II. p. 891; 1759. Syst. ed. X. p. 1222. n. 868; 1763. Sp. ed. II. p. 1256; 1764. Gen. ed. VI. p. 433. n. 968; 1767. Syst. ed. XII. p. 564: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 644; 1784. Syst. p. 774. — Reich. 1778. Gen. p. 430. n. 1050. — Lour. 1790. Coch. II. p. 493. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 566. n. 1310. — Gmel. 1791. Syst. p. 1249. — Pers. 1797. Syst. p. 815;

*) Dicat. Henr. Cotta, Tharand.
**) Dicat. „Major Fred. Cotton, Madras."

Cotula Tourn. cont.
1807. Ench. II. p. 463. n. 1883. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2165. n. 1505; 1809. En. p. 908. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 437.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 249. n. 1028: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 565.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 184. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 549. — Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 405.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539.
Scop. 1777. Intr. p. 132: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 88. n. 159: g. Siphoniphytor. Excluditur Baldingeria.

Cotula Vaill. 1719. Act. Ac. Paris. p. 288: g. Corymbiferar.
= Cenia Comm.

Cotula Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 388. t. 165: g. emendat. Tubulosar.
Cass. 1818. Dict. v. 11. p. 67: g. Anthemidear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 918. Sect.: Centipeda. — Link 1829. Hdb. I. p. 752. — Bartl. 1830. Ord. p. 141. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 225. — A. Rich 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 235. — Koch 1837. Syn. p. 370. Ed. II. p. 407. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 39.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 551; 1826. Syst. III. p. 497. n. 2733; 1831. Gen. II. p. 621. n. 3081: g. Eupatorinar.
Link 1822. En. II. p. 343: g. Corymbiferar.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 177; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: g. Cotulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2375. — Less. 1832. Syn. p. 260. — DC. 1837. Pr. VI. p. 77. — Endl. 1838. Gen. n. 2683. p. 437; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 212 (135). — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3437. (genuinar.) — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 434. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 559. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 127: g. Senecionidear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 23: g. Chrysanthemear.
Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 127: g. Compositar.
Synon. Ananthocyclos Vaill.; (Ananthocyclus Wittst.); Lancisia Ponted.; Baldingeria Neck.; Cotulae sp. Linn.

Cotula C. Koch 1843. Bot. Zeit. p. 37: g. Cotulear. exactius circumscriptum. Sect.: Eucotula, Cotulopsis, Cotulodes, Pseudocotula. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 991; 1847. VI. p. 209.

Cotuleae Cassini 1823. Dict. v. 29. p. 177; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: subdiv. Chrysanthemear. Gen.: Solivaea, Hippia, Cryptogyne, Monochlaena, Eriocephalus, Leptinella, Cenia, Cotula. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 103. Gen.: Hippia, Leptinella, Cenia, Cotula.

Cotuleae Cassini cont.
Less. 1832. Syn. p. 260: div. Artemisiear. Gen.: Omalanthus, Lapeyrousia, Cotula, Strongylosperma, Cenia.
DC. 1837. Pr. VI. p. 76: div. Anthemidear. Gen.: Peyrousea, Otochlamys, Cotula, Strongylosperma, Cenia, Omalotes. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 437; 1841. Ench. p. 241. Gen. ead. (Lapeyrousia loco Peyrouseae.) Accedit 1842 (Spl. II. p. 46) Aromia. — Meisn. 1839. Gen. p. 212 (135). Gen. ut DC.
Rchb. 1841. Nom. p. 88: div. Tubuliflorar. Subdivis.: *genuinae* (gen. Cotulear. DC. et sect. Hippieae), Euxenieae, Artemisieae.
C. Koch 1843. Bot. Zeit. p. 38. Nova gen.: Pleiogyne, Cenocline.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: subtrib. Senecionidear. Gen. ut Endl. 1842 et Cenocline.

Cotulodes C. Koch 1843. Bot. Zeit. p. 39: sect. Cotulae. (C. leptalea, oxyodonta, sororia DC.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 991.

Cotulopsis C. Koch 1843. Bot. Zeit. p. 39: sect. Cotulae. (C. filifolia Thunb.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 991.

Cotylanthera*) Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 707: nov. g. Solanaceis accedens.
Endl. 1839. Gen. n. 3870. p. 668; 1841. Ench. p. 332: g. dubium Solanacear. — Par. Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 674.
Meisn. 1840. Gen. p. 276 (183): g. Daturear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4693: g. Henckeliear.?
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 734: g. Cyrtandracear. dubium.

Cotyle DC. 1828. Prodr. III. p. 400: sect. Umbilici. (Cotyledon Umbilicus L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4187 *c*. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 112. — Endl. 1839. Gen. n. 4620 *b*. p. 811; 1841. Ench. p. 405.
Synon. Umbilicus Cam.; Cotyliphyllum Link.

Cotylea Tausch 1823. Hort. Canal. fasc. I: sect. Saxifragae. (S. rotundifolia.) *Cf.* Flora 1824. I. p. 86. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 336.
= Miscopetalum Haw.

Cotyledon**) Tourn. 1700. Inst. p. 90. t. 19: g. pl. class. I. — Par. Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 40.
Linn. 1737. Gen. p. 136. n. 382; 1737. Cliff. p. 175; 1740. Syst. p. 23; 1753. Sp. I. p. 429; 1759. Syst. ed. X. p. 1036. n. 512; 1762. Sp. ed. II. p. 614; 1764. Gen. ed. VI. p. 229. n. 578; 1767. Syst. ed. XII. p. 316. n. 574: g. Decandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 357; 1784. Syst. p. 428. — Reich. 1778. Gen. p. 235. n. 628. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 309. n. 788. — Lour. 1790. Coch. I. p. 286. — Gmel. 1791. Syst. p. 729. — Pers. 1797. Syst. p. 759; 1805. Ench. I. p. 510.

*) κοτύλη, excavatio, poculum.
**) κοτυληδών, Graecorum.

Cotyledon Tourn. cont. n. 1138. — Willd. 1799. Sp. II. p. 753. n. 912; 1809. En. p. 482. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 455.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 229. n. 946: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 430.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 274. — Batsch 1802. Tab. p. 27.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 307.

Adans. 1763. Fam. II. p. 248: g. Sedor.

Hill 1769. Ht. kew. p. 152: g. Monopetalar.

Ortega 1772. De nova quadam stirpe, seu Cotyledonis, Mucizoniae et Pistoriniae descriptio.

Scop. 1777. Intr. p. 254: sect. Sedi.

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 215. *Cf. Kalanchoë.*

Neck. 1790. El. II. p. 296. n. 1066: g. Synathrophytor.

Cram. 1803. Disp. p. 96 in Octandr. Tetragyn.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 125: g. Crassulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 334. n. 1316.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 855: g. Sedear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1624. Sect.: verae, Echeveria, Umbilicus.

= Cotyledon, Umbilicus et Echeveria DC.

Cotyledon DC. 1801. Bull. soc. philom. n. 49. p. 1; 1815. Fl. Franç. V. p. 521: g. restrict. Crassulacear. (C. sedoides DC.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 310. — Link 1831. Hdb. II. p. 22. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 551. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 86. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 306. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 106.

Haw. 1812. Syn. succ. p. 105 (Ed. Schrank 1819. p. 114); 1821. Rev. succ. p. 19: g. Pentandr. Pentagyn.

Lois. 1818. Dict. v. 11. p. 69: g. Sempervivor. („*des Joubarbes*".)

Link 1821. En. I. p. 435: g. Sempervivar.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 437. n. 1731; 1830. Gen. I. p. 385. n. 1937: g. Sedear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4185. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 197.

DC. 1828. Pr. III. p. 396: g. Crassulear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 109. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346.

Meisn. 1838. Gen. p. 135 (98): g. Umbilicear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4618. p. 810; 1841. Ench. p. 405.

Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6194: g. Cotyledonear.

Synon. Umbilicaria Pers.; Cotyledonis sp. capens. Auct.

Cotyledon Gaudin 1828. Fl. helvet. III. p. 63. 211: g. Crassulacear.

= Umbilicus DC.

Cotyledon Gaudin 1828. Fl. helvet. III. p. 86: sect. Saxifragae. (S. Cotyledon, mutata et Aizoon.)

= Saxifragae sect. Aizoniae Tausch pars.

Cotyledoneae DC. 1818. Syst. I. p. 121; 1824. Prodr. I. p. 1: div. plantar. Classes: Exogenae s. Dicotyledoneae, Endogenae s. Monocotyledoneae.

Cotyledoneae Rchb. 1841. Nomencl. p. 158: subsect. Sedear. genuinar. Gen. Umbilicear. Endl. (omissa Echeveria.)

Cotylephora Meisn. 1837. Gen. Comm. p. 28: g. Tiliear.?, pro *Esenbeckia Blume* propositum.

= Neesia Blume.

Cotyliphyllum Link 1831. Handb. II. p. 23: g. Crassulacear. (Cotyledon Umbilicus L.)

= Cotyle DC.

Cotyliscus Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 164. 175: nov. g. pro Cochlearia nilotica Del. propositum. *Cf.* Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 71.

DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 240; 1821. Syst. II. p. 526; 1824. Pr. I. p. 203: sect. Senebierae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4749 *c*; 1841. Nom. p. 180. n. 6941. 3. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 217. — Endl. 1839. Gen. n. 4975 *c*. p. 888; 1841. Ench. p. 451.

Coublandea Steud. Nomencl. I. p. 428: vid. *seq.*

Coublandia*) Aublet 1775. Guian. II. p. 937. t. 356: nov. g. Polygam. Monoec. (C. frutescens.)

Juss. 1789. Gen. p. 352: g. Leguminosar.

Gmel. 1791. Syst. p. 797 (*Cublandia*): g. Polyandr. Monogyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 80. n. 1317.

Batsch 1802. Tab. p. 98 (*Cublandia*): g. Lomentacear.

Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsiear.

= Müllera Linn. f.

Couepia**) Aublet 1775. Guian. I. p. 519. t. 207: nov. g. Icosandr. Polygyn. (C. guianensis.)

Juss. 1789. Gen. p. 341: g. Amygdalear.

Gmel. 1791. Syst. p. 820 (*Cuepia*): g. Polyandr. Monogyn.

Batsch 1802. Tab. p. 4 (*Cuepia*): g. Drupiferar.

Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 162: g. Rosacear.

R. Brown 1818. Tuck. Cong. p. 433 (Verm. bot. Schr. I. p. 205: *Coupia*): g. Chrysobalanear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 526. — Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4523. — Bartl. 1830. Ord. p. 406. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 478. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 369.

G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 44 (*Coupia*): g. Rhamneis aff., minus notum.

Meisn. 1837. Comm. p. 72 in synon. Moquileae.

Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 212: g. Chrysobalanacear. Sect.: Eucouepia, Hemicouepia.

Endl. 1842. Spl. II. p. 95. n. 6410 *b*: sect. Moquileae. Subsect. eaed. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 6.

Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 92: subg. Moquileae.

Synon. Grymania Presl.

---

*) Lecta prope praedium domini Descoublan.

**) Nomen caribaeum *Couepi*.

Coulejia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 31: nov. g. plantar. (*Amvetti Rheede* V. t. 54.)
= . . . ?

Coulteria*) HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 328: nov. g. Caesalpiniear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 46. — Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4150; 1841. Nom. p. 155. n. 6066. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 99. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6764. p. 1312; 1841. Ench. p. 674.
DC. 1825. Pr. II. p. 480: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 429. — Meisn. 1837. Gen. p. 99 (70).
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 360. n. 1816: g. Leguminosar. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1495.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Walp. 1838. Flora I. p. 35.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Eucaesalpiniear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Synon. Tara Mol.; Adenocalyx Bert.

Couma Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 39. t. 392: nov. g. flore incognito. (C. guianensis.)
Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 219: g. incertae sedis.
A. Rich. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 52 (Isis 1825. p. 1309): g. Apocynear, Carissae, Ambelaniae, Pacouriae et Cerberae aff.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 49; 1830. Gen. I. p. 136. n. 178: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 631.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3577: g. Cerberear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 102: g. Melodiniear.
Endl. 1838. Gen. n. 3379. p. 579; 1841. Ench. p. 293: g. Carissear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 505. — Meisn. 1840. Gen. p. 262 (171). — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5197. (genuinar.)
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 322: g. Willughbeiar. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601.
Synon. Cerberae sp. Rudge.

Coumarouma Wittst. Etym. Handw. p. 233: sphalm. pro *seq.*

Coumarouna**) Aublet 1775. Guian. II. p. 740. t. 296: nov. g. Diadelph. Octandr. (C. odorata.) *Cf.* Steud. Nomencl. I. p. 453 (*Cumarouma*). — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1084 (*Cumaruna*).
Lam. Illustr. t. 601 (*Cumaruna*).
Juss. 178.. Gen. p. 364: g. Leguminosar. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 218.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Dalbergiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 477: sect. Diptericis. Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4023 *a*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 427.
Synon. Heinzia Scop.; Baryosma Gärtn.

Coupia Nees, G. Don vid. *Couepia Aubl.*

Coupia Dietr. vid. *Goupia Aubl.*

*) Dicat. Thom. Coulter, peregrinatori botanico.
**) Nomen caribaeum *Coumarou*.

Couponi Wittst. Etym. Handw. p. 233: sphalm. pro *seq.*

Coupoui*) Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 16. t. 377: nov. g. imperfecte cognitum. (C. aquatica.)
Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 223: g. Myrtear.? — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 108 (77).
DC. 1828. Pr. III. p. 295: g. dubium Myrtacear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 871. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 106.
Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4546: g. Terminaliear.?
Endl. 1840. Gen. n. 6330. p. 1234; 1841. Ench. p. 651: g. dubium Barringtoniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 175. n. 6809 (*Coupouia*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 755: g. Barringtoniacear.?

Coupouia Rchb. vid. *praeced.*

Couralia Splitg. 1842 in Hoev. & Vriese Tijdschr. IX. p. 10: nov. g. Bignoniacear., Zeyheriae aff. (Bignonia fluviatilis Aubl.)
= Tabebuia Gomez.

Couratari**) Aublet 1775. Guian. II. p. 723. t. 290: nov. g. Monadelph. Polyandr. (C. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1039 (*Curatari*).
Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 224: g. Zanoniae aff.?
A. St. Hil. 1822. Mém. Mus. IX. p. 218: g. Nandhirobear.
A. Rich. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 329: g. Lecythidear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 294. — Rchb. 1828. Consp. p. 175. n. 4653; 1841. Nom. p. 175. n. 6794 (*Courataria*). — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 379. — Bartl. 1830. Ord. p. 332. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 875. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 198. — Meisn. 1838. Gen. p. 109 (78). — Endl. 1840. Gen. n. 6331. p. 1234; 1841. Ench. p. 651. — Walp. 1843. Rep. II. p. 193 (*Couratori*). — Berg 1856. Linnaea XXVII. p. 462; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 2. p. 506. Sect.: Eucouratari, Cariniana.
Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 81: g. Myrtear.? — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 436. n. 2159 (*Curataria*).
Poit. 1827. Mém. Mus. XIV. p. 154.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 740: g. Lecythidacear.
Synon. Lecythopsis Schrank; Cariniana Casar.

Courataria Rchb. 1841 vid. *praeced.*

Couratori Walp. vid. *praeced.*

Courbari Adans. vid. *seq.*

Courbaril***) Plumier 1703. Gen. p. 49. t. 36.
Adans. 1763. Fam. II. p. 317 (*Courbari*): g. Cassiar.

*) Nomen caribaeum *Coupoui-rana*.
**) Nomen caribaeum *Couratari*.
***) Nomen americanum.

Courbaril Plum. cont.
Endl. 1841. Gen. n. 6788 *a*. p. 1317; 1841. Ench. p. 674: sect. Hymenaeae.
Synon. Hymenaea Hayne.

Courimari*) Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 27. t. 384: nov. g. imperfecte cognitum. (C. guianensis.)
Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 243: g. incertae sedis.

Couringia (?) Heist. . . . *Cf.* Juss. 1818. Dict. v. 11. p. 244.
Adans. 1763. Fam. II. p. 418: g. Erucar. (Brassica orientalis et campestris L.)
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 239: sect. Erysimi.
Link 1831. Hdb. II. p. 310: g. Siliquosar.
Vid. Conringia.

Courondi Adans. 1763. Fam. II. p. 446: g. Cistor. (*Rheede* Ht. Malab. IV. p. 103. t. 50.) *Cf.* Hamilt. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 228.
= Christmannia Dennst.

Couroupita**) Aublet 1775. Guian. II. p. 708. t. 282: nov. g. Monadelph. Polyandr. (C. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1068 (*Curupita*).
Juss. 1789. Gen. p. 326: g. Myrtor.
Batsch 1802. Tab. p. 13 (*Curupita*): g. Myrtoidear.
Tussac 1818. Fl. Antill. II. p. 45.
Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 273: g. Myrtacear.
Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 81: g. Myrtear.
Poit. 1826. Mém. Mus. XIII. p. 152: g. Lecythidear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 293. — Rchb. 1828. Consp. p. 175. n. 4652; 1841. Nom. p. 175. n. 6797. — Bartl. 1830. Ord. p. 332. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 874. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 196. — Meisn. 1838. Gen. p. 109 (78). — Endl. 1840. Gen. n. 6334. p. 1235; 1841. Ench. p. 651. — Brongn. 1843. En. genr. p. 124. — Berg 1856. Linnaea XXVII. p. 461; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 2. p. 475.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 740: g. Lecythidacear.
Synon. Pontopidana Scop.; Elsholtzia Neck.; Lecythidis sp. Willd.; Pekeae sp. Juss.

Courrantia***) Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 276: nov. g. Pyrethrear. (Matricaria Courrantiana DC.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 194: sect. Matricariae.
Conf. Chamomilla DC.

Coursetia†) DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 92: nov. g. Leguminosar. (Lathyrus fruticosus Cav.). — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 583. n. 2864.
DC. 1825. Pr. II. p. 264: g. Galegear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3901; 1841. Nom. p. 148. n. 5738. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 239. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6549. p. 1274; 1841. Ench. p. 669. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 491.

Courtarea Dietr. vid. *Coutarea Aubl.*

Courtenia R. Brown 1844 in Horsf. Pl. jav. rar. Pt. 3. p. 236: nov. g. Sterculiear. (Sterculia heterophylla Pall.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 105.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 362: g. Sterculear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 616: g. Sterculiacear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. $5321/_5$.

Courtoisia Rchb. 1827. Ic. exot. t. 208; 1837. Hdb. p. 194; 1841. Nomencl. p. 113. n. 4384: g. Giliear., inter Collomiam et Navarretiam medium. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 108.
Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179): subg. Giliae.
= Navarretia Ruiz & Pav. (Benth. in DC. Pr. IX. p. 309.)

Courtoisia Marchand 1830. Bijdr. tot nat. Wet. V. p. 184: nov. g. Lichenum. (Parmelia exigua et effusa Ach., Byssus candelaris L., Patellaria rubra et Verrucaria atra Hoffm., etc.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 195.

Courtoisia*) Nees 1834. Linnaea IX. p. 286; 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 261: nov. g. Cyperear. (Kyllingia cyperoides Rottb.) — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 127. — Meisn. 1842. Gen. p. 410 (313). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144. — Steud. 1855. Glum. II. p. 71. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 295.
= Mariscus Vahl?

Cousinia**) Cassini 1827. Dict. v. 47. p. 498. 503; 1830. v. 60. p. 570: nov. g. Xeranthemear. (Carduus orientalis Marsch.?) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9.
C. A. Meyer 1831. En. pl. Cauc. p. 230.
DC. 1837. Pr. VI. p. 552: g. Carlinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2862. p. 470; 1841. Ench. p. 246. — Meisn. 1839. Gen. p. 224 (139). — Brongn. 1843. En. genr. p. 36. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 676. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3664: g. Arctiear.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 328: g. Eulappear.
Synon. Carthami, Onobromatis et Cardui sp. Auct.

Coussapoa Aublet 1775. Guian. II. p. 955. t. 362. 363: nov. g. Polygam. Trioec. (C. latifolia et angustifolia.)
Juss. 1789. Gen. p. 406: g. Urticis aff.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 312 (*Cussapoa*): g. Urticeis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 340 (*Cussapoa*).
Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 285: g. Urticear.
Agdh. 1825. Aphor. p. 204: g. Artocarpear. —

*) Nomen caribaeum *Courimari*.
**) Nomen caribaeum *Couroupitoutoumou*.
***) Dicat. Helveto Courrant.
†) G. Dumont de Courset.

*) Dicat. R. Courtois, prof. Leodiensi.
**) Dicat. Vict. Cousin, prof. Paris.

Coussapoa Aublet cont.
Par. Bartl. 1830. Ord. p. 105. — Endl. 1837. Gen. n. 1866. p. 280; 1841. Ench. p. 168. — Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 49. — Meisn. 1842. Gen. p. 349 (260). — Brongn. 1843. En. genr. p. 99.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 506: g. Cecropiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2518.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 33. t. 147.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 38: g. Artocarpidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 271: g. Artocarpacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 310.
Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 92: g. Conocephalear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 655. — Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 131.

Coussarea Aublet 1775. Guian. I. p. 98. t. 38: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (C. violacea.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 279 (*Cussarea*). — Schult. 1827. Mant. III. p. 11.
Juss. 1789. Gen. p. 203; 1820. Mém. Mus. VI. p. 376: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 443 (*Cussarea*). — Hedw. 1806. Gen. p. 371 (*Cussarea*). — Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 286. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 12. 205. n. 475. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 92. n. 454. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 459.
Batsch 1802. Tab. p. 233: g. Coffeacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2021. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 177. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87: g. Lentaginiae.
DC. 1830. Pr. IV. p. 493: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 576. — Endl. 1838. Gen. n. 3158. p. 534; 1841. Ench. p. 272. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 310.
Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118): g. Psychotriacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2808: g. Psychotriear.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 26. t. 231.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Benth. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 235 typum Aubletianum, nec species ab Auctoribus eidem generi adscriptas, Farameae injungendum asserit.
Synon. Pecheya Scop.; Billardiera Vahl; Frölichia Vahl.

Coutarea Aublet 1775. Guian. I. p. 314. t. 122: nov. g. Hexandr. Monogyn. (C. speciosa.)
Scop. 1777. Intr. p. 141: g. Opulinar.
Juss. 1789. Gen. p. 202; 1820. Mém. Mus. VI. p. 388: g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 578. — Pers. 1805. Ench. I. p. 392. n. 861. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 441 (*Cutarea*). — Hedw. 1806. Gen. p. 223. n. 907. — Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 291. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 127. n. 1311; 1830. Gen. I. p. 243. n. 1272. — Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 146. t. 200. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1038 (*Courtarea*). 1051.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 79. t. 194. f. 2 (speciosa).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 611: g. Cinchonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2069. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 287. — DC. 1830. Pr. IV. p. 350. — Bartl. 1830. Ord. p. 211. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 472. — Meisn. 1838. Gen. p. 157 (113). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 382. — Brongn. 1843. En. genr. p. 51.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81 (*Contarea*): g. Cinchonariae.
Cham. 1834. Linnaea IX. p. 259: g. Gardeniacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3278. p. 557; 1841. Ench. p. 274: g. Eucinchonear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 310.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2915: g. Quinquinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.
Synon. Portlandiae Jacq. sp.

Coutoubaea Hamilt. vid. *seq.*

Coutoubea*) Aublet 1775. Guian. I. p. 72. t. 27. 28: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (C. spicata, ramosa.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 137. n. 284. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 18 (*Coutoubaea*).
Juss. 1789. Gen. p. 141: g. Gentianar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 322 (*Cutubea*): g. Gentianear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 58. 369. — Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 292. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 179. — Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 346. — Kunth 1823. Syn. II. p. 269. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 426. n. 444; 1830. Gen. I. p. 84. n. 413. — Mart. 1827. Nov. gen. II. 2. p. 110. t. 85 (*Cutubea*). *Cf.* Flora 1827. I. p. 375. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Cham. 1833. Linnaea VIII. p. 13 (*Cutubea*). — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 36. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 440. — Steud. 1840. Nom. I. p. 429 (*Coutubea*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3482: g. Chironiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3553. p. 604; 1841. Ench. p. 302. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 311.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 201: g. Coutoubear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 132. n. 5104: g. Erythraeariar.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 130: g. Hippiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 66: g. Erythraeacear.

*) Nomen caribaeum.

Coutoubea Aublet cont.
Benth. 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 198.
Synon. Limborchia Scop.; Exacum Vahl; Picrium Schreb.

Coutoubeae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 174. 200: subtrib. Gentianiear. Gen.: Coutoubea, Adenema, Schubleria, Helia, Eudoxia.

Coutubea Steud. vid. *Coutoubea Aubl.*

Couturea Cast. 1845. Cat. pl. Mars. p. 192.
Desmaz. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 65: g. Gasteromycetum. Char. emend.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42 (*Couturia*): g. Sphaeronemeor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 407: g. Myxothecieor.

Couturia Lindl. vid. *praeced.*

Covalia Rchb. vid. *Covolia Neck.*

Covelia „Neck.“ DC., Endl. in synon. Spermacoces: vid. *Covolia Neck.*

Covellia*) Gasparr. 1844. Nov. gen. p. 10; 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 347; 1845. Ri erch.: nov. g. a Ficu L. disjunctum. (F. oppositifolia W.)
Miq. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 525; 1848. ibid. VII. p. 458: g. Ficuum.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 726: g. Morear.
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 65: g. Ficear.
= Sycomorphe Miq.

Covilhamia Korthals 1848. Nederl. kruidk. Arch. I. p. 307: nov. g. Sterculiacear. (C. ovata.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 160: g. Sterculiear.

Covola Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 67: nov. g. ex typo Salviae verticillatae L.
= Salviae sect. Hemisphace Benth.

Covolia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 201. n. 337: nov. g. Phyllastrophytor., a Spermacoce L. sejunctum.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Astrophyllae.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 1997 *b* (*Covalia*): sect. Spermacoces.
= Spermacoces Linn. pars.

Cowania**) Don 1825. Linn. Trans. XIV. 3. p. 574: nov. g. plantar.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 192: g. Potentillear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4440.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 415. n. 2073: g. Rosacear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 164.
Bartl. 1830. Ord. p. 402: g. Dryadear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 528. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 453. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (74). — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6505. (genuinar.)
Endl. 1840. Gen. n. 6387. p. 1246; 1841. Ench. p. 659: g. Eudryadear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 657. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 311. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 666.

*) Dicat. Nic. Covelli.
**) Dicat. peregrinatori James Cowan.

Cowania Don cont.
Zucc. 1845. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. IV. 2. p. 7. An Dryadi injungenda?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Potentillidar.
Synon. Greggia Engelm.

Coxia Endl. 1839. Gen. n. 4209. p. 733; 1841. Ench. p. 356: g. Lysimachiear., a Duby (in DC. Pr. VIII. p. 60) Lysimachiae denuo injunct. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 255 (163). — Rchb. 1841. Nom. p. 124. n. 4845. (genuinar.) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 312.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 362: g. Primulacear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 69: g. Primulear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645: g. Primulidar.
Synon. Lubinia Link & Otto.

Crabbea*) Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 276. 417: nov. g. Acanthacear. (Barleria pungens Thunb.) *Cf.* Meisn. Comm. p. 202.
= Barleriae sect. Prionitis Nees.

Crabbea Harvey 1842. Lond. journ. bot. I. p. 26: nov. g. Acanthacear. (Bot. Zeit. 1843. p. 291.)
Meisn. 1843. Comm. p. 367: g. Ruelliear. — Par. Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 162.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Barleridar.

Crabowskia G. Don vid. *Grabowskia Schltd.*

Cracca Rivin. 1691. Ord. pl. t. 52: g. pl. class. XIV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 252. Ed. Hall. 1745. p. 262: g. pl. class. XI.
Medic. (Vorles. II. p. 359) 1789. Phil. Bot. I. p. 204.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 614: sect. Viciae. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 527; 1841. Nom. p. 148. n. 5771. 3. — Endl. 1840. Gen. n. 6581 *c.* p. 1279; 1841. Ench. p. 670. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 80. — Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 488. — Webb 1846. Canar. II. p. 103.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 468: g. Viciear. Sect. Eucracca, Ervoides.
Synon. Oxypogon Rafin.

Cracca Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 139; 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 18 (Gen. 795); 1753. Sp. II. p. 752: g. Diadelph. Decandr., Galegae serius injunctum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 296: g. Tetrapetalar. irregular.
= Tephrosia Linn.

Cracca Benth. & Oerst. .... Legum. Centroam. p. 8: g. Galegear. restitutum. (Tephrosia mollis HBK.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 480.

Craccaea Rchb. vid. *seq.*

Craccoides DC. 1825. Prodr. II. p. 250 (Lég. Mém. VI): sect. Tephrosiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3892 *c*; 1841. Nom. p. 148. n. 5728. 2 (*Craccaea*). — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 229. — Endl. 1840. Gen. n. 6539 *b.* p. 1273; 1841. Ench. p. 669.

*) Dicat. poëtae Crabbe.

Craepalia*) Schrank 1793. Flor. bavar. I. p. 882. (*Crepalia* ex Steud. Nom. I. p. 435; II. p. 65.)
= Lolium Linn.

Craepalobrumnon Walp. vid. *seq.*

Craepaloprumnon**) Endl. 1839. Gen. n. 5079 *b.* p. 921; 1841. Ench. p. 479: sect. Flacourtiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 186. n. 7133. 2. — Walp. 1842. Rep. I. p. 205 (*Craepalobrumnon*).

Crafordia Rafin. 1814. Specchio I. p. 156.
DC. 1825. Pr. II. p. 522: g. Leguminosar. vix notum. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 467.
Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3890; 1841. Nom. p. 148. n. 5729: g. Galegear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6540. p. 1273; 1841. Ench. p. 669. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 314.
Meisn. 1837. Gen. p. 86 (62): g. Clitoriear.?

Crambe***) Tourn. 1700. Inst. p. 211. t. 100: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 199. n. 548; 1737. Cliff. p. 340; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 193; 1753. Sp. II. p. 671; 1759. Syst. ed. X. p. 1137. n. 739; 1763. Sp. ed. II. p. 937; 1764. Gen. ed. VI. p. 446. n. 825; 1767. Syst. ed. XII. p. 344: g. Tetradynam. Siliquos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 505; 1784. Syst. p. 604. — Reich. 1778. Gen. p. 344. n. 889. — Gmel. 1791. Syst. p. 992. — Pers. 1797. Syst. p. 642.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 66. n. 278: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 69. Sejungitur Rapistrum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gis. 1792. Pracl. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 426.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 242. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 510. — DC. 1805. Franç. IV. p. 721. — Maher 1805 in Hort. Trans. I. (1815.) p. 13. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 72. (Verm. bot. Schr. V. p. 4.) — Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 159. — Lois. 1818. Dict. v. 11. p. 307.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172[16]: g. Siliculosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 320. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 480. — Pers. 1807. Ench. II. p. 184. n. 1544. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 724. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 678.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 337. (C. hispanica.) *Cf. Rapistrum Medic.*
Neck. 1790. El. III. p. 97. n. 1427: g. Brachytophytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 434. n. 1071: g. Tetradynam. Siliculos. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 418. n. 1220; 1809. En. p. 662. — Cram. 1803. Disp. p. 146. — Link 1822. En. II. p. 148.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 292. t. 142.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 116: g. Myagroidear.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 245; 1821. Syst. II. p. 650; 1824. Pr. I. p. 225: g. Raphanear. Sect.: Sarcocrambe, Leptocrambe, Dendrocrambe. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV; 1837. Hdb. p. 259. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 256. Sect. eaed. — Koch 1836. Syn. p. 78. Ed. II. p. 83. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4967. p. 886; 1841. Ench. p. 451. Sect. ut DC. — Rchb. 1841. Nom. p. 179. n. 6916. Sect. eaed. (Crambe loco Sarcocrambes.) — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 221. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 93. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 315.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 851. n. 2261; 1831. Gen. II. p. 511. n. 2503: g. Synclistar.
Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4724; 1832. Fl. exc. p. 655: g. Rapistrear. Sect. (1828) ut DC. — Par. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 156.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Link 1831. Hdb. II. p. 282: g. Raphanidear.
C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 212: g. Enarthrocarpear. — Par. Webb & Berth. 1836. Canar. I. p. 87.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 326: g. Lomentosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Raphanidar.

Crambe Adans. 1763. Fam. II. p. 424: g. Raphanor. (Myagrum perenne et orientale L.)
= Rapistrum Boerh.

Crame**ria** Murray 1774 vid. *Krameria Löfl.*

Cranichidae Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 441: div. Neottear. Gen.: Ponthieva, Pterichis, Cryptostylis, Zosterostylis, Gomphichis, Stenoptera, Altensteinia, Cranichis, Tripleura, Chlorosa, Rophostemon, Prescottia. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182. Accedunt Acraea, Galeoglossum, Ocampoa. *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172
Endl. 1841. Ench. p. 113; 1842. Spl. II. p. 18: div. Neottiear. Gen. ead.

Cranichideae Meisn. 1842. Gen. pl. vasc. p. 384 (288): trib. Neottiear. Gen. Cranichidar. Lindl.

Cranichis*) Swartz 1788. Prodr. p. 8. 120: nov. g. Gynandr. Diandr. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 605. n. 1374.
Gmel. 1791. Syst. p. 61: g. Diandr. Monogyn.
Gis. 1792. Pracl. p. 179: g. Orchidear. — Par. Swartz 1800. Act. Holm. p. 226; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 53. t. 1. f. K. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 162. — Pers. 1807. Ench. II. p. 511. n. 1985. —

*) κραιπάλη, crapula.
**) προύμνος, prunus sylvestris.
***) An a Graecorum κράμβη? Conf. Bockm. Lex. bot. p. 66.

*) „κράνος, galea; ἔχω, habeo: quia labellum galeam exhibet."

Cranichis Swartz cont.
Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 315. — Kunth 1822. Syn. I. p. 324. — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 156. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 700. n. 2941; 1831. Gen. II. p. 656. n. 3303.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 77. n. 1598: g. Gynandr. Monandr. — Par Swartz 1806. Ind. occ. III. p. 1418. 1993. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 191.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 295: g. Coniopagar. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 189. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
La Llave & Lex. 1825. Nov. veg. II. Orch. p. 5: g. Rinemospermar. hypogear.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9. (Linnaea II. p. 528): g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1424; 1841. Nom. p. 55. n. 2141. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 215. n. 1574. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 316.
Lindl. 1840. Orchid. p. 450; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Cranichidar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1550. p. 113; 1842. Spl. II. p. 19.
Meisn. 1842. Gen. p. 385 (288): g. Cranichidear.

Craniolaria Linn. 1737. Gen. p. 346. n. 868; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 618; 1759. Syst. ed. X. p. 1112. n. 670; 1763. Sp. ed. II. p. 861; 1764. Gen. ed. VI. p. 310. n. 752; 1767. Syst. ed. XII. p. 412: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 467; 1784. Syst. p. 558. — Reich. 1778. Gen. p. 311. n. 810. — Gmel. 1791. Syst. p. 934. — Pers. 1797. Syst. p. 595.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 179. n. 736: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 175. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Acanthor.
Hill 1769. Ht. kew. p. 274: g. Monopetalar. irregular.
Juss. 1789. Gen. p. 140: g. Bignoniar.
Neck. 1790. El. I. p. 374. n. 580: g. Plasyrgophytor.
Kunth .... Journ. Phys. LXXXVII. p. 453.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 153: g. Sesamear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 252. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 249.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 67: g. Bignoniacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3239: g. Gesnerear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 504. n. 2479: g. Bignoniear. descisc.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 235: g. Pedalinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4174. p. 724; 1841. Ench. p. 351. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 625. — DC. 1845. Pr. IX. p. 254.
Meisn. 1840. Gen. p. 298 (206): g. Pedaliear.

Craniolaria Linn. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4530: g. Martyniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670: g. Pedalear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 318: g. Pedaliacear.
Synon. Martynia Houst.; Sesamum Adans.; Holoregmia Nees.

Craniospermeae „DC. mss." Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 280 (189): trib. Borraginear. Gen.: Plagiobothrys, Colsmannia, Craniospermum, Macromeria?, Meneghinia.
DC. 1845. Pr. IX. p. 467: subtrib. Borragear., serius (ibid. X. p. 174) pro genere dubio (Craniospermo) rejecta.

Craniospermum*) Lehm. 1818. Asperif. II. p. 336: nov. g. Asperifoliar.' (C. subvillosum.) — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. VII. 751. n. 632 *a.* — Spreng. 1825. Syst. I. p. 556. n. 591; 1830. Gen. I. p. 125. n. 621. — Bartl. 1830. Ord. p. 198. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 603.
Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2951; 1841. Nom. p. 111. n. 4326: g. Echiear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 327: g. Lithospermear.
Endl. 1839. Gen. n. 3763. p. 648; 1841. Ench. p. 321: g. Anchusear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 318.
DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 280 (189): g. Craniospermear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31: g. Asperifoliear.
Decne 1844 in Jacquem. voy. Bot. t. 130.
DC. 1846. Pr. X. p. 174: g. Borragear. in serie dubium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.
Ledeb. 1849. Ross. III. p. 174: g. Cynoglossear.

Craniotome Rchb. 1824. Icon. exot. I. p. 39. t. 54; 1828. Consp. p. 116. n. 2849: nov. g. Nepetear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Benth. 1835. Labiat. p. 704: g. Ajugoidear.?
Benth. 1836. Labiat. p. LXV: g. Stachydear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 836. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 355. 450.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188; 1841. Nom. p. 105. n. 4094: g. Marrubiear. (genuinar.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3654. p. 627; 1841. Ench. p. 308. — Meisn. 1840. Gen. p. 288 (196). — Walp. 1845. Rep. III. p. 847. 988. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 454. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 318.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Marrubidar.

Crantzia**) Scopoli 1777. Introd. p. 173. n. 710: nov. g. Personatar. (Besleria cristata L.) *Cf.* Juss. 1818. Dict. v. 11. p. 320.
Neck. 1790. El. I. p. 366. n. 565: g. Plasyrgophytor.
= Alloplectus Mart.

---

*) κρανίον, cranium.
**) Dicat. Henr. Joh. Nep. de Crantz.

Crantzia Swartz 1788. Prodr. p. 3. 38: nov. g. Tetrandr. Trigyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 286 (*Cranzia*).
Vahl 1791. Symb. II. p. 99. Char. auct.
= Tricera Swartz.

Crantzia Nuttall 1818. Gen. am. I. p. 177: nov. g. Umbellatar. (Hydrocotyle lineata Michx.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 236. (descisc.)
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3765; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 142. n. 5503: g. Hydrocotylear. — Par. DC. 1829. Coll. Mém. V. p. 27; 1830. Pr. IV. p. 70. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 255. — Meisn. 1838. Gen. p. 140 (102). — Endl. 1839. Gen. n. 4356. p. 763; 1841. Ench. p. 377. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 137. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 600. (?) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 319. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 59.
Tausch 1834. Flora I. p. 357: g. Heterospermear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Hydrocotylidar.
Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 87: g. Umbelliferar., Ottoae et Oenanthae aff.

Crantzia Lagasca mss.
= Couringia Heist.

Crantzia Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plantar. non descriptum.

Crantzia „Schreb." apud DC. et Endl.: vid. *Cranzia Schreb.*

Cranzia Schreb. 1789. Gen. I. p. 143. n. 362: g. Pentandr. Monogyn.
= Toddalia Juss.

Cranzia Gmel. vid. *Crantzia Swartz.*

Craspedaria*) Link 1841. Fil. hort. Berol. p. 117: g. Dryopteridear. Sect.: Craspedaria (Polypodium vacciniifolium Langsd.), Niphobolus.
= Niphobolus Kaulf.

Craspedaria Presl 1850. Epimel. bot. p. 623: g. Polypodiear. reformat. (Niphobolus rupestris, serpens et ovalis.) — Simil. Fée 1852. Gen. Fil. p. 263. Sect.: Eucraspedaria, Crypsinus.

Craspederica Link 1829. Handb. I. p. 612: subg. Ericae.

Craspedia Forst. 1786. Prodr. fl. ins. Austr. p. 306: nov. g. Syngenes. Polygam. Segregat. *Cf.* R. Brown 1816. Linn. Trans. XII. 1. p. 105. (Verm. bot. Schr. II. p. 544.) — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 590. n. 1350. — Gmel. 1791. Syst. p. 1281. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2393. n. 1574. — Pers. 1807. Ench. II. p. 498. n. 1958.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar.
Cass. 1818. Dict. v. 11. p. 355: g. Inulear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 140. — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 245.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 441. n. 2685; 1831. Gen. II. p. 612. n. 3025: g. Eupatorinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2449: g. Gnaphaliear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26.
Less. 1832. Syn. p. 271: g. Craspediear.
Lindl. 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1908: g. Asteracear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 152: g. Angianthear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2721. p. 443; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 216 (136). — Fenzl 1839. Flora II. p. 726. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3527. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 443. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 322. — A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 99.
A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 128: g. Senecionidear.
Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 131: g. Compositar.
Synon. Richea Labill.; Cartodium Sol.

Craspedieae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 269: div. Gnaphaliear. Gen.: Siloxerus, Hirnellia, Gnephosis, Crossolepis, Eriosphaera, Calocephalus, Leucophyta, Craspedia.

Craspedodiscus Ehrenb. 1844. Ber. Berl. Ak. p. 261. 266: nov. g. Naviculaceor., Coscinodisco aff.
= Coscinodiscus Ehrenb.

Craspedolepis*) Steud. 1855. Syn. pl. glum. II. p. 264: nov. g. Restiacear. (Cr. Verreauxii.)

Craspedon Fee 1824. Essai p. 44: g. Squammariear. epiphyllar. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 40. p. 106 et Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 323.
Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 366 *c*: sect. Stigmatidii.
Endl. 1836. Gen. p. 33; 1841. Ench. p. 19: sect. Strigulae? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 292. 4.

Craspedophyllum Presl 1843. Hymenophyll. p. 125: sect. Hymenophylli. (H. marginatum H. & Gr.)

Craspedum**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 336. Ed. Willd. p. 410 (an = *Dicera Forst.?*): nov. g. Polyandr. Monogyn. (C. tectorium.)
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
= Ganitrus Gärtn.?

Craspidospermeae A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 323: subtrib. Carissear. Gen.: Craspidospermum, Plectaneia?

Craspidospermum „Bojer mss." A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 323: nov. g. Craspidospermear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Carissear.

Crassa „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 26. Ed. Hall. 1745. p. 26: g. pl. class. I.
= Stapeliae et Asclepiadis Linn. spec.

Crassales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 22: nixus Apocarpar. Ordines: Crassulaceae, Galacinae.

---

*) κράσπεδον, margo, limbus.

*) κράσπεδον, fimbria.
**) κράσπεδον, fimbria: ob petala in fimbrias laciniata.

Crassicolla DC. 1836. Prodr. V. p. 373: sect. Grangeae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2397 *a*. p. 388; 1841. Ench. p. 235.

Crassina Scepin. Diss. (citante Endl. Gen. p. 405.)
= Euzinnia Endl.

Crassina Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 105: sect. Astragali. (A. gracilis, etc.)

Crassocephalum Mönch 1794. Meth. p. 516: nov. g. Petalostemonis. (Senecio cernuus L.)
Less. 1830. Linnaea V. p. 162: g. Senecionear.
Less. 1832. Syn. p. 395: g. Cacaliear.
= Cremocephalum Cass.

Crassouvia Comm. mss.
= Bryophyllum Salisb.

Crassula Linn. 1737. Gen. p. 89. n. 255; 1737. Cliff. p. 116; 1740. Syst. p. 21; 1753. Sp. I. p. 282; 1759. Syst. ed. X. p. 969. n. 352; 1762. Sp. ed. II. p. 404; 1764. Gen. ed. VI. p. 54. n. 392; 1767. Syst. ed. XII. p. 225. n. 388: g. Pentandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 251; 1784. Syst. p. 304. — Reich. 1778. Gen. p. 157. n. 423. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 207. n. 533. — Lour. 1790. Coch. I. p. 185. — Gmel. 1791. Syst. p. 515. — Pers. 1797. Syst. p. 323; 1805. Ench. I. p. 337. n. 754. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1547. n. 594; 1809. En. p. 341. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 26. 456.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 62.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 373. — Batsch 1802. Tab. p. 27.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 307.
Gled. 1764. Syst. p. 193. n. 798: g. Petalostemonum.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 173: g. Diplosantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 152: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 255: sect. Sedi.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 124: g. Crassulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 212. n. 871.
! DC. 1805. Franç. IV. p. 385: g. Crassulacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 856; 1825. Syst. I. p. 966. n. 1149; 1830. Gen. I. p. 237. n. 1250: g. Sedear. Sect. (1830): Globulea, Cyrtogyne, Grammanthes, Rochea. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1027. Sect. similes.
= Crassula Haw., Rochea DC., etc.

Crassula Adans. 1763. Fam. II. p. 248: g. Sedorum.
= Rochea DC.

Crassula (fruticosa) Mill. Dict. n. 8 teste DC. Prodr. VI. p. 446.
= Euryopis Cass. spec.

Crassula Haworth 1812. Syn. succ. p. 51. Ed. Schrank 1819. p. 54: g. Succulentar., emissis Larochea et Globulea restrict.

Crassula Haworth cont.
Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 360: g. Crassulear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 383. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 99. — Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6177. Sect. ut Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 325.
Schult. 1820. Syst. VI. p. LXII. 709: g. Sempervivor.
Link 1821. En. I. p. 300: g. Sempervivar.
Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4177: g. Sedear. Sect.: Crassula, Turgosea. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98). Subgen.: Sarcolipes, Petrogeton, Tetraphyle.
Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 194: g. Crassulacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 310. — Link 1831. Hdb. II. p. 19. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 546. — Koch 1836. Syn. p. 257. Ed. II. p. 283. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 74. — Brongn. 1842. Én. genr. p. 107. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 172.
Endl. 1839. Gen. n. 4610. p. 809; 1841. Ench. p. 405: g. Eucrassulear. Sect.: Sarcolipes, Petrogeton, Tetraphyle, Crassula, Pyrgosea. Accedit 1843 (Spl. III. p. 84) Disporocarpa. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 10.
Synon. Gomara Adans.; Turgosea Haw.; Sarcolipes, Petrogeton et Tetraphyle Eckl. & Zeyh.

Crassula Ecklon & Zeyh. 1837. Enum. pl. Afr. austr. III. p. 294: g. Crassulacear., angustissime circumscriptum.
Endl. 1839. Gen. n. 4610 *d*. p. 809; 1841. Ench. p. 405: sect. Crassulae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6177. 4.

Crassulaceae DC. 1801. Bull. soc. philom. n. 49. p. 1; 1805. Fl. Franç. IV. p. 382: fam. (64) Dicotyledonum. Gen.: Umbilicus, Bulliarda, Tillaea, Crassula, Sedum, Sempervivum.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246; 1828. Pr. III. p. 381: ordo (87) Calyciflorar. Tribus: Crassuleae, Crassulaceae *anomalae* (gen.: Diamorpha, Penthorum). — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (apocarpar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 97. Trib. ut DC.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 538: fam. Calyciflorar. Gen.: Umbilicus, Tillaea, Sedum, Sempervivum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: fam. Calicunguliae.
Rchb. 1828. Consp. p. 158; 1832. Fl. exc. p. 546: div. Corniculatar. Subdivis.: Sedeae, Penthoreae.
Bartl. 1830. Ord. p. 309: ordo (178) Succulentar. Gen.: Tillaea, Bulliarda, Dasystemon, Septas, Crassula, Globulea, Curtogyne, Grammanthes, Rochea, Kalanchoë, Bryophyllum, Cotyledon, Pistorinia, Umbilicus, Echeveria, Sedum, Sempervivum; Diamorpha, Penthorum.
Link 1831. Hdb II. p. 18: ordo 9 Perigynar. Gen.: Tillaea, Bulliarda, Crassula, Globulea, Rochea, Calanchoë, Bryophyllum, Cotyledon, Pistorinia, Cotyliphyllum, Rhodiola, Sedum, Sempervivum.

Crassulaceae DC. cont.
Lindl. 1833. Nix. p. 22: ordo Crassalium.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 71: fam. (69) Succulentar. Gen. ut Bartl.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 163) 1847. Veg. kd. p. 344: ordo Violalium. Subord.: Crassuleae, Diamorpheae.
Webb & Berth. 1836. Canar. I. p. 173. Gen.: Tillaea, Umbilicus, Aithales, Aichryson, Aeonium, Greenovia, Petrophyes.
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): ordo 95 plant. (p. 440 Corniculatar.) Subord.: Crassuleae, Penthoreae.
Endl. 1839. Gen. p. 808; 1841. Ench. p. 404: ordo Corniculatar. Subord.: Crassuleae, Diamorpheae. *Cf.* Orb. 1849. Dict. IV. p. 326.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 106: fam. Crassulinear. Gen. ex Crassuleis Endl.
Synon. Sempervivae Juss.; Succulentae Vent.; Crassuleae St. Hil.

Crassulaceites Sternb. 1838. Vers. II. p. 206: ordo plant. foss. Gen.: Phillipsia, Lomatofloyos.

Crassulariae Rchb. 1837. Handb. p. 230; 1841. Nomencl. p. 158: div. Corniculatar. Subdivis.: Sedeae, Penthoreae, Cephaloteae.

Crassuleae Jaume St. Hil. 1805. Expos. II. p. 123. t. 93: fam. plant. Gen.: Tillaea, Crassula, Cotyledon, Rhodiola, Sedum, Sempervivum, Septas. *Affine*: Penthorum.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 896: fam. Dicotyledonum polypetalar.
= Crassulaceae DC.

Crassuleae Juss. 1818. Dict. v. 11. p. 369: fam. Peripetalear. Gen.: Tillaea, Crassula, Bryophyllum, Sedum, Sempervivum, Septas.
DC. 1828. Pr. III. p. 381: trib. Crassulacear. Gen.: Tillaea, Bulliarda, Dasystemon, Septas, Crassula, Globulea, Curtogyne, Grammanthes, Rochea, Kalanchoë, Bryophyllum, Cotyledon, Pistorinia, Umbilicus, Echeveria, Sedum, Sempervivum. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 98. Gen. ead. et Purgosia, Kalosanthes.
Endl. 1839. Gen. p. 809; 1841. Ench. p. 405: subordo Crassulacear. Trib.: Crass. *isostemones* (sect.: Eucrassuleae, Rocheae), *diplostemones* (sect.: Umbiliceae, Sedeae). — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98). Trib.: Sedeae, Umbiliceae. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346. Gen. Crassulear. Endl. et Kalanchoë, Procrassula.
Rchb. 1841. Nom. p. 158: sect. Sedear. Gen.: Tillaea, Bulliarda, Helophytum, Dasystemon, Septas, Crassula, Globulea; Rocheae.

Crassulineae Brongn. 1843. Enum. genr. p. XXVIII. 106: class. Dialypetalar. perigynar. Fam.: Crassulaceae, Elatineae, Datisceae.

Crataegus Tourn. 1700. Inst. p. 633: g. pl. class. XXI, ab auctoribus diversissimo modo circumscriptum, a Scopoli, Willdenow (Enum. p. 522) aliisque Mespilo et Pyro insertum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 126. Ed. Hall. 1745. p. 136: g. pl. class. V.

Crataegus Tourn. cont.
Linn. 1737. Gen. p. 143. n. 404; 1737. Cliff. p. 187; 1740. Syst. p. 24; 1748. Ups. p. 126; 1753. Sp. I. p. 475; 1759. Syst. ed. X. p. 1057. n. 547; 1762. Sp. ed. II. p. 681; 1764. Gen. ed. VI. p. 250. n. 622; 1767. Syst. ed. XII. p. 342: g. Icosandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 387; 1784. Syst. p. 464. — Reich. 1778. Gen. p. 255. n. 678. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 338. n. 854. — Lour. 1790. Coch. I. p. 319. — Pers. 1797. Syst. p. 498. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1000. n. 987. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 305. — Elliott 1821. Sketch I. p. 547. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 509 (*Crategus*).
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 353: g. Pomiferar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 7.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 275. n. 1130: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Pomacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 335. — Gis. 1792. Prael. p. 444. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 337. — DC. 1805. Franç. IV. p. 431; 1825. Pr. II. p. 626. — Pers. 1807. Ench. II. p. 36. n. 1226. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 564. — Lindl. 1821. Linn. Trans. XIII. p. 105 (*Cf.* Flora 1823. I. p. 172); 1847. Veg. kd. p. 560. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 307. — Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4460; 1832. Fl. exc. p. 628; 1841. Nom. p. 168. n. 6528. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 221. — Bartl. 1830. Ord. p. 400. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 414. n. 2068. — Link 1831. Hdb. II. p. 77. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 598. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 200. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 98. — Koch 1836. Syn. p. 233. Ed. II. p. 258. — Meisn. 1837. Gen. p. 106 (75). — Kunth 1838. Berol. I. p. 205. — Endl. 1840. Gen. n. 6353. p. 1239; 1841. Ench. p. 656. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 87. — Brongn. 1843. Én genr. p. 124. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 158. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 87. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 100. 115. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 567. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 671.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1804. Dict. v. 1. p. 472 (*Alisier*); 1805. Expos. II. p. 182.
Adans. 1763. Fam. II. p. 296: g. Rosar.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 175: g. Calyciflorar.
Scop. 1772. Carn. I. p. 345: sect. Mespili.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 289. 298. 302. *Cf. Chamaemespilus* et *Oxyacantha Medic.*
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 155: g. Mespilor. (Crataegus crus galli L.)
Neck. 1790. El. II. p. 74. n. 725: g. Sarcodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 829: g. Polyandr. Digyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 219.

Crataegus Tourn. cont.
Medic. 1793. Gesch. d. Bot. p. 83; 1794 in Usteri n. Ann. III. p. 91: g. emendat. Antho-Mallonandriae.
Borckh. 1798 in Röm. Arch. I. 3. p. 86. Char. emend.
Gaud. 1828. Helv. III. p. 294. 317: g. Icosandr. Pentagyn.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 463: g. Pomear.
Synon. Oxyacantha Rupp., Medic.

Crataeva Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1044. n. 528; 1762. Sp. ed. II. p. 636; 1767. Syst. ed. XII. p. 326. n. 599: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 245. n. 654. — Murr. 1784. Syst. p. 444. — Gmel. 1791. Syst. p. 749. — Pers. 1797. Syst. p. 476; 1807. Ench. II. p. 5. n. 1171. — Willd. 1799. Sp. II. p. 852. n. 943.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Putaminear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 376.
Gled. 1764. Syst. p. 105. n. 430: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 267: g. Polyandrar.
Neck. 1790. El. II. p. 257. n. 1010: g. Dapsilophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 85: g. Capparidear. — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 86. — Kunth 1824. Syn. III. p. 144. — R. Brown 1826 in Denh. & Clapp. narrat. p. 223 (Verm. bot. Schr. IV. p. 31). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 8. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 327.
Cram. 1803. Disp. p. 137 in Polyandr. Monogyn.
DC. 1824. Pr. I. p. 242: g. Capparear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4866; 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 186. n. 7124. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 266. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 276. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 23. — Meisn. 1837. Gen. p. 17 (15). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 301. — Endl. 1839. Gen. n. 5003. p. 894; 1841. Ench. p. 456. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 89. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358.
= Crateva Linn.

Cratarellus Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 4: g. Merulinor. (Merulius cornucopioides — *Fungoidaster Mich.* t. 82. f. 5.) *Cf.* Leman 1825. Dict. v. 38. p. 517.
Corda 1842. Mycol. p. 175: vid. *Craterellus.*
= Craterelli Fries pars.

Crategus Roxb. vid. *Crataegus Tourn.*

Craterantha*) Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 365: sect. Symphoricarpi. (S. montanus.)

Craterella Pers. 1796. Obs. myc. I. p. 39; 1797. Tent. disp. p. 32: g. Hymenothecii. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 11. p. 372.
Pers. 1801. Syn. Fung. p. XVIII. 565: sect. Thelephorae. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 103. — Endl. 1836. Gen. n. 437 *k.* p. 39; 1841. Ench. p. 21.

*) κρατήρ, vas.

Craterella Pers. cont.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 652: g. Thelephoridear.
Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 463: g. Hydneor.
= Craterelli Fries pars.

Craterellus Fries 1838. Epicr. p. 531; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 330: g. Auricularinor. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 41. 82; 1842. Mycol. p. 175 (*Cratarellus*). — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 399. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 164. — Bail 1858. Syst. p. 22.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Thelephoreor.
Math. 1853. Belg. II. p. 348: sect. Cantharelli.
Synon. Craterella Pers.; Cratarellus Pers.

Crateria Pers. 1805. Ench. I. p. 485. n. 1099: g. Decandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 322. n. 1269.
Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 110: sect. Caseariae.
Endl. 1843. Spl. III. p. 90. n. 5060 *b α*: subsect. Chaetocrateris.
Synon. Lindleya Kunth; Careacia Rchb.

Crateriaceae Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 58: sect. Physareor. Gen.: Stegasma.

Cratericarpium Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 339: nov. g. Epilobiear. (Nomen.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6117. p. 1191; 1841. Ench. p. 637. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 327.
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 171 (Nouv. Ann. Mus. IV. p. 397): g. Epilobinear. (Oenothera subulata Rz. & Pav.) *Cf.* Meisn. 1838. Comm. p. 86 sub Oenothera.
Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6564: g. Onagrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Epilobear.
Synon. Cratericarpum Rchb.

Cratericarpum Rchb. 1837. Handb. p. 246: g. Onagrear.
Walp. 1843. Rep. II. p. 89: g. Epilobiear.
Walp. 1846. Rep. V. p. 665: g. Jussieuear.
= Cratericarpium Spach.

Craterideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 565. 579: div. Gasteromycear. Gen.: Craterium, Pyxidium.

Crateriflorae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXX: series Rotiflorar. Fam.: Plantagineae, Primuleae, Ericeae.
Rchb. 1828. Consp. p. 127 (1831. Fl. exc. p. 187. 393): formatio Rotiflorar. Fam.: Lysimachiaceae, Primulaceae, Ericaceae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 177; 1841. Nom. p. LV (p. 122 casu omiss.): formatio Limbiflorar. Fam.: Plumbagineae, Primulaceae, Ericaceae.

Craterispermum Benth. 1849. Niger Fl. p. 411: nov. g. Vanguerieur. (Coffea laurina DC.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 758: g. Coffeacear.?

Crateritecoma Lindl. vid. *Craterotecoma Mart.*

Craterium Trentep. 1800 in Roth Catal. II. p. 224: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 11. p. 372.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 29: g. Gastromycor.
Nees 1816. Syst. p. 125; 1817. Ueberbl. p. 33: g. Trichocistor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 382.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13: g. Cribrariar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 579: g. Crateridear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 80: g. Trichosporear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 555: g. Trichiacear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 141; 1829. Syst. myc. III. 1. p. 148; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 454: g. Physarcor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 191; 1841. Nom. p. 9. n. 362. Sect. (1841): Apoma, Sphaerocarpa, Craterium. — Endl. 1836. Gen. n. 315. p. 26; 1841. Ench. p. 17. Sect.: Apoma, Sphaerocarpa, Cyclopoma. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 20; 1842. Mycol. p. 81. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 271. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489. — Bonord. 1851. Hdb. p. 214. — Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 13.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: g. Fuliginear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 525. n. 3509: g. Dermatogasterum.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 772. n. 3961: g. Trichogasterum.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 357: g. Angiogasterum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Math. 1853. Belg. II. p. 387: g. Trichiear.
Synon. Fungoides Mich.; Pissida Adans. pt.

Crateroideae Rchb. 1828. Consp. p. 19 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Hyphopsorar. Gen.: Calicium, Coniocybe.

Crateromycei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: sect. Columelleor. Gen. §. 1: Calyssosporium, Hemiscyphe, Crateromyces, Didymocrater, Zygosporium? §. 2: Diamphora.

Crateromyces Corda 1836 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 59. t. 30: nov. g. Fungor. (C. candidus.)
Endl. 1836. Gen. n. 252. p. 21; 1841. Ench. p. 15: g. Mucorinor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 243: g. Mucoroideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 17; 1842. Mycol. p. 67: g. Crateromycetum. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 120.
Rabenh. 1844 Krypt. I. p. 134: g. Mucoroidear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Crateromyceor.

Crateromycetes Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 17; 1842. Anl. Mycol. p. 66: sect. Mucoroidear. Gen.: Calyssosporium, Hemiscyphe, Crateromyces, Didymocrater.

Crateromycetes Corda cont.
Bonord. 1851. Hdb. p. 120: fam. Mucorinor. Gen.: Hemiscyphe, Crateromyces, Diamphora.

Crateropsorae Rchb. 1837. Handb. p. 131: subordo Hyphopsorar. Fam.: Coniocybeae, Calicieae, Sphaerophoreae.
Rchb. 1841. Nom. p. 14: subordo Podetiopsorar. Fam.: Calycieae, Coniocarpicae, Sphaerophoreae. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 68. Fam. eaed.

Craterospermum A. Braun 1855. Alg. unicell. gen. p. 60 adnot.: nov. g. Zygnemacear., Mougeotiae aff. (C. laetevirens.)

Craterostegia Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1171 *a*: sect. Tradescantiae.

Craterostigma Hochstett. 1841. Flora II. p. 668: nov. g. Cyrtandrear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4700: g. Henckelicar.
Endl. 1842. Spl. II. p. 64. n. 4140/$_2$: g. Didymocarpear.
Meisn. 1843. Comm. p. 367: g. Eudidymocarpear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 411: sect. Toreniae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.

Craterotecoma „Martius mss." DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 300 (209); 1845. Prodr. IX. p. 215: nov. g. Catalpear.
Endl. 1841. Ench. p. 346. n. 4113/$_1$ (*Ceratotecoma*): g. Tecomear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677 (*Crateritecoma*): g. Bignoniacear.
Synon. Phoenicocissus Mart.

Crateua Link vid. *seq.*

Crateva*) Linn. 1737. Gen. p. 113. n. 320; 1737. Ht. Cliff. p. 484: g. Octandr. Monogyn.
Linn. 1740. Syst. p. 24; 1742. Gen. ed. II. p. 231. n. 506: g. Polyandr. Monogyn. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 246.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Putamineor.
Linn. 1753. Sp. I. p. 444; 1764. Gen. ed. VI. p. 238. n. 599: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 320. n. 818.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Capparidum. — Par. Juss. 1789 Gen. p. 244. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 775.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 121: g. Capparidear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 3. — Link 1822. En. II. p. 4 (*Crateua*). — Spreng. 1825. Syst. II. p. 447. n. 1748; 1830. Gen. I. p. 389. n. 1953. — Poir. 1828. Dict. v. 52. p. 225 (*Tapier*).
Synon. Tapia Plum.; Apioscorodon Pluk.; Crataeva Linn.; Othrys Nor.; Farquharia Hils. & Boj.

Cratochwilia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 339. n. 1129: nov. g. Cyrtosiphytor., a Clutia L. disjunctum.
= Cluytiae Reich. sp.

*) Nomen a medico Veteribus saepe laudato: Crateias s. Cratevas.

Cratoneuron Sulliv. 1856. Musc. Un. St. p. . . .: sect. Hypni. (H. filicinum.)
= Drepanophyllaria Müll. pt.
*Cratoophytum**) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 137: gen. 42 plantar. Spec. natur.: Kämpferia, Curcuma, Thalia, Costus, Alpinia, Amomum, Canna, Maranta, Psydaranta, Qualea, Myrosma, Rencalmia, Tillandsia, Heliconia, Musa, Bromelia, Psedomelia.
Cratoxylon**) Blume 1825. Flora I. p. 117: nov. g. Hypericinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 292. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 362.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 352. n. 2635: g. Hypericear., serius (Gen. II. p. 600) Lüheae insertum.
Rchb. 1828. Consp. p. 210. n. 5470: g. Ascyrear.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 341; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 352: g. Tridesminear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 308; 1841. Nom. p. 211. n. 8008: g. Tridesmear.
Endl. 1840. Gen. n. 5472. p. 1035; 1841. Ench. p. 539: g. Elodear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406. — Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 15.
Synon. Cratoxylum Blume; Hornschuchia Blume.
Cratoxylum Blume 1825. Bijdr. Nr. 3. p. 143; 1828. Fl. jav. Praef. p. VI: g. Hypericinear. *Cf.* Linnaea I. p. 667.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 613: g. Eucryphiear.
Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33): g. Carpodontear.
Walp. 1842. Rep. I. p. 391: g. Elodear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 329.
= Cratoxylon Blume.
Cratylia „Martius mss." Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 131: nov. g. Dioclear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6661. p. 1293; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5817. — Walp. 1842. Rep. I. p. 764. — Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 67. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 329.
Meisn. 1843. Comm. p. 351: g. Phaseolear.
Crawfordia Rchb. vid. *seq.*
Crawfurdia***) Wallich 1826. Tent. fl. Nepal. I. p. 63. t. 47. 48: nov. g. Gentianear. — Par. Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 33. — D. Don 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 517. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 200. (verar.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 919. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211 (*Crawfordia*); 1841. Nom. p. 133. n. 5122: g. Erythraeariar.
Endl. 1838. Gen. n. 3556. p. 604; 1841. Ench. p. 303: g. Chironiear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 330.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 305; 1845 in DC. Pr. IX. p. 120: g. Swertiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 261 (170). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 6. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 560.
Synon. Gentianae sp. Don, etc.
Creatocaulon*) Fries 1818. Obs. mycol. II. p. 316: sect. Cordyliae. (C. militaris, alutacea, capitata, etc.)
Credneria Zenker 1833. Beitr. z. Gesch. d. Urw. p. 17: nov. g. Amentaccar. foss. *Cf.* Flora Lit. III. p. 77. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 129.
Bronn 1834. Lethaea geogn.
Göpp. 1844. Arb. Schles. Ges. p. 220.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 226; 1846. Chlor. prot. p. LXXXI: g. dubium Juliflorar. foss. *Cf.* Unger 1849. Bot. Zeit. p. 348.
Hampe 1850. Bot. Zeit. p. 160: g. Polygonear., Coccolobae aff.
Cremanium**) D. Don 1823. Mem. Wern. soc. IV. 2. p. 310: nov. g. Melastomaccar. (Melastoma vaccinioides Bonpl.) — Par. Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 159. t. 286.
DC. 1828. Pr. III. p. 191: g. Miconiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 797. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 266. — Meisn. 1837. Gen. p. 112 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6260. p. 1221; 1841. Ench. p. 647. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1468. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6769. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 330.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4641: g. Blakeacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 330: g. Melastomear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 341. n. 1722.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 233: sect. Miconiae. Subsect.: Pseudocremanium, Chiloporus. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 739.
Synon. Cyathanthera Pohl.
Cremaspora Benth. 1849. Niger Fl. p. 412: nov. g. Rubiacear., Kraussiae aff. (Coffea hirsuta Don.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 750: g. Coffeear.
Cremastostemon***) Hort.
= Olinia Thunb. (Endl. Gen. p. 1223.)
Cremastra Lindl. 1833. Orchid. gen. p. 172: nov. g. Vandear. (Cymbidium appendiculatum Don.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1430. p. 199; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2036. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 330.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Bletidar.?
Crematopteris Schimp. & Moug. 1844. Pl. foss. Vosg. p. 74. t. 35.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 74; 1846. Chlor. prot. p. XLIII: g. Pecopteridum.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 70: g. Filicum foss.
Synon. Reussia Sternb.; Scolopendrites Göpp.

---

*) *κραταιόω*, sum fortis, corroboro; *φυτόν*, planta.
**) *κρατός*, robur.
***) Dicat. J. Crawfurd, gubernatori Singaporensi.

*) *κρέας*, caro.
**) *κρεμάω*, suspendo.
***) *κρεμαστός*, pendens.

Cremobotrys Beer 1854. Flora p. 348: nov. g. Bromeliacear. (Billbergia zebrina Lindl.)
Beer 1857. Fam. Bromel. p. 114: subg. Billbergiae.

Cremocephalium Miquel vid. *seq.*

Cremocephalum Cassini 1824. Dict. v. 34. p. 390; 1827. v. 48. p. 448. 458; 1830. v. 60. p. 583: g. Senecionear. (Senecio cernuus L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2505. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 38. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 97 (*Cremocephalium*).
DC. 1837. Pr. VI. p. 297: g. Erechtitear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2791. p. 455; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (136). — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3550. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 331.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713: g. Neurolaenear.
Synon. Crassocephalum Mönch; Crassocephali sp. Less.

Cremochilus Turczan. 1852. Bull. Mosc. Nr. 3. p. 174: nov. g. Lobeliacear., Siphocampylo aff. *Cf.* Flora 1853. II. p. 741.

Cremolobeae R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. App. p. 212 (Verm. bot. Schr. IV. p. 11): trib. Cruciferar. Gen.: Cremolobus, Menonvillea.
Endl. 1839. Gen. p. 872; 1841. Ench. p. 449: fam. Cruciferar. Gen. ead. Accedunt 1850 (Spl. V. p. 36) Hexaptera, Decaptera.
Rchb. 1841. Nom. p. 180: subsect. Thlaspidear. Gen. ut R. Brown.

Cremolobidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 354: trib. Pleurorhizear. Gen.: Cremolobus, Menonvillea.

Cremolobus*) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 235; 1821. Syst. II. p. 418; 1824. Prodr. I. p. 184: nov. g. Thlaspidear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 198. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 331.
R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. App. p. 212 (Verm. bot. Schr. IV. p. 11): g. Cremolobear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4892. p. 872; 1841. Ench. p. 449. — Rchb. 1841. Nom. p. 180. n. 6928.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 183. n. 4747: g. Thlaspidiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Siliculosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 663.
Meisn. 1837. Gen. p. 12 (12): g. Biscutellatar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259: g. Biscutellear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Cremolobidar.

Cremontia „Comm. mss." DC. 1824. Prodr. I. p. 446: sect. Hibisci. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 476. — Rchb. 1841. Nom. p. 200. n. 7642. 6. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 144.

*) κρεμάω, suspendo; λοβός, lobus.

Cremontia DC. cont.
Endl. 1840. Gen. n. 5277 *b α*. p. 982; 1841. Ench. p. 512: subsect. Ketmiae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370: g. Hibiscear.

Cremophyllum Scheidw. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 1. p. 23; 1848 in Otto's Gartenz. Nr. 17. p. 130: nov. g. Euphorbiacear. (C. spathulatum.) *Cf.* Flora 1843. p. 514 et Bot. Zeit. 1849. p. 141.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 372: g. Crotonear.
= Dalechampia Plum. (Baill.)

Cremosperma Benth. 1846. Pl. Hartweg. II. p. 234: nov. g. Gesneriaceár. (C. hirsutissima.)
Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 360: g. Beslericar. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 404.

Cremostachys L. R. Tulasne 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 259: nov. g. Crotonear. (Antidesma filiforme Bl.)
= Galearia Mor. (Planch.)

Crena Scopoli vid. *Crenea Aubl.*

Crenacantha*) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phycol. gener. p. 272; 1849. Spec. Alg. p. 422. n. 257: nov. g. Confervear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53.

Crenaea Schreb. 1789. Gen. I. p. 317. n. 807: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 747. — Willd. 1799. Sp. II. p. 844. n. 932.
Pers. 1807. Ench. II. p. 7. n. 1180: g. Salicariar.
= Crenea Aubl.

Crenamum Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.
Tausch 1828. Flora I. Erg. Bl. p. 80 (*Cnenamum*): sect. Borkhausiae.
= Barkhausia Mönch.

Crenea Aublet 1775. Guian. I. p. 523. t. 209: nov. g. Icosandr. Polygyn. (C. maritima.)
Scop. 1777. Intr. p. 220 (*Crena*): g. Calycanthemar.
Juss. 1789. Gen. p. 332: g. Salicariar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 79. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 708; 1825. Syst. II. p. 449. n. 1751; 1830. Gen. I. p. 389. n. 1955. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 9.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 177: g. Lythrariar. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 380. — Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 454.
Meyer 1818. Fl. Esseq. p. 186.
DC. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 74; 1828. Pr. III. p. 90: g. Salicariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4568; 1841. Nom. p. 172. n. 6653. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 721. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 419. — Meisn. 1838. Gen. p. 118 (84).
Endl. 1840. Gen. n. 6153. p. 1201; 1841. Ench. p. 643: g. Eulythrariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lythrear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 332: g. Eulythrear.
Synon. Crenaea Schreb.; Faya Neck.

*) κρήνη, fons.

Crenias Spreng. 1827. Cur. post. p. 246. 247: g. Monadelph. Diandr. (Mniopsis scaturig. Mart.)
Spreng. 1831. Gen. II. p. 796. n. 4126: g. Podostemear.
= Mniopsis Mart.
Crenosciadium Boiss. & Heldr. 1849. Diagn. pl. nov. or. II. Nr. 10. p. 30: nov. g. Peucedanear. (C. siifolium.) *Cf.* Flora 1850. p. 45. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 704.
Crenularia Boissier 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 380: nov. g. Cruciferar. (C. orbiculata.)
Boiss. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 181: g. Thlaspidear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 340.
Endl. 1843. Spl. III. p. 87. n. 4891/1: g. Thlaspideis aff. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 46.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Thlaspidar
Creochiteae Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 559: subtrib. Miconialium. Gen.: Creochiton.
Creochiton*) Blume 1831. Flora II. p. 506: nov. g. Miconicar. (Melastoma pudibundum Bl.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 788. — Meisn. 1838. Gen. p. 113 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6255. p. 1220; 1841. Ench. p. 647. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1462. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6764. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 333.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 153: g. Pyxidanthear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 796.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 559: g. Creochitear.
Creocome Edgeworth 1846. Linn. Trans. XX. 1. p. . . .: nov. g. Umbelliferar. (Bot. Zeit. 1848. p. 133.)
Creodus**) Loureiro 1790. Fl. cochinch. I. p. 88. Ed. Willd. p. 112: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (Cr. odorifer.)
= Chloranthus Swartz.
Creolobus Lilja 1838. Flor. p. 67.
= Mentzeliae sect. Macrosperma Endl.
Creolybus Wittst. Etym. Handw. p. 237: vid. *praeced.*
Creopus „Link" Bail 1858. Syst. Pilz. p. 53. t. 17: g. Sphaeriaceor. stromaticor. (*Pulvinaria Fr.*)
Crepalia „Schrank" Steud. Nom. vid. *Craepalia Schrank.*
Crepibrachium***) Tausch 1828. Flora I. Erg. Bl. p. 80: sect. Crepidii. (Crepis aspera L.)
= Nemauchenes Cass.
Crepidaria Haworth 1812. Syn. succ. p. 136 (Ed. Schrank 1819. p. 148); 1819. Suppl. p. 67: nov. g. Dodecandr. Trigyn.
Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7329. 3: sect. Euphorbiae. — Par. Baill. 1858. Euphorb. p. 284.
= Pedilanthus Neck.

Crepideae Cassini 1822. Dict. v. 25. p. 61: div. Lactucear. Gen. §. 1: Lampsana, Rhagadiolus, Kölpinia. §. 2: Zacintha, Nemauchenes, Gatyona, Hostia, Barkhausia, Catonia, Crepis, Intybellia, Pterotheca, Ixeris, Taraxacum. §. 3: Helminthia, Picris, Medicusia. — Par. Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568. Subdivis.: Lampsaneae, *verae* (gen.: Chondrilla, Willemetia, Zacintha, Nemauchenes, Gatyona, Anisoderis, Barkhausia, Paleya, Catonia, Crepis, Brachyderea, Phaecasium, Intybellia, Deloderium, Pterotheca, Ixeris, Taraxacum, Omalocline), Picrideae.
Rchb. 1828. Consp. p. 97: subdiv. Lactucear. Gen.: Thrincia, Leontodon, Picris, Medicusia, Helminthia; Zacyntha, Nemauchenes, Gatyona, Barkhausia, Lagoseris, Phaecasium, Crepis, Brachyderea, Catonia, Homalocline, Geracium, Hieracium, Tolpis, Schmidtia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 95. Gen.: Chondrilla, Phoenixopus, Prenanthes, Zacintha, Phaecasium, Crepis, Geracium, Barkhausia, Intybellia, Zollikofferia; Picridieae.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 251: subdiv. Cichoracear.
Koch 1837. Syn. p. 434: trib. Cichoracear. Gen.: Picridium, Zazintha, Lagoseris, Barkhausia, Crepis, Soyeria, Hieracium.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6: sect. Lactucear. Gen.: Lampsana, Aposeris, Rhagadiolus, Kölpinia, Chondrilla, Peltidium, Zacintha, Heteracia, Nemauchenes, Gatyona, Borkhausia, Paleya, Anisoderis, Catonia, Soyeria, Geracium, Crepis, Brachyderca, Phaecasium, Intybellia, Pterotheca, Ixeris, Taraxacum, Microderis, Helminthia, Spitzelia, Medicusia, Picris, Rodigia, Ammogeton, Pachylepis, Pinaropappus.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 454: subtrib. Cichoracear. — Par. Koch 1844. Syn. ed. II. p. 499. Gen. ut 1837 (Zacyntha) et Pterotheca (loco Lagoseridis). Barkhausia Crepidi injungitur.
Crepidium Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 387. f. 63: nov. g. Orchidear.
= Microstylis Nutt.
Crepidium Tausch 1828. Flora I. Erg. Bl. p. 80: nov. g. a Crepide L. sejunctum. Sect.: Sphaerotheca, Crepibrachium.
= Endoptera DC.
Crepidium Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 435: nov. g. Lactucear. (Crepis biennis Hook.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 51. n. 3022/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Walp. 1843. Rep. II. p. 697 (praecedentibus Torrey & A. Gray) Eucrepidi DC. inserit.
Crepidium Presl 1843. Hymenoph. p. 115: sect. Didymoglossi. (Trichomanes humile Forst.)
Crepidomanes Presl 1850. Epimel. bot. p. 377: sect. Trichomanis et ibid. p. 618 nov. g. Trichomanear. (Trichomanes intramarginale Hook. & Grev.)

---

*) κρέας, caro; χιτών, tunica.
**) κρεώδης, carnosus: a flore carnoso, tumido.
***) κρηπίς, crepida.

Crepidopteris*) „Presl“ Sternb. 1838. Vers. II. p. 119: nov. g. Adiantaceitum.
= Pecopteris Brongn.

Crepidopus Nees 1816. Syst. p. 195; 1817. Ueberbl. p. 48: sect. Agarici. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 419.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 616: g. Agaricidear.
= Crepidotus Fries et Pleuroti Fries pars.

Crepidotropis**) Walp. 1840. Linnaea XIV. p. 296: nov. g. Dalbergiear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 6727/$_1$. p. 1427; 1841. Ench. p. 673. — Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6020. — Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 334.
= Dioclea HBK.? (Lindl. 1847.)

Crepidotus Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 272; 1825. Pl. homon. p. 74; 1828. Elench. I. p. 37: tribus Dermini.

Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *D a*; 1841. Nom. p. 12. n. 502. 3 *a*: subsect. Dermini. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 453 IV. *a*. p. 40; 1841. Ench. p. 22. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 469. — Math. 1853. Belg. II. p. 356.

Fries 1836. Epicr. p. 209; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 294: subg. Dermini. Sect.: Eudermini, Hypodermini. — Par. Bail 1858. Syst. p. 37.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici. *Synon.* Crepidopus Nees pt.

Crepinia Rchb. 1828 in Mössl. Handb. II. p. 1415 (Pl. crit. Cent. VII); 1828. Consp. p. 98. n. 2155: nov. g. Andryalear. *Cf.* Rchb. 1831. Fl. exc. p. 269 in nota ad Pterothecam nemausensem.

Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear.
= Trichocrepis Vis.

Crepis Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 195: g. Cichoracear. (ab auctoribus diversissimo modo emendat.) — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 169. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 485. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 374. — DC. 1805. Franç. IV. p. 38; 1815. V. p. 446. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 425. — D. Don 1825. Nepal. p. 164. — Link 1829. Hdb. I. p. 799. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 4. 130. Sect.: Barckhausia, Crepis. — Math. 1853. Belg. I. p. 311.

Linn. 1737. Gen. p. 240. n. 621; 1737. Cliff. p. 386; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 238; 1753. Sp. II. p. 805; 1759. Syst. ed. X. p. 1195. n. 819; 1763. Sp. ed. II. p. 1131; 1764. Gen. ed. VI. p. 403. n. 914; 1767. Syst. ed. XII. p. 524: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 599; 1784. Syst. p. 719. — Reich. 1778. Gen. p. 401. n. 993. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 530. n. 1239. — Gmel. 1791. Syst. p. 1179. — Pers. 1797. Syst. p. 758; 1807. Ench. II. p. 375. n. 1774. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1592. n. 1412;

Crepis Vaill. cont.
1809. En. p. 826. — Link 1822. En. II. p. 290.

Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 242. n. 994: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 534. Segregantur Medicusia et Barkhausia.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Semiflosculosor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Semiflosculosar. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 97; 1777. Intr. p. 121. — Batsch 1802. Tab. p. 250. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 120. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 487.

Hill 1769. Ht. kew. p. 46: g. Ligulatar.

Neck. 1770. Act. Ac. Palat. II. p. 464: g. Chicoracear.

Neck. 1790. El. I. p. 53. n. 95: g. Glossariphytor. Sejungitur Chatelania.

Rebent. 1804. Neom. p. 96: g. Pentandr. Monogyn.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 579; 1826. Syst. III. p. 634. n. 2877; 1831. Gen. II. p. 644. n. 3234: g. Cichorear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 125.

Cass. 1818. Dict. v. 11. p. 395: g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 146. — Less. 1832. Syn. p. 136. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 160. Sect.: Phaecasium, Brachyderea, Eucrepis, Intybellioides, Hapalostephium, Hieracioides. — Endl. 1838. Gen. n. 3022. p. 500; 1841. Ench. p. 251. Sect.: Eucrepis, Homalocline. Accedit 1842 (Spl. II. p. 51) Psilochenia. — Kunth 1838. Berol. I. p. 385. (legitimar.) — Meisn. 1839. Gen. p. 236 (144). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 436. Nova sect.: Leptotheca. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 487. Sect.: Eucrepis, Phaecasium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 820. Sect. ex DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 107. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 336.

Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 62; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: g. Crepidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2145; 1831. Fl. exc. p. 257 (sect.: Phaecasium, Crepis, Catonia); 1841. Nom. p. 95. n. 3716 (sect.: Calliopea, Homalocline, Soyeria, Crepis, Brachyderea). — Koch 1837. Syn. p. 437. Ed. II. p. 500. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6. (restrict.) — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 454. Subgen.: Chlorocrepis, Wibelia, Daucocrepis. — C. Koch 1850. Linnaea XXIII. p. 688.

Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 426.

Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1346. 1397: g. Cichoriacear. Sect. ut 1831 et Brachyderea.

Tausch 1828. Flora I. Erg. Bl. p. 78: g. disjuncto Crepidio etc. valde restrict.

D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 308: g. Hieracear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 140.

*) *κρηπίς*, margo, crepida.
**) *κρηπίς*, crepida; *τρόπις*, carina.

Crepis Vaill. cont.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 273: g. Liguliflorar.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 329: g. Crepoidear. Sect.: Barkhausia, Paleya, Crepis.
Synon. Limnoseris Peterm.

Crepoideae Gren. (& Godr.) 1850. Fl. France II. p. 285. 314: trib. Cichoracear. Gen.: Chondrilla, Willemetia, Taraxacum; Lactuca, Prenanthes, Sonchus; Mulgedium, Picridium, Zacintha, Pterotheca, Crepis, Soyeria, Hieracium, Andryala.

Crepula Hill 1769. Hort. kew. p. 58: nov. g. Associatar. (Cnicus centauroides et cernuus L.)
= Rhaponticum et Alfrediae sp. DC.

Crescentia Linn. 1737. Gen. p. 182. n. 505; 1737. Cliff. p. 327; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 626; 1759. Syst. ed. X. p. 1115. n. 680; 1763. Sp. ed. II. p. 872; 1764. Gen. ed. VI. p. 314. n. 762; 1767. Syst. ed. XII. p. 416: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 472; 1784. Syst. p. 564. — Reich. 1778. Gen. p. 315. n. 820. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 412. n. 1021. — Gmel. 1791. Syst. p. 943. — Pers. 1797. Syst. p. 601; 1807. Ench. II. p. 168. n. 1503. — Willd. 1800. Sp. III. p. 311. n. 1160.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 172. n. 701: g. Petalostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Solanear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 378. — Link 1822. En. II. p. 146.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Putaminear.? — Par. Gis. 1792. Prael. p. 376.
Hill 1769. Ht. kew. p. 261: g. Monopetalar. irregular.
Scop. 1777. Intr. p. 170: g. Personatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 193. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 842. n. 2242; 1831. Gen. II. p. 506. n. 2485. (Baccatar.)
Juss. 1789. Gen. p. 127: g. Solaneis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 292 (*Cressentia*). — Poir. 1805. Dict. v. 6. p. 226 (*Calebassier*).
Neck. 1790. El. I. p. 376. n. 582: g. Plasyrgophytor.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 229. t. 222.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 892: g. Bignoniear. anomalar.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 157: g. Bignoniaceis aff. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 254.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVIII: g. Buchnerear.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3219: g. Caprariacear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 232: g. Crescentiear. — Par. DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123; 1845. Pr. IX. p. 246. — Endl. 1839. Gen. n. 4171. p. 723; 1841. Ench. p. 350. — Meisn. 1840. Gen. p. 301 (210). — Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4720. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 567. — Brongn. 1843. En. genr. p. 62. — Seem. 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 273.

Crescentia Linn. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: g. Cyrtandrear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 332: g. Scrophularineis aff.
Gardn. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 425: g. Crescentiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 674. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 337.
Synon. Cujete Plum.; Cuiete Adans.

Crescentia Burger . . . . genus Vitium, teste Bronner.

Crescentiaceae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 24.
Gardn. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 425: ordo inter Bignoniaceas et Cyrtandraceas medius. Gen.: Crescentia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 673: ordo Bignonialium. Gen. Crescentiear. Endl. et Sotor, Schlegelia.
Seem. 1853. Fl. Panam. p. 181: fam. plant. Trib.: Tanaecieae, Crescentieae.

Crescentieae Bojer 1837. Hort. maurit. p. 221.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 216. 232: trib. Bignoniacear. Gen.: Crescentia, Tanaecium, Tripinnaria. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 62. Gen.: Crescentia. — DC. 1845. Pr. IX. p. 240. Subtrib.: Tanaecieae, Crescentieae (gen. Crescentiear. DC. 1838).
DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123; 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 285: subtrib. Crescentinear. Gen.: Crescentia, Kigelia, Tripinnaria.
Endl. 1839. Gen. p. 723: fam. Personatar. Gen. ut Don. — Par. Endl. 1841. Spl. 1. p. 1409; 1841. Ench. p. 350; 1842. Spl. II. p. 65. Gen. ead. et Periblema, Phyllarthron, Colea, Parmentiera, Kigelia. — A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 571. Gen. ut DC.
Meisn. 1840. Gen. p. 301 (210): trib. Crescentinear. Gen. ut DC.
Rchb. 1841. Nom. p. 121: subsect. Cyrtandrear. genuinar. Gen.: Crescentia, Parmentiera (serius Zenkeria), Boutonia, Colea, Arthrophyllum, Tanaecium; Tripinnaria, Kigelia.
Miquel 1844. Bot. Zeit. p. 785: subordo 4 Gesneriacear. Gen.: Crescentia, Tanaecium, Schlegelia.
Seem. 1853. Fl. Panam. p. 181; 1854. Kew gard. misc. VI. p. 272: trib. Crescentiacear. Gen.: Parmentiera, Crescentia, Kigelia (et 1853 Sotor?) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 523 adnot.

Crescentineae DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 123; 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 285: trib. Bignoniacear. Subtrib.: Tanaecieae, Crescentieae. — Par. A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 571. Subtrib. eaed.
Meisn. 1840. Gen. p. 301 (210): subordo Bignoniacear. Trib. eaed.

Cressa*) Linn. 1747. Amoen. ac. I. Ed. 1749. p. 121: nov. g. plant.

*) Cressa foemininum adjectivi cres i. e. cretensis.

Cressa Linn. cont.
Linn. 1753. Sp. I. p. 223; 1759. Syst. ed. X. p. 949. n. 277; 1762. Sp. ed. II. p. 325; 1764. Gen. ed. VI. p. 122. n. 313; 1767. Syst. ed. XII. p. 197. n. 310: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 218; 1784. Syst. p. 264. — Reich. 1778. Gen. p. 127. n. 341. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 172. n. 439. — Gmel. 1791. Syst. p. 454. — Pers. 1797. Syst. p. 277. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1320. n. 502. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 72.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Jalapar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 245: g. Portulacar.
Gled. 1764. Syst. p. 210. n. 877: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 185: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 134: g. Convolvulor.
Neck. 1790. El. II. p. 19. n. 636: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 397: g. Convolvulacear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 288. n. 640. — DC. 1805. Franç. III. p. 643. — Hedw. 1806. Gen. p. 181. n. 747. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 489. Ed. Nees p. 345. — Lois. 1818. Dict. v. 11. p. 401. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 119. — Schult. 1820. Syst. VI. p. xix. 205. — Kunth 1823. Syn. II. p. 230. — Link 1829. Hdb. I. p. 594. — Bartl. 1830. Ord. p. 192. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 921. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 73. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 503.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 310: g. Convolvuleis aff.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 463; 1825. Syst. I. p. 863. n. 1007; 1830. Gen. I. p. 214. n. 1105: g. Convolvulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2996; 1841. Nom. p. 114. n. 4427. (genuinar.) — Choisy 1833. Mém. Genèv. VI. p. 495 (*cf.* Flora Litt. V. p. 137); 1845 in DC. Pr. IX. p. 439. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 300. — Endl. 1839. Gen. n. 3792. p. 652; 1841. Ench. p. 323. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (181). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 94. — Brongn. 1843. En. genr. p. 55. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 95.
Webb .... Canar. III. p. 34: g. Cressear.
Synon. Anthyllis Pr. Alp.

Cresseae Webb & Berth. .... Phyt. Canar. III. p. 33: sect. Convolvulacear. Gen.: Cressa.

Cressentia St. Hil. vid. *Crescentia Linn.*

Creswellia Gregory 1855 ......: nov. g. Diatomacear.

Crevispina Rchb. vid. *Cervispina.*

Cribaria Gray, Dumort. vid. *Cribraria Schrad.*

Cribarideae Gray Arr. brit. pl. I. p. 565. 577: div. Gasteromycear. Gen.: Cribaria, Didymium.

Cribraria „Schrad. ined." Gmel. 1791. Syst. p. 1471: nov. g. Fungor. — Par. Pers. 1796. Obs. mycol. I. p. 90. — Schrad. 1797. Nov. gen. I. p. 2. (*Cf.* Leman 1818. Dict. v. 11. p. 409.) — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 269.
Pers. 1797. Tent. disp. p. 11: g. Dermatocarpi.
Pers. 1801. Syn. Fung. p. xiv. 189: g. Trichospermor.
DC. 1805. Franç. II. p. 255: sect. Trichiae.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 29: g. Gastromycor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 49: g. Gymnospermor.
Nees 1816. Syst. p. 120; 1817. Ueberbl. p. 37: g. Trichocistor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 380.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 14: g. Cribrariar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 565. 577 (*Cribaria*): g. Cribaridear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 80 (*Cribaria*): g. Trichosporear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 555: g. Trichiacear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 144: g. Trichiaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 183; 1841. Nom. p. 9. n. 357.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: g. Fuliginear.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1026: g. Trichogastrum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 529. n 3516; 1831. Gen. II. p. 772. n. 3964: g. Trichogasterum.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 168; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 456: g. Stemoniteor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 310. p. 26; 1841. Ench. p. 16. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 265.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 361: g. Angiogasterum.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 22; 1840. IV. p. 35; 1842. V. p. 21. 58; 1842. Mycol. p. 84: g. Cribrariacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Cribrarieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 216: g. Stemonitideor.
Math. 1853. Belg. II. p. 386: g. Trichiear.

Cribrariaceae Corda 1838. Icon. Fung. II. p. 22; 1840. IV. p. 35: fam. Myclomycetum. Gen.: Dictydium, Cribraria, Arcyria.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 21; 1842. Mycol. p. LXXIII: fam. Dermatogasterum. Gen. ead.

Cribrariae Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13: cohors Fungor. Gen.: Craterium, Stemonitis, Arcyria, Trichia, Dictydium, Cribraria.

Cribrariei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: sect. Coniogastror. Gen.: Dictydium, Cribraria.

Crineae Kunth 1850. Enum. V. p. 542: div. Amaryllear. Gen.: Griffinia, Lycoris, Crinum, Hyline.

Crinipes Hochstett. 1855. Flora p. 279: nov. g. Avenacear. (Danthonia abyssinica Hochst.).
Hochst. 1856. Flora p. 22: g. Festucacear.

Crinissa D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 180: sect. Chondrillae. (Ch. pauciflora S. & M.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3009 *b*. p. 499; 1841. Ench. p. 250.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 144: sect. Pyrrhopappi.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3738: g. Crepidear. genuinar.
Synon. Barkhausia Nutt., Ell.

Crinita Houtt. .... Pflanzensyst. V. p. 357. t. 40.
Gmel. 1791. Syst. p. 231: g. Tetrandr. Monogyn.
= Pavetta Linn.

Crinita Mönch 1794. Meth. p. 578: nov. g. Petalostemonis (Chrysocoma biflora L.?)
= Linosyris Lob.

Crinitaria Cassini 1825. Dict. v. 37. p. 460. 475; 1830. v. 60. p. 582: g. Chrysocomear. (*Crinita Mönch.*) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2535. — Less. 1832. Syn. p. 195.
Bartl. 1830. Ord. p. 139: g. Asterear. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 24.
= Linosyris Lob.

Crinium Fries 1819. Novit. fl. suec. V. p. 79: nov. g. Fungor. (Acrosporium calyciiforme Fr.)
= Crinula Fries.

Crinodendron*) Molina 1782. Saggio p. 179: nov. g. plant.
Cavan. 1788. Diss. V. p. 300. t. 158: g. Malvacear. (C. patagua.) *Cf.* Röm. & Ust. 1790. Mag. Bot. XI. p. 133.
Gmel. 1791. Syst. p. 1026: g. Monadelph. Decandr. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 78. n. 2408; 1831. Gen. II. p. 548. n. 2686.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 889: g. Linozostear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 195: g. Euphorbiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 177. n. 4696: g. Samydear.?
Hook. 1833. Bot. Misc. III. p. 155. t. 100: g. Elaeocarpear.? — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 39 (29). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372.
Endl. 1840. Gen. n. 5391. p. 1012; 1841. Ench. p. 523: g. Tricuspidariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7942.
Synon. Crinodendrum Juss.

Crinodendrum Juss. 1789. Gen. p. 431: g. incertae sedis.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 456. n. 1114: g. Monadelph. Decandr. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 691. n. 1267. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 380. — Pers. 1807. Ench. II. p. 237. n. 1606. — Poir. 1825. Dict. v. 38. p. 71 (*Patagua*).

*) *κρίνον*, lilium.

Crinodendrum Juss. cont.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 341: g. Tricuspidariear.
= Crinodendron Molina.

Crinonia Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 338: nov. g. Orchidear.
= Pholidota Lindl.

Crinonia Banks mss.
= Hedycarya Forst. (Endl.)

Crinopsis Römer 1847. Fam. nat. syn. IV. p. 11. 90: sect. Crini. (Cr. Paxtoni Herb., etc.) — Simil. Kunth 1850. Enum. V. p. 577.

Crinotrichium Ritg. vid. *Circinotrichum Nees.*

Crinula*) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 493; 1828. Elench. I. p. 235: nov. g. Clavator. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 576: g. Clavariear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 91 (*Grinula*): g. Pistillarinor.
Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 296 (*Grinula*): g. Pistillarior.
Endl. 1836. Gen. n. 416. p. 36; 1841. Ench. p. 20: g. Mitrulinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 432.
Fries 1838. Epicr. p. 584: g. Clavarieor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 41; 1842. Mycol. p. 172: g. Clavariacear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 339: g. Clavarineor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 198: g. Agyriaceor.
Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 79: g. Agyriacear.
Synon. Crinium Fries.

Crinum**) Linn. 1737. Gen. p. 97. n. 245; 1737. Cliff. p. 127; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 76; 1753. Sp. I. p. 291; 1759. Syst. ed. X. p. 976. n. 366; 1762. Sp. ed. II. p. 419; 1764. Gen. ed. VI. p. 161. n. 405; 1767. Syst. ed. XII. p. 236. n. 401: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 263; 1784. Syst. p. 318. — Reich. 1778. Gen. p. 164. n. 438. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 217. n. 553. — Lour. 1790. Coch. I. p. 197. — Gmel. 1791. Syst. p. 537. — Pers. 1797. Syst. p. 338; 1805. Ench. I. p. 352. n. 782. — Willd. 1799. Sp. II. p. 45. n. 618; 1809. En. p. 352. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 260. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 214. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 126.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 221. n. 919: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Spathacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 274. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 248; 1825. Syst. II. p. 54. n. 1199; 1830. Gen. I. p. 275. n. 1430. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1181.

*) „Nomen a *κρίνω*, dijudico, ob locum ambiguum in systemate."

**) Crinum s. Crinon synonymum antiquum a Theophrasto Lilio impositum (Ht. Cliff.)

Crinum Linn. cont.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Narcissor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 54.
Scop. 1777. Intr. p. 86: g. Liliacear.
Neck. 1790. El. III. p. 157. n. 1501: g. Ymnodiphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 183: g. Narcissoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 146: g. Lirior.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 135: g. Amaryllidear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 229. n. 933. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 297. Ed. Nees p. 153. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 278. — Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 412. — Kunth 1822. Syn. I. p. 285. — Herb. 1825. Amar. syn. p. I; 1837. Amaryll. p. 78. 242. (Amaryllidiform.) — Link 1829. Hdb. I. p. 197. — Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 25. — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LI. 852. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1604. — Brongn. 1843. En. genr. p. 21. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 342.
Ker 1817. On the genus Crinum.
Link 1821. En. I. p. 312: g. Narcissinar.
Agdh. 1822. Aphor. p. 173: g. Narcissear. — Par. Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 182.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1252: g. Amaryllear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1276. p. 177; 1841. Ench. p. 103. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (296). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 423. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 157. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 11. 65. Sect.: Clinocrinum, Yuccaeopsis, Eucrinum, Hesperocrinum, Callicrinum, Cyrtoloma, Crinopsis. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 580.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Van Hall 1840 in Hoev. & Vriese Tijdschr. VII. p. 142. (Observ. de seminum formatione.)
Kunth 1850. Enum. V. p. 547: g. Crinear. Sect. ut Römer (except. 3 et 4).
Synon. Tanghekolli Adans.; Bulbine Gärtn.

Criocephalus*) Schlechtend. 1826. Linnaea I. p. 83: sect. Melanthii. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1073 *a*. p. 136; 1841. Ench. p. 79.

Criosanthes Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 102: nov. g. Orchidear. (Cypripedium arietinum Ait.)
= Cypripedium Linn.

Cripterisma Planch. vid. *Crypterisma Planch.*

Criptosporium Link Spec. II. p. II: vid. *Cryptosporium Kunze.*

Crisistrix Bosc ex Steud. Nomencl. I. p. 358. 440.
= Chrysithrix Linn. f.

Crisium „Hall.“ Lachenal 1777. Act. Helvet. VIII. p. 141.
= Cirsium Tourn.

*) κριός, aries.

Crista galli Rupp. 1718. Fl. jen. p. 234. Ed. Hall. 1745. p. 240: g. pl. class. IX.
= Alectorolophus Hall.

Cristaria Sonnerat 1782. Voy. Ind. II. p. 247. Gmel. 1791. Syst. p. 675: g. Decandr. Monogyn.
= Poivrea Comm.

Cristaria Cavan. 1799. Icon. V. p. 10. t. 418: nov. g. Monadelph. Polyandr. (C. glaucophylla.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 248. n. 1629: g. Malvacear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 610. — DC. 1824. Pr. I. p. 458. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 489.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 802: g. Sidear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII; 1828. Consp. p. 202. n. 5246; 1841. Nom. p. 200. n. 7631. — Meisn. 1837. Gen. p. 27 (24). — Endl. 1840. Gen. n. 5288. p. 985; 1841. Ench. p. 512. — Brongn. 1843. En. genr. p. 77. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 349. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 101. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 309.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 109; 1831. Gen. II. p. 557: sect. Sidae.
Bartl. 1830. Ord. p. 346: g. Malvear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 343.
Presl 1836. Reliq. Hänk. II. p. 119.
Rchb. 1837. Hdb. p. 287: g. Anodear.

Cristatella Nuttall 1834. Journ. Ac. Philad. VII. p. 85. t. 11. (Non Zool.)
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 123: g. Cleomear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 296.
= Cyrbasium Endl.

Critamus Hoffm. 1816. Umbell. ed. II. p. 182: nov. g. Umbelliferar. (Sium cicutaefolium Gmel.)
= Falcariae Riv. pars.

Critamus*) Besser 1821. Volhyn. p. 93: nov. g. Umbelliferar. — Par. Mert. & Koch 1826. Deutschl. Fl. II. p. 440. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 478; 1828. Consp. p. 143. n. 3720; 1841. Nom. p. 140. n. 5385: g. Amminear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 333. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 356. — Endl. 1839. Gen. n. 4401. p. 770; 1841. Ench. p. 378. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 351.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 342: g. Pleurospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.
= Falcaria Riv.

Critesion Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 103: nov. g. Graminear. (Hordeum jubatum Pursh?)
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 238 (*Crithesium*): sect. Hordei.
= Hordeum Palis.

Critesium „Rafin.“ Endl. Gen. p. 104 in synon. Hordei: vid. *praeced.*

Crithamus Wittst. vid. *Critamus Bess.*

*) κριθάμινος, ex hordeo paratus, quare *Crithamus*. (Wittst.)

Crithe*) Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 412: sect. Avenae. (A. fatua, sterilis, etc.)

Crithesium Wittst. vid. *Critesion Rafin.*

Crithmum**) Tourn. 1700. Inst. p. 317. t. 169: g. pl. class. VII.

Linn. 1737. Gen. p. 74. n. 213; 1737. Cliff. p. 94; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 61; 1753. Sp. I. p. 246; 1759. Syst. ed. X. p. 957. n. 303; 1762. Sp. ed. II. p. 354; 1764. Gen. ed. VI. p. 134. n. 340; 1767. Syst. ed. XII. p. 208. n. 337: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 231; 1784. Syst. p. 280. — Reich. 1778. Gen. p. 138. n. 371. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 185. n. 473. — Gmel. 1791. Syst. p. 478. — Pers. 1797. Syst. p. 296. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1408. n. 537; 1809. En. p. 309.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 55. n. 221: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 90.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30 (*Chrithmum*); 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 95. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 311. n. 690.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Umbelliferar. — Par. Crantz 1767. Cl. Umbell. p. 69. — Scop. 1772. Carn. I. p. 219; 1777. Intr. p. 116. — Juss. 1789. Gen. p. 223. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 27. — Juss. 1804. Dict. v. 3. p. 388 (*Bacile*). — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 474. — DC. 1805. Franç. IV. p. 316. — Hedw. 1806. Gen. p. 199. n. 816. — Link 1821. En. I. p. 270. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 510. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 96. (Divis. 1.) — Bartl. 1830. Ord. p. 236.

Adans. 1763. Fam. II. p. 97: g. Cicutar.

Neck. 1790. El. I. p. 166. n. 274: g. Scadiophytor.

Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 102; 1836. Syn. p. 299. Ed. II. p. 329: g. Seselinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3716; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5442. — DC. 1830. Pr. IV. p. 164. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 321. — Tausch 1834. Flora I. p. 356. — Meisn. 1838. Gen. p. 143 (104). — Endl. 1839. Gen. n. 4449. p. 777; 1841. Ench. p. 379. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 961. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 215. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 112. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 289. — Parlat. .... in Webb Canar. II. p. 159. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 699. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 351.

Link 1829. Hdb. I. p. 364: g. Selinear.

Rchb. 1832. Fl. exc. p. 472: g. Seselinar.

Griseb. 1843. Rumel. I. p. 371: g. Pleurospermar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Synon. Baticula Caesalp.; Cachrydis sp. Spreng.

*) χριθή, hordeum, granum.
**) χρίθμον Dioscoridis.

Critho*) E. Meyer 1848. Ind. sem. h. Regiom.; 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 253; 1851. Linnaea XXIV. p. 195: nov. g. Graminear. (Hordeum Aegiceras Royle.)

Crithodium Link 1834. Linnaea IX. p. 132: nov. g. Graminear. (Triticum bicorne Forsk.)

Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 464: g. Hordeacear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 426 (326). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 165.

Crithopsis Jaub. & Spach 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 362 (Ill. pl. or. IV. t. 321): nov. g. Graminear. (Elymus rhachitrichus Hochst.)

Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 786: g. Hordeacear.

Crithopyrum**) Hort. Prag. teste Steud. Glum. I. p. 344.

= Agropyri spec.

Critonia P. Browne 1756. Jamaic. p. 490. t. 34. f. 1.

Cram. 1803. Disp. p. 169: g. Syngenes. Polygam. Aequal.

DC. 1836. Pr. V. p. 140: g. Adenostylear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2279. p. 369; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1839. Gen. p. 181 (124). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3830. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 351.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37: g. Eupatoriear. (verar.) — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 46.

Synon. Dalea P. Browne; Wikströmia Spreng.; Wickströmia Rchb.; Eupatorii sp. Linn.

Critonia Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 411. t. 147: g. Tubulosar.

= Kuhniae sect. Striga DC.

Critonia Cassini 1818. Dict. v. 12. p. 1; 1828. v. 57. p. 342; 1830. v. 60. p. 586: g. Vernoniear. Archetypar. verar.?

= Decaneuri sp. DC.

Crocanthemum***) Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 370: nov. g. Heteromerinear. (Cistus carolinianus Vent. et brasiliensis Lam.)

Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 95: g. Cistinear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. III. p. 722.

= Helianthemi sect. Lecheoides Dun. pt.

Croceae Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 128: trib. Spathacear. Gen.: Leucojum, Peliosanthes, Amaryllis, Crinum, Strumaria, Cyrtanthus, Eustephia, Haemanthus, Hypoxis, Curculigo, Sisyrinchium, Galaxia, Ferraria, Witsenia, Aristea, Crocus, Ixia, Sparaxis, Trichonema.

Crocicreas Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 418: nov. g. Sphaeropsideor. (Perisporium gramineum Fr.)

Crocidium Hook. 1833. Fl. Bor. Am. I. p. 335. t. 118: nov. g. Senecionear. (C.

*) Nomen significat plantam grana Hordei ferentem.
**) πυρός, frumentum.
***) κρόκος, crocus.

Crocidium Hook. cont.
multicaule.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3368. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 352.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 301: g. Eusenecionear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 215 (136). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 414. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 448. — Endl. 1841. Spl. I. n. 2812/1. p. 1384; 1841. Ench. p. 245.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 33: g. Othonnear.

Crocineae „Dumort." Spach 1846. Hist. vég. phan. XIII. p. 4: trib. Iridear. Gen.: Crocus.

Crociris Rchb. („Pl. crit. 1286—1288") 1841. Nomencl. p. 44. n. 1586: g. Ixiear.

Crociseris Rchb. 1828 in Mössl. Handb. II. p. 1501; 1831. Fl. exc. p. 242: sect. Cinerariae. (Senecio lanatus Scop., arachnoideus Sieb.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 357: sect. Senecionis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2811 ɪ *h*. p. 459; 1841. Ench. p. 244. — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3365. 5. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 220.

Crocisporium Lév. vid. *Crocysporium Corda.*

Crocodeilanthe Rchb. f. 1854. Xen. Orchid. p. 10: nov. g. Malaxidear.? (C. Xiphizusa.)

Crocodia Link 1833. Handb. III. p. 177.
= Sticta Schreb.

Crocodilium*) Vaillant 1718. Act. Ac. Paris. p. 161: g. Cynarocephalar.
Juss. 1789. Gen. p. 173: g. Cinarocephalar. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 500. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 385.
DC. 1805. Franç. IV. p. 106: sect. Centaureae. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 487. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1545 (*Corcodilium*); 1831. Fl. exc. p. 212.
Cass. 1818. Dict. v. 12. p. 19: g. Centauriear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 540: g. Centaurear.
Cass. 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 571: g. Cyanear.
Bartl. 1830. Ord. p. 144: g. Centaureacear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11: subg. Centaureae.
Synon. Crocodylium Hill et Auct.

Crocodilodes Vaillant 1718. Act. Ac. Paris. p. 162: g. Cynarocephalar.
= Atractylis Linn.

Crocodilodes Adans. 1763. Fam. II. p. 127: g. Calthar.
= Berkheya Ehrh.

Crocodylium Hill 1769. Hort. kew. p. 63: g. Associatar. (Centaurea Crocodylium et peregrina.)
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 158: g. Centaurear.
Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 377: g. Centauriear.

*) κροκόδειλος, crocodilus.

Crocodylium Hill cont.
Link 1822. En. II. p. 359: sect. Centaureae. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 591. — Endl. 1838. Gen. n. 2871 *w*. p. 474; 1841. Ench. p. 246. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 430.
Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2686: g. Centaureear.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 3 *i*: subsect. Cyani.
= Crocodilium Vaill.

Crocoxylon*) Ecklon & Zeyh. 1835. Enum. pl. Afr. austr. p. 128: nov. g. Celastrinear. (Ilex crocea Thunb.)
Meisn. 1837. Gen. p. 69 (49): g. Evonymear.
= Elaeodendri Jacq. pars.

Crocus Tourn. 1700. Inst. p. 350. t. 183. 184: g. pl. class. IX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 32. Ed. Hall. 1745. p. 33: g. pl. class. I.
Linn. 1737. Gen. p. 10. n. 26; 1737. Cliff. p. 18; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 15; 1753. Sp. I. p. 36; 1759. Syst. ed. X. p. 862. n. 53; 1762. Sp. ed. II. p. 50; 1764. Gen. ed. VI. p. 25. n. 55; 1767. Syst. ed. XII. p. 84: g. Triandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 37. — Murr. 1774. Syst. p. 75; 1784. Syst. p. 83. — Reich. 1778. Gen. p. 27. n. 61. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 34. n. 75. — Gmel. 1791. Syst. p. 107. — Pers. 1797. Syst. p. 84; 1805. Ench. I. p. 41. n. 95. — Willd. 1797. Sp. I. p. 194. n. 92; 1809. En. p. 54. — Vahl 1806. Enum. II. p. 45. n. 94. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 98. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 404. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 63. 86.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 281: g. Liliacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 87.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 159. n. 649: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 498.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: g. Denudatar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Iridum. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 60. — Juss. 1789. Gen. p. 59. — Gawl. 1805 in Konig Ann. of bot. I. p. 221. — Haw. 1809. Hortic. Trans. I. p. 132.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170. — Batsch 1802. Tab. p. 143.
Neck. 1790. El. III. p. 169. n. 1521: g. Ymnodiphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 194: g. Iridear. — Par. St. Hil. 1805 Expos. I. p. 149. — DC. 1805. Franç. III. p. 241. — Hedw. 1806. Gen. p. 23. 353. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 340. 367. n. 123. — Link 1821. En. I. p. 48; 1829. Hdb. I. p. 221. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 194. - Agdh. 1823. Aphor. p. 172. — Lois. 1827. Dict. v. 46. p. 541 (*Safran*). — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Koch 1837. Syn. p. 698. Ed. II. p. 804. — Endl. 1837. Gen. n. 1248. p. 169; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn.

*) κρόκος, Crocus. Incolis *Saffraanhout.*

Crocus Tourn. cont.
I. p. 126. 151. — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 23. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 372. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 631; 1853. N. Verh Berl. Gart. I. p. 399. Sect.: Aneurocromyon, Inocromyon, Dictyocromyon. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 284 (*Safran*). — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 108. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 236.
Salisb. 1812. Hortic. Trans. I. p. 316: g. Gladiolear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 251; 1825. Syst. I. p. 145. n. 146; 1830. Gen. I. p. 36. n. 158: g. Spathacear.
Bouché 1826. Linnaea I. p. 227. Char. emend.
Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1200; 1830. Fl. exc. p. 84; 1841. Nom. p. 44. n. 1587: g. Ixiear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 100: g. Crocinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Bulbocodium Tourn.?; Ilmu Adans.; Safran Medic.

Crocyllis E. Meyer mss. (Anthospermum Lichtensteinii Crus.)
= Anthospermi Linn. pars?

Crocynia Achar. 1810. Lichen. univ. p. 217; 1814. Syn. Lich. p. 54: sect. Lecideae (L. gossypina), antea *Saphenaria*.

Crocysporium*) Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 5. t. 1. f. 87: nov. g. Caeomacear. (C. Aegerita.)
Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 77: g. Tubercularinor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 58.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 38; 1842. Mycol. p. 161: g. Tuberculariacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 147.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491 (*Crocisporium*): g. Tubercularieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 79: g. Acmosporiaceor.

Crodisperma Poit. mss. (Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 398 in synon. Chatiakellae.) *Cf. Cordisperma.*
= Wulffia Neck. (DC. Pr. V. p. 563.)

Crommyum**) Webb 1850. Phytogr. Canar. III. p. 342: sect. Allii. Subsect.: Porrum, Codonoprasum.

Cromnophyllum Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 351: sect. Dendrolirii.

Cromyodendron***) „Presl" Sternb. 1838. Vers. II. p. 193: nov. g Asparagaceitum. (*Scitaminites Sternb.* olim.)
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 171; 1846. Chlor. prot. p. LXVII: g. Liliacear.

Cromyophora C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 636: sect. Iridis. (I. reticulata, caucasica Bieb.)

*) κροκύς, floccus.
**) κρόμμυον s. κρόμυον, cepa.
***) κρόμυον, bulbus.

Cronarticei Tulasne 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 171: div. Uredineor. Gen.: Cronartium.

Cronartium Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 220: nov. g. Fungor. (Erineum asclepiadeum Funk.) *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 12. p. 23, Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 513 adnot. et Unger 1833. Exanth. Pfl. (Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 214.) — Par. Kunze 1823. Mykol. Heft. II. p. 98.
Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 12: g. Dematior.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 530: g. Phylleriear. — Par. Fée 1834. Mém. Phyll.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Uredineor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 1. n. 11. (genuinor.) — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 20, — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 562. n. 3579: g. Coniomycetum suffultor., serius (Gen. II. p. 785) ad Aecidium reductum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 18; 1842. Mycol. p. 73: g. Aecidiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Caeomaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 510: Aecidineor.
Math. 1853. Belg. II. p. 446: g. Aecidinear.
Tul. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 188: g. Cronartieor. *Cf.* Flora 1855. p. 749.
= Röstelia Rebent.? (Endl. Gen. p. 17.)

Croomia*) Torrey .... Ann. Lyc. N.-York IV. t. 7.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 663: g. Nandinear. (Cissampelos pauciflora Nutt.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 438.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1409. n. $4815/_1$; 1841. Ench. p. 440. n. $4807/_1$: g. Berberidear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 340.
Rchb. 1841. Nom. p. 185. n. 7095: g. Berberear. genuinar.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 367: g. Berberidacear.
Synon. Torreya Croom.

Crossandra**) Salisb. 1806. Parad. p. 12: nov. g. ex typo Justiciae infundibuliformis L.
Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 69: g. Didynam. Angiosperm.
Juss. 1816. Dict. v. 1. spl. p. 11 (*Crossoandra*): g. Acanthacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 134.
Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 98; 1847 in DC. Pr. XI. p. 280: g. Aphelandrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4073. p. 703; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4265. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 367. — Miq. 1857. Ind bat. II. p. 821.
Rchb. 1837. Hdb. p 190: g. Ruelliariar.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 370. 595: g. Echmatacanthor.

*) Dicat. H. B. Croom, botanico americano.
**) κροσσός, fimbria.

Crossandra Salisb. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 63: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Justiciadar. *Synon.* Harrachia Jacq. f.

Crossiris Spach 1846. Hist. vég. phan. XIII. p. 71; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 110: subg. Iridis. (I. fimbriata Vent.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 829.
= Evansia Salisb.

Crossoandra Juss. vid. *Crossandra Salisb.*

Crossocephalum Endl. 1838. Gen. n. 3528 *d.* p. 600; 1841. Ench. p. 302: sect. Gentianae (praecedente Frölich 1796. Diss. de Gentiana p. 109, ubi sectio *Crossopetalae.*)
= Crossopetalum DC.

Crossocoma Nuttall .... Pl. Gambelian. ex Lond. Journ. bot. VII. p. 392: nov. g. cum Paeonia comparatum.

Crossolepis Lessing 1832. Syn. Compos. p. 70: nov. g. Craspediear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 158: g. Helichrysear. *Cf.* Endl. 1838. Gen. p. 444. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Endl. 1841. Ench. p. 242. n. 2727/1. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3506. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 367.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.
A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 175: g. Angianthear.? — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 271.

Crossolepis Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 61: g. Compositar. (Cr.? pusilla.)
Hook. .... Icon. t. 413.
= Chrysocoryne Endl.

Crossopetalae Bunge vid. *Crossopetalum DC.*

Crossopetalium Rchb. 1841. Nomencl. Ind. p. 152: nomen propositum pro „*Crossopetalo*" s. potius *Crossophyllo Spach.*

Crossopetalon Adans. vid. *seq.*

Crossopetalum P. Browne 1756. Jamaic. p. 145. t. 17. f. 1: nov. g. Tetrandr. Monogyn.
Adans. 1763. Fam. II. p. 224 (*Crossopetalon*): g. Jasminor.
= Myginda Jacq.

Crossopetalum „Fröl." DC. 1805. Franç. III. p. 659: sect. Gentianae. (G. ciliata.) — Par. Bunge 1829. Mém. Mosc. VII. (1824.) p. 207. 222 (*Crossopetalae*). — Koch 1837. Syn. p. 492. Ed. II. p. 566 (1844 *Grossopetalum*). — Griseb. .... in Hook. Fl. bor. am. II. p. 64; 1839. Gent. gen. p. 255; 1845 in DC. Pr. IX. p. 101. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 58.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 15: subg. Gentianae.
Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5130. 1 *b*: subsect. Gentianellae.
Synon. Gentianae crossopetalae Fröl.; Gentianella Col.; Spiragyne Neck.; Denckea Rafin.; Urananthe Gaud.; Crossocephalum Endl.; Lehmanna Casseb. & Theob.

Crossopetalum „Spach" Rchb. Nomencl. p. 210 (in ind. p. 152 emend. *Crossopetalium*): vid. *Crossophyllum Spach.*

Crossophora Link 1831. Handb. II. p. 438: g. Euphorbiacear.
= Chrozophora Neck.

Crossophrys Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 3: nov. g. Clethracear. (Clethra arborea pt.)

Crossophyllum Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 359: sect. Hyperici. (H. orientale Desrouss.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 210. n. 7994. c (*Crossopetalum*, serius *Crossopetalium*).
Endl. 1840. Gen. p. 1033. n. 5464 *A b ζ*; 1841. Ench. p. 539. n. 5464 *B d ζ*: subsect. Hyperici.

Crossopterix Wittst. vid. *seq.*

Crossopteryx Fenzl 1839. Nov. stirp. Mus. Vindob. dec. nr. 51: nov. g. Rubiacear. — Par. Benth. 1849. Niger Fl. p. 381. Char. ampliat. — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 239 (*Crossopterix*).
Endl. 1841. Spl. I. n. 3279/1. p. 1394; 1841. Ench. p. 274: g. Eucinchonear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 70. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 367.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2917: g. Quinquinear.
Meisn. 1843. Comm. p. 360: g. Cinchonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.

Crossostemma Benth. 1849. Niger Fl. p. 364: nov. g. Passiflorear. (C. laurifolium.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 653.

Crossostephium Lessing 1831. Linnaea VI. p. 220; 1832. Syn. Compos. p. 266: nov. g. Artemisiear. (Artemisia chinensis Vahl.) — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 127. — Endl. 1838. Gen. n. 2695. p. 439; 1841. Ench. p. 242. — Meisn 1839. Gen. p. 213 (135). — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3453. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 368.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 23: g. Chrysanthemear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 88: g. Anthemidear.

Crossostigma Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 174 (Nouv. Ann. Mus. IV. p. 404): nov. g. Epilobinear. (Epilobium minutum Lindl.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6572: g. Onagrear.
Endl. 1840. Gen. n. 6121 *c.* p. 1192; 1841. Ench. p. 637: sect. Epilobii?

Crossostoma Steud. Nomencl. I. p. 442: err. pro *Crossotoma Don.*

Crossostylis*) Forst. 1776. Char. gen. p. 87. t. 44: nov. g. Monadelph. Polyandr. *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 509. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 473. n. 1149. — Willd. 1800. Sp. III. p. 845. n. 1307. — Pers. 1807. Ench. II. p. 260. n. 1651 (*Grossostylis*).
Scop. 1777. Intr. p. 283: g. Columniferar.

*) κροσσός, fimbria.

Crossostylis Forst. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 432: g. Salicariis aff.? — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 24.
Gmel. 1791. Syst. p. 1036: g. Monadelph. Icosandr. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 381.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 805; 1826. Syst. III. p. 85. n. 2427: g. Pentapetear.
DC. 1828. Pr. III. p. 296: g. Myrtacear. dubium. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 841. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 106. — Endl. 1840. Gen. n. 6336. p. 1235; 1841. Ench. p. 651.
Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4680: g. Myrtear.?
Spreng. 1831. Gen. II. p. 551. n. 2700: g. Bombacear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 28 (25)?
Guillem. 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 354.
Meisn. 1837. Gen. p. 107 (76): g. Chamaelauciear.?
Rchb. 1837. Hdb. p. 253: g. Eugeniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 175. n. 6799: g. Lecythidear.? — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 368.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 740: g. Lecythidacear.?
A. Gray 1853. Char. n. gen. p. 8: g. Legnotidear.

Crossotoma*) G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 730: sect. Scaevolae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3038 *d.* p. 506; 1841. Ench. p. 261. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 512.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 583: g. Scaevolear. — Par. Vriese 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 36. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 372.
Synon. Pogonetes Lindl.; Baudinia Lesch.

Crotalaria**) Tourn. 1700. Inst. p. 644: g. pl. class. XXII.
Linn. 1737. Gen. p. 218. n. 578; 1737. Cliff. p. 356; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 210; 1753. Sp. II. p. 714; 1759. Syst. ed. X. p. 1158. n. 771; 1763. Sp. ed. II. p. 1003; 1764. Gen. ed. VI. p. 370. n. 862; 1767. Syst. ed. XII. p. 477: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 540; 1784. Syst. p. 649. — Reich. 1778. Gen. p. 369. n. 934. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 490. n. 1172. — Gmel. 1791. Syst. p. 1094. — Pers. 1797. Syst. p. 686; 1807. Ench. II. p. 283. n. 1688. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 49. t. 193; 1832. Ind. III. p. 259. — Willd. 1800. Sp. III. p. 972. n. 1343; 1809. En. p. 747. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 94. — Roth 1821. Nov. spec. p. 332. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 192.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126 (*Crotallaria*); 1764. Syst. p. 131. n. 542: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. p. 161.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord.

*) τομή, sectio: a segmentis corollae fimbriatis.
**) Nomen a figura leguminum, caudam serpentis Crotali referente.

Crotalaria Tour. cont.
nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 397. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 82.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 354. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 390. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 216. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 25. — Link 1822. En. II. p. 227. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 236. n. 2548; 1831. Gen. II. p. 581. n. 2850.
Hill 1769. Ht. kew. p. 290: g. Tetrapetalar. irregular.
Medic. (Vorles. II. p. 344) 1789. Phil. Bot. I. p. 206. (C. incana L.)
Gärtn. 1791. Fr. II. t. 148.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 750: g. Spartiear.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 124. — Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4042. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 133. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 180. — E. Meyer 1835. Comm pl. Afr. I. p. 23. — Meisn. 1837. Gen. p. 82 (58). Subgen.: Amphinomia, Clavulium, Chrysocalyx, Priotropis. — Torr. & Gray 1839. North-Am. I. p. 369. — Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 474. — Benth. 1839. Ann. nat. hist. III. p. 428. Sect.: Anarthrophyllum, Chrysocalyx, Eucrotalaria. — Endl. 1840. Gen. n. 6472. p. 1262; 1841. Ench. p. 668. Sect.: Eucrotalaria, Sphaerocrotale, Chrysocalyx, Cyrtolobus, Clavulium, Priotropis?, Amphinomia? — Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5884. Sect. eaed. exclusis 2 ultimis. — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 458. 472. — Brongn. 1843. En. genr. p. 127. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 399. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 368. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 320. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 459.
Link 1831. Hdb. II. p. 159: g. Lotoidear.
Vogel 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 7: g. Lotear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Crotalariear.
Synon. Crotolaria Scop.; Crotularia Medic.; Atolaria Neck.

Crotalarieae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 554: div. Genistear. Gen.: Lupinus, Crotalaria, Priotropis.

Crotalarioides Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 42: sect. Argyrolobii. (A. crotalarioides.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 842.

Crotallaria Gled. vid. *Crotalaria Tourn.*

Crotalopsis Michx. mss.
=Baptisia Vent.

Crotolaria Scopoli 1777. Introd. p. 305: g. Leguminosar.
Lour. 1790. Coch. II. p. 433. Ed. Willd. p. 526: g. Diadelph. Decandr.
Neck. 1790. El. III. p. 30. n. 1339: g. Cyteophytor. Sejungitur Atolaria.

Crotolaria Scopoli cont.
D. Don 1825. Nepal. p. 241: g. Papilionacear.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. 193: g. Genistear.
= Crotalaria Tourn.

Croton*) Linn. 1737. Gen. p. 288. n. 720; 1737. Ht. Cliff. p. 444; 1742. Gen. ed. II. p. 457. n. 866: g. Monoec. Polyandr.
Linn. 1748. Upsal. p. 290 in Monoec. Polyadelph.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 140. n. 591: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Tricoccor.
Linn. 1753. Sp. II. p. 1004; 1759. Syst. ed. X. p. 1275. n. 960; 1763. Sp. ed. II. p. 1424; 1764. Gen. ed. VI. p. 502. n. 1083; 1767. Syst. ed. XII. p. 634: g. Monoec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 721; 1784. Syst. p. 863. Aubl. 1775. Guian. II. p. 879. t. 338. 339. — Reich. 1778. Gen. p. 498. n. 1181. — Lour. 1790. Coch. II. p. 581. Schreb. 1791. Gen. II. p. 654. n. 1462. — Pers. 1797. Syst. p. 907. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 214. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 531. n. 1718; 1809. En. p. 993. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 225. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 55. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 678.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Euphorbiar. Par. Juss. 1789. Gen. p. 389.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 243. — Gis. 1792. Prael. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 169. — Geiseler 1807. Crotonis mon. — Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 38. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 867. n. 3135; 1831. Gen. II. p. 697. n. 3519.
Hill 1769. Ht. kew. p. 206: g. Pentapetalar.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 269: g. Monadelph. Dodecandr. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1029. — Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 1179.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 244; 1789. Phil. Bot. I. p. 90.
Neck. 1790. El. II. p. 335. n. 1122: g. Cyrtosiphytor. (restrict.)
Vent. 1799. Tabl. III. p 496: g. Tithymaloidear.
Cram. 1803. Disp. p. 204 in Dioec. Monadelph.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 284: g. Euphorbiacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 346. — Pers. 1807. Ench. II. p. 583. n. 2138. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 66. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 47. — Kunth 1822. Syn. I. p. 394. — Link 1822. En. II. p. 406; 1831. Hdb. II. p. 437. — Agdh. 1823. Aphor. p. 194. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 28. — Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 84.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 365: g. Euphorbiear.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 601: g. Crotonear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5827. p. 1117; 1841. Ench. p. 588. — Klotzsch 1841. Arch. f. Nat. I. p. 251; 1843. Lond. journ. bot. II. p. . . . — Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7387. (genuinar.) — Brongn. 1843. En. gener. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. — Gér. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 371.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5045: g. Ricinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 501.
Blanco 1837. Filipin. p. 751: g. Monoec. Adelph.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Crozophorear.
Meisn. 1841. Gen. p. 340 (253): g. Eucrotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 349: g. Crotonidear. Sect.: Eucroton, Micranthis, Furcaria, Gymnocroton, Eutropia, Palanostigma, Geiseleria, Tiglium, Andrichnia, Astraeopsis, Astraea, Podostachys, Ocalia, Barhamia, Timandra, Medea, Cleodora?, Codonocalyx, Crotonanthus?, Lasiogyne.
Synon. Heliotropium Caesalp.; Ricinoides Tourn.; Ricinocarpus Boerh.; Elutheria Linn.; Cascarilla Adans.; Tridesmus Lour.; Luntia, Cinogasum, Aroton, Brunsvia Neck.; Schradera Willd. (Steud.)

Crotonanthus „Klotzsch in sched." Baillon 1858. Et. Euphorb. p. 370: sect. Crotonis?

Crotoneae Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 599: sect. Euphorbiacear. Gen. jav.: Trigostemon, Ryparosa, Croton, Baliospermum, Erythrocarpus, Codiaeum, Rottlera, Adisca, Trewia, Cleidion, Cheilosa, Conceveibum, Erytrochilus, Janipha, Jatropha, Elaeococca, Aleurites, Ostodes, Elateriospermum, Spathiostemon, Ricinus, Mappa, Pachystemon, Omalanthus, Acalypha, Tragia, Cnesmosa, Excaecaria.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: subdiv. Euphorbiear. Sect.: Micrantheae, Argythamnieae, Crozophoreae.
Endl. 1840. Gen. p. 1113; 1841. Ench. p. 588: trib. Euphorbiacear. Gen.: Garcia, Mabea, Siphonia, Elateriospermum, Anda, Aleurites, Ostodes, Elaeococca, Jatropha, Curcas, Cnidoscolus, Manihot, Ricinus, Spathiostemon, Baloghia, Ricinocarpus, Amperea, Mozinna, Hisingera, Hemicyclia, Gelonium, Codiaeum, Rottlera, Adriania, Cheilosa, Acidoton, Baliospermum, Haematospermum, Hendecandra, Adelia, Crotonopsis, Croton, Julocroton, Crozophora, Chiropetalum, Caperonia, Ditaxis, Monotaxis, Argythamnia, Trigonostemon, Ryparia. — Par. Klotzsch 1841. Arch. f. Nat. I. p. 192. Nova gen.: Podostachys, Astraea, Ocalia, Eutropia, Cleodora, Timandra, Medea, Philyra. — Endl. 1842. Spl. II. p. 89. Gen. ut antea exclusa Hisingera. Accedunt genera Klotzschiana et Cephalocroton, Tetrorchidium, 1843 (Spl. III. p. 98) Trewia, Engelmannia, Tiglium, Geiseleria, Brachystachys, Lasiogyne, Pilinophytum et 1850 (Spl. V. p. 89) Givotia, Beyeria, Bertya, Serophyton, Eremocarpus, Heterochlamys, Sclero-

*) Croton synonymon Ricini apud Dioscoridem. (Ht. Cliff.)

Crotoneae Blume cont.
croton. — Meisn. 1841. Gen. p. 339 (252). Subtrib.: Rottlereae, Eucrotoneae, Jatropheae. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 80. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. Gen. ut Endl. etc. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505. Gen. fere ut Endl. 1842.
Rchb. 1841. Nom. p. 194: subdiv. Euphorbiacear. Sect.: Mozinneae, *genuinae* (gen.: Crozophora, Crotonopsis, Chiropetalum, Caperonia, Julocroton, Croton, Ditaxis, Monotaxis, Argythamnia, Trigonostemon, Ryparia, Codiaeum, Ricinocarpus, Baloghia, Curcas, Jatropha, Elaeococca, Ostodes, Aleurites, Anda), Garcieae.
Zoll. 1846. Obs. phyt. II. p. 17 ex Hasskarl 1847. Flora II. p. 662: trib. Monosporear.

Crotonideae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 349: div. Euphorbiacear. uniovulatar. Gen.: Croton, Hendecandra, Brachystachys, Julocroton, Pilinophytum, Gymnamblosis, Crotonopsis, Eremocarpus, Klotzschiphytum, Codiaeum, Blachia, Synaspisma, Speranskia, Givotia, Sumbavia, Ostodes, Ceratophorus, Garcia, Baliospermum, Suregada, Elateriospermum, Melanolepis, Boutonia, Acidoton, Beyeria, Cleidion, Adriania, Redia, Trewia, Pycnocoma, Mabea, Conceveiba, Coelebogyne, Adelia, Axenfeldia, Cheilosa, Rottlera, Mappa, Macaranga.

Crotonineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XXIII. 79: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam.: Antidesmeae, Forestiereae, Euphorbiaceae.

Crotonopsis*) Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. Am. II. p. 185. t. 46: nov. g. Monoec. Pentandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 380. n. 1672. — Pers. 1807. Ench. II. p. 559. n. 2070. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 209.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 59: g. Euphorbiacear. — Par. A. Juss. 1824. Euphorb. p. 31.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5046: g. Ricinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 487.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Crozophorear.
Endl. 1840. Gen. n. 5826. p. 1117; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7383. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Meisn. 1841. Gen. p. 340 (253): g. Eucrotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 380: g. Crotonidear.
Synon. Leptemon Rafin. (Leptomon Steud.); Friesia Spreng.

Crotularia „Dill." Medic. (Vorles. II. p. 344) 1789. Phil. Bot. I. p. 206: sphalm. pro *Crotalaria*.

Crouania**) J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 83: nov. g. Gloiocladear. (Mesogloia attenuata Ag.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 36. n. 122/25. — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 372; 1849. ibid. X. p. 54.

Crouania J. Agardh cont.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): g. Cryptonemear.
Kütz. 1843. Phyc. gener. p. 373: sect. Callithamnii.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Gloiocladidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Ceramiacear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 225: g. Callithamniear.
= Callithamnii sp. Kütz.

Croum Gled. vid. *Ervum*.

Crowea*) Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 220.
Pers. 1805. Ench. I. p. 465. n. 1043: g. Decandr. Monogyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 366.
Hedw. 1806. Gen. p. 307. n. 1216: g. Rutacear.? — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 62. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 674; 1825. Syst. II. p. 322. n. 1583; 1830. Gen. I. p. 349. n. 1761. — Link 1821. En. I. p. 399. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1419.
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140; 1824. Pr. I. p. 720: g. Diosmear. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 181. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 481. — Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5169; 1837. Hdb. p. 282. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 792. — Meisn. 1837. Gen. p. 60 (44). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 83.
Bartl. 1830. Ord. p. 388: g. Boroniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 337. — Endl. 1840. Gen. n. 6007. p. 1155; 1841. Ench. p. 612. — Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7518. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.

Crozophora A. Juss. 1824. Euphorb. p. 27: g. Euphorbiacear. *Cf.* Ann. sc. nat. I. 1824. p. 153. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 146.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 850. n. 3110; 1831. Gen. II. p. 692. n. 3491: g. Tricoccar. (in Monoec. Pentandr.)
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5044; 1829 ap. Mössl. III. p. 1717; 1832. Fl. exc. p. 764: g. Ricinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 500.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Crozophorear.
Endl. 1840. Gen. n. 5829. p. 1117; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7382. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 581.
Meisn. 1841. Gen. p. 340 (253): g. Eucrotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 321: g. Jatrophidear.
= Chrozophora Neck.

Crozophoreae Rchb. 1837. Handb. p. 281: sect. Crotonear. Gen.: Griselinia; Mozinna, Aleurites; Anda; Ditaxis, Crozophora, Croton, Crotonopsis, Caperonia, Codiaeum, Ricinocarpus, Jatropha, Elaeococca; Garcia.

---

*) κρότων; ὄψις, facies.
**) Dicat. fratribus Crouan, phycologis.

*) Dicat. James Crowe, botanico angl.

Cruciales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 18: nixus Parietalium. Ordines: Cruciferae, Capparideae, Resedaceae.

Cruciana Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 166: sect. Asperulae. (Crucianella glomerata MB.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 23. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 461.

Crucianella Linn. 1737. Gen. p. 26. n. 69; 1737. Cliff. p. 32; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 27; 1753. Sp. I. p. 108; 1759. Syst. ed. X. p. 892. n. 118; 1762. Sp. ed. II. p. 157; 1764. Gen. ed. VI. p. 52. n. 126; 1767. Syst. ed. XII. p. 119: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 128; 1784. Syst. p. 151. — Reich. 1778. Gen. p. 54. n. 133. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 69. n. 163. — Lour. 1790. Coch. I. p. 79. — Gmel. 1791. Syst. p. 241. — Pers. 1797. Syst. p. 157; 1805. Ench. I. p. 129. n. 243. — Willd. 1797. Sp. I. p. 601. n. 186; 1809. En. p. 155. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 796. — Schult. 1827. Mant. III. p. 15.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 165. n. 672: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520. — Batsch 1802. Tab. p. 231. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 598. — Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1988; 1831. Fl. exc. p. 204; 1841. Nom. p. 74. n. 2749. — Bartl. 1830. Ord. p. 209. — DC. 1830. Pr. IV. p. 586. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 640. — Koch 1836. Syn. p. 328. Ed. II. p. 360. — Endl. 1838. Gen. n. 3102. p. 523; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (120). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 378. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 402.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 197; 1820. Mém. Mus. VI. p. 370. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 566. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 430. — DC. 1805. Franç. IV. p. 246. — Hedw. 1806. Gen. p. 65. 373. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 63. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 15. 286. n. 488. — Link 1821. En. I. p. 138; 1829. Hdb. I. p. 655. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 398. n. 391; 1830. Gen. I. p. 93. n. 462. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 474. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 168. (restrict.) — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 50.
Hill 1769. Ht. kew. p. 120: g. Monopetalar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 111. t. 24. f. 3 (angustifolia).
Neck. 1790. El. I. p. 197. n. 328: g. Phyllastrophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 60 in Pentandr. Monogyn.
Trin. 1818. Act. Petrop. t. 11. 12.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Astrophyllae.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 131: g. Asperulear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 48.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 771: g. Galiacear.
Synon. Laxmannia Gmel.

Cruciata Tourn. 1700. Inst. p. 115. t. 39: g. pl. class. I. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 4. Ed. Hall. 1745. p. 5.
Adans. 1763. Fam. II. p. 144: g. Aparinium.
DC. 1830. Pr. IV. p. 605: sect. Galii. — Par. Koch 1836. Syn. p. 329. Ed. II. p. 361. — Endl. 1838. Gen. n. 3100 *e*. p. 523; 1841. Ench. p. 271. — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2747. 1. — Walp. 1843. Rep. II. p. 456. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 163. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 415. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 16.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 207: subsect. Gallii.
Tausch 1835. Flora I. p. 339. 356: subsect. Eugalii.
C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 473: sect. Valantiae.
Synon. Valantiae sp. Linn.

Cruciata Gaudin 1828. Fl. Helv. II. p. 269: sect. Gentianae. (G. cruciata L.)
= Gentianae sect. Tretorrhiza Griseb.

Cruciatae Hall. 1768. Helvet. I. p. 192.
= Cruciferae Juss.

Cruciatae Batsch 1802. Tab. affin. p. 74: class. II. plantar. Ordines: Calycanthemae, Cheiranthemae, Capnanthemae.

Crucibulum Endl. 1836. Gen. n. 430 *C m a.* p. 38; 1841. Ench. p. 21: subsect. Helvellopsidis. (Octosporae sp. Hedw.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 3. *d. a.*

Crucibulum L. R. & Ch. Tulasne 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 89: nov. g. Nidulariacear. (Cyathus Crucibulum Pers.)
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 38; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Nidularieor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Nidulariaceor.

Cruciella „Leschen. mss." Endl. 1839. Gen. n. 4364 *b*. p. 764; 1841. Ench. p. 377; 1850. Spl. V. p. 1: sect. Leucolaenae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 385. — Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 290.
Synon. Leucolaena DC.

Cruciferae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 35 plantar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 409: fam. 52 plant. Sect.: Erucae, Lunariae, Thlaspi, Raphani.
Juss. 1789. Gen. p. 237: ordo 3 class. XIII. Gen. §. 1: Raphanus, Sinapis, Brassica, Turritis, Arabis, Hesperis, Heliophila, Cheiranthus, Erysimum, Sisymbrium, Cardamine, Dentaria, Ricotia. §. 2: Lunaria, Biscutella, Clypeola, Alyssum, Subularia, Draba, Cochlearia, Iberis, Thlaspi, Lepidium, Anastatica, Vella, Myagrum, Bunias, Crambe, Isatis. *Cf.* Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 474.
Vent 1799. Tabl. III. p. 96: ordo 7 class. XIII. Sect.: Erucaceae, Cheiranthoideae, Alyssoideae, Myagroideae.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 499. t. 70. Gen. ut Juss. 1789 et in §. 2: Coronopus, Psychine, Rapistrum, Erucago, Cakile, Pugionium.

Cruciferae B. Juss. cont.
DC. 1805. Franç. IV. p. 641: fam. (77) Dicotyledonum polypetalar. Gen.: Raphanus, Sinapis, etc. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 891. Typi sectionum: Cheiranthus, Iberis.
Juss. 1818. Dict. v. 12. p. 64: fam. Hypopetalear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 711: fam. 76 plant. Ordines: Siliquosae, Siliculosae.
DC. 1819. Théor. élém. p. 244; 1821. Mém. Mus. VII. p. 169; 1821. Syst. II. p. 139; 1824. Pr. I. p. 131: ordo (11) Thalamiflorar. Subordines: Pleurorhizeae, Notho-rhizeae, Orthoploceae, Spirolobeae, Diplecolobeae. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 146. Subord. ut DC. et Schizopetalieae. — Koch 1836. Syn. p. 33. Ed. II. p. 36. Subord.: Siliquosae, Latiseptae, Angustiseptae, Nucamentaceae, Lomentaceae. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 70. Trib.: Raphaneae; Brassiceae, Cheirantheae; Alyssineae, Calepineae, Buniadeae; Iberideae, Senebiereae; Cakilineae, Rapistreae.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 671: fam. Thalamiflorar. Divis.: Siliculosa, Siliquosa.
Agdh. 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 587: ordo Brevistylar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 845; 1831. Gen. II. p. 510. Divis.: Synclistae, Siliculosae, Siliquosae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV: fam. Amphispermar. Divis.: Lomentaceae, Siliculosae, Siliquosae, Capsulares et baccatae.
Bartl. 1830. Ord. p. 261: ordo (148) Rhoeadear. Divis.: Nucamentaceae et Lomentaceae, Siliculosae, Heliophileae, Siliquosae.
Link 1831. Hdb. II. p. 280: ordo 6 Allostemonum. Sect.: Raphanideae, Buniadeae, Lepidineae, Alyssineae, Siliquosae.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 309. Trib.: Arabideae, Sisymbrieae, Lepidieae, Brassiceae, Raphaneae.
Kunth 1834 in Abh. Berl. Ak. f. 1832. p. 33. Char. emend. ex floris et fructus formatione.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 58.
Meisn. 1837. Gen. p. 9 (10): ordo 12 plant. (p. 437 Rhoeadear.) Subord. ut DC.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 316: fam. (99) Rhoeadear. Divis.: Lomentosae, Siliquosae, Siliculosae, Carcerulosae.
Endl. 1839. Gen. p. 861; 1841. Ench. p. 447: ordo Rhoeadum. Subord. ut DC. *Cf.* A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 374.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 90: fam. Cruciferinear. Trib. Endlicherianae.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 244: fam. Dicotyledonear. Series ut Koch (exceptis Nucamentaceis).
Krause 1846. Bot. Zeit. p. 137.
Synon. Cruciatae Hall.; Tetradynamia Linn.; Siliquosae Linn.; Antiscorbuticae Crantz; Cruciformes Smel.; Cruciferae Dumort.

Cruciferae Dumort. 1823. Comm. bot. p. 64: fam. Thalamunguliae.
= Cruciferae Juss.

Cruciferineae Brongn. 1843. Enum. genr. p. xxv. 89: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam.: Resedaceae, Capparideae, Cruciferae.

Cruciflorae Rchb. 1828. Consp. p. 181; 1832. Fl. exc. p. 651. 653; 1837. Handb. p. 256; 1841. Nomencl. p. 178: formatio Thylachocarpicar. Fam.: Tetradynamae, Papaveraceae, Capparideae.

Cruciformes Linn. 1747. Class. plant. p. 341: nomen class. V. Tournefortianae. Gen.: Clypeola, Myagrum, etc.
Smelovsky 1805. Nov. Act. Ac. Petrop. XIV. p. 470: fam. plant. Divis.: Siliculosae, Siliquosae.

Crucigenia*) Morren 1830. Ann. sc. nat. XX. p. 404. t. 15: nov. g. Echinellae aff. *Cf.* Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 377.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phyc. gener. p. 163: g. Desmidiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Pediastrear.
= Staurogenia Kütz.

Crucigeniella Gaillon teste Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 377: nomen pro *Crucigenia Morr.* propositum.

Crucita Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 179; 1764. Gen. ed. VI. p. 65. n. 167: g. Tetrandr. Digyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 167. — Gmel. 1791. Syst. p. 281. — Pers. 1797. Syst. p. 172. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 33. n. 593.
Gled. 1764. Syst. p. 26. n. 102: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 346: g. Seminudar.
Juss. 1789. Gen. p. 85: g. Atriplicum. (B. Juss. in Ht. Trian.: g. Salsolar.)
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 202: g. Attriplicear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 493. n. 553; 1830. Gen. I. p. 115. n. 582: g. Chenopodear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4347. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 551.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.
Endl. 1837. Gen. p. 301; 1841. Ench. p. 185 Iresinae Kunth cum dubio inserit.
Meisn. 1841. Gen. p. 318 (231): g. Gomphrenear.
= Cruzeta Löfl.

Cruckshankia Steud. vid. *Cruckshanksia Hook. & Arn.*

Cruckshanksia Miers 1826. Trav. II. p. 529. Rchb. 1828. Consp. p. 212[a]. n. 1177[b] (*Cruikshankia*): g. Ferrariear.
= Solenomelus Miers.

Cruckshanksia Hook. 1831. Bot. Miscell. II. p. 211. t. 90: nov. g. Geraniacear.? (C. cistiflora.) *Cf.* Steud. Nomencl. I. p. 448 (*Cruickshanksia*).
= Ledocarpon Desfont.

Cruckshanksia**) Hook. & Arnott 1833. Bot. Miscell. III. p. 361: nov. g. Rubiacear.,

*) Vox hybrida.
**) Dicat. Cruckshanks, detectori plantae.

Cruckshanksia Hook. & Arnott cont. Spermacocae et Mitracarpo aff. (C. hymenodon.) — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 448 (*Cruckshankia*).

G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 631: g. Euspermacocear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3137. p. 530; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119). — Walp. 1843. Rep. II. p. 469.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377: g. Spermacocear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2786 (*Cruickshankia*).

Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 31. t. 236.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Synon. Rotheria Meyen.

Crudia Schreb. 1789. Gen. I. p. 282. n. 711: g. Decandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 674. — Willd. 1799. Sp. II. p. 539. n. 821.

Gis. 1792. Prael. p. 429: g. Lomentacear. (?) — Par. Batsch 1802. Tab. p. 98 (*Crudya*).

Pers. 1805. Ench. I. p. 462. n. 1029: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 357. n. 1678; 1830. Gen. I. p. 368. n. 1862. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1516.

= Crudyae DC. pars.

Crudia Rchb., Bartl. vid. *Crudya DC.*

Crudya Batsch vid. *Crudia Schreb.*

Crudya DC. 1825. Prodr. II. p. 519: g. Cassiear. dilatat. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 464. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (70).

Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4108 (*Crudia*): g. Ceratoniear.

Bartl. 1830. Ord. p. 415 (*Crudia*): g. Caesalpinear.

Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88: g. Caesalpiniear. (verar.) — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6802. p. 1319; 1841. Ench. p. 674. — Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6104. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 611.

Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Cynometrear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.

Synon. Crudia et Cyclas Schreb.; Apalatoa, Touchiroa, Vouarana et Parivoae sp. Aubl.; Touchiroa Rich.; Waldschmidtia Scop.

Cruickshankia Rchb. Nom. vid. *Cruckshanksia Hook. & Arn.*

Cruickshanksia Steud. Nom. vid. *Cruckshanksia Hook.* 1831.

Cruikshankia Rchb. vid. *Cruckshanksia Miers.*

Crumenaria*) Martius 1826. Nov. gen. et spec. II. p. 68. t. 160: nov. g. Rhamnear. (C. decumbens.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 112. — Par. Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 380. — Spreng. 1827. Cur. post. p. 51; 1830. Gen. I. p. 195. n. 990. (in Pentandr. Monogyn.) — Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 44. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 439. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 857.

Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3796: g. Gouaniacear.

Endl. 1840. Gen. n. 5748. p. 1103; 1841. Ench. p. 581: g. Gouaniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5572.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.

*) Crumena idem ac sacculus: ob formam coccorum.

Cruminium Desvaux 1826. Ann. sc. nat. IX. p. 423: nov. g. Phaseolear. (C. giganteum.) *Cf.* Linnaea II. p. 513. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3951; 1841. Nom. p. 150. n. 5851. (?) — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 157. — Meisn. 1837. Gen. p. 93 (66). — Endl. 1841. Gen. p. 1302; 1841. Ench. p. 672 (dubium). — Walp. 1842. Rep. I. p. 792. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 466: g. Leguminosar. minus notum.

Cruoria Fries 1835. Fl. scan. p. 316: nov. g. ex typo Chaetophorae pellitae Lyngb. *Cf.* Aresch. 1843. Linnaea XVII. p. 263 et Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 378.

Endl. 1843. Spl. III. p. 23. n. 79: g. Chordariear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 379.

Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 262; 1849. Sp. Alg. p. 533. n. 341: g. Chaetophorear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 124: g. Myrionemear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Chordaridar.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 94: g. Rivulariear.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 102: g. Euchaetophorear.

Synon. Chaetoderma Kütz.; Erythroclathrus Liebm.

Crupina*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 173. Ed. Hall. 1745. p. 185: g. pl. class. VIII (a Linnaeo Centaureae insertum).

Dill. 1719. Nov. gen. p. 139. t. 8: g. herbae capitatae.

Pers. 1807. Ench. II. p. 488: sect. Centaureae. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1537; 1831. Fl. exc. p. 212.

DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 157: g. Centaurear.

Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 377; 1818. v. 12. p. 67; 1826. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 239. 247; 1830. v. 60. p. 571: g. Centauriear. (1826 et 1827 Archetypar. verar.) — Par. Less. 1832. Syn. p. 7. — DC. 1837. Pr. VI. p. 565. — Koch 1837. Syn. p. 414. Ed. II. p. 476. — Endl. 1838. Gen. n. 2870. p. 472; 1841. Ench. p. 246. — Meisn. 1839. Gen. p. 226 (140). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3654. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 36. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 684. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 421.

*) „*cruppen*" Batavis proserpere.

Crupina Rupp. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2685: g. Centaureear.
Link 1829. Hdb. I. p. 702: g. Acarnacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 144: g. Centaureacear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 231: g. Cynarocephalar.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 126: g. Centaurinear.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 266: g. Crupinear.
Synon. Jacea Gaud.

Crupineae (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 200. 266: trib. Cynarocephalar. Gen.: Crupina, Serratula.

Crusea Chamisso mss. 1829.
= Mitracarpum Zucc.

Crusea*) Schlechtend. & Cham. 1830. Linnaea V. p. 165: nov. g. Spermacocear. (Spermacoce longiflora Kth.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377. — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2774. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49.
DC. 1830. Pr. IV. p. 566: g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 627. — Endl. 1838. Gen. n. 3125. p. 528; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 170 (119). — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 106.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 481: g. Rubiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Crusea A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 204. t. 19. f. 1: nov. g. Guettardacear. (C. glabra.)
= Sacconia Endl.

Crustaceae Scopoli 1777. Introd. p. 60: gens Incompletar. Gen.: Pulina, Lepra, Verrucaria.

Crustaceae Agardh 1821. Aphor. p. 91: div. Lichenum. Subdivis.: Leprosae, Rimatae, Pyrenulatae, Calicioideae, Scutellatae.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. Dermatophyllosporar. Sect.: Graphidea, Verrucarinea, Trypetheliacea.

Crustumia Dochnahl 1856. Obstk. II. p. 174: g. Pyror. (*Apothekerbirn*, *Bon Chrétien.*)

Cruzeta**) Löfling 1758. It. hispan. p. 203. n. 76.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 900. 1362. n. 1117: g. Tetrandr. Digyn.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 349: g. Gomphrenear.
Synon. Crucita et Cruzita Linn. et Auct.

Cruzita Linn. 1767. Syst. ed. XII. p. 129. n. 167: g. Tetrandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 139. — Reich. 1778. Gen. p. 68. n. 179. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 89. n. 224. — Willd. 1797. Sp. I. p. 700. n. 259. — Pers. 1805. Ench. I. p. 150. n. 330. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 484. n. 593.

Cruzita Linn. cont.
Neck. 1790. El. II. p. 200. n. 920: g. Syscllophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 172: g. Oleracear.
Hedw. 1806. Gen. p. 82. n. 381: g. Atriplicear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 76.
Agdh. 1825. Aphor. p. 215: g. Chenopodear.
= Cruzeta Löfl.

Crybe Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 446; 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1872: nov. g. Arethusear. (C. rosea.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1609. p. 219; 1841. Ench. p. 114. — Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2182. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 412.
Lindl. 1840. Orchid. p. 425: g. Euarethusear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 383 (287).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Pogonidar.

*Cryopsorae**)* Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 7: ordo Lichenum. Fam.: Verrucarieae, Graphideae, Limborieae.

Cryosophila „Blume" Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 139: g. Sabalidar.

Cryphaea**) Brid. 1822. Meth. musc. p. 139: g. Peristomor. pleurocarpor. *Cf.* Leman 1825. Dict. v. 35. p. 291 (*Occultine*) et Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 412.
Agdh. 1822. Aphor. p. 109: g. Muscor.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 249: g. Pleurocarpor. peristomor. (p. XLVI g. Brachypodum.)
Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 550: g. Fontinaloideor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Hypnoidear.
Endl. 1836. Gen. n. 589. p. 57; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 46: g. Maschalocarpear.
Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 967: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1844. Linnaea XVIII. p. 677: sect. Cryphaeae.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 82: g. Cryphaeacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 243. — Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 293. — Bruch & Schimp. .... Bryol. eur. V.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: g. Neckerear.
Wils. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 101: g. Pilotrichear.
= Eucryphaea Müll.

Cryphaea Hamilt. 1825. Edinb. journ. sc. II. p. 9.
= Chloranthus Swartz.

Cryphaea C. Müll. 1848. Linnaea XVIII. p. 677: g. Muscor. ampliat. Sect.: Cryphaea, Dendropogon.
C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 162: sect. Pilotrichi. Subsect.: Dichotomaria, Eucryphaea, Dendropogon.

*) Dicat. W. Cruse, prof. Regiomont.
**) Nomen hispanicum? a voce *cruz*.

*) *κρύος*, gelu, glacies.
**) *κρυφαῖος*, occultus.

Cryphaeaceae Hampe 1847. Linnaea XX. p. 82: fam. Clonocarpor. Gen.: Moritzia, Cryphaea.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 242: subdiv. Clonocarpor. Gen.: Cryphaea.
Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 293: trib. Pleurocarpor. Gen. id.
Bruch, Schimp. & Gümb. . . . . Bryol. eur. V: fam. Muscor. Gen. id.

Cryphaeadelphus C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 145: sect. Dichelymae.

Cryphia*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 508. Ed. Nees p. 364: nov. g. Labiatar. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 78. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 704. n. 2067; 1831. Gen. II. p. 468. n. 2303.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 442: g. Melissear.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2833: g. Salviear.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear
Benth. 1834. Labiat. p. 448; 1848 in DC. Pr. XII. p. 558: g. Prostantherear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 798. — Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 107. n. 4171. — Endl. 1838. Gen. n. 3629. p. 621; 1841. Ench. p. 307. — Meisn. 1840. Gen. p. 286 (194). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 165. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 354. 426. — Walp. 1845. Rep. III. p. 764. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 413.

Cryphiacanthus Nees 1841. Ind. sem. h. Vratisl.; 1842. Linnaea XVI. p. 298; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 48; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 197: nov. g. Ruelliear. (Ruellia clandestina L.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 106. n. 4058/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 367.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar.

Cryphiantha**) Ecklon & Zeyh. 1836. Enum. pl. Afr. austr. II. p. 171: nov. g. Genistear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 84 (60).
= Amphithalea Eckl. & Zeyh.

Cryphiospermum Palis. 1805. Fl. Owar. II. p. 24. t. 74: nov. g. Cichoracear. *Cf.* R. Brown 1816. Linn. Trans. XII. p. 104 (Verm. bot. Schr. II. p. 542), ubi Meyerae, et Cassini 1818. Dict. v. 12. p. 78, ubi Enydrae synonymum habetur.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 154: g. Ecliptar.
Less. 1832. Syn. p. 210: g. Siegesbeckiear.
DC. 1836. Pr. V. p. 497: g. Eclipter. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2453. p. 398; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3103. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 413.
Synon. Wahlenbergia Schum.; Meyerae sp. Br.; Caesuliae sp. Willd.

Cryphium Palis. mss.
= Calymperes Swartz. (Leman 1818. Dict. v. 12. p. 80.)

*) κρύφιος, latens.
**) „κρύφιος et ἄνθη, propter flores foliis obtectos."

Crypsantha Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 52: novum nomen pro *Hedwigia Brid.* (H. ciliata) propositum. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 12. p. 80.

Crypsinus*) Presl 1850. Epimel. bot. p. 483 (125): nov. g. Polypodiear. (Drynaria neglecta Sm.)
Fée 1852. Gen. Fil. p. 264: sect. Craspedariae.

Crypsis Aiton 1789. Hort. kew. I. p. 48: nov. g. Graminum. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 136. — Host 1801. Gram. Austr. I. p. 24. t. 31. — Hedw. 1806. Gen. p. 21. n. 94. — Link 1821. En. I. p. 67. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 75.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 785. n. 1710: g. Diandr. Digyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 158. n. 73.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 96: g. Graminear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 156. — DC. 1805. Franç. III. p. 3. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 72. — Palis. 1812. Agrost. p. 22. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 16. 375. n. 231. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 80. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 264. n. 269; 1830. Gen. I. p. 56. n. 274. — Link 1829. Hdb. I. p. 28.
Pers. 1805. Ench. I. p. 79. n. 152: g. Triandr. Digyn. — Par. Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 167. — Willd. 1809. En. p. 85. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 49. — Trin. 1820. Fund. p. 114. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 474.
Panz. 1814. Denkschr. Ak. Münch. f. 1813. p. 273.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 140; 1822. Syn. I. p. 207: g. Agrostidear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 150. — Agdh. 1823. Aphor. p. 148.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 672): g. Vilfaceor.
Link 1827. Hort. I. p. 69: g. Phalaridear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 943 (sect.: Heleochloa, Antitragus); 1841. Nom. p. 36. n. 1227 (sect.: Crypsis, Heleochloa). — Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Kunth 1830. Gram. p. 14; 1833. Agrost. p. 21. — Endl. 1836. Gen. n. 715. p. 80; 1841. Ench. p. 56. Sect. ut Rchb. 1828. — Meisn. 1843. Gen. p. 415 (318). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 467; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 459. Sect. ut Endl. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 24. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 413. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 444.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 30: g. Oryzear.
Koch 1837. Syn. p. 796. Ed. II. p. 897: g. Alopecuroidear. — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 385.
Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 27: g. Phleinear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 131. 234: g. Phalaroidear.
Trin. 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845) Bot. p. 115: g. Vilfeor.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 7: g. Phleoidear.

*) κρυφῖνος, occultus.

Crypsis Ait. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Bromear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 151: g. Vilfear.
Synon. Pallasia Scop.; Antitragus Gärtn.; Heleochloa Host; Pechea Pourr. (Steud.)

Crypsocalyx A. Rich. Fl. Seneg. IV. p. 157 teste Endl. 1834 in R. Brown Verm. bot. Schr. V. p. 390 adnot.: g. a Crotalaria sejunctum.
= Cyrtolobus R. Brown?

Crypta Nuttall 1817. Journ. Ac. Philad. I. p. 117: nov. g. Portulacear., Montiae aff. (C. minima.) *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 163. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 304. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 222. (?)
Nutt. 1818. Gen. II in Add.: g. Diandr. Monogyn.
Schult. 1822. Mant. p. 70. 232: g. Diandr. Trigyn.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 124. n. 137: g. Diandr. Digyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4306: g. Talinear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 32. n. 142: g. Salicariar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 124.
Rchb. 1837. Hdb. p. 248; 1841. Nom. p. 172. n. 6630: g. Elatinear.
Endl. 1840. Gen. n. 5475 *a*. p. 1036; 1841. Ench. p. 541: sect. Elatines. — Par. Seubert 1842 in Walp. Rep. I. p. 283; 1844. Verh. nat. Ver. Rheinl.; 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 41.
Synon. Cryptina Rafin.

Cryptacantha*) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phycol. gener. p. 358; 1845. Phycol. germ. p. 281; 1849. Spec. Alg. p. 601: sect. Cystosirae.

Cryptadenia Meisn. 1840. Linnaea XIV. p. 404: nov. g. Thymelaear. (Passerina grandiflora L.)
Meisn. 1841. Gen. p. 330 (242); 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 573: g. Gnidiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2442: g. Daphnoidear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 36. n. 2095/1.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 63. n. 2101: g. Stellerear.
Synon. Calysericos Eckl. & Zeyh. pt.

Cryptadia**) Lindl. . . . . in Chesn. It. (Herb. Chesney nr. 201.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 2444/1. p. 1381; 1841. Ench. p. 236: g. Buphthalmear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3385. — Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955 (*Cryptodia*): g. Cervanear.

Cryptandra Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 217: nov. g. Pentandr. Monogyn. (C. ericifolia.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 250. n. 572. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. xxviii. 372. n. 725.

*) κρυπτός, occultus.
**) κρυπτάδιος, occultus.

Cryptandra Smith cont.
Hedw. 1806. Gen. p. 108: g. Rhododendracear.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 82: g. Rhodoraceis aff.?
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 509: g. Rhododendrear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 623. n. 661: g. Ericear.?
DC. 1825. Pr. II. p. 38: g. Rhamnear. — Par. Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 372. — Bartl. 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 39. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 465. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 625. — Steud. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 186. — Reissek 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 285. Subgen.: Eucryptandra, Solenandra, Corisandra. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 268. Subgen. ead.
Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3802: g. Ceanothear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 132. n. 658: g. Ericeis aff.
Endl. 1840. Gen. n. 5742. p. 1101; 1841. Ench. p. 581: g. Phylicear. Sect. (1850. Spl. V. p. 85) ut Reiss. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5582. — Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 195. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 414.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.

Cryptangium „Schrad. mss." Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 163: nov. g. Scleriear. *Cf.* Steud. 1855. Glum. II. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119 (*Cryptanguina*): g. Sclerear.
= Scleriae Berg. pars.

Cryptangium C. Müll. 1843. Linnaea XVII. p. 599: nov. g. Hydropogonear. (Fontinalis gymnostoma Br. & Sch.) *Cf.* Müll. in Bot. Zeit. 1844. p. 761 et Syn. Musc. II. p. 152, ubi ad Pilotrichi sectionem Fontinalem reducitur. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 81: g. Ripariacear.

Cryptanguina Lindl. vid. *Cryptangium Schrad.*

Cryptantha Lehm. 1832. Sem. hort. Hamb.: nov. g. ab Endl. (Spl. I. p. 1403) cum dubio inter synonyma Pectocaryae citatum.
Fisch. & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petrop. p. 35.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 373: g. Boraginear.
A. DC. 1846. Pr. X. p. 129: sect. Eritrichii.

Cryptanthera A. DC. 1846. Prodr. X. p. 29: sect. Nonneae. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 109. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 631.

Cryptanthus Klotzsch 1836 in Otto & Dietr. Gartenz. IV. Nr. 38. p. 297: nov. g. Bromeliacear. (Tillandsia acaulis Lindl.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1303/1. p. 1361; 1841. Ench. p. 106. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 148. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 414.

Cryptanthus Klotzsch cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1634: g. Anassear.
Meisn. 1842. Gen. p. 395 (298): g. Bromeliear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 399.
Beer 1857. Bromel. p. 18. 75: g. Nidulariar.
Synon. Pholidophyllum Vis.; Madvigia Liebm.

Cryptanthus Nuttall olim.
= Aphanisma Nutt.

Cryptarachne*) Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 189: sect. Chrysymeniae.

Cryptarrhena R. Brown 1816. Bot. Regist. II. n. 153 (Verm. bot. Schr. II. p. 417): nov. g. Orchidear. (C. lunata.) *Cf.* Spreng. n. Entd. I. p. 328. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 741. n. 3030; 1831. Gen. II. p. 674. n. 3408.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 195: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1498; 1841. Nom. p. 54. n. 2063. — Endl. 1837. Gen. n. 1458. p. 203; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 414.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Notylidar.
Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 765. Char. emend.

Crypterhonia Hassk. vid. *Crypteronia Blume.*

Crypterisma Planchon 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 92 (*Cripterisma*, corr. in tab.) 201: sect. Droserae. (D. hilaris Cham. & Schl.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 71.

Crypteronia**) Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1151: nov. g. Rhamnear., Alzateae Rz. & Pav. proximum. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50)? — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 232 (*Crypterhonia*).
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 11: g. Euonymear.
Meisn. 1837. Gen. p. 69 (49): g. Evonymear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5756. p. 1104; 1841. Ench. p. 582: g. Rhamneis aff. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5614.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnaceár.?
Endl. 1847. Spl. IV. p. 38. n. 1905: g. Crypteroniear.
Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 123: g. Lythrariaccar.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 692: g. Lagerströmiear.
Synon. Henslowia Wall.; Quilamum Blanco. (Endl. 1847.)

Crypteronieae Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 38: g. fam. Salicineis aff. Gen.: Crypteronia.

Cryptina Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 96: g. Cryptinear.
= Crypta Nutt.

Cryptineae Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 96: fam. Dicotylear. Gen.: Cryptina, Claytonia, Leptrina.

Cryptocalyx Benth. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 446; 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 52: nov. g. Verbenear. (C. nepetaefolia.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4181. (genuinar.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 3683/1. p. 1401; 1841. Ench. p. 312: g. Lippiear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 336. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 57.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664: g. Verbenacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 415.
= Lippia Linn. (Schauer in DC. Pr. XI. p. 572.)

Cryptocarpa Juss., Nees (1833 ex Flora Litt. IV. p. 111) vid. *Cryptocarya R. Brown.*

Cryptocarpa „Kunth" Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3842: g. Bursercar.?
= . . . . ?

Cryptocarpeae „Aresch." Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 126: div. Floridear. Gen.: Chondrus, Polyides, Furcellaria, Iridaea, Dumontia, Helminthora; Gloeosiphonia.
Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 306: fam. Floridear. Gen. ead. et Hildenbrandtia.

Cryptocarpha „R. Brown 1817. Linn. Trans. XII. p. 301" Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 34; 1818. Dict. v. 12. p. 84: g. Boopidear.
= Acicarpha Juss.

Cryptocarpon Dozy & Molkenb. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 302; 1845. Musc. Archip. Ind. p. 37. t. 15: nov. g. Muscor., Macromitrio aff. (C. apiculatum.)
C. Müll. 1845. Bot. Zeit. p. 544: sect. Macromitrii.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: g. Neckerear.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 718 (*Cryptocarpus*): g. Orthotrichear.

Cryptocarpum Dunal 1816. Synops. Solan. p. 45: sect. Solani. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 656. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 438. — Walp. 1845. Rep. III. p. 90.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 325: sect. Asterotrichoti.

Cryptocarpus HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 187. t. 123. 124: nov. g. Chenopodear. (C. globosus et pyriformis.) *Cf.* Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 415. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 473. — Agdh. 1825. Aphor. p. 216. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 452. n. 481; 1830. Gen. I. p. 109. n. 549. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 541.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 83: g. Atriplicear.
Schult. 1827. Mant. III. p. 16. 308: g. Tetrandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4393; 1837. Hdb. p. 239: g. Rivinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 299: g. Phytolac-

*) ἀράχνη, aranea.
**) ῥόνος teste Hasskarl. Quid?

Cryptocarpus HBK. cont.
cear.? — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 241.
Endl. 1837. Gen. n. 1936. p. 297; 1841. Ench. p. 182: g. Kochiear.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. mon. p. 8: g. Anserinear.
Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233): g. Camphorosmear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6390: g. Betear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiaceae.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 88: g. Chenopodieis aff.

Cryptocarpus C. Müll. vid. *Cryptocarpon Dozy & Molk.*

Cryptocarya R. Brown 1810. Prodr. I. p. 402. Ed. Nees p. 258: nov. g. Laurinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 340; 1825. Syst. II. p. 270. n. 1524; 1830. Gen. I. p. 327. n. 1665. (Enneandr. Monogyn.) — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 167. — Kunth 1822. Syn. I. p. 459. — Agdh. 1825. Aphor. p. 227.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 87: g. Laurinear. — Par. Juss. 1822. Dict. v. 25. p. 349 (*Cryptocarpa*). — Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 556. — Bartl. 1830. Ord. p. 112.
Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1911: g. Laurear.
Nees 1831 in Wall. Pl. As. rar. II. p. 61; 1833. Progr. p. . . .: g. Cryptocaryar.
Nees 1836. Laurin. p. 205: g. Cryptocaryear. Sect.: genuinae, Gymnocarya, Peumus. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 2036. p. 318; 1841. Ench. p. 197. Sect. eaed. (Eucryptocarya.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1331. 1342. — Meisn. 1841. Gen. p. 325 (238). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 470. — Rchb. 1841. Nom. p. 71. n. 2674. Sect. ut Nees. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 415. — Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. 21. p. 334. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 920.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauraceae.

Cryptocaryae Nees 1833. Progr. p. . . .: div. Laurear. Gen.: Endiandra, Beilschmiedia, Cecidodaphne, Cryptocarya, Agathophyllum, Mespilodaphne.

Cryptocaryeae Nees 1836. Laurin. p. 21. 191: trib. Laurinar. Gen. Cryptocaryar. Nees et Caryodaphne.
Endl. 1837. Gen. p. 318; 1841. Ench. p. 197: trib. Laurinear. Gen. ead. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 470. Gen. ead.
Meisn. 1841. Gen. p. 325 (238): trib. Laurear. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 71: subdiv. Laurear. Gen. ead.

Cryptocaula Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 203: subg. Gesnerae. (G. tuberosa Mart.)

Cryptocephala Wallroth vid. *Lichenastra Wallr.*

Cryptoceras Schott 1854. Oestr. bot. Woch. p. 121: nov. g. Corydalidear. (Corydalis verticillaris et oppositifolia DC.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 190.

Cryptochaete Benth. 1845. Pl. Hartweg. II. p. 209: sect. Microchaetes. (Senecio teretifolia DC. etc.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 325.

Cryptochilidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 181: sect. Vandear. Gen.: Cryptochilus, Acanthophippium, Anthogonium? *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 170.

Cryptochilos Spreng. vid. *seq.*

Cryptochilus Wallich 1822. Tent. fl. Nepal. p. 36. t. 26: nov. g. Orchidear. *Cf.* Linnaea II. p. 539. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1584 (loci incerti). — Spreng. 1831. Gen. II. p. 676. n. 3415 (*Cryptochilos*).
Lindl. 1833. Orchid. p. 193: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 202. n. 1450. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 417.
Lindl. 1838. Bot. Regist. t. 23: g. Epidendrear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1389/2. p. 1362; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1988. — Meisn. 1842. Gen. p. 373 (280).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Cryptochilidar.

Cryptoclynei Léveillé 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 66: fam. Stromatosporor. Gen.: Vermicularia.

Cryptococceae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 82; 1843. Phycol. gener. p. 147; 1845. Phycol. germ. p. 118; 1849. Sp. Alg. p. 145: fam. Mycophycear. Gen.: Cryptococcus, Ulvina, Sphaerotilus. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 72. Gen.: Cryptococcus.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 2: div. Algar. imperfectar. Gen.: Cryptococcus, Ulvina.
Math. 1853. Belg. II. p. 532: trib. 29 Algar. Gen. ut Rabenh.

Cryptococcus Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 365 (Alg. aq. dulc. dec. III): nov. g. Algar. (C. mollis.) *Cf.* Flora 1833. p. 696 et Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 361.
Menegh. 1838. Cenni p. 25: g. Protococcoidear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52.
Rchb. 1841. Nom. p. 17. n. 571: g. Protococcinar.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92): g. Palmellear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 82; 1843. Phyc. gener. p. 147; 1845. Phyc. germ. p. 119; 1849. Sp. Alg. p. 105. n. 102: g. Cryptococcear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 72. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 2. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 417. — Math. 1853. Belg. II. p. 533.
Synon. Torula Turp.

Cryptocorine A. Rich. vid. *seq.*

Cryptocoryne „Fischer" Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 767: g. Callear. (Nomen) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 67.

Cryptocoryne Fischer cont.
Wydler 1830. Linnaea V. p. 428: g. Ambrosiniae aff. (Ambrosinia ciliata Roxb.?)
Schott 1832. Melet. p. 16: g. Ambrosiniear. — Par. A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 146 (*Cryptocorine*).
Blume 1835. Rumphia I. p. 83. t. 36: g. Cryptocorynear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1671. p. 234; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 12. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1081. — Meisn. 1842. Gen. p 362 (271). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 37. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 417. — Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 191.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 1: g. Cryptoryninar.
Cryptocoryneae (Leprieur 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 84) Blume 1835. Rumphia I. p. 83: trib. Aracear. Gen.: Cryptocoryne, Stylochaeton. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 234; 1841. Ench. p. 128. Gen. ead. — Meisn. 1842. Gen. p. 362 (271). Gen. ead. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129. Gen. ead.
Kunth 1841. Enum. III. p. 11: trib. Aroidear. verar. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 32: subdiv. Aracear. Gen. ead.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 36: trib. Callacear. Gen. ead.
Cryptocoryninae Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 1: subtrib. Alleluchiear. Gen.: Cryptocoryne, Lagenandra.
Cryptocotyledoneae Agardh 1821. Aphor. p. 73; 1822. ibid. p. 121; 1825. Cl. pl.; 1826. Isis. p. 584: regio III plant. Classes: Macropodae, Spadicinae, Glumiflorae, Liliiflorae, Gynandrae.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: subdiv. Orthophytor. Classes: Macropodae, Glumiflorae, Gynandrae, Liliflorae, Spadiceae.
= Amphibrya Endl.
Cryptodia Schultz Bip. vid. *Cryptadia Lindl.*
Cryptodiscus Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 37. t. 15. f. 129; 1842. ibid. V. p. 36; 1842. Anl. Mycol. p. 151: nov. g. Patellariacear. (C. pallidus et atrovirens.)
Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 284: g. Tympanideor. (p. 11. n. 440 g. Cupulator.)
Rabenh. 1844. Krypt. I p. 332: sect. Stictidis, ab Eod. (Bot. Zeit. 1851. p. 454) a Stictide iterum separata.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Lev. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g Sticteor.
Bail 1858. Syst. p. 62. t. 19: g. Patellariaceor.?
Cryptodiscus Schrenck 1841. Enum. pl. nov. p. 65: nov. g. Coriandrear. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 381. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 106. n. 4517/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 359. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 366. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 80.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Coriandridar.
Bunge 1851. Ac. Pet. Mem. sav. étr. VII. p. 314: g. Smyrnear., Cachrydi proximum.

Cryptodon R. Brown 1824 in Parry's voy. App. XI. p. cccIII (Verm. bot. Schr. I. p. 450): nov. g. Muscor.? (Splachnum paradoxum.)
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Splachnoidear.
= Tetraplodon Bruch & Schimp.
Cryptodracon Benth. 1834. Labiat. p. 495: sect. Dracocephali. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 812. — Endl. 1838. Gen. n. 3638 c. p. 623; 1841. Ench. p. 308. — Walp. 1845. Rep. III. p. 795.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 400: subsect. Boguldeae.
Cryptogama Batsch 1802. Tab. affin. p. 256: class. VIII. plant. Ordines: Chlorophylla, Glaucophylla, Aphylla.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 15: div. Vegetabilium. Classes: Stachyocarpa, Maschalocarpa, Hypophyllocarpa, Rhizocarpa, Mitrocarpa, Eccalyptrocarpa, Ascidiocarpa, Aspidocarpa, Angiocarpa, Hypepidermidocarpa, Engastriocarpa, Hymenocarpa, Eleutherocarpa.
Cryptogamae (*Les Cryptogames*) De la Marck 1785. Act. Ac. Paris. p. 447: class. VI. plant. Familiae: Filices, Algae, Fungi, Musci.
Bernh. 1800 in Schrad. Journ. II. p. 134. Ordines: Periaedocatae, Filices, Musci.
Willd. 1802. Bem. Farrenkr. Ordines: Stachyopterides, Filices, Hydropterides, Musci, Hepaticae, Algae, Fungi, Gasteromyci.
Mass. 1818. Dict. v. 12. p. 91. Divis: Salviniceae, Equisetaceae, Musci, Hepaticae, Lycopodiaceae, Filices, Algae, Lichenes, Hypoxyleae, Fungi.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. L. Classes: Fungi, Lichenes, Chlorophyta.
Brongn. 1843. En. genr. p. XI. 1: div. I. plant. Ramificationes: Amphigenae, Acrogenae.
Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 418. Divis.: vasculares, cellulares.
Cryptogamae vasculares Metten. 1856. Fil. hort. Lips. p. 12. Fam.: Filices, Equisetaceae, Lycopodiaceae, Selaginelleae, Rhizocarpeae.
Cryptogamae vasculariae Meyer 1836. Chlor. hann. p. 660. Cohortes: Pseudocarpicae, Conosporae, Lepidosporae, Epiphyllosporae, Rhizosporae.
Cryptogamia Linn. 1737. Gen. et in operibus sequentibus: class. XXIV. plant. Ordines: Filices, Musci, Algae, Fungi. — Par. Wigg. 1780. Holsat. p. 73. Ord.: Filices, Epiphyllospermae, Rhizospermae, Julospermae, Metaxillares, Musci, Coleofissae, Sphaerospermae, Aspidoferae, Aspermae. Appendix: Fungoideae. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 747. Ordines Linnaeani et Miscellaneae, Hepaticae. — Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. Am. II. p. 261. Ord.: Filices, Hepaticae, Equisetaceae, Lycopodaceae, Musci, Lichenaceae. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 8; 1831. Gen. II. p. 715. Sectiones: 1. Rhizantheae, Rhizospermeae, Equiseteae, Lycopodeae, Ophioglosseae, Poropterides, Osmundeae,

Cryptogamia Linn. cont. Gleichenieae, Filices verae, Filices desciscentes. 2. Musci frondosi et hepatici. 3. Lichenes. 4. Algae. 5. Mycetes.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 328: class. XX. plant. Ord. Linnaeani.
Hoffm. 1795. Bot. Taschenb. p. 1. Ord.: Radicalia, Peltata, Annulata, Bivalvia, Calyptrata, Ecalyptrata, Scutellata.
Willd. 1804 in Rebent. Neom. p. IX. Ord.: Gonopterides, Stachyopterides, Filices, Hydropterides, Musci, Hepaticae, Homallophyllae, Algae, Lichenes, Xylomyci, Fungi, Gasteromyci, Byssi. (Willd. Grundr. ed. Link 1831. p. 235. Ord. iid. et Poropterides, Schismatopterides.)
Stackh. 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 52. Ord.: Filices, Musci, Lichenes, Fuci, Confervae, Fungi, Hypoxyla.
Mart. 1817. Erlang. p. 1. Ord.: Gonopterides, Epiphyllospermae, Rhizopterides, Stachyopterides, Musci, Hepaticae, Homalophyllae, Lichenes, Algae, Coniomycetes, Hyphomycetes, Gastromycetes. Fungi.
Synon. Cryptostemonis Gled.; Cryptostemon Mönch; Aetheogamia Palis.; Exembryonatae Rich.; Vegetabilia Agama Wallr.

Cryptogenis Rich mss. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 52. p. 521.
= Ceratopteris Brongn.

Cryptoglochin Heuffel 1844. Flora II. p. 528: nov. g. Caricinear. (Carex curvula All.)

Cryptoglottis Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 296: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1833. Orchid. p. 230: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 205. n. 1484. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2089. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 431.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1369/$_3$. p. 1362; 1841. Ench. p. 110: g. Dendrobiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1962. — Meisn. 1842. Gen. p. 370 (278).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Cryptogramma R. Brown 1823. App. to Frankl. voy. p. 767 (Verm. bot. Schr. I. p. 548): nov. g. Filicum. (Osmunda crispa L.) *Cf.* Brongn. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 431.
Endl. 1841. Spl. I. n. 608. p. 1346; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. — Par. Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 43.
Rupr. 1845. Beitr. z. Pfl. russ. R. Lief. III: g. Filicacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 312: g. Polypodiacear.
Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 525: sect. Allosuri.
Hook. 1858. Sp. Fil. p. 126 (*Cryptogramme*): g. Pteridear.
Synon. Riedlea Mirb.; Phorolobus Desv.; Allosorus Koch; Allosori sp. Bernh.; Pteridis, Onocleae, Struthiopteridis, Acrostichi, Blechni sp. Auct.

Cryptogramma „Grev." Desvaux 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 336: g. Filicum. (C. acrostichoides Grev. & Br.)
= Ceratopteris Brongn.

Cryptogramme Hook. vid. *Cryptogramma R. Brown.*

Cryptogyne Cassini 1827. Dict. v. 50. p. 491. 498; 1830. v. 60. p. 578: nov. g. Cotulear. (C. absinthioides.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 147: sect. Eriocephali. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2710 *b.* p. 441; 1841. Ench. p. 242. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3464. 2.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 23: g. Chrysanthemear.
Synon. Microgyne, Brachygyne, Solenogyne, Siphonogyne, Stenogyne Cass.

Cryptolappa A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 254; 1843. Arch. Mus. III. p. 600: sect. Camareae. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 83. n. 5561 *a.* — Walp. 1846. Rep. V. p. 349. — Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 106.

Cryptolepis R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 69 (Verm. bot. Schr. II. p. 405): nov. g. Apocynear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXIV. 409. n. 743. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 146. n. 728.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 636. n. 687: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 653.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3523; 1841. Nom. p. 134. n. 5164: g. Echitear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Endl. 1838. Gen. n. 3424. p. 585; 1841. Ench. p. 295. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. — Meisn. 1840. Gen. p. 265 (173). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 52. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 474.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 82: g. Echitiear.
Falc. 1842. Ann. and Mag. n. h. VIII. p. 448; 1842. Linn. Trans. XIX. p. 53: g. Periplocear. Char. emend. — Par. Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. p. 146. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 466.
Synon. Cudicia Hamilt.?; Leposma Blume; Lepistoma Blume.

Cryptolobus*) Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 760; 1826. Syst. III. p. 218. n. 2528; 1831. Gen. II. p. 577. n. 2823: g. Leguminosar. (Glycine subterranea L.)
= Voandzeia Pet.-Thouars.

Cryptolobus „Wallich" Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 302: g. Apocynacear., Endlichero, Meisnero etc. ignotum. *Cf.* Steud. 1840. Nom. I. p. 450.
Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5225: g. Carissear.?

Cryptoloma Hanstein 1858. Linnaea XXIX. p. 506. 578: nov. g. Brachylomatear. (Brachylomatis sp. Hanst. olim.)

Cryptomeria D. Don 1839. Linn. Trans. XVIII. 2. p. 166; 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XII. p. 231: nov. g. Cupressinear.

*) λοβός, legumen.

Cryptomeria D. Don cont.
(Cupressus japonica Thunb.) *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 37, — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1372. n. $1794/_1$; 1841. Ench. p. 139. n. $1790/_1$. — Rchb. 1841. Nom. p. 62. n. 3270. — Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 353. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 432.
Sieb. & Zuccar. .... Fl. japon. II. p. 41. t. 124.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Cupressear.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 71; 1847. Gen. Spl. IV. p. 4. n. 1802: g. Taxodinear.

Cryptomerites Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 123: nov. g. Cupressinear. foss. (Cupressites Ullmanni Bronn.)

Cryptomyces Greville 1826. Scot. t. 206.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 764. n. 3906: g. Pileator.
Corda 1842. Mycol. p. 191: g. Pyronemear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 372: g. Sticteor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Agyricor.
= Rhytisma Fries?

Cryptomycetes Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 52: ordo 2 Fungor. Fam.: Aecidiacei, Naemasporei, Ascosporei.

Cryptonema Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 1. p. 590: nov. g. Burmanniacear. (C. malaccensis.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 715. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 608.
= Nephrocoelium Turcz.

Cryptonemeae J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 81: trib. Floridear. Subtrib.: Gloiocladeae, Nemostomeae, Spongiocarpeae, Gasterocarpeae, Coccocarpeae. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 433. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 36. Subtrib. eaed. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53. Sect. similes.
Dcne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): ordo Choristosporear. Gen.: Crouania, Dudresnaya, Gloiocladia, Naccaria, Gloiosiphonia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: subordo Ceramiacear. Trib.: Gloiocladidae, Nemastomidae, Spongiocarpidae, Gasterocarpidae, Coccocarpidae, Ctenodontidae.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 144: sect. Ceramiacear. Subsect.: Gloiocladeae, Nemastomeae, Spongiocarpeae, Halymenieae, Coccocarpeae.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 160: subordo Cryptonemiacear. Tribus: Gastrocarpeae, Nemastomeae.

Cryptonemia J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 100: nov. g. Coccocarpear. (Sphaerococcus Lactuca Ag.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 41. n. $122/_{15}$. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Coccocarpidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst.: g. Chondrear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 181: g. Gastrocarpear.
= Euhymeniae Kütz. pars.

Cryptonemiaceae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 156: ordo Gongylospermear. Subordines: Gigartineae, Cryptonemeae.

Cryptopetalon Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 12; 1818. Dict. v. 12. p. 123; 1825. v. 28. p. 203: nov. g. Tagetinear., Kleiniae aff. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 62; 1830. v. 60. p. 574: g. Pectidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2350: g. Tagetear.
Synon. Cryptopetalum DC.

Cryptopetalum Hook. & Arn. 1833. Bot. Miscell. III. p. 344: nov. g. Saxifragear.? (C. pusillum.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 232.
= Lepuropetalum Ell.

Cryptopetalum DC. 1836. Prodr. V. p. 101: sect. Lorenteae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2251 *a*. p. 365; 1841. Ench. p. 233. — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3229. 1. — Gardn. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 239.
= Cryptopetalon Cass.

Cryptophragmium Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 100: nov. g. Aphelandrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4078. p. 704; 1841. Ench. p. 343. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204). — Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4270.
Rchb. 1837. Hdb. p. 190: g. Ruelliariar.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 66: g. Acanthacear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 63: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Justiciadar.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 94: g. Hygrophilear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 780.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 434: g. Justiciear.

Cryptophyllum „Gardn." Bot. Zeit. 1843. p. 316: vid. *Coptophyllum Gardn.*

Cryptophyta Link 1824. Spec. I. p. II: class. Cryptogamar., Fungos, Algas et Lichenes complectens.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 145. Ordines: Fungi, Lichenes, Algae.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 1: class. I. Vegetabilium.
= Thallophyta Endl.

Cryptopleura Nuttall 1841. Amer. phil. Trans. n. ser. VII. p. 431: nov. g. Lactucear. (C. californica.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 50. n. $3018/_2$. — Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 493: sect. Macrorhynchi. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 696.

Cryptopleura Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phycol. gener. p. 444; 1845. Phycol. germ. p. 333; 1849. Sp. Alg. p. 870. n. 571: nov. g. Delesseriear. — Par. Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 194.

Cryptopleura Kütz. cont.
Nägeli 1847. Alg. Syst.: g. Chondrear.
Synon. Delesseriae, Nitophylli, Dawsoniae, Chondri, Halyoneniae, Fuci, Wormskioldiae sp. Auct.

Cryptopodia Röhl. 1813. Deutschl. Fl. III. p. 82: sect. Neckerae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 567 *b* (*Cyrtopodia*).
Fürnr. 1827. Flora II. Beil. p. 81; 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Hypnoidear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 87.
= Euneckerae Müll. pars.

Cryptopodium Brid. 1827. Bryol. II. p. 30: g. Acrocarpor. peristomor. (Bryum bartramioides Hook.)
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: g. Bartramiis aff. (*Synon. Cryptoseta Hook. mss.*)
Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 657: g. Conostomeor.
Mont. 1842 in Orb. Dict. II. p. 481; 1849. ibid. IV. p. 435; 1849. ibid. VIII. p. 400: g. Bartramiear.
Wils. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 88: g. Bartramiacear.
= Eubartramiae Müll. spec.

Cryptopteron Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 252: sect. Pteroneuri. (Pt. carnosum DC.)

Cryptopus Lindl. 1824. Bot. Regist. X. n. 817: nov. g. Orchidear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 718. n. 2982.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 244: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1510; 1841. Nom. p. 54. n. 2101. — Endl. 1837. Gen. n. 1496. p. 207; 1841. Ench. p. 112. — Meisn. 1842. Gen. p. 379 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 437.
Bartl. 1830. Ord. p. 57: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.
Synon. Beclardia A. Rich.

Cryptosanus Scheidweiler 1843 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 13. p. 101: nov. g. Orchidear. (C. scriptus.) *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 637.

•Cryptosema Meisn. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 206: nov. g. Podalyricar., Brachysemati aff. (C. pimeleoides.)

Cryptoseta Hook. mss.
= Cryptopodium Brid.

Cryptosorus Fée (1843. Congr. scient. Fr. I. p. 178); 1852. Gen. Fil. p. 231: nov. g. Polypodiear. (Polypodium obliquatum Blume.)

Cryptospermeae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 96; 1843. Phycol. gener. p. 321; 1845. Phycol. germ. p. 260; 1849. Sp. Alg. p. 527: ordo Gymnospermear. Fam.: Lemanieae, Chaetophoreae, Batrachospermeae, Liagoreae, Mesogloeaceae.

Cryptospermum Young 1797. Linn. Trans. III. p. 30. t. 5.
Pers. 1805. Ench. I. p. 122. n. 330: g. Tetrandr. Monogyn.

Cryptospermum Young cont.
Hedw. 1806. Gen. p. 71. n. 339: g. Rubiacear.
= Opercularia Rich.

Cryptosphaeria Greville 1822. Scot. crypt. Fl. III. t. 13: nov. g. Fungor. *Cf.* Flora 1823. I. p. 373.
= Sphaeria Hall., Valsa Adans. et Hypoxylon Bull.

Cryptosphaeria Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 266: sect. Sphaeriae. (Foliicolae, Caulicolae, etc. Fries.)

Cryptospora Karelin & Kiril. 1842. Bull. soc. Mosc. Nr. 1. p. 161: nov. g. Anchoniear. (C. falcata.) *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 312 et Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 315. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 768. — Endl. 1843. Spl. III. p. 88. n. $4947/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Anchonidar.

Cryptosporeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 102: subdiv. Trichothallar. Tribus: Batrachospermeae, Chaetophoreae, Chordarieae, Liagoreae.

Cryptosporium Kunze 1817. Mykol. Heft. I. p. 3. t. 1: nov. g. Fungor. (C. atrum.)
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: g. Hypodermior.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 522: g. Fusidiear.
Link 1825. Spec. II. p. 96: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 193; 1832. Syst. myc. III. 2. p. 481: g. Stilbosporeor. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180. — Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 23; 1841. Nom. p. 2. n. 60. — Endl. 1836. Gen. n. 197. p. 17; 1841. Ench. p. 13. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 48.
Corda 1829 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. II. p. 105. t. 49—51.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 785. n. 4076: g. Coniomycetum liberor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 191: g. Sporomycetum hyposporor.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 2: g. Caeomacear.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 26: g. Pyrenomycetum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 33; 1842. Mycol. p. 138: g. Melanconiacear. — Par. Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 733.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Sphaeronemeor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 423: g. Phyllosticteor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Melanconieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 58: g. Naemasporeor.
Synon. Fusicoccum Corda.

Cryptostachys Steud. 1850. Flora I. p. 229: nov. g. Graminear., Agrostidi clandestinae Spr. aff. (Nomen.)
Steud. 1854. Glum. I. p. 181: g. Agrostear.

Cryptostegeae Rchb. 1828. Consp. p. 131: subdiv. Periplocear. Gen.: Cryptostegia.

Cryptostegia R. Brown 1819. Bot. Regist. t. 435 (Verm. bot. Schr. V. p. 322): nov. g. Periplocear. (Nerium grandiflorum Roxb.) — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. xli. — Bartl. 1830. Ord. p. 203. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 164. — Endl. 1838. Gen. n. 3431. p. 587; 1841. Ench. p. 298. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 538. — Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5061. (genuinar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 52. — Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 491. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 438. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 464.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 837. n. 964: g. Asclepiadear. — Par. Wight 1834. Contrib. p. 65.

Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3459: g. Cryptostegear.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 207. n. 1057: g. Apocynear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 883.

Rchb. 1837. Hdb. p. 208: g. Cryptostegiear.

Cryptostegieae Rchb. 1837. Handb. p. 208: subdiv. Periplocear. Gen.: Cryptostegia.

Cryptostemma R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 141 (Verm. bot. Schr. II. p. 447): nov. g. Synantherear. (Arctotis calendulacea et hypochondriaca.)

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 573; 1826. Syst. III. p. 606. n. 2833; 1831. Gen. II. p. 637. n. 3190: g. Radiatar.

Cass. 1818. Dict. v. 12. p. 125; 1823. v. 29. p. 449; 1830. v. 60. p. 573: g. Arctotidear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2670. — Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Less. 1832. Syn. p. 38. — Brongn. 1843. En. genr. p. 37. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 438.

Link 1822. En. II. p. 355: g. Corymbiferar.

Link 1829. Hdb. I. p. 774: g. Coreopsidear.

DC. 1837. Pr. VI. p. 495: g. Arctotear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2836. p. 464; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 487. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3638: g. Cryptostemmear.

Synon. Cynotis Hoffmsg.; Arctotidis sp. Linn.

Cryptostemmeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 92: subdiv. Ursiniear. Gen.: Arctotheca, Cryptostemma, Microstephium.

Cryptostemon Mönch 1794. Meth. p. 4. 42. 719; 1798. Einleit. p. 228: class. VIII. plantar. Sect.: Filices, Musci, Hepatici, Algae, Fungi.

Cryptostemonis Gleditsch 1764. Syst. p. xxxiii: div. altera plantar. Classes.: Filicinae, Muscosae, Algaceae, Fungosae.

Cryptostephane Schultz Bip. 1844. Flora p. 782; 1847 in Walp. Repert. VI. p. 318: nov. g. Eumutisiear.

Cryptostoma Dietr. vid. *seq.*

Cryptostomum Schreb. 1789. Gen. I. p. 137. n. 344: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 390. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1061. n. 390. — Pers. 1805. Ench. I. p. 232. n. 512.

Batsch 1802. Tabl. p. 204: g. Sapotar.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 897: g. Sapotear., an Büttnerear.?

Spreng. 1825. Syst. I. p. 669. n. 730: g. Büttnerear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 625 (*Cryptostoma*).

Spreng. 1830. Gen. I. p. 132. n. 659: g. Büttnereis aff.

Meisn. 1837. Gen. p. 73 (53): g. Chailletiacear.?

= Moutabea Aubl.

Cryptostylis R. Brown 1810. Prodr. I. p. 317. Ed. Nees p. 173: nov. g. Orchidear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 128. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 712. n. 2966; 1831. Gen. II. p. 661. n. 3333.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 294: g. Coniopagar. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 189. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.

Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528): g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp p. 67. n. 1421; 1841. Nom. p. 55. n. 2146. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 216. n. 1579. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 439.

Lindl. 1840. Orchid. p. 445; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Cranichidar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1548. p. 113; 1842. Spl. II. p. 18; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 11.

Meisn. 1842. Gen. p. 384 (288): g. Cranichidear.

Synon. Malaxidis sp. Labill.

Cryptotaenia DC. 1829. Coll. Mém. V. p. 42; 1830. Prodr. IV. p. 118: nov. g. Amminear. (Sison canadense L.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 291. — Meisn. 1838. Gen. p. 143 (104). — Rchb. 1837. Hdb. p. 219 (genuinar.); 1841. Nom. p. 140. n. 5396. — Endl. 1839. Gen. n. 4409. p. 771; 1841. Ench. p. 378. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 946. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 613. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 439. — Hassk. 1855. Retzia I. p. 113. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 66.

Tausch 1834. Flora I. p. 343 (sphalm. *Cryptotonia*): g. Scandicinear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Synon. Deringa Adans.; Alacospermum Neck.?; Cyrtospermum Rafin.; Conopodii sect. 2 Koch.

Cryptothamnium Wallroth 1842. Beitr. z. Bot. I. p. 76: g. Pyrenomycetum eustomor. (Usnea nigra B. Dill. — *Synon. Hypoxyli, Sphaeriae, Rhizomorphae, Thamnomycetis sp. Auct.*)

Cryptotheca Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1128: nov. g. Salicariar. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 26. n. 113. (Diandr. Monogyn.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 101.

DC. 1828. Pr. III. p. 76: g. Salicariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4557;

Cryptotheca Blume cont.
1841. Nom. p. 172. n. 6635. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 707. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 419. — Meisn. 1838. Gen. p. 117 (83).
Endl. 1840. Gen. n. 6141. p. 1199; 1841. Ench. p. 643: g. Eulythrariear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 685.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lythrear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 439: g. Eulythrear.
Blume 1855. Mus. bot. Lugd. II. p. 129: g. Lythrariacear.

Cryptotheca Hornsch. mss.
= Pterobryon Hornsch. (teste Auct. ipso.)

Cryptothladia*) Bunge 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 321: sect. Morinae. (M. parviflora Kar. & Kir.)

Cryptotonia Tausch vid. *Cryptotaenia DC.*

Crypturus Link 1843. Linnaea XVII. p. 387: nov. g. Rottbölliacear., inter Lepturum et Lolium intermedium. (Rottböllia loliacea Bory.)

Crystallia Sommerf. (mss.?)
= Gomphonema Agdh. (Kütz. Spec. p. 67.)

Cszernaevia „Turcz." Endl. Gen. p. 777 vid. *seq.*

Cszernaewia „Turcz." Endl. Ench. p. 379 in synon. Conioselini: vid. *Czernaevia Turcz.*

Cteisium**) Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. II. p. 275: nov. g. Filicum. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 12. p. 130. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 43.
= Lygodium Swartz.

Ctenis Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. II. p. 63.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 162: g. Filicitum.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 165; 1846. Chlor. prot. p. LXVI: g. Cycadeacear. dubium.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 111: g. Cycadear.

Ctenium Panzer 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 288. t. 13 (Ideen p. 36. t. 13. f. 3 a—f): nov. g. Polygam. Monoec. (Chloris monostachya Michx.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 168: g. Chloridear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 92; 1833. Agrost. p. 274. — Endl. 1837. Gen. n. 843. p. 94; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 136. 334. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1317. — Meisn. 1843. Gen. p. 421 (322). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 162. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 441. — Steud. 1854. Glum. I. p. 202.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 274. n. 289; 1830. Gen. I. p. 64. n. 313: g. Graminear. (Triandr. Digyn.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Chlorear.
Synon. Campuloa Desv.; Campulosus Palis.; Monocera Ell.; Monathera Rafin.

Ctenochlaena Kunze ..... sect. Aspidii. (Fée Gen. Fil. p. 357.)

Ctenodonteae Montagne 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 155; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 442: nova tribus Floridear. Gen.: Ctenodus.

Ctenodontidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 25: trib. Cryptonemear. Gen.: Ctenodus.

Ctenodus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phycol. gener. p. 407: nov. g. Gelidiear.
Mont. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 151: g. Ctenodontear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Ctenodontidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 442: g. Coccocarpear.
= Euctenodus Kütz. (ob Ctenodum piscem.)

Ctenomeria Harvey 1842. Lond. journ. bot. I. p. 29: nov. g. Euphorbiacear., Acalyphae aff.
Meisn. 1843. Comm. p. 369: g. Acalyphear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 98. n. 5787/1. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Baill. 1858. Euphorb. p. 494: g. Dysopsidear.

Ctenophora Brébiss. mss.
= Synedrae Ehrenb. sp. (Kütz. Spec. p. 46.)

Ctenopsis De Notaris 1847. Sem. Genuens.; 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 324: nov. g. Graminear., Leptochloae aff. (Festuca pectinella Del.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 763: g. Chloridear. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 210.

Ctenopteris Blume .... Fl. javan. p. 129.
Endl. 1836. Gen. p. 60. n. 615 *c*: sect. Polypodii. — Par. Presl 1836. Pterid. p. 177. — J. Smith 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 47.
Endl. 1841. Spl. I. n. 615 *a α*. p. 1346; 1841. Ench. p. 36: subsect. Eupolypodii.
Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 985. 1 *a*: subsect. Polypodii.
Newm. 1851. Syn. brit. ferns p. 28: g. Filicum. (Polypodium vulgare L.)

Ctenopyrum Link 1843. Linnaea XVII. p. 394: sect. Tritici. (T. villosum, orientale, cristatum, etc.)
= Eremopyrum Ledeb.

Ctenosperma Hook. f. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 115: nov. g. Compositar. (C. alpinum.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 724: g. Hippiear.

Ctenosperma F. Müll. mss.
= Silphiosperma Steetz.

Ctenostachys Boissier 1848 in DC. Prodr. XII. p. 639: sect. Staticcs.

Ctesium Pers. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 185: nov. g. Graphidear. (Allographa lutea Chev., etc.)

Cuazonaria „Corda" Endl. et Rabenh. in synon. Typhulae: vid. *Cnazonaria Corda.*

Cuba Scopoli 1777. Introd. p. 300. n. 1365: g. Leguminosar.
= Tachigali Aubl.

*) θλαδίας, eunuchus. (?)
**) κτείς, κτενός, pecten.

Cubaea Schreb. 1789. Gen. I. p. 278. n. 702: g. Decandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 671. — Willd. 1799. Sp. II. p. 530. n. 841.
Gis. 1792. Prael. p. 429: g. Lomentacear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 98.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 345. n. 1631; 1830. Gen. I. p. 361. n. 1821: g. Leguminosar. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1496.
= Tachigali Aubl.

Cubeba Miquel 1839. Bull. Néerl.; 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIV. p. 169; 1840. Comm. phyt. p. 33: nov. g. Piperear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 335 (247). — Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2572. (genuinar.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 1820 *a*. p. 1373; 1841. Ench. p. 149: sect. Piperis. Subsect.: Melamiri, Beetla.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 11: g. Piperacear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 362.
Miq. 1843. Syst. Piperac. p. 285: g. Piperinar. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 16. n. 1823/3.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 518: g. Piperidar.

Cubilia Blume 1849. Rumphia III. p. 100: nov. g. Sapindear. (Euphoria Cubili Blanco.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 221.

Cublandia Gmel., Batsch vid. *Coublandia Aubl.*

Cubospermum*) Loureiro 1790. Fl. cochinch. I. p. 275. Ed. Willd. p. 337: nov. g. Decandr. Monogyn. (C. palustre. — An Jussieuae spec.? Willd. in adnot. p. 338.)
= Jussiaea Linn.

Cucifera Delile 1813. Fl. Aegypt. I. p. 57; 1824 in Descr. de l'Egypte XIX. p. 20. 117. t. 1. 2: nov. g. Palmar. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 472 (*Doum*).
= Hyphaene Gärtn.

Cucubalites Göppert 1838. Nov. Act. Leop. XVIII. 2. p. 570: g. foss. Silenear.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 248: 1846. Chlor. prot. p. LXXXVI: g. pl. foss. incertae sedis.

Cucubalus**) Tourn. 1700. Inst. p. 339. t. 176: g. pl. class. VIII. (Cucubalus bacciferus L.)
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 128. Ed. Hall. 1745. p. 142 (*Cacubalus*): g. pl. class. V.
Scop. 1777. Intr. p. 331: g. Caryophyllear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 760. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 832 (genuin.); 1825. Syst. II. p. 404. n. 1714; 1830. Gen. I. p. 379. n. 1911. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 62. 161. — Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5364. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1565.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 376. t. 77. f. 7 (baccifer).
Mönch 1794. Meth. p. 710: g. Allagostemonis.
DC. 1824. Pr. I. p. 367: g. Silenear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV;

Cucubalus Tourn. cont.
1841. Nom. p. 206. n. 7829. — Bartl. 1830. Ord. p. 307. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 398. — Koch 1836. Syn. p. 100. Ed. II. p. 108. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21). — Fries 1842 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora p. 121. — Brongn. 1843. En. genr. p. 103. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 164. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.
Endl. 1840. Gen. n. 5251. p. 974; 1841. Ench. p. 506: g. Lychnidear. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 332. — A. Braun 1843. Flora p. 376. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 201.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 446: g. Silenacear.
Synon. Lychnanthos Gmel.; Scribaea GMS.; Mönchia Neck.?

Cucubalus Linn. 1737. Gen. p. 132. n. 371; 1737. Cliff. p. 170; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 109; 1753. Sp. I. p. 414; 1759. Syst. ed. X. p. 1030. n. 502; 1762. Sp. ed. II. p. 591; 1764. Gen. ed. VI. p. 225. n. 566; 1767. Syst. ed. XII. p. 308. n. 561: g. Decandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 349; 1784. Syst. p. 419. — Reich. 1778. Gen. p. 230. n. 615. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 303. n. 771. — Gmel. 1791. Syst. p. 712. — Pers. 1797. Syst. p. 449. — Willd. 1799. Sp. II. p. 684. n. 894; 1809. En. p. 470. — GVS. 1800. Fl. Wett. II. p. 94. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 287.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 95. n. 392: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 302. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 246. — Batsch 1802. Tab. p. 34. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 118. — Pers. 1805. Ench. I. p. 495. n. 1117. — Hedw. 1806. Gen. p. 330. n. 1301. — Poir. 1817. Dict. v. 7. p. 120 (*Carnillet*). — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 135. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 645. — Link 1821. En. I. p. 424. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 270.
Adans. 1763. Fam. II. p. 255: g. Alsinium.
Hill 1769. Ht. kew. p. 194: g. Pentapetalar.
Scop. 1772. Carn. I. p. 304: sect. Lychnidis.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 204; 1789. Phil. Bot. I. p. 56.
Neck. 1790. El. II. p. 166. n. 870: g. Catotaphytor. Distinguuntur Mönchia et Acubalus.
Cram. 1803. Disp. p. 112: g. Decandr. Tetragyn. et p. 198 in Dioec. Tetrandr.
Link 1831. Hdb. II. p. 246: g. Silenear. (Cuc. Otites L.) — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 824; 1837. Hdb. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 173.
= Cucubalus Tourn. et Silenes spec.

Cucubalus Elliott 1817. Sketch Bot. South-Carol. I. p. 514: g. Decandr. Trigyn. (C. stellatus Mich.)
= Behenantha Otth.

*) Nomen a seminibus cubicis.
**) Cucubalum s. cacubaluin Plinii.

Cucularia Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 169: novum nomen pro Fumaria cucullaria L. propositum.
Endl. 1839. Gen. n. 4836 *b.* p. 859 (*Cucullaria*); 1841. Ench. p. 443: sect. Dicentrae. — Par. Pfeiff. 1857. Bot. Zeit. p. 649.
Synon. Capnorchis Boerh.; Bicucullata March.; Bikukulla Adans.

Cuculla Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 287: sect. Dendrocollae.
Lindl. 1833. Orchid. p. 238: sect. Aëridis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1493 *a.* p. 206; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2098. 1. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 695.

Cucullaria Buxbaum 1728. Cent. I. p. 13 t. 19. f. 2. (Valantia Cucullaria L.)
= Callipeltis Stev.

Cucullaria Schreb. 1789. Gen. I. p. 6. n. 11: g. Monandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 10. — Willd. 1797. Sp. I. p. 17. n. 16. — Pers. 1805. Ench. I. p. 4. n. 17. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 337. — Vahl 1805. Enum. I. p. 4. n. 3. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 5. 36. n. 24. — Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 78.
Batsch 1802. Tab. p. 57: g. Violariar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 796: g. Geranior.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 16. n. 21; 1830. Gen. I. p. 7. n. 17: g. Vochisiear.
= Vochysia Juss.

Cucullaria Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 201: sect. Leotiae.
= Hygromitra Fries.

Cucullaria Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 26: trib. Leotiae.
Endl. 1836. Gen. n. 432 *b.* p. 38; 1841. Ench. p. 21: sect. Leotiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 450 *b.*
Corda 1842. Mycol. p. 192: g. Leotiacear.
Bonord. 1851. Hdb. p. 208: g. Helvellaceor.

Cucullaria Endl. vid. *Cucularia Rafin.*

Cuculllifera Nees 1836 in Lindl. nat. syst. ed. II. p. 451.
Kunth 1841. Enum. III. p. 484: g. Restiacear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 408 (313). — Steud. 1855. Glum. II. p. 264.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139: g. Restionear.
= Hypolaena R. Brown?

Cucumerinae Endl. 1839. Gen. p. 938: div. Cucurbitear. Gen.: Cucumis, Cucurbita, Coccinia, Trichosanthes, Elaterium, Cephalandra. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1421 et Ench. p. 491) Echinocystis.
Rchb. 1841. Nom. p. 101: sect. Cucurbitear. genuinar. Gen. ut Endl. 1841.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 15. 68: trib. Cucurbitear. Gen. ead. et Ceratosanthes, Involucraria, Gymnopetalum, Apodanthera.

Cucumeroides Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 485. t. 180.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 11. 44: subg. Bryoniae.
= Bryonia Linn.?

Cucumis Tourn. 1700. Inst. p. 104 t. 31. 32: g. pl. class. I. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 47. Ed. Hall. 1745. p. 46.
= Cucumeris Linn. pars.

Cucumis Linn. 1737. Gen. p. 296. n. 737; 1737. Cliff. p. 451; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 292; 1753. Sp. II. p. 1011; 1759. Syst. ed. X. p. 1279. n. 969; 1763. Sp. ed. II. p. 1435; 1764. Gen. ed. VI. p. 508. n. 1092; 1767. Syst. ed. XII. p. 640: g. Monoec. Syngenes. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 726; 1784. Syst. p. 869. — Reich. 1778. Gen. p. 504. n. 1193. — Lour. 1790. Coch. II. p. 591. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 663. n. 1479. — Pers. 1797. Syst. p. 912. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 719.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 281. n. 1153: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 654.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Cucurbitacear. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Forsk. 1775. Aegypt. p. 168. — Scop. 1777. Intr. p. 151. — Juss. 1789. Gen. p. 395. — Gis. 1792. Prael. p. 439. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 515. — Batsch 1802 Tab. p. 221. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 296. — DC. 1805. Franç. III. p. 690. — Pers. 1807. Ench. II. p. 593. n. 2161. — Mirb. 1815. Elém. II. p. 904. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 122. — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 226 (*Concombre*). — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 593; 1826. Syst. III. p. 46. n. 2364; 1831. Gen. II. p. 531. n. 2606 (in Monadelph. Pentandr.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 551. — Kunth 1822. Syn. I. p. 428. — Link 1822. En. II. p. 404; 1829. Hdb. I. p. 641. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 929. — Bartl. 1830. Ord. p. 274. — Koch 1836. Syn. p. 251. Ed. II. p. 276. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 543. — Brongn. 1843. En. genr. p. 116. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 142.
Hill 1769. Ht. kew. p. 142: g. Monopetalar.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 323: g. Syngenes. Monogam.
Neck. 1790 El. I. p. 237. n. 385: g. Sygolliphytor. Excluditur Rigocarpus.
Gmel. 1791. Syst. p. 100: g. Triandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1794. Prodr. I. p. 13; 1818. Fl. cap. I. p. 156.
Cram. 1803. Disp. p. 179: in Monoec. Triandr.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 611. n. 1749; 1809. En. p. 999: g. Monoec. Monadelph.
Seringe 1825. Mém. Genèv. III. 1. p. 25: g. Benincasear.
Seringe 1828 in DC. Pr. III. p. 299: g. Cucurbitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2760; 1831. Fl. exc. p. 295. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 5. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 341. — Meisn. 1838. Gen. p. 127 (91). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 205. — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 278. — Wight 1842. Ann. and Mag. n. h. VIII.

Cucumis Linn. cont.
p. 270. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 606. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Endl. 1839. Gen. n. 5137. p. 938; 1841. Ench. p. 491: g. Cucumerinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3958. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 15. 68. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 670
Synon. Cucumis et Melo Tourn.

Cucumisporium Bonord. vid. *Cucumisporium Preuss.*

Cucumites Bowerbank 1840. Foss. fruits I. p. 91.
Unger 1845. Syn. pl. foss. g. 232; 1846. Chlor. prot. p. LXXXII: g. Cucurbitacear.

Cucurbita Tourn. 1700. Inst. p. 107. t. 36: g. pl. class. I. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 50. Ed. Hall. 1745. p. 48.
Adans. 1763. Fam. II. p. 138: g. Bryoniar.
Forsk. 1775. Aegypt. p. 167: g. Cucurbitacear.
= Cucurbitae Linn. pars.

Cucurbita Linn. 1737. Gen. p. 297. n. 738; 1737. Cliff. p. 451; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 291; 1753. Sp. II. p. 1010; 1759. Syst. ed. X. p. 1278. n. 968; 1763. Sp. ed. II. p. 1434; 1764. Gen. ed. VI. p. 507. n. 1091; 1767. Syst. ed. XII. p. 639: g. Monoec. Syngenes. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 726; 1784. Syst. p. 868. — Reich. 1778. Gen. p. 504. n. 1192. — Lour. 1790. Coch. II. p. 592. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 662. n. 1478. — Pers. 1797. Syst. p. 912. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 718.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 280. n. 1152: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Cucurbitacear. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 151. — Juss. 1789. Gen. p. 396. — Gis. 1792. Prael. p. 439. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 516. — Batsch 1802. Tab. p. 221. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 296. — DC. 1805. Franç. III. p. 691. — Pers. 1807. Ench. II. p. 593. n. 2160. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 123. — Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 231 (*Courge*). — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 593; 1826. Syst. III. p. 45. n. 2363; 1831. Gen. II. p. 531. n. 2603. (in Monadelph. Pentandr.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 552. — Kunth 1822. Syn. I. p. 428. — Link 1822. En. II. p. 403; 1829. Hdb. I. p. 642. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 930. — Bartl. 1830. Ord. p. 275. — Koch 1836. Syn. p. 250. Ed. II. p. 276. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 116. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 142.
Hill 1769. Ht. kew. p. 142: g. Monopetalar.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 322: g. Syngenes. Monogam.
Neck. 1790. El. I. p. 239. n. 388: g. Sygolliphytor. Sejungitur Citrullus.
Gmel. 1791. Syst. p. 101: g. Triandr. Monogyn.
Cram. 1803. Disp. p. 179: g. Monoec. Triandr.

Cucurbita Linn. cont.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 606. n. 1740; 1809. En. p. 998: g. Monoec. Monadelph. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 228. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 9. 192.
Seringe 1825. Mém. soc. Genèv. III. 1. p. 25; 1828 in DC. Pr. III. p. 316: g. Cucurbitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2762; 1831. Fl. exc. p. 295. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 40. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 350. — Meisn. 1838. Gen. p. 127 (91). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 197. — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 278. — Wight 1842. Ann. and Mag. n. h. VIII. p. 270. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 611. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315. — Gér. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 300 (*Courge*).
Endl. 1839. Gen. n. 5138. p. 938; 1841. Ench. p. 491: g. Cucumerinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3959. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 16. 83. Subgen.: Pepo, Melopepo, Cucurbita. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 672.
Naudin 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 5. Revisio generis.
Synon. Cucurbita, Pepo et Melopepo Tourn.

Cucurbitaceae Hall. 1742. En. stirp. Helv. Praef. p. 34: div. Dicotyledonum petalodear. Isostemonum. Gen.: Bryonia.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: ordo 45 plantar. Gen.: Passiflora, Fevillea, Momordica, Trichosanthes, Cucumis, Cucurbita, Bryonia, Sicyos, Melothria, Gronovia?
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 55 plantar. Gen.: Sicyos, Bryonia, Melothria, Momordica, Cucumis, Cucurbita, Trichosanthes, Fevillea, Gronovia, Zanonia.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 34 plantar. Gen.: Gronovia, Anguria, Elaterium, Sicyos, Melothria, Bryonia (sphalm. *Brysonia*), Cucurbita, Cucumis, Trichosanthes, Momordica, Fevillea, Passiflora. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 439. Gen. ead.
Scop 1777. Intr. p. 150: gens Campanulatar. Gen.: Melotria, Sicyos, Luffa, Elaterium, Momordica, Cucumis, Anguria, Cucurbita, Trichosanthes, Fewillea, Zanonia, Bryonia, Trevouxia.
Juss. 1789. Gen. p. 393: ordo 2 class. XV. Gen. §. 1: Gronovia, Sicyos. §. 2: Bryonia, Elaterium. §. 3: Melothria, Anguria, Momordica, Cucumis, Cucurbita, Trichosanthes, Ceratosanthes. §. 4: Fevillea, Zanonia. *Affinia*: Passiflora, Murucuia, Tacsonia, Papaya. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 507. Gen. ead. excluso §. 4 et Tacsonia. (In §. 3 Luffa loco Anguriae.)
Batsch 1802. Tab. p. 221: fam. unica Cirrhatar. Gen. ut Juss., excluso §. 5 et adjectis Sechio, Turia.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 292. t. 109. Gen. ut Juss. Accedunt §. 2 Muricia, §. 3 Luffa et §. 4 Lagenula.
DC. 1805. Franç. III. p. 688: fam. (55) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Bryonia, Momordica, Cucumis, Cucurbita.

Cucurbitaceae Hall. cont.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 903: fam. Dicotyledonum apetalar. Gen.: Cucumis, Bryonia.
Juss. 1818. Dict. v. 12. p. 144: fam. Dicotyledonear. Diclinar. Gen. §. 1: Gronovia, Sicyos, Sechium. §. 2: Solena, Bryonia, Elaterium, Muricia. §. 3: Melothria, Anguria, Momordica, Ecbalium, Luffa, Cucumis, Cucurbita, Trichosanthes, Ceratosanthes, Myrianthus. §. 4. *Affinia*: Zanonia, Belvisia. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 449. Trib.: Nhandirobeae, Cucurbiteae, Sicyoideae.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 591: fam. 58 plant. Gen.: Sicyos, Sechium, Bryonia, Anguria, Momordica, Luffa, Cucumis, Cucurbita, Trichosanthes, Ceratosanthes; Feuillaea, Zanonia, Carica; Melothria; Passiflorae.
DC. 1819. Théor. élém. p. 245: ordo Calyciflorar. — Par. Seringe 1828 in DC. Pr. III. p. 297. Tribus: Nhandirobeae, Cucurbiteae. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 1. Trib. eaed.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 550: fam. Calyciflorar. Gen.: Bryonia, Cucumis, Cucurbita.
A. St. Hil. 1822. Mém. Mus. IX. p. 190.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: fam. Calicitubiae.
Agdh. 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 592: ordo Peponiferar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 273. Gen.: Lagenaria, Cucumis, Luffa, Benincasa, Erythropalum, Turia, Bryonia, Sicyos, Elaterium, Momordica, Neurospermum, Sechium, Melothria, Trichosanthes, Joliffia, Cucurbita, Involucraria, Muricia, Anguria, Feuillea, Zanonia, Kolbea; Zucca, Allasia. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91). Trib. ut Seringe 1828. — Endl. 1839. Gen. p. 934; 1841. Ench. p. 489. Subordines: Telfairieae, Cucurbiteae, Sicyoideae. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 232. Gen. foss.: Cucumites.
Seringe 1825. Mém. soc. Genève III. 1. p. 1. Trib.: Benincaseae, Cucurbiteae. *Gen. affinia*: Papaya, Allasia, Fevillea, Zanonia, Gronovia, Myrianthus, Hydnora, Zucca. *Cf.* DC. ibid. p. 33.
Sageret 1826. Mém. s. l. Cucurb. (Paris)
Rchb. 1828. Consp. p. 113; 1831. Fl. exc. p. 293; 1837. Hdb. p. 184: fam. Campanacear. Divis.: Cucurbiteae, Nhandirobeae, Papayaceae (et 1831 Xanthieae). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. Divis.: Cucurbiteae, Zanonieae, Papayeae.
Link 1829. Hdb. I. p. 639: ordo Epanthar. Gen.: Melothria, Sicyos, Bryonia, Momordica, Cucumis, Cucurbita.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (181) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. pl. p. 17; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 51; 1847. Veg. kd. p. 311: ordo Cucurbitalium. Tribus: Nhandirobeae, Cucurbiteae, Siceae.
Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 401. Tribus: Nhandirobeae, Joliffieae, Cucurbiteae, Sechineae, Sicyoideae, Cyclanthereae.

Cucurbitaceae Hall. cont.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 183: fam. (92) Peponiferar. Tribus ut Meisn. — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 1. Subordines ut Endl. et Gronovieae.
Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 272. Tribus ut Schrad. (Telfairieae loco Joliffiear.)
Brongn. 1843. Én. genr. p. 116: fam. Cucurbitinear. Gen. ex Endl.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 606. Tribus: Cucurbiteae, Sicyoideae, Triceratiae.

Cucurbitales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 17: nixus Epigynar. Ordines: Cucurbitaceae, Loaseae, Cacteae, Homalinae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 310: nixus Exogenar. diclinar. Ord.: Cucurbitaceae, Datiscaceae, Begoniaceae.

Cucurbitaria Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 508. 519: nov. g. Spheridear. (Sphaeria cucurbitula Tode, berberidis, cupulata et coccinea Pers.)
Grev. . . . . Scot. t. 50. 84. 135. 195: g. Fungor. *Cf.* Flora 1824. I. p. 90.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 131: g. Sphaeriaceor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 271.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 390: series Sphaeriae.
= Sphaeriae Hall. pars.

Cucurbiteae Seringe 1825. Mém. soc. Genèv. III. 1. p. 25: trib. Cucurbitacear. Gen.: Bryonia, Sicyos, Elaterium, Momordica, Neurosperma, Sechium, Melothria, Trichosanthes, Cucurbita, Involucraria?, Muricia, Anguria. — Par. Seringe 1828 in DC. Pr. III. p. 299. Gen. ead. et Lagenaria, Cucumis, Luffa, Benincasa, Erythropalum, Turia et Joliffia. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 4. Gen. ead. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 402. Gen.: Coniandra, Cyrtonema, Melothria, Ceratosanthes, Pilogyne, Rhynchocarpa, Bryonia, Citrullus, Ecbalium, Momordica, Luffa, Benincasa, Lagenaria, Trichosanthes, Cucumis, Cucurbita, Elaterium, Schizocarpum, Cephalandra. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 192. Gen. fere ut Ser. — Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91). Gen. ut Seringe 1828 et Micrampelis?, Zehneria, Pilogyne, Sicydium, Schizocarpum, Coniandra, Citrullus, Thladiantha, Cephalandra, Cyrtonema, Coccinia, Cyclanthera, Myrianthus? — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 273. Gen.: Coniandra, Cyrtonema; Sicydium, Bryonopsis, Aechmandra, Melothria, Ceratosanthes, Apodanthera; Anguria, Psiguria?, Schizostigma, Sphenantha; Pilogyne, Zehneria, Karivia, Rhynchocarpa; Mukia; Bryonia, Citrullus, Ecbalium, Echinocystis, Momordica, Luffa, Benincasa, Lagenaria; Trichosanthes, Gymnopetalum; Cucumis, Cucurbita, Elaterium, Schizocarpum, Coccinia, Cephalandra. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 267. Gen. ead. (exceptis Apodanthera, Psiguria et Echinocystide). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315. Gen. fere ut Arnott. —

Cucurbiteae Seringe cont.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 450. Sect.: Coniandreae, Melothrieae, Bryonieae, Cucumerineae, Telfairieae, Cyclanthereae.
Rchb. 1828. Consp. p. 113; 1831. Fl. exc. p. 294; 1837. Hdb. p. 184: div. Cucurbitacear. Gen. ut Seringe 1828 et Ecbalium, Micrampelis?, Zucca?, Allasia?, Myrianthus? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. Subdivis.: Sicyoideae, *genuinae* (sect.: Zygranthereae, Cucumerinae, Coniandreae, Telfairieae).
Endl. 1839. Gen. p. 935; 1841. Ench. p. 491: subordo Cucurbitacear. Divis.: Coniandreae, Melothrieae, Bryonieae, Cucumerinae, Cyclanthereae. — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 6. 7. Trib. ut Endl. et Schizocarpeae, Sphenantheae.
Cucurbitella Walp. 1847. Rep. VI. p. 50 in adnot. (err. *Curcubitella*): g. Cucurbitacear.
Synon. Schizostigma Arnott 1841.
Cucurbitineae Brongn. 1843. Enum. genr. p. xxx. 116: class. Dialypetalar. perigynar. Fam.: Begoniaceae, Nandhirobeae, Cucurbitaceae, Gronovieae?
Cucurbitula Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 11. 43: subg. Bryoniae. (B. stipulacea W.)
Cudicia Hamilt. mss.
= Cryptolepis R. Brown.
Cudonia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 348: nov. g. Helvellaceor. (Leotiae sp. Auct.)
Cudrania Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 122: nov. g. Euartocarpear. (Trophis spinosa Roxb.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 660.
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 44: g. Artocarpear.
Synon. Cudranus Rumph.
Cudranus Rumph. 1747. Amboin. V. t. 15. 16.
= Cudrania Tréc.
Cuellara Pers. vid. *seq.*
Cuellaria*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 59. t. 10; 1798. Syst. p. 103: nov. g. Decandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 482. n. 1093 (*Cuellara*).
Hedw. 1806. Gen. p. 312. n. 1234: g. Ericar.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 147: g. Ericinear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 517: g. Ericear. bicornium (serius Clethrae injunctum).
Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3407: g. Rhodoracear.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 589: sect. Clethrae.
Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4882: g. Clethrear.
Cuepia Gmel., Batsch vid. *Couepia Aubl.*
Cuiete Marcgr. 1648. Brasil. p. 123 c. ic.
Plum. 1703. Gen. p. 23. t. 16. (Icon. t. 109 *Cujete*?)
Adans. 1763. Fam. II. p. 207: g. Personatar.
= Crescentia Linn.
Cuitlanzina Lindl. Orchid. scel. p. 15 ex Linnaea II. p. 530, Rchb., Bartl. vid. *seq.*

*) Dicat. Joanni Cuellar.

Cuitlauzina*) La Llave & Lexarza 1825. Nov. veget. descr. II. Orch. p. 32: nov. g. Rinemospermar. epidendrar. (C. pendula.)
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530: *Cuitlanzina*); 1833. Orchid. p. 196: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1525 (*Cuitlanzina*); 1841. Nom. p. 54. n. 2064 (*Cuitlauzinia*). — Endl. 1837. Gen. n. 1459. p. 203; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 452.
Bartl. 1830. Ord. p. 58 (*Cuitlanzina*): g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.?
Cuitlauzinia Rchb., Spach vid. *praeced.*
Cujavus Rumph. 1741. Amboin. I. p. 140. 142 (domestica et agrestis).
= Psidium Linn.
Cujete Plumier vid. *Cuiete Marcgr.*
Culcasia Palis. 1805. Fl. Owar. t. 3.
Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 773 *b*: sect. Caladii.
Rich. 1833 in Guillem. Arch. bot. I. p. ...: g. Orontiacear.
Endl. 1837. Gen. n. 1689. p. 237; 1841. Ench. p. 128: g. Colocasiear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 46. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1101. — Meisn. 1842. Gen. p. 361 (270). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 39. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 457.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Caladiear.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 115: g. Philodendrinar.
Synon. Denhamia Schott.
Culcita Presl 1836. Pterid. p. 135: nov. g. Dicksoniacear. (Dicksonia Culcita L'Her.) *Cf.* Brongn. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 457.
Endl. 1841. Spl. I. n. 644 *b*. p. 1350; 1841. Ench. p. 37: sect. Dicksoniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1033. 2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Dicksoniear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 340: g. Balantiear.
= Balantium Kaulf.?
Culcitium**) Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 1. t 66. 67: nov. g. Corymbiferar.
Cass. 1818. Dict. v 12. p. 210: p. Senecionear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1832. Syn. p. 393. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3358. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 170: g. Jacobear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 449.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 431. n. 2675; 1831. Gen. II. p. 611. n. 3017: g. Eupatorinar.

*) „Dicat. in memoriam Cuitla huatzin, reguli Iztapalapae, qui Mexicanos Hesperideos hortos exornare curavit".
**) culcita, pulvinar.

Culcitium Humb. & Bonpl. cont.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 447. 452; 1830. v. 60. p. 583: g. Doronicear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2489. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31.
DC. 1837. Pr. VI. p. 324: g. Eusenecionear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2804 p. 457; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 215 (136). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 457.
Synon. Oresigonia Schltd.
Culhamia*) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Ar. p. 96: nov. g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 754.
Scop. 1777. Intr. p. 249: g. Polycarpiar.
= Sterculiae sect. Cola Schott & Endl.?
Cullen Medic. (Vorles. II. p. 381); 1789. Verles. IV. 1. p. 358; 1789. Phil. Bot. I. p. 211: nov. g. ex typo Psoraleae corylifoliae L.
= Psoralea Linn.
Cullomia Juss. vid. *Collomia Nutt.*
Cullumia**) R. Brown 1813 in Aiton hort. kew. ed. sec. V. p. 137 (Verm. bot. Schr. II. p. 443): nov. g. Synantherear. (Berckheya ciliaris W.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 572; 1826. Syst. III. p. 608. n. 2837; 1831. Gen. II. p. 638. n. 3194: g. Radiatar.
Cass. 1818. Dict. v. 12. p. 213; 1821. v. 19. p. 234; 1823. v. 29. p. 448; 1830. v. 60. p. 573: g. Gorteriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2682; 1841. Nom. p. 93. n. 3641. — DC. 1837. Pr. VI. p. 497. — Endl. 1838. Gen. n. 2840. p. 465; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 460.
Link 1822. En. II. p. 354: g. Corymbiferar.
Bartl. 1830. Ord. p. 143: g. Arctotidear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 81. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 37.
Synon. Gorteriae sp. Linn.; Berckheyae sp. Willd., etc.
Cullumia Sieber Fl. cap. exsicc. (*Collomia* Steud. Nom. I. p. 398.)
= Felicia (reflexa) DC. Pr. V. p. 222.
Culmales Batsch 1802. Tab. affin. p. 152: ordo Incompletar. Familiae: Junceae, Calamariae.
Culminiae Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: ordo 26 plantar. Gen.: Tilia, Theobroma, Sloanea, Bixa, Heliocarpus, Triumfetta, Bartramia, Muntingia, Clusia, Dillenia, Kiggelaria, Grewia, Corchorus.
Culmites Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 209. 215. 303: g. Vegetabilium foss. class. II. *Cf.* Brongn. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 460.
Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXVIII: g. foss. Equisetacear. *Cf.* Flora 1827. I. p. 343. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 103.
Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 136; 1828. Prodr. p. 137: g. Monocotyledonear. foss.

*) *Kulhām* Arabum.
**) Dicat. T. G. Cullum, botan. angl. 1774.

Culmites Sternb. cont.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 166; 1846. Chlor. prot. p. LXVI: g. Graminear.
Cumada Jones 1795. Asiat. Research. IV. p. 249.
= Nymphaeanthe Rchb.
Cumarouma Steud. Nomencl. vid. *seq.*
Cumaruna Lam. Illustr. t. 601, Gmel. vid. *Coumarouna Aubl.*
Cumbea „Buchanan" Steud. Nomencl. I. p. 298. 453: vid. *Cambea Hamilt.*
Cumbulu Adans. 1763. Fam. II. p. 199: g. Verbenar. (*Rheede* Malab. I. t. 41.)
= Gmelina Linn.
Cumineae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 81: trib. 4 Umbelliferar. Gen.: Cuminum.
Rchb. 1828. Consp. p. 141: sect. Daucinear. Gen.: Oliveria, Cuminum.
DC. 1830. Pr. IV. p. 200: trib. Orthospermar. Gen.: Cuminum, Trepocarpus. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 348. Gen. ead. — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (107). Gen. ead. — Endl. 1839. Gen. p. 783; 1841. Ench. p. 379. Gen. ead. Accedit 1843 (Spl. III. p. 83) Froriepia. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 97. Gen. ut DC.
Tausch 1834. Flora I. p. 343: subtrib. Rhynchospermar. Gen.: Cuminum, Treptocarpus.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133. 149: sect. Rhynchospermear. Gen. ut DC.
Rchb. 1841. Nom. p. 141: sect. Ammiinear. Gen. ead.
Brongn. 1843. Én genr. p. 113: trib. Orthospermear. Gen.: Cuminum.
Cumingia Kunth, Spach vid. *Cummingia Don.*
Cuminia Colla .... Mem. di Torin. XXXVIII. p. 139. t. 47: nov. g. (Bystropogon erianthus Benth.)
Endl. 1838. Gen. n. 3652. p. 626; 1841. Ench. p. 308: g. Lamiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 287 (196). — Walp. 1845. Rep. III. p. 846.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166: g. Stachydear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4081. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 462.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Lamidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 258: g. Satureicar. anomalar.
Cuminidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 778: trib. Apiacear. Gen. Cuminear. Endl. 1843.
Cuminoides Tourn. 1700. Inst. p 300. t. 155: g. pl. class. VI.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 95: g. pl. class. V.
Mönch 1794. Meth. p. 93: g. Thalamostemonis.
= Lagoëcia Linn.
Cuminum Linn. 1742 Gen. ed. II. p. 115. n. 266; 1753. Sp. I. p. 254; 1759. Syst. ed. X. p. 960. n. 313; 1762. Sp. ed. II. p. 365; 1764. Gen. ed. VI. p. 139. n. 351; 1767. Syst. ed. XII. p. 212 n. 348: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774.

Cuminum Linn. cont.
Syst. p. 235; 1784. Syst. p. 285. — Reich. 1778. Gen. p. 142. n. 381. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 189. n. 483. — Gmel. 1791. Syst. p. 484. — Pers. 1797. Syst. p. 302. Willd. 1797. Sp. I. p. 1440. n. 547; 1809. En. p. 315. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 92.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian: g. Umbelliferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 221. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 19. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 471. — Hedw. 1806. Gen. p. 198. n. 814. — Hoffm. 1816. Umbell. ed. II. p. 194. — Lois. 1818. Dict. v. 12 p. 217. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 95. (Divis. 1.) — Link 1821. En. I. p. 279. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Adans. 1763. Fam. II. p. 97: g. Cicutar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 89. — Gis. 1792. Pracl. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 318. n. 703.
Gled. 1764. Syst. p. 54. n. 219: g. Thalamostemonum.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 107. t. 23. f. 8 (C. Cyminum).
Neck. 1790. El. I. p. 169. n. 281: g. Scadiophytor.
Spreng. 1813. Umbell. pr. p. 25.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 638; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLIV. 531; 1825. Syst. I. p. 905. n. 1077; 1830. Gen. I. p. 225. n. 1178: g. Amminar.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 81: g. Cuminear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 141. n. 3669; 1841. Nom. p. 141. n. 5443. — DC. 1830. Pr. IV. p. 201. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 348. — Tausch 1834. Flora I. p. 344. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 373. — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (107). — Endl. 1839. Gen n. 4488. p. 783; 1841. Ench. p. 379. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 974. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 149. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 113. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 461.
Link 1829. Hdb. I. p. 350: g. Caucalidear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 219: g. Amminear. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Cuminidar.
Synon. Foeniculi sp. Tourn.

Cummingia*) Don 1828 in Loud. Mag. nat. hist. Nov. p. 362. (1828. Bot. Regist. XIV. n. 1193.)
Endl. 1837. Gen. n. 1155. p. 149; 1841. Ench. p. 84: g. Conanthercar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1811. — Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 631 (*Cumingia*): g. Anthericear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 387 (*Cumingia*). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 462.

Cuncea „Hamilt. mss." D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 135: nov. g. Stipulariar. (C. trifida.)

Cuncea D. Don cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 1996: g. Coffeacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 90. n. 442: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 454.
Bartl. 1830. Ord. p. 210: g. Spermacocear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 462
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 157: g. Putoriear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 576. — G. Don 1831. Gen. syst. III. p. 633. — Endl. 1838. Gen. n. 3114. p. 526; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 170 (121). — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2762.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Cunila*) Linn. 1737. Gen. p. 174. n. 484; 1737. Cliff. p. 313; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 169: g. Didynam. Gymnosperm.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 156. n. 640: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 141.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 165. — Gis. 1792. Pracl. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1359. n. 1106; 1762. Sp. ed. II. p. 30; 1764. Gen. ed. VI. p. 15. n. 35; 1767. Syst. ed. XII. p. 63: g. Diandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 63; 1784. Syst. p. 67. — Reich. 1778. Gen. p. 17. n. 38. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 21. n. 46. — Gmel. 1791. Syst. p. 43. — Pers. 1797. Syst. p. 68. — Willd. 1797. Sp. I. p. 122. n. 59; 1809. En. p. 31. — Vahl 1805. Enum. I. p. 213. n. 52.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 111. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 328. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 255. — DC. 1805. Franç. III. p. 505. — Hedw. 1806. Gen. p. 16. 350. — Pers. 1807. Ench. II. p. 129. n. 1402. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 220. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 15. — Link 1821. En. I. p. 18. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 54. n. 91; 1830. Gen. I. p. 18. n. 68. — D. Don 1825. Nepal. p. 107. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 97.
Neck. 1790. El. I. p. 299. n. 468: g. Corythophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 430: g. Salviear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2837: g. Nepetear.
Benth. 1834. Labiat. p. 360: g. Satureinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 774. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 67. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 163.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188: g. Origanear.

*) Dicat. dominae Gordon Cumming.

*) Nomen ex Plinio mutuatum.

Cunila Linn. cont.
Endl. 1838. Gen. n. 3614. p. 618; 1841. Ench. p. 307: g. Cunilear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 285 (193). — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4064. — Walp. 1845. Rep. III. p. 713. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 463.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Cunilidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 180: g. Thymear.
Synon. Mappia Adans.

Cunileae Endl. 1838. Gen. p. 618; 1841. Ench. p. 307: subtrib. Satureinear. Gen.: Collinsonia, Cunila. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 285 (193). Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 104: subdiv. Origanear. Gen. ead.

Cunilidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 661: trib. Saturear. Gen.: Collinsonia, Cunila.

Cunina Clos 1849 in Gay Fl. Chil. III. p. 201: nov. g. Guettardear. (C. Sanfuentes.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 984: g. Euguettardear.

Cunninghamia*) Schreb. 1791. Gen. II. p. 789. n. 1720: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 615. n. 204.
Batsch 1802. Tab. p. 233: g. Coffeacear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 410. n. 406; 1830. Gen. I. p. 91. n. 453: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 459.
= Malanea Aubl.

Cunninghamia „R. Brown" A. Rich. 1826. Conif. p. 80. 149. t. 18: nov. g. Abietinear. (Pinus lanceolata Lamb.) — Par. Endl. 1841. Ench. p. 141. n. 1796. — Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). — Brongn. 1843. En. genr. p. 136; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 463.
Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1728: g. Abietinar. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 260. n. 1796. — Link 1841. Linnaea XV. p. 539.
Link 1830. Abh. Berl. Ak. f. 1827. p. 157: g. Dammaracear.
Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2372: g. Araucariear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 360.
Zucc. 1842 in Endl. Spl. II. p. 25. n. 1798: g. Cunninghamiear. Sect.: Belis, Arthrotaxis. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 192; 1847. Gen. Spl. IV. p. 7. n. 1806. (restrict.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Abietear.
Synon. Belis Salisb.; Jacularia Rafin.

Cunninghamieae Zuccar. 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 25: trib. Abietinear. Gen.: Sciadopitys, Cunninghamia, Damara. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 80; 1847. Gen. Spl. IV. p. 5. Gen.: Dammara, Cunninghamia, Arthrotaxis, Sequoia, Sciadopitys.

Cunninghamites Presl 1838 in Sternb. Vers. II. p. 203. t. 48. 49: g. Coniferitum.
Endl. 1842. Spl. II. p. 27. n. 1805: g. Abietinar. foss.

*) Dicat. Rich. Cunningham

Cunninghamites Presl cont.
Unger 1845 Syn. pl. foss. p. 201; 1846. Chlor. prot. p. LXXV: g. Abietinear. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 305; 1847. Gen. Spl. IV. p. 13. n. 1816/30. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 117.

Cunonia*) Büttn. 1750. De Cunon. (Amstelod.) = Antholyza Linn.

Cunonia Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1025. 1368. n. 1136; 1762. Sp. ed. II. p. 569; 1764. Gen. ed. VI. p. 222. n. 556; 1767. Syst. ed. XII. p. 302. n. 552: g. Decandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 342; 1784. Syst. p. 410. — Reich. 1778. Gen. p. 227. n. 605. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 300. n. 761. — Gmel. 1791. Syst. p. 703. — Pers. 1797. Syst. p. 439; 1805. Ench. I. p. 486. n. 1108. — Willd. 1799. Sp. II. p. 634. n. 884.
Gled. 1764. Syst. p. 97. n. 402: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 201: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 225: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 310: g. Saxifragis aff.
Neck. 1790. El. II. p. 385. n. 1201: g. Ypsoophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 284: g. Saxifragear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 29. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 221. — Link 1821. En. I. p. 411.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 344. t. 225
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 133: g. Saxifrageis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 328. n. 1293.
R. Brown 1814. Flind. voy. App. III. p. 549 (Verm. bot. Schr. I. p. 41): g. Cunoniacear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 867. — Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4211. — Meisn. 1838. Gen. p. 138 (101). — Brongn. 1843. En. genr. p. 108.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 511: g. Rhododendrear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 361. n. 1691: g. Ericear.
D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. IX. p. 92: g. Cunoniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 313. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 374. n. 1889. — DC. 1830. Pr. IV. p. 12. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 201. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 10. — Endl. 1839. Gen. n. 4662. p. 819; 1841. Ench. p. 409. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1524. — Rchb. 1841. Nom. p. 159. n. 6215. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 464. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 31.
Rchb. 1837. Hdb. p. 230: g. Weinmanniear.
Lindl. 1837. Veg. kd. p. 572: g. Weinmannear.
Synon. Osterdykia Burm.; Osterdikia Scop.

Cunoniaceae R. Brown 1814. Flind. voy. App. III. p. 548 (Verm. bot. Schr. I. p. 40): novus ordo plantar. Gen.: Weinmannia, Cunonia, Ceratopetalum, Calycomis, Codia; Bauera?

*) Dicat. Joh. Christiano Cuno, mercatori Amstelodamensi.

Cunoniaceae R. Brown cont.
Juss. 1818. Dict. v. 12. p. 222: fam. Peripetalear. Gen.: Codia, Callicoma, Ceratopetalum, Weinmannia, Cunonia; Itea?
DC. 1819. Théor. élém. p. 246: ordo Calyciflorar. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (apocarpar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 196. Tribus: Cunonieae, Codieae, Bauereae, Symphyogyneae.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: fam. Calicunguliae.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 49: sect. Saxifragear. Gen.: Weinmannia.
Agdh. 1825. Cl. pl.; 1826. Isis p. 590: ordo Hypodicarpar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L: div. Corniculatar. Gen.: Bauera, Weinmannia, Cunonia, Ceratopetalum; Callicoma, Fothergilla, Itea, Cyrilla, Hydrangea; Philadelphus.
Rchb. 1828. Consp. p. 159: subdiv. Saxifragear. Gen.: Codia?, Callicoma; Ceratopetalum?, Bumalda?, Bauera, Weinmannia, Cunonia; Vahlia, Plectronia?; Cyrilla, Itea, Hydrangea; Forgesia.
D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. IX. Apr. p. 84. Tribus: Cunonieae, Bauereae, Geissoideae. *Cf.* Endl. in R. Brown Verm. bot. Schr. V. p. 350 adnot.
Bartl. 1830. Ord. p. 312: ordo (180) Succulentar. Divis.: Cunonieae, Hydrangeaceae, *Desciscentes* (gen.: Itea, Cyrilla, Forgesia?).
Presl 1831. Rel. Hänk. II. 1. p. 50: trib. Saxifragacear. (Gen.: Weinmannia.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 138 (101). Gen.: Weinmannia, Leiospermum, Caldeluvia, Arnoldia, Pterophylla, Cunonia, Calycomis, Platylophus, Schizomeria, Ceratopetalum, Codia, Hoteia, Belangera, Callicoma, Gumillaea, Ochranthe, Adenilema? — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 398. Gen. Cunoniear. Endl. et Lamanonia.
Lindl. 1833. Nix. p. 22: ordo Saxalium.
Mart. 1835. Consp. p. 48: ordo 223.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 3: fam. (67) Succulentar. Trib.: Cunonieae, Bauereae, Philadelpheae, Hydrangeae, Escallonieae.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 162) 1847. Veg. kd. p. 571: ordo Saxifragalium. Trib.: Weinmanneae, Belangereae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 108: trib. Saxifragear. Gen. e Cunonieis DC. et Bauera.

Cunoniariae Rchb. 1837. Handb. p. 230; 1841. Nomencl. p. 159: div. Corniculatar. Subdivis.: Brunieae, Weinmannieae (1841 Cunonieae), Bauereae.

Cunonieae D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. IX. p. 84: trib. Cunoniacear. Gen.: Weinmannia, Leiospermum, Caldeluvia, Platylophus, Cunonia, Arnoldia, Pterophylla, Calycomis, Callicoma, Ceratopetalum, Schizomeria, Codia, Belangera. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 197. Gen. ead. exceptis 2 ultimis. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 4. Gen. ut DC.
Bartl. 1830. Ord. p. 313: div. Cunoniacear. Gen.: Callicoma, Ceratopetalum, Cunonia, Weinmannia; Bauera.
DC. 1830. Pr. IV. p. 7: trib. Saxifragacear.

Cunonieae D. Don cont.
Gen.: Codia, Callicoma, Dieterica, Weinmannia, Belangera, Cunonia, Arnoldia, Ceratopetalum.
Endl. 1839. Gen. p. 817; 1841. Ench. p. 409: subordo Saxifragacear. Gen.: Codia, Callicoma, Calycomis, Aphanopetalum, Ceratopetalum, Schizomeria, Platylophus, Anodopetalum, Weinmannia, Leiospermum, Ackama, Pterophylla, Arnoldia, Gumillea, Caldeluvia, Cunonia, Geissois, Belangera; Bauera; Adenilema; Pellacalyx.
Rchb. 1841. Nom. p. 159: subdiv. Cunoniariar. Gen. ut Endl. (exclusis 4 ultimis: Bauereis).

Cunto Adans. 1763. Fam. II. p. 446: g. Cistor. (*Rheede* Malab. V. t. 15 = Dörrienia Dennst.)
= Acronychia Forst.

Cupa-Veela „Rheede Hort. Malab. IX. t. 33" A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 382: sect. Vincae. (V. pusilla Mur.)

Cupa-Vleea A. DC. Prodr. VIII. p. 382: sphalm. pro *Cupa-Veela*.

Cupadessa Hassk. vid. *Cipadessa Blume*.

Cupameni Adans. 1763. Fam. II. p. 356: g. Tithymalor. (*Rheede* Ht. Malab. X. t. 81.)
= Acalypha Linn.

Cupania*) Plumier 1703. Gen. p. 45. t. 19.
Linn. 1737. Gen. p. 339. n. 848; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 200; 1759. Syst. ed. X. p. 941. n. 246; 1762. Sp. ed. II. p. 290; 1764. Gen. ed. VI. p. 110. n. 279: g. Pentandr. Monogyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 42. n. 165: g. Thalamostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 355: g. Tithymalor.
Linn. 1767. Syst ed. XII. p. 636. n. 279: g. Monoec. Adelph.
Murr. 1774. Syst. p. 772; 1784. Syst. p. 864: g. Monoec. Monadelph. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 499. n. 1182. — Pers. 1797. Syst. p. 909.
Scop. 1777. Intr. p. 325: g. Disciferar.
Swartz 1788. Prodr. p. 61; 1791. Obs. bot. p. 364: g. Octandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 253. n. 645. — Gmel. 1791. Syst. p. 610. — Willd. 1799. Sp. II p. 327. n. 745. — Cram. 1803. Disp. p. 93. — Pers. 1805. Ench. I. p. 413. n. 930.
Juss. 1789. Gen. p. 249: g. Sapindis aff.
Neck. 1790. El. III. p. 373. n. 1809: g. Cyrtosiphytor.?
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 12: g. Saponacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 262. n. 1058.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 476: g. Sapindacear. — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 124. (verar.) — Kunth 1824. Syn. III. p. 162. — Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 385. t. 79. 80. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1279. — Brongn.

*) Dicat. Rev. Patri Francisco Cupani.

Cupania Plum. cont.
1843. En. genr. p. 87. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 464.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 344: g. Myristiceär.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 223: g. Sapindear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 612. Sect.: Trigonis, Molinaea, Odontaria?, Guioa? — Spreng. 1825. Syst. II. p. 220. n. 1456; 1830. Gen. I. p. 311. n. 1592. — Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 28. 41. t. 3. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 667. Sect. ut DC. et Dimereza, Tina. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 112. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 57. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (37. 38). — Endl. 1840. Gen. n. 5614. p. 1070; 1841. Ench. p. 561. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 285. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 379.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5212; 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 199. n. 7594: g. Cupaniear. Sect. (1828) ut DC. — Par. Blume 1849. Rumphia III.
Synon. Trigonis Jacq.; Vouarana Aubl.; Molinaea Juss.; Gelonium Gärtn.; Tina Röm. & Schult.; Stadmannia Lam.; Mischocarpus Blume; Guioa Cav.; Blighia Kön.; Akeesia Tuss.; Harpulia Roxb.; Bonannia Raf.; Dimereza Labill.; Diplopetalon Spreng.; Ratonia DC.; Erioglossum Guill. & Perr.; Digonocarpus et Trigonocarpus Fl. Flum.; Tripha Nor.

Cupanieae Rchb. 1828. Consp. p. 200 (1832. Fl. exc. p. 768); 1837. Handb. p. 285: subdiv. Sapindear. Gen.: Valentinia?, Stadmannia, Schleichera, Melicocca, Hypelate, Cossignia, Tina, Cupania, Dimereza, Toulicia, Thouinia, Euphoria, Schmidelia, Aporetica, Matayba?, Talisia, Blighia, Sapindus, Loxostylis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 199. Gen.: Toulicia, Enourea, Irina, Lepisanthus, Sapindus, Erioglossum, Matayba, Moulinsia, Cupania, Aphania, Talisia, Nephelium, Thouinia, Melicocca; Plösslea; Xanthoceras, Magonia.
Blume 1849. Rumphia III. p....: trib. Sapindacear. Gen.: Cupania, Dictyoneura, Hemigyrosa, Mischocarpus, Arytera, Lepidopetalum, Spanoghea.

Cupanioides Brongn. vid. *seq.*

Cupanoides Bowerbank 1840. Foss. fruits I. p. 69.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 237; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIV: g. Sapindacear. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 132 (*Cupanioides*).

Cupella Webb .... Phytogr. Canar. III. p. 86: sect. Cedronellae. (Dracocephalum canariense L.)

Cuphaea Mönch vid. *Cuphea P. Browne.*

Cuphantha*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 336: subsect. Xylostei. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 449. — Endl. 1838. Gen. n. 3337 *B c.* p. 569; 1841. Ench. p. 282.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2735. 3: sect. Xylostei.

Cuphantha Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 362: sect. Symphoricarpi (S. vulgaris et racemosus.)

Cuphea P. Browne 1756. Jamaic. p. 216: nov. g. Decandr. Monogyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 107.
Adans. 1763. Fam. II. p. 234: g. Salicariar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 332. — Batsch 1802. Tab. p. 79. — Pers. 1807. Ench. II. p. 8. n. 1183. — Spreng. 1818 Anl. II. 2. p. 708; 1825. Syst. II. p. 455. n. 1766; 1830. Gen. I. p. 390. n. 1958. — Link 1822. En. II. p. 4. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 195. — Kunth 1824. Syn. III. p. 454. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 11.
Jacq. 1772. Hort. Vindob. II. p. 83: g. restrictum.
Scop. 1777. Intr. p. 211: g. Dumosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 210. t. 44. f. 9 (viscosissima).
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 64. *Cf. Lythrum Cuphea Medic.* Vorles. IV. 1. p. 216.
Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 66. t. 11: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 870. n. 952; 1809. En. p. 498.
Mönch 1794. Meth. p. 664 (*Cuphaea*): g. Calycostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 304: g. Calycanthemar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 178: g. Lythrariar. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 226. — Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 454. — Link 1831. Hdb. II. p. 50.
A. St. Hil. 1815. Mém. Mus. II. p. 379: g. Salicariear. — Par. DC. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 76; 1828. Pr. III. p. 83. — Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4559 (sect.: Melanium, Cuphea); 1841. Nom. p. 172. n. 6651 (sect.: Aceteia, Aegialeia, Cuphea, Calycyboma). — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 713. — St. Hil. 1833. Fl. Bras. III. p. 94. t. 182—185. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 422. — Meisn. 1838. Gen. p. 117 (84). — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 544.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 304: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Ell. 1821. Sketch I. p. 546.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Lythrear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575.
Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 568: g. Lythrariear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 118. — Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 295. Char. emend.
Benth. 1839. Pl. Hartweg. p. 7: g. Lythracear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 483.
Endl. 1840. Gen. n. 6151. p. 1201; 1841. Ench. p. 643: g. Eulythrariear. — Par. Müll. 1857. Ann bot. IV. p. 689.

*) κοῦφος, levis.

Cuphea P. Browne cont.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 464 (*Cuphaea*, corrig. *Cyphaea*): g. Eulythrear.
Synon. Melanium et Parsonsia P. Browne; Parfonsia Scop.; Balsamona Vand.; Melvilla Anders.; Duvernaya Desp.; Banksia Domb.

Cuphea Rchb. 1841. Nomencl. p. 172. n. 6651. 3: sect. Cupheae. (DC. §. 3. Lythroideae.)
Synon. Lythrum Medic.

Cuphocarpus Decaisne & Planch. 1854. Rev. hortic. 4e sér. III. p. . . .: nov. g. Araliacear.

Cupi Adans. 1763. Fam. II. p. 158: g. Caprifolior. (*Rheede* Malab. II. p. 27. t. 23.) = Cupia Röm. & Schult.

Cupia Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. 206: sect Canthii.
DC. 1830. Pr. IV. p. 393: g. Gardeniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 506. — Brongn. 1843. En. genr. p. 50.
Endl. 1838. Gen. n. 3293 *b*. p. 560; 1841. Ench p. 274: sect. Stylocorynae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2950. 2. — Walp. 1843. Rep. II. p. 517.
Synon. Cupi Adans.; Chomelia Linn.; Webera Schreb.; Tarenna Gärtn.; Zamaria Rafin.?; Rondeletiae sp. Linn.

Cupressaceae Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 444: ordo Monochlamydear. Gen. Cupressinear. Endl. 1847.

Cupresseae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 229: subordo Pinacear. Gen.: Juniperus, Thuiaecarpus, Thuja, Cryptomeria, Thujopsis, Cupressus, Retinispora, Callitris, Parolinia, Taxodium, Chamaepeuce.

Cupressideae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 225: fam. Monochlamydear. Gen.: Juniperus.

Cupressina C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 289: subsect. Omaliae.
Synon. Hypnum et Ptilium Sulliv.

Cupressinadelphus C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 215: subsect. Hypnellae.

Cupressinae Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 298: sect. Coniferar. Gen.: Juniperus, Thuya, Cupressus, Taxodium. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 3. (*Cupr. s. Galbuliferae.*) Gen.: Cupressus, Taxodium.
Agdh. 1825. Aphor. p. 212: trib. Coniferar. Gen.: Juniperus, Thuya, Taxodium, Cupressus.
Rchb. 1828. Consp. p. 80: div. Strobilacear. Gen.: Juniperus, Thuia, Callitris, Cupressus, Schubertia. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 161. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Cupressus), Junipereae.
Bartl. 1830. Ord. p. 95: ordo (65) Coniferar. Gen.: Thuja, Callitris, Cupressus, Taxodium, Juniperus. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 258. Gen. ead. et Pachylepis. — Endl. 1842. Sp. II. p. 224. Accedunt Cryptomeria, Thujopsis et Widdringtonia (loco Pachylepidis). Fossilia: Juniperites, Thuyites, Cupressites, Taxodites, Steinhauera, Thuyoxylum.
Link 1831. Hdb. II. p. 471: ordo 11 Amentacear. Gen. ut Bartl.

Cupressinae Rich. cont.
Kunth . . . . Hdb. p. 307; 1838. Berol. II. p. 225: div. Coniferar. Gen.: Juniperus, Taxus. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 168.

Cupressineae A. Rich. 1826. Mém. Conif. p. 137: div. Coniferar. Gen.: Juniperus, Thuya, Callitris, Cupressus, Taxodium. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 62. Gen. ead. et Parolinia, Cryptomeria.
Koch 1837. Syn. p. 665. Ed. II. p. 764: ordo Coniferar. Gen.: Juniperus, Cupressus. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 138. Gen.: Juniperus, Thuja, Cryptomeria, Thuyopsis, Cupressus, Callitris, Parolinia, Taxodium, Chamaepeuce. — Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). Gen. ead. exclusis Thuyopside et Chamaepeuce. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 188. Gen. foss.: Juniperites, Thuytes, Cupressites, Taxodium, Taxodites, Steinhauera, Brachyphyllum, Thuyoxylum. — Endl. 1847. Syn. Conif. p. 3; 1847. Gen. Spl. IV. p. 1. Divis.: Juniperinae, Actinostrobeae, Thuiopsideae, *verae* (gen.: Cupressus, Chamaecyparis), Taxodineae.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 303: fam. Coniferar. Gen.: Juniperus, Cupressus, Chamaecyparis, Platycladus, Thuya, Callitris, Frenela, Pachylepis, Schubertia, Cryptomeria. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 135; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 180. Gen. Cupressinar. Endl. 1842.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 120: trib. Coniferar. Gen. §. 1: Juniperites, Cupressites, Thuites, Callitrites, Frenelites. §. 2: Widdringtonites, Solenostrobus, Passalostrobus?, Taxodites, Glyptostrobites, Cryptomerites, Voltzia.
Karst. 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 216: fam. Strobuliferar.

Cupressinites Bowerbank 1840. Foss. fruits I. p. 52.
= seq.

Cupressites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 112; 1828. Prodr. p. 109; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 465: g. foss. Coniferar. — Par. Bronn 1828 in Leonh. Zeitschr. f. Min. p. 109. (Lethaea II. p. 42.) — Endl. 1837. Gen. n. 1812. p. 263; 1841. Ench. p. 147. — Göpp. 1838. Nov. Act. Leop. XVIII. 2. p. 568.
Endl. 1842. Spl. II. p. 25. n. 1796/3: g. Cupressinar. foss.
Unger 1842. Chlor. protog. p. 18. t. 8. 9 (1846. p. LXXII); 1845. Syn. pl. foss. p. 191: g. Cupressinear. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 277; 1847. Gen. Spl. IV. p. 12. n. 1816/3. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 120.
Synon. Cupressinites Bowerb.

Cupressus*) Tourn. 1700. Inst. p. 587. t. 358: g. pl. class. XIX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 315: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 336 in class. XVI.)
Linn. 1737. Gen. p. 294. n. 733; 1737. Cliff. p. 449; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p.

*) Conf. Wittst. Etym. Handw. p. 246.

Cupressus Tourn. cont.
288; 1753. Sp. II. p. 1002; 1759. Syst. ed. X. p. 1274. n. 958; 1763. Sp. II. p. 1422; 1764. Gen. ed. VI. p. 500. n. 1079; 1767. Syst. ed. XII. p. 633: g. Monoec. Monadelph. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 249. — Murr. 1774. Syst. p. 720; 1784. Syst. p. 861. — Reich. 1778. Gen. p. 496. n. 1177. — Lour. 1790. Coch. II. p. 580. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 652. n. 1458. — Pers. 1797. Syst. p. 906. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 208. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 511. n. 1713; 1809. En. p. 990. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 224. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 653.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 144. n. 602: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Coniferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 353. — Juss. 1789. Gen. p. 413. — Gis. 1792. Prael. p. 586. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 580. — Batsch 1802. Tab. p. 165. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 327. — Pers. 1807. Ench. II. p. 580. n. 2133. — Schoub. & Mirb. 1812. Bull. soc. philom. p. 122. — DC. 1815. Franç. V. p. 335. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 395. — Link 1822. En. II. p. 411. — D. Don 1825. Nepal. p. 55. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 889. n. 3149; 1831. Gen. II. p. 699. n. 3529. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 353.
Adans. 1763. Fam. II. p. 480: g. Pinuum.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 265: g. Monadelph. Tetrandr. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1007.
Neck. 1790. El. III. p. 267. n. 1659: g. Lepyrophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 64. t. 91.
Mönch 1794. Meth. p. 692: g. Calycostemonis.
Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 121: g. Galbuliferar. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 350.
Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 298: g. Cupressinar. — Par. HBK. Nov. gen. II. p. 3. — Agdh. 1825. Aphor. p. 212. — Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1722; 1829 ap. Mössl. III. p. 1588. 1715 (sect.: Cupressus, Schubertia); 1831. Fl. exc. p. 161. — Bartl. 1830. Ord. p. 95. — Link 1831. Hdb. II. p. 473. — Endl. 1837. Gen. p. 259. n. 1791. — Zucc. 1842 in Endl. Gen. Spl. II. p. 25.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 215: g. Juniperear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXVII.
A. Rich. 1826. Conif. p. 142. t. 9: g. Cupressinear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 666. Ed. II. p. 765. — Endl. 1841. Ench. p. 139. n. 1791. — Rchb. 1841. Nom. p. 62. n. 2366. — Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 323. Sejungitur Chamaecyparis. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 135; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 550 (*Cyprès*). — Endl. 1847. Syn. Conif. p. 55; 1847. Gen. Spl. IV. p. 4. n. 1798. (restrict.) — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 679.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Cupressear.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 445: g. Cupressacear.

Cupula Rchb. Nom. vid. *Capula Endl.*

Cupulaeformes Rebent. 1804. Pr. fl. Neom. p. 383: subdiv. Dermatothecior. Gen.: Peziza, Ascobolus, Hysterium, Aegerita.
Agardh 1821. Aphor. p. 85: subdiv. Hymenomycetum. Gen.: Cyphella, Solenia, Ascobolus, Peziza.

Cupulares Fries 1825. Pl. homon. p. 92: trib. Tremellinor. Gen.: Hirneola, Lemalis, Exidia. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 12. Gen. ead. — Endl. 1836. Gen. p. 35; 1841. Ench. p. 20. Gen. ead.

Cupularia Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: nov. g. Fuliginear. (Nomen.)
Link 1833. Hdb. III. p. 421.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 270: g. Physareor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489.
Synon. Craterii sp. Fries.

Cupularia (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 180: nov. g. Inulear. (Inula graveolens Desf. et viscosa Ait.) *Cf.* Rchb. Ic. fl. Germ. XVI. p. 18 et Müll. Ann. bot. V. p. 201.

Cupulati Fries 1823. Syst. myc. II. p. 35: ordo Hymenomycetum. Divis.: Pezizeae, Dermeae, Heteroclitae.
Fries 1825. Pl. homon. p. 85: trib. Elvellaceor. Gen.: Rhizina, Peziza, Ascobolus, Bulgaria.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 918: subdiv. Hymenomycor. Gen.: Peziza, Patellaria, Ascobolus, Bulgaria, Ditiola, Tympanis, Cenangium, Stictis.
Rchb. 1828. Consp. p. 13: subdiv. Helvellarior. Gen. ut Fries 1825.
Endl. 1836. Gen. p. 37; 1841. Ench. p. 20: trib. 3 Helvellaceor. Gen. ead. Accedit 1842 (Spl. II. p. 1) Cyttaria.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 331: subsect. Helvellaceor. Divis.: Dermei, Tympanidei.

Cupulati Endl. 1836. Gen. p. 36; 1841. Ench. p. 20: trib. 1 Helvellaceor. Gen.: Solenia, Stictis. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 11. Gen. ead. et Propolis, Cryptodiscus, Mellitiosporium.
= Stictei Fries.

Cupuliferae Rich. 1808. Anal. d. fr. p. 32. 92. Ed. Voigt (1811) p. 29. 105: nova fam. plant., ab Amentaceis sejuncta.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 53: fam. Juliaciae.
Agdh. 1825. Class. plant.; 1826. Isis p. 585: div. Amentacear. — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 56. Gen.: Quercus.
Blume 1829. Fl. jav. fasc. XI. XII. p. 3. Gen. jav.: Quercus, Lithocarpus, Castanea.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (82) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 99: ordo (70) Amen-

Cupuliferae Rich. cont. tacear. Gen.: Carpinus, Ostrya, Corylus, Fagus, Castanea, Quercus.
Lindl. 1833. Nix. p. 25: ordo Amentalium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 170.
Koch 1837. Syn. p. 638. Ed. II. p. 735: ordo Monochlamydear. Gen. ut Bartl.
Endl. 1837. Gen. p. 273; 1841. Ench. p. 159: ordo (8?) Juliflorar. Gen. ead. et Lithocarpus. Accedunt 1847 (Spl. IV. p. 22) Distegocarpus, Synaedrys. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257). Tribus: Coryleae, Quercineae, Fagineae. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 216. Gen. foss.: Quercus, Quercinium, Fagus, Fegonium, Carpinus.
Döll 1842. Flora II. p. 722: class. plantar. Ordines: Juglandeae, Carpineae, Fagineae.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 138: fam. Amentacear. Trib.: *verae* (sect.: Quercineae, Fagineae), Betuloideae; Betulaceae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 466. Gen. ut Endl.
Conf. Castaneae Adans., Corylaceae Mirb., Quercinae Juss.; Cupulifereae Blume.
Cupulifereae Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 18. p. 282 (et in Ind.).
Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 113: ordo Monochlamydear. Gen.: Fagus, Castanea, Quercus, Corylus, Carpinus, Ostrya.
= Cupuliferae Rich.
Curanga*) Juss. 1807. Ann. Mus. IX. p. 319: nov. g. Personatar. (Serratula amara Rumph.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 401: g. Scrofularinar.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 54 (p. 138 *Curania*): g. Scrophulariar. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 230.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 746: g. Scrophularinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3065: g. Veronicear.
Endl. 1839. Gen. n. 3941. p. 682; 1841. Ench. p. 339: g. Gratiolear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (220). — Walp. 1845. Rep. III. p. 284. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 466.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 408; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Lindernicar. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 687.
Synon. Serratula Rumph.; Caranga Vahl; Synphyllium Griff.
Curania Röm. & Schult. vid. *praeced.*
Curare Humb. (teste A. Juss.)
= Rouhamon Aubl.
Curatari Gmel. vid. *Couratari Aubl.*
Curataria Spreng. vid. *praeced.*
Curatella Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1079. 1373. n. 1151; 1762. Sp. ed. II. p. 748; 1764. Gen. ed. VI. p. 273. n. 679; 1767. Syst. ed. XII. p. 370: g. Polyandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 417; 1784. Syst. p. 502. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 579. t. 232. — Reich. 1778. Gen. p. 277. n. 733. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 365. n. 921. — Gmel. 1791. Syst. p. 833. — Pers. 1797. Syst. p. 538; 1807. Ench. II. p. 81. n. 1322. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1223. 1056.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Anonar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 450: g. Cistor.
Gled. 1764. Syst. p. 111. n. 457: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 259: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 282: g. Magnoliis aff.
Neck. 1790. El. II. p. 289. n. 1053: g. Synathrophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 9: g. Spiraear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 77: g. Magnoliaceis aff.
DC. 1818. Syst. I. p. 409: g. Delimacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 72. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (4). — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 22.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 231: g. Dilleniacear. — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 52. — Kunth 1824. Syn. III. p. 120. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 22. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 96.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 814; 1825. Syst. II. p. 610. n. 1972; 1830. Gen. I. p. 444. n. 2197: g. Dilleniear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 270. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 467.
DC. 1824. Pr. I. p. 70: g. Delimear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4975; 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7268. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 250. — Endl. 1839. Gen. n. 4759. p. 842; 1841. Ench. p. 432. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 417: g. Deliminear.
Curcas Adans. 1763. Fam. II. p. 356: g. Tithymalor. (Jatropha Curcas L.)
Medic. 1787. Malv. p. 118: g. Monadelph. Decandr.
Endl. 1840. Gen. n. 5806. p. 1114; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7396. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Meisn. 1841. Gen. p. 341 (253): g. Jatrophear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 313: g. Jatrophidear. Sect.: Eucurcas, Mozinna.
Synon. Bromfeldia Neck.; Bromfieldia Wittst.; Castiglionia Ruiz & Pav.; Jatropha Pohl. *Cf.* Mozinna Ort.
Curcubitella Walp vid. *Cucurbitella.*
Curculigineae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 58.
= Hypoxideae R. Brown.
Curculigo Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 63. t. 16. f. 11: nov. g. Scitaminum. (C. orchioides.)
Roxb. 1795. Corom. I. p. 14. t. 13: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 105. n. 636. — Pers. 1805. Ench. I. p. 362. n. 800. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 143.

*) Nomen vernaculum *Daun cucurangh.*

Curculigo Gärtn. cont.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 116: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 232. n. 943. — Schult. 1830. Syst. VII. p. XLV. 755.
R. Brown 1814. Prodr. I. p. 289. Ed. Nees p. 145: g. inter Asphodeleas et Amaryllideas medium.
R. Brown 1810. Flind. voy. II. App. 3. p. 576 (Verm. bot. Schr. I. p. 101): g. Hypoxidear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 164. — Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1218; 1841. Nom. p. 45. n. 1653. — Bartl. 1830. Ord. p. 42. Herb. 1837. Amaryll. p. 64. 83. — Endl. 1837. Gen. n. 1263. p. 173; 1841. Ench. p. 102. — Meisn. 1842. Gen. p. 397 (300). — Brongn. 1843. En. gen. p. 22. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 115. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 585.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 232: g. Narcissear.
Link 1821. En. I. p. 324: g. Liliacear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 60. n. 1207: g. Spathacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Curculiginear.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 16: g. Asparagear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 277. n. 1439: g. Asphodelear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1190.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Croceear.
Miq. 1840. Comm. bot. p. 108.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 154: g. Hypoxidacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 467.
Synon. Molineria Colla; Forbesia Eckl.

Curcuma*) Linn. 1737. Gen. p. 332. n. 829; 1740. Syst. p. 16; 1753. Sp. I. p. 2; 1759. Syst. ed. X. p. 842. n. 6; 1762. Sp. ed. II. p. 3; 1764. Gen. ed. VI. p. 4. n. 6; 1767. Syst. ed. XII. p. 50: g. Monandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 49; 1784. Syst. p. 51. — Reich. 1778. Gen. p. 4. n. 6. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 5. n. 8. — Lour. 1790. Coch. I. p. 7. — Gmel. 1791. Syst. p. 8 Pers. 1797. Syst. p. 50. — Willd. 1797. Sp. I. p. 14. n. 11. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 28. t. 151; 1819. III. p. 1. t. 201; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 20. Ed. 1832. p. 20.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 148. n. 612: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27: g. Scitaminum. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 275. (veror.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 66: g. Zingiberum. — Par. Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 45. — Endl. 1837. Gen. n. 1623. p. 223; 1841. Ench. p. 119.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Scitaminear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 93. — Gis. 1792. Prael. p. 188. — Batsch 1802. Tab. p. 104. — Pers. 1805. Ench. I. p. 4. n. 12. — Roxb. 1812. Asiat. research. XI.

*) Nomen officinarum, a Graecorum κούρκουμον.

Curcuma Linn. cont.
p. 518. *Cf.* Link Jahrb. I. 1820. p. 73. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 3. 30. — Agdh. 1823. Aphor. p. 184. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 10. n. 10; 1830. Gen. I. p. 5. n. 10. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 18. — Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 313. (p. 341 Curcumear.)
Hill 1769. Ht. kew. p. 239: g. Monopetalar. irregular.
Juss. 1789. Gen. p. 64: g. Cannar.
Neck. 1790. El. III. p. 141. n. 1481: g. Cratoophytor.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 157: g. Amomear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 3. 343. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 234. — Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1599. — Bartl. 1830. Ord. p. 61. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 156.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 285: g. Zingiberear. — Par. Rchb. 1841. Nom p. 56. n. 211. — Meisn. 1842. Gen. p. 388 (290).
Link 1821. En. I. p. 3; 1829. Hdb. I. p. 229: g. Alpiniacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Curcumacear.
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: g. Kämpferiear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 25: g. Zingiberacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 471. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 595.
Synon. Zerumbet Rumph.; Kua Medic.; Stissera et Erndlia Gis.

Curcumaceae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 56.
= Zingiberaceae Rich.

Curcummeae Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341: div. Scitaminear. Gen.: Curcuma.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 356: trib. Zingiberacear. Gen. id.

Curdiaea Harvey . . . . . . nov. g. Sphaerococcoidear. *Cf.* Bot. Zeit. 1858. Beil. p. 94.

Curinila Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXII. 275. n. 941: g. Pentandr. Monogyn. (*Curinil Rheede* Mal. VII. p. 47. t. 25.) *Cf. Reinera Dennst.*
= Cissus Linn.?

Curroria Planchon 1849. Niger Fl. p. 457: nov. g. Stapeliear. (C. decidua.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 69.

Cursonia Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 422: nov. g. Ericear. (C. peruviana.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 48. n. $2934/_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 343. — Walp. 1843. Rep. II. p. 681. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.

Curtia*) Chamisso & Schlechtend. 1826. Linnaea I. p. 209: nov. g. Scrofularinear. (Sabbatia verticillaris Spreng.)
Cham. 1833. Linnaea VIII. p. 13: g. Gentianear.

*) Dicat. Curt Sprengel.

Curtia Cham. & Schlecht. cont.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7: g. Scrophularinear. minus notum.
= Schübleria Mart.

Curtisia*) Aiton 1789. Hort. kew. I. p. 162: nov. g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 792. n. 1729. — Thunb. 1792. Nov. gen. VI. p. 100; 1794. Prodr. I. p. 28; 1818. Fl. cap. I. p. 518. — Willd. 1797. Sp. I. p. 687. n. 247. — Pers. 1805. Ench. I. p. 147. n. 315. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 347. — Hedw. 1806. Gen. p. 67. n. 325. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 16. 294. n. 499. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 499.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 245: g. Guttiferis aff.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 897; 1825. Syst. I. p. 442. n. 466: g. Sapotear.?
Link 1821. En. I. p. 145: g. Terebinthacear.?
A. Rich. 1825. Dict. class. V. p. 203.
DC. 1825. Pr. II. p. 12: g. Aquifoliacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3622. — Bartl. 1830. Ord. p. 377. — Meisn. 1839. Gen. p. 252 (161)?
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI: g. Celastrinear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 99. n. 494: g. Celastrinar.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 13: g. Cassiniear.
Meisn. 1838. Gen. p. 152 (109): g. Araliacear.?
Endl. 1839. Gen. n. 4577. p. 799; 1841. Ench. p. 397: g. (dubium) Cornear., a Reissek 1842 in Endl. Spl. II. p. 106 accuratius expositum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5566. — Brongn. 1843. En. genr. p. 114. — Endl. 1850. Spl. V. p. 17. n. 4574/$_1$. (verar.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 783: g. Cornacear.? — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 472.
Synon. Doratium Sol.; Sideroxylon Burm.; Relhamia et Junghansia Gmel.

Curtisia Schreb. 1789. Gen. I. p. 199. n. 508: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 498.
= Ochroxylum Schreb.

Curtogyne**) Haworth 1821. Revis. pl. succ. p. 8; 1828. Phil. Mag. III. p. 184: nov. g. Pentandr. Pentagyn. (Crassula undata et undulata Haw.)
DC. 1828. Pr. III. p. 392: g. Crassulear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 106.
Bartl. 1830. Ord. p. 310: g. Crassulacear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 81. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 303. — Brongn. 1843. En. genr. p. 106.
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): g. Umbilicear.
Synon. Cyrtogyne Rchb.

Curtoisia „Rchb." Endl. Gen. Suppl. II. p. 60 in synon. Eugiliae: vid. *Courtoisia Rchb.*

*) Dicat. Sam. Curtis.
**) κυρτός, curvus.

Curtopogon Palis. 1812. Agrost. p. 32: nov. g. Graminear. (Aristida dichotoma Rich.) *Cf.* Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 245. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 19. 398. n. 241. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 266. n. 275 (*Cyrtopogon*); 1830. Gen. I. p. 60. n. 294.
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 921 *b*: sect. Aristidae.
Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Stipacear.
= Aristidae sect. Chaetaria Palis.

Curupita Gmel., Batsch vid. *Couroupita Aubl.*

Cururu*) Plumier 1703. Gen. p. 34. t. 35.
= Paullinia Linn.

Curvembryae Bronn 1822. Diss. Legum. p. 131: subordo Leguminosar. Tribus: *decandrae* (Sophoreae), *diadelphae* (subtrib.: Genisteae, Trifolieae, Phaseoleae, Vicieae, Coronilleae, Galegeae), Dalbergieae, Intsieae.
= Papilionaceae DC.

Curvembryae Lindl. 1833. Nix. plant. p. 24: cohors Incompletar. Nixus: Chenopodales, Polygonales, Petivales, Sclerales, Cocculales.

Curvembryae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 621: div. Solanacear. Gen.: Nierembergia, Petunia, etc.

Curvembryae Miers in Lond. journ. bot. V. p. 148: vid. *Solanaceae.*

Cuscuta**) Tourn. 1700. Inst. App. p. 652. t. 422: g. pl. class. I. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 363. Ed. Hall. 1745. p. 27.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 297. t. 62. f. 6 (europaea).
Pfeiff. 1845. Bot. Zeit. p. 673; 1846. ibid. p. 18: g. Cuscutacear., emissis Epilinella et Engelmannia (serius Cuscutina) a Linnaeano discrepans. *Cf.* Walp. 1847. Rep. VI. p. 543 adnot.
DesMoul. 1853. Ét. org. s. l. Cusc.: g. Cuscutear.
Synon. Cassytha et Cuscuta Gray; Cassutha Vis.

Cuscuta Linn. 1737. Gen. p. 32. n. 89; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 124; 1759. Syst. ed. X. p. 900. n. 156; 1762. Sp. ed. II. p. 180; 1764. Gen. ed. VI. p. 66. n. 170; 1767. Syst. ed. XII. p. 129: g. ampliat. Tetrandr. Digyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 116. — Murr. 1774. Syst. p. 140; 1784. Syst. p. 167. — Reich. 1778. Gen. p. 69. n. 182. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 90. n. 227. — Gmel. 1791. Syst. p. 285. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 32; 1818. Fl. cap. I. p. 568. — Pers. 1797. Syst. p. 173. — Willd. 1797. Sp. I. p. 702. n. 262. — Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 69. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 3. t. 104; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 466; ed. 1832. I. p. 446. — Nutt. 1818. Gen. II. in Add. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 376. 459.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 468: g. Dicotyledonum Isostemonum.

*) Nomen americanum ex Pisone.
**) Nomen arabicum *Cossuth.*

Cuscuta Linn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 211. n. 881: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 461.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 245: g. Portulacar.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 71: g. Oliganthera r.
Hill 1769. Ht. kew. p. 144: g. Monopetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 487: g. Sedacear.
Scop. 1777. Intr. p. 190: g. Speciosar.
Walt. 1788. Carol. p. 14. 109. n. 111: g. Pentandr. Digyn. — Par. Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 175. — Cram. 1803. Disp. p. 61 (C. Epithymum, americana, etc.) et p. 34 in Tetrandr. Monogyn. (C. monogyna.)
Juss. 1789. Gen. p. 135: g. Convolvulis aff. — Par. Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 102.
Neck. 1790. El. II. p. 25. n. 647: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. IV. p. 2: g. ordinis incerti.
Batsch 1802. Tab. p. 242: g. Chordariar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 310: g. Convolvuleis aff.
DC. 1805. Franç. III. p. 643; 1815. V. p. 425: g. Convolvulacear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 289. n. 643. — Hedw. 1806. Gen. p. 81. n. 377. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 491. Ed. Nees p. 347. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 248. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 121. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XIX. 199. — Kunth 1823. Syn. II. p. 232. — D. Don 1825. Nepal. p. 99. — Hook. 1834. Fl. bor. am. II. p. 77. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 921. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 76. Sect.: Eucuscuta, Lupulus. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 473. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 503. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 185.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 465; 1825. Syst. I. p. 864. n. 1010; 1830. Gen. I. p. 215. n. 1109: g. Convolvulear. — Par. Ledeb. 1829. Alt. I. p. 293. — Brongn. 1843. En. genr. p. 55.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 345: g. Cuscutar. Distinguitur Cassytha.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Phytolaccear. *Cf.* Rchb. ibid. p. 251. 418.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4386: g. Basellear.
Link 1829. Hdb. I. p. 594: g. Cuscutinar. — Par. Koch 1837. Syn. p. 494. Ed. II. p. 569. — Meyer 1849. Fl. hanov. p. 363.
Bartl. 1830. Ord. p. 193: g. Cuscutear. — Par. Choisy 1833. Mém. Genèv. VI. p. 497 (*cf.* Flora Lit. V. p. 138); 1845 in DC. Pr. IX. p. 452. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 303. — Rchb. 1837. Hdb. p. 239; 1841. Nom. p. 166. n. 6442; 1844. Fl. sax. p. 326. — Kunth 1838. Berol. II. p. 31. — Endl. 1839. Gen. n. 3816. p. 655; 1841. Ench. p. 325. — Meisn. 1840. Gen. p. 272 (178). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 89. — Webb .... Canar.

Cuscuta Linn. cont.
III. p. 35. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 631.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 585: g. Amaranthear.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 230; 1847. Veg. kd. p. 634: g. Cuscutacear.
Engelm. 1842 in Sillim. journ. XLIII. p. 233; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 190: g. Cuscutinear. (disjuncta Lepidanche restrict.)
Vis. 1847. Fl. dalm. II. p. ... Sect.: Cassutha, Epilinella, Engelmannia, Ocimicida. *Cf.* Flora 1848. I. p. 9.
Conf. Cuscuta Tourn., Lepidanche Engelm., Epilinella et Cuscutina Pfeiff.
Cuscuta Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 39: g. Pentandr. Monogyn.
= Basella Rheede.
Cuscutaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 230) 1847. Veg. kingd. p. 633: ordo Solanalium. Gen.: Cuscuta, Lepidanche.
Pfeiff. 1845. Bot. Zeit. p. 673; 1846. ibid. p. 17: ordo plantar. Gen.: Cuscuta, Epilinella, Engelmannia (serius ibid. p. 492 Cuscutina). — Par. Pfeiff. 1847. Fl. Niederhess. p. 303. *Cf.* Buchinger 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 83.
DesMoul. 1853. Ét. Cusc. p. ... Tribus: Cuscuteae, Cuscutineae. *Cf.* Bot. Zeit. 1854. p. 889.
Trautv. 1855. Bull. Ac. Pet. XIII. p. 369.
Cuscutae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 345: sect. Convolvulacear. Gen.: Cuscuta, Cassytha.
Cuscuteae Presl 1821. Fl. Cech. I. p. 247.
Bartl. 1830. Ord. p. 192: ordo (116) Tubiflorar. Gen.: Cuscuta. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 272 (178). Gen. id.
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo Volvalium.
Choisy 1833. Mém. Genèv. VI. p. 405. 497: sect. Convolvulacear. Gen. id. — Par. Kunth 1838. Berol. II. p. 31. Gen. id. — Webb .... Canar. III. p. 35. Gen. id.
Mart. 1835. Consp. p. 22: ordo 125.
Rchb. 1837. Hdb. p. 239; 1841. Nom. p. 166: sect. Phytolaccear. Gen. id.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 253. 303: trib. Convolvulacear. Gen. id. — Par. Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 452. Gen. id.
Endl. 1839. Gen. p. 655; 1841. Ench. p. 325: fam. Tubiflorar., Convolvulaceis aff. Gen. id. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 89 (fam. 134). Gen. id.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 631: ordo Dicotyledonum monopetalar. Gen. id.
Cuscuteae DesMoul. 1853. Ét. organ. s. l. Cusc. p. ...: trib. Cuscutacear. Gen.: Cuscuta, Epilinella, Monogynella. *Cf.* Bot. Zeit. 1854. p. 889.
Cuscutina Pfeiff. 1846. Bot. Zeit. p. 492: g. Cuscutacear., antea *Engelmannia Pfr.* (Cuscuta suaveolens Ser.) — Par. Pfeiff. 1847. Fl. Niederhess. p. 305.
Garcke 1848. Fl. v. Halle p. 314: g. Cuscutinar.
Synon. Schrebera Linn.?; Pfeifferia Buching.; Buchingera F. Schultz; Ocimicida Vis.?; Cassutha DesMoul.

Cuscutinae Link 1829. Handb. I. p. 594: subordo Convolvulacear. Gen.: Cuscuta.
Koch 1837. Syn. p. 494. Ed. II. p. 569: trib. Convolvulacear. Gen. id.
Garcke 1848. Fl. Halle p. 313: div. Convolvulacear. Gen. id. et Cuscutina.

Cuscutineae Engelm. 1842. Monogr. in Sillim. Amer. journ. XLIII. p. 333; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 184: trib. Convolvulacear. Gen.: Cuscuta, Lepidanche. *Cf.* Flora 1843. p. 291 et Bot. Zeit. 1843. p. 380.

Cuscutineae DesMoul. 1853. Ét. org. s. l. Cusc. p. . . .: trib. Cuscutacear. Gen.: Cassutha, Succuta.

Cusimbua*) DC. 1836. Prodr. V. p. 650: sect. Porophylli. (An genus proprium? Cacalia Cusimbua Don.) — Par. Endl. Gen. n. 2582 *b.* p. 420; 1841. Ench. p. 239. — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3217. 2.

Cusparia „Humb. Tabl. géogr." R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 34): g. Diosmear. (indicat.)
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 142: g. Cuspariear.
Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 519: g. Meliacear.
= Galipeae Aubl. pars.

Cusparia Dietr. vid. *Casparia Kunth.*

Cusparieae DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 141: trib. Rutacear. Gen.: Cusparia, Ticorea, Galipea, Raputia, Monniera. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 729. Gen.: Monniera, Ticorea, Galipea, Erythrochiton, Diglottis. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 796. Gen. ut Rchb. 1828. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471. Gen. ut Rchb. 1841.
Rchb. 1828. Consp. p. 197: sect. Diosmear. Gen. ut DC. et Spiranthera, Almeidea. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 197. (genuinar.) Gen. ut 1828 et Lemonia.
Bartl. 1830. Ord. p. 388: div. Diosmear. Gen. ut Rchb.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 323. 347: trib. Diosmear. Gen. ead. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1150; 1841. Ench. p. 611. Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 276.
Rchb. 1837. Hdb. p. 282: subsect. Diosmear. Gen. ut antea omissa Almeidea.

Cuspidaria DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 239; 1821. Syst. II. p. 493; 1824. Prodr. I. p. 197: sect. Erysimi. (Cheiranthus cuspidatus Bieb.) — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 76. — Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4813 *b*: 1841. Nom. p. 182. n. 7026. 3. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 210. — Endl. 1839. Gen. n. 4908 *b.* p. 875; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 187. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 261.
Link 1831. Hdb. II. p. 315: g. Siliquosar.

Cuspidaria DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 125 (Rev. Bign. p. 9); 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 287; 1845. Prodr. IX. p. 177: g. Eubignoniear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 299 (207).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677: g. Bignoniacear.
= Nouletia Endl.

Cuspidaria C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 378: subsect. Mallacodii. (Hypnum cuspidatum L.)
Conf. Hemiragis Brid.; Calligeron Sull.

Cuspidaria Fée 1852. Gen. Fil. p. 88: nov. g. Vittariear. (Pteris tricuspis L., etc.)

Cuspidarieae A. Juss. in Orb. Dict. XII. p. 583: vid. *Tricuspidarieae Endl.*

Cuspidella DC. 1836. Prodr. V. p. 370: sect. Sphaeranthi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2395 *b.* p. 388; 1841. Ench. p. 235. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3572. 2.

Cuspidia Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 454: nov. g. Radiatar. (Gorteria cernua L.) *Cf.* Cassini 1820. Bull. soc. philom. Nov. p. 171.
Juss. 1806. Ann. Mus. VIII. p. 179: g. Corymbiferar. sect. 7.
Cass. 1818. Dict. v. 12. p. 251; 1821. v. 19. p. 234; 1823. v. 29. p. 448: g. Gorteriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2679. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14.
Bartl. 1830. Ord. p. 143: g. Arctotidear.
Less. 1832. Syn. p. 62: subg. Dideltae.
DC. 1837. Pr. VI. p. 503: sect. Dideltae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2843 *b.* p. 465; 1841. Ench. p. 245. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3644. 2.
Synon. Aspidalis Gärtn.

Cussambium Rumph. 1741. Amboin. I. p. 154. t. 57. „Vocari posset Staphylodendron indicum." *Cf.* Hamilt. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 356.
= Schleichera Willd.

Cussapoa St. Hil. vid. *Coussapoa Aubl.*

Cussarea Gmel., St. Hil., Hedw. vid. *Coussarea Aubl.*

Cusso s. Bankesia Bruce 1790. Voy. p. 22. 23.
= Brayera Willd.

Cussonia*) Thunb. 1780. Nov. Act. Upsal. III. p. 210. t. 12. 13; 1781. Nov. gen. I. p. 10; 1794. Prodr. I. p. 49; 1818. Fl. cap. II. p. 181: nov. g. Pentandr. Digyn. — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 25. n. 1378. — Murr. 1784. Syst. p. 292. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 177. n. 455. — Gmel. 1791. Syst. p. 492. — Pers. 1797. Syst. p. 309. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1355. n. 517; 1809. En. p. 297.
Juss. 1789. Gen. p. 218: g. Araliar.
Neck. 1790. El. I. p. 171. n. 284: g. Scadiophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 508: g. Umbellatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 41. — Link 1829. Hdb. I. p. 366.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 463: g. Araliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 189. n. 780. — Poir. 1818. Dict. v. 12.

*) *Cusimba-Sua* Nepalensium.

*) Dicat. Petro Cusson, prof. botan. Monspel.

Cussonia Thunb. cont. p. 254. — Schult. 1820. Syst. VI. p. xxii. 217. — Bartl. 1830. Ord. p. 238. — DC. 1830. Pr. IV. p. 255. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 387. — Rchb. 1837. Hdb. p. 221. — Meisn. 1838. Gen. p. 152 (109). — Endl. 1839. Gen. n. 4552. p. 794; 1841. Ench. p. 393. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 117. — Dietr. 1839 Syn. I. p. 581; II. p. 925 (*Gussonia*). — Brongn. 1843. En. genr. p. 114. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 473.
Link 1821. En. I. p. 259: g. Umbelliferar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 868. n. 1024; 1830. Gen. I. p. 217. n. 1119: g. Araliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5542.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3759: g. Saniculear.

Cussonia Comm. mss.
= Eliaea Cambess.

Custenia Steud. Nomencl. I. p. 456: vid. *seq.*

Custinia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 223. n. 958: g. Eredophytor.
= Tontelea Aubl.

Cutarea St. Hil. vid. *Coutarea Aubl.*

Cutleria Greville 1830. Alg. Brit. p. 60; 1830. Syn. p. xliv.
Menegh. 1838. Cenni p. 42; 1842. Alg. ital. p. 195: g. Dictyotear. (?) — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 29. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 766. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 39; 1848. Spec. Fuc. p. 103. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330 (Flora 1843. p. 93). — Endl. 1843. Spl. III. p. 25. n. 93. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97 (*Cuttleria*); 1843. Phyc. gener. p. 338; 1845. Phyc. germ. p. 271; 1849. Sp. Alg. p. 558. n. 364. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 182. — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 474; 1849. ibid. X. p. 56 (*Cuttleria*).
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 133: g. Chordariear.
Zanard. 1843. Classif. p. 10: g. Cutleriear. — Par. Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 446. (*Synon. Spatoglossum Kütz.*) — Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 241.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dictyotidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Stilophorear.

Cutlerieae Zanardini 1843. Classif. Fic. p. 10: trib. Antheridiear. Gen.: Cutleria. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 406, ubi sphalm. *Catlerieae.*
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 446: subtrib. Dictyotear. Gen. id.
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 241: fam. Phaeosporear. Gen. id.

Cuttera Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 170 (N.-York med. repos. II. Hex. V. p. 350): nov. g. ex typo Gentianae Saponariae L., etc.
= Gentianae sect. Coelanthae Fröl.

Cuttleria Kütz., Mont. vid. *Cutleria Grev.*

Cutubea St. Hil., Mart., Cham. vid *Coutoubea Aubl.*

Cuveracea Jones 1795. Asiat. research. IV. p. 281; Reuss Rep. Comm. II. p. 55. 117 (*Cuveraca*).
= Cedrelae sect. Toona. (Endl. Gen. p. 1055.)

Cuviera*) Köler 1802. Gram. p. 328.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 92 (*Cuvieria*): sect. Elymi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 842 *a.*
= Elymi Linn. pars.

Cuviera DC. 1807. Ann. Mus. IX. p. 222. t. 15: nov. g. Guettardacear. (C. acutiflora.) — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 210. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 257: g. Rubiacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. viii. 159. n. 880. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 396. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 760. n. 816; 1830. Gen. I. p. 174. n. 876. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 789.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 614: g. Guettardear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2102; 1841. Nom. p. 76. n. 2865. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 212. — DC. 1830. Pr. IV. p. 468. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 559. — Meisn. 1838. Gen. p. 167 (117). — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 254 (*Cuvieria*).
Endl. 1838. Gen. n. 3215. p. 544; 1841. Ench. p. 273: g. Euguettardear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 474.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.

Cuvieria Gray vid. *Cuviera Köl.*

Cuvieria A. Juss. vid. *Cuviera DC.*

Cyamopsis**) DC. 1825. Prodr. II. p. 215 (Lég. mém. VI): g. Trifoliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3878. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 200. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 196. — Meisn. 1837. Gen. p. 85 (61).
Guill. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 171.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 112: g. Glycinear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6647. p. 1291; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5803.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Indigoferear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 476: g. Kennedyear.
Synon. Cordaea Spreng.

Cyamus „Theophr." Smith 1804 Exot. Bot. I. p. 59. t. 31. 32: nov. g. Polyandr. Polygyn. (Nymphaea Nelumbo L.) *Cf.* Tratt. 1822. Flora II. p. 577. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 25. — Elliott 1821. Sketch II. p. 67.
Salisb. 1806 in Konig Ann. bot. II. p. 75: g. Nymphaeear.
Tratt. 1825. Gen. nov. pl. I. n. 8: g. Nymphaeacear. *Cf.* Flora 1825. II. p. 763.
= Nelumbium Juss.

---

*) Dicat. G. L. Chr. Fr. Dagob. de Cuvier, Zoologo.
**) *κύαμος*, vicia, faba.

Cyana „Rencalm." Borckh. inter synonyma Ciminalis: vid. *Cyane Rencalm.*

Cyanaea*) DC. 1821. Syst. II. p. 49; 1824. Prodr. I. p. 114: sect. Nymphaeae. (N. caerulea Sav.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 125.
Synon. Cyanea Endl.; Cyanymphaea Rchb.

Cyanaea Rchb. 1831. Fl. exc. p 423: sect. Gentianae. Subsect.: Gentianella, Eurythalia, Ericala, Pneumonanthe.

Cyanantheae Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 273 (180): trib. Polemoniacear. Gen: Cyananthus.

Cyananthos Lehm. 1853 in Otto's Hamb. Gart. Zeit. p. . . . : sect. Nymphaeae.

Cyananthus Wallich 1830. Catal. n. 1472. 1473.
Benth. . . . . in Royle Himal. p. 304. t. 69.
Endl. 1839. Gen. n. 3826. p. 658; 1841. Ench. p. 327: g. Polemoniacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 636; 1847. Bot. Regist. n. 6. (An Campanulacear.?) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 476.
Meisn. 1840. Gen p. 273 (180): g. Cyananthear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 108: g. Polemoniear. (?) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4397.
Benth 1846. Linn. Trans. XX. p. 82 not.: g. Campanulacear., Wahlenbergiae aff. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 388.

Cyanastrum Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 36. 39: secundum nomen pro *Cyanopside Cass.* propositum.

Cyanastrum DC. 1837. Prodr. VI. p. 558: subsect. Cyanopsidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2865 *A β.* I. p. 471; 1841. Ench. p. 246. - Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3649. I. *b. a.*

Cyane (*Κυανη*) Rencalm. 1611. Spec. hist. p. 69. (ic. p. 68.)
Griseb. 1836 in Hook. Fl. bor. am. II. p. 54; 1839. Gent. gen. p. 276; 1844. Rumel. II. p. 64: sect. Gentianae (G. asclepiadea L.)
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 17: subg. Gentianae.
= Pneumonanthe Neck. (Griseb. in DC. Pr. IX. p. 109.)

Cyanea Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 457. t. 75: nov. g. Lobeliacear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 699.
Cham. 1833. Linnaea VIII. p. 219: sect. Lobeliae.
Presl 1836. Prodr. Lobel. p. 47: g. Delissеacear. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 512. n. 3065. — A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 343.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572: g. Delissear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 476.
Conf. Kittelia Rchb.

Cyanea Endl. 1839. Gen. n. 5020 *a.* p. 900; 1841. Ench. p. 461: sect. Nymphaeae. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 168. Planch. 1853. Ann. sc. nat. 3e sér. XIX. p. 37. - Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 154.
= Cyanaea DC.

*) *κύανος*, coeruleus.

Cyanea „Rencalm." Endl. Gen. p. 600 in synon. Endotrichae: vid. *Cyane Rencalm.*

Cyaneae Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 571: sect. Jaceinear. Gen.: Melanoloma, Cyanus, Odontolophus, Lopholoma, Acrocephalus, Acrocentron, Hymenocentron, Crocodilium.

Cyanella Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 985. n. 386; 1762. Sp. ed. II. p. 443; 1764. Gen. ed. VI. p. 167. n. 420; 1767. Syst. ed. XII. p. 243. n. 416: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 272; 1784. Syst. p. 329. — Reich. 1778. Gen. p. 169. n. 453. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 222. n. 568. — Gmel. 1791. Syst. p. 553. — Pers. 1797. Syst. p. 351; 1805. Ench. I. p. 366. n. 805. — Willd. 1799. Sp. II. p. 131. n. 641. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 323
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792 Prael. p. 283.
Gled. 1764. Syst. p. 72. n. 300: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 83: g. Liliacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 237; 1825. Syst. II. p. 78. n. 1231. — Link 1821. En. I. p. 328. - Eckl. 1827. Verz. p. 4.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 68. t. 17. f. 7 (capensis).
Juss. 1789. Gen. p. 53: g. Asphodelor. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. xxxv. 492.
Neck. 1790. El. III. p. 180. n. 1533; g. Gonoophytor.
Thunb. 1794. Vet. Ac. n. Handl. p. 194.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 164: g. Asphodeloidear.
Batsch 1802. Tab. p. 132: g. Alliacear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 131: g. Asphodelear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 241. n. 979. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 261. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 266. n. 1384. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1142.
Agdh. 1823. Aphor. p. 168: g. Commelinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1396: g. Abamear.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: g. Anthericear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1144. p. 148; 1841. Ench. p. 84. — Rchb. 1841. Nom. p. 49 n. 1799. — Meisn. 1842. Gen. p. 401 (304). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 635. - Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 389. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 476.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 19: g. Hyacinthinear.

Cyaneus Ledeb. vid. *Cyanus Tourn.*

Cyanitis Reinwardt 1823. Catal. h. Bûitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Decandr. *Cf. Cianitis Reinw.*
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 5: g. Hydrangear.
Meisn. 1838. Gen. p. 137 (100): g. Hydrangeacear.
= Adamia Wall.

Cyanobotrys Zuccarini 1845. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. IV. 2. p. 28: nov. g. Dalbergiear., Andirae aff. *Cf.* Flora 1846. II. p. 427. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 255.

Cyanocephalus „Pohl mss." Benth. 1833. Labiat. p. 84: sect. Hyptidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 689. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *f.* p. 611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 6. — Walp. 1845. Rep. III. p. 530.

Cyanococcus A. Gray 1846. Mem. Amer. Ac. n. ser. III (Chlor. bor. Am. I. p. 53): subg. Vaccinii. — Par. Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 56. — Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1097.

Cyanodaphne Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 21. p. 333: nov. g. Cryptocaryear. (Haasia cuneata Nees.) — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 925.

Cyanoides Ponted. 1720. Diss. (Linn. 1747. Class. pl. p. 530): g. Radiator.
= Centaureae Linn. pars.

Cyanophyllum Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 324: nov. g. Clidemiear. (C. metallicum.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 751.
C. Koch 1857. Berl. Gartenz. p. 241: g. Miconiacear.

Cyanopis Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. vi: synonymum Cianthillii Blume.
DC. 1836. Pr. V. p. 69: g. Heterocomear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2206. p. 358; 1841. Ench. p. 232 (*Cyanopsis*). — Meisn. 1838. Gen. p. 176 (123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709 (*Cyanopsis*).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39 (*Cyanopsis*): g. Vernoniear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3870 (*Cyanopsis*): g. Pacourinear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 18: sect. Vernoniae.
Synon. Cyanthillium Blume; Isonema Cass.; Vernoniae et Conyzae sp. Auct.

Cyanopleura Spach vid. *Chaenopleura Rich.*

Cyanopsis Cassini 1816. Bull. soc. philom. Déc. p. 200; 1817. Dict. v. 7. p. 377: nov. g. Centauriear. (Centaurea pubigera Pers.)
Cass. 1820. Bull. soc. philom. p. 143; 1826. Dict. v. 44. p. 36. 39; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 571: g. Chryseidear. (verar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11. 77.
Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2694: g. Centaureear.
Bartl. 1830. Ord. p. 144: g. Centaureacear.
Synon. Cyanastrum Cass.

Cyanopsis DC. 1837. Prodr. VI. p. 558: sect. Amberboae (ampliata). Subsect.: Cyanastrum, Lacellia, Volutaria. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2865 *A β.* p. 471; 1841. Ench. p. 246. Subsect. eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3649. 1. *b.* Subsect. eaed.
Synon. Cyanopsis et Volutarella Cass.

Cyanopsis „Blume" Endl. Ench. p. 232, Spach, Rchb. vid. *Cyanopis Blume.*

Cyanopsis Schott 1851. Oestr. Prim. p. 12: subsect. Nothobritanicae. (Primula glutinosa Wulf.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 464. 469 (*Cyanopis*).

Cyanorchis Petit-Thouars ex Steud. Nomencl. I. p. 230. 457.
= Broughtonia R. Brown.

Cyanoseris Koch 1837. Syn. p. 432. Ed. II. p. 496: sect. Lactucae. (L. perennis L.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3008 *b.* p. 499; 1841. Ench. p. 250. — Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3704. 3. — Simil. Schultz Bip. 1841. Linnaea XV. p. 725.

Cyanospermum Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 259: nov. g. Euphaseolear. (Cylista tomentosa Roxb.)
Meisn. 1837. Gen. p. 94 (66): g. Phaseolear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 131.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 114: g. Rhynchosiear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6695. p. 1301; 1841. Ench. p. 672. — Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5845. — Walp. 1842. Rep. I. p. 790. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 478. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 166. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 568.

Cyanostegia Turczan. 1849. Bull. soc. Mosc. XXII. 2. p 35: nov. g. Verbenacear., Pityrodiae aff. (C. lanceolata, etc.) *Cf.* Flora 1850. p. 479.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 235: g. Viticear.

Cyanothamnus Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. xviii: nov. g. Rutacear., Boroniae aff. (C. ramosus et tenuis.)
Endl. 1840. Gen. n. 6005. p. 1155; 1841. Ench. p. 612: g. Boroniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7516. — Walp. 1842. Rep. I. p. 503. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Meisn. 1843. Comm. p. 347: g. Diosmear. — Par. Bartl. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 170; 1847. ibid. II. p. 227. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 479.

Cyanotis*) D. Don 1825. Pr. fl. Nepal. p. 45: nov. g. Commelinear., monente R. Brown a Tradescantia sejunctum. (Tr. cristata et axillaris L.) — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. lxii. 1150. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 544.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1171b: g. Ephemerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 40: g. Commelinacear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 122. — Lemaire 1849 in Orb. Dict. IV. p. 479.
Endl. 1837. Gen. n. 1032. p. 126; 1841. Ench. p. 71: g. Commelynacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 188. — Hassk. 1852. Pl. Jungh. II. p. 153.
Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1535: g. Commelynear. (genuinar.) — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 102; 1844. Abh. Berl. Ak. (1846.) p. 74. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 13.

*) κύανος, azureus; οὖς, ὠτος, auris.

Cyanotis D. Don cont.
Meisn. 1842. Gen. p. 406 (311): g. Tradescantiear.
Synon. Zygomenes Don.

Cyanotris Rafin. 1819. Amer. monthly mag.; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 262: nov. g. ex typo Heloniadis angustifoliae.
= Amianthium A. Gray.

Cyanotris Rafin. mss. in Herb. Mus. Vindob.
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1784: g. Scillear.
= Camassia Lindl. (Endl. Suppl. I. p. 1358.)

Cyanthillium Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 889: g. Carduacear. verar.
= Cyanopis Blume.

Cyanus Tourn. 1700. Inst. p. 445. t. 254: g. pl. class. XII. (ab Auctoribus varia latitudine adoptatum vel, praecedente Linnaeo, Centaureae insertum.)
Rupp 1718. Fl. jen. p. 170. Ed. Hall. 1745. p. 182: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1718. Act. Ac. Paris. p. 184: g. Cynarocephalar. — Par. Desp. 1804. Dict. v. 4. p. 481 (*Bluet*).
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 690: g. Capitatar. — Par. GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 172.
Adans. 1763. Fam. II. p. 117: g. Xeranthemor.
Hill 1769. Ht. kew. p 64: g. Associatar.
Juss. 1789. Gen. p. 174: g. Cinarocephalar. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 503. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 386.
Neck. 1790. El. I. p. 73. n. 129: g. Siphoniphytor.
Mönch 1794. Meth. p. 560: g. Petalostemonis.
DC. 1805. Franç. IV. p. 91; 1837. Pr. VI. p. 578: sect. Centaureae. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 483. — Link 1822. En. II. p. 356. — Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 537. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1540. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 392. — Koch 1837. Syn. p. 411. Ed. II. p. 472. — Endl. 1838. Gen. n. 2871 *p.* p. 474; 1841. Ench. p. 246 — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 454. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 3. Subsect.: Melanoloma, Cyanus, Odontolophus, Lopholoma, Spilacron, Acrolophus, Acrocentron, Hymenocentron, Crocodylium. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 233. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 698 (*Cyaneus*). — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 248. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 425. — Math. 1853. Belg. I. p. 301.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 158: g. Centaurear. Sect.: Lepteranthus, Cyanus, Zoegea.
Baumg. 1816. Fl. transylv. II. p. 81.
Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 377: g. Centauriear.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 441: g. Cynarocephalear.
Cass. 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 571: g. Cyanear.

Cyanus Tourn. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Centaureacear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11. 68: subg. Centaureae.

Cyanymphaea Rchb. 1841. Nomencl. p. 34. n. 1164. 3: sect. Nymphaeae.
= Cyanaea DC.

Cyata „P. Br." Adans. vid. *Cyathia P. Browne.*

Cyathanthera*) Pohl 1831. Pl. Brasil. II. p. 130. t. 188: nov. g. Melastomacear. (C. lanceolata.) *Cf.* Flora Litt. III. p. 198.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 42: g. Sonerilear.
Meisn. 1838. Gen. p. 112 (80): g. Miconiear. — Par. Dictr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1458.
= Cremanium Don.

Cyathea Smith 1791. Mem. Ac. Torin. V. p. 416; 1797 in Röm. Arch. I. 2. p. 55; 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 104: nov. g. Filicum (dorsiferar.) *Cf.* Brongn. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 479. — Par. Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 299. — Roth 1800. Germ. III. p. 93. (annulatar.) — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 6. 93 (annulatar.); 1806. Syn. Fil. p. 139. (gyratar.) — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 9. 65. — Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. II. p. 266. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 44. — Willd. 1810. Sp. V. p. 490. n. 1980. — Leman 1818. Dict. v. 12. p. 269. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 126. n. 3279; 1831. Gen. II. p. 725. n. 3675. (verar.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 322.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 18: g. Helicogyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. Journ. III. 3. p. 31: g. Gyrator.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 24: g. Polypodiacear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 88. — Agdh. 1822 Aphor. p. 117. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 254. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 244. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.)
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262: g. Cyathear. — Par. J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 419; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 663 — Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 14. Subgen.: Notocarpia, Eucyathea. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80. — Hook. f. 1855. N.-Zeal. II. p. 6.
Rchb. 1828. Consp. p. 37. n. 679: g. Cytheacear. — Par. Endl. 1833. Norf. p. 15; 1836. Gen. n. 653. p. 63; 1841. Spl. I. p. 1351; 1841. Ench. p. 37. Sect. (1841): Schizocaena, Notocarpia, Disphenia, Cnemidaria. — Presl 1836. Pterid. p. 54. (restrict.) — Link 1841. Fil. h. Berol. p. 35. — Meisn. 1843. Gen. p. 434 (335). — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 111.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Rhizospermar.
Kunze 1834. Linnaea IX. p. 100: g. Cyatheoidear.

*) κύαθος, poculum, cyathus.

Cyathea Smith cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 30. n. 1050: g. Cyatheear. Sect. ut Endl. (Cyathea loco Schizocaenae.)
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. V. p. 346: g. Cyathinear. Subgen.: Notocarpia (Schizocaena Sm.), Cyathea (Eucyathea Hook.).
Fée 1852. Gen. Fil. p. 351: g. Eucyathear. *Synon.* Sphaeropteris Bernh.

Cyathea Lév., Math. vid. *Cyathia P. Browne, Fries.*

Cyatheaceae Rchb. 1828. Consp. p. 37: subdiv. Polypodiacear. indusiatar. Gen.: Alsophila, Chnoophora, Hemitelia, Cyathea.
Kunze 1834. Linnaea IX. p. 97: ordo Filicum. Divis.: Cyatheoideae, Trichomanoideae. — Par. Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 15. 106. Gen.: Cibotium, Balantium, Thyrsopteris, Alsophila, Hemitelia, Cyathea, Matonia.
Endl. 1836. Gen. p. 63; 1841. Ench. p. 37: subordo Polypodiacear. Gen.: Thyrsopteris, Hemitelia, Alsophila, Cyathea, Mattonia. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 35. Gen.: Cyathea, Cnemidaria, Hemitelia, Chnoophora, Matonia, Alsophila, Trichopteris, Metaxya.
Presl 1836. Pterid. p. 53: trib. Helicogyratar. Gen.: Cyathea, Disphenia, Cnemidaria, Hemitelia, Trichopteris, Metaxya, Alsophila, Matonia.
Meisn. 1843. Gen. p. 434 (335): trib. Polypodiacear. Gen. ut Endl.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 5; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 479; 1849. ibid. V. p. 694: trib. Filicum. Gen.: Matonia, Thyrsopteris, Cyathea, Schizocaena, Disphaenia, Cnemidaria, Hemithelia, Alsophila, Trichopteris, Metaxya.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 330. 346: ordo Helicogyratar. Trib.: Cyathineae, Hemitelieae.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. II. p. 278: subtrib. Polypodiacear.

Cyatheacites Sternb. 1838. Vers. II. p. 116: trib. Filicaceitum. Gen.: Gutbiera.

Cyatheae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 3. 17: div. Filicum. Gen. brit.: Woodsia, Trichomanes, Hymenophyllum.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262: subtrib. Polypodiacear. Gen.: Cyathea, Hemitelia, Alsophila, Woodsia, Chnoophora. — Par Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80. Gen.: Thyrsopteris, Schizochlaena, Hemitelia, Cnemidaria, Alsophila, Haplophlebia, Dicranophlebia, Metaxya, Trichipteris, Arachniodes, Gymnosphaera, Cyathea, Schizocaena, Disphemia, Cnemidaria, Matonia.
J. Smith 1842. Lond journ. bot. I. p. 659: trib. (7) Filicum. Gen.: Schizocaena, Hemitelia, Cyathea, Alsophila, Gymnosphera, Trichopteris, Metaxya. — Par. Hook. f. 1855. N.-Zeal. II. p. 6. Gen.: Cyathea, Alsophila, Dicksonia.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 14: trib. Polypodiacear. Gen.: Cyathea, Hemitelia, Alsophila.

Cyatheae Gray cont.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 14: trib. Polypodiacear. Gen.: Cyathea, Hemitelia, Alsophila.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 39. 345: trib. Helicogyratar. Subtrib.: Alsophileae, Hemithelieae, Eucyatheae.

Cyatheae J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 419: trib. Polypodiacear. Sect.: Cyatheae, Gleicheniaceae, Osmundaceae, Marattiaceae, Ophioglosseae.

Cyatheeoma Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. 2. p. 27: sect. Tecomae. (T. leptophylla.) — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p 758 (*Cyatheocoma*).

Cyatheeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 29: subdiv. Amphibolocarpar. Gen.: Thyrsopteris, Hemitelia, Alsophila, Metaxya, Chnoophora, Cyathea, Mattonia.

Cyatheites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 319: nov. g. Pecopteridum. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 86; 1846. Chlor. prot. p. XLVI.
Synon. Gutbiera Sternb.

Cyathella Decaisne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 332: g. Asclepiadear. (*Cynoctonum Meyer* non *Gmel.*)
= Cynoctonum Meyer.

Cyatheoideae Kunze 1834. Linnaea IX. p. 97: div. Cyatheaceae. Gen.: Alsophila, Hemitelia, Cyathea.

Cyathia P. Browne 1756. Jamaic. p. 78: g. Fungor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 6 (*Cyata*).
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 297: trib. Nidulariae.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489 (*Cyathea*): g. Nidularieor.
Math. 1853. Belg. II. p. 399 (*Cyathea*): sect. Cyathi.
= Cyathus Hall.

Cyathideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 566. 587: div. Gasteromycear. Gen.: Cyathus.

Cyathideae Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490 (*Cyathidés*): trib. Ectothecor. Sect.: Cyttariei, Pezizei, Agyriei, Cenangiei, Stictei.

Cyathidium Lindl. . . . . in Royle Himal. p. 251.
Endl. 1838. Gen. n. 2853 *a a* p. 468; 1841. Ench. p. 246: subsect. Lagurostemonis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3893. 1. *a.*
Synon. Lagurostemon E. Meyer.

Cyathidium „Cassini Dict. v. 53. p. 466“ Endl. Gen. p. 468. n. 2853 *a*: lege *Lagurostemon Cass.*

Cyathinae Batsch 1802. Tab. affin. p. 206: ordo Monopetalar. Familiae: Primulariae, Anagallideae.
Perleb 1838. Clav. class.: ordo Thalamanthar. Fam. 122—127. (Primulaceae, etc.)

Cyathineae Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 346: trib. Cyatheacear. Gen.: Cyathea, Disphenia, Cnemidaria.

Cyathisphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 87: g. Sphaeriear. (Sphaeria cupularis, vernicosa, etc.)

Cyathocalyx „Champion in Herb. Hook." Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 126: nov. g. Guatteriear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 63.

Cyathochaeta Nees 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 86: nov. g. Cladiear. (Carpha diandra R. Br.)
Steud. 1855. Glum. II. p. 159 (*Cyatochaete*): g. Rhynchosporear.

Cyathocline Cassini 1829. Ann. sc. nat. XVII. p. 34; 1830. Dict. v. 60. p. 581. 595: nov. g. Grangeinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 373. — Endl. 1838. Gen. n. 2398. p. 388; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 190 (128). — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Less. 1832. Syn. p. 202: g. Conyzear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28: g. Buphthalmear.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3575: g. Grangeinar.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 480: g. Baccharidear.

Cyathocnemis Klotzsch 1855. Begon. p. 220: nov. g. Begoniacear.

Cyathocoma Nees 1834. Linnaea IX. p. 300; 1835. X. p. 195: nov. g. Cladiear.
Kunth 1837. Cyperogr. p. 322: g. Rhynchosporear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $968/_1$. p. 1355; 1841. Ench. p. 63. (verar.) Sect.: Eucyathocoma, Ideleria. — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1446. (verar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 480. — Steud. 1855. Glum. II. p. 160 (*Cyatocoma*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Rhynchosporidar.

Cyathocoma Miq. vid. *Cyathecoma Blume.*

Cyathodes*) Labill. 1804. Nov. Holl. I. t. 81. 82: g. Pentandr. Monogyn. (C. glauca et disticha.) *Cf.* Schrad. n. Journ. III. 1. p. 120.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 539. Ed. Nees p. 395: g. Epacridear. emend. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 271. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLI. 471. n. 773. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 138. n. 687. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 634. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 163.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 520: g. Epacridum.
Cham. 1826. Linnaea I. p. 539.
Rchb. 1828. Consp. p. 127. n. 3338: g. Stypheliacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 158: g. Styphelicar. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 776. — Endl. 1839. Gen. n. 4271. p. 747; 1841. Ench. p. 367. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 740. — Meisn. 1839. Gen. p. 248 (156). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 433. — Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4801. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 480.
Synon. Stypheliae sp. Labill.; Lissanthis, Stypheliae et Trochocarpae sp. Spreng.; Ardisiae sp. Gärtn.

Cyathodiscus Hochstett. 1842. Flora I. p. 240: nov. g. Daphnoidear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 65. n. $2109/_1$: g. Aquilarinear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 410.
Meisn. 1843. Comm. p. 368: g. Lagettear.
= Peddiea Harv. (*Conf.* Hochstett. 1844. Bot. Zeit. p. 849.)

Cyathodium Kunze 1834 in Lehm. Pugill. pl. VI. p. 17: nov. g. Targioniear. *Cf.* Flora Lit. V. p. 168 et Ann. sc. nat. 2e sér. III. p 62. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 800. — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 480.
Endl. 1836. Gen. n. 462. p. 44; 1841. Ench. p. 26: g. Targioniacear. — Par. Nees 1846. Syn. Hepat. p. 577.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 490: g. Marchantiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 58: g. Targionear.

Cyathoglottis Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 55. t. 94: nov. g. Orchidear., Sobraliae proximum. (C. crocea et candida)
Endl. 1837. Gen. n. 1610. p. 219; 1841. Ench. p. 114: g. Arethusear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2184. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 481.
Lindl. 1840. Orchid. p. 430: g. Vanillear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 384 (287).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Vanillidar.

Cyathoideae Rchb. 1837. Handb. p. 139: subdiv. Amphibolocarpar.
= Cyatheoideae Kunze.

Cyathoidei Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: div. Gastromycetum. Gen.: Nidularia, Arachnion.

Cyathoides Micheli 1729. Nov. gen. p. 222. t. 102: g. pl. class. XVII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 17: g. pl. class. I.
= Cyathus Hall.

Cyatholoma Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 648: subsect. Stellanthes. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n 4313 *c* 21. p. 1411; 1841. Ench. p. 370.
Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 3 *c*: subsect. Actinianthes.

Cyathonema DC. 1846. Prodr. X. p. 34: sect. Borraginis.

Cyathophora Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 683: nov. g. Marchantiadear. (Marchantia androgyna L.)
= Preissia Nees?

Cyathophora DC. 1836. Prodr. V. p. 538: sect. Wedeliae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2496 *a*. p. 406; 1841. Ench. p. 238.
Synon. Niebuhria Neck.; Wedelia, Stemmodontia et Trichostemma, Trichostephus, Trichostephium Cass.

*) κυαθώδης: propter urceoli formam germen cingentis.

Cyathophorum Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 33. 52; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 466: nov. g. Diplopogonor. (Anictangium bulbosum Hedw.) *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 12. p. 273, Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 226 et Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 481.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 721: g. Hypophyllocarpor. peristomor. (et ibid. p. XLVI g. Jungermannoideor.)
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 299: sect. Hookeriae.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 537: g. Hypophyllocarpior.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: g. Hypopterygiear. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 120.
C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 14: g. Hypopterygiacear.
Synon. Pterigophylli sp. Auct.

Cyathorhachis „Nees mss." Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 403: nov. g. Andropogonear. (C. Wallichiana.)

Cyathospermum Wallich mss. ex D. Don Fl. Nepal. p. 132.
= Gardneria Wall.

Cyathostemon Turczan. 1852. Bull. Ac. Petersb. X. p. 331: nov. g. Myrtacear., Rinziae aff. (C. tenuifolius.)

Cyathostyles Schott mss.
= Cyphomandra Sendtn.

Cyathula*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 101. Ed. Willd. p. 124: nov. g. Pentandr. Monogyn. (C. geniculata = *Auris canina Rumph.*), a Juss. 1803. Ann. Mus. II. p. 135 ad Achyranthem reductum.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 548: g. Amaranthacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4384: g. Achyranthear.?
Bartl. 1830. Ord. p. 298: g. Amarantacear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 249. — Hassk. 1852. Pl. Jungh. II. p. 133.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 325: g. Desmochaetear. Sect.: Telostachys, Polyscalis. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1044.
Synon. Pupalia Mart.; Desmochaeta HBK.; Syama Jones; Polyscalis Wall.

Cyathus Hall. 1768. Helvet. III. p. 127.
Wigg. 1780. Holsat. p. 106: g. Fungoidear.
Roth 1788. Germ. I. p. 541: g. Fungor. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1461. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 283. — Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 317.
Juss. 1789. Gen. p. 6: g. Lichenum.
Pers. 1797. Tent. disp. p. 16. 58: g. Sarcothecii.
Pers. 1801. Syn. Fung. p. xv. 236: g. Sarcospermor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 359. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 50.
Batsch 1802. Tab. p. 269: g. Fungoideor.
DC. 1805. Franç. II. p. 269: g. Angiocarpor.
Nees 1816. Syst. p. 139; 1817. Ueberbl. p. 37: g. Angiogasterum. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 389. — Spreng. 1827.

Cyathus Hall. cont.
Syst. IV. p. 414. n. 3463; 1831. Gen. II. p. 762. n. 3886.
Fries 1818. Symb. p. 2.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Pisocarpior.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 587: Cyathidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69: g. Nidulariar. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 398. Sect.: Cyathea, Nidularia.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 562: g. Nidulariear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 870: g. Pyrenomycetum astomor.
Endl. 1836. Gen. n. 344. p. 29; 1841. Ench. p. 17: g. Nidulariaceor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 409. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 305. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42. — Bonord. 1851. Hdb. p. 233.
Schnitz 1842. Linnaea XVI. p. 141. (Morphologia.)
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 25; 1842. Mycol. p. 103: g. Nidulariacear. — Par. L. & C. Tulasne 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 66. Sect.: Cyathus (Rhabdocyathi), Olla (Leiocyathi).
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 38; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Nidularieor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 438.
Synon. Cyathoides Mich.; Cyathia P. Browne; Cyata Adans.; Cyathea Lév.; Nidulariae sp. Bull.

Cyatochaete Steud. vid. *Cyathochaeta Nees.*

Cyatocoma Steud. vid. *Cyathocoma Nees.*

Cybbanthera „Hamilt. mss." D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 87: nov. g. Scrophularinar. (C. connata.)
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3161: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111: g. Gratiolear.
= Limnophila R. Brown.

Cybele Knight & Salisb. 1809. Prot. p. 23.
= Stenocarpus R. Brown.

Cybelion Spreng. 1826. Syst. III. p. 679. 712. n. 2989: nov. g. Orchidear.
= Ionopsis Kunth.

Cybianthoides Miquel 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 296: sect. Cybianthi.

Cybianthus*) Martius 1829. Nov. gen. III. p. 87. t. 236: nov. g. Myrsinear. (C. penduliflorus.)
A. DC. 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 103; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 292; 1841. ibid. XVI. p. 78. 92; 1844. Pr. VIII. p. 115: g. Ardisiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 124. n. 4855. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 8. — Endl. 1839. Gen. 4220. p. 736; 1841. Ench

*) Nomen a corolla cyathiformi.

*) κύβος, cubus.

Cybianthus Martius cont. p. 359; 1842. Spl. II. p. 65. Sect. (1842): Eucybianthus, Nematanthera. — Meisn. 1839. Gen. p. 253 (162). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 374. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 482. — Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 291. Sect.: Eucybianthus, Cybianthoides, Weigeltia.

Cybiostigma Turczan. 1852. Bull. Mosc. Nr. 3. p. 155: nov. g. Büttneriacear., Büttneriae aff. *Cf.* Flora 1853. II. p. 734.

Cybistax „Martius mss.“ DC. 1840 in Meisn. Gen. pl. vasc. p. 300 (208); 1845. Prodr. IX. p. 198: nov. g. Eubignoniear. Pleostictidum.

Endl. 1841. Ench. p. 347. n. 4124 *d*: sect. Bignoniae.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677: g. Bignoniacear.

Synon. Phryganocydia Mart.; Bignoniae calycotomae DC. 1838.

Cycadaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 312.

= Cycadeae Rich.

Cycadeaceae Rchb. 1828. Consp. p. 40: fam. Anoegopteridum. Divis.: Ophioglosseae, Zamieae, Cycadeae.

Cycadeaceae Endl. 1836. Gen. p. 70; 1841. Ench. p. 49: ordo unicus Zamiar. Gen.: Cycas, Encephalartos, Zamia. Fossilia: Zamiostrobus, Palaeozamia, Zamites, Pterophyllum, Nilsonia, Cycadites, Mantellia. Accedit 1842 (Spl. II. p. 103) Hauffia.

Rchb. 1837. Hdb. p. 139: fam. Anoegopteridum. Divis.: Palaeocycadeae?, Cycadeae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 30. Gen. ut Endl.

Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 442: sect. Cycadear. Gen.: Cycas.

Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 148; 1846. Chlor. prot. p. LXI: ordo Zamiear. Gen.: Cycadites, Zamites, Pterophyllum, Nilssonia, Zamiostrobus, Cycadeoidea, Raumeria, Calamoxylon, Medullosa; Pachypteris?, Ctenis?, Carpolithus?

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 223: ordo Gymnogenar. Gen. ut Endl. et Dion, Macrozamia, Dipsacozamia.

Conf. Cycadeae Rich.; Cycadaceae Lindl.

Cycadeacites Sternb. 1838. Vers. II. p. 194: ordo plant. foss. Gen.: Cycadites, Calamoxylon, Zamites.

Cycadeacites „Presl“ Morris 1841. Ann. and Mag. n. h. VII. p. 115: g. Cycadear. foss.

Synon. Cycadites Br.

Cycadeae Rich. 1807 in Pers. Ench. II. p. 630: fam. quasi intermedia Palmas inter et Filices. Gen.: Cycas, Zamia.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 346. Ed. Nees p. 202: ordo Monocotyledonum. Gen. ead.

Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 299: ordo Coniferis aff. Gen. ead.

Rich. 1811. Anal. fr. Ed. Voigt p. 188: ordo Synorhizar. (ibid. p. 122 div. Coniferar.) Gen. ead.

Cycadeae Rich. cont.

DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Endogenar. phanerogamar.

Juss. 1820. Dict. v. 17. p. 281. Gen. ut Rich.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 67: fam. Spadiciae.

Agdh. 1822. Aphor. p. 134: ordo Spadicinar. Gen. ead. et Phytelephas?

Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXXII: ordo 6 Acotyledonum. Gen. foss.: Cycadites, Bucklandia.

A. Rich. 1826. Conif. p. 195: ordo Palmis aff. (sed dicotyledoneus). Gen.: Cycas, Zamia.

Rchb. 1828. Consp. p. 40; 1837. Hdb. p. 139: div. Cycadeacear. Gen. unicum: Cycas.

Brongn. 1829. Ann. sc. nat. XVI. p. 589.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65.

Link 1829. Hdb. I. p. 265: ordo 14 Endogenear. Gen. ut Rich.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (227) Gymnospermar. — Par. Lindl. 1833. Nix. p. 32.

Bartl. 1830. Ord. p. 93: ordo (63) Coniferar. Gen.: Zamia, Arthrozamia, Cycas. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 353 (264). Gen.: Cycas, Encephalartos, Zamia.

Kittel 1830. Flora II. p. 617: fam. Dicotyledonear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 135: trib. Spadicear. Gen. ut Agdh.

H. Mohl 1832. Abhandl. Münchn. Ak. X. p. 391. (Structura.)

Lehm. 1834. Nov. stirp. pug. sext. Gen.: Encephalartos, Zamia. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. III. p. 57.

Mart. 1835. Consp. p. 11: ordo 57.

Downing 1837. Sillim. Amer. journ. XXXII. p. 45. (Isis 1840. p. 179.)

Miquel 1838 in Dietr. & Otto Gartenz. VI. p. 321.

Morris 1841. Ann. and Mag. VII. p. 110. Nov. gen.: Ptilophyllum.

Miquel 1842. Mon. Cycadear. (Utr. fol.); 1843. Linnaea XVII. p. 676. Gen. viv.: Cycas, Macrozamia, Encephalartos, Zamia.

Münst. . . . . . . Gen.: Otozamites, Podozamites, Pterozamites.

Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 440: fam. Coniferar. Sect.: Cycadeaceae, Zamiaceae.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 136: fam. Cycadoidear. Gen. ut Meisn.

Göpp. 1844. Uebers. Arb. Schles. Ges. 1843. Gen. foss.: Cycadites, Zamites, Zamiostrobus, Pterophyllum, Nilsonia. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 812.

Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 37: fam. plant. foss. Gen.: Zamites.

Brongn. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 482. Gen. ut Miq. et Dion.

Miquel 1849. Tijdschr. voor Natuurl. Wet. II. p. 280. Gen.: Cycas, Dioon, Ceratozamia, Macrozamia, Encephalartos, Zamia.

Karst. 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 216: fam. Strobuliferar.

Cycadeae Rich. cont.
Miquel 1857. Ind. bat. II. p. 1076: ordo Phanerogamar. gymnospermar. Gen.: Cycas.
== Cycadeaceae Endl.

Cycadeoidea Buckland .... Trans. geol. soc. 2d. ser. II. p. 397.
Lindl. & Hutt. .... Foss. fl. II. t. 143.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 162; 1846. Chlor. prot. p. LXV: g. Cycadeacear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 108 (*Cycadoidea*): g. Cycadear.
Synon. Mantellia Brongn.

Cycadites Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXXII: g. Cycadear. foss. *Cf.* Flora 1827. I. p. 344. — Par. Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 99; 1828. Prodr. p. 93; 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 109. — Römer 1839. Verst. nd. Ool. p. 9. — Dunk. 1843. Progr. norddeutsch. Walderth. p. 7. — Göpp. 1844. Arb. Schles. Ges.
Endl. 1836. Gen. n. 712. p. 72; 1841. Ench. p. 50: g. Cycadeacear. foss. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 149; 1846. Chlor. prot. p. LXII.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 194: g. Cycadeacitum.

Cycadium Guillard 1839. Ann. sc. phys. II. p. 123: g. foss. Cycadear.? *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 132.

Cycadoidea Brongn. vid. *Cycadeoidea Buckl.*

Cycadoideae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XXXII. 136; class. Gymnospermar. Fam.: Cycadeae.

Cycas*) Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 482; 1753. Spec. II. p. 1188; 1759. Syst. ed. X. p. 1354. n. 1087; 1763. Sp. ed. II. p. 1658; 1764. Gen. ed. VI. p. 527. n. 1222; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 729: g. Palmar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 69. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 778. n. 1699. — Batsch 1802. Tab. p. 127. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 207. (anomal.) — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 274.
Linn. 1771. Mant. II. p. 166: g. Filicum. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 778; 1784. Syst. p. 925. — Reich. 1778. Gen. p. 554. n. 1285. — Juss. 1789. Gen. p. 16. — Gis. 1792. Prael. p. 594. — Pers. 1797. Syst. p. 966. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 68. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 48.
Thunb. 1782. Act. Holm. p. 286: g. Dioec. Polyandr. — Par. Lour. 1790. Coch. II. p. 632. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 844. n. 1838; 1809. En. p. 1022.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 229: g. Polyandr. Monogyn.
Neck. 1790. El. III. p. 307. n. 1707: g. Pocilmophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 862: g. Polyandr. Polygyn.
Smith 1802. Linn. Trans. VI. p. 312. t. 29. (Descriptio fructus.)
Rich. 1807 in Pers. Ench. II. p. 630. n. 2281; 1810. Ann. Mus. XVI. p. 299; 1811. Anal. fr. Ed. Voigt p. 122: g. Cycadear. —

*) Nomen e Theophrasto.

Cycas Linn. cont.
Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 347. Ed. Nees p. 203. — Agdh. 1822. Aphor. p. 134. — Link 1822. En. II. p. 432; 1829. Hdb. I. p. 266. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 907. n. 3198; 1831. Gen. II. p. 711. n. 3586. — A. Rich. 1826. Conif. p. 197. t. 24—26. — Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 432. — Rchb. 1828. Consp. p. 40. n. 752. — Bartl. 1830. Ord. p. 94. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 135 (sphalm. *Zycas*). — Morris 1841. Ann. and Mag. VII. p. 112. — Miq. 1840. Comm. phyt. III. p. 111; 1842. Mon. Cycad. p. 21; 1843. Linnaea XVII. p. 680; 1857. Ind. bat. II. p. 1077. — Meisn. 1842. Gen. p. 353 (264). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 136; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 485.
Roxb. 1832. Ind. III. p. 744: g. Dioec. Monandr.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 312: g. Cycadacear.
Endl. 1836. Gen. n. 704. p. 71; 1841. Ench. p. 50: g. Cycadeacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 30. n. 1068. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 442. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 225.
Blanco 1837. Filipin. p. 745: g. Monoec. Dodecandr.
Synon. Todda-Pana Rheede, Adans.; Olus calappoides Rumph?

Cycca Batsch vid. *Cicca Linn.*

Cyclachaena Fresen. 1836. Ind. sem. Francof. p. 4; 1838. Linnaea XII. p. 78: nov. g. Ambrosiear. (a DC. 1838 [Prodr. VII. 1. p. 288] Ivae, ab. Endl. 1841 [Spl. I. p. 1381] Euphrosynae cum dubio insertum). — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 285: g. Ivear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 976; 1847. VI. p. 155.
Synon. Picrotus Nutt.

Cycladenia Benth. 1850. Pl. Hartweg. p. 332: nov. g. Apocynear., Vincae aff. (C. humilis.)
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 38: g. Tabernaemontanear.

Cyclamen*) Tourn. 1700. Inst. p. 154. t. 68: g. pl. class. II.
Linn. 1737. Gen. p. 41. n. 116; 1737. Cliff. p. 49; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 47; 1753. Sp. I. p. 145; 1759. Syst. ed. X. p. 918. n. 184; 1762. Sp. ed. II. p. 207; 1764. Gen. ed. VI. p. 82. n. 201; 1767. Syst. ed. XII. p. 151: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 163; 1784. Syst. p. 194. — Reich. 1778. Gen. p. 84. n. 214. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 107. n. 262. — Gmel. 1791. Syst. p. 328. — Pers. 1797. Syst. p. 200; 1805. Ench. I. p. 171. n. 384. — Willd. 1797. Sp. I. p. 809. n. 298; 1809. En. p. 193.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 499: g. Dicotyledonum Isostemonum.

*) κύκλος, circulus. (Tourn.)

Cyclamen Tourn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 206. n. 853: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 177.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Preciar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 317. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 6. 73.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 97.
Adans. 1763. Fam. II. p. 231: g. Anagallidum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 183: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 186: g. Speciosar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 329; 1789. Phil. Bot. I. p. 185.
Neck. 1790. El. II. p. 30. n. 656: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 291: g. Primulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 233. — DC. 1805. Franç. III. p. 452. — Hedw. 1806. Gen. p. 96. n. 433. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 281. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XIV. 128. n. 655. — Link 1821. En. I. p. 159; 1829. Hdb. I. p. 416. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 303. — Bartl. 1830. Ord. p. 166. — Koch 1837. Syn. p. 592. Ed. II. p. 680. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 343. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 4.
Batsch 1802. Tab. p. 207: g. Primulariar.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 25. t. 183.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 385; 1825. Syst. I. p. 572. n. 613; 1830. Gen. I. p. 141. n. 704: g. Primulear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 642. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 56. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 23. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 69.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 128. n. 3356: g. Androsacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4201. p. 731; 1841. Ench. p. 356. — Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 488. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 459.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 406: g. Cyclaminear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 124. n. 4830: g. Cortusear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645: g. Primulidar.
Synon. Cyclaminus Caesalp., Scop.

Cyclamineae Rchb. 1831. Fl. exc. p. 406: subdiv. Primulear. Gen.: Cyclamen.

Cyclaminus „Diosc. & Plin.“ Caesalp. 1583. De plant. lib. 9. (Linn. 1747. Class. pl. p. 20.)
Scop. 1772. Carn. I. p. 135: g. Pentandr. Monogyn.
= Cyclamen Tourn.

Cyclandrophora Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 47: nov. g. Chrysobalanear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 353.
Endl. 1843. Spl. III. p. 103. n. 6410 *c*: sect. Moquileae.?
Blume 1855. Mél. bot. II. (Flora 1858. p. 255): sect. Parinarii. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 615.

Cyclanthaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 362.
Gardn. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 27. = Cyclantheae Poit.

Cyclantheae Poiteau 1822. Mém. Mus. IX. p. 34: nova fam. inter Aroideas et Pandaneas collocanda. Gen.: Cyclanthus.
Rchb. 1828. Consp. p. 71; 1837. Hdb. p. 158: div. Palmar. Gen.: Cyclanthus, Carludovica.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65.
Bartl. 1830. Ord. p. 67: div. Callacear. Gen. ut Rchb.
Schott 1832. Melet. p. 15: ordo Aroidear. Gen. ead. et Phytelephas.
Lindl. 1833. Nix. p. 35: ordo Pandalium.
Mart. 1835. Consp. p. 5.
Endl. 1837. Gen. p. 243; 1841. Ench. p. 133: fam. Pandanear. Gen. ut Rchb. et Wettinia. — Simil. Kunth 1841. Enum. III. p. 104. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 43: subdiv. Pandanear. Gen. ut Endl.
Meisn. 1842. Gen. p. 359 (268): trib. Pandanacear. Gen. ead. et Nipa, Phytelephas?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 14: fam. Pandanoidear. Gen. ut Rchb.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 23: trib. Pandanear. Gen. ut Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 132: subordo Pandanacear. Gen.: Carludovica, Nipa, Cyclanthus, Wettinia.
Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 436: subordo Pandanear. Gen. ut Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 416: fam. Spadiciflorar.

Cyclanthera Schrad. 1831. Ind. sem. h. Gotting.: nov. g. Cucurbitacear. (C. pedata.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 23. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 116.
Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 408: g. Cyclantherear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5143. p. 939; 1841. Ench. p. 491. — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 280. — Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3941. — Walp. 1843. Rep. II. p. 203. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 17. 101. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 489.
Meisn. 1838. Gen. p. 127 (92): g. Cucurbitear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 222. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Synon. Discanthera Torr. & Gray.?

Cyclanthereae Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 408: trib. Cucurbitacear. Gen.: Cyclanthera. — Par. Arnott 1841 Hook. journ. bot. III. p. 280. Gen. id.
Endl. 1839. Gen. p. 939; 1841. Spl. I. p. 1421; 1841. Ench. p. 491: div. Cucurbitear. Gen. id. et (1841) Discanthera.
Rchb. 1841. Nom. p. 101: subsect. Zygantherear. Gen. ead.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 17. 100: trib. Cucurbitear. Gen. ead.

Cyclanthus Poiteau 1822. Mém. Mus. IX. p. 35. t. 2. 3: nov. g. Cyclanthear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 71. n. 1613; 1841. Nom. p. 43. n. 1515. — Bartl. 1830.

Cyclanthus Poiteau cont.
Ord. p. 67. — Schott 1832. Melet. p. 15. — Endl. 1837. Gen. n. 1714. p. 243; 1841. Ench. p. 133. — Kunth 1841. Enum. III. p. 107. — Meisn. 1842. Gen. p. 359 (268). — Brongn. 1843. En. genr. p. 14. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 24. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 132. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 489.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 772. n. 3064; 1831. Gen. II. p. 682. n. 3439: g. Aroidear. (Monoec. Androgyn.)
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 38. t. 152.
Synon. Cyclosanthes Pöpp.

Cyclas Schreb. 1789. Gen. I. p. 282. n. 712: g. Decandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 674.
Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 773: g. Leguminosar. anomalar.
= Crudyae DC. pars.

Cyclea „Arn. & Wight" Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 309: g. Menispermacear. (Nomen.)
Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 36. 41: g. Cissampelidear. (Cocculus Burmanni.) — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 200 (injuncta Rhaptomeride). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 131.

Cycledium „Wallr." Endl. Gen. p. 33 in synon. Lecanidii: vid. *seq.*

Cycledum*) Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 510: nov. g. Hymenomycetum angiosporor.
= Lecanidion Endl.

Cyclium Steud. vid. *Cycnium E. Mey.*

Cyclobalanus Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 28. n. 1845 *C*: sect. Quercus.
Synon. Gyrolecana Blume?

Cyclobium Agardh 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.

Cyclobothra**) Don 1828 in Sweet Fl. gard. t. 20.
Lindl. 1834. Bot. Regist. XX. (n. ser. VII.) n. 1661. Char. emend. *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 52.
Bernh. 1835. Flora II. p. 596: sect. Calochorti. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1095 *b.* p. 140; 1841. Ench. p. 82.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1210 (*Cyclobothria*): g. Melanthacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1756: g. Tulipacear.
Mart. & Gal. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 383: g. Liliacear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 227: g. Tulipear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 264. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 204.

Cyclobothria Dietr. vid. *praeced.*

Cyclocampe***) Steud. 1855. Syn. pl. glum. II. p. 156: nov. g. Rhynchosporear. (C. Waigiouensis.) — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 339 (*Cyclocarpa*).

Cyclocarpa Miquel vid. *Cyclocampe Steud.*

*) κυκληδόν, circulo.
**) βόθρος, fossa.
***) καμπή, flexus.

Cyclocarpaea DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 232; 1821. Syst. II. p. 287; 1824. Prodr. I. p. 157: sect. Farsetiae. (Lunaria suffruticosa Vent.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4770 *c.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 174. — Endl. 1839. Gen. n. 4865 *b.* p. 867; 1841. Ench. p. 448.

Cyclocarpus Junghuhn 1840 in Hoev. & Vriese Tijdschr. VII. p. 210: nov. g. Terebinthacear.
= Boymia A. Juss.

Cyclocodon „Griff. Notul. III." Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1082: g. Wahlenbergiear. (Codonopsis parviflora Wall.)

Cycloderma Klotzsch 1832. Linnaea VII. p. 203: nov. g. inter Trichogastres et Myxogastres medium. (C. indicum.)
Endl. 1836. Gen. n. 327. p. 28; 1841. Ench. p. 17: g. Podaxideor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 385. — Bonord. 1851. Hdb. p. 254.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 24; 1842. Mycol. p. 98: g. Podaxidear.
Mont. 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 80: g. Podaxinear.
L. & Ch. Tulasne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 176: g. Podaxonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Podaxineor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 440. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505; VIII. p. 488.

Cyclodieae Fée 1852. Gen. Filic. p. 38. 277: trib. Cathetogyratar. Gen.: Polystichum, Phanerophlebia, Hemicardium, Amblia, Cyclodium, Cyrtomium, Podopeltis, Bathmium.

Cyclodium*) Presl 1836. Pterid. p. 85: nov. g. Aspidiariar. (Aspidium glandulosum Bl.) *Cf.* Presl 1850. Epimel. bot. p. 419.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 99: g. Aspidiacear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 640 *c.* p. 1349; 1841. Ench. p. 37: sect. Aspidii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1028. 3.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Aspidiear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 284: g. Cyclodiear.

Cycloglossum Presl 1843. Hymenophyll. p. 124: sect. Hymenophylli. (H. caespitosum Gaud. etc.)

Cyclogyne Benth. 1839 in Lindl. Veg. Swan-River p. XVI: nov. g. Galegear. (C. canescens.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6534. p. 1272; 1841. Ench. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5722. — Meisn. 1843. Comm. p. 351. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 496. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 488.

Cyclolepis Gill. & Don 1832. Phil. Mag. p. 392.
Hook. & Arn. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 109: subg. Gochnatiae?
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 28: g. Eumuti-

*) κύκλος: ob indusium orbiculare.

Cyclolepis Gill. & Don cont.
siear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 230 (142).
Endl. 1838. Gen. n. 2915 *a α*. p. 484; 1841. Ench. p. 248: subsect. Eugochnatiae.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10: g. Stähelinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3787: g. Chuquiragear.
Synon. Cyclopis Guill. (Cyclopsis Guill.?)

Cyclolepis Moquin-Tand. 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 203: nov. g. Chenopodear. (Salsola platyphylla Mich.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 238: g. Kochiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1929. p. 296; 1841. Ench. p. 181. — Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233).
Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6383: g. Betear. (p. 236 *Petermannia Rchb.*)
= Cycloloma Moq.-Tand.

Cyclolepsis „Don“ Endl. Gen. Suppl. I. p. 1385 (n. 2915): sphalm. pro *Cyclolepis Gill. & Don.*

Cyclolobeae C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Fl. Alt. I. p. 370: subordo Chenopodear. Tribus: Chenopodieae, Salicornieae, Atripliceae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 603. Ed. II. p. 693. Trib. eaed. — Endl. 1837. Gen. p. 292; 1841. Ench. p. 181. Trib. eaed. — Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. . . . Trib.: Anserineae, Spinacieae, Camphorosmeae, Corispermeae, Salicornieae.
Meisn. 1841. Gen. p. 319 (232): subordo Chenopodiacear. Trib. ut Meyer.
Rchb. 1841. Nom. p. 164: sect. Chenopodear. Divis.: Salicornieae, Atripliceae, Chenopodeae genuinae.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 315: subordo Atriplicear. Trib. ut Moq.-Tand. 1840.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 101: trib. Chenopodear. Gen. ex Endl.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 43: subordo Salsolacear. Trib. ut 1840. (Chenopodieae loco Anserinear.)

Cyclolobium Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 92; 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 63: nov. g. Dalbergiear. (*Cf.* Endl. 1842. Spl. II. p. 96.) — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6700. p. 1302; 1841. Ench. p. 672. — Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 5992. — Walp. 1842. Rep. I. p. 792. — Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 84. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 496.

Cycloloma Moquin-Tand. 1840. Chenop. mon. p. 17: g. Anserinear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 33. n. 1929: g. Kochiear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 102: g. Cyclolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 60: g. Betear.
Synon. Cyclolepis Moq.; Amoreuxia Moq.; Amorea Del.; Petermannia Rchb.

Cyclomorium Walp. 1843. Repert. II. p. 890. n. 6613/1: nov. g. Euhedysarear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. (?)

Cyclomyces Kunze in Sieb. Crypt. exsicc. n. 63. *Cf.* Klotzsch in Hook. Bot. Misc. II. p. 150. t. 79 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 188.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 332: g. Radularior.
Fries 1830. Linnaea V. p. 512; 1838. Epicr. p. 495; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 324: g. Polyporeor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 479. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 43; 1842. Mycol. p. 182. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 171. — Bail 1858. Syst. p. 25. t. 30.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 799. n. 4142: g. Pileator.
Endl. 1836. Gen. n. 449. p. 40; 1841. Ench. p. 21: g. Agaricinor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 486: g. Agaricineor.
Synon. Loxophyllum Klotzsch.

Cyclonema Hochstett. 1842. Flora I. p. 225: nov. g. Verbenacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664. — Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 489.
Meisn. 1843. Comm. p. 367: g. Lantanear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 77. n. 3708/1. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 101.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 675: g. Viticear.
Synon. Spironema Hochst.; Cyrtostemma Kunze.

Cyclopappus „Cass.“ Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 952: g. Erigerear. (Nomen.)

Cyclopeltis J. Smith 1846. Bot. Mag. . . . . . . (Aspidium semicordatum Sw.) *Cf.* Kunze 1850. Linnaea XXIII. p. 246.
Synon. Hemicardion Fée.

Cyclophorus Desvaux 1811. Berl. Mag. V. p. 300. t. 7. f. 4; 1813. Journ. bot. III. p. 19; 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 224 (non Zoolog.): nov. g. Filicum. (Polypodium adnascens Sw., Candollea heterophylla Mirb., etc.) *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 12. p. 290.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 364: g. Polypodiear. — Par. Presl 1850. Epimel. bot. p. 489.
Presl 1836. Pterid. p. 202: sect. Niphoboli. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 617 *a*. p. 1347; 1841. Ench. p. 36. — Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 1003. 2. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 262. (?)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
= Niphobolus Kaulf.

Cyclophyllum Griseb. 1839. Gen. et spec. Gentian. p. 154; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 64: sect. Canscorae.

Cyclophyllum Bunge . . . . Bull. Ac. Petersb. VIII. n. 16: sect. Pedicularis. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 269. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 679.
= Pedicularis sect. Verticillatae Stev.

Cyclopia Ventenat 1808. Decad. p. 8.
R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 5 (Verm. bot. Schr. II. p. 454): g. Leguminosar. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 291. — Link 1821. En. I. p. 401. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 348. n. 1643; 1830. Gen. I. p. 364. n. 1835. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1500.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 743: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 131. — DC. 1825. Pr. II. p. 101. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4081. — Bartl. 1830. Ord. p. 408. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 114. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 152. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 3. — Vogel 1836. Linnaea X. p. 595. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (58).
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 67; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 432: g. Eupodalyriear. Sect.: Eucyclopia, Ibbetsonia. — Par. Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 453. Sect. eaed. — Endl. 1840. Gen. n. 6422. p. 1255; 1841. Ench. p. 667. Sect eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5915: g. Podaliriear. Sect.: Cyclopia, Ibbetsonia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 126: g. Podalyriear.
Synon. Ibbetsonia Sims.

Cyclopis Guillem. 1833. Arch. II. p. 468. (An *Cyclopsis?* ex Wittst. Etym. Handw. p. 251.)
= Cyclolepis Gill. & Don.

Cycloplea Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 95: nov. g. Eulysigoniear. (Cyclotellae sp. Kütz.)

Cyclopogon Presl 1827. Reliq. Hänk. I. 2. p. 93: nov. g. Epipactear. *Cf.* Flora 1828. I. p. 343.
Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1434: g. Neottiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Endl. 1837. Gen. p. 213. n. 1547 *b*; 1841. Ench. p. 113. n. 1559 *b* (err. *Cycloptera*): sect. Spiranthis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2114. 2.
= Euspiranthes Lindl.

Cyclopoma Endl. 1836. Gen. n. 315 *c*. p. 27; 1841. Ench. p. 17: sect. Craterii.
Synon. Craterium Trentep.

Cyclopsis „Guill." Wittst. vid. *Cyclopis.*

Cycloptera R. Brown 1809. Linn. Trans. X. p. 176 (Verm. bot. Schr. II. p. 276); 1810. Prodr. I. p. 380. Ed. Nees p. 236: sect. Grevilleae. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 415. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 435. — Endl. 1838. Gen. n. 2143 *g*. p. 341; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 84. n. 2143 *B*. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 530. — Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2393. 7.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Grevillear.
Synon. Grevillea Knight & Sal.

Cycloptera Endl. Ench. p. 113. n. 1559 *b*: vid. *Cyclopogon Presl.*

Cyclopteris Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 9: g. Aspidiacear. (Polypodium fragile L.)
= Cystopteris Bernh.

Cyclopteris Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 61; 1828. Prodr. p. 51; 1828. Hist. vég. foss. I. p. 215; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 500; 1849. ibid. XIII. p. 65: g. foss. Filicum. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 677. p. 66; 1841. Ench. p. 43.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 65. 133: g. Filicitum.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 53; 1846. Chlor. prot. p. XXXVIII: g. Neuropteridum. — Par. M'Coy 1847. Ann. and Mag. XX. p. 148.
Synon. Adiantites Göpp.

Cyclopterygium Hochstett. 1848. Flora I. p. 175: nov. g. Orthoplocear. angustiseptar. (Schouwia arabica Schimp.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 55: g. Psychinear.
= Schouwia Jaub. & Sp.?

Cycloptychis „E. Meyer mss." Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 268: nov. g. Brachycarpear.? sect. propriae.
Endl. 1842. Spl. II. p. 74. n. 4976/1: g. Senebierear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 342. — Walp. 1843. Rep. II. p. 764.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Erucaridar. et denuo inter Senebieridas.

Cyclosanthes Pöppig .... in Froriep's Not. XXXI. p. 312.
= Cyclanthus Poit.

Cyclosia Klotzsch 1838 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 39. p. 305: nov. g. Vandear. (C. maculata.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1420/1. p. 1363; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2026. — Meisn. 1842. Gen. p. 375 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
= Mormodes Lindl.

Cyclosorus Link 1833. Hort. Berol. II. p. 128; 1841. Fil. h. Berol. p. 108: nov. g. Aspidiacear. (Aspidium gongylodes Schk.)
= Polystichum Roth.

Cyclosperma Bonnemais. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 179: nov. g. Hydrophytar. loculatar.
= Lyngbya Agdh.

Cyclospermae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LV: series Schizocarpicar. Fam.: Ranunculaceae, Rutaceae, Sapindaceae.

Cyclospermum Lagasca 1821. Amen. nat. II. p. 101 (*Ciclospermum*): nov. g. Umbelliferar. divis. 1. (Sison Ammi L.)
DC. 1830. Pr. IV. p. 105: sect. Helosciadii. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 282. — Endl. 1839. Gen. n. 4397 *b*. p. 769; 1841. Ench. p. 378. — Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5381. 2. — Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 294.

Cyclosporeae „Aresch." Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 123: div. Fucacear. Gen.: Cystoseira, Halidrys, Halicoccus, Fucus, Himanthalia.
Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 250: ordo Fucacear. Fam.: Cystosireae, Fuceae.

Cyclostegia Benth. .... Bot. Regist. ad calcem nr. 1282.
Benth. 1833. Labiat. p. 163; 1848 in DC.

Cyclostegia Benth. cont.
Pr. XII. p. 162: sect. Elsholtziae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 714. — Endl. 1838. Gen. n. 3588 *b.* p. 612; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4050. 2. — Walp. 1845. Rep. III. p. 583.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163: g. Menthoidear.

Cyclostemma Benth. 1849. Niger Fl. p. 349: sect. Heterotidis. (Osbeckia antennina Sm.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 603.

Cyclostemon Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 597: nov. g. Phyllanthear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5837. p. 1119; 1841. Ench. p. 588. — Meisn. 1841. Gen. p. 342 (254). — Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7403. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 501.
Baill. 1858. Euphorb. p. 561: g. Cyclostemonear.
Synon. Sphragidia Thwait.

Cyclostemoneae Baillon 1858. Et. Euphorb. p. 561: div. Euphorbiacear. biovulatar. Gen.: Cyclostemon, Hemicyclia.

Cyclostigma Griseb. 1839. Gen. et sp. Gentian. p. 259; 1844. Fl. Rumel. II. p. 63; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 103: sect. Gentianae. (G. nivalis, verna L., etc.) — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 60.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 16: subg. Gentianae.

Cyclostigma Hochstett. 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 56. n. $3396/_2$: g. Plumeriear. (antea *Annularia Hochst.*)
Meisn. 1843. Comm. p. 365: g. Ophioxylear.
= Piptolaena Harv.

Cyclostigma Klotzsch 1853 in Seem. Fl. Panam. p. 104: nov. g. Crotonear. (Croton abutiloides, etc.)
= Palanostigma Mart.

Cyclotaxis Boissier 1849. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 10. p. 48: nov. g. Scandicinear., ad Echinophoreas accedens. (C. palaestina.) *Cf.* Flora 1850. p. 45. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 718.

Cyclotella Kützing 1833. Linnaea VIII. p. 535 (Syn. Diatom. p. 7): subg. Frustuliae. *Cf.* Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 503.
Endl. 1836. Gen. n. 1 *a.* p. 2; 1841. Ench. p. 2: sect. Frustuliae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 631. 2.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 66; 1849. Sp. Alg. p. 18. n. 12: g. Melosirear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 45.
Synon. Discoplea Ehrenb.?; Hyalodiscus Ehrenb.; Cycloplea Trevis.?

Cyclotheca Moquin-Tandon 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 37: nov. g. Gyrostemonear.

Cycnia Lindl. mss.
= Prinsepia Royle.

Cycnium „E. Meyer mss." Benth. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 368; 1846 in DC. Prodr. X. p. 504; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Buchnerear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 586. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270. — Steud.

Cycnium Benth. cont.
1840. Nom. I. p. 458 (*Cyclium*). — Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4638. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 361. 526.
Endl. 1839. Gen. n. 3963. p. 685; 1841. Ench. p. 339: g. Eubuchnerear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 313 (224). — Walp. 1845. Rep. III. p. 306. 967.

Cycnoches*) Lindl. 1833. Gen. Orchid. p. 154; 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1742: nov. g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1418. p. 198; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2023. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Brongn. 1843. En. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Catasetidar.
Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 109: g. Cycnochidear.

Cycnochideae Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 109: fam. Eborilinguium. Gen.: Cycnoches, Lüddemannia.

Cycnogeton Endl. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 210; 1839. Nov. stirp. Dec. I; 1841. Spl. I. n. $1664/_1$. p. 1369; 1841. Ench. p. 125: nov. g. Najadear. (Triglochin procerum R. Br.)
Kunth 1841. Enum. III. p. 590 (*Cynogeton*): g. Fluvialibus aff.
Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1134: g. Potamear.
Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272): g. Potamogetear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 210: g. Juncaginacear.
Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 55: g. Alismacear.

Cycnopodium Naudin 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 52 (Deless. Ic. sel. V. t. 3): nov. g. Miconiear. (C. latifolium.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 723. (?) — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 75.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 118: g. Davyear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 783.

Cycnoseris Endl. 1843. Bot. Zeit. p. 458; 1843. Gen. Suppl. III. p. 71. n. $2984/_1$: nov. g. Hypochaeridear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 338.

Cycolis Bernhardi 1839. Linnaea XIII. p. 361: sect. Physalidis. (Saracha viscosa Schrad.)
= Sarachae Ruiz & Pav. sp.

Cydonia Tourn. 1700. Inst. p. 632. t. 405: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 126. Ed. Hall. 1745. p. 140: g. pl. class. V.
Juss. 1789. Gen. p. 335: g. Pomacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 336. — Pers. 1807. Ench. II. p. 40. n. 1232. — Lois. 1818. Dict. v. 10. p. 3 (*Coignassier*). — Lindl. 1821. Linn. Trans. XIII. p. 97 (*cf.* Flora 1823. I. p. 162); 1847. Veg. kd. p. 560. — DC. 1825. Pr. II. p. 638. Sect.: Cydonia, Chaenomeles. — D. Don 1825. Nepal. p. 237. — Rchb. 1828.

*) *κύκνος*, cygnus; *αὐχήν*, collum.

Cydonia Tourn. cont.
Consp. p. 168. n. 4471; 1832. Fl. exc. p. 631; 1841. Nom. p. 169. n. 6541. — Bartl. 1830. Ord. p. 400. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 414. n. 2065. — Link 1831. Hdb. II. p. 82. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 650. Sect. ut DC. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 154. — Koch 1836. Syn. p. 254. Ed. II. p. 260. — Meisn. 1837. Gen. p. 106 (75). — Endl. 1840. Gen. n. 6341. p. 1236; 1841. Ench. p. 656. — Brongn. 1843. En. genr. p. 124. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 156. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 94. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 101. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 104. 216. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 569. — G. . . 1849 in Orb. Dict. IV. p. 83 (*Coignassier*).
Medic. 1793. Gesch. d. Bot. p. 64; 1794 in Usteri n. Ann. III. p. 90: g. Antho-Mallonandriae.
Borckh. 1798 in Römer Arch. I. 3. p. 90.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 182: g. Rosacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 39.
Willd. 1809. Enum. p. 528: g. Icosandr. Pentagyn.
Gaud. 1828. Helv. III. p. 324: sect. Pyri.
Synon. Pyri sp. Linn. et Auct.

Cylactis Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 97 (Sillim. Amer. journ. I. p. 377): nov. g. Senticosar., Rubo et Dalibardae aff. *Cf.* Flora 1824. I. p. 131.
DC. 1825. Pr. II. p. 568: g. Dryadear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 402. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 453. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73).
Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4447: g. Potentillear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 243: g. Rubear.
= Rubus Linn.? (Endl. Gen. p. 1241.)

Cylbanida Noronh. mss.
= Pittosporum Banks. (Tulasne.)

Cylichnium*) Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 267: nov. g. Sporomycetum entosporor.
Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 372: g. Trichodermeor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 20; 1842. Mycol. p. 82: g. Physareor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 272. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Bonord. 1851. Hdb. p. 224: g. Perisporiaceor.
= Phelonitis Chev.?

Cylichnos Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 298: nov. g. Algar. (Fucus coronopifolius L.)
= Rhynchococcus Kütz.

Cylicodaphne**) Nees 1831 in Wall. Pl. As. rar. II. p. 61; 1833. Progr. p. 18; 1836. Laurin. p. 503: nov. g. Tetrantherear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 2058. p. 322; 1841. Ench. p. 198. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1333. 1358. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 473. — Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239). — Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2651. — Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. 24. p. 387 (sect.: genuinae, Lepidadenia); 1852. ibid. II. p. 11 (accedit sect.: Lecanodaphne). — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 931.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.
Miq. 1852. Pl. Jungh. II. p. 184: g. Laurinear.

Cylindraceae Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 136: fam. Fucor. Gen.: Lichina, Polyides, Chordaria, Desmarestia.

Cylindrachne „Cass." Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2471: g. Inulear. genuinar. An errore pro *Cylindrocline Cass.?*

Cylindria*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 69. Ed. Willd. p. 86: g. Tetrandr. Monogyn. (C. rubra.) — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 316. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 421. n. 431; 1830. Gen. I. p. 86. n. 427. *Cf.* Konig in Ann. of Bot. I. p. 392 et R. Brown in Linn. Trans. X. p. 224.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 480: g. Protear.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 3. 93. n. 419: g. Proteacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 118. — Endl. 1838. Gen. p. 343; 1841. Ench. p. 216. — Meisn. 1841. Comm. p. 243; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 482. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533 (dubium).
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1769 b: g. Banksiear.?
Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 441: g. Solanear.
Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2419: g. Persooniear.?

Cylindrisporium Preuss vid. *Cylindrosporium Grev.*

Cylindrites Göppert 1842. Nov. Act. Leop. XIX. 2. p. 115. t. 46. 48: nov. g. Fucoidar. foss.
Endl. 1843. Spl. III. p. 56. n. $122/_{107}$: g. Algar. foss. dubium. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 15; 1846. Chlor. prot. p. XXVIII.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Phycear. foss. dubium.

Cylindrium Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 34: nov. g. Protomycetum. (Fusidii sp.)

Cylindrocarpus Crouan 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 359: nov. g. Algar. parasiticar. (C. microscopicus.)

Cylindrocephala C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 412: sect. Jurineae.

Cylindrocephalum Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 103: nov. g. Polyactideor. (Menispora aurea Corda.)

Cylindrocline Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 11; 1818. Dict. v. 12. p. 318; 1822. v. 23. p. 565: nov. g. Inulear. (1822 Archetypar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28. (verar.)

*) κυλίχνη, poculum parvum.
**) κύλιξ, calyx; δάφνη, laurus: propter cupulam fructus exquisite calyciformem.

*) Nomen ob corollae lacinias tubum teretem continuantes.

Cylindrocline Cass. cont.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Rhanteriear.
Less. 1832. Syn. p. 207: g. Epaltidear.
DC. 1836. Pr. V. p. 458: g. Plucheinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2419. p. 392; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3561: g. Plucheinar.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955: g. Cylindroclinear.
Synon. Lepidopogon Tausch; Cylindrachne Rchb.?

Cylindroclineae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 955: subdiv. Eubuphthalmear. Gen.: Cylindrocline.

Cylindrocolla Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 149: nov. g. Myxonemeor. (Dacryomyces Urticae.)

Cylindrocystis Meneghini 1838. Cenni org. Alghe p. 26: nov. g. Nostochinear. (Palmella cylindrospora Bréb.) *Cf.* Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 513.
Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 588: g. Nostochinar. genuinar.
Menegh. 1842. Mon. Nostoch. p. . . .: g. Nostocoidear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: g. Coccochlorear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 228: sect. Palmogloeae.

Cylindrodendrum Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 98: nov. g. Dendrinor. (C. album et articulatum.)

Cylindrodochium*) Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 132: nov. g. Tubercularinor. (Cylindrosporium concentricum Grev.)

Cylindrohypnum Hampe 1852. Bot. Zeit. p. 72: sect. Hypni.

Cylindrolobus Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VI: g. Orchidear.
Endl. 1837. Gen. n. 1392. p. 195; 1841. Ench. p. 110: g. Epidendrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1991. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 372 (279). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. . . . . Journ. Proc. Linn. soc. III. p. 58: sect. Eriae. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 657.
Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 182: subg. Eriae.
Synon. Ceratium Blume.

Cylindrophora Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 92: nov. g. Pleurosporiaceor. (Verticillii sp. Corda.)

Cylindropuntia Engelm. 1856. Syn. Cactac. p. 302 (Emory Cact. p. 53): subg. Opuntiae. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 54.

Cylindropus Nees 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 266; 1834. Linnaea IX. p. 303: nov. g. Sclerieae. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 413 (316). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146.

*) δοχεῖον, receptaculum.

Cylindropus Nees cont.
Kunth 1837. Cyper. p. 360: g. Sclerinear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 180.
= Scleria Berg.?

Cylindropyrum Jaub. & Spach 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 353: subg. Aegilopis. (A. squarrosa, cylindrica, etc.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 789.

Cylindrosorus Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 62: nov. g. Compositar. (C. flavescens.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 151: g. Angianthear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2719. p. 443; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 216 (136). — Fenzl 1839. Flora II. p. 726. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3525.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.
= Angianthus Wendl.? (Lindl.)

Cylindrospermum Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1843. Phycol. gener. p. 211; 1845. Phyc. germ. p. 172; 1849. Sp. Alg. p. 292. n. 204: g. Nostocear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 40. — Math. 1853. Belg. II. p. 518.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 68: g. Nostochinar. genuinar.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 514: g. Nostocinear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Zoospermear. dubium.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 11: g. Algar. polycytidear. heterocytidear.
Synon. Belonia Carm.

Cylindrospora Spreng. vid. *seq.*

Cylindrosporium Greville 1822. Scot. crypt. fl. VI. t. 27. *Cf.* Flora 1823. I. p. 374.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 523: g. Fusidiear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 569. n. 3589 (*Cylindrospora*): g. Coniomycetum liberor.
Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 22: g. Stilbosporeor.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 481 not.: g. Entophytor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 183. p. 17; 1841. Ench. p. 13.
Rchb. 1841. Nom. p. 1. n. 14: g. Uredineor. genuinor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 5; 1842. Mycol. p. 18: sect. Torulae.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Torulaceor. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 106 (*Cylindrisporium*).
Bonord. 1851. Hdb. p. 43: g. Caeomaceor.

Cylindrostrobus Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 76. n. 2121 *c*: sect. Petrophilae. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 275.

Cylindrostylium Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 164: sect. Ribis. (R. lacustre, rubrum, prostratum.)

*Cylindrotheciea*e Sulliv. 1856. Musc. Un. St.: trib. Muscor. frondosor.

Cylindrothecium Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47: nov. g. Hypnear. (Neckera cladorrhizans), serius Pylaisaeacear.

Cylindrothecium Bruch cont.
Sulliv. 1856. Musc. Un. St. p. . . .: g. Cylindrotheciear.
= Entodon C. Müll.

Cylindrotrichum Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 88: nov. g. Psiloniaceor. (Menisporae sp. Corda.)

Cylipogon Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 97: nov. g. Dalidear., inter Daleam et Petalostemonem.
= Kuhnistera Lam.

Cylista*) Aiton 1789. Hort. kew. III. p. 512: g. Diadelph. Decandr. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 808. n. 1759. — Gmel. 1791. Syst. p. 1107. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 64. t. 92; 1819. III. p. 16. t. 221; 1832. Ind. III. p. 319. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1068. n. 1351. — Pers. 1807. Ench. II. p. 302. n. 1710.
Gis. 1792. Pracl. p. 415: g. Papilionacear.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 319: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 762; 1826. Syst. III. p. 194. n. 2516; 1831. Gen. II. p. 575. n. 2808. — Link 1822. En. II. p. 235.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 410. — Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3955. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 369. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 157. — Meisn. 1837. Gen. p. 94 (66).
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 257: g. Euphaseolear.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 114: g. Rhynchosiear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6694. p. 1300; 1841. Ench. p. 672. — Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5844. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 167.

Cylizoma Necker 1790. Elem. bot. III. p. 33. n. 1343: g. Cyteophytor.
= Deguelia Aubl.

Cymaduse Decaisne & Thuret 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 12: nov. g. Fucacear. (Fucus tuberculatus Huds.)
= Pycnophycus Kütz.

Cymanthus**) Endl. 1840. Gen. n. 5246 *α β*. p. 972; 1841. Ench. p. 506: subsect. Smegmanthae.
= Bootia Neck.

Cymaria Benth. 1835. Labiat. p. 705: nov. g. Ajugoidear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 873. — Endl. 1838. Gen. n. 3681. p. 632; 1841. Ench. p. 309. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 357. 473. — Walp. 1845. Rep. III. p. 931. 992.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4165: g. Teucriear.?
Meisn. 1840. Gen. p. 287 (196): g. Lamiear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Ajugear. — Par. Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 602. (?) — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 992.

*) κυλιστός, volutatus.
**) κῦμα, unda, cyma.

Cymation Spreng. 1825. Syst. II. p. 142. n. 1357: g. Asphodelear. (*Lichtensteinia W.*)
Bartl. 1830. Ord. p. 52: g. Colchicacear.
= Ornithoglossum Salisb.

Cymatochloa*) Schlechtend. 1854. Bot. Zeit. p. 817: nov. g. Graminear., a Paspalo separatum.

Cymatoderma Junghuhn 1840 in Hoev. & Vriese Tijdschr. VII. p. 290: novum genus inter Thelephoram et Merisma collocandum.
Corda 1842. Mycol. p. 193: g. Auricularinor. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 1. *Cf.* Endl. Spl. II. Add. p. 103 et Montagne 1841 in Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 320.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Hydneor.
= Cladoderris Pers.

Cymatonema Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 375. n. 251: nov. g. Confervear.

Cymbachne**) Retz. 1791. Observ. VI. p. 36.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 77: g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 129. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 52. 810. n. 378. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 320.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 861: g. Chloridear.?
= Stegosia Lour.?

Cymbalaria „Lobel.“ Rupp. 1718. Fl. jen. p. 238. Ed. Hall. 1745. p. 242: g. pl. class. IX. *Cf.* Steud. Nom. I. p. 459 (*Cymballaria*).
Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 70. (Antirrhinum orbiculare.)
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 397: g. Capsuliferar. (Antirrhinum Cymbalaria L.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 155: sect. Antirrhini.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 321: g. Scrofularinar.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 373; 1841. Nom. p. 115. n. 4491. 2: sect. Linariae. — Par. Chav. 1833. Mon. Antirrh. p. 98. — Koch 1837. Syn. p. 520. Ed. II. p. 598. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 518. — Endl. 1839. Gen. n. 3891 *c*. p. 673; 1841. Ench. p. 338. — Walp. 1845. Rep. III. p. 190. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 266. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 573.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267: g. Antirrhinear.

Cymbalaria Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 336: sect. Saxifragae. (S. cymbalaria L.)

Cymballaria Steud. vid. *Cymbalaria Rupp.*

Cymbanthes Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 329: nov. g. Uvularear. (Melanthium eucomoides Jacq.)
= Androcymbium Willd.

Cymbaria Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 282. n. 590; 1753. Sp. II. p. 618; 1759. Syst. ed. X. p. 1112. n. 669; 1763. Sp. ed. II. p. 861; 1764. Gen. ed. VI. p. 309. n. 751;

*) κῦμα, scotia, trochilus. (architect.)
**) κύμβη, cymba.

Cymbaria Linn. cont.
1767. Syst. ed. XII. p. 412: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 467; 1784. Syst. p. 558. — Reich. 1778. Gen. p. 311. n. 809. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 406. n. 1008. — Gmel. 1791. Syst. p. 934. — Pers. 1797. Syst. p. 595. — Willd. 1800. Sp. III. p. 242. n. 1146.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 182. n. 750: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 208. — Scop. 1777. Intr. p. 172. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 276. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 321.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Orobanchear.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 198: g. Ringentium.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 252. t. 53. f. 12 (daurica).
Juss. 1789. Gen. p. 119: g. Scrophulariar.
Neck. 1790. El. I. p. 341. n. 532: g. Chasmatophytor.
Pers. 1807. Ench. II. p. 159. n. 1467: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3181. — Bartl. 1830. Ord. p. 171.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 399; 1825. Syst. II. p. 815. n. 2202; 1831. Gen. II. p. 496. n. 2445: g. Scrofularinar.
Schlechtend. 1820 in Nees Hor. phys. p. 107. Char. emend. *Cf.* Flora 1821. II. p. 521.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 112: g. Cymbariear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 627.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 6: g. Rhinanthear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4009. p. 693; 1841. Ench. p. 340. Sect.: Cymbochasma, Eucymba. — Meisn. 1840. Gen. p. 312 (223). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 363. 544. — Walp. 1845. Rep. III. p. 398. 971. Sect. ut Endl. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 556. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 264.
Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4464: g. Pedicularinar. Sect.: Cymbochasmia, Cymbaria.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Euphrasiear.
Synon. Phyloma Gmel.

Cymbaria Taylor 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 190: nov. g. Muscor. (C. Jamesoni.)
= Eustichia Brid.

Cymbaria Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 469: sect. Calotidis. (C. cymbacantha F. Müll.)

Cymbaria Anderss. 1856. Nov. Act. Upsal. ser. tert. II. 1. p. 243 (Flora 1857. p. 40): sect. Anthisthiriae. (Andropogon cymbarius L.)

Cymbarieae D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 112: sect. Rhinanthacear. Gen.: Cymbaria.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 627: trib. Rhinanthacear. Gen. id.

Cymbella Agardh 1830. Consp. Diatom. p. 1: nov. g. Cymbellear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 194. — Harv. 1841. Brit. Alg. p. 215. — Kütz. 1844. Bacill. p. 79; 1845. Phyc. germ. p. 84; 1849. Sp. Alg. p. 57. n. 37. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 38. — Math. 1853. Belg. II. p. 538.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 538: subg. Frustuliae. *Cf.* Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 517.
Endl. 1836. Gen. n. 1 *c.* p. 2; 1841. Ench. p. 2: sect. Frustuliae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 631. 3.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: g. Eucymbellear.
Synon. Navicularia Bory?; Cymbophora Kütz.?; Bacillariae sp. Nitzsch.

Cymbella Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. 428. t. 100. f. 8 (C. Zebra).
= Epithemia Kütz.

Cymbelleae Agardh 1830. Consp. Diatom. p. 1: div. Diatomacear. Gen.: Cymbella, Schizonema, Micromega, Berkeleya, Homoeocladea, Gloiodictyon, Hydrurus, Gloionema, Gomphonema.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 407; 1841. Brit. Alg. p. 16. 206: trib. Diatomacear. Gen. (1838): Gomphonema, Micromega, Schizonema, 1841 Gomphonema, Homaeocladia, Berkeleya, Schizonema, Cymbella.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 194: trib. Phycear. Gen.: Cymbella, Gomphonema.
Kütz. 1844. Bacill. p. 78; 1845. Phyc. germ. p. 84; 1849. Sp. Alg. p. 57: fam. Diatomear. Gen.: Cymbella, Cocconema, Syncyclia, Encyonema.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: subordo Diatomacear. Gen.: Frustulia, Styllaria, Meridion, Licmophora, Biddulphia, Gomphonema, Eunotia, Cocconema, Achnanthes, Striatella, Amphitetras, Isthmia, Diatoma, Tabellaria, Tessella, Fragilaria, Grammonema, Tetracyclus, Lysigonium, Oncobyrsa.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 38: sect. Diatomacear. Gen. ut Kütz.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: trib. Amphiphractar. Subtrib.: Eucymbelleae, Encyonemeae.
Rabenh. 1853. Süssw. Diatom.: fam. Diatomacear. arcuatar. Gen. ut antea.
Math. 1853. Belg. II. p. 538: trib. 34 Algar. Gen.: Cymbella, Cocconema, Encyonema.

Cymbia Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 467: sect. Krigiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 685. — Scheele 1852. Linnaea XXV. p. 258.

Cymbicarpos Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 105: sect. Astragali. (A. trigonus, etc.)

Cymbidium*) Swartz 1799. Nov. Act. Upsal. VI. p. 70; 1799 in Schrad. Journ. II. p. 213; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 72: nov. g. Orchidear., ab Epidendro L. sejunctum. — Par. Batsch

*) „*κύμβος*, cavus recessus; *ἰδέα*, species: ob labellum in plerisque concavum."

Cymbidium Swartz cont. 1802. Tab. p. 101. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 164 (*Cimbidium*). — Pers. 1807. Ench. II. p. 514. n. 1993. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 331. Ed. Nees p. 187; 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 213 (Verm. bot. Schr. II. p. 39). — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 324. — Link 1822. En. II. p. 371; 1829. Hdb. I. p. 254. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 378. — D. Don 1825. Nepal. p. 35. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 721. n. 2991; 1831. Gen. II. p. 667. n. 3364.

Willd. 1805. Sp. IV. p. 94. n. 1604; 1809. En. p. 945: g. Gynandr. Monandr. — Par. Swartz 1806. Ind. occ. III. p. 1446. 1995. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 457.

Thunb. 1807. Fl. cap. I. p. 124: g. Diandr. Monogyn.

HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 340: g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 329. — Bartl. 1830. Ord. p. 58.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 289: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.

Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.

La Llave & Lex. 1825. Nov. veget. II. Orch. p. 11: g. Rinemospermar. epigear. (C. vexilliferum.)

Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 161: g. Vandear. Sect. (1833): Eucymbidium, Pseudo-Vanda, Camaridium, Bolbidium, Angidium. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1513. — Endl. 1837. Gen. n. 1427. p. 199; 1841. Ench. p. 111. Sect. ut Lindl. (Luisa loco Pseudo-Vandae.) — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2033. Sect.: Cymbidium, Luisa, Camaridium, Bolbidium, Angidium. — Meisn. 1842. Gen. p. 376 (282). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 707.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Brassidar.
Synon. Camaridium Lindl.; Trichorrhiza Lindl. (Steud.)

Cymbidium DC. 1805. Fl. franç. III. p. 262: g. Orchidear. (C. corallorhiza.)

Marsch.-Bieb. 1808. Taur. cauc. II. p. 373: g. Gynandr. Monogyn.
= Corallorrhiza Hall.

Cymbocarpa*) Miers 1840. Ann. nat. hist. V. p. 133; 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 543: nov. g. Burmanniacear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $1218/_3$. p. 1359; 1841. Ench. p. 96. — Meisn. 1842. Gen. p. 390 (292). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 119. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 60.

Miers 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 549; 1848. Ann. and Mag. 2d. ser. I. p. 235: g. Apteriear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 172.

Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1647: g. Burmanniear.

*) κύμβη, cymba; καρπός, fructus.

Cymbocarpum DC. 1830. Prodr. IV. p. 186: nov. g. Peucedanear., ex Anetho cymbocarpo formandum?

C. A. Meyer 1831. Pl. cauc. p. 132.

G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 382: g. Coriandrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4545. p. 792; 1841. Ench. p. 381. — Rchb. 1841. Nom. p. 138. n. 5315. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 365.

Meisn. 1838. Gen. p. 144 (104): g. Seselinear. An potius Smyrnear.?

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 132: g. Ceramospermear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Coriandridar.

Cymbochasma*) Endl. 1839. Gen. n. 4009 *a*. p. 693; 1841. Ench. p. 340: sect. Cymbariae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4464. 1 (*Cymbochasmia*). — Walp. 1845. Rep. III. p. 398.

Cymbochasmia Rchb. vid. *praeced.*

Cymbonotus Cassini 1825. Dict. v. 35. p. 397; 1830. v. 60. p. 573 (Opusc. phyt. II. p. 65): nov. g. Arctotidear. (Prototypar.) — Par. Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 462. t. 86. — Less. 1832. Syn. p. 28. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. (verar.) — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3235.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 797. n. 4134: g. Radiatar.

DC. 1837. Pr. VI. p. 491: g. Arctotear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2831. p. 464; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 486. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Cymbophora Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 565: sect. Gomphonemae. *Cf.* Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 517. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 5 *a*. p. 2; 1841. Ench. p. 2. — Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 635. 1.
= Cymbella Agdh.?

Cymbopogon Spreng. 1815. Pugill. II. p. 14; 1825. Syst. I. p. 134. 289. n. 299; 1830. Gen. I. p. 62. n. 303: nov. g. Graminear. (Andropogon cymbarius L.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 53. 833. n. 381.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 178: g. Saccharinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 972.

Link 1821. En. I. p. 107: g. Graminum.

Steud. 1854. Glum. I. p. 383: sect. Andropogonis.

Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 482: subg. Andropogonis.
= Anatherum Palis.

Cymbosema Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 61: nov. g. Hedysarear. (C. roseum.)

Endl. 1842. Spl. II. p. 96. n. $6662/_1$: g. Dioclear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 534. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Meisn. 1843. Comm. p. 351: g. Phaseolear.

*) χάσμα, fauces.

Cymboseris Boissier 1849. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 11. p. 50: nov. g. Cichoracear., Crepidi aff. (C. Palaestina.) *Cf.* Flora 1850. p. 55.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 976: g. Lactucear.
Cymbosira Kütz. 1844. Bacill. p. 77; 1845. Phycol. germ. p. 84; 1849. Spec. Alg. p. 57. n. 36: nov. g. Achnanthear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 41.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: g. Achnanthidear.
Cymbospatha C. Koch 1857. Berl. Gartenz. p. 220: sect. Monsterae.
Cymbostemon Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 444: nov. g. Illicinear. (Illicium floridanum L.)
Rchb. 1841. Nom. p. 192. n. 7295: g. Illiciear. genuinar.
= Illicii Linn. pars.
Cymburus Salisb. 1806. Parad. p. 53.
= Stachytarpheta Vahl.
Cymelonema*) Presl 1850. Epimel. bot. p. 570 (210): nov. g. Memecylear. (C. memecyloides.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 890.
= Urophyllum Jack.
Cymicifuga Rchb. in Mössl. Handb. II. p. 942: sphalm. pro *Cimicifuga.*
Cyminosma**) Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 280. t. 58. f. 6: nov. g. plantar. (C. Ankenda.)
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 334: g. Melastomeis aff.?
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 141; 1824. Pr. I. p. 722: g. Diosmear.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 465; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 519: g. Ruteis aff. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 781.
Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5117; 1837. Hdb. p. 282: g. Empetrear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 304. n. 1556: g. Rutacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 390. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 146. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227. 1270.
Roxb. 1832. Ind. II. p. 239: g. Octandr. Monogyn.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 314: g. Rutaceis aff.
Meisn. 1837. Gen. p. 60 (44): g. Rutear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 473: g. Xanthoxylacear.
= Acronychia Forst.?
Cymodocea Konig 1806. Ann. of Bot. II. p. 96. t. 7: nov. g. pro Phucagrostide Theophrasti majore Caul. conditum.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 897. n. 3157; 1831. Gen. II. p. 702. n. 3539: g. Najadum.
Link 1829. Hdb. I. (p. 288: g. Hydrogetonum et) p. 820: g. Najadear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 72. — Endl. 1837. Gen. n. 1657. p. 230; 1841. Ench. p. 125. — Unger 1843. Chlor. prot. p. 61. — Lehm. 1847. Pl. Preiss. II. p. 273. — Webb 1850. Canar. III. p. 301. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 225.
Kunth 1841. Enum. III. p. 118: g. Zosterear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 14.
Rchb. 1841. Nom. p. 31. n. 1074: g. Zosteracear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 145.
Meisn. 1842. Gen. p. 363 (271): g. Zannichellicar.
Synon. Phucagrostis Caulin. pt.; Amphibolis Agdh.?; Graumüllera Rchb.?
Cymopolia*) Lamx. 1816. Polyp. flex. p. 293: nov. g. Corallinear.? — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 33. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 683.
Kütz. 1841. Polyp. calcif. p. 16.
Dcne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329; XVIII. p. 112 (Flora 1843. p. 93): g. Actinocladear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 520; 1849. ibid. X. p. 56.
Endl. 1843. Spl. III. p. 21. n. 68: g. Dasycladear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 95; 1843. Phyc. gener. p. 312. — Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 35.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dasycladidar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 102: g. Cymopoliear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 510. n. 330: g. Valoniear.
Cymopolieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 102: trib. Siphonothallar. Gen.: Neomeris, Cymopolia.
Cymopteris „Rafin." Linnaea VIII. Litt. p. 81: vid. *seq.*
Cymopterus Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 100: nov. g. Umbelliferar. (Thapsia glomerata Nutt.) *Cf.* Schult. 1820. Syst. VI. p. XXXVI et Linnaea VIII. Litt. p. 81 (*Cymopteris*). — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 235.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3700: g. Angelicear.? — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 623. Sect.: Eucymopterus, Phellopterus, Leptocnemia, Pteryxia.
DC. 1830. Pr. IV. p. 203: g. Thapsiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 350. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 142. n. 5495. Sect. (1841) ut Endl. — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (107). — Endl. 1839. Gen. n. 4491. p. 784; 1841. Spl. I. p. 1414; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 11. Sect. (1841) ut Torr. & Gray (Phyllopterus loco Phellopteri).
Nutt. 1834. Journ. Ac. Philad. VII. p. 28.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Thapsidar.
Synon. Thapsia Nutt.
Cymosae Linn. 1751. Phil. bot. p. 35: ordo 63 plantar. Gen.: Diervilla, Lonicera, Mitchella, Loranthus, Ixora, Morinda, Cinchona?
Cynancheae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XLI: div. Asclepiadear. Gen.: Eustegia,

*) Anagramma nominis *Memecylon.*
**) *κύμινον*, cuminum; *ὀσμή*, odor.

*) *πολιός*, griseus.

Cynancheae Rchb. cont.
Philibertia, Sarcostemma, Dimia, Cynanchum, Holostemma, Solenostemma, Canahia, Macroscepis, Lachnostoma, Podostigma, Calotropis, Xysmalobium, Oxystelma, Enslenia, Gomphocarpus, Asclepias.
Rchb. 1828. Consp. p. 130; 1831. Fl. exc. p. 418; 1837. Hdb. p. 208: subdiv. Asclepiear. Sect.: Pergularinae, Gonolobeae, *genuinae* (gen.: Asclepias, Acerates, Gomphocarpus, Enslinia, Oxystelma; Xysmalobium, Podostigma, Calotropis, Lachnostoma, Macroscepis, Oxypetalum, Kanahia, Sonninia, Scutera, Holostemma, Cynanchum, Solenostemma, Metaplexis, Ditassa, Doemia, Philibertia, Sarcostemma, Pentaphragma, Eustegia). — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 128. Gen. Cynoctonear. Endl. 1841.
Endl. 1838. Gen. p. 589; 1841. Ench. p. 298: trib. Asclepiadear. (verar.) Sect.: Astephaneae, Metastelmeae, Ditasseae, Cynoctoneae, Calotropideae, Euasclepieae. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 53. Gen. ex Endl.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539. 544: sect. Asclepiadear. verar. Gen. Endlicheriana et Vincetoxicum, Urostelma, Ananthrix.
Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174): trib. Asclepiear. Subtrib. ut Endl.

Cynanchica Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 473: sect. Asperulae. (Asperulae §. 2 Cynanchicae DC.) — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 164. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 22. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 460.

Cynanchum*) Linn. 1737. Gen. p. 63. n. 182; 1737. Cliff. p. 79; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 54; 1753. Sp. I. p. 212; 1759. Syst. ed. X. p. 945. n. 268; 1762. Sp. ed. II. p. 310; 1764. Gen. ed. VI. p. 119. n. 304; 1767. Syst. ed. XII. p. 192. n. 301: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 212; 1784. Syst. p. 257. — Reich. 1778. Gen. p. 124. n. 331. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 168. n. 430. — Lour. 1790. Coch. I. p. 166. — Gmel. 1791. Syst. p. 441. — Pers. 1797. Syst. p. 269. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1252. n. 488; 1809. En. p. 276. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 157. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 163. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 12. 239.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 198. n. 821: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Contortor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Apocinor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402. — Batsch 1802. Tab. p. 201.
Hill 1769. Ht. kew. p. 150: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 156: g. Dicarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 147: g. Apocinear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 429. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 333. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 354.
Neck. 1790. El. I. p. 253. n. 403: g. Campylophytor. Disjunguntur Ziervoglia et Psanchum.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 171. t. 117.
Pers. 1805. Ench. I. p. 272. n. 624: g. Apocynear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 667.
R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 43 (Verm. bot. Schr. II. p. 380); 1810. Prodr. I. p. 462. Ed. Nees p. 318: g. Asclepiadear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 484; 1825. Syst. I. p. 851. n. 990; 1830. Gen. I. p. 212. n. 1085. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 202. — Schult. 1820. Syst. VI. p. xii. 96. — Link 1821. En. I. p. 250; 1829. Hdb. I. p. 437. — Kunth 1823. Syn. II. p. 281; 1838. Berol. II. p. 25. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 278. — Bartl. 1830. Ord. p. 203. — Koch 1837. Syn. p. 483. Ed. II. p. 555. Sect. (1844): Scammonea, Vincetoxicum. — Decne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 332. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 903. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 67. Sect.: Eucynanchum, Vincetoxicum.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. xli; 1828. Consp. p. 131. n. 3140: g. Cynanchear. (genuinar.) Sect.: Vincetoxicum, Schubertia. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 418. Sect.: Cynanchum, Vincetoxicum. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 53.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 150: g. Asclepiear.
= Cynanchum Medic., Vincetoxicum Rupp., Cynoctonum E. Meyer et Endotropis Endl.

Cynanchum Medic. 1790. Act. Theod. Palat. Phys. VI. p. 404: g. Gynandriae Monadelphodecandro-digynae restrictum.
Mönch 1794. Meth. p. 718: g. Stigmatostemonis.
Hedw. 1806. Gen. p. 132. n. 575: g. Apocinear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 418: sect. Cynanchi.
Endl. 1838. Gen. n. 3461. p. 591; 1841. Ench. p. 298: g. Cynoctonear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 544: g. Cynanchear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 128. n. 4962.
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Asclepiadear. verar. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 47. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 479.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 547: g. Eustegiar.
Synon. Ziervoglia Neck.?; Psanchum Neck.?; Scammonea Koch; Eucynanchum Griseb.; Cynanchi sp. Linn.

Cynapium*) „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 270. Ed. Hall. 1745. p. 284: g. pl. class. XII.
= Aethusa Linn.

*) Vocabulum antiquum Dioscoridis, derivatum a venenositate adversus canes, ut et alias feras. (Linn. Hort. Cliff. p. 80.)

*) κύων, canis: quare Apium caninum.

Cynapium „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 640: nov. g. Smyrniear. (C. apiifolium.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5364.
Endl. 1841. Spl. I. n. 4543/1. p. 1414; 1841. Ench. p. 380: g. Smyrnear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 426.
Meisn. 1843. Comm. p. 359: g. Cachrydear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 15: g. Eusmyrnear.

Cynara Vaillant 1718. Act. Ac. Paris. p. 155: g. Cynarocephalar. — Par. Math. 1853. Belg. I. p. 301.
Linn. 1737. Gen. p. 244. n. 631; 1737. Cliff. p. 394; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 251; 1753. Sp. II. p. 827; 1759. Syst. ed. X. p. 1201. n. 835; 1763. Sp. ed. II. p. 1159; 1764. Gen. ed. VI. p. 410. n. 928; 1767. Syst. ed. XII. p. 531: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 607; 1784. Syst. p. 728. — Reich. 1778. Gen. p. 407. n. 1007. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 538. n. 1257. — Gmel. 1791. Syst. p. 1190. — Pers. 1797. Syst. p. 768; 1807. Ench. II. p. 384. n. 1801. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1690. n. 1436; 1809. En. p. 844. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 129. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 409.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Capitator.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Capitatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 168. — Batsch 1802. Tab. p. 251. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 5. 204.
Gled. 1764. Syst. p. 245. n. 1010: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 559.
Hill 1769. Ht. kew. p. 67: g. Associatar.
Scop. 1777. Intr. p. 124: g. Flosculosar. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 885.
Neck. 1790. El. I. p. 66. n. 114: g. Siphoniphytor.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 157: g. Carduacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 144. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 288.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 533; 1826. Syst. III. p. 369. n. 2636; 1831. Gen. II. p. 605. n. 2973: g. Cynarear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2323.
Link 1822. En. II. p. 303; 1829. Hdb. I. p. 684: g. Acarnacear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 620: g. Carduinear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 400. Ed. II. p. 485. — Endl. 1838. Gen. n. 2882. p. 477; 1841. Ench. p. 247. — Meisn. 1839. Gen. p. 225 (140). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12. 90. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 36. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 206.
Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3910: g. Cirsiear.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 336; . . . . in Webb Canar. II. p. 384: g. Eucynarear.
Synon. Cinara Tourn.; Cardui sp. Linn.

Cynara Thunb. Fl. cap. p. 622.
= Platycarpha Less.

Cynareae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 532: ordo Compositar. Gen.: Cynara, Cirsium, Carlina, Saussurea, Syncarpha, Carlowizia, Acarna, Joannea, Carduus, Serratula, Onopordon, Arctium, Silybum, Cassinia, Onobroma, Haynea, Heterocoma, Stähelina; Echinops, Boopis, Acicarpha, Rolandra, Carthamus; Centaureae.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 353; 1831. Gen. II. p. 605: trib. 1 Compositar. Sect.: *genuinae* (gen. §. 1: Cynara, Cirsium, Carlina, Carlowizia, Dasyphyllum, Acarna, Saussurea, Syncarpha, Leuzea, Joannea. §. 2: Carduus, Onopyxos, Onopordon, Acilepis, Arctium, Gochnatia, Serratula, Haynea, Stähelina, Onobroma, Silybum, Heterocoma, Stobaea [1831. Gen.: Carduus, Onopyxus, Onopordon, Acilepis, Arctium, Serratula, Rhaponticum, Hololepis, Pacourina, Heterocoma]. §. 3: Carthamus, Echinops [1831. §. 3: Cardopatum, Onobroma, Silybum, Stobaea]. §. 4: Carthamus, Echinops), *desciscentes* (gen.: Centaurea, Zoëgea, Galactites, Atractylis, Stokesia, Gundelia, Sphaeranthus).

Cynareae Rchb. 1828. Consp. p. 100; 1837. Handb. p. 182: div. Homoianthar. Subdivis. (1828): Mutisieae, Nassauvieae, Carlineae, Carduaceae.

Cynareae Rchb. 1828. Consp. p. 102: subsect. Carduinar. Gen.: Cynara, Onopordon, Arctium.

Cynareae Lessing 1830. Linnaea V. p. 128; 1831. ibid. VI. p. 83; 1832. Syn. Compos. p. 4: trib. 1 Synantherear. Subtrib. (1831): Centaurieae, Carduineae, Echinopsideae, Arctotideae, Othonneae, Calenduleae et (1832) Cardopateae, Xeranthemeae.
DC. 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 261; 1837. Pr. VI. p. 449: trib. Tubuliflorar. Subtrib.: Calendulaceae, Arctotideae, Echinopsideae, Xeranthemeae, Carlineae, Centaurieae, Carthameae, Carduineae, Serratuleae, Silybeae. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 461; 1841. Ench. p. 245. Subtrib. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 221 (138). Subtrib. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. Subtrib.: Calenduleae, Osteospermeae, Othonneae, Arctoteae, Gortericae, Echinopsideae, Cardopateae, Xeranthemeae, Carlineae, Centaurieae, Carthameae, Silybeae, Carduineae, Serratuleae.
Rchb. 1841. Nom. p. 99: div. Homoianthar. Subdivis.: Serratuleae, Carthameae, Cirsieae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 35: trib. Compositar. Subtrib. ut DC. (exclusis 2 primis) et Cardopateae.
Koch 1844. Syn. ed. II. p. 451: trib. unica Cynarocephalar. Subtrib.: Calendulaceae, Echinopsideae, Carduineae, Carlineae, Serratuleae, Centaurieae, Xerantheneae.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 321. Subtrib.: Acharacopappeae, Characopappeae. *Cf.* Walp. Ann. bot. I. p. 428.

Cynarocephalae Vaillant 1718. Act. Ac. Paris. p. 149: class. Compositar. Gen. §. 1: Hacub, Echinopus. §. 2: Onopordon,

Cynarocephalae Vaillant cont.
Carduus, Lappa. §. 3: Cynara, Polyacantha, Cirsium, Eriocephalus, Crocodilium, Crocodilodes. §. 4: Arcana, Cnicus, Calcitrapa, Calcitrapoides. §. 5: Carthamus, Atractylis, Carthamoides, Silybum, Carlina, Carlinoides. §. 6: Xeranthemum, Rhaponticum, Rhaponticoides, Amberboi. § 7: Jacea, Cyanus. *Cf.* Juss. 1805. Ann. Mus. VI. p. 315.
Batsch 1802. Tab. p. 249: ordo Compositar. Fam. unica: Capitatae. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 70. Gen.: Echinops, Carthamus, etc.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: ordo Subaggregatar.
Koch 1837. Syn. p. 392: subordo Compositar. Tribus: Echinopsideae, Carduineae, Carlineae, Serratuleae, Centaurieae, Xeranthemeae. — Par. Koch 1844. Syn. ed. II. p. 451. Trib. unica: Cynareae.
Conf. Cinarocephalae Juss.

Cynarocephaleae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 433: div. Compositar. Gen.: Onopordum, Arctium, Serratula, Silybum, Carduus, Cirsium, Bennettia, Carlina, Cyanus, Phrygia, Jacea, Hippophaestum, Polyacantha, Leucantha.

Cynaroideae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 435.
= Cynareae Less.

Cynaroides DC. 1837. Prodr. VI. p. 666: sect. Leuzeae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2895 *c.* p. 480; 1841. Ench. p. 247.
Synon. Nanocynara Rchb.

Cynclidium Rchb., Endl. vid. *Cinclidium Swartz.*

Cynocardamum*) Webb & Berth. 1836. Phytogr. Canar. I. p. 96: nov. g. Iberidear. (Lepidium virginicum L.)
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 552: g. Siliculosar.
Endl. 1839. Gen. n. 4888. p. 871; 1841. Ench. p. 449: g. Thlaspidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 179. n. 6922. (genuinar.) — Walp. 1842. Rep. I. p. 157. — Meisn. 1843. Comm. p. 340.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Thlaspidar.
Synon. Lepidinella Spach?

Cynocephalum „Wiggers" Endl. in synon. Fegatellae: vid. *Conocephalum Wigg.*

Cynocrambe Tourn. 1703. Coroll. p. 52. t. 485: g. pl. class. XV.
Adans. 1763. Fam. II. p. 497: g. Elaeagnor.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 362. t. 75. f. 9 (prostrata).
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 30.
= Theligonum Linn.

Cynocrambe Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 261: sect. Mercurialis. (M. perennis L.)
= Mercurialis Linn. pars.

Cynocrambeae Nees 1835. Gen. pl. fl. Germ. Fasc. VIII. n. 1.
Endl. 1837. Gen. p. 285; 1841. Ench. p. 171: fam. Juliflorar., Urticaceis aff. Gen. unicum: Thelygonum.

*) Nomen ex Dioscoride mutuatum.

Cynocrambeae Nees cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 243; 1841. Nom. p. 167: subdiv. Sanguisorbear. Gen. id.
Meisn. 1841. Gen. p. 345 (256): ordo Juliflorar.? Gen. id.

Cynoctonae Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 526: div. Asclepiadear. verar. Gen.: Orthosia, Cynoctonum, Pycnoneurum, Holostemma, Solenostemma, Arauja, Schubertia.

Cynoctoneae Endl. 1838. Gen. p. 591: sect. Cynanchear. Gen.: Holostemma, Cynanchum, Endotropis, Schizoglossum, Cynoctonum, Vincetoxicum, Cordylogyne, Solenostemma, Glossostephanus, Metaplexis; Rhyssolobium. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1397 et Ench. p. 298) Bunburya, Pycnoneuron, Morrenia.
Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175): subtrib. Cynanchear. Gen. ut Endl. 1838 et Pycnoneurum, Morrenia.

Cynoctonum*) Gmelin 1791. Syst. p. 443: g. Pentandr. Digyn. (C. sessilifolium et petiolatum Walt. fl. carol. p. 108.)
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3552: g. Rauwolfiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 205.
= Mitreola Linn.

Cynoctonum E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. austr. II. p. 215: nov. g. Asclepiadear. verar. — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 46.
Endl. 1838. Gen. 3464. p. 591; 1841. Ench. p. 299: g. Cynoctonear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175). — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 478.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 128. n. 4958.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 527: g. Cynoctonar.
Synon. Cyathella Decne; Bunburia Harv.; Bunburya Meisn.; Colostephanus Harv.; Cynanchi sect. 3 R. Brown.

Cynodon Rich. 1805 in Pers. Ench. I. p. 85. n. 159: nov. g. Triandr. Digyn. — Par. Willd. 1809. En. p. 90. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 56. — Trin. 1820. Fund. p. 123. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Flora I. p. 472.
Hedw. 1806. Gen. p. 38: g. Graminear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 187. Ed. Nees p. 43. — Palis. 1812. Agrost. p. 37. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 20. 410. n. 248. — Link 1829. Hdb. I. p. 21.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73; 1815 in HBK. Nov. gen. II. p. 170; 1822. Syn. I. p. 230; 1830. Gram. p. 87; 1833. Agrost. p. 259: g. Chloridear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 100. — Agdh. 1823. Aphor. p. 151. — Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 862; 1830. Fl. exc. p. 22; 1841. Nom. p. 37. n. 1308. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 424; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl.

*) κύων, canis; κτείνω, neco.

Cynodon Rich. cont.
I. p. 137; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 102. — Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Koch 1837. Syn. p. 779. Ed. II. p. 899. — Endl. 1837. Gen. n. 836. p. 92; 1841. Ench. p. 58. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 34. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 136. 329. — Meisn. 1843. Gen. p. 422 (322). — Brongn. 1843. En. genr. p. 8. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 461; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 452. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 87; 1850 in Webb Canar. III. p. 395. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 198. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 428. — Steud. 1854. Glum. I. p. 212.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 152: g. Panicear.
Link 1821. En. I. p. 103: g. Graminum. — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 66. 162.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 678): sect. Chloridis.
Link 1827. Hort. I. p. 52: g. Cynodontear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Chlorear.
(Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 463: g. Spartinear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 382: g. Gymnopogonear.
Synon. Capriola Adans.; Digitaria Juss.; Fibigia Köl.; Cabrera Lag.; Panici sp. Linn.

Cynodon Brid. 1822. Meth. musc. p. 99: g. Peristomor. acrocarpor.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 500: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIV Bryoideor.)
Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 638: g. Bryaceor.
= Cynodontium Brid.

Cynodonteae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 51: fam. Graminear. Gen.: Cynodon.

Cynodontium Brid. 1806. Muscol. rec. Suppl. I. p. 155: g. Aploperistomator. (*Synon. Cynontodium Hedw., Swarzia Hedw., Brid.*)
Schwägr. 1811. Suppl. I. 1. p. 110: g. Muscor. (frondosor.) — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 94. — Leman 1818. Dict. v. 12. p. 380. — Agdh. 1822. Aphor. p. 107. — Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 219. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 178. (odontostomor.)
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Weissioidear.
Endl. 1836. Gen. n. 538. p. 52; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 916: g. Calyptrobryor.
Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: g. Dicranacear. (Didymodon obscurus Kaulf.) — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 6.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 95: subg. Didymodontis.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 128: g. Weisiacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 541: g. Didymodontear. et 1849. ibid. VIII. p. 101: g. Dicranear.
Synon. Cynodon Brid.

Cynogeton Kunth vid. *Cycnogeton Endl.*

Cynoglossae Endl. Gen. p. 650: vid. *Cynoglosseae Endl.*

Cynoglosseae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 348: subtrib. Buglossear. Gen.: Echinospermum, Rochelia, Omphalodes, Cynoglossum, Asperugo.
Koch 1837. Syn. p. 496. Ed. II. p. 571: trib. Boraginear. Gen. ead. (praeter Rocheliam.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 192: subdiv. Schizocarpicar. Gen.: Plagiobotrys, Arnebia, Trichodesma, Rindera, Rochelia, Echinospermum, Cryptantha, Botryospermum, Asperugo, Omphalodes, Mattia, Cynoglossum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 111. Gen. ut Endl. 1841 et Krynitzkia.
Endl. 1839. Gen. p. 650 (*Cynoglossae*): trib. Borraginear. Gen.: Trichodesma, Omphalodes, Rindera, Mattia, Solenanthus, Cynoglossum, Asperugo, Echinospermum. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1403 et Ench. p. 321) Friedrichsthalia, Pectocarya, Suchtelenia, Caccinia et 1842. (Spl. II. p. 59) Krynitzkia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 279 (187). Gen.: Ktenospermum?, Rochelia, Omphalodes, Rindera, Mattia, Echinospermum, Eritrichium, Pectocarya, Solenanthus, Cynoglossum, Myosotis, Bothriospermum, Suchtelenia, Caccinia, Asperugo.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 657: subtrib. Borraginear. Gen. ut Endl. 1839.
A. DC. 1846. Pr. X. p. 117: subtrib. Borragear. Gen.: Amsinckia, Gruvelia, Pectocarya, Antiphytum, Eritrichium, Plagiobothrys, Krynitzkia, Echinospermum, Heterocaryum, Asperugo, Cynoglossum, Omphalodes, Suchtelenia, Solenanthus, Diploloma, Caccinia, Mattia, Rindera, Trichodesma.

Cynoglossidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 656: trib. Boraginacear. Gen. Cynoglossear. Endl. 1841.

Cynoglossoides Danty d'Isnard 1718. Mém. Ac. Paris. p. 256: nov. g. plantar. borraginear.
= Trichodesma R. Brown.

Cynoglossoides Endl. 1839. Gen. n. 3779 *a*. p. 650; 1841. Ench. p. 321: sect. Trichodesmae.
Synon. Pilodesma Rchb.

Cynoglossum Tourn. 1700. Inst. p. 139. t. 57: g. pl. class. II.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 12. Ed. Hall. 1745. p. 12: g. pl. class. I.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 323. t. 67. f. 4 (laevigatum, appenninum, linifolium).
Mönch 1794. Meth. p. 418: g. Petalostemonis.
DC. 1805. Franç. III. p. 635: sect. Cynoglossi. — Simil. Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 75.
Schrank 1811. Münchn. Denkschr. III. p. 219: g. Asperifoliar. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. IX. 74. n. 639. — Bartl. 1830. Ord. p. 198.
Link 1821. En. I. p. 172; 1829. Hdb. I. p. 586: g. Borraginear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 2966; 1831. Fl. exc. p.

Cynoglossum Tourn. cont.
344. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 103. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 931.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 349: g. Boraginear. — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 100. — Kunth 1838. Berol. II. p. 37. — Lehm. .... in Hook. Fl. bor. am. II. p. 84.

Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 114: g. Nuculatar.

D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 240: g. Buglossear.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 352: g. Cynoglossear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 496. Ed. II. p. 572. — Rchb. 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 112. n. 4350. — Endl. 1839. Gen. n. 3784. p. 650; 1841. Ench. p. 321. — Meisn. 1840. Gen. p. 279 (188). — DC. 1846. Pr. X. p. 146. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 165. — Dcne .... in Webb Canar. III. p. 51. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 535.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 33: g. Asperifoliear.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 57: g. Anchusear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Cynoglossidar.

Synon. Cynoglossi pars Linn.

Cynoglossum Linn. 1737. Gen. p. 36. n. 100; 1737. Cliff. p. 47; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 33; 1753. Sp. I. p. 134; 1759. Syst. ed. X. p. 914. n. 168; 1762. Sp. ed. II. p. 192; 1764. Gen. ed. VI. p. 75. n. 183; 1767. Syst. ed. XII. p. 146: g. Pentandr. Monogyn. ampliat. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 123. — Murr. 1774. Syst. p. 157; 1784. Syst. p. 186. — Reich. 1778. Gen. p. 77. n. 195. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 100. n. 243. — Gmel. 1791. Syst. p. 318. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 34; 1818. Fl. cap. II. p. 3. — Pers. 1797. Syst. p. 192; 1805. Ench. I. p. 159. n. 354. — Willd. 1797. Sp. I. p. 760. n. 278; 1809. En. p. 179. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 5; ed. 1832. I. p. 456.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 521: g. Asperifoliar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 160. — Gis. 1792. Prael. p. 489. — Batsch 1802. Tab. p. 188. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 114. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 118. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 563. n. 601; 1830. Gen. I. p. 127. n. 632. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 4. 62. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 195. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 607.

Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 195. n. 809: g. Petalostemonum.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Neck. 1790. Act. Theod. Pal. II. p. 479. — Juss. 1789. Gen. p. 131. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 393. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 304. — DC. 1805. Franç. III. p. 635; 1815. V. p. 421. Sect.: Cynoglossum, Omphalodes. — Hedw. 1806. Gen. p. 93. n. 421. — R. Brown

Cynoglossum Linn. cont.
1810. Prodr. I. p. 495. Ed. Nees p. 351. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 381.

Adans. 1763. Fam. II. p. 178: g. Borraginum.

Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 74: g. Oligantherar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 125: g. Monopetalar.

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 185; 1789. Phil. Bot. I. p. 29.

Neck. 1790. El. I. p. 287. n. 454: g. Trachytophytor.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 446: g. Boraginear.

Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 75. Sect.: Cynoglossum, Lappula, Tetraspis, Omphalium.

= Cynoglossum et Omphalodes Tourn.

Cynometra*) Linn. 1741. Act. soc. Ups. p. 78. n. 1024; 1753. Sp. I. p. 382; 1759. Syst. ed. X. p. 1019. n. 466; 1762. Sp. ed. II. p. 547; 1764. Gen. ed. VI. p. 208. n. 519; 1767. Syst. ed. XII. p. 291. n. 514: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 330; 1784. Syst. p. 396. — Reich. 1778. Gen. p. 213. n. 562. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 281. n. 710. — Lour. 1790. Coch. I. p. 268. — Gmel. 1791. Syst. p. 674. — Pers. 1797. Syst. p. 424; 1805. Ench. I. p. 456. n. 1013. — Willd. 1799. Sp. II. p. 539. n. 820. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 83. t. 286; 1832. Ind. II. p. 372.

Gled. 1764. Syst. p. 93. n. 382: g. Thalamostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 299: g. Leguminosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 350. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 379. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 209. — Hedw. 1806. Gen. p. 304. n. 1205 (*Cynomora*). — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 386. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 769 (anomalar.); 1825. Syst. II. p. 327. n. 1595; 1830. Gen. I. p. 353. n. 1786. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1374. 1427.

Neck. 1790. El. II. p. 445. n. 1276: g. Chorisophytor.

Gis. 1792. Prael. p. 429: g. Lomentacear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 98.

Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 509. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 456. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 293. Subgen.: Cynometra, Pseudocynometra. — Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70). — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 508.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.

Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4131; 1841. Nom. p. 155. n. 6086: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 117. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6784. p. 1316; 1841. Ench. p. 674. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 133. — Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 178. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 601.

---

*) κύων, canis; μήτρα, matrix.

Cynometra Linn. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Cynometrear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 77.
Synon. Cynomorium Rumph.; Iripa Adans.

Cynometreae Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74; 1841. ibid. III. p. 133 (*Cynometrieae*): trib. Caesalpiniear. Gen.: Cynometra, Hardwickia, Copaifera, Dialium, Apuleia, Detarium, Crudya. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. Gen. ead. et Pterogyne, Zenkeria. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 274. Gen. ead.

Cynometrieae Benth. in Hook. journ. bot. III. p. 133: vid. *Cynometreae.*

Cynomora Hedwig vid. *Cynometra Linn.*

Cynomoridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 89: trib. Balanophoraceae. Gen.: Cynomorium, Mystropetalum, Balanophora, Phaeocordylis.

Cynomoriceae Agardh 1825. Aphor. p. 203: trib. Urticear. Gen.: Helosis, Langsdorfia, Balanophora, Cynomorium, Sarcophyte.
= Balanophoreae Rich.

Cynomorieae Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 11: trib. Balanophorear. Gen.: Cynomorium. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 74. Gen. id. et Balanophora. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1352 et Ench. p. 52) Mystropetalon. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 548. Gen. ut Endl. — Meisn. 1842. Gen. p. 366 (274). Gen. ut Endl. 1841 et Rhopalocnemis.
Lindl. 1833. Nix. p. 36: ordo Rhizanthear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 164; 1841. Nom. p. 60: div. Balanophorear. Gen. ut Endl. 1841.

Cynomorion*) Micheli 1729. Nov. gen. pl. p. 17. t. 12: g. pl. class. III.
= Cynomorium Linn.

Cynomorium Linn. 1737. Gen. p. 279. n. 702; 1740. Syst. p. 30; 1753. Sp. II. p. 970; 1759. Syst. ed. X. p. 1259. n. 922; 1763. Sp. ed. II. p. 1375; 1764. Gen. ed. VI. p. 476. n. 1033; 1767. Syst. ed. XII. p. 613: g. Monoec. Monandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 700; 1784. Syst. p. 838. — Reich. 1778. Gen. p. 472. n. 1126. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 617. n. 1392. — Pers. 1797. Syst. p. 882; 1807. Ench. II. p. 529. n. 2013. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 177. n. 1620. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 384. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 387.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 3. n. 10: g. Thalamostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 80: g. Elaeagnor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Amentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 578.
Hill 1769. Ht. kew. p. 378: g. Tetraphyllar.
Scop. 1777. Intr. p. 101: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 445: g. incertae sedis.
Neck 1790. El. III. p. 107. n. 1434: g. Daphonophytor.

*) κύριον, penis, a canini genitalis similitudine.

Cynomorium Linn. cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 13: g. Monandr. Monogyn.
Rich. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 431. t. 21: g. Balanophorear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 20. n. 36; 1830. Gen. I. p. 11. n. 39. — Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1679. — Bartl. 1830. Ord. p. 80.
Agdh. 1825. Aphor. p. 203: g. Cynomoriear. — Par. Schott & Endl. 1832. Melet. p. 11. — Endl. 1836. Gen. n. 717. p. 74; 1841. Ench. p. 52. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 548. — Rchb. 1841. Nom. p. 60. n. 2317. — Meisn. 1842. Gen. p. 366 (274). — Hook. f. 1850 in Webb Canar. III. p. 430.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 90: g. Cynomoridar.
Synon. Cynomorion Mich.

Cynomorium Rumph. 1741. Herb. Amboin. I. p. 163.
= Cynometra Linn.

Cynontodium Hedwig 1801. Spec. musc. p. 57: nov. g. Muscor. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 31.
Palis. 1805. Pr. Aethéog. p. 20: g. Ectopogonor.
DC. 1805. Franç. II. p. 463: sect. Didymodontis.
Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 73: sect. Trichostomi.
= Cynodontium Brid.

Cynophalla DC. 1824. Prodr. I. p. 249: sect. Capparidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4874 *d*; 1841. Nom. p. 186. n. 7126. 4. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 282. — Endl. 1839. Gen. n. 5000 *d*. p. 893; 1841. Ench. p. 456. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 77.

Cynophallus Fries 1823. Syst. myc. II. p. 284: trib. Phalli. (Ph. caninus Huds.)
Endl. 1836. Gen. n. 358 *a*. p. 31; 1841. Ench. p. 18: sect. Phalli. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 413. 1.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 29; 1842. Mycol. p. 119: g. Phalloidear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Phalloideor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 259. — Bail 1858. Syst. p. 15. t. 26.
Synon. Mutinus Fries; Ithyphallus Gray pt.

Cynopoa Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 72; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Elymus caninus L.)
= Agropyron Gärtn.

Cynopsola Rchb. vid. *seq.*

Cynopsole Endl. 1836. Gen. n. 719. p. 74; 1841. Ench. p. 52: nov. g. Helosiear. (Balanophora elongata Bl.?, Langsdorffia indica Arn.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 164 (*Scynopsole*); 1841. Nom. p. 60. n. 2322 (*Cynopsola*). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 548. — Meisn. 1842. Gen. p. 366 (274).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 90: g. Helosidar.

Cynopyrum C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 423: sect. Agropyri. (A. caninum, repens, etc.)

Cynorchis Lindl. 1835. Orchid. gen. p. 330; 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1998: g.

Cynorchis Lindl. cont.
Ophrydear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1529. p. 210; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1872. — Meisn. 1842. Gen. p. 380 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Gymnadenidar.
Synon. Cynosorchis Pet.-Thouars; Amphorchidis Pet.-Thouars pars; Gymnadeniae sp. A. Rich.

Cynorhiza*) Ecklon & Zeyh. 1837. Enum. pl. Afr. austr. III. p. 351: nov. g. Peucedanear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). — Endl. 1839. Gen. n. 4464. p. 780 (*Cynorrhiza*); 1841. Ench. p. 379. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 135 (*Cynorrhiza*). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 969. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5463. — Walp. 1843. Rep. II. p. 413.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Cynorrhiza Endl., Spach, Rchb. vid. *praeced.*

Cynorrhynchium Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 207: nov. g. plant.
= Mimulus Linn. (Amoen. acad. III. p. 9.)

Cynosbata**) DC. 1824. Prodr. I. p. 654: sect. Pelargonii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5278 *h.* — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 315 (*Cynosbota*). — Endl. 1840. Gen. n. 6048 *c.* p. 1168; 1841. Ench. p. 620.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 732: subsect. Ciconii.
Rchb. 1837. Hdb. p. 290: g. Pelargoniear.
Synon. Bossea Rchb.

Cynosbatium Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 178: sect. Grossulariae. (Ribes Cynosbati L.)

Cynosbota Spach vid. *Cynosbata DC.*

Cynosciadium DC. 1829. Coll. mém. V. p. 44. t. 11; 1830. Prodr. IV. p. 140: nov. g. Seselinear. (Oenanthe digitata Nutt.) — Par. Tausch 1834. Flora I. p. 355. — Meisn. 1838. Gen. p. 144 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4423. p. 774; 1841. Ench. p. 378. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 139. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 954. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 617. — Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5415.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Cynosorchis Petit.-Thouars 1822. Orchid. afr. t. 13—15.
= Cynorchis Lindl.

Cynosureae Rchb. 1841. Nomencl. p. 39: sect. Festucear. Gen.: Cynosurus, Lamarkia, Dactylis, Chamaedactylis, Lasiochloa, Ectrosia, Lophatherum, Elytrophorus.

Cynosuroideae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 198: fam. Graminear. Gen.: Cynosurus, Sesleria.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 400: div. Loxanthar. Gen.: Cynosurus.

*) κύων, canis; ῥίζα, radix: *Hundewortel* incolarum.
**) βάτος, rubus: Rubus caninus.

Cynosurus Linn. 1737. Gen. p. 13. n. 36; 1737. Cliff. p. 22; 1740. Syst. p. 17; 1753. Sp. I. p. 72; 1759. Syst. ed. X. p. 875. n. 81; 1762. Sp. ed. II. p. 105; 1764. Gen. ed. VI. p. 36. n. 87; 1767. Syst. ed. XII. p. 95: g. Triandr. Digyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 68. — Murr. 1774. Syst. p. 100; 1784. Syst. p. 116. — Reich. 1778. Gen. p. 37. n. 93. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 50. n. 118. — Lour. 1790. Coch. I. p. 59. — Gmel. 1791. Syst. p. 184. — Pers. 1797. Syst. p. 119. — Willd. 1797. Sp. I. p. 411. n. 138; 1809. En. p. 111. — Hoffm. 1800. Bot. Tasch. III. 1. p. 48; III. 2. t. 7. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 314. — Thunb. 1818. Fl. cap. I. p. 442. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 631.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 232: g. Graminum. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 73. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Host 1802. Gram. Austr. II. p. 67. t. 95. 96; 1805. ibid. III. p. 4. t. 4. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 75.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 20. n. 82: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 200. Disjunguntur Wangenheimia, Lamarkia et Eleusine.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 406. — Juss. 1789. Gen. p. 31. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 105. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 82. — DC. 1805. Franç. III. p. 75. — Lois. 1818. Dict. v. 11. p. 404 (*Crételle*). — Link 1829. Hdb. I. p. 79.
Adans. 1763. Fam. II. p. 34: g. Poarum.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 5. t. 1. f. 8 (echinatus).
Neck. 1790. El. III. p. 224. n. 1603: g. Achyrophytor.
Link 1827. Hort. I. p. 198: g. Cynosuroidear. — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 401.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 466: g. Festucear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 445. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 75. — Math. 1853. Belg. I. p. 618.
Kunth 1830. Gram. p. 126; 1833. Agrost. p. 388; 1838. Berol. II. p. 394: g. Festucacear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 809. Ed. II. p. 934. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 455. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 42. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 139. 371. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 9. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 140; 1850 in Webb Canar. III. p. 406. — Steud. 1854. Glum. I. p. 299. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 562. Sect.: Eucynosurus, Lamarckia.
Endl. 1837. Gen. n. 894. p. 100; 1841. Ench. p. 59: g. Bromear. Sect.: Cynosurus, Chrysurus. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 424 (324). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 164.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1402 (1844. Fl.

Cynosurus Linn. cont.
sax. p. 35): g. Cynosurear. Sect. ut Endl.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 348: g. Eubromear.
Cynosurus Pers. 1805. Ench. I. p. 86. n. 164: g. Triandr. Digyn., excluso Chrysuro restrict. — Par. Trin. 1820. Fund. p. 142.
Hedw. 1806. Gen. p. 48. n. 228: g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 66. t. 14. f. 1. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 30. 517. n. 287. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 349. n. 345; 1830. Gram. I. p. 71. n. 347.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 126. — Bartl. 1830. Ord. p. 29.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 171: g. Chloridear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 151.
Link 1821. En. I. p. 101: g. Graminum. — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 69. 263.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 839; 1830. Fl. exc. p. 17: g. Cenchrinar.
Endl. 1837. Gen. n. 894 *a.* p. 100; 1841. Ench. p. 59: sect. Cynosuri. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1402. 1.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Synon. Falona Adans.; Phalona Dumort. (Steud.)
Cynotis Hoffmannsegg 1826. Verzeichn. p. 99.
= Cryptostemma R. Brown.
Cynotoxicum Flor. Flum. IV. t. 186—188: g. Decandr. Monogyn. ex Steud. Nom. I. p. 465.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 18 inter genera nondum descripta.
Cynoxylum Pluk. 1696. Almag. p. 127. t. 172. f. 6.
= Nyssa Gron.
Cynthia D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 309: nov. g. Taraxacear. (Troximon virginicus Gärtn.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 142.
Less. 1832. Syn. p. 129: g. Hyoseridear. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 89. Sect.: Eucynthia, Adopogon. — Meisn. 1839. Gen. p. 234 (144). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 468. Sect. ut DC. — Brongn. 1843. En. genr. p. 34.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7: g. Hieraciear.
Synon. Troximon Endl. (Troximon Gärtn. pt.); Luthera Schultz.
Cynura Cassini (ubi?) teste Orb. Dict. III. p. 544: g. Compositar.
Cyophorci Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: trib. Entobasidum. Sect.: Polygastrei, Nidularici, Carpobolei.
Cyparissa „Don" Endl. 1841. Ench. p. 139. n. 1790 *c*: sect. Thujae.
Cypella Herbert .... Bot. Mag. n. 2637.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1181: g. Ferrariear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 7.
Bartl. 1830. Ord. p. 45: g. Iridear. — Par. Rchb. 1830. Fl. exot. n. 20; 1841. Nom. p. 43. n. 1560. (genuinar.) — Endl. 1837. Gen. n. 1228. p. 166; 1841. Ench. p. 98. —

Cypella Herbert cont.
Meisn. 1842. Gen. p. 392 (294). — Brongn. 1843. En. genr. p. 22.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Phalocallis Herb.; Alophia Herb.; Trifurcaria Herb.?; Beatonia Herb.?
Cypellium Desvaux 1825 in Hamilt. Pr. fl. Ind. occ. p. 28: nov. g. Pentandr. Monogyn. (C. nervosum.)
Meisn. 1838. Comm. p. 112: g. Rubiacear.? anomalum.
= Strigilia Cavan.
Cypellon*) Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 292: nov. g. Algar. (Fucus laciniatus Balb.)
Rupr. 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 42: g. Rhodophycear.
= Acanthotylus Kütz.
Cypellon Zanardini mss.?
= Fauchea Mont. (Kütz. Spec. p. 787.)
Cyperaceae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 62. t. 12: fam. plantar. Gen. §. 1: Carex, Adupla. §. 2: Fuirena, Schoenus, Gahnia, Eriophorum, Scirpus, Cyperus, Thryocephalum, Killingia, Mapania, Chrysitrix.
DC. 1805. Franç. III. p. 99: fam. (13) Monocotyledonum (phanerogamar.) Gen.: Carex, Eriophorum, Scirpus, Schoenus, Cyperus. Accedit 1815 (ibid. V. p. 298) Kobresia. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 867.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 212. Ed. Nees p. 68: ordo Monocotyledonum. Nova gen.: Chondrachne, Chorizandra, Isolepis, Eleocharis, Arthrostylis, Chaetospora, Oreobolus, Lampocarya, Evandra, Caustis, Diplacrum.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153. Divis.: Scirpeae, *verae* (gen.: Cyperus, Abildgaardia, Dulichium, Mariscus, Papyrus, Kyllingia, Schoenus, Rhynchospora, Chaetospora, etc.), Cariceae, Sclerinae.
Juss. 1818. Dict. v. 12. p. 391: fam. Monohypogynar. Gen. §. 1: Carex, Scleria, Opetiola, Uncinia, Kobresia, Diplacrum, Zosterospermum. §. 2: Remirea, Killingia (Thryocephalum), Cyperus, Schoenus, Chrysithrix, Scirpus, Eriophorum, Fuirena, Mapania, Mariscus, Melancranis, Fimbristylis, Abilgarda, Elyna, Dichromena, Hypaelytrum, Vaginaria, Lepironia, Trichophorum, Diaphora, Chaetospora, Isolepis, Arthrostylis, Chorizandra, Chondrachne, Oreobolus, Elaeocharis, Beera, Papyrus, Nemochloa, Hymenochaeta; Cladium, Gahnia, Machaerina, Rhyncospora, Lepidosperma, Dulichium, Lampocarya, Evandra, Caustis, Carpha, Catagyna, Lasiochaeta, Cylindrosperma.
DC. 1819. Théor. élém. p. 249: ordo Endogenar. phanerogamar.
Lestib. 1819. Ess. Cypér. Divis.: Cariceae, Sclericae, Chrysitriceae, Kobresiae, Cypereae, Scirpeae. *Cf.* Flora 1821. I. p. 1 et Schult. 1824. Mant. II. p. 1. 3.

*) κύπελλον, poculum.

Cyperaceae St. Hil. cont.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 41: fam. plant. endogenar. phanerogamar. Divis.: Cariceae, Cyperaceae, Scirpideae.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: fam. Glumaciae.
Agdh. 1823. Aphor. p. 140: ordo Glumiflorar. Tribus: Cariceae, Cypereae, Scirpeae. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 119. Trib. eaed.
Presl fr. 1828 in Reliq. Hänk. I. fasc. 3. Sect.: *genuinae* (trib.: Cyperoideae, Hypoelytreae, Scirpeae), *Diclinae* (trib.: Sclerineae, Caricinae).
Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 149. Divis.: Cariceae, Sclerineae, Cyperineae, Scirpeae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.; 1833. Nix. p. 36: ordo Glumacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 32. Divis.: Caricinae, Cyperinae. — Endl. 1837. Gen. p. 109; 1841. Ench. p. 62. Trib. ut Nees 1834 et Fuireneae. — Meisn. 1842. Gen. p. 410 (313). Trib.: Cypereae, Scirpeae, Hypolytreae, Rhynchosporeae, Sclerieae, Elyneae, Caricineae. — Steud. 1855. Glum. II. p. 1. Trib. ut Kunth 1837.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 101. Novum genus: Vauthiera.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 373. Tribus: Cypereae, Hypolytreae, Chrysitricheae, Scirpeae, Rhynchosporeae, Cladieae, Sclerieae, Elyneae, Cariceae.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 384) 1847. Veg. kd. p. 117: ordo Glumalium. Subord.: Cariceae, Elyneae, Sclereae, Rhynchosporeae, Cladeae, Chrysitricheae, Hypolytreae, Fuireneae, Scirpeae, Cypereae.
Kunth 1837. Cyper. p. 1: ordo Monocotyledonum. Tribus: Cypereae, Scirpeae, Hypolytreae, Rhynchosporeae, Sclerineae, Caricineae.
Koch 1837. Syn. p. 734. Ed. II. p. 848: ordo Endogenear. Trib. ut Agdh.
Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 1. Tribus: Cypereae, Hypolytreae, Ficinieae, Scirpeae, Fuireneae, Rhynchosporeae, Cladieae, Sclerieae, Elyneae, Cariceae. — Simil. Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 53. (Gen. Meyeniana.)
Brongn. 1843. Én. genr. p. 11: fam. Glumacear. Trib.: Cypereae, Scirpeae, Schoeneae, Sclerieae, Caricineae. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 142. Trib. ut Meisn. (Cariceae.)
Synon. Cyperi Hall.; Cyperoideae Juss.; Cypereae Palis.; Scirpeae Batsch; Scirpoideae Pers.; Cyperoidae Spreng.; Cyperideae Dumort.

Cyperaceae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 136: div. Cyperoidar. Gen.: Cyperus, Dulichium, Carpha.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 69: div. Cyperacear. Gen.: Cyperus, Schoenus, Cladium, Chaetospora, Rhynchospora.
= Cypereae Lestib.

*Cypereae**) Palis. 1816. Mém. de l'Inst. Année 1812. Pt. II. p. 51. Novum genus: Tetraria.
= Cyperaceae St. Hil.

Cypereae Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 19): div. Cyperacear. Gen.: Spermodon, Zosterospermum, Pycreus, Killingia, Melancranis; Hypoelytrum, Mapania, Remirea, Cyperus, Mariscus, Papyrus, Abildgaardia, Trasus, Elynanthus, Arthrostylis, Hypolepis, Schoenus, Schoenopsis, Lampocarya; Gahnia, Cladium, Caustis, Tetraria, Evandra; Nomochloa, Dulichium, Rhynchospora; Carpha, Chaetospora, Machaerina.
Agdh. 1823. Aphor. p. 141: trib. Cyperacear. Gen.: Kyllingia, Melancranis, Hypaelytrum, Mapania, Cyperus, Mariscus, Abildgaardia, Arthrostylis, Schoenus, Lampocarya, Gahnia, Cladium, Caustis, Evandra, Dulichium, Rhynchospora, Carpha, Machaerina. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 119. Gen. ead. — Schrad. 1832. Comm. Gotting. VII. p. 104. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 282. Gen.: Acrolepis, Hemichlaena, Dulichium; Comostemum, Pycreus, Cyperus, Papyrus, Mariscus; Kyllingia, Courtoisia, Remirea. — Koch 1837. Syn. p. 735. Ed. II. p. 848. Gen.: Cyperus, Schoenus. — Endl. 1837. Gen. p. 118; 1841. Ench. p. 64. Gen.: Dulichium, Cyperus. Accedit 1842 (Spl. II. p. 10) Leptoschoenus. — Kunth 1837. Cyperogr. p. 2. Gen.: Cyperus, Mariscus, Courtoisia, Kyllingia, Remirea. — Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 3. Novum genus: Diclidium. — Meisn. 1842. Gen. p. 410 (313). Gen. ut Kunth et Leptoschoenus. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 11. Gen.: Cyperus, Killingia, Mariscus, Androtrichum. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144. Gen. ut Meisn. — Steud. 1855. Glum. II. p. 1. Gen.: Acrolepis, Hemichlaena, Leptoschoenus, Dulichium, Atomostylis; Cyperus, Chamaexyphium, Mariscus, Kyllingia, Courtoisia, Remirea, Sorostachys, Hydroschoenus, Borabora.
Rchb. 1828. Consp. p. 56 (1830. Fl. exc. p. 72); 1837. Hdb. p. 147: subdiv. Cyperinar. Gen. ut Lestib. (exclusis 6 ultimis) et Schelhammeria, Hemichlaena, Baumea, Torulinium? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. Gen.: Cyperus, Pycreus, Torreya, Papyrus, Kyllingia, Abildgaardia, Dulichium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: subordo Cyperacear. Gen.: Dulichium, Comostemum, Diclidium, Cyperus, Papyrus, Kyllingia, Mariscus, Abilgaardia, Leptoschoenus.
Conf. Cyperaceae Spreng.

Cyperella Rupp. 1718. Fl. jen. p. 130. Ed. Hall. 1745. p. 143: g. pl. class. VI.
= Luzula DC.

Cyperella Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 53. t. 31: g. pl. class. XV.
= Rhynchospora Vahl et Blysmus?

Cyperi Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 234: div. Apetalar. staminiferar. Gen.: Cyperoides, Ulva, Carex, Cyperus, Scirpus, Linagrostis.

*) Nomen pro Cyperoideis Juss. substitutum.

Cyperi Hall. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 40: sect. 9. Graminear. Gen.: Cyperus, Scirpus, Linagrostis, Carex, Ulva, Mondo, Flagellaria.

Cyperideae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 64.
= Cyperaceae St. Hil.

Cyperinae Rchb. 1828. Consp. p. 56; 1830. Fl. exc. p. 72; 1837. Handb. p. 147: div. Cyperoidear. Subdivis.: Cypereae, Dulichieae et (1837) Schoeneae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. Subdivis.: Rhynchosporeae, Chrysitricheae, Cypereae.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: div. Cyperacear. Gen. Cyperinar. et Scirpinar. Rchb. 1828.

Cyperineae Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 172: div. Cyperacear. Gen.: Pleurostachys, Abildgaardia, Mariscus.

Cyperites Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. I. t. 43.
Göpp. 1836. Syst. Fil. foss. (Nov. Act. Leop. XVII. Spl. p. 439): g. Graminear. foss. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 167; 1846. Chlor. prot. p. LXVI (dubium).

Cyperoidae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 129: fam. 13 plant. Divis.: Cariceae, Sclerinae, Scirpinae, Cyperaceae.
= Cyperaceae St. Hil.

Cyperoideae Juss. 1789. Gen. p. 26: ordo 3 class. II. Gen. §. 1: Carex. §. 2: Fuirena, Schoenus, Gahnia, Eriophorum, Scirpus, Cyperus, Thryocephalum, Kyllingia, Mapania, Chrysitrix. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 90. Gen. §. 1: Carex. §. 2: Schoenus, Eriophorum, Scirpus, Cyperus.
Rchb. 1828. Consp. p. 55; 1830. Fl. exc. p. 54; 1837. Hdb. p. 147; 1841. Nom. p. 40: fam. Glumacear. Divis.: Caricinae, Cyperinae, Scirpinae.
= Cyperaceae St. Hil.

Cyperoideae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 275: ordo 2 Endogenear. (parallelinerviar.) Sect.: *genuinae* (gen.: Streblidia, Schoenus, Blysmus, Rhynchospora, Eleocharis, Eleogiton, Isolepis, Fimbristylis, Holoschoenus, Dichroma, Cladium, Scirpus, Abildgaardia, Machaerina, Cyperus, Papyrus, Dulichium, Mariscus, Kyllinga, Fuirena, Hypelytrum, Trichophorum, Eriophorum), *diclinae* (gen.: Elyna, Kobresia, Carex), Typhoideae. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 98. Subordines iidem et Sparganioideae.

Cyperoideae Presl fratr. 1828. Reliq. Hänk. I. Fasc. 3: trib. Cyperacear. genuinar. Gen.: Cyperus, Abildgaardia, Mariscus, Kyllingia, Gussonea.
= Cyperear. Nees pars.

Cyperoides Tourn. 1700. Inst. p. 529. t. 300: g. pl. class. XV. — Par. Mich. 1729. Nov. pl. gen. p. 55. t. 32. — Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 320.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 303: g. pl. class. XIV.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 231: g. Cyperor.
Gaud. 1830. Helv. VI. p. 21: sect. Caricis.
= Caricis Linn. spec.

Cyperorchis Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 3. p. 48: nov. g. Vandear. (Cymbidium elegans Lindl.) — Par. Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 548.

Cyperus*) Tourn. 1700. Inst. p. 527. t. 299: g. pl. class. XV. — Par. Mich. 1729. Nov. pl. gen. p. 44. t. 31. — Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 318.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 301: g. pl. class. XIV.
Linn. 1737. Gen. p. 12. n. 32; 1737. Cliff. p. 21; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 19; 1753. Sp. I. p. 44; 1759. Syst. ed. X. p. 866. n. 61; 1762. Sp. ed. II. p. 66; 1764. Gen. ed. VI. p. 29. n. 66; 1767. Syst. ed. XII. p. 81: g. Triandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 41. — Murr. 1774. Syst. p. 82; 1784. Syst. p. 96. — Reich. 1778. Gen. p. 31. n. 72. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 41. n. 93. — Lour. 1790. Coch. I. p. 41. — Gmel. 1791. Syst. p. 129. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 18; 1818. Fl. cap. I. p. 374. — Pers. 1797. Syst. p. 98; 1805. Ench. I. p. 60. n. 122. — Willd. 1797. Sp. I. p. 269. n. 112; 1809. En. p. 71. — Hoffm. 1800. Bot. Tasch. III. 1. p. 20; III. 2. t. 2. — Vahl 1806. Enum. II. p. 298. n. 121. (restrict.) — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 116. — Elliott 1817. Sketch I. p. 63. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 34. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 420. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 190; ed. 1832. I. p. 185.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 246: g. Cyperor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 41.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 82: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 79. (spurior.) — Host 1805. Gram. Austr. III. p. 47. t. 70—76.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 13. n. 42: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 316.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Calamariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 129. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 23.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 396.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 9. t. 2. f. 2 (pumilus).
Juss. 1789. Gen. p. 27: g. Cyperoidear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 92. — Link 1821. En. I. p. 43; 1827. Hort. I. p. 300; 1829. Hdb. I. p. 105. — Presl fr. 1828. Reliq. Hänk. I. Fasc. 3.
Neck. 1790. El. III. p. 242. n. 1630: g. Chortodiphytor.
Batsch 1802. Tab. p. 157: g. Scirpear.
Cram. 1803. Disp. p. 4 in Monandr. Monogyn. et p. 14 in Diandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 66: g. Cyperacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 144; 1815. V. p. 301. — Hedw. 1806. Gen. p. 33. 360. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 212. Ed. Nees p. 68. — Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153; 1815 in HBK.

*) *κύπειρος* s. *κυπειρίς* Veterum

Cyperus Tourn. cont.
Nov. gen. I. p. 202; 1822. Syn. I. p. 37. (verar.) — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 4. 161. n. 183. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 136; 1825. Syst. I. p. 215. n. 227. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 69. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 12. — D. Don 1825. Nepal. p. 38. — Lois. 1827. Dict. v. 49. n. 498 *(Souchet)*. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 64. 133. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 71. — Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 84.) Sect.: Dewisia, Arethryon, Papyrus. — Endl. 1833. Norf. p. 21. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 207. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 419. Sect.: Picreus, Eucyperus. — Webb 1850. Canar. III. p. 360. Sect.: Pycreus, Etymocyperus. — Hook. f. 1853. N.Zeal. I. p. 268.
Agdh. 1823. Aphor. p. 141: g. Cyperear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 50. n. 236. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 119. — Koch 1837. Syn. p. 735. Ed. II. p. 848. — Kunth 1837. Cyper. p. 2; 1838. Berol. II. p. 318. — Meisn. 1842. Gen. p. 410 (313). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 11. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 147. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 621. Sect.: Eu-Cyperus, Pycreus. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 688 *(Souchet)*. — Liebm. 1850. Mexic. Halvgräs. Sect.: Pycreus, Eucyperus, Diclidium, Papyrus. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 239. — Math. 1853. Belg. I. p. 580. — Steud. 1855. Glum. II. p. 2. Sect.: Pycreus, Cyperus. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 357. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 254. Subgen. ut Steud.
Endl. 1837. Gen. n. 1003 *a*. p. 119; 1841. Ench. p. 64: sect. Cyperi.
Synon. Pseudo-Cyperus Mich.; Mariscus Hall.; Papyrus Willd.; Pycreus Palis.; Torreya Rafin.; Distimus Rafin.; Comostemum Nees?; Galilea Parl.?

Cyperus Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 21 et Schult. Mant. II. p. 4): g. Cyperear., sejuncto Pycreo restrict. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1088; 1830. Fl. exc. p. 72; 1841. Nom. p. 41. n. 1469. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 283; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 15; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 56; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 72.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Cyperinar.
Bluff & Nees 1836. Fl. germ. I. 1: g. Cyperoidear. — Par. Rchb. 1844. Fl. sax. p. 55.
Steud. 1855. Glum. II. p. 2: sect. Cyperi. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 254.
= Eucyperus Griseb.

Cyperus Endl. 1837. Gen. n. 1003. p. 119; 1841. Ench. p. 64: g. Cyperear. latius circumscriptum. Sect.: Cyperus, Kyllingia, Abildgaardia.
= Cyperus Tourn., Kyllingia Linn. et Abildgaardia Vahl.

Cyphaea Lemaire vid. *Cuphea P. Browne.*

Cyphanthera*) Miers 1853. Ann. and Mag. n. h. 2d. sér. XI. p. 376: nov. g. Solanear., ab Anthocercide sejunctum.
Miers .... Ill. South-Am. pl. II. App. p. 28. Char. reform. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 593.

Cyphelium**) Achar. 1814. Vet. Ac. Handl. p. 215; 1816. ibid. p. 110.
Agdh. 1821. Aphor. p. 92: g. Calicioidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 19. n. 360 *b*: sect. Calicii.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 570: sect. Calycii. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 129 *a*. p. 12; 1841. Ench. p. 9. — Rchb. 1841. Nom. p. 14. n. 510. 1.
Th. Fries 1856. Oefvers. k. Vet. Ac. Förh. XIII (Flora 1857. p. 633): g. Calicioideor.
Synon. Calycium Chev.; Acolium Fée.

Cyphelium Chevall. . . .
= Calycium Achar.

Cyphelium Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 313: g. Calyciear. — Par. Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 344.
Arnold 1858. Flora II. p. 698: g. Caliciear.
= Chaenotheca Th. Fries.

Cyphella Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 201; 1828. Elench. II. p. 28: nov. g. Heteroclitar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 85: g. Cupulaeformium.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 570: g. Pezizear. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 37; 1842. Mycol. p. 154.
Fries 1825. Pl. homon. p. 92: g. Pileolarium. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 293. — Endl. 1836. Gen. n. 409. p. 35; 1841. Ench. p. 20.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 768. n. 3928: g. Pezizoideor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 518: g. Hymenomycetum angiosporor.
Fries 1838. Epicr. p. 566; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 336: g. Auricularinor. — Par. Corda 1842. Mycol. p. 193 (in Addend.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42. — Bail 1858. Syst. p. 22. t. 28.
Lév. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 239: g. Cantharello aff. Char. reform.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 455: g. Hydneor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 314: g. Helotieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Thelephoreor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 144: g. Hymenularior.
Math. 1853. Belg. II. p. 266: g. Tremellinear.
Synon. Pezizae sp. Auct.

Cyphia Berg. 1767. Fl. cap. p. 373.
Scop. 1777. Intr. p. 105: g. Strictar.
Juss. 1789. Gen. p. 165: g. Campanulacear.
Neck. 1790. El. I. p. 132. n. 227: g. Sphanidophytor.

*) *κυφός*, curvus, gibbus.
**) *κύφελλον*, cavitas, poculum.

Cyphia Berg. cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 370 (*Cyphium*): g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 952. n. 343.
Batsch 1802. Tab. p. 212: g. Campanulatar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 369: g. Campanulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 170. n. 716. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 524; 1825. Syst. I. p. 809. n. 907; 1830. Gen. I. p. 196. n. 996. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. xxxix. 475. n. 1011. (?) — Dietr. 1839. Syn. p. 576. 859. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691.
Pers. 1807. Ench. II. p. 215. n. 1585: g. Monadelph. Pentandr.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 393: g. Lobeliacear. — Par. Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 98. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 718.
Bartl. 1830. Ord. p. 148: g. Goodenoviear.
Presl 1837 in E. Meyer Comm. pl. Afr. II. p. 292: g. Goodeniear. Sect.: Eucyphia, Isomeria, Cyphiella. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3041. p. 507; 1841. Ench. p. 261. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (146). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 584. (restrict.)
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 498: g. Cyphiacear. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1037.
Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4017: g. Cyphiear. (in Consp. omissum.)
Synon. Lobeliae sp. Linn. et Auct.

Cyphiaceae A. DC. 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XII. p. 151; 1839. Prodr. VII. 2. p. 497: ordo (106) Calyciflorar. Gen.: Cyphia.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1037: subordo Lobeliacear. Gen.: Cyphia, Nemacladus, Cyphocarpus, Streleskia.
Synon. Cyphieae Rchb.; Campanulacear. pars Juss.; Goodenoviear. pars R. Brown.

Cyphieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 103: subdiv. Campanulariar. Gen.: Cyphia.

Cyphiella Presl 1837 in E. Meyer Comm. pl. Afr. II. p. 293: sect. Cyphiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3041 c. p. 507; 1841. Ench. p. 261.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 584: g. Goodeniear.

Cyphium Gmel. vid. *Cyphia Berg.*

Cyphocalyx Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 557: nov. g. ex typo Aspalathi aridae E. Mey.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 209: g. Genistear.

Cyphocarpaceae Miers 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 61: nova fam. Lobeliaceis et Goodenovieis aff. Gen.: Cyphocarpus. *Cf.* Griseb. 1849. Arch. f. Naturg. II. p. 431.

Cyphocarpus Miers 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 62: nov. g. Cyphocarpacear. (C. rigescens.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1038: g. Cyphiacear.

Cypholophus*) Weddell 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 198 (Flora 1855. p. 522): nov. g. Euböhmeriear. (C. macrocephalus et rufescens.)
Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 377: g. Sarcochlamydear.

Cyphoma*) Hook. f. & Wils. 1855. Fl. New-Zeal. II. p. 95: subg. Polytrichi. (P. magellanicum Hedw.)
= Polytrichadelphus C. Müll.

Cyphomandra Sendtner 1845. Flora I. p. 161; 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 113: nov. g. Solanacear., ex Witheringiae et Solani speciebus conditum. *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 502.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 576: g. Solanear. — Par. Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 179.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 387: g. Solaninear.
Synon. Cyathostyles Schott; Pionandra Miers; Pallavicinia Not.

Cyphonema Herbert . . . . Bot. Mag. 3710. p. 3 (fol. 1347): nov. g. Amaryllidear. Cyrtanthiformium.
Kunth 1850. Enum. V. p. 541: g. Cyrtanthear.

Cyphopteris**) „Presl" Sternb. 1838. Vers. II. p. 121: nov. g. Polypodiacitum. (Pecopteris punctulata Brongn.)
= Hemitelites Göpp.

Cyphorima Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 98: nov. g. Borraginear. (Lithospermum latifolium L.)
= Batschia Gmel.

Cyprianthe Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 220: nov. g. Ranunculinear. (Ranunculus asiaticus.)
= Ranunculastrum DC.

Cypripedeae Lindl. 1840. Gen. Orchid. p. xvii. 525; 1847. Veg. kingd. p. 183: trib. Orchidacear. Gen.: Cypripedium.
= Cypripedieae Lindl.

Cypripedia Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 298: ordo Orchidear. Gen.: Cypripedium.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 124: div. Orchidear. Gen. id.
= Cypripedieae Lindl.

Cypripedieae Lindl. 1826. Orch. scel. p. 7. 18 (Linnaea II. p. 531): subordo et tribus Orchidear. Gen.: Cypripedium.
Rchb. 1828. Consp. p. 70; 1837. Hdb. p. 155: div. Orchidear. Gen. id.
Lindl. 1833. Nix. p. 34: ordo Gynandrar.
Dumort. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 6: trib. Chondrorchidear.
Endl. 1837. Gen. p. 220; 1841. Ench. p. 114: subordo Orchidear. Gen. id.
Koch 1837. Syn. p. 697. Ed. II. p. 804: trib. Orchidear. Gen. id. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 387 (289). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 28. Gen. id. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182. Gen. id. — Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172.

*) κυφός, curvus; λόφος, crista.

*) κύφωμα, gibbus.
**) κῦφος, tuberculum.

Cypripedieae Lindl. cont.
Gen. id. — Rchb. f. 1852. Poll. gen. p. 16.
Rchb. 1841. Nom. p. 56: div. Orchidacear. Gen.: Cypripedium, Hypodema.
Synon. Cypripedia Spreng.; Cypripedeae Lindl.

Cypripedium*) Linn. 1737. Gen. p. 272. n. 687; 1737. Cliff. p. 430; 1740. Syst. p. 29; 1753. Sp. II. p. 951; 1759. Syst. ed. X. p. 1245. n. 906; 1763. Sp. ed. II. p. 1346; 1764. Gen. ed. VI. p. 464. n. 1015; 1767. Syst. ed. XII. p. 595 (*Cyrripedium*): g. Gynandr. Diandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 680; 1784. Syst. p. 817. — Reich. 1778. Gen. p. 458. n. 1100. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 606. n. 1376. — Pers. 1797. Syst. p. 862. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 142. n. 1613; 1809. En. p. 947. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 199.
Linn. 1740. Act. Upsal. p. 24; 1747. Cl. plant. p. 490: g. ordinis quarti naturalis.
Gled. 1749. Berl. V. p. 133; 1764. Syst. p. 283. n. 1163: g. Stylostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27; 1764. Ord. nat.: g. Orchidear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 65. — Gis. 1792. Prael. p. 179. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 209. — Swartz 1800. Act. Holm. p. 250; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 101. — Batsch 1802. Tab. p. 101. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 167. — DC. 1805. Franç. III. p. 264. — Pers. 1807. Ench. II. p. 525. n. 2008. — R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 220. (Verm. bot. Schr. II. p. 50.) — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 404. — Rich. 1818. Mém. Mus. IV. p. 43. 52. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 212. — Link 1822. En. II. p. 372; 1829. Hdb. I. p. 256. — Agdh. 1823. Aphor. p. 190. — D. Don 1825. Nepal. p. 37. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 745. n. 3044; 1831. Gen. II. p. 676. n. 3418. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 572. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1553. 1579. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 423. 490. — Bartl. 1830. Ord. p. 58. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 173.
Hill 1769. Ht. kew. p. 278: g. Dipetalar. irregular.
Scop. 1777. Intr. p. 91: g. Satyrior.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 30: g. Diandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 62. — Rebent. 1804. Fl. neom. p. 15.
Neck. 1790. El. III. p. 131. n. 1471: g. Synarmophytor.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 161: g. Gynandr. Monandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 298: g. Cypripedior. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 124.
La Llave & Lex. 1825. Nov. veget. II. Orch. p. 9: g. Rinemospermar. hypogear. (C. Irapeanum.)
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 18 (Linnaea II. p. 531): g. Cypripediear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1577. Sect.: Calceolus, Hypodema, Venustum. — Endl. 1837. Gen. n. 1618. p. 220; 1841. Ench. p. 114. — Koch 1837. Syn. p. 697. Ed. II. p. 804. — Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2197. Sejungitur Hypodema. — Meisn. 1842. Gen. p. 387 (289). — Brongn. 1843. En. genr. p. 28. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 192. — Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172. — Rchb. f. 1852. Poll. gen. p. 16. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 86. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 266. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 737.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 134: g. Epipactear.
Lindl. 1840. Orchid. p. 525; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Cypripedear.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 97: g. Ceriorchidear.
Math. 1853. Belg. I. p. 528: g. Neottiear.
Synon. Calceolus Tourn.; Criosanthes Rafin.; Arietinium Beck.

Cyprolepis Steud. vid. *Lyprolepis Steud.*

Cypselea*) Turpin 1806. Ann. Mus. VII. p. 219: nov. g. Portulacear. (C. humifusa.) — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 408. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 841; 1825. Syst. I. p. 94. n. 123. — DC. 1828. Pr. III. p. 353. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 73.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 60. 282. n. 109: g. Diandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4311: g. Talinear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 30. n. 131: g. Sedear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 104.
Bartl. 1830. Ord. p. 302: g. Spergulear.
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 351: g. Portulacellar. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 130 (94).
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205: g. Alsinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 237; 1841. Nom. p. 163. n. 6343: g. Sesuviear. — Par. Fenzl 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 293. — Endl. 1839. Gen. n. 5173. p. 949; 1841. Ench. p. 501.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 527: g. Sesuvear.
Synon. Millegrana Surian.; Radiana Rafin.

Cypselodontia**) DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 286: nov. g. Euinulear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 193 (129). — Endl. 1841. Spl. I. n. 2436/2. p. 1381; 1841. Ench. p. 236.
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3400: g. Inulear. (genuinar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 954: g. Printziear.

Cypsophila Fl. Wett. II. p. 86: sphalm. pro *Gypsophila*.

Cyrbasium***) Endl. 1839. Gen. n. 4989. p. 891; 1841. Ench. p. 456: g. Cleo-

---

*) πέδη, πέδιον, pedica.

*) κυψέλη, alveare.
**) κυψέλη, alveare; ὀδούς, dens.
***) κυρβασία, pilei species.

Cyrbasium Endl. cont.
mear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 185. n. 7106. (genuinar.) — Walp. 1842. Rep. I. p. 196. — Meisn. 1843. Comm. p. 342. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358.
Synon. Cristatella Nutt.

Cyrenea Allemand 1770. Nov. Act. Nat. Cur. IV. p. 94: nov. g. plantar.

Cyrilla*) „Gardener mss." Linn. 1767. Mant. I. p. 5. n. 1247; 1767. Syst. ed. XII. p. 182: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 200; 1784. Syst. p. 241. — Reich. 1778. Gen. p. 111. n. 294. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 150. n. 380. — Gmel. 1791. Syst. p. 411. — Pers. 1797. Syst. p. 252; 1805. Ench. I. p. 175. n. 404. — Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 157. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 144.
Scop. 1777. Intr. p. 228: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 160: g. Ericar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 357. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXII. 408. n. 982.
Neck. 1790. El. II. p. 380. n. 1191: g. Ypsoophytor.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 153: g. Petalostemonis.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 409: g. Ericinear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 512: g. Rhododendrear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 788. n. 865; 1830. Gen. I. p. 180. n. 912: g. Ericear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 805.
Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4214: g. Cunoniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 313 (desciscens).
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 35: g. Escalloniear.
Meisn. 1837. Gen. p. 68 (49): g. Evonymear.? et p. 137 (101) Escalloniear.?
Endl. 1841. Spl. I. p. 1413. n. 4344/$_1$; 1841. Ench. p. 578. n. 5713/$_1$: g. Cyrillear. (*Cf.* Meisn. 1843. Comm. p. 348.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4934. — Planch. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 127; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 254. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 421. — Alefeld 1856. Linnaea XXVIII. p. 7.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 445: g. Cyrillacear.

Cyrilla L'Herit. 1784. Stirp. nov. I. p. 147. t. 71: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Roxb. 1798. Corom. II. p. 47. t. 189; 1832. Ind. III. p. 115. — Willd. 1800. Sp. III. p. 229. n. 1141.
= Achimenes P. Browne.

Cyrillaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 445: ordo Berberalium. Gen.: Cyrilla, Mylocaryum, Elliottia.

Cyrilleae Endl. 1841. Gen. Suppl. I. p. 1413: fam. Bicornium, Ericaceis aff. Gen.: Cyrilla, Cliftonia.
Endl. 1841. Ench. p. 578: fam. Frangulacear. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 127: subdivis. Vacciniear. Gen. ead.

*) Dicat. Dominico Cyrillo, prof. Neapol.

Cyrilleae Endl. cont.
Planch. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 127; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 254: sect. Ericear. Gen. ead. et Purdiaea, Elliottia.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 421: trib. Ericacear. Gen. ut Planch.
Alefeld 1856. Linnaea XXVIII. p. 7: subordo Pyrolacear. Gen. ut Endl.

Cyripedium Gis. Prael. vid. *seq.*

Cyrripedium Linn. 1767 vid. *Cypripedium.*

Cyrta*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 278. Ed. Willd. p. 340: nov. g. Decandr. Monogyn. (C. agrestis.)
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 411: g. Sapoteis aff.?
Spreng. 1825. Syst. II. p. 285. n. 1537; 1830. Gen. I. p. 332. n. 1681: g. Styracear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3596; 1841. Nom. p. 136. n. 5279. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. p. 743. n. 4255. *Cf.* A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 245. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 417. (?) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1387.
Meisn. 1839. Comm. p. 157: g. Styracinar.?
Endl. 1841. Ench. p. 363. n. 4254: g. dubium Ebenaceis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 795: g. monopetalum minus notum.

Cyrta Benth. 1833. Labiat. p. 81; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 90: sect. Hyptidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 688. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *c.* p. 611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 5. — Walp. 1845. Rep. III. p. 528.

Cyrtandra**) Forst. 1776. Char. gen. p. 5. t. 3: nov. g. Diandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 37 (*Kyrtandra*). — Willd. 1797. Sp. I. p. 78. n. 47. — Vahl 1805. Enum. I. p. 104. n. 40. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 55. 138. n. 76. — Schult. 1824. Mant. II. Add. p. 189. — Blanco 1837. Filipin. p. 17 (*Kyrtandra*).
Scop. 1777. Intr. p. 168: g. Personatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 280. — Hedw. 1806. Gen. p. 12. 347. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 412. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 39. n. 75. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 29 (44 *Cyrtandria*).
Juss. 1789. Gen. p. 121: g. Scrophulariis aff.
Vahl 1791. Symb. II. p. 1: g. post Veronicam inserendum.
Pers. 1807. Ench. II. p. 165. n. 1486: g. Antirrhinear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 404: g. Orobanchear.
Jack 1823. Linn. Trans. XIV. p. 25: g. Cyrtandracear. *Cf.* Isis 1825. p. 1177. — Par. Nees 1825. Flora I. p. 143. (verar.)
Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 767: g. Cyrtandrear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 25. n. 105. — Bartl. 1830. Ord. p. 185. — G. Don 1837. Gen. syst. IV.

*) κυρτός, curvus.
**) κυρτός, tortus; ἀνήρ, vir.

Cyrtandra Forst. cont.
p. 660. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 120. n. 4715. (genuinar.) — R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 122. (Flora 1842. I. p. 219.) — Meisn. 1840. Gen. p. 303 (212). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257. — DC. 1845. Pr. IX. p. 280.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3223: g. Gesnerear.
Endl. 1839. Gen. p. 718. n. 4146; 1841. Ench. p. 349. n. 4152: g. Eucyrtandrear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 737.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Cyrtandridar. *Synon.* Getonia Banks & Sol.

Cyrtandraceae Jack 1823. Linn. Trans. XIV. 1. p. 23: novus ordo plant. Gen.: Cyrtandra, Didymocarpus, Loxonia, Aeschynanthus. *Cf.* Flora 1823. II. Beil. p. 88 et Isis 1825. p. 1176.
Nees 1825. Flora I. p. 143: fam. Bignoniacear. Tribus: Trichosporeae, *verae* (gen.: Cyrtandra, Whitia, Didymocarpus, Loxonia).
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (216) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 30: ordo Bignonialium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 286.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 656: trib. Gesneriacear. Subtribus: Trichosporeae, Didymocarpeae, Cyrtandreae, Loxotieae.
Meisn. 1840. Gen. p. 302 (211): ordo Labiatiflorar. Tribus: Didymocarpeae, Cyrtandreae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 62: fam. Personear. Gen.: Streptocarpus, Aeschinanthus.
DC. 1845. Pr. IX. p. 258: ordo (135) Corolliflorar. Trib. ut Meisn.

Cyrtandreae Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 759: sect. Bignoniacear. Gen.: Cyrtandra, Whitia, Rhynchotechum, Loxonia, Centronia, Kuhlia.
Bartl. 1830. Ord. p. 185: div. Acanthacear. Gen.: Cyrtandra, Henckelia, Loxonia, Lysionotus, Trichosporum.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 660: subtrib. Cyrtandracear. Gen. ut Blume (excepta Kuhlia) et Utania, Fieldia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: subdiv. Orobanchear. Gen.: Ramondia, Rehmannia, Henkelia, Loxonia, Lisionotus, Aeschynanthus, Leucocarpus, Cyrtandra; Crescentia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 120. Sect.: Ramondieae, Henckelieae, *genuinae* (gen.: Leucocarpus, Cyrtandra, Whitia, Rhynchothecum, Fieldia, Centronia), Crescentieae.
R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 112 (Flora 1842. I. p. 193): trib. Gesneriacear. Gen. §. 1: Aeschynanthus, Trommsdorffia, Agalmyla, Lysionotus; Chirita, Didymocarpus, Streptocarpus, Baea; Loxocarpus, Epithema, Stauranthera, Loxonia, Glossanthus, Loxotis, Monophyllaea, Platystemma, Rhabdothamnus. §. 2: Fieldia, Rhynchothecum, Centronia, Cyrtandra, Whitia. — Par. Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 360. Gen. amer.: Episcia, Tussacia, Napeanthus.
Endl. 1839. Gen. p. 716; 1841. Ench. p. 348: subordo Gesneracear. Tribus: Didymocarpeae, Eucyrtandreae. — Simil. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 209. Gen. Endlicheriana. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672. Trib.: Didymocarpidae, Cyrtandridae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257: trib. Gesneriear. Gen.: Aeschynanthus, Lysionotus, Tromsdorfia, Chirita, Didymocarpus, Streptocarpus, Baea, Loxotis, Glossanthus, Loxonia, Epithema, Rhabdothamnus, Cyrtandra, Whitia, Rhynchothecum, Fieldia, Centronia.
DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 303 (212); 1845. Pr. IX. p. 280: trib. Cyrtandracear. Gen.: Cyrtandra, Whitia, Rhynchotechum, Centronota, Fieldia.

Cyrtandria Dietr. vid. *Cyrtandra Forst.*

Cyrtandridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 672: trib. Cyrtandrear. Gen.: Cyrtandra, Whitia, Rhynchothecum, Fieldia.

Cyrtantheae Rchb. 1828. Consp. p. 61; 1837. Handb. p. 151: subdiv. Amaryllidear. synchlamydear. Gen.: Gastronema, Bravoa, Cyrtanthus, Urceolina, Pyrolirion, Vallota, Imatophyllum.
Kunth 1850. Enum. V. p. 531: subtrib. Amaryllinear. Gen.: Vallota, Cyrtanthus, Cyphonema.

Cyrtanthera Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 93. 99; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 328: nov. g. Gendarussear. — Par. Oersted 1855. Centralam. Acanth. p. 35 not. Char. auct. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 659.

Cyrtantherella Oersted 1855. Centralam. Acanth. p. 36: nov. g. Gendarussear. (Justicia macrantha Benth.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 641.

Cyrtanthus Aiton 1789. Hort. kew. I. p. 144: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 48. n. 621; 1809. En. p. 353. — Pers. 1805. Ench. I. p. 352. n. 758.
Gis. 1792. Prael. p. 274: g. Spathacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 249; 1825. Syst. II. p. 58. n. 1204; 1830. Gen. I. p. 276. n. 1432. — Eckl. 1827. Verz. p. 8 (*Cyrthanthus*). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1186.
Hedw. 1806. Gen. p. 229. n. 934: g. Amaryllidear. — Par. Herb. 1821. App. p. 79; 1825. Bot. Mag. App. p. IV. (Cyrtanthiformium.) — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LIII. 894. Sect.: verae, Monellae, Gastronemata. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1608. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 21.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 412: g. Narcissear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 173.
Link 1821. En. I. p. 313: g. Narcissinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1233: g. Cyrtanthear. (et ibid. p. 65. n. 1373 Hemerocallidear.) — Par. Kunth 1850. Enum. V. p. 533. Sect.: Cyrtanthus, Gastronema.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.

Cyrtanthus Aiton cont.
Endl. 1837. Gen. n. 1279. p. 178; 1841. Ench. p. 103: g. Amaryllear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 394 (296). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 426.
Synon. Timmia Gmel.; Monella et Gastronema Herb.

Cyrtanthus Schreb. 1789. Gen. I. p. 122. n. 302: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 362 (*Kyrtanthus*).
= Posoqueria Aubl.

Cyrtanthus Herbert 1837. Amaryll. p. 70. 128: g. restrict. Amaryllidear. Cyrtanthiformium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Amaryllear. — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 9. 47. Sect.: Eucyrtanthus, Monella.
Kunth 1850. Enum. V. p. 534: sect. Cyrtanthi. Subsect. ut Römer.

Cyrthanthus Ecklon vid. *Cyrtanthus Ait.*

Cyrtoblastae Presl 1831. Symb. I. p. 63: novum nomen pro *Curvembryis* propositum.

Cyrtocarpa HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 19. t. 609: nov. g. Terebinthacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 155.
DC. 1825. Pr. II. p. 91: g. Terebinthaceis aff.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 157: g. Decandr. Monogyn.
Bartl. 1830. Ord. p. 396: g. Anacardiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 68. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 201.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 344. n. 1741: g. Terebinthear.
Meisn. 1837. Gen. p. 75 (54): g. Cassuviear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5897. p. 1129; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.
Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5660: g. Pistaciear.

Cyrtocaryum A. DC. 1846. Prodr. X. p. 32: sect. Nonneae.

Cyrtoceras Bennett 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 90. t. 21: nov. g. Asclepiadear., Hoyae affine. (C. reflexum.)
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 514: g. Ceropegiear.
= Centrostemma Decne.

Cyrtochilos Spreng., Bartl. vid. *seq.*

Cyrtochilum HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 349. t. 84: nov. g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 335. — Bartl. 1830. Ord. p. 58 (*Cyrtochilos*).
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 414: g. Orchidear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 729. n. 3005 (*Cyrtochilos*); 1831. Gen. II. p. 668. n. 3372.
Agdh. 1823. Aphor. p. 189: g. Massulatar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 210: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1524; 1841. Nom. p. 54. n. 2070. — Endl. 1837. Gen. n. 1465. p. 203; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 376 (282). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 125: g. Ceropagar.

Cyrtochilum HBK. cont.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 35. t. 61.
= Oncidium Swartz. (Lindl. 1847.)

Cyrtocladon Griffith 1851. It. Not. III. p. 147.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 119: g. Anaporinar. (C. sanguinolentum.) — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 213.

Cyrtocnon „Link“ Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 247 b: g. Phomaceor.

Cyrtocodon Benth. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 204: sect. Gerardiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 556. — Endl. 1839. Gen. n. 3996 *b.* p. 691; 1841. Ench. p. 340. — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4522. 2. — Walp. 1845. Rep. III. p. 381.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 511: sect. Seymeriae.

Cyrtodeira*) Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 179. 207: nov. g. Drymoniear. (Achimenes cupreata Hook.) — Par. C. Koch 1857. Berl. Gartenz. p. 236.

Cyrtodon R. Brown 1824. Suppl. to Parry's voy. App. XI. p. CCXCIX (Verm. bot. Schr. I. p. 442): nov. subg. Splachni, pro Weissia splachnoide Schwägr. indicatum.
Endl. 1836. Gen. n. 502 *a.* p. 49; 1841. Ench. p. 31: sect. Eremodontis. (*Synon. Dissodon Grev. & Arn.*) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 877. 1.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 138: sect. Dissodontis. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 93.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Splachnear.

Cyrtogonium J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 402; 1842. ibid. IV. p. 154: g. Acrostichiear. symplophlebiear. (*Synon. Poecilopteris Presl*, *Campium Presl*, *Bolbitis Schott*, *Jenkinsia Hook.*)
Meisn. 1843. Gen. p. 430 (330): sect. Acrostichi.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodiear.
Presl 1850. Epimel. bot. p. 535: sect. Poecilopteridis.

Cyrtogyne Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4179: g. Sedear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 237: sect. Crassulae.
Endl. 1839. Gen. n. 4614. p. 810; 1841. Ench. p. 405: g. Rochear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6181.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346: g. Crassulear.
= Curtogyne Haw.

Cyrtolepis Lessing 1831. Linnaea VI. p. 166: nov. g. Anthemidear. (Santolina terrestris Forsk.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24 (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Less. 1832. Syn. p. 258: g. Santolinear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 17: g. Euanthemidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2644. p. 430; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 209 (134).

*) δειρή, collum, cervix.

Cyrtolepis Lessing cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3050: g. Ptarmicear.

Cyrtolobus R. Brown 1832 in Wallich Catal. n. 5432 (Verm. bot. Schr. V. p. 390): nov. g. Papilionacear. non descriptum. (Crotalaria elliptica Roxb.)
Endl. 1840. Gen. n. 6472 *d.* p. 1262; 1841. Ench. p. 668: sect. Crotalariae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5884. 4. — Walp. 1846. Rep. V. p. 446.
Synon. Crypsocalyx A. Rich.?

Cyrtoloma Römer 1847. Fam. nat. syn. IV. p. 11. 89: sect. Crini. (Cr. flaccidum Herb.) — Simil. Kunth 1850. Enum. V. p. 576.

Cyrtomium*) Presl 1836. Pterid. p. 86: nov. g. Aspidiariar. (Polypodium falcatum L.)
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 99. 164: g. Aspidiacear.
Endl. 1841. Spl. I. p. 640 *d.* p. 1349; 1841. Ench. p. 37: sect. Aspidii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1028. 4. — Meisn. 1843. Gen. p. 433 (334).
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 186: g. Aspidiear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 285: g. Cyclodiear.

Cyrtonema Schrad. 1836 in Eckl. & Zeyh. En. pl. Afr. II. p. 276; 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 403: nov. g. Cucurbitear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 172 (92). — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 273. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 267. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Endl. 1839. Gen. n. 5125. p. 935; 1841. Ench. p. 491: g. Coniandrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3966. — Walp. 1843. Rep. II. p. 195. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 8. 23.

Cyrtonora Zippel. ex Macklock in Bijdr. tot nat. Wet. V. p. 142. (Féruss. Bull. XVIII. p. 92.)
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 19 inter genera nondum descripta.

Cyrtopera Lindl. 1833. Orchid. gen. p. 189 (Bot. Regist. XVIII. 1508): nov. g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1446. p. 201; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2051. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 686.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.
Synon. Cyrtopodii sp. Bot. Mag.; Limodori sp. Pet.-Th.

Cyrtophlebium R. Brown 1839 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 4.
Endl. 1841. Spl. I. n. 615 *g.* p. 1347; 1841. Ench. p. 36: sect. Polypodii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 985. 7. — Meisn. 1843. Gen. p. 431 (331).

*) κύρτωμα, arcus.

Cyrtophlebium R. Brown cont.
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 58: g. Polypodiear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear. = Campyloneurum Presl.

Cyrtophyllum Reinwardt 1823. Cat. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Pentandr. (g. Contortar: C. peregrinum: Isis 1823. p. 313.)
Reinw. 1825. Syll. Ratisb. II. p. 8: g. Rubiacear.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1022: g. Strychneacear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 66: g. Strychnacear.
Meisn. 1839. Gen. p. 259 (167): g. Fagraeacear. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 31.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604: g. Loganear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 425: g. Loganiear.
Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 11. p. 172: sect. Fagraeae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 76.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 375: subg. Fagraeae.
Synon. Picrophloeus Blume.

Cyrtopodia Rchb. vid. *Cryptopodia Röhl.*

Cyrtopodium R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 216 (Verm. bot. Schr. II. p. 43); 1814. Bot. Mag. n. 1876 (Verm. bot. Schr. V. p. 408): nov. g. Orchidear. (Cymbidium Andersonii Lamb.) *Cf.* Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 416. — Par. Link 1822. En. II. p. 371. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 729. n. 3006; 1831. Gen. II. p. 669. n. 3377.
Agdh. 1823. Aphor. p. 189: g. Massulatar.
Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 53: g. Gynandr. Monandr.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 188: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1523; 1841. Nom. p. 54. n. 2049. — Endl. 1837. Gen. n. 1444. p. 201; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (283). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178 (*Cirtopodium*).
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 125: g. Ceropagar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Catasetidar.
Synon. Tylochilus Nees; Cymbidii sp. Anders.

Cyrtopodium „Brid." Endl. Gen. p. 53 in synon. Philonotidis: vid. *Cryptopodium Brid.*

Cyrtopogon Spreng. vid. *Curtopogon Palis.*

Cyrtopus Brid. 1827. Bryol. II. p. 235: sect. Neckerae. (N. setosa Hook.) — Par. Endl. 1836. Gen. n. 575 *b.* p. 55; 1841. Ench. p. 32. — Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 953. 2.
Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 292: g. Pterogoniacear.
C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 158: sect. Pilotrichi.
Synon. Endotrichum Dozy & Molk.; Trachypus Reinw.; Carovaglia Endl.; Esenbeckia Nees; Prionodon Müll.

Cyrtorhyncha „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1838. Fl. North-Am. I. p. 26: nov. g. Ranunculear. (C. ranunculina.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 257 (*Cyrtorrhyncha*). — Par. Dictr. 1843. Syn. III. p. 217. 343.
Endl. 1839. Gen. n. 4771. p. 845; 1841. Ench. p. 434: g. Anemonear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 9. — Meisn. 1843. Comm. p. 339. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 427.
Rchb. 1841. Nom. p. 190. n. 7229: g. Thalictrear.

Cyrtorrhyncha Wittst. vid. *praeced.*

Cyrtosia Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 396. f. 6: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1830. Orchid. p. 25: g. Pleurothallear.
Endl. 1837. Gen. p. 220. n. 1613: g. Arethusear.
= Erythrorchis et Cyrtosia Blume 1835.

Cyrtosia Blume 1835. Rumphia I. p. 199. t. 69: g. restrict. Vanillear. (C. javanica.) — Par. Lindl. 1840. Orchid. p. 438. — Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2188. — Meisn. 1842. Gen. p. 384 (287).
Endl. 1841. Spl. I. n. 1613. p. 1368; 1841. Ench. p. 114: g. Arethusear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 719.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Vanillidar.

Cyrtosiphonia Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 401: nov. g. Eucarissear. (Rauwolfiae spec. asiat. Auct.)

Cyrtosiphytum)* Necker 1790. Elem. bot. II. p. 331: genus 29 plantar. Spec. natur.: Ricinus, Croton, Luntia, Cinogasum, Aroton, Brunsvia, Chrozophora, Clutia, Cratochwilia, Plukenetia, Acalypha, Stillingia, Mercurialis, Omphalea, Tragia, Cicca, Phylanthus, Sapium, Hippomane, Hertelia, Hernandia, Jatropa, Bromfeldia, Sterculia, Andrachne, Arachne, Caturus, Buxus, Excoecaria, Dalechampia, Cometes, Adelia, Euphorbia, Keraselma, Athymalus, Pedilanthus, Tithymalus, Carica, Thryallis.

Cyrtospadix C. Koch 1853. App. sem. Berol. p. 3: nov. g. Aroidear. (Philodendron striatipes Kunth.) *Cf.* Ann. sc. nat. 4e sér. I. 1854. p. 339 et Müll. Ann. bot. V. p. 873.

Cyrtospermum Rafin. 1819 mss.
= Cryptotaenia DC.

Cyrtospermum Benth. 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 13: nov. g. Anacardiacear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 445.

Cyrtostachys Blume 1838. Bull. Néerl. p. 66; 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. X. p. 375: nov. g. Palmar. (C. Renda.) *Cf.* Brongn. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 562.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1752/3. p. 1372; 1841. Ench. p. 126: g. Borassinar. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 641.
Rchb. 1841. Nom p. 58. n. 2289 (*Scyrtostachys*): g. Manicariear.

*) *κύρτωσις*, gibbositas; *φυτόν*, planta.

Cyrtostachys Blume cont.
Meisn. 1842. Gen. p. 356 (266): g. Geonomear.
Blume 1843. Rumphia II. p. 101. t. 120: g. Arecinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.
= Bentinckia Berry. (Miquel.)

Cyrtostemma Mertens & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 755: sect. Scabiosae. (Sc. maritima L.) — Par. Koch 1836. Syn. p. 347. Ed. II. p. 380. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 447.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 321: g. Scabiosear.
Synon. Vidua Coult.; Spongostemma Rchb.

Cyrtostemma Kunze 1843. Bot. Zeit. p. 272: novum nomen pro *Spironemate Hochst.* propositum.
= Cyclonema Hochst.

Cyrtostigma Endl. 1838. Gen. n. 2129 *b*. p. 338; 1841. Ench. p. 215: sect. Spatallae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2386. 2. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 309.

Cyrtostylis R. Brown 1810. Prodr. I. p. 322. Ed. Nees p. 178: nov. g. Orchidear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 416. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 714. n. 2972; 1831. Gen. II. p. 662. n. 3339. — Lindl. 1834 in Hook. journ. bot. I. p. 273. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 245.
Agdh. 1823. Aphor. p. 190: g. Coniopagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 10 (Linnaea II. p. 528): g. Arethusear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1449; 1841. Nom. p. 55. n. 2158. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1590. p. 217; 1841. Ench. p. 114. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182.
Lindl. 1840. Orchid. p. 398: g. Euarethusear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 383 (287).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Acianthidar.

Cyrtotropis Wallich 1830. Pl. As. rar. I. p. 49. t. 62.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 356: g. Phaseolear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 333. — Meisn. 1837. Gen. p. 92 (66).
Endl. 1841. Gen. n. 6672. p. 1296; 1841. Ench. p. 672: g. Wisteriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5828. — Walp. 1846. Rep. V. p. 536.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555 (*Cystotropis*): g. Euphaseolear.

Cyssopetalum Turczan. 1849. Bull. Mosc. XXII. 2. p. 25: nov. g.门Seselinear., Conioselino simile. (C. javanicum.) *Cf.* Flora 1850. p. 477. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 703.

Cystanche Ledeb. vid. *Cistanche Link.*

Cystanthe*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 555. Ed. Nees p. 411: nov. g. Epacri-

*) *κύστις*, vesica.

Cystanthe R. Brown cont. dear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 417. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIII. 488. n. 786. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 631. n. 678; 1830. Gen. I. p. 156. n. 779. — Bartl. 1830. Ord. p. 158. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 689.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 519: g. Epacridum.
Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3343: g. Richeacear.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 785: g. Epacricar.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 768: g. Epacrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4259. p. 749; 1841. Ench. p. 368. — Meisn. 1839. Gen. p. 249 (157). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 434. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449.
Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4809: g. Richear.

Cystapophysium*) Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 602 *b*: sect. Splachni. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 503 *c*. p. 49; 1841. Ench. p. 31.
Synon. Ampullaria Ehrh.; Apodanthus La Pyl.

Cystea Smith . . . . Engl. fl. IV. p. 258. = Cystopteris Bernh.

Cysticapnos Boerh. 1710. Lugd. bat. p. 391: g. Siliquosar. (Linn. 1747. Class. pl. p. 181 = Fumaria.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 431 (*Cisticapnos*): g. Papaverum. (Fumaria vesicaria L.)
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 161. t. 115.
Mönch 1794. Meth. p. 51: g. Thalamostemonis.
Borckh. 1797 in Röm. Arch. I. 2. p. 45. Char. emend.
Willd. 1809. En. p. 741: g. Diadelph. Hexandr.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 417: g. Papaveracear. — Par. Link 1822. En. II. p. 219.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 726: g. Papaverear.
DC. 1821. Syst. II. p. 112; 1824. Pr. I. p. 126: g. Fumariacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 260. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 141. — Link 1831. Hdb. II. p. 275. — Meisn. 1837. Gen. p. 8 (10). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 93.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 162. n. 2485; 1831. Gen. II. p. 568. n. 2768: g. Fumaricar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4831. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 470: g. Monocentrear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 264; 1841. Nom. p. 184. n. 7060: g. Corydalear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 753.
Endl. 1839. Gen. n. 4842. p. 860; 1841. Ench. p. 444: g. Corydalidear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 82: g. Corydalinear.
Synon. Corydalis Dill., Neck.; Capnocystis Juss.

*) *ἀπόφυσις*, pars adnata.

Cystidianthus*) Hasskarl 1843. Tijdschr. nat. Gesch. X. p. 125; 1844. Cat. Bogor. alt. p. 126: nov. g. Asclepiadear. (Hoyae sect. 3 Blume.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. 4. p. 57: g. Hoyear. (Hoya campanulata Bl.)
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 515: g. Ceropegiear.
Synon. Codonanthus Hassk.

Cystidium Lindl. vid. *Cystodium Sm.*

Cystisporeae Léveillé 1846. Consid. mycol. p. . . .: class. Fungor. *Cf. Cystospori Lév.*

Cystium Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 107: sect. Astragali. (A. Cicer, etc.)

Cystocarpum Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 32. n. 122/7 *f*: sect. Sargassi. (S. cystocarpum Ag.)

Cystoclonieae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phycol. gener. p. 390. 404; 1845. Phycol. germ. p. 305: fam. Periblastear. Gen.: Cystoclonium, Hypnophycus. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 756. Gen.: Cystoclonium, Dasyphlaea, Hypnea.
J. Agdh. 1847. Oefvers. k. Ak. Förh. IV. Nr. 1; 1848. Flora II. p. 412: fam. Algar. Gen.: Ahnfeldtia, Gymnogongrus?, Cystoclonium, Calophyllis.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Sphaerococcear.

Cystoclonium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phycol. gener. p. 404; 1845. Phycol. germ. p. 305; 1849. Sp. Alg. p. 756. n. 506: nov. g. Cystocloniear. — Par. J. Agdh. 1847. Oefvers. k. Ak. Förh. IV; 1848. Flora II. p. 412.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 170: g. Sphaerococcoidear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Coccocarpear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 169: g. Kallymeniear.
Synon. Dicranema Sond.

Cystococcus Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 84: nov. g. Characiear.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 10: g. Algar. monocytidear. ambiguar. eremobiar.

Cystocoleus**) Thwaites 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d ser. III. p. 241: nov. g. plant. (Chroolepus ebenea Ag.)

Cystodium J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 433: nov. g. Dicksoniar. (Dicksonia sorbifolia Sm.), ab Hook. (1844. Sp. Fil.) Dicksoniae iterum injunctum. *Cf.* Kunze 1845. Bot. Zeit. p. 798.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80 (*Cystidium*): g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 342: g. Balantiear.

Cystogyne Gasparr. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 345; 1845. Ricerche p. 84: nov. g. a Ficu L. separatum (Ficus leucosticta Spreng.), a Miquel (1847) ad Urostigma Gasp. relatum.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 35. n. 1859 *E*: sect. Ficus.

*) *κυστίδιον*, vesicula.
**) *κολεός*, vagina.

Cystophora J. Agardh 1841. Linnaea XV. p. 3; 1848. Sp. Fuc. p. 238: g. Fucacear. — Par. Harv. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 214.
Conf. Blossevillea Decne.

Cystophora Rabenhorst 1844. Krypt. I. p. 75: nov. g. Psiloniacear. (Coelosporium fruticosum Link.)
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493 (*Cystopora*): g. Ascophoreor.?

Cystophyllum Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 31. n. 122/6 *b*: sect. Cystoseirae.
= Coccophorae Grev. sp.

Cystophyllum J. Agardh 1848. Spec. Fucoid. p. 228: nov. g. Fucacear. (Sirophysalis, Myagropsis, Spongocarpi et Cystosirae sp. Kütz. Phycol.) — Par. Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 122.

Cystopleura Brébiss. mss.
= Epithemia Kütz. (Sp. Alg. p. 3.)

Cystopora Lév. vid. *Cystophora Rabenh.*

Cystopterideae Presl 1836. Pterid. p. 92: sect. Aspleniacear. Gen.: Cystopteris, Acrophorus, Leucostegia, Ragiopteris, Onoclea.

Cystopteris Bernhardi 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 26: g. Cathetogyratar. (*Cyathea* olim: C. fragilis.)
Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 263: g. Filicum. (ampliat.)
Rchb. 1828. Consp. p. 212ᵃ. n. 679ᵇ: g. Cyatheacear.
Hook. & Arn. 1832. Beech. voy. Bot. Pt. III. p. 119 (*Cistopteris*): g. Polypodiacear. — Par. Kunze 1834. Linnaea IX. p. 97. — Genth 1836. Nass. I. p. 31. — Kunth 1838. Berol. II. p. 420. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 260 (*Cistopteris*). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 5 (*Cistopteris*). — Koch 1845. Syn. ed. II. p. 979. (indusiatar.) — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 319. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 516. (indusiatar.)
Presl 1836. Pterid. p. 92: g. Cystopteridear.
Endl. 1836. Gen. n. 641. p. 62; 1841. Ench. p. 37: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1029. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 633. (indusiatar.)
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 45: g. Davalliacear.
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 192: g. Aspidiear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 433 (334). — Fée 1852. Gen. Fil. p. 299.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 196: g. Davalliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Woodsiear.
Webb 1850. Canar. III. p. 445: g. Asplenicar.
Metten 1856. Fil. h. Lips. p. 96: g. Aspidiacear.
Synon. Filicula Tourn.; Cystea Smith; Cyclopteris Gray; Aspidium Math.

Cystopus Léveillé 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 371 (Flora 1849. p. 277); 1849 in Orb. Dict. XII. p. 787: nov. g. Uredinear. (Uredo candida Pers.)

Cystopus Léveillé cont.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 512: g. Epiteor.
Tulasne 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 171: g. Albugineor. *Cf.* Flora 1855. p. 729.

Cystopus Blume .... Fl. jav. p. 69: nov. g. Orchidear.
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 733: sect. Anoectochili.

Cystorchis Blume .... Fl. jav. p. 73: nov. g. Orchidear.
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 725: sect. Hetaeriae.

Cystoscira Mathieu vid. *seq.*

Cystoseira*) Agardh 1821. Sp. Alg. I. 1. p. 50; 1821. Aphor. p. 101: nov. g. Fucoidear. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 193 (*Cistoseira*). — A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 328. — Menegh. 1838. Cenni p. 43. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 393; 1841. Brit. Alg. p. 17. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 791.
Agdh. 1824. Syst. p. xxxviii. 281: g. Fucacear. — Par. Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 131. — Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 356. — Endl. 1836. Gen. n. 120. p. 10; 1841. Ench. p. 8. Sect.: Hormosira, Coccophora, Scytothalia, Scirococcus, Carpodesmia, Halidrys, Acinaria. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 136; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 564. — J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 3; 1842. Alg. medit. p. 46; 1848. Sp. Fuc. p. 213. — Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 145. — Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 65. — Math. 1853. Belg. II. p. 492 (*Cystoscira*).
Fries 1825. Pl. homon. p. 326: sect. Fuci.
Rchb. 1828. Consp. p. 29. n. 514 *a*: sect. Sargassi.
Grev. 1830. Synops. p. xxxii.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 331 (Flora 1843. p. 93): g. Sargassear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 30. n. 122/6: g. Cystoseirear. Sect.: Cystoseira, Cystophyllum, Stephanocystis. — Par. Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 159. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 191.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 123: g. Cyclosporear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Cystoseiridar.
Conf. Acinaria Targ.; Acinarius Rouss.; Mackaia Gray; Catenaria Raf.; Ascophylla, Ericaria, Abrotanifolia et Monilifera Stackh.; Cystosira Spreng.

Cystoseireae Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 30: trib. Fucacear. Gen.: Coccophora, Halidrys, Blossevillea, Cystoseira, Sargassum, Turbinaria, Carpacanthus, Phyllospora, Carpophyllum, Marginaria, Scytothalia, Scirococcus, Polyphacum.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 191: subsect. Fucacear. Gen.: Halidrys, Cystoseira, Sargassum.

*) κύστις, vesicula; σειρά, catena.

Cystosciridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 22: trib. Fuccar. Gen. Cystoseirear. Endl.

Cystoseirites Sternb. 1838. Vers. II. p. 35: g. Fucoiditum.
Unger 1843 in Endl. Spl. III. p. 54. n. 122/99: g. Algar. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 61.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 7; 1846. Chlor. prot. p. xxvi. 125. t. 38. 39: g. Phycear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57 (*Cystosirites*).

Cystosira Spreng. 1827. Syst. IV. p. 316. n. 3387; 1831. Gen. II. p. 748. n. 3787: g. Phycoidear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 99: g. Chondrothamnior.
Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. t. 38.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 10: g. Sargassear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Cystosirear.
= Cystoseira Agdh.

Cystosira Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phycol. gener. p. 356; 1845. Phycol. germ. p. 280; 1849. Sp. Alg. p. 598. n. 410: g. restrictum Cystosirear. Sect.: genuinae, Cryptacantha et 1849 Halitea.

Cystosireae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phycol. gener. p. 353; 1845. Phycol. p. 278; 1849. Sp. Alg. p. 593: fam. Angiospermear. Gen.: Treptacantha, Halerica, Phyllacantha, Cystosira, Hormophysa, Halidrys, Pycnophycus et 1849 Sirophysalis, Carpodesmia.
Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 252: fam. Cyclosporear. Gen.: Halidrys.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 104: trib. Actinothalamar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: trib. Phycoidear. Gen.: Coccophora, Halidrys, Carpodesmia, Blossevillea, Cystosira, Sargassum, Spongocarpus, Halochloa, Pterocaulon, Turbinaria, Carpacanthus, Marginaria, Carpophyllum, Phyllospora, Scytothalia, Sirococcus.

Cystosirites Mont. vid. *Cystoscirites Sternb.*

Cystospermeae Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. ....: trib. Algar. filiformium. Gen.: Vesiculifera, Bulbochaete.

Cystosporei Léveillé (1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 70.) 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: div. IV. Fungor. Trib.: Columellei, Saprophilei.

Cystotricha Berkeley & Broom 1850. Ann. nat. hist. V. p. 457: nov. g. Pyrenomycetum, Endotricho aff.

Cystotropis Lindl. vid. *Cyrtotropis Wall.*

*Cyteophytum**) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 1: genus 36 plant. Spec. nat.: Medicago, Trigonella, Trifolium, Melilotus, Psoralea, Lotus, Scandalida, Ebenus, Anthyllis, Astragallus, Aragallus, Spiesia, Phaca, Biserrula, Indigofera, Alysicarpus, Hedysarum, Onobrychis, Lourea, Coronilla, Bonaveria, Emerus, Ornithopus, Hippocrepis, Scorpiurus, Aeschynomene, Abrus, Arachis, Robinia, Geoffroya, Aspalathus, Eriocylax, Ulex, Spartium, Apartium, Cytisus, Genista, Liparia, Borbonia, Crotolaria, Atolaria, Ononis, Bolducia, Cylizoma, Drakenstenia, Piscidia, Erythrina, Galega, Brissonia, Orobus, Vicia, Ervum, Lathyrus, Athyrus, Pisum, Clitoria, Glycine, Fagelia, Lupinus, Phaseolus, Hornera, Dolichos, Psophocarpus, Amerimnum, Bonafidia, Colutea, Glycyrrhiza, Pterocarpus, Griselinia, Sophora, Aphora, Anagyris, Cercis, Nissolia, Securidaca, Dalbergia, Cicer.

*) „κυτοσεος, carina, cavitas seu fundum navis; φύτοι, planta".

Cytharexylon Batsch vid. *Citharexylon Linn.*

Cytheraea DC. 1825. Prodr. II. p. 75: sect. Spondiadis. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 208. — Endl. 1840. Gen. n. 5920 *b*. p. 1134; 1841. Ench. p. 599. — Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5643. 2. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 777.
= Evia Comm.

Votherea Salisb. 1812 in Trans. hort. soc. I. (1815.) p. 301: nov. g. Orchidear. (Cypripedium bulbosum L.)
= Calypso Salisb.

Cytheris Lindl. 1831. Orchid. gen. p. 128: nov. g. Epidendrear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1389. p. 195; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1986. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 372 (279). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Bletidar.

Cyticus Link Handb. II. p. 153: sphalm. pro *Cytisus*.

Cytinaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 392) 1847. Veg. kingd. p. 91: ordo Rhizogenar. Gen.: Cytinus, Hydnora, Hypolepis, Thismia?
= Cytineae Brongn.

Cytineae Brongn. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 39: nov. ordo plant., Aristolochieis aff. Gen.: Rafflesia, Cytinus, Nepenthes. *Cf.* Isis 1825. p. 1302, Nees 1826 in R. Brown Verm. bot. Schr. II. p. 643 not. (ubi accedunt Apodanthes, Aphyteia, Gonyanthes?) et G... 1849 in Orb. Dict. IV. p. 566.
Rchb. 1828. Consp. p. 78; 1832. Fl. exc. p. 843: fam. Imbricatar. Gen.: Aphyteia; Gonyanthes; Rafflesia; Sarcophytum; Cytinus, Apodanthes. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 164. Divis.: Hydnoreae, Sarcophyteae, Rafflesieae. — Rchb. 1841. Nom. p. 60. Divis.: *genuinae* (gen.: Cytinus, Hydnora), Sarcophyteae, Rafflesieae.
Link 1829. Hdb. I. p. 368: subordo Pistolochinar. Gen.: Cytinus, Rafflesia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (63) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 80: ordo (54) Aristolochiear. Gen.: Apodanthes, Cytinus, Sarcophytum. *Affinia*: Rafflesia, Aphyteja.
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 13: ordo Rhizanthear. Gen.: Cytinus. *Affinia*: Hypolepis, Aphyteia, Apodanthes. — Par. Lindl. 1833. Nix. p. 36. — Endl. 1836.

Cytineae Brongn. cont.
Gen. p. 75; 1841. Ench. p. 52. Gen.: Cytinus, Hydnora. — Meisn. 1842. Gen. p. 367 (275). Gen. ead.
Koch 1837. Syn. p. 624. Ed. II. p. 719: ordo Monochlamydear. Gen.: Cytinus.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 549: fam. (177) Aristolochiear. Trib.: Eucytineae, Rafflesiaceae.
R. Brown 1842. Linn. Trans. XIX. p. 245 (*cf.* Flora 1848. II. p. 539): trib. Rafflesiacear. Gen.: Cytinus. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 699. Gen. id. — Walp. 1843. Ann. bot. III. p. 514. Gen. id.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 115: fam. Asarinear.

Cytinus*) Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 566. n. 1232: g. Gynandr. Octandr. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 609. n. 1384.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294.
Linn. 1767. Syst. ed. XII. p. 602: g. Gynandr. Dodecandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 688; 1784. Syst. p. 826. — Reich. 1778. Gen. p. 464. n. 1115. — Pers. 1797. Syst. p. 870.
Scop. 1777. Intr. p. 97: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 73: g. Aristolochiar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 173. — DC. 1805. Franç. III. p. 350. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 302.
Neck. 1790. El. III. p. 114. n. 1449: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 745: g. Dodecandr. Monogyn.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 228: g. Asaroidear.
Batsch 1802. Tab. p. 244: g. Asarinar.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 589. n. 1729: g. Monoec. Monadelph. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 591. n. 2155.
Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 423: g. Aristolochiear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 209. n. 1420; 1831. Gen. II. p. 541. n. 2650. (in Monadelph. Octandr.)
Brongn. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 40 (Isis 1825. p. 1303): g. Cytinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1687; 1832. Fl. exc. p. 843; 1841. Nom. p. 60. n. 2326. (genuinar.) — Link 1829. Hdb. I. p. 368. — Bartl. 1830. Ord. p. 81. — Schott & Endl. 1832. Melet. p. 13. — Endl. 1836. Gen. n. 723. p. 75; 1841. Ench. p. 53. — Koch 1837. Syn. p. 624. Ed. II. p. 719. — Meisn. 1842. Gen. p. 367 (275). — R. Brown 1842. Linn. Trans. XIX. p. 245. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 327. — Griff. .... Linn. Trans. XIX. (Ann. sc. nat. 1847. 3e sér. VII. p. 324.) — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 514. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 70.
Agdh. 1826. Aphor. p. 240: g. Pistiacear.
Blume 1833. Nov. fam. expos.; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 90: g. Rhizanthear.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 392; 1847. Veg. kd. p. 92: g. Cytinacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 161: g. Sarcophytear.

Cytinus Linn. cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 552: g. Eucytinear.
Planch. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 296. Char. reform.
Synon. Hypocistis Tourn.; Thyrsine Gled.; Phelypaea Thunb.?; Hisbanche Sparrm.?; Hypolepis Pers.; Haematolepis Presl.

Cytisanthus O. F. Lang 1843. Flora II. p. 769: nov. g. a Cytiso disjunctum. (Cytisi sect. *Asterocytisus Koch.*)

Cytiseae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 554: div. Genistear. Gen.: Ulex, Stauracanthus, Adenocarpus, Erinacea, Spartium, Genista, Retama, Syspone, Calycotome, Sarothamnus, Lembotropis, Cytisus, Laburnum.

Cytiso-Genista Tourn. 1700. Inst. p. 649: g. pl. class. XXII.
= Sarothamnus Wimm.

Cytisoides Kunth 1838. Fl. Berol. I. p. 221: subsect. Barbae Jovis. (Anthyllis cytisoides et Hermanniae L.)
Conf. Saroma Griseb.

Cytisoides Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 44: sect. Argyrolobii. (Cytisus argenteus L.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 842.
= Dicheilus Rchb.

Cytisophyllum O. F. Lang 1843. Flora II. p. 770: nov. g. a Cytiso disjunctum. (Cytisi sect. *Phyllocytisus Koch.*)

Cytisopsis Jaub. & Spach 1842. Illustr. pl. or. I. p. 154. t. 84: nov. g. Genistear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 511.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Cytisear.

Cytispora*) Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 540; 1825. Pl. homon. p. 119; 1828. Elench. II. p. 116: g. Cytisporeor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 367. p. 31; 1841. Ench. p. 19. — A. Libert 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 123. — Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 269. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 146. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 413. Subgen.: Synariza.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 586: g. Cytisporear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 244.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 1014: g. Sclerogastrum.
Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 247: g. Phomaceor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 749: g. Pyrenomycetum sphinctrostomor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Melanconicor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Sphaeronaemeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 61: g. Naemasporeor.
= Cytospora Ehrenb.

Cytisporacei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 408: ordo Pyrenomycetum. Divis.: Leveillinei, Cytisporei, *Scutato-adnati* (gen.: Parmularia, Microthyrium).

Cytisporeae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 586: trib. Hypoxylear. Gen.: Sphaero-

*) κύτινος, calyx carnosus Granati.

*) κυτίς, pyxis parva.

Cytisporeae Brongn. cont. nema, Cytispora, Pilidium, Leptostroma, Leptothyrium, Actinothyrium?, Phoma. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 242. Gen. ead. et Melasmia, Labrella, Ceuthospora, Micropera, Microthyrium, Aylographa.

Spreng. 1831. Gen. II. p. 774: div. Gastromycetum. Gen.: Bostrychia, Sphaeronaema, Septaria, Naemaspora, Ceuthospora, Cirrolus; Chaetomium, Asterosporium, Apiosporium, Myxothecium, Illosporium, Leptostroma, Prosthemium, Pilidium.

Cytisporei Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 318: div. Pyrenomycetum. Gen.: Sphaeronaema, Cytispora, Phoma.

Fries 1825. Pl. homon. p. 118: ordo Pyrenomycetum. Gen. ut 1823 et Zythia, Septoria, Ceuthospora.

Rchb. 1828. Consp. p. 10: div. Sphaeriaceor. Subdivis.: Xylomacei, Phomacei.

Endl. 1836. Gen. p. 31; 1841. Ench. p. 19: trib. Pyrenomycetum. Gen.: Phoma, Ceuthospora, Cytispora, Sphaeronema.

A. Libert 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 123: sect. Xylomycor. Gen.: Cytispora, Sphaeronema, Leptostroma.

Rchb. 1841. Nom. p. 6: subdiv. Xylomaceor. Gen.: Phoma, Sacidium, Coniothyrium, Sporocadus, Ceuthospora, Melanospora, Cytispora, Sphaeronema.

Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 143: subsect. Sphaeronemear. Gen.: Phoma, Microthecium, Coniothyrium, Ceuthospora, Melanospora, Ascochyta, Cytispora, Sphaeronema.

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 410: div. Cytisporaceor. Gen.: Valsa, Torsellia, Cytispora, Nemaspora, Psecadia, Ceuthospora.

Cytispori Fries 1821. Syst. mycol. I. p. LII: sect. Pyrenomycetum. Gen.: Apiosporium?, Chaetomium, Coccopleum?, Sphaeronaema.

Cytisus*) Tourn. 1700. Inst. p. 647. t. 416: g. pl. class. XXII.

Linn. 1737. Gen. p. 219. n. 582; 1737. Hort. Cliff. p. 354; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 210; 1753. Sp. II. p. 739; 1759. Syst. ed. X. p. 1167. n. 785; 1763. Sp. ed. II. p. 1041; 1764. Gen. ed. VI. p. 378. n. 876; 1767. Syst. ed. XII. p. 489: g. Diadelph. Decandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 68. — Murr. 1774. Syst. p. 555; 1784. Syst. p. 666. — Lour. 1790. Coch. II. p. 462. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 499. n. 1191. — Gmel. 1791. Syst. p. 1114. — Pers. 1797. Syst. p. 703; 1807. Ench. II. p. 309. n. 1721. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1118. n. 1360; 1809. En. p. 766. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 325.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 591: g. Leguminosar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 17. — Scop. 1777. Intr. p. 304. — Juss. 1789. Gen. p. 354. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 388. — Batsch 1802. Tab. p. 95

*) Nomen ex Virgilio et Varrone.

Cytisus Tourn. cont. (*Citysus*). — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 215. — DC. 1805. Franç. IV. p. 501; 1815. V. p. 548. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 424. — Link 1822. En. II. p. 240. (*Cf.* Link 1823. Flora II. p. 756.) — Spreng. 1826. Syst. III. p. 222. n. 2530; 1831. Gen. II. p. 578. n. 2826. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 428. 457.

Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 257: g. pl. class. XI.

Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 134. n. 555: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 144.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 394. — Gis. 1792. Prael. p. 415.

Adans. 1763. Fam. II. p. 321: g. Genistar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 287: g. Tetrapetalar. irregular.

Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 202. 204; 1791. ibid. II. p. 84. Distinguitur Laburnum.

Neck. 1790. El. III. p. 28. n. 1335: g. Cyteophytor.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 746: g. Sparticar.

Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 153. Sect.: Alburnoides, Laburnum, Calycotome, Tubocytisus, Lotoides, Chronanthus. — Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4029 (sect. ut DC.); 1832. Fl. exc. p. 522 (sect.: Dicheilus, Adenocarpus, Cytisus, Calycotome, Laburnum); 1841. Nom. p. 150. n. 5863 (sect.: Cytisus, Calycotome, Laburnum, Leucocytisus). — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 154. Sect. ut DC. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 205. — Koch 1836. Syn. p. 154 (sect.: Laburum, Phyllocytisus, Tubocytisus, Lotoides). Ed. II. p. 169 (sect. eaed. et Calycotome, Asterocytisus, Salzwedelia); 1839. Deutschl. Fl. V. p. 94 (sect.: Laburnum, Phyllocystus, Calycotome, Cytisus, Salzwedelia, Lotoides, Asterocytisus). — Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59). — Endl. 1840. Gen. n. 6505. p. 1266; 1841. Ench. p. 668. Sect.: Tubocytisus, Calycotome, Laburnum, Alburnoides. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 519. Sect. ex DC. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 128. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 7. (Emittuntur Laburnum et Calycotome.) Sect.: Eucytisus, Trianthocytisus. — „Med." Webb 1846. Canar. II. p. 44. Sect.: Nivarina, Chrysocytisus. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 358. Sect.: Laburnum, Tubocytisus. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 470.

Link 1831. Hdb. II. p. 153: g. Genistoidear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Cytisear. (restrict.)

Cytisus O. F. Lang 1843. Flora II. p. 770: g. disjunctis Cytisantho, Salzwedelia, Laburno, Cytisophyllo, Lembotropide et Argyrolobio restrictum. Typus: C. austriacus L.

= Tubocytisus DC. pt.

Cytospora*) Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 15. 28: nov. g. Cytosporar., a Nemaspora disjunctum. *Cf.* Flora 1819. I. p. 204 et Spreng. n. Entd. II. p. 315.
Agdh. 1821. Aphor. p. 83: g. Sphaeriacear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Nemasporeor.
Synon. Cytispora Fries et Auct.; Bostrychia Fries; Variolariae et Hypoxyli sp. Bull.; Sphaeriae sp. Sow.; Naemasporae sp. Pers.; Cryptosphaeriae sp. Grev.

Cytosporae Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 15: cohors Fungor. Gen.: Coccopleum, Apiosporium, Chaetomium, Cytospora.

Cyttaria**) Berkeley 1841. Linn. Trans. XIX. p. 37; 1841. Ann. and Mag. n. h. VII. p. 436: nov. g. Fungor., Bulgariae aff. (C. Darwinii et Berteroi.) *Cf.* Mont 1849 in Orb. Dict. IV. p. 568.
Corda 1842. Mycol. p. 191: g. Pezizear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 1. n. $428/_1$: g. Cupulator.
Léveillé 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 254; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Cyttarieor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 398: g. Dichaenaceor.

Cyttarici Léveillé 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 254: fam. Fungor. Gen.: Cyttaria.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: sect. Cyathideor. Gen. id.

Czackia*) Andrzeiowski 1818. Diss. Krzemin. in 4to.

*) κύτος, cavitas, spatium.
**) κύτταρος: ob superficiem alveolatam.
***) Dicat. Thaddaeo Czacki, botanophilo polon.

Czackia Andrzeiowski cont.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 90. n. 1246; 1830. Gen. I. p. 268. n. 1397: g. Asphodelear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 710. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1153.
Mert. & Koch 1826. Deutschl. Fl. II. p. 558: sect. Antherici. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 563. — Endl. 1837. Gen. n. 1145 *b*. p. 148; 1841. Ench. p. 84.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1375; 1830. Fl. exc. p. 116: g. Hemerocallidear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. xxxi. 424. — Bartl. 1830. Ord. p. 50.
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1798: g. Anthericear. — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 592. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 380. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 195.
= Paradisia Mazzug.

Czernaevia „Turczan. in litt." Ledeb. 1844. Fl. Ross. II. p. 293 (Cat. Baikal. nr. 545): nov. g. Angelicear. (Conioselinum Czernaevia Fisch. & Mey.) — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 8. n. $4457/_2$.
Walp. 1846. Rep. V. p. 870: g. Seselinear.
Conf. Czernjajewia Turcz.; Czernievia Steud.

Czernavia „Szow." Rchb. 1841. Nomencl. p. 39. n. 1395: g. Brizear. (inter Melicam et Moliniam collocatum.)

Czernia Steud. vid. *Czernya Presl.*

Czernievia Steud. Nom. I. p. 478.
= Czernaevia Turcz.

Czernjajewia Turczan. 1845. Catal. pl. Baic. Dahur. p. 545.
= Czernaevia Turcz.

Czernya*) Presl 1818. Gram. sicul. p. 22. *Cf.* Steud. Nom. I. p. 478 (*Czernia*).
= Phragmites Trin.

*) Dicat. Czerny, scriptori botan. saeculi XV.

D.

Daboecia*) D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 160: nov. g. Andromedear. (Erica Daboecia L.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 833. — Meisn. 1839. Gen. p. 246 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 472.
Endl. 1839. Gen. n. 4317 *c*. p. 755; 1841. Ench. p. 370: sect. Menziesiae.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 713: g. Rhododendrear.
Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4939: g. Daboecicar.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 434: g. Rhodorear.
Klotzsch 1857. Ber. Berl. Ak. p. 8: g. Menziesiacear.
Synon. Boretta Neck.

*) Nomen ex anglico: *St. Dabeoc's heath.*

Daboecicae Rchb. 1841. Nomencl. p. 127: subdiv. Rhodoracear. Gen.: Bryanthus, Phyllodoce, Daboecia, Menziesia, Azalea, Osmothamnus, Rhodothamnus, Kalmia.

Dacampia Massalongo 1853. Sulla Lecid. Hook. di Schär.: nov. g. Lichenum. (Schärer nr. 526 ex parte.)
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 325: g. Dacampiear.

Dacampieae Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 322: fam. Kryoblastor. Gen.: Endopyrenium, Catopyrenium, Dacampia, Dermatocarpon.

Dachel Adans. 1763. Fam. II. p. 25: g. Palmar.
= Elate Linn.

Dacridium Leman vid. *Dacrydium Link.*

Dacrina Fries 1825. Pl. homon. p. 172; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 466: nov.

Dacrina Fries cont.
g. Scoriadeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 43. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 291: g. Cephalotricheor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 261. p. 22; 1841. Ench. p. 15. — Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 221.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 40; 1842. Mycol. p. 170: g. Isariear. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 125.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Isariaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 161: g. Auricularinor.
Synon. Merosporium Corda.

Dacryanthus*) Endl. 1839. Gen. n. 4292 *a.* p. 750; 1841. Ench. p. 368: sect. Dracophylli. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4813. 1.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 434: g. Epacrear.

Dacrycarpus Endl. 1847. Syn. Conif. p. 221; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 9. n. 1810 *d*: sect. Podocarpi. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1074.

Dacrydium „Sol. mss.“ Forst. 1786. Pl. esc. p. 80: nov. gen. Taxo aff., non descriptum.
Lamb. 1803. Descr. gen. Pin. p. 39. t. 69: g. Coniferar. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 439. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 703. n. 3542. — Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 4. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 233.
Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 297: g. Taxinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 96.
A. Rich. 1826. Conif. p. 127. t. 2: g. Taxinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 79. n. 1695. — Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 361. — Endl. 1837. Gen. n. 1801. p. 262; 1841. Ench. p. 144. — Meisn. 1842. Gen. p. 353 (264). — Brongn. 1843. En. genr. p. 135; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 181.
Rchb. 1837. Hdb. p. 166: g. Podocarpear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 438. — Endl. 1847. Syn. Conif. p. 224; 1847. Gen. Spl. IV. p. 9. n. 1811. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1075.
Rchb. 1841. Nom. p. 61. n. 2338: g. Taxear.
Lindl. 1847. Veg. kd p. 231: g. Taxaceae. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 569.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 449: g. Podocarpacear.
Cf. Hook. Ic. t. 548; 1843. Lond. journ. bot. II. t. 2 et Schltd. in Flora 1846. p. 756.
Synon. Alania Col.

Dacrydium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 41: nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 12. p. 438 (*Dacridium*).
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Tremelloideor.
= Myxotrichum Kunze.

Dacrymyces Agardh 1821. Aphor. p. 82: g. Tremellinar. — Par. Fries 1823. Syst. myc. II. p. 228; 1828. Elench. II. p. 35; 1838. Epicr. p. 592 (sphalm. *Darcrymyces*).
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 568: g. Tremellinear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 262.
Fries 1825. Pl. homon. p. 94: g. Tremelleor. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 34. n. 401. — Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 418. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 995: g. Hymenomycor. anomalor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 523: g. Inomycetum gymnosporor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Tremellinor. — Par. Bail 1858. Syst. p. 17. t. 22.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 470: g. Hymenulaceor.
= Dacryomyces Nees.

Dacryobolus Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 404: nov. g. Theleboleor. (D. sudans.)

Dacryodes Vahl 1810 in Danske Nat. Selsk. Skrivt. VI. p. 116: nov. g. Burserae aff. (D. excelsa.)
Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5641: g. Burserear.?
= Trattinickia Willd.? (Endl. Spl. I. p. 1425.)

Dacryomyces Nees 1816. Syst. p. 89; 1817. Ueberbl. p. 24: nov. g. Sarcocephalor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 367.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Exosporior.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83: g. Tremellinear.?
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Tremelloideor.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 543. n. 3545: g. Hyphomycetum.
Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 286: g. Tremelleor. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 20. n. 401.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 768. n. 3934: g. Tremellinor.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 32: g. Tubercularinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 66. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 52.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 39; 1842. Mycol. p. 162: g. Tuberculariacear.
Bonord. 1851. Hdb. p. 148: g. Myxonemeor.
Synon. Dacrymyces Agdh. et Auct.; Xylissus, Hypolepia et Hydromycus Raf.?

Dacryomyces Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 547: g. Isariear. Nonne errore pro *Dacrina Fries?*

Dactilis Necker vid. *Dactylis Linn.*

Dactiphyllum Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 261: novum nomen pro *Lupinastro Mönch* (*Pentaphyllo Pers.*) propositum.

Dactylaena Schrader 1823. Cat. sem. h. Gotting.: nov. g. Monandr. (D. micrantha.) *Conf.* Schult. 1829. Syst. VII. p. IX in adnot. ad Cleomen. Char. generis ex Schraderi manuscriptis.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII; 1828.

*) δάκρυ s. δάκρυον, lacryma.

Dactylaena Schrad. cont.
Consp. p. 187. n. 4857; 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 185. n. 7100: g. Cleomear. (1841 genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 266. — Meisn. 1837. Gen. p. 17 (15). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 314. — Endl. 1839. Gen. n. 4986. p. 890; 1841. Ench. p. 456. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 89. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 570.

Dactylanthes*) Haworth 1812. Syn. succ. p. 132. Ed. Schrank 1819. p. 144: g. Dodecandr. Monogyn., ab Euphorbia L. sejunctum.
Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7329. 5: sect. Euphorbiae.

Dactylethria Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 65; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Digitalis ambigua.)

Dactylicapnos Wallich 1828. Fl. Nepal. p. 51. t. 39.
Don .... in Sweet Fl. gard. II. t. 127.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 568. n. 2770 (*Dactyliocapnos*): g. Fumariacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 140. — Meisn. 1837. Gen. p. 8 (10).
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 467: g. Dicentrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4835. p. 859; 1841. Ench. p. 443. — Rchb. 1841. Nom. p. 184. n. 7063. — Walp. 1842. Rep. I. p. 118. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 571. — Pfeiff. 1857. Bot. Zeit. p. 649.
Rchb. 1837. Hdb. p. 264: g. Dielytrear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 65: g. Dielytrinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436: g. Fumariear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 753: g. Corydalear.
Hook. f. & Thoms. 1855. Ind. I. p. 273: sect. Dicentrae. (*Synon. Macrocapnos Royle.*)

Dactyliocapnos Spreng. vid. *praeced.*

Dactyliota Blume 1831. Flora II. p. 518: sect. Medinillae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6236 *d.* p. 1217; 1841. Ench. p. 647. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6744. 4. — Walp. 1843. Rep. II. p. 143.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 75: g. Miconiear. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 606.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 21: g. Medinillear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 298: g. Dissochaetear.

Dactylis Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 29. n. 67; 1753. Sp. I. p. 71; 1759. Syst. ed. X. p. 875. n. 80; 1762. Sp. ed. II. p. 104; 1764. Gen. ed. VI. p. 35. n. 86; 1767. Syst. ed. XII. p. 95: g. Triandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 100; 1784. Syst. p. 116. — Reich. 1778. Gen. p. 37. n. 92. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 50. n. 117. — Gmel. 1791. Syst. p. 184. — Pers. 1797. Syst. p. 119; 1805. Ench. I. p. 88. n. 167. — Willd. 1797. Sp. I. p. 407. n. 137; 1809. En. p. 110. — Hoffm. 1800. Bot. Tasch. III. 1. p. 48; III. 2. t. 6. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 311. — Thunb. 1818. Fl. cap. I. p. 426. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 73. — Trin. 1820. Fund. p. 145. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 633. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 342; ed. 1832. I. p. 341.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 130: g. Graminum. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 74. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Host. 1802. Gram. Austr. II. p. 67. t. 94. — Link 1821. En. I. p. 84. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 73. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 68. 223. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 104.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 400. — Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 458 (*Dactilis*). — Juss. 1789. Gen. p. 31. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 104. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 81. — DC. 1805. Franç. III. p. 73; 1815. V. p. 278. — Hedw. 1806. Gen. p. 44. n. 208. — Palis. 1812. Agrost. p. 85. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 37. 625. n. 321. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 439. — Link 1829. Hdb. I. p. 61.
Gled. 1764. Syst. p. 17. n. 62: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 180.
Neck. 1790. El. III. p. 223. n. 1601: g. Achyrophytor.
Panz. 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 266. (Revis. crit.)
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 125. — Endl. 1837. Gen. n. 892. p. 100; 1841. Ench. p. 59. — Meisn. 1843. Gen. p. 424 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 212.
Agdh. 1823. Aphor. p. 150: g. Festucacear. — Par. Link 1827. Hort. I. p. 152. — Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 999; 1830. Fl. exc. p. 36. — Kunth 1830. Gram. p. 125; 1833. Agrost. p. 385; 1838. Berol. II. p. 394. — Koch 1837. Syn. p. 808. Ed. II. p. 934. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 454. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 42. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 139. 370. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 9. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 207; 1850 in Webb Canar. III. p. 416. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 571. — Steud. 1854. Glum. I. p. 297. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 558.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1404: g. Cynosurear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 445: g. Festucear. — Par. Rchb. 1844. Fl. sax. p. 35. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 75. — Math. 1853. Belg. I. p. 618.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 368: g. Poëar.
Synon. Amaxitis Adans.; Festucae sp. Spreng.

*) δάκτυλος, digitus.

Dactylites Tausch 1823. Hort. Canal. I: div. Saxifragae. (S. hypnoides, tridactylites, granulata.) *Cf.* Flora 1824. I. p. 85.
Synon. Dactyloides Ser.; Saxifraga et Muscaria Haw.; Triplinervium Gaud.; Tridactylites Rchb.

Dactylium Nees 1816. Syst. p. 58; 1817. Ueberbl p. 16: nov. g. Mucedinum. (capitatar.) — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 80. — Pers. 1822. Myc. eur. I. p. 40. — Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 414. (ampliat.) Sect.: Dactylium, Cladobotryon. — Endl. 1836. Gen. n. 224. p. 19; 1841. Ench. p. 14. Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Botrytidum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70: g. Gonosporear.
Link 1824. Spec. I. p. 77: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 299. (synsporor.)
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 534: g. Botrytidear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Aspergillacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 90: g. Spondylomycetum.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 782. n. 4045: g. Inomycetum.
Corda 1839. Prachtfl. p. 45. t. 22 (plumosum).
Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 32; 1842. V. p. 16; 1842. Mycol. p. 65: g. Dendryphiacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 137.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 159: g. Dendryphieor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 95: g. Dendryphiaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 491: g. Botrytideor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cladobotryeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 82: g. Acmosporiaceor.
Synon. Sporocephalum Chev.

Dactylococcus Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 85: nov. g. Characiear.

Dactyloctenium Willd. 1809. Enum. p. 1029. n. 1125: nov. g. Polygam. Monoec. (Cynosurus aegyptius L.)
Palis. 1812. Agrost. p. 72: g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 33. 583. n. 299. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 442. — Link 1829. Hdb. I. p. 23.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 170; 1822. Syn. I. p. 229; 1830. Gram. p. 87; 1833. Agrost. p. 261: g. Chloridear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 169. — Agdh. 1823. Aphor. p. 151. — Link 1827. Hort. I. p. 58. — Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 869; 1841. Nom. p. 37. n. 1311. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 436. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Endl. 1837. Gen. n. 837. p. 93; 1841. Ench. p. 58. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 35. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 136. 330. — Meisn. 1843.

Dactyloctenium Willd.
Gen. p. 422 (323). — Brongn. 1843. En. genr. p. 8. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 89. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 572. — Steud. 1854. Glum. I. p. 212.
Trin. 1820. Fund. p. 140: g. Graminum. — Par. Link 1821. En. I. p. 104. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 6.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Chlorear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 384: g. Eleusinear.

Dactylograma Link ex Steud. Nomencl. I. p. 479; II. p. 164.
= Mühlenbergia Schreb.

Dactyloides Seringe 1830 in DC. Prodr. IV. p. 23: sect. Saxifragae. — Par. Koch 1836. Syn. p. 272. Ed. II. p. 299. — Endl. 1839. Gen. n. 4634 *c.* p. 815; 1841. Ench. p. 408. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 565. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 334. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 223. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 644.
= Dactylites Tausch.

Dactylon Villars 1787. Delphin. II. p. 69.
= Panici Linn. pars.

Dactylophyllum Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 874: sect. Sciodaphylli.

Dactylophyllum Spenner 1829. Fl. Frib. p. 1084: nov. gen. pro Sibbaldia, Potentilla, Comaro et Fragaria junctis propositum. *Cf. Fragaria Crantz.*

Dactylophyllum Benth. 1833. Bot. Regist. n. 1622 (*cf.* Linnaea X. Litt. p. 22); 1845 in DC. Pr. IX. p. 315: sect. Giliae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 244. — Endl. 1839. Gen. n. 3821 *c.* p. 657; 1841. Ench. p. 327. — Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179).
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 108: g. Gilicar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4391.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 636: g. Polemoniacear.

Dactylopogon Koch 1837. Syn. p. 770. Ed. II. p. 889: sect. Andropogonis. (A. Ischaemum L.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 442. — Steud. 1854. Glum. I. p. 377.

Dactylorhiza Necker 1790. Elem. bot. III. p. 129. n. 1469: nov. g. Synarmophytor., ab Orchide L. sejunctum. (*Dactylorrhiza Steud.*)

Dactylospora*) Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 271: nov. g. Lecidinar. (Lecidea parasitica Flk.)

Dactylostegium Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 162: nov. g. Diclipterear.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 488: sect. Diclipterae. (§. 5: Dactylostegiae.)

Dactylostemon Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 181; 1843 in Lond. journ. bot. II. p. 44: nov. g. Hippomanear. *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 545. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 87. n. 5771/₁. — Meisn.

*) δάκτυλος, digitus: a forma sporarum.

Dactylostemon Klotzsch cont.
1843. Comm. p. 369. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baill. 1858. Ét. Euphorb. p. 531 Actinostemoni iterum injungit.
Synon. Gymnorrhoea Leand. de Sacram.; Actinostemonis sp. Mart.

Dactylostylis Scheidweiler 1839 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 51. p. 405: nov. g. Orchidear. (D. fimbriata.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 1403/1. p. 1363; 1841. Ench. p. 110: g. Vandear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2005. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
= Zygostates Lindl. (Lindl. 1847.)

Dactyphyllum „Rafin." Endl. Gen. p. 1268 in synon. Lupinastri: vid. *Dactiphyllum Rafin.*

Dadia Arrab. ex Steud. Nomencl. I. p. 479: nov. g. Compositar. (D. lixa.)

Dadoxylon*) Endl. 1847. Syn. Conif. p. 298; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 13. n. 1816/24: g. Abietinear. foss.
Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 139. 190: g. Araucariear. Sejunguntur Medulloxylon et Colymboxylon.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 125: g. Coniferar. foss.
Synon. Pinites With.; Araucarites Göpp.

Daedalea Pers. 1801. Syn. Fung. p. XVII. 499: nov. g. Boletoideor. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 12. p. 447. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 371.
GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 25. 337: g. Fungor. — Par. Link 1809. Berl. Mag. III. p. 38 (primae seriei).
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 104; 1818. II. p. 239.
Nees 1816. Syst. p. 224; 1817. Ueberbl. p. 58: g. Pileator. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 451. — Fries 1821. Syst. myc. I. p. 331; 1828. Elench. I. p. 64. — Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 948. — Spreng. 1827 Syst. IV. p. 468. n. 3472; 1831. Gen. II. p. 763. n. 3897.
Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 19: g. Boletor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 638: g. Daedalidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83: g. Hymenacear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 578: g. Agariceear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 80; 1838. Epicr. p. 492; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 324; 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 99: g. Polyporeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 337; 1841. Nom. p. 12. n. 480. — Endl. 1836. Gen. n. 446. p. 39; 1841. Ench. p. 21. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 43. 83; 1842. Mycol. p. 182 (*Dedalea*). — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 381. — Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 234. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 414. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 171. — Bail 1858. Syst. p. 26. t. 31.
Pers. 1828. Mycol. eur. III. p. 2: g. Agaricinor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 94: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 631: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Math. 1853. Belg. II. p. 342 (*Dedalea*): g. Polyporear.
Synon. Serda, Sesia et Striglia Adans.; Vonckhout Sterb.; Lenzites Fries; Boleti sp. Linn.

Daedaleadeae Gray vid. *seq.*

Daedalideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 638 (p. 597 *Daedaleadeae*): div. Hymenothecear. Gen.: Daedalea.

Daemia „R. Brown" Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 448.
Schult. 1820. Syst. VI. p. XIII. 112: g. Asclepiadear. — Par. E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 220. (verar.) — Decne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 336. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 156: g. Asclepiear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 543: g. Sarcostemmar. (Asclepias Daemia Forst.)
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 575: g. Ditassear.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 483: g. Sarcostemmear.
Vid. Doemia R. Brown.

Daemonorhops Hassk. vid. *seq.*

Daemonorophus Lemaire vid. *seq.*

Daemonorops*) Blume 1830 in Schult. f. Syst. VII. p. 1333: nov. g. Dioec. (Calamus niger W.)
Endl. 1837. Gen. n. 1740. p. 249; 1841. Ench. p. 135: g. Lepidocaryinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2242. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 64 (*Daemonorhops*). — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 474.
Mart. . . . . Palm. p. 198. t. 117. 125.
Kunth 1841. Enum. III. p. 201: g. Calamear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 354 (265). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 61: g. Lepidocarynear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 575 (corr. *Daemonorophus*): g. Lepidocaryear.
Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 81: g. Lepidocaryinear.
Synon. Palmijuncus niger Rumph.

Dahlbergia Vahl vid. *Dalbergia Linn.*

Dahlia**) Cavan. 1791. Icon. I. p. 56. t. 80: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. (D. pinnata.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 458. n. 1869. — Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 55.
Thouin 1804. Ann. Mus. III. p. 420: g. Radiatar. tertiae sect.

---

*) δαδίον, facula.

*) ῥώψ, frutex.
**) Dicat. Andr. Dahl, botanico suecico.

Dahlia Cavan. cont.
Salisb. 1808. Hortic. Trans. I. (1815.) p. 89: g. Corymbiferar.
DC. 1836. Pr. V. p. 494: g. Ecliptear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2449. p. 397; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3099. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 43. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 575.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 127: g. Coreopsidear.
Synon. Georgina Willd.; Georgia Spreng.

Dahlia Thunb. 1792. Naturh. Selsk. Skrivt. II. 1. p. 133: nov. g. plant. (D. crinita.)
Thunb. 1792. Nov. gen. VII. p. 106; 1794. Prodr. I. p. 1; 1807. Fl. cap. I. p. 35: g. (Monandr. Monogyn. s.) Dioec. Monandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 648. n. 1751.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 449: g. Urticear.
R. Brown 1818. Descr. pl. Chin. p. 3 (Verm. bot. Schr. I. p. 561): g. Hamamelidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1902.
= Trichocladus Pers.

Dahuronia Scopoli 1777. Introd. p. 219. n. 966: g. Calycanthemar.
= Moquilea Aubl.

Dais*) Linn. 1762. Spec. ed. II. p. 556; 1764. Gen. ed. VI. p. 215. n. 540; 1767. Syst. ed. XII. p. 297. n. 535: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 336; 1784. Syst. p. 403. — Reich. 1778. Gen. p. 221. n. 588. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 292. n. 740. — Gmel. 1791. Syst. p. 686. — Pers. 1797. Syst. p. 431; 1805. Ench. I. p. 471. n. 1074. — Willd. 1799. Sp. II. p. 579. n. 860; 1809. En. p. 449.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Veprecular. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 414.
Scop. 1777. Intr. p. 201: g. Speciosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 187. t. 39. f. 3 (cotinifolia).
Juss. 1789. Gen. p. 77: g. Thymelaear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 181. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 325; 1825. Syst. II. p. 356. n. 1670; 1830. Gen. I. p. 371. n. 1876. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 452. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 650. — Bartl. 1830. Ord. p. 105. — Meisn. 1840. Linnaea XIV. p. 388.
Neck. 1790. El. III. p. 374. n. 1810: g. Aclithrophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 240: g. Daphnoidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2093. p. 330; 1841. Ench. p. 209. — Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2449.
Cram. 1803. Disp. p. 88 in Octandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 183: g. Daphnacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 321. n. 1266. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 592.
Link 1821. En. I. p. 390: g. Thymelear. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 234. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 445. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1520. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 120.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1777: g. Daphnear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 330 (242); 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 528. (diplostemonear.) — C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. p. 356.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 66. n. 2106: g. Euthymelear.

Dalbergaria Tussac 1808. Fl. Antill. I. p. 141.
= Alloplectus Mart.?

Dalbergaria Benth. 1852. Pl. Jungh. Fasc. II. p. 256: sect. Dalbergiae. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 133. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 578.

Dalbergia Linn. f. 1781. Suppl. p. 52. n. 1416: nov. g. Diadelph. Octandr. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 641. — Gmel. 1791. Syst. p. 1048. — Pers. 1797. Syst. p. 678.
Juss. 1789. Gen. p. 362: g. Leguminosar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 426. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 240. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 456. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 763; 1826. Syst. III. p. 193. n. 2513; 1831. Gen. II. p. 574. n. 2804. — Link 1822. En. II. p. 221.
Neck. 1790. El. III. p. 53. n. 1375: g. Cyteophytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 483. n. 1158: g. Diadelph. Decandr. — Par. Roxb. 1798. Corom. II. p. 7. 48. t. 113—115. t. 191. 192; 1832. Ind. III. p. 220. — Willd. 1800. Sp. III. p. 900. n. 1317. — Pers. 1807. Ench. II. p. 276. n. 1667.
Vahl 1794. Symb. III. p. 87 (*Dahlbergia*).
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Dalbergiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 416. — Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4014; 1841. Nom. p. 153. n. 6009. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 374. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 264. Subgen.: Brachypterum, Eudalbergia. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 359. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 152. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (67). — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 102. — Endl. 1841. Gen. n. 6717. p. 1304; 1841. Ench. p. 673. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 131. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 593. — Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 254. Sect.: Sissoa, Selenolobium, Dalbergaria. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 126. Sect. eaed. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 575. Sect. eaed.
Synon. Solori et Salken Adans.

Dalbergia Vogel 1837. Linnaea XI. p. 195: g. Dalbergiear.
= Triptolemea Mart.

Dalbergia s. Dalbergaria Tussac Fl. Antill. I. p. 141: vid. *Dalbergaria Tuss.*

*) Nomen novum; δαΐς, taeda.

Dalbergieae Bronn 1822. Diss. Legum. p. 134: trib. Curvembryar. Gen.: Deguelia, Monetaria, Acouroa, Geoffraea, Andira; Parivoa, Derris, Taralea, Pterocarpus, Drepanocarpus, Müllera, Brownea, Diphaca, Pongamia, Dalbergia, Ecastaphyllum, Brya, Amerimnon, Coumarouna, Saraca.

DC. 1825. Pr II. p. 415 (Lég. Mém. X.): trib. 6 Papilionacear. Gen.: Derris, Endespermum, Pongamia, Dalbergia, Pterocarpus, Drepanocarpus, Ecastaphyllum, Amerimnum, Brya, Deguelia. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 103. 373. Gen. ead. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 157. 359. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (67). Gen.: Amerimnon, Brya, Deguelia, Megastegia?, Endespermum, Pterocarpus, Dalbergia, Platymiscium, Miscolobium, Milletia, Pongamia, Derris, Varennea, Drepanocarpus, Semeionotis, Ecastaphyllum, Butea, Apoplanesia. — Benth. 1841. Hook. journ. III. p. 133. — Brongn. 1843. En. genr. p. 131. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. Gen. ut Endl. et Ancylocalyx, Neuroscapha, Gliricidia, Berrebera, Deguelia, Spatholobus. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 271. Gen. ut Endl.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVIII; 1828. Consp. p. 152; 1837. Hdb. p. 226: subdiv. Hedysarear. Gen. 1827 ut DC. exceptis 2 primis, 1828 ut DC. et Viborquia?, Weinreichia? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 153. Gen. ut Endl.

Bartl. 1830. Ord. p. 412: div. Papilionacear. Gen. ut DC.

Vogel 1837. Linnaea XI. p. 177. Gen. brasil.: Nissolia, Machaerium, Dalbergia, Platymiscium, Miscolobium.

Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 90: trib. Leguminosar. Gen.: Cyclolobium, Amerimnum, Corytholobium, Ecastaphyllum, Moutouchia, Pterocarpus, Echinodiscus, Centrolobium, Amphymenium, Drepanocarpus, Machaerium, Ateleia, Brachypterum, Pongamia, Milletia, Endospermum, Dalbergia, Triptolemea, Miscolobium, Platymiscium, Callisemaea, Discolobium, Piscidia, Phellocarpus, Geoffroya, Andira, Dipterix, Commilobium; Brya?, Derris?, Deguelia? — Par. Endl. 1841. Gen. p. 1302. Gen. ead. (Hecastophyllum loco Ecastophylli) et Sphinctolobium, Pterodon, Apoplanesia, Vatairea, Müllera. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1427 et Ench. p. 672) Crepidotropis, 1842 (Spl. II. p. 96) Lonchocarpus, Phyllocarpus, Podiopetalum, 1843 (Spl. III. p. 104) Spatholobus.

Dalea*) Linn. 1737. Hort. Cliffort. p. 363; 1737. Gen. p. 349. n. 877; 1742. Gen. ed. II. p. 366. n. 733: g. Diadelph. Decandr. (serius Psoraleae insertum). — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 1336. n. 1381. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 56. t. 38. — Pers. 1807. Ench. II. p. 345. n. 1747. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 101. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 194.

*) Dicat. Samueli Dale, pharmacologo.

Dalea Linn. cont.

Gled. 1749. Berl. V. p. 127: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34: g. Papilionacear — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 764. (spuriar.) — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 480. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 117.

Juss. 1789. Gen. p. 355: g. Leguminosar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 396. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 219. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 459. — Link 1822. En. II. p. 257. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 326. n. 2607; 1831. Gen. II. p. 572. n. 2790.

Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 244. — Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3888; 1841. Nom. p. 147. n. 5720. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 223. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 246. — Meisn. 1837. Gen. p. 89 (63). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 307. — Endl. 1840. Gen. n. 6523. p. 1270; 1841. Ench. p. 669. — Brongn. 1843. En. genr. p. 128. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 416. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 593. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 482.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Psoraliear.
Synon. Parosella Cavan.

Dalea P. Browne 1756. Jamaic. p. 239: nov. g. Icosandr. Monogyn.
= . . . ?

Dalea P. Browne 1756. Jamaic. p. 314: g. Syngenes. sect. 1.
= Critonia P. Browne.

Dalea Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 235. t. 51. f. 2: nov. g. plantar. (Lippia ovata L.)
= Microdon Choisy.

Dalea Cram. 1803. Disp. syst. p. 154: g. Monadelph. Pentandr.
= Petalostemum Michx.

Dalechampia*) Plumier 1703. Gen. p. 17 t. 38.

Linn. 1737. Cliff. p. 485: g. incertae sedis.

Linn. 1740. Syst. ed. II. p. 31; 1742. Gen. ed. II. p. 495. n. 931; 1753. Sp. II. p. 1054; 1759. Syst. ed. X. p. 1309. n. 1022: g. Polygam. Monoec.

Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 142. n. 598: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Tricoccor.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Euphorbiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 392.

Adans. 1763. Fam. II. p. 357: g. Tithymalor.

Jacq. 1763. Amer. p. 252. t. 160: g. Monoec. Monadelph. — Par. Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1423; 1764. Gen. ed. VI. p. 501. n. 1081; 1767. Syst. ed. XII. p. 634; 1771. Mant. II. p. 169. — Murr. 1774. Syst. p. 720; 1784. Syst. p. 862. — Reich. 1778. Gen. p. 497. n. 1179. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 653. n. 1460. — Pers.

*) Consecrata memoriae Jacobi Dalechampi Cadomensis, historia Lugdunensi claro.

Dalechampia Plumier cont.
1797. Syst. p. 906. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 515. n. 1716; 1809. En. p. 991.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 244. — Gis. 1792. Pracl. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 169. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 85. n. 2429; 1831. Gen. II. p. 553. n. 2707. (in Monadelph. Dodecandr.)
Neck. 1790. El. II. p. 351. n. 1150: g. Cyrtosiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 1070: g. Monadelph. Polyandr.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 505: g. Tithymaloidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 289: g. Euphorbiacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 581. n. 2136. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 98. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 461. — Kunth 1822. Syn. I. p. 412. — Link 1822. En. II. p. 405. — Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 55; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 593.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 374: g. Linozostear.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 632: g. Euphorbiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 488. — Endl. 1840. Gen. n. 5768. p. 1108; 1841. Ench. p. 587. (Atakta t. 20. 21.) — Meisn. 1841. Gen. p. 337 (251). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 79. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5015; 1841. Nom. p. 193. n. 7332: g. Tithymalear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Acalyphear.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 19. t. 222.
Baill. 1858. Ét. Euphorb. p. 485: g. Dysopsidear.
Synon. Cremophyllum Scheidw.

Dalembertia Baillon 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 195; 1858. Ét. Euphorb. p. 545: nov. g. Anthostemidear. (D. populifolia.)

Dalenia Korthals .... Verhand. nat. Geschied. p. 243. t. 58.
Walp. 1846. Rep. V. p. 715: g. Miconiear.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 39: g. Marumiear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 276: g. Dissochaetear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 530.

Dalhousia Lemaire vid. *seq.*

Dalhousiea*) Wallich 1832. Catal. n. 5339.
Meisn. 1837. Comm. p. 69: g. Cassiear. minus notum, 1843 ibid. p. 350: g. Sophorear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 69: g. Eupodalyriear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6424. p. 1255; 1841. Ench. p. 667.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5917: g. Podaliriear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 593 (*Dalhousia*): g. Podalyriear.
Synon. Delaria Desv.?

Dalia „Adans." Endl. in synon. Ledi: vid. *Dulia Adans.*

Dalibarda**) Linn. 1753. Spec. I. p. 491; 1759. Syst. ed. X. p. 1062. n. 555: g. Icosandr. Pentagyn., serius Rubo injunctum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 295: g. Rosar.
Neck. 1790. El. II. p. 90. n. 752: g. Sarcodiphytor.
Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 299: g. Icosandr. Polygyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 53. n. 1239. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 309. — Elliott 1821. Sketch I. p. 571.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 378: g. Didynam. Angiosperm. (??)
Rich. 1816 in Nestl. Potent. p. 16: g. Fragariacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 865; 1825. Syst. II. p. 526. n. 1860: g. Potentillear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII; 1828. Consp. p. 167. n. 4439.
Link 1822. En. II. p. 62: g. Rosacear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1112. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 198 (*Roncinelle*). — Spreng. 1830. Gen. I. p. 416. n. 2074. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 164.
DC. 1825. Pr. II. p. 568: g. Dryadear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 402. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 541. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 453. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (74). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 449: g. Dalibardear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6359. p. 1241; 1841. Ench. p. 659. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 593.
Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6508: g. Rubear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 564: g. Potentillidar.

Dalibardeae Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 449: subtrib. Dryadear. Gen.: Dalibarda, Rubus. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1241; 1841. Ench. p. 659. Gen. ead. — Walp. 1843. Rep. II. p. 13.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 208: trib. Dryadear. Gen. ead.

Dalideae Rafin. vid. *Cylipogon Rafin.*

Dalrympelea***) Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 76. t. 279: nov. g. Rhamnor. (D. pomifera. *Cf.* Flora 1823. II. p. 472), a R. Brown (ibid. in adnot.) ad Turpiniam Vent. reductum.
= seq.

Dalrymplea Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 421; ed. 1832. I. p. 633: g. Pentandr. Monogyn. (antea *Dalrympelea.*)
Spreng. 1825. Syst. I. p. 771. n. 839: g. Rhamnear.
Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 439: g. restitutum Staphyleacear.

Daltonia***) Hook. & Tayl. 1818. Musc. brit. p. 80: nov. g. Muscor. — Par. Gray

---

*) Dicat. James Andr. Ramsay, comiti de Dalhousie.

*) Dicat. Thom. Franc. Dalibard, botanico gall.
**) Dicat. Alex. Dalrymple.
***) Dicat. James Dalton, bryologo angl.

Daltonia Hook. & Tayl. cont.
1821. Brit. pl. I. p. 748. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 187. n. 3328; 1831. Gen. II. p. 733. n. 3722. (frondosor.) — Schwägr. 1830. Suppl. III. vol. II. 2. t. 295. — Math. 1853. Belg. II. p. 30.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 255: g. Pleurocarpor. peristomor. (ibid. p. XLV Neckerar.)
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 294: g. Hypnoidear. Sect.: Macrodon, Pilotrichum, Daltonia. — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60.
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 570: g. Neckeriaceor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 217: sect. Neckerae.
Endl. 1836. Gen. n. 577. p. 56; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 14: g. Hypnear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 955: g. Calyptrobryor.
Bruch, Schimp. & Gümb. . . . . Bryol. eur. Fasc. 44. 45: g. Daltoniacear., serius Hookeriaceis adscriptum.
Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 594; 1849. ibid. VIII. p. 400: g. Neckerear.
C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 16; 1850. Bot. Zeit. p. 670: g. Mniadelphacear.

Daltoniaceae Bruch, Schimp. & Gümb. .... Bryol. eur. Fasc. 44. 45: fam. Muscor. Gen.: Daltonia.

Dalucum Adans. 1763. Fam. II. p. 34: g. Poarum.
= Melica Linn.

Damapana Adans. 1763. Fam. II. p. 323: g. Genistar. (*Tsjovanna-Manneli Rheede* Malab. IX. t. 38.)
= Smithia Ait.?

Damara Zucc. vid. *Dammara Rumph.*

Damarites Endl. 1842. Gen. Spl. II. p. 27. n. 1806/$_3$: g. Abietinar. foss.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 204; 1846. Chlor. prot. p. LXXV: g. Abietinear.
= Dammarites Presl.

Damasonium*) Tourn. 1700. Inst. p. 256. t. 132: g. pl. class. VI.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 77: g. Lilior.
Adans. 1763. Fam. II. p. 458: g. Ranunculor. (Alisma flava L.)
Juss. 1789. Gen. p. 46: g. Juncor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 158: g. Alismoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 122: g. Potameor.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 113: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 255. n. 1035.
DC. 1805. Franç. III. p. 188: sect. Alismae.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 268: g. Butomear. — Par. Presl 1827. Reliq. Hänk. I. 2. p. 89.
Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365: g. Alismacear. — Par. Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 470. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 217. — Kunth 1841. Enum. III. p. 155. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 209. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 42. — Math. 1853. Belg. I. p. 504. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 166.
Agdh. 1822. Aphor. p. 126: g. Alismear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 113. — Endl. 1837. Gen. n. 1043. p. 128; 1841. Ench. p. 72. — Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1145. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 364 (273). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 29. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 600.
Synon. Actinocarpus R. Brown.

*) Apud Plinium idem quod alisma.

Damasonium „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 277: g. pl. class. XIII. (Ed. Hall. 1745. p. 293 in class. XIV.)
= Platantherae Rich. et Gymnadeniae R. Brown sp.

Damasonium Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 26: nov. g. plant.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 300: g. Dicotyledonum Polystemonum.
= Alisma Adans.

Damasonium Schreb. 1789. Gen. I. p. 242. n. 624: g. Hexandr. Hexagyn. — Par. Roxb. 1798. Corom. II. p. 45. t. 185; 1832. Ind. II. p. 215. — Willd. 1799. Sp. II. p. 276. n. 710. — Pers. 1805. Ench. I. p. 400. n. 898. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 294. n. 1518.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 344. Ed. Nees p. 200: g. Hydrocharidear. — Par. Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 30. — Bartl. 1830. Ord. p. 76. — Schult. 1830. Syst. VII. p. CVI. 1593. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 4.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 267: g. Hydrocharidum.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 163. n. 1390: g. Alismear. (?)
Rchb. 1828. Consp. p. 46. n. 808: g. Stratiotear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1049. 1222: g. Alismacear.
= Ottelia Pers.

Damatras Rchb. vid. *seq.*

Damatrias Rchb. vid. *seq.*

Damatris Cassini 1817. Bull. soc. philom. Sept. p. 139; 1818. Dict. v. 12. p. 471; 1823. v. 29. p. 449. 457; 1830. v. 60. p. 573: nov. g. Arctotidear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2673 (*Damatrias*). — Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. (verar.)
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 255: g. Compositar. dubium. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 503. n. 11; 1841. Ench. p. 251.
Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139): g. Arctotear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3648 (*Damatras*): g. Gorteriear.?

Dameria Endl. in synon. Embeliae: vid. *Daucería Dennst.*

Damina Rchb. vid. *seq.*

Damine Endl. 1840. Gen. n. 5376 *b.* p. 1009; 1841. Ench. p. 523: sect. Grewiae.
Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7858 (*Damina*): g. Tiliear. genuinar.
Synon. Vincentia Boj.; Vinticena Steud.

Damironia*) Cassini 1828. Dict. v. 56. p. 221; 1830. v. 60. p. 580: nov. g. Helichrysear. (Xeranthemum variegatum L.)
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.
= Helipteri sect. Astelma DC.

Dammara Dampier 1729. Voy. III. p. 110. t. 3. f. 4.
= Schizopleura Lindl. (Walp. Repert. II. p. 162.)

Dammara Rumph. 1741. Amboin. II. p. 168.
= Engelhardtia Leschen.

Dammara Rumph. 1741. Amboin. II. p. 174. t. 54. *Cf.* Lamb. Pin. Ed. II. t. 54. 55.
Link 1822. En. II. p. 411: g. Coniferar. — Par. Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 230.
Agdh. 1825. Aphor. p. 212: g. Pinear.
Link 1831. Hdb. II. p. 475: g. Dammaracear.
Endl. 1837. Gen. p. 261. n. 1798: g. Abietinar.
Endl. 1841. Ench. p. 141: g. Abietinear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 136. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1069.
Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2375: g. Araucariear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 366.
Zucc. 1842 in Endl. Spl. II. p. 26. n. 1799 (*Damara*): g. Cunninghamiear. (Zucc. Fl. jap. t. 139.) — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 7. n. 1805.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Abietear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 601: g. Abietacear. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 447.
Synon. Agathis Salisb.

Dammara Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 100. t. 103. f. 1. (D. graveolens.)
= Marignia Comm.

Dammaraceae Link 1830. Abh. Berl. Ak. f. 1827. p. 157: div. Coniferar. Gen.: Cunninghamia, Agathis, Araucaria.
Link 1831. Hdb. II. p. 474: subordo Abietinar. Gen.: Araucaria, Dammara, Belis.

Dammareae Karsten 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 216: fam. Strobuliferar.

Dammarites Presl 1838 in Sternb. Vers. II. p. 203. t. 52: g. Coniferitum.
Göpp. 1842. Nov. Act. Leop. XIX. 2. p. 122: g. Coniferar. foss.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 303; 1847. Gen. Spl. IV. p. 13. n. $1816/_{27}$: g. Abietinear. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 118.
Conf. Damarites Endl.

Damnacanthus Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 18. t. 182. f. 7 (indicus).
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 475: g. Rubiacear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 473: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 562. — Endl. 1838. Gen. n. 3178. p. 538; 1841. Ench. p. 272.
Meisn. 1838. Gen. p. 168 (118): g. Psychotriacear.

*) Dicat. J. Phil Damiron, prof. Paris.

Damnacanthus Gärtn. cont.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376: g. Coffeacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 601.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2828: g. Psychotriear. — Par. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 253.
Zucc. 1846. Flora I. p. 286: g. Guettardear. *Cf.* Sieb. & Zucc. 1846 in Abh. Münchn. Ak. IV. 3. p. 175.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Synon. Oxyacantha javanica Rumph?; Baumannia DC.; Canthii sp. Juss.

Damnosporium Corda 1842. Anl. Mycol. p. 192: nov. g. Coryneacear.

Dampiera*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 587. Ed. Nees p. 443: nov. g. Scaevolear. — Par G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 730. — Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 102. n. 4006. — Endl. 1838. Gen. n. 3040. p. 507; 1841. Ench. p. 261. — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (146). — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 502. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 583. — Vriese 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 400; 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 78. *Cf.* Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 376. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 695.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 6. t. 2; 1823. Dict. v. 27. p. 98: g. Lobeliacear. — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 476.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. IX. 168. n. 884: g. Goodenoviar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 753. n. 799; 1830. Gen. I. p. 170. n. 586: g. Lobeliear.
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2784: g. Goodenoviear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 148.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 760: g. Pentandr. Monogyn.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 601: g. Goodeniacear.

Danaa**) Allion. 1785. Pedemont. n. 1392. t. 63.
DC. 1805. Franç. IV. p. 311: g. Umbelliferar. (Ligusticum aquilegifolium Willd.) — Par. Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 478. — Lagasc. 1821. Amen. nat. II. p. 97. (Divis. 1.)
= Physospermum Cusson.

Danaa Colla . . . . Mem. Ac. Turin. XXXVIII. t. 28.
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3365 10: sect. Senecionis.
= Senecionis spec. chilens.

Danacites Endl. vid. *Danaeites Göpp.*

Danaë Medic. 1787. Malv. Fam. p. 72: nov. g. Monadelph. Monandr. (Ruscus racemosus L.) *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 269; 1789. Phil. Bot. I. p. 117; 1791. ibid. II. p. 36.
Mönch 1794. Meth. p. 170: g. Thalamostemonis.
Cram. 1803. Disp. p. 155: g. Monadelph. Hexandr.

*) Dicat. Guil. Dampier, navarcho et peregrinatori celeberrimo.
**) Dicat. J. Petro Mart. Dana, prof. Turin.

Danaë Medic. cont.
Pers. 1807. Ench. II. p. 636: sect. Rusci.
Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 46; 1850. Enum. V. p. 276: g. Ruscear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 224: g. Asparagear.
Webb 1850. Canar. III. p. 319: g. Smilacear. Subgen.: Salmacis, Acrisia.
Synon. Danaidia Link; Danaida Endl.

Danaea*) Smith 1791. Mem. Ac. Turin. V. p. 420; 1797 in Röm. Arch. I. 2. p. 57; 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 107: nov. g. Filicum. — Par. Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 302; 1800. ibid. II. p. 125. (agyratar.) — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 8. 108 (exannulatar.); 1806. Syn. Fil. p. 167. (agyratar.) — Willd. 1802. Bemerk. Farrenkr. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 45. — Leman 1818. Dict. v. 12. p. 479.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 42: g. Agyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 33: g. Agyrator.
Willd. 1810. Sp. V. p. 67. n. 1943: g. Poropteridum. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 106; 1827. Syst. IV. p. 24. n. 3223; 1831. Gen. II. p. 718. n. 3614.
Agdh. 1822. Aphor. p. 117: g. Danaeacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 82. — Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 294. (restrict.) Sect.: Eudanaea, Arthrodanaea, Holodanaea.
Kaulf. 1824. En. Fil. p. 33: g. Marattiacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 39. n. 745. — Grev. & Hook. 1833. Bot. Misc. III. p. 228. — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 15. — Endl. 1836. Gen. n. 669. p. 65; 1841. Ench. p. 42. — Meisn. 1843. Gen. p. 435 (337). — J. Smith 1843. Lond. journ. bot. II. p. 393. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 119. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 282.
Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Paris. VI. p. 207: g. Marattiar.
Bartl. 1830. Ord. p. 18: g. Osmundacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Rhizospermar.
Rchb. 1841. Nom. p. 30. n. 1060: g. Marattiear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 5; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 602; V. p. 694.

Danaeaceae Agardh 1822. Aphor. p. 117; 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 584: ordo Filicum. Gen.: Marattia, Danaea. — Par. Göpp. 1836. Syst. Fil. foss. p. 172. Gen. foss.: Glockeria, Danaeites. — Unger 1845. Syn. p. 35; 1846. Chlor. prot. p. XXXIII. Gen. foss. ut Göpp. et Taeniopteris, Anomopteris, Scolecopteris. — Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 293. Gen.: Danaea, Heterodanaea, Danaeopsis, Anomopteris.
Lindl. 1833. Nix. p. 37; 1847. Veg. kd. p. 82: ordo Filicalium. Gen.: Kaulfussia, Angiopteris, Danaea, Eupodium, Marattia.

Danaeites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 380: nov. g. Danaeacear. foss. — Par. Unger 1845. Syn. p. 36; 1846. Chlor. prot. p. XXXIII.
Endl. 1841. Ench. p. 43. n. 687/4 (*Danaeites*): g. Filicum foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 75.

Danaeopsis Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 299: nov. g. Danaeacear. (Danaea palacea Raddi.)

Danaida Endl. 1837. Gen. n. 1188 *b*. p. 155; 1841. Ench. p. 88: sect. Rusci. — Par. Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 130.
Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1739: g. Convallariear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 18: g. Asparagear.
= Danaë Medic.

Danaidia Link 1829. Handb. I. p. 274: g. Asparaginar. (Ruscus racemosus L.)
= Danaë Medic.

Danais „Comm. mss." Vent. 1799. Tabl. II. p. 584: g. Rubiacear. (quart. sect.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 438. — Pers. 1805. Ench. I. p. 198. n. 440. — Hedw. 1806. Gen. p. 121. n. 530. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 480. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. IV. 23. n. 864. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 385. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 706. n. 773; 1830. Gen. I. p. 165. n. 833. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 724.
Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 83. t. 195.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 611: g. Cinchonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2053. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 274. — Bartl. 1830. Ord. p. 211. — DC. 1830. Pr. IV. p. 361. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 483. — Meisn. 1838. Gen. p. 157 (113). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.
Endl. 1838. Gen. n. 3267. p. 554; 1841. Ench. p. 274: g. Eucinchonear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 602.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2903: g. Quinquinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.
Synon. Paederiae sp. Juss.

Dangervilla Flor. Flum. I. p. 66. (*Dangervillea* „Arrab." g. Triandr. Pentagyn. [spinosa] ex Steud. Nomencl. I. p. 482.)
= Galipea St. Hil.

Danielia DC. 1828. Prodr. III. p. 393: sect. Rocheae. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98). — Endl. 1839. Gen. n. 4615 *a*. p. 810; 1841. Ench. p. 405.
Synon. Larochea Haw.

Danthia Steud. Nom. I. p. 482: lege *Dantia Adans.*

Danthonia*) DC. 1805. Fl. franç. III. p. 32: nov. g. Graminear. (Festuca decumbens L. et Avena calycina Vill.) — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 176. Ed. Nees p. 32. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 302.

*) Dicat. J. Pet. Mar. Dana.

*) Dicat. Etienne Danthoine, Marseille.

Danthonia DC. cont.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Avenacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 129. (Avena strigosa Schreb.) — Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1054; 1830. Fl. exc. p. 52; 1841. Nom. p. 36. n. 1222. Sect. (1841) ut Endl. — Nees 1832. Linnaea VII. p. 314. — Endl. 1837. Gen. n. 871. p. 97; 1841. Ench. p. 59. Sect.: Sieglingia, Danthonia. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 445. Sect.: Danthonia, Pentameris. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 138. 345. — Meisn. 1843. Gen. p. 423 (324). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 8. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 603. — Steud. 1854. Glum. I. p. 238. Sect.: Pentaschistis, Himantochaete, Pentameris, Chaetobromus, Trichopteryx. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 427.
Link 1829. Hdb. I. p. 45 (sphalm. *Dauthonia*): subg. Avenae. (Avena calycina Vill.)
Spreng. 1830. Gen. I. p. 73: sect. Avenae.
Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 67: g. Graminum.
Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838) p. 31: g. Avenaceor. Sect.: Danthonia, Pentameris.
Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 157; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 103: g. Avenear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Math. 1853. Belg. I. p. 604. (verar.)
(Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 560: g. Festucacear.
= Danthonia Palis. et Sieglingia Bernh.

Danthonia Palis. 1812. Agrost. p. 92. t. 18. f. 7: g. restrict. Graminear. (D. provincialis DC.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 40. 689. n. 332. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 483. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 331. n. 336.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 71: g. Triandr. Digyn. — Par. Trin. 1820. Fund. p. 147. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 676.
Agdh. 1823. Aphor. p. 150: g. Avenacear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 798. Ed. II. p. 923. — Kunth 1838. Berol. II. p. 383.
Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Bromear.
Endl. 1837. Gen. n. 871 *b*. p. 97; 1841. Ench. p. 59: sect. Danthoniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1222. 2.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 451: g. Avenear.
Synon. Triathera Roth.; Pentameris Palis.; Pentaschistis Steud.

Danthonia Gaudin 1828. Fl. Helv. I. p. 68. 221: g. Graminum. (D. decumbens.)
Kunth 1830. Gram. p. 106; 1833. Agrost. p. 311: g. Avenacear. — Par. Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 37. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163.
Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838) p. 31: sect. Danthoniae. — Par. Schrad. 1838 in Linnaea XII. p. 445.
= Sieglingia Bernh.

Dantia*) „Petit 1710" Adans. 1763. Fam. II. p. 244: g. Portulacar.

*) Dicat. Danti d'Isnard.

Dantia Adans. cont.
Pet.-Thouars Gen. mad. nr. 49 (ex DC.)
DC. 1828. Pr. III. p. 61: sect. Isnardiae. (I. palustris.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 697. — Endl. 1840. Gen. n. 6111 *a*. p. 1189; 1841. Ench. p. 637.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 508: sect. Ludwigiae.
Synon. Isnardia Linn.; Danthia Steud.

Dantia Lipp. mss.
= Boerhaavia Linn. (Choisy in DC. Pr. XIII. 2. p. 449.)

Dantrungia Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 80. n. 5639 *b*: sect. Meliosmae.

Dapania Korthals 1854. Nederl. kruidk. Arch. p. 384: nov. g. Chrysobalanear.
Planch. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 266: g. Oxalidear. *Cf.* Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 402. 648.

Dapazea Ehrenb. vid. *Depazea Fries.*

Dapetes Fries 1838. Epicr. p. 341: trib. Lactarii. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 494. 3.

Daphnaceae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 180. t. 30: fam. plant. Gen.: Dirca, Lagetta, Daphne, Passerina, Stellera, Arjona, Struthiola, Lachnea, Dais, Gnidia, Nectandra, Quisqualis.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 194.
C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 353. Tribus: Gnidieae, Passerineae, Daphneae. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 45.

Daphnales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 23: nixus Tubiferar. Ordines: Elaeagneae, Thymelaeae, Hernandieae, Aquilarinae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 529: nixus Exogenar. perigynar. Ord.: Thymelaceae, Proteaceae, Lauraceae, Cassythaceae.

Daphnanthes*) C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 358: sect. Daphnes. — Par. Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 532.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 68. n. 2106/7 *b* β: subsect. Eudaphnes.
Synon. Thymelaea GMS.; Cneorum Gray; Eudaphne Meyer.

Daphne**) Linn. 1737. Gen. p. 110. n. 311; 1737. Cliff. p. 147; 1740. Syst. p. 22; 1748. Ups. p. 94; 1753. Sp. I. p. 356; 1759. Syst. ed. X. p. 1003. n. 436; 1762. Sp. ed. II. p. 509; 1764. Gen. ed. VI. p. 192. n. 485; 1767. Syst. ed. XII. p. 271. n. 480: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 307; 1784. Syst. p. 371. — Reich. 1778. Gen. p. 196. n. 526. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 260. n. 664. — Lour. 1790. Coch. I. p. 236. — Gmel. 1791. Syst. p. 631. — Pers. 1797. Syst. p. 396. — Willd. 1799. Sp. II. p. 415. n. 773; 1809. En. p. 424. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 4. 27.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Veprecular. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 414. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 238.

*) δάφνη, laurus.
**) Lauri synonymon supervacaneum. (Ht. Cliff.)

Daphne Linn. cont.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Thymelear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 434. n. 967. — Mirb. 1815. Elém. II. p. 873. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 265. Sect.: Mezereon, Laureola, Cneorum. — D. Don 1825. Nepal. p. 68. — Agdh. 1826. Aphor. p. 233. — Koch 1837. Syn. p. 620. Ed. II. p. 714. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 438. Sect.: Mezereum, Thymelaea, Eudaphne, Gnidia, Laureola, Laureoloides. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 120. — Griseb 1844. Rumel. II. p. 320.
Gled. 1764. Syst. p. 270. n. 1110: g. Calycostemonum.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 26: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 329: g. Monopetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 486: g. Passerinatar.
Scop. 1777. Intr. p. 343: g. Seminudar.
Juss. 1789. Gen. p. 77: g. Thymelaear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 181. — DC. 1805. Franç. III. p. 355. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 362. Ed. Nees p. 218. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 150. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 324; 1825. Syst. II. p. 236. n. 1477; 1830. Gen. I. p. 318. n. 1624. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 486. — Kunth 1822. Syn. I. p. 446. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 650. — Link 1829. Hdb. I. p. 376. — Bartl. 1830. Ord. p. 115. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 71; 1851. Ross. III. p. 546. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1306. — Webb .... Canar. III. p. 231.
Neck. 1790. El. II. p. 178. n. 887: g. Aclithrophytor. Disjungitur Sanamunda.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 238: g. Daphnoidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2092. p. 330; 1841. Ench. p. 208. — Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2438. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 57.
Cram. 1803. Disp. p. 35 in Tetrandr. Monogyn. et p. 197 in Dioec. Octandr.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 181: g. Daphnacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 280. n. 1124. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 603.
Wikström 1820. Diss. de Daphne. (Stockh.)
Link 1821. En. I. p. 356: g. Thymelinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1781: g. Daphnear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 330 (242); 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 530. (diplostemonear.) Sect. (1857): Mezereum, Daphnanthes, Gnidium, Laureola, Eriosolena. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 877.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 164: g. Thymelaeacear.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 66. t. 191.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelaeear.
Endl. 1847. Gen. Spl. IV. p. 67. n. 2106/7: g. Eudaphnear. Sect.: Mezereum, Eudaphne.
Kaleniez. 1849. Bull. soc. Mosc. Nr. 1. Sect.: Eumezereum, Eucneorum. *Cf.* Flora 1850. p. 461.

Daphne Linn. cont.
Synon. Laureola Rupp.; Capura Linn.; Thymelaea Scop.; Scopolia Linn. f.; Sanamunda Neck.?; Eriosolena Blume; Roumea Wall.
Daphne Linn. mss. ex Smith Cyclop. V. xr. = Andromeda Linn.
Daphne C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Petersb. I. Nr. 23. p. 356: g. restrict. Daphnear. Sect.: Eudaphne, Daphnanthes. = Eudaphne Endl.
Daphneae Rchb. 1828. Consp. p. 82; 1837. Handb. p. 170: div. Thymeleacear. Gen.: Thecanthus, Pimelea, Drapetes?, Gnidia, Thymelina, Lachnaea, Dais, Struthiola, Stellera, Passerina, Daphne, Schoenobiblus, Dilobeia?, Lagenula, Capura? et (1837) Forestiera, Dirca, Lagetta, Cansiera.
Meisn. 1841. Gen. p. 330 (242): trib. Thymelaear. Gen.: Pimelea, Drapetes, Diarthron, Schoenobiblus, Dirca, Daphne, Edgeworthia, Daphnopsis, Dais, Passerina.
C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 355: trib. Daphnacear. Gen.: Peddiea, Schoenobiblus, Daphnopsis, Funifera, Pimelea, Nordmannia, Scopolia, Wickströmia, Diplomorpha, Dirca, Dais, Edgeworthia, Lygia, Mezereum, Hargasseria, Daphne, Piptochlamys, Chlamydanthus, Arthrosolen, Diarthron, Stellera. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 46.
Endl. 1847. Gen. Spl. IV. p. 59: subtrib. Thymelinar. Divis.: Stellereae, Thymeleae.
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 496: trib. Thymelear. Subtrib.: *Hemistemoneae* (gen.: Pimelea), *Isostemoneae* (gen.: Drapetes, Cansjera?, Schoenobiblus), *Diplostemoneae* (gen.: Daphnopsis, Ovidia, Funifera, Lagetta, Dirca, Goodallia, Lasiadenia, Peddiea, Dais, Daphne, Edgeworthia, Wikströmia, Coleophora, Stellera, Thymelaea, Diarthron, Arthrosolen, Passerina, Chymococca).
Daphnella „Ser. mss." Mathieu 1853. Fl. Belg. I. p. 484: sect. Salicis. (S. daphnoides Vill.)
Daphnephyllum Hassk. vid. *Daphniphyllum Blume.*
Daphnicon Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plant. = Hippocratea Linn.
Daphnidia Nees 1833. Progr. p. 19: div. Laurear. Gen.: Lepidadenia, Dodecadenia, Actinodaphne, Jozoste, Daphnidium, Tetradenia.
Nees 1836. Syst. Laur. p. 27: vid. *Daphnidinae.*
Daphnidiae Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 473: trib. Laurinear. Gen. Daphnidinar. Nees.
Daphnidieae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 327 (239): trib. Laurear. Gen. Daphnidinar. Nees.
Daphnidinae Nees 1836. Syst. Laurin. p. 583 (p. 27 *Daphnidia*): trib. Laurinar. Gen.: Dodecadenia, Actinodaphne, Daphnidium, Litsaea.
Endl. 1838. Gen. p. 323; 1841. Ench. p. 198: trib. Laurinear. Gen. ead.

Daphnidinae Nees cont.
Conf. Daphnidia Nees, Daphnidiae Spach, Daphnidieae Meisn., Litsaceae Rchb.

Daphnidium*) Nees 1831 in Wall. Pl. As. rar. II. p. 61. 63; 1833. Progr. p. 19: g. Daphnidior. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1333. 1364.
Nees 1836. Syst. Laur. p. 606: g. Daphnidinar. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2065. p. 323; 1841. Ench. p. 198.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 474: g. Daphnidiar.
Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239): g. Daphnidiear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 604. — Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. 22. p. 350. Sect.: genuina, Cephalodaphne.
Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2644: g. Litsacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.
Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 975: g. Tetrantherear.

Daphnidostaphylis**) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 79: nov. g. Arbutear. (Arctostaphylos pungens Kth., etc.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1109.

Daphniphyllum Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1152: nov. g. Rhamneis aff. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 45. — Endl. 1840. Gen. n. 5755. p. 1104; 1841. Ench. p. 582. — Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5613.
Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51): g. Rhamnear. (?) — Par. Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 232 (*Daphnephyllum*). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 606.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.?
Planch. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 259: g. Scepacear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 564: g. Gyrandrear.
Synon. Gyrandra Wall.; Goughia Wight.

Daphnitideae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. ...: sect. Urticacear. Gen.: Laurophyllus.

Daphnitis Spreng. 1825. Syst. I. p. 454. n. 491; 1830. Gen. I. p. 111. n. 559: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (Laurophyllus capensis Thunb.), male includens Dilobeiam Pet.-Th. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 543.
= Laurophyllus Thunb.

Daphnobryon***) Meisn. 1857 in DC. Prodr. XIV. 2. p. 566: nov. g. Gnidiear. (Drapetes tasmannica et ericoides Hook.) — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 880.

Daphnogene Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 227; 1846. Chlor. prot. p. LXXXI: nov. g. Laurinear. foss. — Par. Vis. & Massal. 1854. Flora p. 118.

Daphnoideae Vent. 1799. Tabl. II. p. 235: ordo 2 class. VI. Gen.: Dirca, Lagetta, Daphne, Passerina, Stellera, Struthiola, Lachnea, Dais, Gnidia.
Endl. 1838. Gen. p. 329: ordo (109) Thymelacar. Gen.: Dirca, Daphne, Daphnopsis, Schoenobiblos, Dais, Lachnaea, Passerina, Diarthron, Drapetes, Pimelea, Struthiola, Gnidia, Thymelina, Linostoma, Cansjera, Eriosolena, Wickströmia, Lagetta. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1378 et Ench. p. 208) Lasiosiphon, Phaleria? et 1842 (Spl. II. p. 36) Cryptadenia, Peddiea. — Par. Endl 1847. Spl. IV. p. 59. Tribus: Pimelinae, Thymelinae, *anomalae* (p. 69. Gen.: Peddiea, Funifera, Lagetta, Jenkinsia).
Rchb. 1841. Nom. p. 64: div. Thymelaeacear. Gen.: Pimelea, Struthiola, Diarthron, Drapetes, Cansjera, Schoenobiblos; Stellera, Passerina, Thymelaea, Daphne, Dirca, Daphnopsis, Lachnaea, Cryptadenia, Gnidia, Thymelina, Wickströmia, Lagetta, Eriosolena, Drymispermum; Dais, Lasiosiphon, Linostoma; *Hernandieae.*
Synon. Thymelacae Juss.; Thymelinae Link; Daphnaceae St. Hil.; Thymeleae B. Juss.

Daphnoideae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 323. 442 (235): class. 33 Monochlamydear. Ordines: Monimieae, Atherospermeae, Laurineae, Gyrocarpeae, Grubbiaceae, Nyssaceae, Helwingiaceae, Santalaceae, Anthoboleae, Phalerieae, Aquilarineae, Thymelacae, Hernandieae, Proteaceae, Penaeaceae, Elaeagneae, Myristiceae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. XXXI. 119: class. Dialypetalar. perigynar. Fam.: Gyrocarpeae, Laurineae, Hernandiaceae, Thymeleae.

Daphnopsis Martius 1824. Nov. gen. I. p. 65: nov. g. Thymelaear. (D. brasiliensis.)
Endl. 1838. Gen. p. 330; 1841. Ench. p. 208; 1847. Spl. IV. p. 69. n. $2106/_{13}$: g. Daphnoidear. (imperfecte cognitum). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2440.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 436: g. Thymelear.
Meisn. 1841. Gen. p. 330 (242): g. Daphnear. — Par. C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. p. 355. — Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 520. (diplostemonear.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 65: g. Thymelaeacear.
Synon. Hargasseria Schiede?; Nordmannia Fisch. & Mey.?

*Daphonophytum**)* Necker 1790. Elem. bot. III. p. 102: gen. 40 plant. Spec. nat.: Ceratocarpus, Cynomorium, Gunnera, Stilago, Hura, Salacia, Nepenthes, Aristolochia, Osyris, Elaeagnus, Gouania, Bucida, Waldschmidtia, Conocarpus, Saraca, Pistia, Cytinus, Asarum, Tamus, Rajania, Hippophaë, Theligonum, Viscum, Datisca, Terminalia, Nyssa, Stratiotes, Montinia, Casuarina, Aegopricon.

*Dapsilophytum***)* Necker 1790. Elem. bot. II. p. 245: gen. 25 plant. Spec.

---

*) *Δαφνίδιον*, Laurus minor et elegantula.
**) *δαφνίς*, fructus lauri; *σταφυλίς*, uva, racemus.
***) Nomen propter habitum musciformem.

*) *διαφωνέω*, discrepo; *φυτόν*, planta.
**) *δαψιλής*, abundans; *φυτόν*, planta.

Dapsilophytum Neck. cont. natur.: Breynia, Capparis, Tilia, Clusia, Morisonia, Sloana, Bixa, Margravia, Muntingia, Graevia, Corchorus, Oxytandrum, Lecythis, Elsholtzia, Dupinia, Vantana, Crataeva, Stengelia, Banara.

Dapsilosporium Corda 1836 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 75. t. 38: nov. g. Fungor., Melanconio aff. (D. stromaticum.)

Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 3: g. Caeomacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 56: g. Stilbosporeor.

= Melanconium Link. (Rabenh. Krypt. I. p. 44.)

Darbya A. Gray 1846. Proc. Bost. Soc. II. p. 115; 1846 in Sillim. Amer. journ. I. p. 386; 1847. Bost. Journ. V. p. 350: nov. g. Santalacear. *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 291.

A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 637: sect. Comandrae.

Darcrymyces Fries vid. *Dacrymyces.*

Darea*) Juss. 1789. Gen. p. 15: nov. g. Filicum. — Par. Smith 1799 in Ust. n. Ann. XVII. p. 98. (dorsiferar. — *Daria.*) — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 46. — Willd. 1809. En. p. 1072; 1810. Syst. V. p. 295. n. 1966. — Leman 1818. Dict. v. 12. p. 497.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 29: g. Gyrator.

Agdh. 1822. Aphor. p. 117: g. Polypodiacear. — Par. Kaulf. 1824. En. Fil. p. 180. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 206. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.)

Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 323: g. Asplenicar.

Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 701: g. Asplenioidear.

Endl. 1836. Gen. p. 62. n. 630 *b*: sect. Asplenii. — Par. J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 174.

Endl. 1841. Spl. I. n. 630 *a γ.* p. 1348; 1841. Ench. p. 36: subsect. Asplenii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 1015. 1. *c.*

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.

Fée 1852. Gen. Fil. p. 332: g. Davallicar.

Synon. Caenopteris Berg.

Dareastrum Fée 1852. Gen. Fil. p. 19: sect. Asplenii. (A. cicutarium Sm.)

Dargeria**) Chamisso & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 16: sect. Gerardiae. — Par. Benth. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 210. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 559. (G. parviflora Benth.) — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4522. 5.

= Esterhazya Mikan.

Dargeria Decaisne 1844 in Jacquem. voy. Bot. p. 116.

= Leptorhabdos Schrenk. (Benth. in DC. Pr. X. p. 510.)

Daria Smith vid. *Darea Juss.*

*) Dicat. Dare, pharmacopolae angl.
**) Anagramma nominis Gerardia.

*Darinyphytum**)* Necker 1790. Elem. bot. II. p. 1: gen. 16 plant. Spec. natur.: Eranthemum, Syringa, Willichia, Montia, Centunculus, Rhacoma, Scoparia, Plantago, Psyllium, Budleja, Polypremum, Exacum, Erithrea, Gentiana, Pneumonanthe, Anthopogon, Rassia, Sebeokia, Thyrophora, Spiragyne, Chaetothilus, Gärtneria, Diapensia, Humboldtia, Hottonia, Primula, Androsace, Aretia, Galax, Cressa, Claytonia, Samolus, Retzia, Theophrasta, Convolvulus, Stevogtia, Evolvulus, Apomoea, Milhania, Ipomoea, Cuscuta, Glaux, Coris, Nama, Limnanthus, Menianthes, Soldanella, Cortusa, Dodecatheon, Cyclamen, Doraena, Anagallis, Lysimachia, Hydrolea, Verbascum, Polemonium, Valerandia, Chironia, Schrebera, Swertia, Chlora, Trientalis, Spigelia, Ophiorrhiza, Lisianthus, Hyoscyamus, Nicotiana, Datura, Omalocarpus, Littorella.

Darlingtonia**) DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 97: nov. g. Leguminosar. (Mimosa illinoensis Michx.)

DC. 1825. Pr. II. p. 443 (Lég. mém. XII. nr. 6.): g. Mimosear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4166. — Bartl. 1830. Ord. p. 417. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 397. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 49. — Meisn. 1837. Gen. p. 96 (69). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 401.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX; 1841. Nom. p. 156. n. 6127: g. Acaciear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6830. p. 1325; 1841. Ench. p. 682. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 607.

Benth. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 356: Desmantho injungit.

Darlingtonia Torrey 1853 in Sillim. journ. II. p. 16: nov. g. Sarraceniaceae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 169.

Darluca***) Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87: nov. g. Lentaginiae. (Ixora americana.)

= Tetramerium Gärtn.

Dartus†) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 123. Ed. Willd. p. 152: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Perlarius alter Rumph.)

Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 501: g. Solanear. (?). — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LV. 683. n. 832. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 675. n. 743; 1830. Gen. I. p. 157. n. 789. — Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 409. — Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3290. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 693. — Meisn. 1840. Gen. p. 277 (184)?

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 486: g. Cestrinear.

Endl. 1839. Gen. n. 3872. p. 668; 1841. Ench. p. 332: g. Solanacear. dubium. Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 124. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 674.

Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 4764: g. Mandragorear.?

*) *διαῤῥήγνυμαι*, findor, disrumpor; *φυτόν*, planta.
**) Dicat. Will. Darlington, botan. americano.
***) Dicat. Mich. Darluc, scriptori hist. nat. (Wittst.)
†) *δαρτός*, excoriatus.

Darwinia*) Rudge 1813. Linn. Trans. XI. p. 299: nov. g. Decandr. Monogyn. (D. fascicularis.) *Cf.* Isis 1829. p. 145. — Par. Spreng. 1825. Syst. II: p. 357. n. 1675; 1830. Gen. I. p. 370. n. 1869. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1517.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1771 b: g. Darwiniear.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VII. p. 84: g. Myrtacear., Calythrici proximum. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 149.
Bartl. 1830. Ord. p. 115: g. Thymelaear.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 812: g. Chamaelauciear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 107 (76). — Endl. 1840. Gen. n. 6282. p. 1226; 1841. Ench. p. 650. — Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6823 (*Darwynia*). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 608.
Schauer 1841. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. II. p. 187: g. Euchamaelauciear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 729.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 721: g. Chamaelauciacear.
Darwinia Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 106.
= Monoplectra Rafin. (*Cf.* Vogel 1838. Linnaea Litt. p. 10.)
Darwinia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 31: nov. g. plant. (*Mala-Poenna Rheede* V. t. 9.)
= Litsaea Juss.
Darwinieae Rchb. 1828. Consp. p. 28; 1837. Handb. p. 170: div. Thymeleacear. Gen.: Goniodium?, Darwinia.
Darwynia Rchb. vid. *Darwinia Rudge.*
Dasanthera**) Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 99: nov. g. Personatar. (Gerardia fruticosa Pursh.)
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271: g. Gerardiear.
= Pentstemon L'Herit.
Dasia Agardh 1824. Syst. Alg. p. xxxiv. 211: g. Floridear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 332.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 494 (p. 212 a. n. 498 b): g. Sphaerococcear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 753. n. 3821: g. Confervinar. capsuliferar.
= Dasya Agdh.
Dasianthera Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 90. t. 66: nov. g. Bixinear. (D. luzonensis.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 19 (17). *Cf. Dasyanthera Rchb.*
= Phoberos Lour.?
Dasiola Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea Litt. VIII. p. 85): nov. g. Graminear. (Festuca monandra.)
Dasistoma Rafin. vid. *Dasystoma.*
Dassiera Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 353: sect. Alternantherae.
Dassovia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 257. n. 410: nov. g. Campylophytor., ab Asclepiade L. sejunctum.
Dasus***) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 141. Ed. Willd. p. 175: nov. g. Pentandr. Monogyn. (D. verticillatus.) — Par. Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 503. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. x. 170. n. 887. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 754. n. 803; 1830. Gen. I. p. 169. n. 853. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 759.
Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 201 (*Dazus*): g. Loranthear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 212 a. n. 2120 c (*Dazus*): g. Cephaëlidear.?
Meisn. 1838. Gen. p. 154 (100): g. Loranthacear.?
Endl. 1841. Gen. p. 1330. n. 6862 inter genera gamopetala incertae sedis. — Simil. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 613 (*Dasys*).
Dasya Agardh 1828. Spec. Alg. II. 1. p. 116: g. Ceramiear. (antea *Dasia*). — Par. Duby 1833. Mém. Genèv. VI. p. 11. — Endl. 1836. Gen. n. 66. p. 6; 1841. Ench. p. 4. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 402; 1841. Brit. Alg. p. 97. — Mont. 1840. in Webb Canar. IV. p. 165; 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 173. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 702. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358. (Flora 1843. p. 98.)
Grev. 1830. Syn. p. lx.
J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 29; 1842. Alg. medit. p. 118: g. Rhodomelear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 44. n. 122/56. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 179; 1852. Linnaea XXV. p. 702. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 125. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 156. — Nägeli 1847. Alg. Syst. p. ... — Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 264. — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 608; 1849. ibid. X. p. 54.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phyc. gener. p. 414; 1845. Phyc. germ. p. 310; 1849. Sp. Alg. p. 795. n. 539: g. Dasyear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 59; 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 232: g. Rhodomelacear. Subgen. (1853): Compsotcia, Rhodonema, Lophothalia, Stichocarpus.
Synon. Stichocarpus Agdh.; Rhodonema Mart.; Grateloupia Bonnem.; Gaillona Bonnem.; Baillouviana Gris.
Dasyactis Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 239; 1845. Phycol. germ. p. 188; 1849. Sp. Alg. p. 338. n. 232: nov. g. Rivulariear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 28.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.
Synon. Rivularia Aresch.
Dasyanthera Rchb. 1837. Handb. p. 274: g. Bixear. *Cf. Dasianthera Presl.*
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 115: g. Bixinear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 234.
Endl. 1839. Gen. n. 5078. p. 921; 1841. Ench. p. 479: g. Prockiear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 609.
Rchb. 1841. Nom. p. 189. n. 7212: g. Laetiear.

*) Dicat. Erasmo Darwin, botanico angl.
**) δασύς, asper, hirsutus.
***) δασύς, hirsutus.

Dasyanthera Rchb. cont.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 589: g. Bixacear.
= Phoberos Lour.? (Lindl. 1847.)
Dasyanthes D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 155: g. Ericear. normalium. (Erica Sparrmanni L.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 826. — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 264 (*Dasyanthus*).
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 636: subsect. Syringodeae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *b* 17. p. 1411; 1841. Ench. p. 370. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 2 *g*.
Dasyanthus Wittst. vid. *praeced.*
Dasycarpus Oersted 1856. Vidensk. Meddel. p. 27: nov. g. Tiliacear. (Müll. Ann. bot. VII. p. 453. An = Sloanea Linn.?)
Dasycarya Liebm. .... Nov. pl. mex. dec. nr. 6. p. 98: nov. g. Spondiacear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 447.
Dasycephala Borckh. 1796 in Römer Arch. I. p. 25.
= Pneumonanthe Neck.
Dasycephala DC. 1830. Prodr. IV. p. 565: sect. Diodiae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 626. — Endl. 1838. Gen. n. 3123 *b*. p. 528; 1841. Ench. p. 271. — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2772. 2.
Dasycladeae Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 21: trib. Vaucheriear. Gen.: Chamaedoris, Dasycladus, Neomeris, Cymopolia.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 95; 1843. Phyc. gener. p. 312; 1845. Phyc. germ. p. 254: fam. Coeloblastear. Gen.: Cymopolia, Dasycladus, Ascothamnion.
Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 33: ordo Chlorospermear. Gen.: Cymopolia, Dasycladus, Acetabularia.
Dasycladidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 22: trib. Vaucheriar. Gen. Dasycladear. Endl.
Dasycladus Agardh 1827. Flora II. p. 640; 1828. Spec. II. 1. p. 15: nov. g. Ectocarpear. An melius Characear.? *Cf.* Duby 1833. Mém. Genèv. VI. p. 6 et Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 610.
Endl. 1836. Gen. n. 73. p. 6; 1841. Ench. p. 4: g. Ceramicar. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 33. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 714.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 183: g. Siphonear. — Par. J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 23.
Dcne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329 (Flora 1843. p. 93): g. Actinocladear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465): g. Vaucheriear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 127.
Endl. 1843. Spl. III. p. 21. n. 66: g. Dasycladear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 95; 1843. Phyc. gener. p. 313; 1845. Phyc. germ. p. 254. — Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 38.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dasycladidar.
Nägeli 1847. Alg. syst. p. ...: g. Acetabulariear. *Cf.* Flora 1848. II. p. 616.
Dasycladus Agardh cont.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 508. n. 324: g. Valoniear.
Synon. Spongia Scop.; Botrydion Targ.; Myrsidrum Rafin.
Dasyclonia Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 105; 1843. Phycol. gener. p. 430: subsect. Coelosiphoniae. (Polysiphonia byssoides.)
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 325; 1849. Sp. Alg. p. 834: sect. Polysiphoniae.
Dasycoleum Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 414 (Müll. Ann. bot. VII. p. 557): nov. g. Meliacear. (D. Philippinum.)
Dasyeae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phycol. gener. p. 414: fam. Axonoblastear. Gen.: Dasya, Eupogonium, Trichothamnion. — Par. Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 310; 1849. Sp. Alg. p. 795. Gen. ead. et Lophothalia, Eupogodon, Asparagopsis.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 107: subtrib. Rhodomelear.
Dasygloea „Thwait. mss." Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 272. n. 192: nov. g. Leptotrichear.
Dasylinum Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 598; 1848. ibid. VII. p. 518: series Syllini. (Linum viscosum, hirsutum.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 95.
Dasylirion*) Zuccar. 1838 in Otto & Dietr. Gartenz. p. 258. 303; 1843. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. III. p. 221: nov. g. Xerotidear. *Cf.* Zuccar. 1845. Abh. Münch. Ak. IV. 2. p. 19.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1314/1. p. 1361; 1841. Ench. p. 106: g. Bromeliacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 148.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1630: g. Tillandsicar. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299).
Endl. 1842. Spl. II. p. 15: g. Bromeliaceis aff.
Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 33; 1850. Enum. V. p. 38 (*Dasylirium*): g. Dracaenear. emend.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 17: g. Xerotear.
Synon. Roulinia Brongn.
Dasylirium Kunth vid. *praeced.*
Dasyloma DC. 1830. Prodr. IV. p. 140: nov. g. Seselinear. (Seseli Bengalensis Roxb.) — Par. Tausch 1834. Flora I. p. 356. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 305. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 140. n. 5414. — Meisn. 1838. Gen. p. 144 (104). — Endl. 1839. Gen. n. 4422. p. 773; 1841. Ench. p. 378. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 954. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 139. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 610. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 740.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.
Dasymalla**) Endl. 1839. Nov. stirp. Mus. Vindob. Dec. nr. 12; 1841. Gen. Suppl. I. n. 3733/1. p. 1401; 1841. Ench. p. 318:

*) δασύς, densus; λείριον, Lilium.
**) μαλλός, villus.

Dasymalla Endl. cont.
nov. g. Myoporinear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 247. — Meisn. 1840. Gen. p. 292 (201). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 628. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 139. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 610.
Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4451: g. Stenochilear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 665: g. Myoporacear. — Par. A. DC. 1847. Pr. XI. p. 704.

Dasymaschalon*) Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 134: sect. Unonae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 66. — Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 320.

Dasynema „Schott" Spreng. 1827. Syst. Cur. post. App. p. 408: nov. g. Dillenicar. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 2 (5).
Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4980: g. Delimear.?
Rchb. 1837. Hdb. p. 278: g. Hibberticar. genuinar.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413: g. Hibbertinear.
Endl. 1840. Gen. n. 5362. p. 1006; 1841. Ench. p. 522: g. Sloanear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 611.
Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7947: g. Ablaniear.
Meisn. 1843. Comm. p. 344: g. Tiliear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 74. t. 284.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Sloanidar.
Synon. Adenobasium Presl; Foveolaria et Myriochaeta DC; Sloaneae sp. Aubl.

Dasyochloa „Willd. herb. nr. 2046 ex Trin. mss." Steud. Nomencl. I. p. 484; II. p. 731.
= Uralepis Nutt.

Dasyopsis Zanardini 1843. Sagg. Classif. Fic. p. 52: nov. g. Algar. (Dasya plana et spinella Ag.) *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 611.
Harv. 1847. Nereis p. 58.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Rhodomelear.
= Eupogodon Kütz.

Dasyphila Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 53; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 169: nov. g. Ceramicar. (D. Preissii.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubiae affinitatis.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 673. n. 447: g. Callithamnear.

Dasyphlaea Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Spongiocarpidar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 757. n. 507: g. Cystocloniear.
= seq.

Dasyphloea Montagne 1842. Prodr. Alg. antarct. p. 8; 1845. Pol Sud p.100; 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: nov. g. Spongiocarpear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 39. n. $122/_{40}$.
Harv. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 254: g. Cryptonemiacear.
Synon. Dasyphlaea Lindl.

*) μασχάλη, axilla.

Dasyphylla Stackh. 1816. Nereis brit. Ed. alt. p. ...: nov. g. Fucor. *Cf.* Leman 1818. Dict. v. 12. p. 504 et Spreng. n. Entd. I. p. 96.
= . . . ?

Dasyphyllum HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 17. t. 308: nov. g. Barnadesiar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 360.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 379. n. 2640; 1831. Gen. II. p. 605. n. 2977: g. Cynarear.
Cass. 1827. Dict. v. 47. p. 499; 1830. v. 60. p. 570: g. Barnadesiear. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p 3. — Meisn. 1839. Gen. p. 228 (141). — Endl. 1841. Ench. p. 247. — Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3805. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Carlinear.
Less. 1830. Linnaea V. p. 247; 1832. Syn. p. 94: g. Mutisiear.
Endl. 1838. Gen. p. 481. n. 2902: g. Gerberear.

Dasypogon R. Brown 1810. Prodr. I. p. 263. Ed. Nees p. 119; 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 608 (Verm. bot. Schr. I. p. 157): nov. g. Juncear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 193; 1825. Syst. II. p. 112. n. 1278; 1830. Gen. I. p. 248. n. 1294. — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 504. — Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 238. — Schult. 1829. Syst. VII. p. xxi. 280. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1056. (?)
Agdh. 1823. Aphor. p. 157: g. Xyridear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 121.
Laharpe 1827. Mém. soc. h. n. Par. III. p. 93: g. Bromeliacear.
Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41: g. Juncinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1313: g. Xerotear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: g. Dasypogonear.
Bartl. 1830. Ord. p. 38: g. Aphyllanthear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 134.
Endl. 1837. Gen. n. 1058. p. 132; 1841. Ench. p. 76: g. Kingiaceear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 376. — Meisn. 1842. Gen. p. 406 (310). — Nees 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 52. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 612. — Steud. 1855. Glum. II. p. 311.
Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1683 (*Dasypogonia*): g. Kingiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 187: g. Xyridacear.?

Dasypogoneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54. 55.
= Kingiaceae Endl. etc.

Dasypogonia Rchb. vid. *Dasypogon R. Brown.*

Dasyranthus Rafin. ex Steud. Nomencl. I. p. 484. 692.
= Gnaphalium Linn.

Dasys Lemaire vid. *Dasus Lour.*

Dasyscyphae Fries 1823. Syst. myc. II. p. 89: trib. Lachneae.
= seq.

Dasyscyphus Nees 1817. Syst. Ueberbl. p. 69: fam. Pezizar. pedicellatar.

Dasyscyphus Nees cont.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 670: g. Pezizadear. (Peziza pulchella, virginea Pers. etc.)
Endl. 1836. Gen. n. 430 *B g.* p. 37; 1841. Ench. p. 21: subsect. Lachni. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 2 *c.* — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 358.

Dasyspermum Necker 1790. Elem. bot. I. p. 276. n. 295: nov. g. Scadiophytor., teste auctore species Conii, Ammi, Tordylii et Scandicis complectens.

Dasyspermum Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 113. 118: sect. Alsomitrae. (Zanonia cissoides et heterosperma Wall.)

Dasystachys Oersted 1858. Palm. Centroam. p. 25: g. Chamaedoreear. (Stachyophorbe Deckeriana Klotzsch.)

Dasystemon DC. 1828. Prodr. III. p. 382 (Mém. II. p. 15. t. 3): nov. g. Crassulear. (Crassula calycina Desf.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 99. — Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6175. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 613.
Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4175: g. Sedear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98).
Bartl. 1830. Ord. p. 310: g. Crassulacear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 73. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 107.
Endl. 1839. Gen. n. 4608. p. 809; 1841. Ench. p. 405: g. Eucrassulear.

Dasystephana (*Δασυστεφανη*) Renealm. 1611. Spec. hist. pl. p. 67. ic. p. 68.
Adans. 1763. Fam. II. p. 502: g. Apocynor.
Borckh. 1796 in Röm. Arch. I. 1. p. 25: g. pro Gentiana punctata, asclepiadea, etc. adoptatum.
= Gentianae pars.

Dasystoma Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 99 (*Dasistoma*): nov. g. Personatar.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271: g. Gerardiear. — Par. Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 520 (verar.; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685.
Synon. Pegesia Rafin.; Pedicularoides Benth.; Pedicularioides Walp.

Dasystoma C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 684: sect. Stachydis. (St. Thirkei et Sieberi n. sp.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 264.

Dasytricha Wittst. vid. *seq.*

Dasytrichia „Lamx." Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 185: nov. g. Hydrophytar. loculatar.
Bonnem. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 95: g. Epidermear.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 400: g. Phlomidear.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 265 (*Dasytricha*): g. Confervacear.
= Cladostephus Lyngb.

Datisca Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 142: nov. g. plant.
Linn. 1753. Sp. II. p. 1037; 1759. Syst. ed. X. p. 1296. n. 1003: g. Dioec. Decandr.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salsolar.
Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1469; 1764. Gen. ed. VI. p. 530. n. 1132; 1767. Syst. ed. XII. p. 659: g. Dioec. Dodecandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 748; 1784. Syst. p. 892. — Reich. 1778. Gen. p. 525. n 1237. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 700. n. 1543. — Pers. 1797. Syst. p. 934; 1807. Ench. II. p. 627. n. 2265. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 823. n. 1825; 1809. En. p. 1021. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 391.

Datisca Linn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 506: g. Portulacar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Miscellanear. sect. 1. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 594.
Gled. 1764. Syst. p. 108. n. 443: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 99: g. Disparium.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 147. t. 30. f. 2 (cannabina).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 202. *Conf. Cannabina Medic.*
Juss. 1789. Gen. p. 445: g. incertae sedis. — Par. Vent. 1799. Tabl. IV. p. 11. — Duchesne 1805. Dict. v. 6. p. 434 (*Cannabine*).
Neck. 1790. El. III. p. 118. n. 1456: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 757: g. Dodecandr. Trigyn.
Batsch 1802. Tab. p. 178: g. Scabridar.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 243: g. Dioec. Polyandr.
Presl 1820. Rostlin. I. p. 217: g. Datiscear. — Par. R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 230. (Verm. bot. Schr. IV. p. 44.) — Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4487; 1837. Hdb. p. 244; 1841. Nom. p. 169. n. 6552. — Bartl. 1830. Ord. p. 419. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 290. — Endl. 1839 Gen. n. 5016. p. 898; 1841. Ench. p. 459. — Meisn. 1841. Gen. p. 346 (256). — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 238. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 107. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 502. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 293. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 726.
Link 1822. Én. II. p. 431: g. Urticeis aff.
D. Don 1825. Nepal. p. 203: g. Resedeacear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 906. n. 3191; 1831. Gen. II. p. 709. n. 3576: g. Resedear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: g. Halogear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 317: g. Datiscacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 616.
Synon. Cannabina Tourn.

Datiscaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 82) 1847. Veg. kingd. p. 316: ordo Cucurbitalium. Gen.: Datisca, Tetrameles, Tricerastes.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 616: fam. Dicotyledonear. diclinar. Gen. ead.
= Datisceae Presl.

Datiscales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 25: nixus Rectembryar. Ordines: Datisceae, Lacistemeae.

Datisceae Presl 1820. Rostlinar. I. p. 217.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 19; 1826. Isis p. 592|: ordo Peponiferar.
R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 230 (Verm. bot. Schr. IV. p. 44): ordo plant. Gen.: Datisca, Tetrameles.
Rchb. 1828. Consp. p. 169; 1832. Fl. exc. p. 632; 1837. Hdb. p. 244: div. Haloragear. Gen. ead. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 169. Gen. ut Endl.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (90) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 419: ordo incertae sedis. Gen. ut R. Br.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 290: ordo Thalamiflorar. Gen.: Datisca.
Lindl. 1833. Nix. p. 25: ordo Datiscalium.
Endl. 1839. Gen. p. 897; 1841. Ench. p. 459: ordo Rhoeadum. Gen. ut R. Brown et Tricerastes.
Meisn. 1841. Gen. p. 346 (256): ordo Juliflorar.? Gen. ut Endl.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 107: fam. Crassulinear. Gen.: Datisca.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 291: fam. (230) incertae sedis. Gen. ut Endl.

Datora Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 552: sect. Scopoliae.

Datura*) Linn. 1737. Gen. p. 48. n. 135; 1737. Cliff. p. 55; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 43; 1753. Sp. I. p. 179; 1759. Syst. ed. X. p. 932. n. 218; 1762. Sp. ed. II. p. 255; 1764. Gen. ed. VI. p. 98. n. 246; 1767. Syst. ed. XII. p. 170. n. 245: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 184; 1784. Syst. p. 220. — Reich. 1778. Gen. p. 100. n. 263. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 132. n. 332. — Lour. 1790. Coch. I. p. 110. — Gmel. 1791. Syst. p. 378. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 35; 1818. Fl. cap. II. p. 56. — Pers. 1797. Syst. p. 229. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1007. n. 377; 1809. En. p. 226. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 130. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 238. Ed. 1832. I. p. 561.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 208. n. 866: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Luridar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 182. — Gis. 1792. Prael. p. 384. — Batsch 1802. Tab. p. 196. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 8. 111.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Solanear. — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 476. — Juss. 1789. Gen. p. 125; 1827. Dict. v. 49. p. 408. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 370. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 286. — DC. 1805. Franç. III. p. 609. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 459; 1825. Syst. I. p. 627. n. 670; 1830. Gen. I. p. 154. n. 770. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 5. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 528. — Link 1821. En. I. p. 176; 1829. Hdb. I. p. 561. — Kunth 1823. Syn. II. p. 148; 1838. Berol. II. p. 53. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 234. — Nees

*) Nomen barbarum.

Datura Linn cont.
1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 73. — Koch 1837. Syn. p. 509. Ed. II. p. 586. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 686. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 58. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 545.
Hill 1769. Ht. kew. p. 136: g. Monopetalar.
Neck. 1790. El. II. p. 40. n. 674: g. Darinyphytor.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 702: g. Solanacear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 51. — Sendtn. 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 160.
Bernh. (Trommsd. n. Journ. Pharm. XXVI. 1. p. 118) 1833. Linnaea VIII. Litt. p. 115. Sect.: Brugmansia, Stramonium, Dutra, Ceratocaulis.
Endl. 1839. Gen. n. 3845. p. 663; 1841. Ench. p. 331: g. Daturear. Sect. ut Bernh. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 276 (183). — Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4743. Sect.: Datura, Metella, Ceratocaulis, Brugmansia. — Walp. 1845. Rep. III. p. 15. — Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 619. — Rchb. f. . . . . in Webb Canar. III. p. 117. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 182. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 538. Sect. ut Bernh. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 666. Sect.: Stramonium, Dutra.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 621: g. Curvembryar.
Synon. Stramonium Tourn.; Stramoneum Rupp.; Brugmansia Pers.

Datura Pers. 1805. Ench. I. p. 216. n. 492: g. Solanacear., disjuncta Brugmansia restrict. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 194.
Hedw. 1806. Gen. p. 103. n. 460: g. Solanear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. xxii. 305. n. 694.
Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3285; 1831. Fl. exc. p. 389: g. Daturear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 472. Sect.: Stramonium, Dutra, Ceratocaulis. — Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 164.

Datura Rchb. 1837. Handb. p. 201: g. Daturear. restrictissimum. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 66.
Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4743. 1: sect. Daturae.
= Dutra Bernh.

Datureae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. xxxix; 1828. Consp. p. 126; 1831 Fl. exc. p. 388: div. Solanacear. Gen.: Ramondia; Hyoscyamus, Scopolina; Lehmannia, Petunia, Nicotiana, Nierembergia; Datura, Brugmansia.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 472: trib. Solanacear. Gen.: Datura, Brugmansia, Solandra, Ulloa. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 663; 1841. Ench. p. 331. Gen.: Datura, Solandra. — Meisn. 1840. Gen. p. 276 (183). Gen. ead. et Triguera?, Cotylanthera? — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 56. 66. Gen. ut Endl. et Ceratocaulos, Brugmansia. — Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148. Gen. ut Endl. et Dictyocalyx. — A. Juss. 1849 in Orb.

Datureae Rchb. cont.
Dict. XI. p. 661. Gen. ut Miers et Brugmansia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 201: sect. Nicotianear. Gen.: Stramonium, Datura, Ceratocaulis, Brugmansia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 121. Gen.: Datura, Solandra.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 164: trib. Atropacear. Gen.: Datura, Ceratocaulis, Brugmansia.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 533: subtrib. Solanear. Gen.: Solandra, Ectozoma, Dictyocalyx, Datura.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 666: trib. Solanear. Gen.: Datura, Hyoscyamus, Nicotiana.

Datylospora „Körb". Flora 1856. p. 299: vid. *Dactylospora.*

Daubentonia*) DC. 1825. Prodr. II. p. 267 (Leg. Mém. VI): nov. g. Galegear. (Piscidia punicea Cav.) — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVII (sph. *Dauventonia*); 1828. Consp. p. 149. n. 3906; 1841. Nom. p. 148. n. 5743. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 242. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (62). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 293. — Endl. 1840. Gen. n. 6554. p. 1275; 1841. Ench. p. 669. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 620. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 493.

Daubenya**) Lindl. 1835. Bot. Regist. XXI. t. 1813: nov. g. Asphodelacear. (Massonia lutea Hort.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 170.
Lindl. 1836. Bot. Regist. XXV. t. 53: g. Liliacear.
Endl. 1837. Gen. n. 1127. p. 145; 1841. Ench. p. 84: g. Hyacinthear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 399 (303). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 300. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 302.
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1782: g. Scillear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 621 Liliaceis et Amaryllideis alienam declarat.

Dauceae Rchb. 1828. Consp. p. 142: sect. Daucinear. Gen.: Daucus, Platyspermum, Orlaya.
C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 363: trib. Umbelliferar. Gen.: Daucus.

Dauceria Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 31: nov. g. plantar. (*Tsieriam Cottam Rheede* V. t. 11 et *Basaal* V. t. 12.) = Embelia Burm.

Dauci Adans. 1763. Fam. II. p. 98: sect. 4 Umbellatar. Gen.: Tordylium, Daucus, Caucalis, Torilis, Coriandrum.

Daucidae Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: trib. Apiacear. Gen.: Artedia, Orlaya, Daucus, Agrocharis, Duriaea.

Daucineae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 76: trib. 2 Umbelliferar. Gen.: Daucus, Platyspermum, Orlaya.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIV: div. Umbelliferar. Gen. ead. et Cuminum.

*) Dicat. L. Joh. Mar. Daubenton, medico Paris.
**) Dicat. Dr. Ch. Daubeny, prof. Oxford.

Daucineae Koch cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 141: subdiv. Umbelliferar. genuinar. armatar. Sect.: Cumineae, Dauceae.
DC. 1830. Pr. IV. p. 208: trib. Orthospermar. Gen.: Artedia, Orlaya, Daucus. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 353. Gen. ead. — Koch 1836. Syn. p. 311. Ed. II. p. 342. Gen.: Orlaya, Daucus. — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (107). Gen. ut DC. — Endl. 1839. Gen. p. 784; 1841. Ench. p. 380. Gen. ead. Accedit 1843 (Spl. III. p. 83) Durieua. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 97. Gen. ead.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 448; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 142: sect. Platyspermar. Gen. ut DC.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 113: trib. Orthospermear. Gen. ut DC. 1830.

Daucocrepis Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phytogr. Canar. II. p. 461: subg. Crepidis. (Barkhausia hieracioides Lowe.)

Daucophyllum „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 642: sect. Musenii. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 427.

Daucosma „Engelm. & Gray in Bost. journ. VI. p. 210." Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 701: nov. g. Seselinear. (D. laciniatum.)

Daucus*) Tourn. 1700. Inst. p. 307. t. 161: g. pl. class. VII.
Linn. 1737. Gen. p. 72. n. 206; 1737. Cliff. p. 89; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 59; 1753. Sp. I. p. 242; 1759. Syst. ed. X. p. 955. n. 296; 1762. Sp. ed. II. p. 348; 1764. Gen. ed. VI. p. 131. n. 333; 1767. Syst. ed. XII. p. 206. n. 330: g. Pentandr. Digyn. — Par Murr. 1774. Syst. p. 228; 1784. Syst. p. 277. — Reich. 1778. Gen. p. 136. n. 364. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 182. n. 466. — Gmel. 1791. Syst. p. 474. — Pers. 1797. Syst. p. 292. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1389. n. 530; 1809. En. p. 304. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 90.
Hall. 1742. En stirp. Helv. II. p. 450: g. Umbelliferar. — Par. Gmel. 1747. Sibir. I. p. 186. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1772. Carn. I. p. 189; 1777. Intr. p. 112. — Juss. 1789. Gen. p. 224. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 30. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 476. — DC. 1805. Franç. IV. p. 327; 1815. V. p. 512. — Hedw. 1806. Gen. p. 194. n. 798. — Poir. 1817. Dict. v. 7. p. 125 (*Carotte*). — Link 1821. En. I. p. 265. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 497. — Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 295. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 91.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 53. n. 207: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 92.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 89. — Lour. 1790. Coch. I. p. 178. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 306. n. 681. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 179.

*) *δαῦκος* Veterum.

Daucus Tourn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 99: g. Daucor.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 79. t. 20. f. 4. (Carota, maritimus, muricatus.)
Neck. 1790. El. I. p. 173. n. 283: g Scadiophytor. Disjungitur Gohoria.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 637; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLI. 473; 1825. Syst. I. p. 897. n. 1064; 1830. Gen. I. p. 224. n. 1165: g. Caucalinar.
Duby 1828. Bot. gall. I. p. 215.
DC. 1830. Pr. IV. p. 209: g. Daucinear. Sect.: Platyspermum, Carota, Anisactis. — Par Rchb. 1832. Fl. exc. p. 448; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 142. n. 5501. Sect. (1841): Platyspermum (serius Platydaucon), Daucus, Anisactis. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 353. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 374. — Koch 1836. Syn. p. 312. Ed. II. p. 343. — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (107). — Kunth 1838. Berol. I. p. 282. — Endl. 1839. Gen. n. 4497. p. 785; 1841. Ench. p. 380. Sect. ut DC. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 586; II. p. 976. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 635. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 113. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 335. Sect. ex DC. — Parlat. . . . . in Webb Canar. II. p. 164. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 664. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 77.
Tausch 1834. Flora I. p. 344: g. Caucalidear.— Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 150.
C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 363: g. Daucear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 382: g. Acanthospermar. Sect.: Platyspermum, Carota.
Orb. 1849. Dict. III. p. 187 (*Carotte*): g. Thapsiear.
Synon. Staphylinus Riv., Rupp.; Daucus et Platyspermum Hoffm.

Daucus Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 278: g. pl. class. XII. (Daucus macedonicus Riv., Apium macedonicum C. B. P.) = Athamanta Koch.

Daucus Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 61: g. Umbelliferar, sejuncto Platyspermo restrictum. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 167: g. Umbellatar. — Par Gaud. 1828. Helv. II. p. 15. 306.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 76: g. Daucinear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 357. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 295.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3670: g. Daucear. Sect.: Daucus, Visnaga.
Link 1829. Hdb. I. p. 343: g. Caucalidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Daucidar. = Carota DC.

Daun-contu Adans. 1763. Fam. II. p. 146: g. Aparinium. (Rumph. V. t. 160.) = . . . ?

Dauthonia Link vid. *Danthonia DC.*

Dauventonia Rchb. vid. *Daubentonia DC.*

Davallia*) Smith 1791. Mem. Ac. Turin. V. p. 414; 1797 in Röm. Arch. I. 2. p. 54; 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 112: nov. g. Filicum (dorsiferar.) — Par. Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 299. — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 6. 86 (annulatar.); 1806. Syn. Filic. p. 130. (gyratar.) — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 47. — Willd. 1809. En. p. 1075; 1810. Sp. V. p. 464. n. 1978. — Leman 1818. Dict. v. 12 p. 555. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 118. n. 3272; 1831. Gen. II. p. 724. n. 3665. (verar.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 314.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 27: g. Cathetogyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 31: g. Gyrator.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 156. Ed. Nees p. 12: g. Polypodiacear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 22. — Kunth 1822. Syn. I. p. 87. — Agdh. 1822. Aphor. p. 117. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 221. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 65. t. 11. — D. Don 1825. Nepal. p. 9. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 228. — Bartl. 1830 Ord. p. 17. (indusiatar.) — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 87. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 5.
Link 1822. En. II. p. 464: g. Polypodear.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 371: g. Davalliear. — Par. J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 416; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 427. — Hook. 1844. Spec. Fil. I. p. 151. Subgen.: Humata, Leucostegia, Prosaptia, Eudavallia, Saccoloma, Odontoloma, Microlepia, Cuneatae, Dareoideae.— Webb 1850. Canar. III. p. 445.
Rchb. 1828. Consp. p. 37. n. 682: g. Davalliacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Endl. 1836. Gen. n. 643. p. 63; 1841. Spl. I. p. 1349; 1841. Ench. p. 37: g Polypodiear. Sect. (1841): Microlepia, Saccoloma, Davallia (Eudavallia), Stenolobus?, Prosaptia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1032. Sect. eaed. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 18.
Meisn. 1843. Gen. p. 434 (335): g. Dicksoniear.
Synon. Humata Cav.; Wibelia Bernh.

Davallia Presl 1836. Pterid. p. 127: g. restrictum Davalliear. Sect: Humata, Pachypleuria, Colposoria, Odontosoria
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 43: g. Davalliacear. — Par. Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 101.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1350. n. 643 c: sect. Davalliae. Subsect. ut Presl. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29 n. 1032. 3. Subsect. eaed. (Davallia loco Colposoriae)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Dicksoniear.
± Eudavallia Endl.

Davallia Fée 1852. Gen. Fil. p. 328: g. Davalliear. restrictissimum, ex typo D. canariensis et affinium. (*Synon. Stenolobus et Davalliae sp. Presl.*)

Davalliaceae Rchb. 1823. Consp. p. 37: subdiv. Polypodiacear. indusiatar. Gen.:

*) Dicat. Edm. Davall, botanico helveto.

Davalliaceae Rchb. cont.
Davallia, Peranema, Saccoloma, Dicksonia, Balantium, Cibotium, Lecanopteris.
Presl 1836. Pterid. p. 123: trib Hymenophorear. Sect.: Davallieae, Lindsaeaceae.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 41: subordo Polypodiacear Gen : Allantodia, Adectum, Davallia, Saccoloma, Stenolobus, Microlepia, Sphaeropteris, Lindsaya, Peranema, Physematium, Thyrsopteris, Cystopteris.
Metten. 1856 Fil. h. Lips. p. 14. 99: trib. Polypodiacear. Gen.: Didymochlaena, Nephrolepis, Davallia, Humata, Microlepia, Odontoloma, Lindsaya; Dicksonia.

Davallieae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 262: subtrib. Hymenophyllacear. Gen.: Davallia.
Presl 1836. Pterid. p. 124: sect. Davalliacear. Gen.: Microlepia, Saccoloma, Davallia, Stenolobus.
J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 416; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 425: sect. Dicksoniear. Gen : Humata, Leucostegia, Microlepia, Deparia, Davallia, Loxsoma.
Hook. 1844. Spec. Fil. I p. 150: tribus tertia Polypodiacear. Gen.: Davallia, Cystopteris.
Fée 1852. Gen. Fil. p 38. 323: trib. Cathetogyratar. Gen.: Prosaptia, Scyphularia, Odontosoria, Microlepia, Davallia, Odontoloma, Stenoloma, Wibelia, Darea, Lindsaynium.

Davallioides Unger 1845. Syn pl. foss. p. 59; 1846 Chlor. protog. p. XXXIX: sect. Sphenopteridis.

Davallites Göppert 1836. Syst. Fil foss. p 231: sect Cheilanthitis.

Davia Spreng. vid. *Davya DC.*

Daviesia*) Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 222; 1808 ibid. IX. p. 255; 1805 in Konig Ann bot. I. p.506: nov g Leguminosar. — Par Hedw. 1806. Gen. p 294 n. 1171. — R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 20. (Verm. bot. Schr. II. p. 472.) — Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 558. — Link 1821. En. I. p. 403. — Spreng. 1825. Syst. II p. 351. n. 1656; 1830. Gen. I p. 367. n. 1853. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1509.
Pers. 1805. Ench. I. p. 454. n. 1007: g. Decandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II 2 p. 745: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 131 — DC. 1825 Pr. II. p. 113. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4060. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 124 — Spach 1834. Vég phan. I. p. 182. — Meisn. 1837. Gen. p 81 (58).
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 31; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 75: g. Pultenaear. — Par Endl. 1840. Gen. n. 6435. p. 1257; 1841. Ench. p. 667. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 47. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553. — Lemr 1849 in Orb. Dict. IV. p. 638. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 455.

Daviesia Smith cont.
Endl. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 198: g. Podalyriear.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n 5929: g. Pultenaeear.

Daviesia Lamarck Illustr. Suppl. 10.
= Borya Labill.

Davilla*) Velloz. 1788 in Vandell. Dicc.; 1796 in Röm. Script. p 115. t. 7. f. 14: nov. g Polyandr. Monogyn.
Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 561: g. Dilleniacear. — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 51. — Kunth 1824. Syn. III p. 120 — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 15. (Char. reform.)
DC. 1818. Syst. I. p. 404: g. Delimacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 70. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (4). — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 16.
DC. 1824. Pr. I. p. 69: g. Delimear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4971; 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7267. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 250. — Endl. 1839. Gen. n. 4763. p. 843; 1841. Ench. p. 432. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 638. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 36.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 606. n. 1962; 1830. Gen. I. p. 441. n. 2183: g. Dilleniear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 267.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 415: g. Deliminear.
Synon. Hieronia Fl. Flum.

Davya**) DC. 1828. Prodr. III. p. 105: nov. g. Lavoisierear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 735. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 212. — Meisn. 1838. Gen. p. 114 (81). — Endl. 1840. Gen. n. 6173. p. 1206; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6684. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 639.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4607: g. Merianiear.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 123. t. 261: g. Melastomacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II p. 1374. 1431.
Bartl. 1830. Ord. p. 329: g. Melastomear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 341. n. 1725 (*Davia*).
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 134: g. Davyear. Sect.: Eudavya, Adelobotrys, Siderophyllum, Sclerosarcus, Adelbertia. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 788.
Synon. Sphanellopsis Steud.

Davya Moç. & Sess. Fl. mexic. ined.
= Sauraujae Willd. pars.

Davyeae Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 113: subtrib. Miconialium. Gen.: Platycentrum, Calyptrella, Graffenrieda, Cycnopodium, Chastenaea, Axinaea, Meriania, Brachycentrum, Notocentrum, Ca-

*) Dicat. Hugoni Davies, bo'an. angl.

*) Dicat. Henr. Cath. Davilla.
**) Dicat. Chemico H. Davy.

Davyeae Naudin cont.
lyptraria, Davya, Centronia, Leiostegia, Sarmentaria.

Dawsonia*) R. Brown 1811. Linn. Trans. X. p. 316 (Verm. bot. Schr. II. p. 691): nov. g. Muscor. (D. polytrichoides.) — Par. Schwägr. 1816. Suppl. I. 2. p. 345; 1824. II. vol. I. 2. p. 175. — Leman 1818. Dict. v. 12. p. 563. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 228. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 181. n. 3323; 1831. Gen. II. p. 732. n. 3717. (frondosor.)
R. Brown 1819. Linn. Trans. XII. 2. p. 567 (Verm. bot. Schr. II. p. 714): g. Polytrichoidear. — Par. Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 323.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 204: g. Hypostomor.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75: g. Dawsoniacear.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 156: g. Entostomor.
Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 666: g. Polytrichoideor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Buxbaumioidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Endl. 1836. Gen. n. 565. p. 54; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 943: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 225: g. Polytrichacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 638; 1849. ibid. VIII. p. 400: g. Polytrichear. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 97.
Synon. Triplocoma La Pyl.; Stylocomium Brid.

Dawsonia Lamx. 1825. Dict. class. V. p. 367.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 182. t. 19: g. Delesseriar.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 359: g. Floridear.
= Phyllophorae Grev. et Cryptopleurae Kütz. sp.

Dawsoniaceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75: sect. Muscear. Gen.: Dawsonia.

Dayena Adans. 1763. Fam. II. p. 398: g. Malvar. *(Syn. Chaetaea Jacq.)*
Scop. 1777. Intr. p. 287: g. Columniferar.
= Ayenia Linn.

Dayenia Mill. Icon. t. 118.
Mönch 1794. Meth. p. 626: g. Petalostemonis.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXVII. 470. n. 1005: g. Malvacear.
= Ayenia Linn.

Dayenia „Monier" Medic. 1787. Malv. p. 122: g. Monadelph. Decandr., sejuncta Ayenia a praecedente diversum. (Ayenia pusilla L.) *Cf.* Medic. 1789. Vorl. IV. 1. p. 192; 1789. Phil. Bot. I. p. 38 et Hedw. 1806. Gen. p. 161.
= Ayeniae Linn. pars.

Dayenia Mich. mss. in Herb. Deless.
= Biebersteinia Steph. (Jaub. & Spach.)

*) Dicat. Dawson Turner, bryologo.

Dazus Juss., Rchb. vid. *Dasus Lour.*

Deastella Steud. Nomencl. I. p. 486: vid. *Diastella Knight.*

Debraea*) Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 4. 34. n. 21: g. Monandr. Monogyn. — Par. Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 77.
= Erisma Rudge.

Debregeasia Gaudich. Voy. Bonite. Bot. t. 90.
Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 382: g. Villebrunear.
Synon. Morocarpus Sieb. & Zucc.; Leucocnides sp. Miq.; Missiessyae sp. Wedd. olim; Urticae et Böhmeriae sp. Auct.

Decachaena**) „Torrey & Gray mss." A. Gray 1844. Lond. journ. bot. III. p. 234 in adnot.: sect. Vaccinii. (V. resinosum.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 758: g. Vacciniacear.

Decachaeta DC. 1836. Prodr. V. p. 133: nov. g. Adenostylear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 266 *(Decachaita).* — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2272. p. 369; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1838. Gen. p. 180 (124). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3837. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37: g. Eupatoriear. verar.

Decachaeta Jaub. & Spach . . . . Ill. pl. or. IV. p. 67: subg. Pulicariae. (P. hydrabadensis Lindl.) *Cf.* Müll. Ann. bot. IV. p. 204.
= Tubilium Cass.

Decachaita Wittst. vid. *Decachaeta DC.*

Decadenia Ehrenb. 1827. Linnaea II. p. 253: subg. Tamaricis.
Rchb. 1828. Consp. p. 166. n. 4413 *b:* sect. Tamaricis. — Par. Ledeb. 1829. Alt. I. p. 423. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 726. — Endl. 1840. Gen. p. 1039. n. 5484 *b.* — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 220.

Decadia***) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 315. Ed. Willd. p. 385: nov. g. Icosandr. Monogyn. (D. aluminosa = Arbor aluminosa Rumph. Amb. t. 100.) *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 3.
DC. 1824. Pr. I. p. 520: g. Elaeocarpear. ? — Par Spreng. 1830. Gen. I. p. 438. n. 2168. — Bartl. 1830. Ord. p. 340. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 561.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 602. n. 1937: g. Polyandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 138. n. 3653b: g: Mimusopear. ?
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4: g. Tiliaceis aff. (1840 ibid. IX. p. 417 Styracear. ?)
= Symplocos L'Herit.

Decadianthe Rchb. 1841. Nomencl. p. 197. n. 7524: g. Boroniear. ? (Nomen pro *Hügelia R. Brown* propositum.)

Decadon G. Don, Dietr. vid. *Decodon Gmel.*

Decagonocarpus Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 16. 97: sect. Trichosanthis. (T. scabra Lour.)

*) Dicat. comiti de Bray. (Nomen Erismatis mutatum ob etymologiam pravam.)
**) δεκα, decem.
***) Nomen ob decadem petalorum.

Decaisnea*) Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 192. t. 39: nov. g. Orchidear., Microtidi R. Br. aff. (D. densiflora.)
Endl. 1837. Gen. p. 217. n. 1587: g. Arethusear. — Par Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2155. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182.
= Prescotia Lindl.

Decaisnea Lindl. 1832 in Wallich Catal. n. 7388.
= Cnemidia Lindl.

Decaisnea Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. or. I. p. 212: nov. g. Lardizabalear. (Slackia insignis Griff.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 140.

Decalepis Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 64: nov. g. Asclepiadear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 162: g. Periplocear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3436. p. 588; 1841. Ench. p. 298. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 538. — Meisn. 1840. Gen. p. 266 (173). — Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5058. (genuinar.) — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212; 1844 in DC. Pr. VIII. p. 495. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.

Decaloba DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 435; 1828. Prodr. III. p. 425: sect. Passiflorae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3472 *c;* 1841. Nom. p. 131. n. 5078. 3. *a.* — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 49. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 263. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 599.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 58: subg. Passiflorae.
= Eudecaloba Endl.

Decaloba Endl. 1839. Gen. n. 5098 *c.* p. 926; 1841. Ench. p. 483: sect. Passiflorae. Subsect.: Eudecaloba, Granadilla, Tacsonioides, Polyanthea.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 131. 152: g. Passiflorear. (restrict.) Sect.: Eudecaloba, Polyanthea.

Decalophium Turczan. 1847. Bull. soc. Mosc. XX. p. 153 (Bot. Zeit. 1848. p. 346): nov. g. Chamaelauciear. *Cf.* Flora 1848. I. p. 316. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 306.

Decamerium Nuttall 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 259: nov. g. Vacciniear. (V. frondosum W.)

Decandolia „Bast." Mathieu 1853. Fl. Belg. I. p. 594: sect. Agrostidis.
= Vilfa Adans.

Decandria Linn. Syst., Gen. et Spec., sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. X. plantar. Ordines: Mono-, Di-, Tri-, Penta-, Decagynia.

Decandria Liljebl. . . . . class. VII. plantar.
= Class. VII—X. Linn.

Decanema Decaisne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. X. p. 338; 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: nov. g. Asclepiadear. (Asclepias aphylla Bojer mss.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)

Decanema Decaisne cont.
Meisn. 1840. Gen. p. 267 (174): g. Ditassear. — Par Endl. 1841. Spl. I. n. 3456. p. 1397; 1841. Ench. p. 298. — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 5011. (genuinar.) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 641.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 546: g. Eustegiar.

Decaneurum DC. 1833 in Guillem. Arch. bot. II. p. 516; 1834 in Wight Contr. p. 3; 1836. Prodr. V. p. 66: nov. g. Heterocomear. Sect.: Phyllocephalum, Gymnanthemum. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2205. p. 358; 1841. Ench. p. 232. Sect. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 176 (123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 641. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 146.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. (verar.) — Par. Miq. 1856. Ind. bot. II. p. 20. Sect.: Phyllocephalium, Gymnanthemum.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3869: g. Pacourinear. Sect.: Decaneurum, Gymnanthemum.

Decaneurum Schultz Bip. 1844. Tanac. p. 35: sect. Tanaceti. (Pyrethrum serotinum et uliginosum Auct.) — Simil. Fenzl 1853. Beitr. z. Leucanth. u. Pyrethr. p. 14. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 253.

Decanthera Walp. 1842. Repert. I. p. 546: sect. Caseariae. (Decantherae DC.)

Decaptera Turczan. 1846. Bull. soc. Mosc. XIX. 2. p. 497: nov. g. Cremolobear. *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 354 et Flora 1848. p. 299. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 36. n. 4893/2.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 45: g. Lepidinear.

Decaraphe A. Juss. vid. *seq.*

Decarhaphe Miquel 1840. Comment. II. p. 84. t. 10: nov. g. ex typo Melastomatis pleurocarpi E. Mey.
Endl. 1840. Gen. n. 6257. p. 1220; 1841. Ench. p. 647: g. Miconiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6766. — Meisn. 1843. Comm. p. 255. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 731. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 643. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 75 *(Decaraphe)*.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 266 *(Decarrhaphe)*: g. Lythrariar.

Decaria DC. 1828. Prodr. III. p. 333: sect. Murucuiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3470 *b.* — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 56. — Endl. 1839. Gen. n. 5099 *b.* p. 927; 1841. Ench. p. 483.

Decarrhaphe Wittst. vid. *Decarhaphe Miq.*

Decaschista Rchb. vid. *seq.*

Decaschistia*) Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 52: nov. g. Malvacear. (Hibiscus crotonifolius Wall.)
Meisn. 1837. Gen. p. 27 (23): g. Hibiscear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5285. p. 984; 1841. Ench. p. 512. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 643.
Rchb. 1837. Hdb. p. 288; 1841. Nom. p. 200. n. 7651 *(Decaschista)*: g. Thespesiear.

*) Dicat. J. Decaisne, botanico.

*) σχιστός, separatus, fissus.

Decaspermum Forst. 1776. Char. gen. p. 73. t. 37: nov. g. Icosandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 6.
= Nelitris Gärtn.

Decaspora R. Brown 1810. Prodr. I. p. 548. Ed. Nees p. 404: nov. g. Epacridear. (Cyathodes disticha Labill.) — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 6. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLII. 484. n. 776. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 139. n. 692. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 637.
Rchb. 1828. Consp. p. 127. n. 3332: g. Stypheliacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 158: g. Styphelicar. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 781. — Endl. 1839. Gen. n. 4277. p. 748; 1841. Ench. p. 368. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 758. — Meisn. 1839. Gen. p. 248 (156). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 433. — Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4794. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 643.

Decastemon Planchon . . . . Fl. d. serr. VI. p. 225: sect. Dombeyae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 327.

Decastemones Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 57: vid. *Plantae All.*

Decemium Rafin. 1817. Flor. Ludov. p. 33. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 49: g. Hydrophyllear.
= Hydrophyllum Tourn.

Dechampsia Kunth vid. *Deschampsia Palis.*

Dechenia Göppert 1841. Gatt. foss. Pfl. p. 43.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 138; 1846. Chlor. prot. p. LIX: g. Lepidodendrear.

Deckera Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 478; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. III. p. 302: nov. g. Helminthiear. (Picris asplenioides L.)
C. A. Meyer 1837. Ind. quart. sem. h. Petrop. n. 700.
= Virea Vahl.

Deckeria Karsten 1856. Linnaea XXVIII. p. 258: nov. g. Palmar. (Iriartea phaeocarpa Orb.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 839.

Declieuxia HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 352: nov. g. Coffeacear. (Houstonia fruticosa W.) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 21. — Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2013. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 193. — Eckl. & Zeyh. 1837. En pl. Afr. III. p. 363. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 376: g. Rubiacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 386. n. 385; 1830. Gen. I. p. 89. n. 440. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 452.
Schult. 1827. Mant. III. p. 6. 111: g. Tetrandr. Monogyn. (Spec. ex Mart. & Zucc. mss.)
Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 4: g. Psychotriacear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118).
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2819.
DC. 1830. Pr. IV. p. 479: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 566. — Endl. 1838. Gen. n. 3169. p. 536; 1841. Ench. p. 272.

Declieuxia HBK. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Synon. Psyllocarpus Pohl.

Decodon Gmel. 1791. Syst. p. 677: nov. g. Decandr. Monogyn. (D. aquaticus Walt. Fl. carol. p. 137.)
Elliott 1821. Sketch I. p. 543: g. Icosandr. Monogyn.
DC. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 75; 1828. Pr. III. p. 90: g. Salicariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4566; 1841. Nom. p. 172. n. 6643. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. IV. p. 707. 721 *(Decadon).* — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 419.
Meisn. 1838. Gen. p. 118 (84): sect. Nesaeae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6147 *a.* p. 1200; 1841. Ench. p. 643.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 482: g. Lythracear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 15 *(Decadon):* g. Salicariar.
Synon. Anonymos Walt. n. 176; Lythri sp. Linn.; Nesaeae sp. HBK.

Decodontia Haworth mss. olim teste Ipso 1812. Syn. p. 28.
= Huernia R. Brown.

Decorticalia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 64: subclass. II. Staminaciae. Stirpes: Bitegmia, Unitegmia, Insolitegmia.

Decostea*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 130: nov. g. Dioec. Pentandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 616. n. 2220. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 9.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 346: g. Juglandeis aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3834: g. Juglandear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 397. — Meisn. 1837. Gen. p. 74 (54).
A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 16: g. Corneis aff. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4576. p. 799; 1841. Ench. p. 397.
Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5565: g. Cornear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 783: g. Cornacear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 18. g. Aucubear.
Griseb. 1856. Abh. Gött. Ges. VI. p. 107. 122: g. Ilicinear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 432.

Decumaria Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1663; 1764. Gen. ed. VI. p. 238. n. 597; 1767. Syst. ed. XII. p. 326: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 369; 1784. Syst. p. 443. — Reich. 1778. Gen. p. 244. n. 652. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 319. n. 815. — Gmel. 1791. Syst. p. 749. — Pers. 1797. Syst. p. 475; 1807. Ench. II. p. 4. n. 1167. — Willd. 1799. Sp. II. p. 850. n. 940. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 460. n. 1777.
Gled. 1764. Syst. p. 118. n. 487: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 107.
Scop. 1777. Intr. p. 104: g. Strictar.
Juss. 1789. Gen. p. 324: g. Myrtor.
Neck. 1790. El. II. p. 143. n. 834: g. Coryphophytor.

---

*) Dicat. Dr. De la Costa Serradell.

Decumaria Linn. cont.
Bosc 1792. Act. soc. h. n. Par. I. p. 76.
Batsch 1802. Tab. p. 13: g. Myrtoidear.
Cram. 1803. Disp. p. 136: in Polyandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 164: g. Myrtear. — Par. Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 80.
Willd. 1809. En. p. 516: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 300.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 10: g. Myrtacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 31.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Melastomear.
DC. 1828. Pr. III. p. 206: g. Philadelphear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4220; 1841. Nom. p. 158. n. 6162. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 408. n. 2041. — Bartl. 1830. Ord. p. 319. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 808. — Meisn. 1838. Gen. p. 109 (78). — Endl. 1840. Gen. n. 6106. p. 1187; 1841. Ench. p. 636. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 37. 86. — Brongn. 1843. En. genr. p. 107.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 19: g. Hydrangear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 592.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 753: g. Philadelphacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 645.
Synon. Forsythia Walt.

Decursaria Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 33. n. 122/$_7$ *g:* sect. Sargassi.
= Pterocaulon Kütz.

Dedalea Corda, Math. vid. *Daedalea Pers.*

Deeringia*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 413. Ed. Nees p. 269: nov. g. Amaranthacear. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 11. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLIV. 534. n. 1035. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 541. — Mart. . . . . Beitr. Amarant. p. 78; 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 286. — Bartl. 1830. Ord. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 249.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 314; 1825. Syst. I. p. 816. n. 923; 1830. Gen. I. p. 198. n. 1007: g. Amarantear.
Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 511; ed. 1832. I. p. 682: g. Pentandr. Monogyn.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Amaranthear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 864.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4371: g. Gomphrenear.
Endl. 1837. Gen. n. 1978. p. 304; 1841. Ench. p. 185: g. Celosiear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 319 (232). — Rchb. 1841. Nom. p. 166. n. 6438. — Brongn. 1843. En. genr. p. 103. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 236. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 646. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1025.
Synon. Coilosperma et Deeringia Rafin.

Deeringia Rafin. 1836. Fl. Tell. p. 43. n. 565.
= Deeringiae R. Brown pars.

*) Dicat. in memoriam Car. Deeringii, auctoris florae Nottinghamensis.

Defforgia Lamarck Illustr. t. 125. (Poir. Encycl. suppl.) *Cf.* Steud. Nom. I. p. 493 *(Desforgia).*
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. VII. 75. n. 875: g. Campanulacear.
= Forgesia Comm.

Defloratae Scopoli 1777. Introd. p. 333: trib. 31 plantar. Gentes: *1. Fructu dehiscente.* Gen.: Xylophylla, Pharnaceum, Illecebrum, Suaeda, Aruna, Rotala, Queria, Mollugo, Ortegia, Hudsonia, Tonina, Balanophora, Pennantia, Mabea, Rocama, Amanoa, Galenia, Dodonaea, Mölleria, Aniba. — *2. Fructu minime dehiscente.* Gen.: Herniaria, Scleranthus, Petiveria, Calligonum, Camphorosma, Ulmus, Parietaria, Urtica, Axyris. — *3. Semine intra calycem siccum.* Gen.: Spinacia, Cannabis, Atriplex, Chenopodium, Beta, Salicornia, Corispermum. — *4. Semine intra calycem baccatum.* Gen.: Blitum, Basella, Acnida, Morus. — *5. Seminibus involucro carneo involutis aut insidentibus.* Gen.: Ficus, Perebea, Elatostema, Dorstenia. — *6. Fructu drupaceo aut baccato.* Gen.: Virola, Celtis, Pistacia, Trophis, Salvadora, Bosea, Rivina, Phytolacca.

Deguelia*) Aublet 1775. Guian. II. p. 750. t. 300: nov. g. Diadelph. Decandr. (D. scandens.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1085. — Pers. 1807. Ench. II. p. 277. n. 1671.
Scop. 1777. Intr. p. 303: g. Leguminosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 363. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 242. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 32. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 194. n. 2514; 1831. Gen. II. p. 574. n. 2805.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Dalbergiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 422. — Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4022; 1841. Nom. p. 154. n. 6026. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 379. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 157. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (67). — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 92. — Endl. 1841. Gen. n. 6733. p. 1307; 1841. Ench. p. 673. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 655.
Synon. Cylizoma Neck.

Dehaasia**) Blume 1835. Rumphia I. p. 161. t. 44—47: nov. g. Laurinear. (Cryptocarya cuneata Bl.)
Nees 1836. Laurin. p. 354: g. Oreodaphnear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 326 (238).
Endl. 1837. Gen. n. 2032. p. 317; 1841. Ench. p. 197: g. Persear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 71. n. 2683. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 655.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.
Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 21. p. 333: g. Cryptocaryear.
Synon. Haasia Nees.

Deidamia***) „Nor. mss." Petit-Thouars 1807. Vég. il. Afr. IV. p. 61: nov. g. Passiflorar.

*) Nomen caribaeum *Undequélé.*
**) Dicat. Cornelio de Haas.
***) Nomen mythologicum.

Deidamia Nor. cont.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 33: g. Capparidear.
Juss. 1825. Dict. v. 38. p. 50: g. Passiflorear.— Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 44. n. 2359; 1831. Gen. II. p. 533. n. 2616. (Monadelph. Pentandr.) — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XII. — DC. 1828. Pr. III. p. 337. (verar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 271. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 59. — Meisn. 1838. Gen. p. 124 (90). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 283. — Endl. 1839. Gen. n. 5097. p. 926; 1841. Ench. p. 483. (verar.) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 655. — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 47.
Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3465: g. Granadillear.
Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5077: g. Deidamiear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 130. 138.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 334: g. Passifloracear.

Deidamieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 131: subsect. Passiflorear. genuinar. Gen.: Thompsonia, Deidamia.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 130. 138: subtrib. Passiflorear. Gen. ead.

Deilosma*) „Andrz. mss.“ DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 238; 1821. Syst. II. p. 448; 1824. Prodr. I. p. 188: sect. Hesperidis. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1166; 1828. Consp. p. 185. n. 4806 *b*; 1832. Fl. exc. p. 685. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 114. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 202. — Endl. 1839. Gen. n. 4903 *b*. p. 874; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 171.
Bess. 1822. En. pl. Volhyn. p. 83.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 182. n. 7017: g. Hesperinar. Sect.: Arabidium, Deilosma.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 397: g. Siliquosar.

Deinböllia Endl. 1841. Gen. Spl. I. n. 5638/₁. p. 1424; 1841. Ench. p. 562: g. dubium Sapindacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 199. n. 7611. — Walp. 1846. Rep. V. p. 371. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 657.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 261: g. Terebinthacear.
= Deinbollia Schum.

Deinbollia Schumach. 1827 in Danske Selsk. Afh. IV. p. 16: nov. g. plantar.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 434. n. 2153: g. Polyandr. Monogyn.
Meisn. 1837. Gen. p. 78 (56. 349): g. Connaracear.? et 1843. Comm. p. 346 Sapindacear.?
Vid. Deinböllia Endl.

Deinospermum**) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 323: sect. Lithospermi.
= Aegonychon Gray.

Dejanira Chamisso & Schltd. 1826. Linnaea I. p. 195: nov. g. Gentianear. — Par. Griseb. 1836. Obs. Gentian. p. 35.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211: g. Erythraeariar.

*) δείλη, tempus post meridiem.
**) δεινός, asper.

Dejanira Chamisso cont.
Griseb. 1839. Gen. Gent. p. 114; 1845 in DC. Pr. IX. p. 48: g. Chironiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (168). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 4.
Synon. Callopisma Mart.

Dekinia*) Martens & Gal. 1844. Bull. Ac. Brux. XI. 2. p. 195: nov. g. Labiatar. *Cf.* Flora 1846. I. p. 813.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 682: g. Lamiear.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 258: g. Satureiear. anomalar.

Dela Adans. 1763. Fam. II. p. 499: g. Cicutar. (Athamanta Libanotis L.)
= Eulibanotis DC.

Delabechea Mitchell 1848. Trop. Austr. p. 154 adnot.: nov. g. Sterculiacear. (D. rupestris.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 160: g. Sterculiear.
= Brachychiton R. Brown?

Delairea**) Lemaire 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 379: nov. g. Eusenecionear. (D. odorata.) *Cf.* Bernh. in Thüring. Gartenz. 1845. Nr. I.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713: g. Senecionear.
= Senecio Less.

Delaria Desvaux 1826. Ann. sc. nat. IX. p. 406: nov. g. Sophorear. (Cassia simplicifolia Desv.) *Cf.* Linnaea II. p. 510, Isis 1834. p. 910 et Meisn. 1837. Comm. p. 67. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4082. — Bartl. 1830. Ord. p. 408. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 152. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 450: g. Cassiear.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 65: g. Eupodalyriear.?
= Dalhousiea Wall.?

Delastrea***) A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 195: nov. g. Sapotacear. (Mimusopis sp. dubia Bojer mss.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 591.
= Labramia DC.

Delastreia Zobel vid. *seq.*

Delastria L. R. & Ch. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 379: nov. g. (Fungor. ascosporor.) Lycoperdaceor. (D. rosea.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 438: g. Tubereor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tuberaceor. — Par. Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 55. 67 (*Delastreia* — genuinor.) — Bail 1858. Syst. p. 49.

Deleptium Rchb. vid. *Dileptium Rafin.*

Delesseria†) Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 122: nov. g. Floridear. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 35. — Par. Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XIV. 21; 1822. Sp. Alg. I. 2. p. 170 (Aphor. p. 100); 1824. Syst. p. XXXV. 248. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 362. — Fries 1825. Pl. homon. p. 331. — Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 359. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 398; 1841.

*) Dicat. Dekin.
**) Dicat. dom. Delaire.
***) Dicat. Delastre.
†) Dicat. baroni Benj. Delessert.

Delesseria Lamx. cont.
Brit. Alg. p. 54. — Menegh. 1838. Cenni p. 37. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 150. — Math. 1853. Belg. II. p. 479. — Aresch. 1855. Nov. Act. Upsal. ser. tert. I. p. 347.
Leman 1816. Dict. v. 1. spl. p. 117: g. Ulvacear.
Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 289: sect. Fuci.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 7: g. Phycoidator.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 193: g. Fucoidear.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 185. t. 18: g. Delesseriar. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25.
Grev. 1830. Alg. brit. p. 71. (Syn. p. XLVII.)
Endl. 1836. Gen. n. 100. p. 9; 1841. Ench. p. 6: g. Floridar. (latius circumscriptum).
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 747: g. Plocamiear.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 157: g. Delesseriear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 53. n. 122/87. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 194. — Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 658; X. p. 55. — Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 93. Subgen.: Phycodrys, Pteridium, Hypoglossum, Caloglossa.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 361 (Flora 1843. p. 99): g. Gasterocarpear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 126: g. Sphaerococcear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 290.
Sond. 1852. Linnaea XXV. p. 690: g. Sphaerococcoidear. — Par. Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 238.
Synon. Hydrolapatha et Membranoptera Stackh.; Wormskioldia Spreng.

Delesseria Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phycol. gener. p. 445; 1845. Phycol. germ. p. 334; 1849. Spec. Alg. p. 878. n. 580: g. restrict. Delesseriear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. p. 173.

Delesseriaceae Nägeli 1847. Neuere Alg. Syst. p. . . . : ordo Floridear. Tribus: Nitophylleae, Delesserieae, Rhodomeleae.

Delesseriae Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 181: fam. Florideor. Gen.: Dawsonia, Delesseria.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: subordo Ceramiacear. Gen. Delesseriear. Endl.

Delesserieae J. Agardh 1841. Linnaea XV. p. 8; 1842. Alg. medit. p. 68. 155: trib. Floridear. Gen.: Plocamium, Thamnophora, Nitophyllum, Hymenena, Solieria, Delesseria. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 52. Gen. ead. (Aglaophyllum loco Nitophylli) et Acropeltis, Hydropuntia? — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 659; X. p. 55. Gen.: Plocamium, Thamnophora, Thamnocarpus, Aglaophyllum, Delesseria, Solieria, Acropeltis, Arachnophyllum, Schimmelmannia, Botryoglossum, Pollexfenia.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phyc. gener. p. 442; 1845. Phyc. germ. p. 332: fam. Platynoblastear. Gen.: Aeglophyllum, Schizoglossum, Inochorion, Cryptopleura, Phycodrys, Hypoglossum, Delesseria. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 867.

Delesserieae J. Agardh cont.
Gen.: Aglaophyllum, Schizoglossum, Cryptopleura, Hymenena, Inochorion, Stenogramma, Stictophyllum, Phycodrys, Pollexfenia, Hypoglossum, Rhizophyllis, Delesseria, Epiglossum, Polyphacum, Cladymenia, Heterocladia, Sarcomenia, Botryocarpa, Neuroglossum, Botryoglossum.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : trib. Delesseriacear. Gen.: Delesseria, Odonthalia, Sphaerococcus (Grev.), Acanthophora, Bonnemaisonia, Gelidium, etc.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 171: sect. Sphaerococcear. Gen.: Plocamium, Aglaophyllum, Delesseria, Hypoglossum, Rhizophyllis, Phycodrys.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 90: trib. Sphaerococcoidear. Gen.: Grinnellia, Delesseria, Botryoglossum, Hymenena, Nitophyllum.

Delesserites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 33; 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 59: g. foss. Fucoidar.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 32: g. Floridoitum.
Unger 1843 in Endl. Spl. III. p. 56. n. 122/106: g. foss. Algar.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 14; 1846. Chlor. prot. p. XXVIII: g. Floridear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Phycear. foss.

Delila Dumort. 1827. Fl. Belg. p. 110.
= Spergularia Pers.

Delileocrepis Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 457: sect. Wibeliae. (Barkhausia juvenalis Delile.)

Delilia*) Spreng. 1826. Syst. III. p. 367. 674. n. 2917: nov. g. Syngenes. (Desciscent.), serius (Gen. II. p. 641) ad Milleriam reductum.
Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2727; 1841. Nom. p. 79. n. 2998: g. Milleriear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 214. (?)
= Elvira Cass.

Delima Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 130: nov. g. plantar.
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 92. n. 205 (Nov. gen. zeyl. p. 10. n. 1058); 1759. Syst. ed. X. p. 1076. n. 590; 1762. Sp. ed. II. p. 736; 1764. Gen. ed. VI. p. 271. n. 672; 1767. Syst. ed. XII. p. 364: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 411; 1784. Syst. p. 494. — Reich. 1778. Gen. p. 272. n. 721. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 359. n. 905. — Gmel. 1791. Syst. p. 819. — Pers. 1797. Syst. p. 530.
Gled. 1764. Syst. p. 123. n. 508: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 267: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 339: g. Prockiar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 6.
Neck. 1790. El. II. p. 271. n. 1029: g. Catizophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 112. t. 106.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 190: g. Rosacear.
DC. 1818. Syst. I. p. 406: g. Delimacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 71. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (4).

*) Dicat. A. Raffeneau-Delile.

Delima Linn. cont.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 39: g. Dilleniacear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 258.
DC. 1824. Pr. I. p. 69: g. Delimear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4974; 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7265. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 250. — Endl. 1839. Gen. n. 4764. p. 843; 1841. Ench. p. 432. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 659. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 61. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 36.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 597. n. 1920; 1830. Gen. I. p. 432. n. 2143: g. Dilleniear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 412: g. Deliminear.
Synon. Korosvel Adans.; Trachytella DC. (Müll.); Leontoglossum Hance.

Delimaceae DC. 1818. Syst. I. p. 397: trib. Dilleniacear. Gen.: Tetracera, Davilla, Doliocarpus, Delima, Curatella, Trachytella, Recchia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 68. Gen. ead. et Empedoclea. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (4). Gen. ut Don et Pinzonia.

Delimeae DC. 1824. Prodr. I. p. 67: trib. Dilleniacear. Gen. Delimacear. 1818. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 842; 1841. Ench. p. 432. Gen. ead. et Pinzona, Empedoclea. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 412. Sect.: Delimineae, Recchieae, Doliocarpeae. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424. Gen. ut Endl.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI: subdiv. Dilleniacear. Gen. ut DC. excepta Recchia.
Rchb. 1828. Consp. p. 193: subdiv. Dilleniear. Gen. ut DC. et Empedoclea, Burtonia, Othlis?, Dasynema. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. Sect.: *genuinae* (gen.: Delima, Tetracera, Davilla, Curatella), Recchieae, Doliocarpeae.
Bartl. 1830. Ord. p. 250: div. Dilleniacear. Gen.: Tetracera, Davilla, Doliocarpus, Delima, Curatella, Burtonia.

Delimineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 412: sect. Delimear. Gen.: Delima, Tetracera, Davilla, Pinzona, Curatella, Reifferscheidia.

Delisea*) Lamx. 1819. Dict. v. 13. p. 41; 1824. Dict. class. V. p. 389. (Turp. Atl. I. t. 42. f. 4.): nov. g. Algar.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 359: g. Floridear.
Mont. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 155; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 660: g. Chondriear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 107: g. Deliseinear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Lomentariear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 770. n. 515: g. Gelidiear.
Rupr. 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. Bot. p. 35: g. Rhodophycear.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 233. *(Delisia)*: g. Laurenciacear.
Synon. Calocladia Grev.; Bowiesia Grev.

*) Dicat. D. F. Delise, Lichenologo.

Delisea Fée 1824. Crypt. écorc. p. 151: nov. g. Lichenum.
Rchb. 1841. Nom. p. 17. n. 567. 2: sect. Stictae.

Deliseineae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 107: subtrib. Rhodomelear. Gen.: Delisea, Chondrodon.

Delisella Bory 1823. Dict. class. III. p. 340: g. Algar., a Sphacelaria disjunctum. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 50. p. 142.
= Sphacelariae Lyngb. pars.

Delisia Harv. vid. *Delisea Lamx.*

Delissea*) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 457. t. 76—78: nov. g. Lobeliacear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 699.
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2786: g. Goodenoviear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 148.
Cham. 1833. Linnaea VIII. p. 219: sect. Lobeliae.
Presl 1836. Prodr. Lobel. p. 47: g. Delisseacear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3064. p. 512; 1841. Ench. p. 264. — Meisn. 1839. Gen. p. 241 (148). — A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 342.
Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 102. n. 3999: g. Delisseear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 661.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572: g. Delissear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693.

Delisseaceae Presl 1836. Prodr. mon. Lobel. p. 46: trib. Lobeliacear. Gen.: Trimeris, Pratia, Macrochilus, Delissea, Cyanea, Rollandia, Clermontia, Centropogon. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 512. Gen. ead. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1392 et Ench. p. 264, ubi Kittelia loco Cyaneae) Piddingtonia, Rhyncbopetalum. (Excluditur Trimeris.) — A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 340. Gen.: Pratia, Piddingtonia, Macrochilus, Clermontia, Delissea, Cyanea, Rollandia, Centropogon. — Meisn. 1839. Gen. p. 241 (148). Gen.: Trimeris, Bernonia, Pratia, Macrochilus, Kittelia, Delissea, Clermontia, Rollandia, Centropogon. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 416. Gen. ut A. DC.

Delisseae Spach 1840. Hist. vég. phan. IX. p. 572: trib. Lobeliacear. Gen. Delisseacear. Presl et Bernonia. — Par. Lindl. 1847. Vég. kd. p. 693. Gen. Delisseacear. Endl.

Delisseeae Rchb. 1837. Handb. p. 186: subdiv. Lobeliariar. Gen.: Trimeris, Pratia, Macrochilus, Delissea, Kittelia, Rollandia, Clermontia, Centropogon. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 102. Gen. Delisseacear. A. DC. (Kittelia loco Cyaneae).

Delivaria Miquel vid. *Dilivaria Juss.*

Deloderium Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 422. 430; 1830. v. 60. p. 568: nov. g. Crepidear. verar. (Apargia hyoseroides Sieb).
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2152: g. Andryalear.
Bartl. 1830. Ord. p. 146: g. Lactucear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 109: sect. Millinae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3689. 2.
= Barkhausia Mönch. (Endl).

*) Dicat. Delisse, pharmac. in Isle de France.

Delostoma*) D. Don 1823. Edinb. n. phil. journ. IX. p. 263: nov. g. Bignoniacear. (Bignonia rosea et simplicifolia Pav.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 186. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3272; 1841. Nom. p. 117. n. 4563: g. Bignoniear. (genuinar.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 228. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 566.
DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 122; 1845. Pr. IX. p. 197: g. Eubignoniear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4122. p. 713; 1841. Ench. p. 346. — Meisn. 1840. Gen. p. 300 (208). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 661.

Delostylis Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 102: nov. g. ex typo Trillii stylosi Nutt. = Trillii Linn. pars.

Delphinastrum DC. 1818. Syst. I. p. 351; 1824. Prodr. I. p. 53: sect. Delphinii. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 25. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 457. — C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 289. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 52. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 736; 1841. Nom. p. 191. n. 7243. 3. — Koch 1836. Syn. p. 22. Ed. II. p. 24. — Endl. 1839. Gen. n. 4796 *c.* p. 849; 1841. Ench. p. 435. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 60.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 336: g. Aconitinear. Sect.: Alepidospermum, Lepidospermum.

Delphinellum DC. 1818. Syst. I. p. 346; 1824. Prodr. I. p. 52: sect. Delphinii. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 24. — Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4949 *b;* 1841. Nom. p. 191. n. 7243. 2. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 51. — Endl. 1839. Gen. n. 4796 *b.* p. 849; 1841. Ench. p. 435. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 59. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 321.
Synon. Phledinium Spach.

Delphinieae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LX; 1837. Handb. p. 277; 1841. Nomencl. p. 191: subdiv. Helleborear. Gen.: Delphinium, Aconitum et 1841 Aconitella.

Delphininae Rchb. 1832. Fl. exc. p. 735: sect. Helleborear. Gen.: Delphinium, Aconitum.

Delphinium**) Tourn. 1700. Inst. p. 426. t. 241: g. pl. class. XI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 276. Ed. Hall. 1745. p. 290: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 159. n. 449; 1737. Cliff. p. 212; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 150; 1753. Sp. I. p. 530; 1759. Syst. ed. X. p. 1080. n. 602; 1762. Sp. ed. II. p. 748; 1764. Gen. ed. VI. p. 274. n. 681; 1767. Syst. ed. XII. p. 370: g. Polyandr. Trigyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 379. — Murr. 1774. Syst. p. 418; 1784. Syst. p. 503. — Reich. 1778. Gen. p. 278. n. 736. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 367. n. 927. — Gmel. 1791. Syst. p. 837. — Pers. 1797. Syst. p. 539; 1807. Ench. II. p. 82. n. 1327. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1226. n. 1061; 1809. En. p. 573. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 14. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 419. 455. Sect.: Consolida, Delphinastrum.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 314: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 120. n. 493: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 308.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Multisiliquar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 131. — Gis. 1792. Prael. p. 376. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 338.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Ranunculor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 457.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 186: g. Polyantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 345: g. Pentapetalar. incompletar.
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 483: g. Ranunculear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 491. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 735 (descisc.); 1825. Syst. II. p. 616. n. 1985; 1830. Gen. I. p. 447. n. 2211.
Scop. 1777. Intr. p. 260: g. Polycarpiar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 310. t. 65. f. 3 (elatum).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 214. 241; 1789. Phil. Bot. I. p. 62.
Juss. 1789. Gen. p. 234: g. Ranunculacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 62. — DC. 1805. Franç. IV. p. 913; 1815. V. p. 641. — Lois. 1818. Dict. v. 12. p. 538 *(Dauphinule).* — D. Don 1825. Nepal. p. 195. — C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 288. Sect.: Delphinastra. — Webb 1836. Canar. I. p. 4. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 276.
Neck. 1790. El. II. p. 291. n. 1057: g. Synathrophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 47: g. Multisiliquosar.
Cram. 1803. Disp. p. 120 in Dodecandr. Trigyn.
DC. 1818. Syst. I. p. 340; 1824. Pr. I. p. 51: g. Helleborear. Sect.: Consolida, Delphinellum, Delphinastrum, Staphysagria. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 24. Sect. eaed. excepta prima. — Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4949. Sect.: Calcatrippa, Delphinellum, Staphisagria. — Bartl. 1830. Ord. p. 254. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 50. Sect. ut DC. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Koch 1836. Syn. p. 22. Ed. II. p. 24. Sect. eaed. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4). — Kunth 1838. Berol. I. p. 26. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 30. — Endl. 1839. Gen. n. 4796. p. 849; 1841. Ench. p. 435. Sect. ut DC. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 58. Sect. eaed. excepta quarta. — Brongn. 1843. En. genr. p. 97. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 318. Sect.: Consolida, Delphinellum. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 45. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl.

*) δῆλος, manifestus.
**) Nomen a forma floris nondum explicati, qui delphinum, qualis a pictoribus pingi solet, quodammodo referat. (T.)

Delphinium Tourn. cont.
Ind. I. p. 47. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 23.
Link 1822. En. II. p. 79: g. Magnoliaceis aff.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX; 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7243: g. Delphiniear. Sect. fere ut DC.
Link 1831. Hdb. II. p. 382: g. Aconitear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 735: g. Delphininar. Sect. ut DC. excepta secunda.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 4: g. Ranunculinear.

Delphinium Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 355: g. restrict. Aconitinear. (D. Consolida, Ajacis.)
= Consolida DC.

Deltocarpus L'Herit. mss.
= Myagrum Tourn.

Delucia*) DC. 1836. Prodr. V. p. 633: nov. g. Verbesinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2567. p. 417; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 199 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3173. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Dematia Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 12: cohors Fungor. Gen.: Dematium, Trentepohlia, Rhizomorpha, Hypochnus, Ozonium, Erineum, Cronartium, Taphria, Rubigo, Helicomyces.

Dematiacei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 498: ordo Coniomycetum. Gen. §. 1: Dematium, Cladosporium, Passalora. §. 2: Helicosporium, Helminthosporium, Macrosporium, Oedemium, Coelosporium, Rhinotrichum, Zygosporium, Sphinctrosporium, Arthrinium. §. 3. *Myxothricei.*

Dematiei Fries 1832. Syst. mycol. III. 2. p. 335: ordo Hyphomycetum. Gen.: Sporocybe, Oedemium, Myxotrichum, Actinocladium, Helicosporium, Helminthosporium, Dematium, Polythrincium, Cladosporium, Macrosporium, Arthrinium, Gliotrichum.
Endl. 1836. Gen. p. 20; 1841. Ench. p. 14: subordo Hyphomycetum. Gen. ut Fries.
Rchb. 1841. Nom. p. 5: sect. Mucorinor. Gen.: Gliotrichum, Camptoum, Scolecotrichum, Gonosporium, Arthrinium, Sporophloeum, Macrosporium, Dematium, Ospriosporium, Coccosporium, Actinocladium, Gonytrichum, Memnonium, Melanotrichum, Myxotrichum; Mystrosporium, Septosporium, Macroon, Mydonosporium, Balanium, Gongylocladium, Spondylocladium, Oedemium, Helminthosporium, Cladosporium, Azosma, Mydonotrichum, Polythrincium, Trichaegum, Coccosporium, Helicoma, Helicosporium, Triposporium, Amphitrichum, Cephalotrichum, Brachycladium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: subordo Hyphomycetum. Gen.: Stachybotrys, Cephalotrichum, Rhopalomyces, Sporocybe, Oedemium, Myxotrichum, Gonatotrichum, Helminthosporium, Exosporium, Blastotrichum, Leptotrichum, Mystrosporium, Stemphylium, Septosporium, Trichaegum, Amphitrichum, Triposporium, Helicoma, Helicosporium, Cladotrichum, Dematium,

Dematiei Fries cont.
Polythrincium, Cladosporium, Helicotrichum, Macrosporium, Arthrinium, Goniosporium, Sporophleum, Camptoum.

Dematium*) Pers. 1797. Tent. disp. p. 41: g. Nematothecii. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 44.
Pers. 1801. Syn. Fung. p. XIX. 694: g. Naematothecior.
G.M.S. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 27. 382: g. Fungor.
Rebent. 1804. Neom. p. 394: g. Byssor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 20: g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 44. p. 337.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 54: g. Eleutherocarpor.
Nees 1816. Syst. p. 76; 1817. Ueberbl. p. 20: g. Byssor. solidor.
Mart. 1817. Erlang. p. 358: g. Inomycetum aëreor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Dematior.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 558: g. Byssidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 2; 1842. Mycol. p. 4.
Pers. 1822. Mycol. I. p. 13: g. Trichomycor.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 544: g. Byssinear.— Par. Math. 1853. Belg. II. p. 475.
Link 1824. Spec. I. p. 131: g. Hyphomycetum. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 559. n. 3575. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 301.
Fries 1825. Pl. homon. p. 188: g. Sporomycor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 100.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 166: g. Conopleacear.?
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1032: g. Mucoroideor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92 *(Dermatium)*: g. Leptomycetum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 362: g. Dematieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 235. p. 20; 1841. Ench. p. 14. — Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 184. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 156: g. Asporomycetum rhizomorphor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 62: g. Byssaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Oidieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 499: g. Dematiaceor.
Conf. Chloridium Link; Chaetopsis Grev.; Conoplea et Coelosporium Link; Ceratonema Roth; Echinobotryon et Sporodum Corda; Bissus DC.

Dematostemon Griseb. 1842 in Mart. Fl. Bras. Diosc. p. 29: sect. Dioscoreae, a Kunth (Enum. V. p. 425) ad genus Helmiam relata.

Demazeria**) Dumort. 1822. Comment. bot. p. 26: nov. gen. Graminum. (Poa sicula Jacq.)

Demetria Lagasca 1816. Nov. gen. et spec. p. 30: nov. g. Corymbiferar. (D. spathulata et glutinosa.)
= Grindelia Willd.

---

*) Dicat. Th. Andr. Deluc.

*) δεμάτιον, corpus parvum; δέμα, vinculum, fasciculus.
**) Dicat. Desmazières.

Demidieae Fenzl 1839. Flora II. p. 726: subdiv. Helichrysear. Gen.: Demidium, Amphidoxa.

Demidium*) DC. 1837. Prodr. VI. p. 246: nov. g. Helichrysear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2751. p. 448; 1841 Ench. p. 223. — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3473. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 664.

Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Demidiear.

Demidoffia „Dennst." Wittst. Etym. Handw. p. 268: vid. *Demidofia Dennst.*

Demidofia**) Pallas 1781. En. pl. hort. Demid. t. 1.

Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 158. (Tetragonia expansa L.)

= Tetragonia Linn.

Demidofia Gmel. 1791. Syst. p. 458: g. Pentandr. Digyn.

= Dichondra Forst.

Demidofia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 31: nov. g. plant. (*Kare-Kandel Rheede* V. t. 13.)

= Carallia Roxb.

Demidovia Hoffm. 1808. Hort. Mosq. f. 2. (Paris incompleta Bieb.)

Endl. 1837. Gen. n. 1176 *a.* p. 153; 1841. Ench. p. 88: sect. Paridis. — Par. Kunth 1850. Enum. V. p. 118.

Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1724: g. Paridear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 403 (307). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 210 (*Demidowia*).

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 218: g. Trilliacear.

Synon. Cartalinia Szov.

Demidovia „Pall." Endl. Gen. p. 947 in synon. Tetragoniae: vid. *Demidofia Pall.*

Demidowia Spach vid. *Demidovia Hoffm.*

Democritea Flor. Flum. IV. t. 106: g. Decandr. Monogyn. (Meliacear.? resinosa) ex Steud. Nom. I. p. 489.

Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 20 inter genera nondum descripta.

Democritea DC. 1830. Prodr. IV. p. 540: nov. g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 611. — Endl. 1838. Gen. n. 3118. p. 526; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 665.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377: g. Spermacocear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2767. (genuinar).

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 762: g. Spermacocidar.

Demordium Link vid. *Dermodium Link.*

Denckea Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 170 (New-York med. repos. II. Hex. V. p. 350): nov. g. pro Gentiana crinita W. propositum.

Crossopetalum DC.

Dendragrostis***) Nees 1834. Linnaea IX. p. 487: sect. Chusqueae.

*) *δημίδιον*, plebecula.
**) Dicat. P. Greg. Demidoff.
***) *δένδρον*, arbor.

Dendranthema DC. 1837. Prodr. VI. p. 62: sect. Pyrethri. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2670 *e.* p. 435; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3069. 5.

Schultz Bip. 1847 in Walp. Repert. VI. p. 225: sect. Tanaceti.

Dendrarabis Rchb. vid. *Dendro-Arabis Meyer.*

Dendrella Bory in Encycl. méth. . . .

= Gomphonema Agdh.

Dendrina Fries 1819. Nov. fl. suec. V. p. 79: nov. g. Fungor.

Fries 1825. Pl. homon. p. 186: g. Trichomycor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 108.

Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 453; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 498: g. Sepedonieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 209. p. 18; 1841. Ench. p. 12. — Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 93. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 68. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 7; 1842. Mycol. p. 25: g. Sporotrichacear.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Asteromeor.

Synon. Chromosporium Corda?

Dendrini Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 94: fam. Hyphomycetum. Gen.: Gliocladium, Monosporium, Fusisporium, Verticillium, Acrocylindrium, Diplocladium, Cylindrodendrum, Diplosporium, Trichothecium, Cladobotryum, Sepedonium, Ulocladium; Botrytis, Campsotrichum, Sporotrichum, Helicotrichum.

Dendriopsyllium Decaisne 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 704: sect. Plantaginis.

Dendrium Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 36: nov. g. Ericear. (Ledum buxifolium Berg.)

= Leiophyllum Pers. (Endl).

Dendro-Arabis C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 19: sect. Arabidis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4854 *d.* p. 864; 1841. Ench. p. 448. — Rchb. 1841. Nom. p. 181. n. 6999. 6 (*Dendrarabis*).

Dendrobiae A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 13: div. Malaxidar.

= Dendrobieae Lindl.

Dendrobidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 181: subtrib. Malaxear. Gen.: Dendrobium, Macrostomium, Aporum, ? Diploconchium, Oxystophyllum, ? Diglyphis, Monomeria, Epicrianthes, ? Drymoda, Bolbophyllum, ? Sunipia, Trias, Thelychiton, Cochlia, Lyraea, Megaclinium, Cirrhopetalum, Bryobium, Conchidium, Mycaranthes, Phreatia, Eria. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 628. Gen.: Cadetia, Dendrobium, Cochlia, Bolbophyllum, Sarcopodium, Cirrhopetalum, Epicrianthes, Diglyphis, Phreatia, Hexameria, Eria.

Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 169: sect. Malaxidear. Gen. ut Lindl.

Dendrobieae Lindl. 1830. Orchid. gen. Pt. I. p. 45: sect. Malaxidear. Gen.: Cochlia, Lyraea, Megaclinium, Bolbophyllum, Cirrhopetalum, Trias, Macrostomium, Microcoelia, Epicranthes, Monomeria, Stenoglossum, Diglyphosa, Mycaranthes, Phreatia, Eria, Aporum, Oxystophyllum, Polystachya, Metachilum, Dendrobium. — Simil. Rchb.

Dendrobieae Lindl. cont.
1841. Nom. p. 52. Gen. ut Endl. 1841. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175. Gen. ut Endl. 1837 et Hexadesmia.
Endl. 1837. Gen. p. 190: trib. Malaxidear. Gen. ut Lindl. (Epicrianthes, Diglyphis, Mycaridanthes) et Macrolepis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1362; 1841. Ench. p. 109. Excluditur Stenoglossum. Accedunt Bryobium, Hexameria, Appendicula, Cryptoglottis et 1843 (Spl. III. p. 60) Hexadesmia.
Meisn. 1842. Gen. p. 370 (277): subtrib. Malaxidear. Gen. ut Endl. 1841, excepto Bryobio. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 25. Gen. ex Lindl.

Dendrobium*) Swartz 1799. Nov. Act. Upsal. VI. p. 82; 1799 in Schrad. Journ. II. p. 234; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 92: nov. g. Orchidear. (Epidendrum moniliforme L.) — Par. Batsch 1802. Tab. p. 102. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 166. — Pers. 1807. Ench. II. p. 522. n. 2004. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 332. Ed. Nees p. 188; 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 212 (Verm. bot. Schr. II. p. 38). — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 56. — D. Don 1825. Nepal. p. 33. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 738. n. 3027; 1831. Gen. II. p. 673. n. 3400. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 203. t. 41. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 240.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 132. n. 1610: g. Gynandr. Monandr. — Par. Swartz 1806. Ind. occ. III. p. 1525. 1997. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 477.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 357: g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 341. — Bartl. 1830. Ord. p. 58.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 289: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188 (sphalm. *Dendrobrium*): g. Massulatar.
La Llave & Lex. 1825. Nov. veget. II. Orch. p. 39: g. Rinemospermar. epidendrar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1556. — A. Rich. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 19.
Lindl. 1830. Orchid. p. 74: g. Dendrobiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1369. p. 192; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1959. — Meisn. 1842. Gen. p. 370 (278). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 26. — Schauer 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 430. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 666. — Blume 1850. Rumphia IV. p. 79. — Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 532. Nova sect.: Pseudocadetia.
A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 13: g. Dendrobiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Dendrobidar. Sect.: Stachyobium, Ceratobium, Pedilonum, Onychium, Desmotrichum, Dendrocoryne.
Synon. Bontia Petiv.; Onychium, Pedilonum, Desmotrichum, Grastidium, Sarcostoma Blume; Ceraia et Keranthus Lour.

Dendrobium Miq. 1858. Fl. Ind. bat. III. p. 629: g. Dendrobidar. ampliat. Sect.: Aporum, Strongyle, Dendrocoryne, Holochrysa, Aclinia, Eudendrobium, Pedilonium, Stachyobium, Ceratobium, Sarcostoma, Oxystophyllum, Latouria.

Dendrobrium Agdh. vid. *Dendrobium Swartz.*

Dendrobrychis DC. 1825. Prodr. II. p. 346: sect Onobrychidis. — Par Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4004 *c*; 1841. Nom. p. 152. n. 5952. [3.] — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 306. — Endl. 1841. Gen. n. 6619 *c.* p. 1286; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 713.

Dendrobychis Steud. Nomencl. I. p. 491: leg. *Dendrobrychis.*

Dendrocalamus Nees 1834. Linnaea IX. p. 476: nov. g. Bambusear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 421.
Rupr. 1839. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. Bot. p. 144. sect. Bambusae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 909 *c.* p. 1354; 1841. Ench. p. 59. — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1427. [3.]

Dendroceros Nees 1846. Syn. Hepat. p. 579: nov. g. Anthocerotear. (Monoclea crispata Hook.) *Cf.* Gottsche 1858. Bot. Zeit. p. 286.
Synon. Anthocerotis sp. Raddi.

Dendrocharis Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 452: nov. g. Echitear. (Anodendron inflatum Hassk.)

Dendrochilum Blume. 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 398: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1830. Orchid. p. 34: g. Pleurothallear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1341. p. 189; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1929. — Meisn. 1842. Gen. p. 368 (277). — Schauer 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 429. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Liparidar. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 626.
Synon. Bolbophylli sp. Pet.-Thouars.

Dendrocnide*) Miquel 1851. Pl. Jungh. Fasc. I. p. 29: nov. g. Urticear. (Urtica peltata Bl.) = Laportea Gaudich., Wedd. 1857.

Dendrocolla Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 286. f. 67; 1828. Fl. jav. Praef. p. VI: nov. g. Orchidear. Sect.: Cuculla, Tubera, Fornicaria. = Aërides Lour.

Dendrocoryne Lindl. 1844. Bot. Regist. t. 53: sect. Dendrobii. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 631.

Dendrocrambe DC. 1821. Syst. II. p. 656; 1824. Prodr. I. p. 226: sect. Crambes. (C. fruticosa L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4724 *c.*; 1841. Nom. p. 179. n. 6916. [3.] — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 259. — Endl. 1839. Gen. n. 4967 *c.* p. 886; 1841. Ench. p. 451.

Dendrodochium**) Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 135: nov. g. Tubercularinor. (D. aurantiacum et flavum.)

Dendroglossa Presl 1850. Epimel. bot. p. 509 (149): nov. g. Acrostichacear.? (Gymnopteridis sp.)

---

*) δένδρον, arbor; βιόω, vitam ago.

*) κνίδη, urtica.
**) δοχεῖον, receptaculum.

Dendroglossa Presl cont.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 80: g. Pseudolomariear. (includens Gymnopteridem Presl.)

Dendroglossophyllum C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 223: sect. Hypni.

Dendrohypnum Hampe 1852. Bot. Zeit. p. 70: sect. prima Hypni.

Dendroides Rouss. (Quid?) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 64.

Dendroligotrichum C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 199: sect. Catharineae.
Synon. Phalacroma Hook. & Wils.

Dendrolirium Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 343: nov. g. Orchidear. Sect.: Cosmium, Brachystomium, Odontium, Rhizophyllum, Cromnophyllum, Anacampsium.
Endl. 1837. Gen. n. 1363 *a.* p. 192; 1841. Ench. p. 109: sect. Eriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1952. 1. — Lindl... Journ. Proc. Linn. Soc. III. p. 48. — Blume 1858. Ind. bat. III. p. 660.

Dendrolobium Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 223: subg. Desmodii.
Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 216: g. Hedysarear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 261.
= Eudesmodium DC.?

Dendromecon Benth. 1834. Hortic. trans. n. ser. I. p. 407: nov. g. Papaveracear. (D. rigidum.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 81. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 7 (9). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 64. (verar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 224. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 431.
Rchb. 1837. Hdb. p. 264: g. Chelidoniear.
Bernh. 1838. Linnaea XII. p. 660: g. Hunnemanniear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4829. p. 857; 1841. Ench. p. 443. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 44.
Rchb. 1841. Nom. p. 184. n. 7073: g. Eschscholtziear.

Dendromene DC. 1830. Prodr. IV. p. 73: sect. Trachymenes. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 257. — Endl. 1839. Gen. n. 4362 *b.* p. 764; 1841. Ench. p. 377.

Dendromyces Libosch. 1814. Monogr. (Vindob.)
Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 16: g. Phallor.
= Battarea Pers.

Dendropanax Decaisne & Planch. 1854. Rev. hort. 4e sér. III. p. . . . : nov. g. Araliacear.

Dendropemon*) Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 13: sect. Loranthi. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4586 *b.* p. 801; 1841. Ench. p. 399; 1850. Spl. V. p. 19 (sphalm. *Dendropeucon*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 439.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2725: g. Loranthear. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791: g. Loranthacear.

Dendropeucon Endl. 1850 vid. *praeced.*

Dendrophlomis Benth. 1834. Labiat. p. 625; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 539: subsect. Euphlomidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 851. — Walp. 1845. Rep. III. p. 882.

*) *πήμων*, nocuus.

Dendrophthoë*) Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 13: sect. Loranthi. *Cf.* Schult. 1830. Syst. VII. p. 1613. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4586 *e.* p. 802; 1841. Ench. p. 399. Subsect.: Cichlanthus, Eudendrophthoë. — Walp. 1843. Rep. II. p. 440. — Molkenb. 1852. Pl. Jungh. II. p. 109.
Mart. 1830. Flora I. p. 109: g. Loranthear. (*Baumverwüst*). *Cf.* DC. 1830. Pr. IV. p. 671.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 418: g. Loranthacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 234. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 810. Sect. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2715: g. Psittacanthear. Sect.: Cichlanthus, Dendrophthoë.

Dendropogon Schimper 1843. Bot. Zeit. p. 377: nov. g. Neckeracear.?
C. Müll. 1844. Linnaea XVIII. p. 682: sect. Cryphaeae.
Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 669; 1849. ibid. VIII. p. 400: g. Neckerear.
C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 173: subsect. Cryphaeae.
Synon. Clidostomum Mart.

Dendropogon Fries 1851. Nov. Act. Upsal. ser. tert. I. 1. p. 132: sect. Zasmidii.

Dendrosarcos Paull. . . . .
= Agaricus Tourn.

Dendroseris Don 1832. Phil. Mag. Apr.: nov. g. Cichoriacear. *Cf.* Flora Lit. III. p. 150.
Hook. & Arn. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 32: g. Hieraciear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3032. p. 502; 1841. Ench. p. 251. — Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). — Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3736 (genuinar). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 669.
Synon. Rea Bert.

Dendrosonchus „Webb" Schultz Bip. . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 428: subg. Sonchi. Sect.: Rhizosonchus, Prenosonchus, Lyrosonchus.

Dendrospartum Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 152 adnot.: nov. g. Genistear. (Genista aetnensis DC.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 504.

Dendrostellera C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. p. 359: sect. Stellerae. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 63. n. 2098 *b.* — Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 549.

Dendrostylis Karsten & Triana 1856. Linnaea XXVIII. p. 431: nov. g. Flacourtianear. (D. suaveolens, etc.)

Dendrotrophe**) Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 779: g. Araliacear.
= Henslowia Blume.

Dendryphiaceae Corda 1840. Icon. Fung. IV. p. 32; 1842. V. p. 16; 1842. Anl. Mycol. p. LXVII. 65: fam. Hyphomycetum, jam 1837 (Ic. Fung. I. p. 21) pro Dendryphio indicata. Gen.: Dendryphium, Dactylium. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 137. Gen.: Dactylium.

*) *φθόη*, phthisis.
**) *τροφή*, pabulum.

Dendryphiaceae Corda cont.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 94: subsect. Mucedineor. genuinor. Gen. ut Corda.
Dendryphiei Rchb. 1841. Nomencl. p. 4: subsect. Mucedineor. genuinor. Gen.: Dactylium, Cladobotryum, Dendryphium.
Dendryphion Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 300: nov. g. Hyphomycetum synsporor. *Cf.* seq.
= Aspergillus Mich.? (Endl. Gen. p. 20.)
Dendryphium*) Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 21. t. 6. f. 279: g. Aspergillinor.
Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 33; 1842. V. p. 16; 1842. Mycol. p. 65: g. Dendryphiacear. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 94. — Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 10.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 161: g. Dendryphieor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 504: g. Toruleor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Septonemeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 78: g. Torulaceor.
= Dendryphion Wallr.
Deneckia Schultz Bip. vid. *Denekia Thunb.*
Deneckieae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 952: div. Conyzear. Gen.: Deneckia, Micropsis.
Deneella A. Juss. vid. *Dentella Forst.*
Denekia**) Thunb. 1800. Prodr. II. p. 153. 193; 1801. Nov. gen. XIV. p. 177: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1912. n. 1477. — Pers. 1807. Ench. II. p. 423. n. 1844.
Lagasc. 1811. Amen. nat. I. p. . . . : g. Chaenanthophorar. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 49 *(Denneckia)*.
DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 68: g. Labiatiflorar.
Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 65; 1822. v. 23. p. 565; 1827. v. 49. p. 422; 1830. v. 60. p. 580: g. Inulear. (1822 Archetypar., 1827 verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2466. — Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27. (verar.)
Less. 1832. Syn. p. 206: g. Epaltidear.
DC. 1836. Pr. V. p. 462: g. Plucheinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2423. p. 393; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3559: g. Plucheinar.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952 *(Deneckia)*: g. Deneckiear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 670: g. Tarchonanthear.
Denhamia***) Schott 1832. Melet. bot. p. 19: nov. g. Colocasiear. (Culcasia scandens Palis.)
= Culcasia Palis.
Denhamia Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 18 (16): g. Kiggelariear. *(Leucocarpum A. Rich.*, nec Don.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 186. n. 7130: g. Melicytear.

*) δενδρύφιον, arbuscula.
**) Dicat. Deneke, Stralsund.
***) Dicat. Dixon Denham.

Denhamia Meisn. cont.
Endl. 1839. Gen. n. 5065. p. 918; 1841. Ench. p. 478: g. Bixinear.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 588: g. Bixacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: g. Bixear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 669.
Denira Adans. 1763. Fam. II. p. 118: g. Xeranthemor.
Iva Linn.
Denisaea*) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 306. n. 479: nov. g. Corythophytor., a Phryma L. sejunctum.
Denneckia Steud. vid. *Denekia Thunb.*
Dennstädtia Bernhardi 1800 in Schrad. Journ. II. p. 124: nov. g. Filicum gyratar. (Trichomanes flaccidum Forst.)
= Microlepiae Presl sp.
Denoroma DC. 1817. Mém. Mus. III. p. 326: sect. Xylomatis. (X. Ledi, Pini, Rosae, rhombeum et cinereum.)
Dens Canis Tourn. 1700. Inst. p. 378. t. 202: g. pl. class. IX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 135. Ed. Hall. 1745. p. 149: g. pl. class. VI.
= Erythronium Linn.
Dens Leonis Tourn. 1700. Inst. p. 468. t. 266: g. pl. class. XIII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 189. Ed. Hall. 1745. p. 197: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1721. Act. Ac. Paris. p. 176: g. Cichoracear.
Koch 1837. Syn. p. 418. Ed. II. p. 480: sect. Leontodontis. — Par. Ledeb. 1846. Ross. II. p. 779. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 298.
= Taraxacum Hall.
Denstädtia „Bernh." Endl. passim: vid. *Dennstädtia Bernh.*
Dentaria*) Tourn. 1700. Inst. p. 225. t. 110: g. pl. class. V.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 73. Ed. Hall. 1745. p. 80: g. pl. class. IV.
Linn. 1737. Gen. p. 196. n. 540; 1737. Cliff. p. 335; 1740. Syst. p. 27; 1753. Sp. II. p. 653; 1759. Syst. ed. X. p. 1131. n. 726; 1763. Sp. ed. II. p. 912; 1764. Gen. ed. VI. p. 337. n. 811; 1767. Syst. ed. XII. p. 438: g. Tetradynam. Siliquos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 496; 1784. Syst. p. 593. — Reich. 1778. Gen. p. 338. n. 875. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 441. n. 1087. — Gmel. 1791. Syst. p. 979. — Pers. 1797. Syst. p. 630. — Willd. 1800. Sp. III. p. 478. n. 1236; 1809. En. p. 675. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 65. — Link 1822. En. II. p. 160.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 556: g. Tetrapetalar. cruciatar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 65. n. 265: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 260.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 26. — Scop. 1772. Carn. II. p.

*) Dicat. Lud. Denis.
**) Nomen a radicis forma et colore, quae candidissima ex pluribus squamis, quasi dentibus, componitur.

Dentaria Tourn. cont.
19; 1777. Intr. p. 317. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 496. — Pers. 1807. Ench. II. p. 194. n. 1566. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 409. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 883. n. 2309; 1831. Gen. II. p. 520. n. 2558. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 189. 282. — Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Link 1831. Hdb. II. p. 308. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 443. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 251. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 633. 699.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 239. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 504. — DC. 1805. Franç. IV. p. 686. — Lois. 1819. Dict. v. 13. p. 66.
Adans. 1763. Fam. II. p. 418: g. Erucar.
Hill 1769. Ht kew. p. 172 (17): g. Siliculosar.
Neck. 1790. El. III. p. 74. n. 1397: g. Styridophytor.
Vent. 1799 Tabl. III. p. 105: g. Cheiranthoidear.
Rebent. 1804. Neom. p 153: g. Hexandr. Monogyn.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 231; 1821. Syst. II. p. 271; 1824. Pr. I. p. 154: g. Arabidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4785; 1832. Fl. exc. p. 676. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 41. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 171. — Koch 1836. Syn. p. 45. Ed. II. p. 48. — Meisn. 1837. Gen. p. 10 (10). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 86. — Endl. 1839. Gen. n. 4861. p. 866; 1841. Ench. p. 448. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 129. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 90. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 670. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 194.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 182. n. 7007: g. Cardaminear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Arabidar.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 111: g. Cheiranthear.

Dentella Forst. 1776. Char. gen. p. 25. t. 13: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 124. n. 310. — Gmel. 1791. Syst. p. 370. — Willd. 1797. Sp. I. p. 972. n. 351. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 159; ed. 1832. I. p. 532.
Juss. 1789. Gen. p. 200; 1820. Mém. Mus. VI. p. 385: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 438. — Pers. 1805. Ench. I. p. 205. n. 460. — Hedw. 1806. Gen. p. 137. n. 590. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 80. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. IV. 24. n. 865. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 707. n. 774; 1830. Gen. I. p. 166. n. 834. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 990. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 725.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 610. — Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2052. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 270.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.
Cham. & Schltd. 1829. Linnea IV. p. 150: g. Hedyotidear. — Par. Bartl. 1830. Ord.

Dentella Forst. cont.
p. 210. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 675. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 254 *(Deneella)*. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 196.
DC. 1830. Pr. IV. p. 418: g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 524.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 405: g. Hedyotear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3238. p. 548; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 160 (114). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2872.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
Synon. Heymia Dennst.; Lippaya Endl.

Dentellaria Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 2: g. pl. class. I. *(Dentillaria J. Bauh.)*
= Plumbago Tourn.

Dentellarieae Rchb. 1828. Consp. p. 91: div. Plumbaginear. Gen.: Plumbago, Vogelia; Thela?
Rchb. 1841. Nom. p. 123: subdiv. Plumbagear. Gen.: Plumbago, Ceratostigma, Vogelia.

Dentellarinae Rchb. 1831. Fl. exc. p. 191; 1837. Handb. p. 203: subdiv. Plumbagear. Gen.: Plumbago.

Denticella Ehrenb. 1838. Infus.; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 207; 1844. ibid. p. 201: g. Bacillarior.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: g. Eubiddulphiear.
= Odontella Agdh. et Biddulphia Gray.

Denticula Kütz. 1844. Bacill. p. 43; 1845. Phycol. germ. p. 62; 1849. Sp. Alg. p. 11. n. 7: g. Fragilariear. — Par. Rabenh. 1853. Süssw. Diat.
Rabenh. 1847. Krypt. II. p. 20: g. Diatomear.

Dentidea „Lour." Steud. 1840. Nomencl. I. p. 492: vid. *seq.*

Dentidia*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 369. Ed. Willd. p. 447: nov. g. Didynam. Gymnosperm. (D. nankinensis.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 135. n. 1415: g. Labiatar.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 162: g. Ocymoidear.
= Plectranthus L'Herit.

Dentillaria J. Bauh. II. p. 941.
= Plumbago Tourn.

Dentinum „Micheli" Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 597. 650: nov. g. Hydnidear. (Hydnum repandum L.)

Denudatae Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: ordo 7 plantar. Gen.: Crocus, Gethyllis, Bulbocodium, Colchicum.

Deparia Hook. & Grev. . . . . Ic. Fil. t. 154: nov. g. Filicum. (Dicksonia prolifera Kaulf.) *Cf.* Hook. & Arn. 1832. Beech. voy. Bot. p. 108.
J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 427: g. Davalliear.
Meisn. 1843. Gen. p. 434 (335): g. Dicksoniear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 692. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 336.

*) Nomen a calycis laciniis superioribus denticulatis.

Deparia Hook. cont.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 84: g. Eudicksoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Synon. Cibotii sp. Presl.

Depazea*) Fries 1818. Obs. myc. II. p. 364: nov. g. Sphaerioideor. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 84.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 15 (sphalm. *Dapazea*): g. Sclerotior.
Agdh. 1821. Aphor. p. 83: g. Xylomacear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 527; 1828. Elench. II. p. 110: subg. Sphaeriae.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 603; 1825. Pl. homon. p. 123: g. Xylomaceor. (asporor). — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 229; 1841. Nom. p. 6. n. 250. (genuinor.) — Endl. 1836. Gen. p. 31; 1841. Ench. p. 19. (asporor.) — Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 242. (spurior.)
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 583: g. Sphaeriacear. — Par. Math. 1853. Belg. II p. 210.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Sphaeriaceor. — Par. Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 55; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 27: g. Pyrenomycetum.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 136: g. Sphaeronemear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 422: g. Phyllosticteor.
Synon. Phyllosticta Pers.

Depierrea Anon. 1842. Linnaea XVI. p. 374: nov. g. Campanulacear. (D. campanuloides.)
= Campanulae cujusdam monstrum.

Deppea**) Schlechtend. & Cham. 1830. Linnaea V. p. 167: nov. g. Hedyotidear. (D. erythrorhiza.)
DC. 1830. Pr. IV. p. 618: g. Rubiacear. minus notum.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 524: g. Rondeletiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3136. p. 530; 1841. Ench. p. 271 (Atakt. p. 25. t. 24): g. Euspermacocear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377: g. Spermacocear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2785. (genuinar.) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 695.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
Schltd. 1847. Linnaea XIX. 6. p. 747: g. Hedyotear. Char. emend. *Cf.* Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 371.

Depretzia Dietr. vid. *Despretzia Kunth.*

Derbesia***) Solier 1846. Rev. bot. I. p. 452; 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 157 (Bot. Zeit. 1846. p. 497; 1848. p. 310 et Flora 1847. I. p. 175): nov. g. Algar. zoosporear. (Bryopsis tenuissima et Lamourouxii.)

*) Dicat. principi de la Paz (Man. Godoy).
**) Dicat. clariss. Deppe.
***) Dicat. Derbès.

Derbesia Solier cont.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 101: g. Bryopsidear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Vaucheriear?
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 490: sect. Bryopsidis.
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 231: g. Derbesiear.

Derbesieae Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 231: fam. Chlorosporear. Gen.: Derbesia.

Derderia Jaub. & Spach 1843. Illustr. pl. or. I. p. 129. t. 67.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 290: g. Carlinear.
Jaub. & Spach 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 362. Injungitur Aegopordon Boiss.

Deringa Adans. 1763. Fam. II. p. 498: g. Chaerophyllor. (Sison canadense L.)
= Cryptotaenia DC.

Derlinia Neraud 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 28: nov. g. Scrophulariear. indescriptum. (Gratiolae sp.)

Dermasea Haworth 1821. Enum. Saxifr. p. 8: nov. g. Saxifragear. (Saxifraga nivalis L., etc.)
= Saxifragae sect. Micranthes Tausch.

Dermatea*) Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 362: nov. g. Dermateor. (Pezizae et Cenangii sp.)

Dermatei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 345. 360: ordo Discomycetum. Gen.: Spadonia, Vibrissea, Pilacre, Tubercularia, Sarea, Midotis, Dermatea, Ditiola, Volutella, Schmitzomia.

Dermatium Ritgen vid. *Dematium Pers.*

Dermatoblasteae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 93; 1843. Phycol. gener. p. 294; 1845. Phycol. germ. p. 242: subordo Eremospermear. Fam.: Ulvaceae, Phycoserideae, Enteromorpheae. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 471. Fam.: Protodermaceae, Ulvaceae, Enteromorpheae, Diplostromieae, Dictyosiphoneae.

Dermatocarpa Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 47: ordo Engastriocarpor. Divis.: Trichosperma, Gymnosperma, Sarcosperma. (*Cf. Dermatocarpi Pers.*)

Dermatocarpeae Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 21: cohors 5 Lichenum. Gen.: Solorina, Dermatocarpon, Gyrophora, Endocarpon, Capitularia, Peltidea.
Arnold 1858. Flora p. 232: trib. Endocarpacear. Gen.: Dermatocarpon, Placidium, Catopyrenium, Lithoicea.

Dermatocarpi Pers. 1801. Syn. Fung. p. XIII: ordo Angiocarpor. Divis.: Trichospermi, Gymnospermi, Sarcospermi.
Rebent. 1804. Neom. p. 343: div. Gasteromycor. Sect. eaed.
Leman 1817. Dict. v. 8. p. 106; sect. Angiocarpor. Gen.: Gymnosporangium, Puccinia, Uredo.

Dermatocarpon Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 21: nov. g. Dermatocarpear. — Par. Arnold 1858. Flora II. p. 532.

*) δέρμα, cutis, corium.

Dermatocarpon Eschweiler cont.
Fries 1825. Pl. homon. p. 259: g. Endocarpear., serius (Lich. eur. p. 407) ad Endocarpon reductum.
Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 379: g. Endocarpicar.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 326: g. Dacampiear.

Dermatocarpon Massalongo (antea *Paraphysorma Massal.*)
= Stigmatomma Körb.

Dermatocarpum Pers. 1797. Tent. disp. p. 5: ordo Angiothecii. Gen.: Geastrum, Bovista, Tulostoma, Lycoperdon, Hypogeum, Lycogala, Fuligo, Spumaria, Physarum, Diderma, Trichia, Arcyria, Stemonitis, Cribraria; Tubulina, Pyrenium, Trichoderma, Aecidium, Uredo, Stilbospora, Mucor, Hydrophora, Mucedo.

Dermatocarpus Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d ser. IX. p. 491: sect. Pennantiae.

Dermatodea Vent. 1799. Tabl. II. p. 34: nov. g. Algar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 20.
= Sticta Schreb.

Dermatodon Hübener 1833. Muscol. germ. p. 109: nov. g. Aploperistomor. (Weissia lanceolata Brid.)
Genth 1836. Nass. I. p. 163: g. Bryoideor.
= Anacalypta Röhl.

Dermatogasteres Nees 1817. Syst. Ueberbl. p. 34: series Geogastror. Gen.: Scleroderma, Diploderma, Bovista, Lycoperdon, Geastrum, Actinodermium, Mitremyces, Tulostoma.
Mart. 1817. Erlang. p. 383: series Geogasterum. Gen.: Scleroderma, Bovista, Lycoperdon, Sphaerobolus, Geastrum, Tulostoma.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 378: div. Gastromycetum. Gen.: Arachnion, Scleroderma, Sclerotium, Lycoperdon, Bovista, Tylostoma, Licea, Amphisporium, Dichosporium, Myriococcum, Eurotium, Chaetomium, Craterium, Leocarpus, Diderma, Physarum, Onygena, Cionium. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 770. Gen.: Arachnion, Scleroderma, Cauloglossum, Elaphomyces, Lycoperdon, Bovista, Tylostoma.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 17; 1842. Mycol. p. LXVII. 66: subordo Myelomycetum. Fam.: Mucoroideae, Pilobolideae, Aecidiaceae, Physarei, Trichiacei, Cribrariaceae, Stemonitideae, Trichodermaceae, Aethalini, Reticulariaceae, Lycoperdaceae, Sclerodermaceae, Podaxideae, Pisocarpiaceae, Nidulariaceae, Geastrideae, Carpoboli, Splanchnomycetes, Tuberaceae, Hymenangiaceae, Clathraceae, Lysuroideae, Batarreae, Phalloideae.

Dermatogastri Nees 1816. Syst. p. 131: vid. *Dermatogasteres Nees.*

Dermatomycetes Rchb. 1828. Consp. p. 1. 8; 1832. Fl. exc. p. L: ordo Fungor. Formationes, Gasteromycetes, Hymenomycetes. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 129; 1841. Nom. p. 6. Fam.: Sphaeriacei, Lycoperdacei, Hymenini. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 136. Fam. eaed.

Dermatonemata Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 32: div. Dermatophykeor. Subdivis.: Arthronemata, Gryphonemata, Trichonemata.

Dermatophykea Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 29: ordo 2 Algar. Divis.: Dermatophysinges, Dermatonemata, Dermatoplynthia.

Dermatophyllosporae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): ordo Homorganor. phyllosporor. Fam.: Crustaceae, Phylloideae, Cladonioideae.

Dermatophyllum Scheele 1848. Linnaea XXI. p. 458: nov. g. Sophorear. (D. speciosum.)

*Dermatophysinges**) Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 30: div. Dermatophykeor. Gen.: Nostoc.

Dermatoplynthia Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 67: div. Dermatophykeor. Gen.: Ulva, Phyllona, Laminaria.

Dermatopsorae Rchb. 1837. Handb. p. 131: ordo Lichenum. Subord.: Gasteropsorae, Apotheciopsorae.

Dermatosipheae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 179. 242: div. Tiloblastear. Fam.: Hormidieae, Ulotricheae, Conferveae, Zygnemeae, Hydrodictyeae, Protonemeae, Chantransieae, Draparnaldieae, Ectocarpeae, Sphacelarieae. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 8. Fam. eaed. (exceptis 2 ultimis.)
= Confervinae Kütz.

Dermatothallae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 107: div. Gymnothalamar. Trib.: Dictyoteae, Sporochneae, Laminarieae.

Dermatothecia Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 52: ordo Hymenocarpor. Gen.: Clavaria, Ramaria, Geoglossum, Spathularia, Leotia, Helvella, Morchella, Peziza, Ascobolus, Helotium, Stilbum, Aegerita.

Dermatothecii Rebent. 1804. Pr. fl. Neom. p. 378: div. 3 Fungor. Subdiv.: Clavaeformes, Gymnodermata, Helvelloidei, Cupulaeformes.

Dermea Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 164; 1818. II. p. 309: sect. Pezizae.
Fries 1825. Pl. homon. p. 114: g. Dermeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 261; 1841. Nom. p. 7. n. 281. — Endl. 1836. Gen. n. 379. p. 32; 1841. Ench. p. 19.
Lindl. 1841. Veg. kd. p. 43: g. Phacidiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Cenangieor.?

Dermeae Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 39: div. Cupulator. Gen. Ditiola, Tympanis, Cenangium, Stictis.

Dermei Fries 1825. Pl. homon. p. 114: trib. Phacidiaceor. Gen.: Dermea, Cenangium, Heterosphaeria.
Rchb. 1828. Consp. p. 11.; 1841. Nom. p. 7: subdiv. Phacidiaceor. Gen. ead.
Endl. 1836. Gen. p. 32; 1841. Ench. p. 19: subtrib. Phacidiaceor. Gen. ead.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 331: div. Cupulator. Gen. Stictis, Cenangium.

*) φύσιγξ, vesica.

Derminus Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 10; 1825. Pl. homon. p. 73: series Agarici. Tribus: Pholiota, Myxacium, Hebeloma, Flammula, Inocybe, Naucoria, Galera, Tapinia, Crepidotus. (Excluditur 1825 Inocybe.) — Par. Fries 1838. Epicr. p. 160. Subgen.: Pholiota, Hebeloma, Flammula, Naucoria, Galera, Crepidotus. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 288. Subgen. ead. et Inocybe. — Bail 1858. Syst. p. 37. Subgen. ut Fries 1838.

Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *D:* sect. Agarici. Subsect. ut Fries 1825. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 453 IV. p. 40; 1841. Ench. p. 22. Subsect. ut Fries 1821. — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 502. 3. Subsect. ut Fries 1838. (Flammella.) — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 469. Subsect. eaed. et Inocybe. — Math. 1853. Belg. II. p. 356. Sect. ut Fries 1825.

Derminus Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 393; 1838. Epicr. p. 422; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 317: sect. Boleti. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 448 *c.* p. 40; 1841. Ench. p. 21. — Math. 1853. Belg. II. p. 331.

= Amaurosporus Rchb.

Dermoblastae Willd. 1796 in Usteri n. Ann. XI. p. 18: class. plantar.

Dermocarpa Crouan 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 70: nov. g. Squammariear. (D. violacea.)

Dermocorynus Crouan 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 69: nov. g. Nemastomear., Grateloupiae aff. (D. Montagnei.)

Dermocybe Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 227: trib. Cortinariae.

Fries 1825. Pl. homon. p. 72: subsect. Cortinarii. — Par Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *F a.* — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 493. — Math. 1853. Belg. II. p. 360.

Endl. 1836. Gen. n. 453 *V a.* p. 40; 1841. Ench. p. 22: subsect. Cortinariae.

Fries 1838. Epicr. p. 283; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 303: sect. Cortinarii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 498. 3 *(Desmocybe).* — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41.

Dermodium Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 41: g. Gastromycor. (antea ibid. III. p. 25 err. typ. *Demordium). Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 93.

Nees 1816. Syst. p. 107; 1817. Ueberbl. p. 29: g. Gasteromycor. diffluentium.

Mart. 1817. Erlang. p. 372: g. Sporomestorum diffluentium.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 570: g. Myrotheciadear.

Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 551: g. Fuliginear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 97: g. Orthomycetum.

= Tubulina Pers.

Dermophylla Silva Manso 1836. Cataract. Bras. p. 30.

Endl. 1843. Spl. III. p. 91. n. $5152/_2$: g. dubium Cucurbitacear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 764. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315 *(Dromophylla).*

Römer 1846. Fam. nat. II. p. 12. 49: g. Eubryoniear.

Dermosporii Fries 1825. Pl. homon. p. 172: trib. Tubercularinor. Gen.: Dermosporium, Aegerita, Sclerococcum, Epicoccum.

Rchb. 1828. Consp. p. 4: div. Tubercularinor. Gen. ead.

Dermosporium Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 32: nov. g. Mucedinum (sphaerobasium). *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 96 et Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 220.

Nees 1816. Syst. p. 31; 1817. Ueberbl. p. 7: g. Sphaeromycor. evolutivor.

Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Tuberculariar.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 524: g. Fusidiear.

Link 1825. Spec. II. p. 107: g. Gymnomycetum.

Fries 1825. Pl. homon. p. 172: g. Dermosporior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 42.

Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Tuberculariaceor.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum. (Nees Syst. f. 25.)

Spreng. 1831. Gen. II. p. 784. n. 4065: g. Coniomycetum suffultor.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 235: g. Sporomycetum perisporor.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 38; 1842. Mycol. p. 161: g. Tuberculariacear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 476: g. Sclerotiaceor.

= Aegerita Pers.?

Deroemera*) Rchb. f. 1852. Pollin. gen. p. 29; 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 579: nov. g. Ophrydear., Perulariae aff. (Spiranthes abyssinica Hochst.) *Cf.* Flora 1853. p. 750.

Derouetia**) Boissier & Balansa 1856. Diagn. pl. nov. or. III. Ser. 2. Nr. 5. p. 114: nov. g. Rodigiear., Crepidi et Robertiae similis. (D. robertioides.)

Derris***) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 432. Ed. Willd. p. 525: nov. g. Diadelph. Decandr. (D. pinnata). — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 278. n. 1675.

Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 97: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 192. n. 2511; 1831. Gen. II. p. 573. n. 2797.

Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Dalbergiear. — Par. DC. 1825. Syst II. p. 415. — Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4011; 1841. Nom. p. 154. n. 6025. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 374. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 157. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (68). — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 92. — Endl. 1841. Gen. n. 6732. p. 1307; 1841. Ench. p. 673. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 581. Sect. ut Miq.

Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 248. 251: g. inter Galegeas et Dalbergieas medium.

Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 140: g. Millettiear. Sect.: Derris, Paraderris.

---

*) Dicat. nobilissimo De Römer.

**) Dicat. Derouet, botanico Turonensi.

***) *δέρρις*, membrana: a legumine membranaceo.

Deschampsia*) Palis. 1812. Agrost. p. 91. t. 18. f. 3: nov. g. Graminear. (Aira ambigua Michx.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 40. 685. n. 330. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 301.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72 *(Dechampsia)*; 1830. Gram. p. 97; 1833. Agrost. p. 286; 1838. Berol. II. p. 378: g. Avenacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 136. — Trin. 1835. Linnaea X. p. 299. — Endl. 1837. Gen. n. 857. p. 95; 1841. Ench. p. 58. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 36. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1206. — Meisn. 1843. Gen. p. 423 (323). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 8. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 100. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 419. Sect.: Avenella, Campella, Vahlodea. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 507. Sect.: Eudeschampsia, Avenella.

Trin. 1820. Fund. p. 157: g. Triandr. Digyn.

Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 552: sect. Airae. — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 323. — Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1036 *b*; 1830. Fl. exc. p. 50. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 69. — Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 55. — Koch 1837. Syn. p. 792. Ed. II. p. 914. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 389. — Steud. 1854. Glum. I. p. 219.

Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Bromear.

Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838.) p. 6: g. Avenaceor.

Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 156: g. Avenear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 456. Sect.: Avenella, Campelia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116.

Synon. Campella Link.

Desciscentes Spreng. 1826. Syst. III. p. 367: trib. 6 Syngenesiae. Gen.: Shawia, Rolandra, Spiracantha, Trichospira, Voigtia, Odontoloma, Dialesta, Delilia, Brunonia, Calycera, Boopis, Acicarpha, Ogiera. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 648. Gen. ead. (exclusis Delilia et Brunonia) et Eremanthus, Adenocyclus.

Descliaea Fl. mex. ic. ined.

= Margaris DC.

Descuraea Endl. 1850 vid. *Descurea Guett.*

Descurainia Webb & Berth. 1836. Phyt. Canar. I. p. 72: g. Cheiranthear. Sect.: Irio, Sophia.

= Sisymbrii sect. Irio et Descurea.

Descurea**) Guettard 1747. Observ. II. p. 162.

C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 135: sect. Sisymbrii. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4906 *e*. p. 875; 1841. Ench. p. 449; 1852. Spl. V. p. 37 *(Descuraea)*. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 180. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 255.

Synon. Sophia Hall.; Hugueninia Rchb.

Desfontaina „Arrab." Steud. Nom. vid. *Desfontenaea Fl. Flum.*

Desfontainea*) HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 273: g. incertae sedis. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 266.

Endl. 1839. Gen. p. 669. n. 3875: g. Desfontainear.

Griseb. 1856. Abh. Gött. Ges. VI. p. 112: g. Gentianear.

= Desfontainia Ruiz & Pav.

Desfontainea Rchb. vid. *Desfontenaea.*

Desfontaineae Endl. 1839. Gen. p. 669; 1841. Ench. p. 336: fam. Tubiflorar. incertae sedis. Genus unicum: Desfontainea.

Desfontainesia Hoffmsg.

= Fontanesia Labill.

Desfontainia**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 29. t. 5; 1799. Fl. peruv. II. p. 47. t. 186: nov. g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Schrad. 1799. Journ. I. p. 174 — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 700. n. 757.

Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 157. t. 45: g. Solanear.? — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 456; 1830. Gen. I. p. 160. n. 807. — Dietr. 1839 Syn. I. p. 568. 714.

D. Don 1831. Edinb. n. phil. journ. Oct. p. 274: g. Gentianear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 213: g. Desfontainiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4776. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 675.

Rchb. 1837. Hdb. p. 201: g. Atropear.

Meisn. 1839. Gen. p. 252 (161): g. Aquifoliacear.?

Endl. 1841. Ench. p. 336. n. 3875: g. Desfontainear.

Synon. Linkia Pers.; Bevania Bridg.; Desfontainea HBK.

Desfontainieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 175. 213: trib. Gentianear. Gen.: Desfontainia.

Rchb. 1841. Nom. p. 122: sect. Cestrinear. Gen. id.

Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 675: fam. Solanaceis aff. Gen. id.

Desfontenaea Flor. Flum. III. t. 146: g. Euphorbiacear. (non descriptum) incertae sedis. (Endl. Gen. p. 1125). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 195. n 7461 *(Desfontainea)*?

Steud. 1840. Nom. I. p. 493 *(Desfontaina)*: g. Tricoccar.?

Desforgia Steud. Nom. vid. *Defforgia Lam.*

Desmantha Endl. vid. *seq.*

Desmanthea DC. 1825. Prodr. II. p. 444 (Lég. mém. XII.): sect. Desmanthi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4167 *b*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 398. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 270. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 402. — Endl. 1841. Gen. n. 6828 *b*. p. 1325 *(Desmantha)*; 1841. Ench. p. 682.

= Desmanthus Benth.

Desmantheae Benth. 1841. Hook. journ. bot. III. p. 133: trib. Mimosear.

Desmanthus***) Willd. 1805. Spec. IV. p. 1044. n. 1901; 1809. En. p. 1049: nov. g. Polygam. Monoec.

*) Dicat. medico Deschamps, St. Omer.

**) Nomen a Guett. in honorem avi sui Franc. Descurain Sisymbrio Sophiae impositum.

*) Dicat. René Louiche Desfontaines.

**) Dicat. Desfontaines.

***) δέσμα, vinculum.

Desmanthus Willd. cont.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 101: g. Leguminosar. — Par. Link 1822. En. II. p. 442. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 325. n. 1591; 1830. Gen. I. p. 351. n 1771. (in Decandr. Monogyn). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1423.
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Mimosear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 261. — Kunth (Mimos. p. 115.) 1825. Syn. IV. p. 9. — DC. 1825. Pr. II. p. 443. Sect.: Neptunia, Desmanthea, Dichrostachys. — Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4167. Sect. eaed. — Bartl. 1830. Ord. p. 417. — Link 1831. Hdb. II. p. 132. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 397. Sect. ut DC. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 49. (restrict.) — Meisn. 1837. Gen. p. 96 (68). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 401. Sect. ut DC. — Brongn. 1843. En. genr. p. 133.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Acaciear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 270. Sect.: Neptunia, Desmanthea. — Endl. 1841. Gen. n. 6828. p. 1325; 1841. Ench. p. 682. Sect.: Neptunia, Desmantha. — Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 6125. Sect.: Neptunia, Desmanthus.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 474: g. Mimosar.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 709: g. Parkiear. Sect. ut Endl.

Desmanthus Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 356: g. Gymnantherar., emissis Neptunia et Dichrostachyde, et injuncta Darlingtonia emendat. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 44.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Eumimosear.
Synon. Acuan Med.; Darlingtonia DC.; Desmanthea DC.; Desmantha Endl.

Desmarestella Bory 1825. Dict. class. V. p. 438: nov. g. ex typo Confervae confervicolae Dillw. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 709.
Duby 1833. Mém. soc. Genèv. V. p. 341: g. Ceramiear.
= Leiblinia Endl.

Desmarestia*) Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 43: nov. g. Fucacear. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 104. — Par. Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 358. — Endl. 1836. Gen. n. 111. p. 10; 1841. Ench. p. 8.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 387: g. Fucoidear.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 140: g. Dictyoteis aff.?
Grev. 1830. Alg. brit. p. 36. (Synops. p. XXXIX).
Menegh. 1838. Cenni p. 41: g. Sporochnoidear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 395; 1841. Brit. Alg. p. 25. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 43. — Endl. 1843. Spl. III. p. 28. n. 114. Sect.: Desmarestia, Desmia. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 186. Sect.: Dichloria, Desmia.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330 (Flora 1843. p. 93): g. Laminariear. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 123. (?)

*) Dicat. A. G. Desmarest.

Desmarestia Lamx. cont.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 10: g. Arthrocladiear. (?) — Par. J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 65.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phyc. gener. p. 343; 1845. Phyc. germ. p. 274; 1849. Sp. Alg. p. 570. n. 379: g. Sporochnear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 348. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56. — Math. 1853. Belg. II. p. 494 *(Desmaretia).*
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Sporochnidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 709: g. sedis incertae.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 76; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 217: g. Sporochnacear.
Synon. Desmia Lyngb.; Dichloria Grev.; Trinitaria Bory; Hyalina, Hippurina et Flagellaria Stackh.; Phymatium Link?

Desmarestia Post. & Rupr. 1840. Illustr. Alg. 13: g. restrictum.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 757: g. Sporochnidear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 28. n. 114 *a:* sect. Desmarestiae.

Desmaretella „Bory" Endl. in synon. Leibliniae: vid. *Desmarestella Bory.*

Desmaretia Mathieu vid. *Desmarestia Lam.*

Desmatodon*) Brid. 1822. Meth. musc. p. 86: nov. g. Peristomor. acrocarpor. (Dicranum latifolium Hedw.)
Agdh. 1821. Aphor. p. 107: g. Muscor. — Par. Leman 1823. Dict. v. 26. p. 329 *(Ligatula).*
Brid. 1826. Bryol. I. p. 523: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIV g. Trichostomoideor.)
Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 632: g. Trichostomeor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Desmatodontoidear.
Endl. 1836. Gen. n. 533. p. 51; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 911: g. Calyptrobryor.
Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. 18. — 20: g. Trichostomacear., serius (II. p. III) Pottiacear.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 94: g. Trichostomear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 108. — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 710; 1849. ibid. VIII. p. 401. — Bayrh. 1849. Taun. p. 8. — Wils. 1855. in Hook. f. N. Zeal. II. p. 76.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 588: sect. Trichostomi.
Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 374: g. Pottiacear.
Synon. Swarzia Brid.; Barbulae sp. Auct.

Desmatodonteae Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 41: fam. Muscor. Gen. hercyn.: Barbula, Trichostomum.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 95: sect. Stegocarpor. Subsect.: Pottiaceae, Trichostomeae, Distichiaceae.

*) δέσμα, vinculum.

Desmatodontoideae Fürnrohr 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: fam. 2. Muscor. Gen.: Pottia, Entosthymenium, Anacalypta, Trichostomum, Desmatodon, Barbula, Syntrichia; Pilopogon? Zygotrichia?

Desmazierella M. A. Libert 1829. Ann. sc. nat. XVII. p. 82. t. 6: nov. g. Fungor. (D. acicola.) *Cf.* Isis 1834. p. 1056.
  Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.

Desmazieria Montagne 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 303: nov. g. Lichenum. (Usnea homalea Fr.)

Desmia*) Lyngbye 1819. Tent. Hydrophyt. dan. p. 33: nov. g. Phycoidator. (Fucus ligulatus Lightf.)
  Post. & Rupr. 1840. Illustr. Alg. p. 13: g. Sporochnoidear.
  Endl. 1843. Spl. III. p. 28. n. 114 *b*: sect. Desmarestiae. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 186. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 582.
    Synon. Herbacea Stackh.

Desmia**) D Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 153: nov. g. Ericear. normalium. (Erica conferta Andr.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 807.
  Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 615: subsect. Ectasis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *a* 2. p. 1411; 1841. Ench. p. 369. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4887. 1. *b*.

Desmidia Brébiss. vid. *Desmidium Agdh.*

Desmidiaceae Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 591: div. Diatomear. Series: *liberae* (gen.: Trochiscia, Closterium, Heterocarpella, Micrasterias, Scenedesmus, Biddulphia), *inclusae* (gen.: Echinella, Geminella, Gloeonema, Desmidium).
  Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 194: trib. Phycear. Gen.: Closterium.
  Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 100: ordo Algar. unicellularium. Gen.: Pleurotaenium, Closterium, Mesotaenium, Dysphinctium, Euastrum, Phycastrum, Desmidium.
  Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 7: ordo Chlorospermear.

Desmidieae Endl. 1836. Gen. p. 3; 1841. Ench. p. 2: subordo Diatomacear. Trib.: Micrasterieae, Echinelleae.
  Menegh. 1838. Cenni p. 34: fam. Algar. Gen.: Trochiscia, Closterium, Cosmarium, Staurastrum, Sphaerastrum, Micrasterias, Scenedesmus, Biddulphia, Sphaerodesmus, Pleurococcus, Desmidium, Echinella, Geminella.
  Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 406: trib. Diatomacear. Gen. cap.: Meloseira. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 15. 194. Gen. id. et Desmidium.
  Menegh. 1840. Linnaea XIV. p. 202. Divis.: *inclusae* (p. 202. Gen.: Desmidium, Isthmia, Scenedesmus, Pediastrum, Gonidium), *nudae* (p. 214. Gen.: Micrasterias, Cosmarium, Xanthidium, Staurastrum, Closterium, Sphaerastrum, Trochiscia).

*) δεσμός, vinculum, ligula.
**) δέσμη, fasciculus.

Desmidieae Endl. cont.
  Rchb. 1841. Nom. p. 19: subdiv. Diatomear. Gen. ut Menegh.
  Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. p. 57 (Flora 1843. p. 467): trib. Desmidioidear. Gen.: Desmidium, Isthmia.
  Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 83; 1843. Phyc. gener. p. 159: fam. Chamaephycear. Gen.: Closterium, Microtheca, Pentasterias, Euastrum, Xanthidium, Staurastrum, Crucigenia, Merismopoedia, Scenodesmus, Tessarthra, Micrasterias, Sphaerastrum, Gomphosphaeria, Desmidium, Didymoprium. — Par. Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 128. Gen.: Trochiscia, Tetraedron, Pithiscus, Closterium, Stauroceras, Microtheca, Euastrum, Phycastrum, Scenodesmus, Grammatonema, Hyalotheca, Isthmosira, Didymoprium, Desmidium, Eucampia, Geminella, Merismopoedia, Pediastrum, Sphaerastrum, Rhaphidium, Sorastrum. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 162. Gen. ead. et Penium, Polysolenia, Polyedrum, Micrasterias, Cosmarium, Arthrodesmus, Xanthidium, Zygoxanthium, Asteroxanthium, Stephanoxanthium, Spondylosium, Monactinus?, Staurogenia, Coelastrum, Oocardium.
  Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . . : fam. unica Algar. figuratar.
  Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: subordo Diatomacear. Gen.: Pentasterias, Xanthidium, Euastrum, Odontella, Closterium, Tetmemorus, Micrasterias, Staurastrum, Pediastrum, Sphaerastrum, Helierella, Crucigenia, Selenaca, Heliactis, Scenedesmus, Tessarthra, Echinella, Desmidium.
  Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 51: fam. Schizophycear. Gen.: Lithodesmium, Ampitetras, Sphaerastrum, Sorastrum, Raphidium, Merismopoedia, Closterium, Micrasterias. Euastrum, Xanthidium, Arthrodesmus, Tessararthra, Staurastrum, Pentasterias, Desmidium, Didymoprium, Geminella, Grammonema, Bambusina, Hyalotheca.
  Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 99: trib. Schimatothallar. Gen.: Gymnodesmus, Gymnozyga, Sphaerozosma, Desmidium.
  Brébiss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 710: trib. Algar. synsporear. Gen.: Desmidium, Hyalotheca, Spondylotium, Scenedesmus, Ankistrodesmus, Pediastrum, Micrasterias, Cosmarium, Staurastrum, Closterium, Penium, Spirotaenia, Docidium, Trochiscia.
  Math. 1853. Belg. II. p. 524: trib. 26. Algar. Gen.: Closterium, Stauroceras, Micrasterias, Penium, Evastrum, Cosmarium, Phycastrum, Scenodesmus, Pediastrum, Sphaerastrum.

Desmidioideae Trevisan 1842. Prosp. fl. Eugan. p. 57 (Flora 1843. p. 467): subordo Ulvacear. Tribus: Desmidieae, Pediastreae, Micrasterieae.

Desmidium Agardh 1824. Syst. Alg. p. xv. 9; 1832. Consp. Diatom. p. 56: nov. g. Diatomear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 757. n. 3861.
  Fries 1825. Pl. homon. p. 354: g. Fragilarinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 453.

Desmidium Agardh cont.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 118: g. Temachinor.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 613: g. Desmidiacear. (inclusar.) — Par. Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 130.
Endl. 1836. Gen. n. 24. p. 3; 1841. Ench. p. 2: g. Echinellear.
Menegh. 1838. Cenni p. 34; 1840. Linnaea XIV. p. 402: g. Desmidiear. (inclusar.) — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 196. — Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 657. — Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. p. 57 (Flora 1843. p. 467); 1848. Alghe coccot. p. 99. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phyc. gener. p. 165; 1845. Phyc. germ. p. 141; 1849. Sp. Alg. p. 190. n. 142. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 56. — Brébiss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 710 *(Desmidia)*.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 11: g. Algar. polycytidear. homoeocytidear. synechocytidear.

Desmidochus „Ehrenb." Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3412: g. Stapeliear.
Bartl. 1830. Ord. p. 202: g. Asclepiadear.
= seq.

Desmidorchis*) Ehrenb. 1829. Linnaea IV. p. 94. (Nomen. *Cf. praec.)*
Decne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 265: g. Asclepiadear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5019: g. Stapeliear. genuinar?
= Boucerosia Wight & Arn.

*Desmiospermeae***) Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 7: series Rhodospermear. Ordines: Rhodomelaceae, Laurenciaceae, Corallinaceae, Sphaerococcoideae, Gelidiaceae, Spongiocarpeae, Squamarieae, Helminthocladeae, Wrangeliaceae.

Desmocarpus Wallich 1832. Catal. n 6978: nov. g. ex typo Cadabae triphyllae Wight.
Endl. 1839. Gen. n. 4993 *b*. p. 892; 1841. Ench. p. 456: sect. Cadabae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 186. n. 7119. 2.

Desmocephalum Hook. f. (Proc. Linn. Soc. nr. 28. p. 277) 1846. Linn. Trans. XX. p. 208: nov. g. Melampodinear., Elvirae aff.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 310: g. Compositar. tubuliflorar. (?), incomplete descriptum.

Desmochaeta DC. 1813. Catal. h. Monsp. p. 101: novum nomen pro *Pupalia Juss.* (nec *Pupal-walli Rheede)*.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 316; 1825. Syst. I. p. 817. n. 926; 1830. Gen. I. p. 199. n. 1011: g. Amarantear.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 106: g. Amarantacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLVI. 549. n. 1042. — Link 1821. En. I. p. 154. — Agdh. 1825. Aphor. p. 220. — Mart. 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 320. — Bartl. 1830. Ord. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 249.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Amaranthear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 865.

*) δεσμίς, fasciculus.
**) δέσμιος, vinctus.

Desmochaeta DC. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4373: g. Achyranthear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 103. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511.
Endl. 1837. Gen. n. 1970. p. 303; 1841. Ench. p. 185: g. Desmochaetear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231). — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6418.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 331: sect. Pupaliae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1046.

Desmochaeta HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 210: g. Amaranthacear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 12.
= Cyathula Lour.

Desmochaeteae Endl. 1837. Gen. p. 303; 1841. Ench. p. 185: subdiv. Achyranthear. Gen.: Digera, Desmochaeta, Pupalia. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231). Gen. ead. et Saltia?, Polyscalis? — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 323. Gen.: Digera, Saltia, Pupalia; Cyathula.
Rchb. 1841. Nom. p. 165: subsect. Achyranthear. Gen.: Albersia, Scleropus, Polyscalis, Saltia, Pupalia, Desmochaeta, Digera.

Desmocladus Nees 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 56: nov. g. Restiacear. (Restio fasciculatus R. Br.) — Par Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 892. — Steud. 1855. Glum. II. p. 249.

Desmocybe Rchb. vid. *Dermocybe Fries.*

Desmodium Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 122: nov. g. Leguminosar. (Hedysarum asperum Poir., etc.) *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 109. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 592. n. 2921.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 527: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 137.
= Desmodii DC. pars.

Desmodium DC. 1825. Prodr. II. p. 325 (Lég. mém. VI.): g. emendat. Euhedysarear. Sect.: Eudesmodium, Pleurolobium, Chalarium. — Par G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 288. Sect. eaed. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 223. Subgen.: Dendrolobium, Desmodium. — Meisn. 1837. Gen. p. 91 (65). — Endl. 1841. Gen. n. 6615. p. 1285; 1841. Ench. p. 670. Sect. ut DC. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 427. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 712.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4000; 1841. Nom. p. 152. n. 5961: g. Onobrychear. Sect. ut DC. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 284.
Link 1831. Hdb. II. p. 212: g. Hedysarear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 357. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 130. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Synon. Desmodium et Hedysarum Desv.; Hedysari sp. Linn.

Desmodium Benth. 1852. Pl. Jungh. Fasc. II. p. 220: g. ampliat. Hedysarear. Sect.: Leptodesmia?, Sagotia, Nicolsonia, Pleurolobium, Heteroloma, Scorpiurus, Chalarioides, Chalarium, Dollinera, Podocarpium, Nephromeria. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 235. Sect. fere eaed. *Cf.* Müll. Ann.

Desmodium Benth. cont. bot. IV. p. 537. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 202. Sect. nova: Haplarthron.
Synon. Onobrychis Burm.; Desmodium DC. (exclusis paucis); Nicolsonia DC.; Ototropis Nees; Dollinera Endl.; Codariocalyx Hassk.; Cyclomorium Walp.

Desmodophyllum Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 244; 1846. Chlor. prot. p. LXXXV: g. Papilionacear. foss.

Desmoncus*) Martius 1824. Palm. fam. p. 20; 1824. Palm. fasc. III. p. 85. t. 68. 69. 71. 89 (*cf.* Isis 1825. p. 873): nov. g. Cocoinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1630; 1841. Nom. p. 58. n. 2267. — Endl. 1837. Gen. n. 1764. p. 254; 1841. Ench. p. 136. — Kunth 1841. Enum. III. p. 258. — Meisn. 1842. Gen. p. 358 (267).
Spreng. 1826. Syst. III. p. 772. n. 3067; 1831. Gen. II. p. 683. n. 3442: g. Palmar. (in Monoec. Androgyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 65.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 16: g. Cocoinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 63.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Cocoëar.
Synon. Atitara s. Jatitara Marcgr.

Desmonema Rafin. 1833. Atlant. journ. Nr. 6. p. 23: nov. g. Euphorbiae et Tragio aff. *Cf.* Meisn. 1841. Comm. p. 250.

Desmophlebis Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 72: g. Filicum foss. (*Diplazites Göpp.*)

Desmophyllum Webb & Berth. 1836. Phytogr. Canar. I. p. 15: nov. g. Rutacear. (Ruta pinnata L.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 92. n. 6027 *a:* sect. Rutae.
Synon. Ruteria DC.

Desmopus Fries 1818. Obs. mycol. II. p. 26: trib. Cortinariae. (Agaricus fascicularis, lateritius, etc.)

Desmos**) Loureiro 1790. Fl. Cochinch. I. p. 352. Ed. Willd. p. 430: nov. g. Polyandr. Polygyn. (D. cochinchinensis et chinensis. — „Descriptio generis convenit cum Unona Linn." Willd. in adnot.)
DC. 1818. Syst. I. p. 491; 1824. Pr. I. p. 91: sect. Unonae. — Par. Blume 1825. Bijdr. Nr. 1. p. 15. — Poir. 1828. Dict. v. 56. p. 282. — Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5006 *b.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 95. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 131. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 65. — Zolling. 1858. Linnaea XXIX. p. 319.

Desmosanthes Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 313: sect. Diphyis. (D. crocea, angustifolia, sulcata, capitata, obtusa.)

Desmoscelis***) Naudin 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 29: nov. g. Lasiandralium. (Chaetogastra hypericoides DC.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 552.

Desmoschoenus Hook. f. 1853. Fl. New-Zeal. I. p. 271: nov. g. Cyperacear. (Isolepis spiralis Rich.)

Desmostachys Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. IX. p. 222. 398: nov. g. Icacinear.

Desmostemoneae Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 339. 345; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 349: trib. Hypericacear. Sect.: Vismineae, Tridesmineae, Elodeineae.

Desmotrichum Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 329: nov. g. Orchidear. (Dendrobii sp. Sw.)
Rchb. f. 1849 in Walp. Ann. bot. I. p. 778: sect. Dendrobii.
= Dendrobii Swartz pars.

Desmotrichum Léveillé 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 217: nov. g. Hyphomycetum, Haplariae aff. (D. simplex.) *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 647.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 464: g. Cephalosporeor.

Desmotrichum Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 244: nov. g. Ulvacear. (Diplostromium tenuissimum Kütz. ex parte.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 470. n. 291: g. Ectocarpear.
= Heterophycus Trevis.

Despretzia*) Kunth 1830. Gram. p. 485. t. 157: nov. g. Poacear.? (D. mexicana.)
Kunth 1833. Agrost. p. 39: g. Phalaridear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 759. p. 82; 1841. Ench. p. 57. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1240. — Meisn. 1843. Gen. p. 415 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 239 (*Depretzia*): g. Phalaroidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.
= Zeugites Trin.? (Steud. Glum. I. p. 411.)

Dessenia Adans. 1763. Fam. II. p. 285: g. Thymelaear.
= Gnidia Linn.

Destructorii Rchb. 1828. Consp. p. 5: subdiv. Byssaceor. spurior. Gen.: Lepraria, Mycinema.
Endl. 1836. Gen. p. 20; 1841. Ench. p. 15: sect. Byssor. Genus unicum: Mycinema.
Rchb. 1841. Nom. p. 3: sect. Byssaceor. Gen.: Mycinema, Tophora, Byssus, Rhacodium, Dichonema?, Rhizomorpha. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 60. Gen.: Ozonium, Fibrillaria, Byssus, Dematium, Rhizomorpha.

Destrugesia Gaudich. Voy. Bonite t. 57: g. Capparidear. (indescriptum: Walp. 1846. Rep. V. p. 55.)

Desvauxia**) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 252. Ed. Nees p. 108: nov. g. Restiacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 188. — Agdh. 1823. Aphor. p. 157. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Mart. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 60. t. 2. f. III.
„Palis. mss." Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 39: g. Eriocaulonear.

*) ὄγκος, uncus.
**) δεσμός, catena.
***) σκελίς, perna.

*) Dicat. Despretz, physico gallico.
**) Dicat. Desvaux, auctori dissertationum de Junceis.

Desvauxia R. Brown cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 36: g. Desvauxiear. — Par. Nees 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 70. — Steud. 1855. Glum. II. p. 266.
= Centrolepis Labill. *(Cf. Devauxia.)*

Desvauxiaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 386) 1847. Veg. kingd. p. 120: ordo Glumalium. Gen.: Aphelia, Alepyrum, Centrolepis, Gaimardia.
= seq.

Desvauxieae Bartl. 1830. Ord. nat. p. 36: div. Restiacear. Gen.: Aphelia, Desvauxia, Alepyrum.
Lindl. 1833. Nix. p. 23. Ed. germ. p. 36: ordo Glumacear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 266. Gen. ut Bartl. et Gaimardia.
Mart. 1835. Consp. p. 8: ordo 38.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 140: trib. Restiacear. Gen.: Aphelia, Alepyrum, Centrolepis, Gaimardia.
= Centrolepideae Desv., Endl.

Detarieae DC. 1825. Prodr. II. p. 521 (Lég. mém. XIII): trib. Caesalpiniear. Gen.: Detarium, Cordyla. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 107. 425. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 100 (71). Gen. ead.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: div. Amygdalear. Gen. ead.
Rchb. 1828. Consp. p. 156: div. Mimosear. Gen. ead.
Rchb. 1837. Hdb. p. 228; 1841. Nom. p. 156: div. Mimosacear. Gen. ead.
Endl. 1841. Gen. p. 1322: fam. Swartziеis aff. Gen. ead.
Endl. 1841. Ench. p. 681: subordo Swartziear. Gen. ead.

Detarium*) Juss. 1789. Gen. p. 365: nov. g. Leguminosar. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 462. n. 1030. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 244. — Hedw. 1806. Gen. p. 323. n. 1276. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 111. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 369. n. 1863. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1516.
Gmel. 1791. Syst. p. 700: g. Decandr. Monogyn. — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 158.
Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 521: g. Detariear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV; 1828. Consp. p. 156. n. 4155; 1841. Nom. p. 156. n. 6113. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 465. — Guill. & Perr. 1833. Fl. Seneg. I. p. 269. t. 60. — Meisn. 1837. Gen. p. 100 (71). — Endl. 1841. Gen. n. 6816. p. 1322; 1841. Ench. p. 681. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 714.
Bartl. 1830. Ord. p. 417: g. Mimosear. desciscens.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 131: g. Caesalpiniear. verar.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Cynometrear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.

*) Nomen vernaculum *Detar*.

Dethardingia*) Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 80: novum nomen pro *Dufourea Kunth* propositum.
= Dufourea Kunth.

Dethawia Endl. 1839. Gen. n. 4435. p. 775; 1841. Ench. p. 379: g. Seselinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5427. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 706.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.
= Wallrothia Spreng.

Detridium Nees 1833. Gen. et sp. Aster. p. 255: nov. g. Asterum cinerariformium. (Cineraria Bergiana Spr.)
DC. 1836. Pr. V. p. 223: sect. Agathaeae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2299 *a*. p. 373; 1841. Ench. p. 234.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Asterear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3292. 1: sect. Detridis.
Synon. Detrioides Less.

Detrioides Lessing 1832. Syn. Compos. p. 182: subg. Elphegeae.
= Detridium Nees.

Detris Adans. 1763. Fam. II. p. 131: g. Bidentium.
Less. 1832. Syn. p. 168: subg. Asteris.
DC. 1836. Pr. V. p. 223: sect. Agathaeae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2299 *b*. p. 373; 1841. Ench. p. 234.
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3292. 2: sect. Detridis.
Synon. Agathaea Nees; Cinerariae et Asteris sp. Aust.

Detris Rchb. 1841. Nomencl. p. 85. n. 3292: g. Asterear. genuinar. Sect.: Detridium, Detris.
= Agathaea Cass.

Deutzia**) Thunb. 1781. Diss. nov. gen. I. p. 19; 1784. Fl. jap. p. 10: nov. g. Decandr. Trigyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 425. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 305. n. 776. — Gmel. 1791. Syst. p. 722. — Pers. 1797. Syst. p. 456. — Willd. 1799. Sp. II. p. 730. n. 899. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 368. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 118. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 383. n. 1703; 1830. Gen. I. p. 376. n. 1899. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1584.
Juss. 1789. Gen. p. 431: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 330. n. 1300.
Neck. 1790. El. III. p. 359. n. 1789: g. Catotaphytor.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 30. t. 184.
Pers. 1805. Ench. I. p. 505. n. 1122: g. Caryophyllear.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 657: g. Caprifoliear.
Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4218; 1841. Nom. p. 158. n. 6163: g. Philadelphear. (?) — Par. D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. VIII. p. 169. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 808. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 18. — Meisn. 1838. Gen. p. 109 (78). — Endl. 1840. Gen. n. 6107. p. 1187;

*) Dicat. G. G. Detharding, Rostock.
**) Dicat. Joh. Deutz, Amstelodam.

Deutzia Thunb. cont.
1841. Ench. p. 636. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 107.
DC. 1830. Pr. IV. p. 16: g. Hydrangeear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 230.
Zucc. 1835 in Sieb. fl. japon. p. 17. t. 6—8: g. Hydrangiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 753: g. Philadelphacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 715.

Devauxia Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 119: g. Restiacear. — Par. Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 419. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 272.
Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41: g. Centrolepidear.?
= Desvauxia R. Brown.

Devauxia Palis. mss.
= Glyceria Link.

Devauxiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62. 63: fam. Phylidrariear. Gen.: Devauxia, Alephia, Alepyrum.
= Centrolepideae Desv.

Deverra*) DC. 1829. Coll. mém. V. p. 45; 1830. Prodr. IV. p. 143: nov. g. Seselinear. Sect.: Deverraria, Pithuranthos. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 307. Sect. eaed. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 140. n. 5419. Sect. (1841): Deverra, Pithyranthus. — Meisn. 1838. Gen. p. 144 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4427. p. 774; 1841. Ench. p. 378. Sect.: Deverraria, Pithyranthus. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 954. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 68.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Deverraria DC. 1830. Prodr. IV. p. 143: sect. Deverrae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 307. — Endl. 1839. Gen. n. 4427 *a*. p. 774; 1841. Ench. p. 378.

Deveya Rchb., Meisn. vid. *Deweya Torr. & Gray.*

Devillea Bert. mss.
= Caraguata Plum.

Devillea**) Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 107; 1852. Arch. Mus. VI. p. 156; 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIII. p. 261: nov. g. Podostemonear. (D. flagelliformis.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 440. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 787.

Deweya***) Torrey & Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 641: nov. g. Smyrniear. (Ligusticum argutum Nutt.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5365 (*Deveya*). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 715.
Endl. 1841. Spl. I. n. 4543/$_2$. p. 1414; 1841. Ench. p. 380: g. Smyrnear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 427.
Meisn. 1843. Comm. p. 359 (*Deveya*): g. Cachrydear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 15: g. Eusmyrnear.

Dewisia Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 84): sect. Cyperi. (C. diandrus, Nuttalli.)

*) „Deverra erat veteribus Dea scoparum."
**) Dicat. Emilio Deville, Castelnaviae comiti.
***) Dicat. prof. C. Dewey.

Deyeuxia*) „Clarion" Palis. 1812. Agrost. p. 43. t. 9. f. 9. 10: nov. g. Graminear., ab Arundine Auct. separat. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 24. 422. n. 259. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 120. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 253. n. 263; 1830. Gen. I. p. 59. n. 291. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 298.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 143; 1822. Syn. I. p. 208: g. Avenacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 158. — Agdh. 1823. Aphor. p. 149.
Trin. 1820. Fund. p. 109: sect. Arundinis.
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 908 *b*: sect. Calamagrostidis. — Par. Koch 1837. Syn. p. 785. Ed. II. p. 906. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 388. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 426. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 477.
Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Agrostidear. — Par. Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 147.
Kunth 1833. Agrost. p. 239; 1838. Berol. II. p. 374: g. Arundinacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 818. p. 90; 1841. Ench. p. 58. (*Cf.* Endl. Spl. III. n. 818 et 818/$_1$.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 135. 323. — Meisn. 1843. Gen. p. 420 (321). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 162.
Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1185: g. Arundinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Synon. Graphidium Gaudich.

Diabasis DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 297: sect. Matricariae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1384. n. 2669 *a*/$_1$. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 200.
Endl. 1841. Ench. p. 241. n. 2667 *b*: sect. Leucanthemi.
Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3066. 1 *a*: subsect. Anactideae.

Diacaccarpium Endl., Rchb., vid. *Diacicarpium Blume.*

Diacalpe**) Blume 1830. Enum. pl. Jav. II. p. 241: nov. g. Polypodiacear. (D. aspidioides.)
Presl 1836. Pterid. p. 245: inter genera minus nota.
Endl. 1836. Gen. n. 648. p. 63; 1841. Ench. p. 37: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1039.
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 190: g. Aspidiear.
Meisn. 1843. Gen. p. 434 (334): g. Dicksoniear. — Par. Fée 1852. Gen. Fil. p. 338.
Hook. 1844. Spec. Fil. p. 58. (Gen. Fil. p. 99): g. Woodsiear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 99: g. Aspidiacear.

Diacantha Lagasca 1811. Amen. nat. I. p. 41: nov. g. Chaenanthophorar.
Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 132: g. Carlinear.

*) Dicat. Deyeux, botanico gallico.
**) χάλπη, amphora.

Diacantha Lagasca cont.
Cass. 1827. Dict. v. 47. p. 499; 1830. v. 60. p. 570: g. Barnadesiear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9.
Barnadesiae sect. Diacanthoides DC.?

Diacantha Lessing 1830. Linnaea V. p. 243; 1832. Syn. Compos. p. 94: g. restrict. Mutisiear. (Barnadesia arborea Kunth). — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 718.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 3: sect. Barnadesiae.
Endl. 1838. Gen. n. 2900. p. 481; 1841. Ench. p. 247: g. Barnadesiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3802. — Walp. 1843. Rep. II. p. 678. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.

Diacanthoides DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 2: sect. Barnadesiae.
= Eubarnadesia Endl.

Diacecarpium Hassk. vid. *Diacicarpium Blume.*

Diachea*) Fries 1819. Nov. fl. Suec. V. p. 80: nov. g. Fungor. (Stemonitis elegans Trent.)
Fries 1821. Syst. mycol. I. p. L: g. Trichocistor.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 143: g. Trichiaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 186; 1841. Nom. p. 9. n. 360.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 155; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 455: g. Stemoniteor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 313. p. 26; 1841. Ench. p. 17. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 270.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 772. n. 3966: g. Trichogasterum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 385: g. Angiogasterum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 21. 60; 1842. Mycol. p. 86: g. Stemonitidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: g. Podaxineor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 216: g. Stemonitideor.

Diacicarpium Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 657: nov. g. Caprifoliear., Schöpfiae Schreb. forsan nimis affine. *Cf.* Endl. Gen. p. 745 (*Diacaecarpium*).
Meisn. 1838. Gen. p. 154 (111): g. Caprifoliacear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5285 (*Diacaecarpium*): g. Symplocear.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 169 (*Diacecarpium*): g. Loranthacear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 444 (*Diacaecarpium*).
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 12. 21: g. Olacear.
= Marlea Roxb. (Endl. Suppl. III. p. 101.)

Diacidia**) Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. Fasc. XXI. p. 179: nov. g. Malpighiear., Meckeliae proximum.

*) „Nomen ob mucilaginem maxime sese diffundentem imposuimus".
**) δίς, ἀκίς, arista.

Diacmandra Ledeb. 1848. Fl. Ross. III. 1. p. 303: subg. Pedicularis. (P. grandiflora Fisch.)

Diacoria Endl. 1841. Ench. p. 319. n. 3738 *d:* sect. Cordiae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 629: g. Cordiacear.

Diacrium Lindl. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 81; 1853. Fol. Orchid. 10 Jan. p. 26: subg. Epidendri. *Cf.* Endl. Spl. II. p. 16. n. 1371 *d.*

Diactinium A. Braun 1855. Alg. unicell. gen. (?): sect. Pediastri.

Diadelphia Linn. Syst., Gen., Spec., sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. XVII. plantar. Ordines: Hexandria, Octandria, Decandria. *Cf.* A. Rich. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 719.

Diadema Benth. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 583: sect. Ingae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 625.

Diadena „Palis." Endl. Gen. Suppl. III. p. 14 in synon. Zygnematis: vid. *Diadenus Palis.*

Diadenia Wittst. vid. *Diadenus Palis.*

Diadenium Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 41. t. 71: nov. g. Orchidear. (D. micranthum.)
Endl. 1837. Gen. n. 1453. p. 202; 1841. Ench. p. 111: g. Vandear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2057. — Meisn. 1842. Gen. p. 375 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Ionopsidar.

Diadenus „Palis. Mém. Inst. inéd." Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 124: nov. g. Trichomatar. (Conferva atropurpurea Roth.) *Cf.* Leman 1829. Dict. v. 13. p. 137 et Wittst. Etym. Handw. p. 273 (*Diadenia*).
= Bangia Lyngb.

Diadesmis Kütz. 1844. Bacill. p. 109; 1849. Sp. Alg. p. 95. n. 50: nov. g. Naviculear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Stauroneidear.
Rabenh. 1853. Süssw. Diatom.: g. Naviculacear.

Diafnia Presl 1850. Epimel. bot. p. 479: sect. Blechnopsidis. (Blechnum serrulatum Rich.)

Diagramma Blume 1830. Enum. pl. Jav. II. p. 118: sect. Grammitidis. (G. heterocarpa, vulcanica, membranacea, macrophylla.)
Endl. 1841. Ench. p. 36. n. 609 *a:* sect. Selligueae.
Synon. Selliguea Presl.

Diagramme „Blume" Endl. in synon. Selligueae: vid. *praeced.*

Diales Batsch 1802. Tab. affin. p. 121: ordo Liliacear. Fam.: Potamea, Hydrocharides, Ephemera.

Dialesta*) HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 44. t. 320: nov. g. Vernoniacear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 375. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 720.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 673. n. 2916; 1831. Gen. II. p. 649. n. 3272: g. Syngenes. desciscent.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 342; 1830. v. 60. p. 586: g. Elephantopear.

*) δίς, bis; ἀλέστης gluma.

Dialesta HBK. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2196: g. Eupatorinar.
Less. 1829. Linnaea IV. p. 315; 1832. Syn. p. 146: g. Vernoniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 136. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39. (verar.)
DC. 1838. Pr. V. p. 76: g. Heterocomear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2219. p. 360; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 177 (123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3883: g. Pacourinear.
Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 502: subg. Oliganthis. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 383.

Dialissa Lindl. 1844. Ann. and Mag. n. h. XIV. p. 106: nov. g. Orchidear., Stelidi aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Pleurothallidar.

Dialium*) Linn. 1767. Mant. p. 3. n. 1240; 1767. Syst. ed. XII. p. 56: g. Diandr. Monogyn. (*Cf.* Afzel. 1806 in Schrad. n. Journ. II. 2. p. 233 sub Codario.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 55; 1784. Syst. p. 57. — Reich. 1778. Gen. p. 11. n. 23. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 14. n. 29. — Gmel. 1791. Syst. p. 27. — Pers. 1797. Syst. p. 57; 1805. Ench. I. p. 9. n. 41. — Willd. 1797. Sp. I. p. 49. n. 39. — Vahl 1805. En. I. p. 303. n. 65. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 339. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 60. 282. n. 108. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 139.
Scop. 1777. Intr. p. 99: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 424: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 19. 351.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 775: g. Capparidum.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsiear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 94. n. 119: g. Capparidear.
DC. 1825. Pr. II. p. 520: g. Geoffrear.
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4103; 1841. Nom. p. 154. n. 6051: g. Ceratoniear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 29. n. 128: g. Leguminosar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 104.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 465: g. Cassiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 100 (71).
Guill. & Perr. 1833. Fl. Seneg. I. p. 267: g. Mimosear. *Cf.* A. Braun 1834. Flora Lit. IV. p. 21.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 130: g. Caesalpiniear. (verar.) — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6805. p. 1320; 1841. Ench. p. 675. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 133. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 720.
Benn. 1838 in Horsf. pl. jav. rar. p. 136. t. 30. (D. indum L.)
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Cynometrear. (injuncto Codario Sol.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 78.
Synon. Arouna Aubl.; Aruna Schreb.; Cleyria Neck.

*) Apulejo eadem herba, quae heliotropium.

Dialium Willd. 1796 in Römer Archiv I. p. 31. t. 6.
Guill. & Perr. 1833. Fl. Seneg. t. 59.
= Codarium Sol.

Dialla Lindl. vid. *Dicella Griseb.*

Dialypetalae Endl. 1839. Gen. p. 762; 1841. Ench. p. 375: cohors IV. Acramphibryor. Classes: Discanthae, Corniculatae, Polycarpicae, Rhoeades, Nelumbia, Parietales, Peponiferae, Opuntiae, Caryophyllinae, Columniferae, Guttiferae, Hesperides, Acera, Polygalinae, Frangulaceae, Tricoccae, Terebinthineae, Gruinales, Calyciflorae, Myrtiflorae, Rosiflorae, Leguminosae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. XXII. 74: series Angiospermar. A. *Hypogynae.* Class.: Guttiferae, Malvoideae, Crotonineae, Polygalineae, Geranioideae, Therebinthineae, Hesperideae, Aesculineae, Celastroideae, Violineae, Cruciferineae, Papaverineae, Berberineae, Magnolineae, Ranunculineae, Nympheineae, Piperineae, Urticineae, Polygonoideae. B. *Perigynae.* Class.: Caryophyllineae, Cactoideae, Crassulineae, Saxifragineae, Passiflorineae, Hamamelineae, Umbellineae, Santalineae, Asarineae, Cucurbitineae, Oenotherineae, Daphnoideae, Proteineae, Rhamnoideae, Myrtoideae, Rosineae, Leguminosae, Amentaceae.

Dialysex Moquin-Tand. 1840. Chenop. p. 64; 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 101: sect. Atriplicis. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 32. n. 1912 *c.*

Diamorpha*) Nuttall 1818. Gen. am. I. p. 293: nov. g. Octandr. Tetragyn. (Sedum pusillum Michx.)
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 161: g. Crassulear.
Elliott 1821. Sketch I. p. 528: g. Decandr. Pentagyn.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 260. n. 1512; 1830. Gen. I. p. 324. n. 1651: g. Sedear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231 (1328 *Dimorpha*).
DC. 1828. Pr. III. p. 414: g. Crassulacear. (anomalar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 310. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 125. (anomalar.) — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 73.
Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4193; 1837. Hdb. p. 230; 1841. Nom. p. 159. n. 6198: g. Penthorear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 135 (99).
Endl. 1839. Gen. n. 4624. p. 812; 1841. Ench. p. 405: g. Diamorphear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 561. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 726.

Diamorpheae Endl. 1839. Gen. p. 812; 1841. Ench. p. 405: subordo Crassulacear. Gen.: Diamorpha, Penthorum. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346. Gen. ead.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 561: trib. Crassulacear. Gen. ead.
= Penthoreae Rchb.

*) διαμόρφη, deformatio: a fructus formatione a reliquis Sempervivis abhorrente.

Diamoste*) Chamisso & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 6: sect. Stemodiae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3926 *b*. p. 679; 1841. Ench. p. 339. — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4622. 2. — Walp. 1845. Rep. III. p. 268. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 382.

Diamphora Martius 1821. Nov. Act. Leop. X. p. 510: nov. g. Fungor., Didymocrateri aff. *Cf.* Flora 1822. II. p. 428 et Leman 1828. Dict. v. 53. p. 439.
Link 1824. Spec. I. p. 100: g. Hyphomycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 531: g. Mucorear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 176; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 488: g. Mucoreor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 141.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 325: g. Mucorinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 250. p. 21; 1841. Ench. p. 15. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 242: g. Mucoroideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 18; 1842. Mycol. p. 71: g. Diamphorear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Crateromyceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 120: g. Crateromycetum.

Diamphoreae Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 18; 1842. Anl. Mycol. p. 71: sect. Mucoroidear. Gen.: Diamphora.

Diana Comm. mss. teste Juss.
= Dianella Lam.

Diandria Linn. Gen., Syst. et Spec., sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. II. plantar. Ordines: Mono-, Di-, Trigynia.

Dianella Lamarck 1786. Illustr. t. 250.
Juss. 1789. Gen. p. 41: g. Asparagor.
Batsch 1802. Tab. p. 140: g. Draconear.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 28: g. Thalamostemonis.
Pers. 1805. Ench. I. p. 372. n. 814: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Willd. 1809. En. p. 375. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 164.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 101: g. Smilacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 243. n. 985.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 279. Ed. Nees p. 135: g. Asphodelear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 229; 1825. Syst. II. p. 92. n. 1252; 1830. Gen. I. p. 261. n. 1357. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXVIII. 349. — Endl. 1833. Norf. p. 27. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1113.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 269: g. Asparagear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 276. — Agdh. 1823. Aphor. p. 162. (verar.) — Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 12. — Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Endl. 1837. Gen. n. 1160. p. 150; 1841. Ench. p. 84; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 39. — Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Brongn. 1843. En. genr. p. 18. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 215. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.

*) Anagr. Stemodiae.

Dianella Lamarck cont.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 162: g. Asparaginear. — Par. A. Rich. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 726.
Link 1821. En. I. p. 341: g. Asparaginar.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1393: g. Abamear.
Link 1829. Hdb. I. p. 186: g. Convallariacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1818: g. Dracaenear. — Par. Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 33; 1850. Enum. V. p. 43. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 559.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 255: g. Liliacear.
Synon. Diana Comm.; Excremis Willd.; Rhuacophila Blume.

Diangiae Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 49. 53: vid. *Plantae All.*

Diania Noronh. mss.
= Dicoryphe Pet.-Thouars. (Tulasne.)

Diantheae Rich. 1823. Dict. class. III. p. 238.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298; 1841. Nom. p. 205: subdiv. Caryophyllear. Sect.: *genuinae* (gen.: Banffya; Gypsophila, Heterochroa, Acanthophyllum, Saponaria, Tunica, Velezia, Dianthus; 1841 subsect.: Banffyeae, Saponarieae, Tuniceae), Sileneae, Lychnideae.
Kunth 1838. Fl. Berol. I. p. 106. Novum gen.: Kohlrauschia.
Endl. 1840. Gen. p. 970; 1841. Ench. p. 505: trib. Silenear. Gen.: Velezia, Dianthus. — Par. Braun 1843. Flora p. 377. Gen.: Acanthophyllum, Saponaria, Vaccaria, Gypsophila, Tunica, Dianthus, Velezia. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 225. Gen.: Saponaria, Gypsophila, Dianthus, Velezia.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 36: div. Silenear. Gen.: Saponaria, Dianthus, Tunica, Gypsophila.

Dianthera*) Gronov. 1742. Fl. Virgin. p. 6: nov. g. Diandr.
Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 13. n. 29; 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 7; 1753. Sp. I. p. 27; 1759. Syst. ed. X. p. 850. n. 37; 1762. Sp. ed. II. p. 24; 1764. Gen. ed. VI. p. 13. n. 28; 1767. Syst. ed. XII. p. 60: g. Diandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 60; 1784. Syst. p. 63. — Reich. 1778. Gen. p. 13. n. 29. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 21. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 17. n. 36. — Lour. 1790. Coch. I. p. 25. — Gmel. 1791. Syst. p. 35. — Pers. 1797. Syst. p. 64. — Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 10. t. 14—16.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 521.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Acanthor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 104.
Adans. 1763. Fam. II. p. 209: g. Personatar. — Par. Linn. 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 174. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.

*) δίς, ἀνθηρά, quare Beckmann (Lex. bot. p. 75) corrigere proponit: *Disanthera.*

Dianthera Gronov. cont.
Retz. 1775. Vet. Ac. Handl. p. 295.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 240. t. 51. f. 8 (malabarica).
Neck. 1790. El. I. p. 332. n. 517: g. Chasmatophytor.
Swartz 1791. Obs. bot. p. 13: Justiciae inserit.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 239: g. Acanthacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 348.
Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3112 *a:* sect. Justiciae.
Synon. Diplanthera Gled.; Diptanthera Schrank. (Steud.)

Dianthera Soland. mss.
= Dicliptera Juss. (teste R. Brown.)

Dianthinae DC. (citantibus Nonnullis): trib. Caryophyllear.
= Sileneae DC.

Dianthoides Endl. 1839. Gen. n. 3821 *d.* p. 657; 1841. Ench. p. 327: sect. Giliae. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179). — Benth. 1845 in DC. Pr. IX. p. 314.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 636: g. Polemoniacear.
Synon. Fenzlia Benth.; Rossmässlera Rchb.

Dianthoseris Schultz Bip. 1842. Flora II. p. 439: nov. g. Cichoriacear. imperfecte cognitum. — Par. Walp. 1847 Rep. VI. p. 367.

Dianthus*) Linn. 1737. Gen. p. 130. n. 364; 1737. Cliff. p. 164; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 104; 1753. Sp. I. p. 409; 1759. Syst. ed. X. p. 1029. n. 500; 1764. Gen. ed. VI. p. 225. n. 560; 1767. Syst. ed. XII. p. 307: g. Decandr. Digyn. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 228 (*Dyanthus*). — Murr. 1774. Syst. p. 348; 1784. Syst. p. 417. — Reich. 1778. Gen. p. 230. n. 614. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 303. n. 770. — Lour. 1790. Coch. I. p. 281. — Gmel. 1791. Syst. p. 710. — Pers. 1797. Syst. p. 446. — Willd. 1799. Sp. II. p. 671. n. 893; 1809. En. p. 465. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 286. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 446.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 94. n. 389: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Pracl. p. 349.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 330. — Juss. 1789. Gen. p. 302. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 245. — Batsch 1802. Tab. p. 34. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 116. — Pers. 1805. Ench. I. p. 493. n. 1116. — DC. 1805. Franç. IV. p. 739; 1815. V. p. 601. — Hedw. 1806. Gen. p. 329. n. 1296. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 831 (genuinar.); 1825. Syst. II. p. 375. n. 1697; 1830. Gen. I. p. 374. n. 1888. — Link 1821. En. I. p. 414. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 643. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 37. — Kunth 1824. Syn. III. p. 349. — Wahlenb. 1824. Succ. I. p. 267. — Lois. 1825. Dict. v. 35. p. 415 (*Oeillet*). — Gaud. 1828. Helv. III. p. 62. 144. — Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5358. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 134. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1543.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 134: g. Diplosantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 205: g. Pentapetalar.
Neck. 1790. El. II. p. 168. n. 873: g. Catotaphytor.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: g. Stellinear.
Seringe 1824 in DC. Pr. I. p. 355: g. Silenear. Sect.: Armeriastrum, Caryophyllum. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 144. Sect. eaed. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1832. Fl. exc. p. 803. — Bartl. 1830. Ord. p. 306. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 384. Sect. ut Ser. — Link 1831. Hdb. II. p. 235. — Koch 1836. Syn. p. 94. Ed. II. p. 102. Sect. eaed. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 147. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 195. — Fries 1842 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora I. p. 124. — Brongn. 1843. En. genr. p. 103. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 185. Sect.: Caryophyllum, Chamaegarophalon. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Dianthear. — Par. Kunth 1838. Fl. Berol. I. p. 106. Sejungitur Kohlrauschia. — Endl. 1840. Gen. n. 5244. p. 971; 1841. Ench. p. 505. Sect.: Caryophyllum, Kohlrauschia, Tunica, Pseudotunica. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 274. Sect. eaed. — A. Braun 1843. Flora p. 385. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 228. Sect.: Tunica, Kohlrauschia, Caryophyllum. — Willk. . . . . Ic. pl. Hisp. p. 25. Subgen.: Pseudodianthus, Eudianthus. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 264. Subgen. ead.
Webb 1836. Canar. I. p. 134: g. Caryophyllacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7824: g. Tunicear.
Synon. Caryophyllus Tourn.; Pleonanthus Ehrh. Cf. Tunica Rupp.

Diapasis Poir. vid. *Diaspasis R. Brown.*

Diapedium König ex Steud. Nomencl. I. p. 501. 504.
= Dicliptera Juss.

Diapensia*) Linn. 1737. Fl. lappon. p. 88; 1737. Gen. p. 52. n. 147; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 141; 1759. Syst. ed. X. p. 917. n. 177; 1762. Sp. ed. II. p. 202; 1764. Gen. ed. VI. p. 79. n. 194; 1767. Syst. ed. XII. p. 150: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 161; 1784. Syst. p. 191. — Reich. 1778. Gen. p. 81. n. 207. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 104. n. 255. — Gmel. 1791. Syst. p. 325. — Pers. 1797. Syst. p. 198; 1805. Ench. I. p. 185. n. 418. — Willd. 1797. Sp. I. p. 795. n. 290. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 122.

*) Contractum ex *Διόςανθος*, flos Jovis. (Ht. Cliff.)

*) Nomen antiquum Saniculae.

Diapensia Linn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 207. n. 858: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Preciar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 347.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Convolvulor.
Juss. 1789. Gen. p. 135: g. Convolvulis aff.
Neck. 1790. El. II. p. 16. n. 629: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 399: g. Polemonacear.
Batsch 1802. Tab. p. 207: g. Primulariar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 310: g. Convolvuleis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 106. n. 472: g. Convolvulacear.
Wahlenb. 1812. Fl. lappon. p. 58. t. 9.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 515; 1825. Syst. I. p. 623. n. 662; 1830. Gen. I. p. 153. n. 763: g. Ericear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 156. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 684. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 727. (?)
Lois. 1819. Dict. v. 13. p. 165: g. Convolvulaceis aff.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXV. 356. n. 712: g. Primulacear.?
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 122: g. Bicornium.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL: g. Monotropear.
Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3394: g. Rhodoracear.
Link 1829. Hdb. I. p. 595: g. Diapensiacear. — Par. Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 233. 443; 1847. Veg. kd. p. 606. — Endl. 1839. Gen. n. 4345. p. 760; 1841. Ench. p. 374. — Hook. . . . . Fl. bor. am. II. p. 76. — Meisn. 1840. Gen. p. 272 (179). — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 85.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28 *(Diapenzia)*: g. Ericacear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 239: g. Polemoniacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: g. Pyrolear.
Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4879: g. Diapensiear. — Par. A. DC. 1852. Pr. XIII. 1. p. 691.
Synon. Rembertia Adans.

Diapensiaceae Link 1829. Handb. I. p. 595: subordo Convolvulacear. Gen.: Diapensia. *Cf.* A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 727.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 233: ordo inter Polemoniaceas et Hydroleaceas collocatus.
Endl. 1839. Gen. p. 760; 1841. Ench. p. 373: fam. Bicornium, Ericaceis aff. Gen.: Diapensia, Pyxidanthera.
Meisn. 1840. Gen. p. 272 (178): ordo Tubiflorar. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 606: ordo Gentianalium. Gen. ead.
Alefeld 1856. Linnaea XXVIII. p. 5: ordo Ericalium.

Diapensieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 125: sect. Pyrolear. Gen.: Diapensia, Pyxidanthera.

Diapensieae Rchb. cont.
A. DC. 1852. Pr. XIII. 1. p. 691: trib. Polemoniacear. Gen. ead.

Diapenzia Dumort. vid. *Diapensia L.*

Diaperia Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 337: nov. g. Tarchonanthear. (Evax prolifera Nutt.) — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 264.
Endl. 1842. Spl. II. p. 41. n. $2420/_1$: g. Plucheinear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 138.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955: g. Evacear.

Diaphane Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 304: nov. g. Iridear. (I. sisyrinchium L. et juncea Desf.)

Diaphanium Fries (1835. Fl. scan. p. 307) 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 480: nov. g. Illosporiaceor. (D. maximum, lacteum.)

Diaphora*) Loureiro 1790. Fl. Cochinch. II. p. 578. Ed. Willd. p. 708: nov. g. Monoec. Polyandr. (D. cochinchinensis.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 576. n. 2118 *(Diaphorea)*.
Batsch 1802. Tab. p. 156: g. Graminear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 88. — Palis. 1812. Agrost. p. 143.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 182: g. Oryzear.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 167 *(Diaphorea)*: g. Cyperacear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 119 (dubium). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119 (dubium).
Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Schult. Mant. II. p. 3): g. Kobresiar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 141: g. Caricear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 120.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 416. n. 1718; 1830. Gen. I. p. 380. n. 1916: g. Graminum. (Decandr. Trigyn.)
Rchb. 1828. Consp. p. 55. n. 1068: g. Elynacear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1494: g. Cyperoidear. dubium.
Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316): g. Elynear.?

Diaphoranthema Beer 1854. Flora p. 349: nov. g. Bromeliacear. (Tillandsia recurvata L.)
Beer 1857. Bromel. p. 24. 153: g. Diaphoranthemear.

Diaphoranthemeae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 11. 23: trib. Bromeliacear. Divis.: Tillandsiae, Diaphoranthemeae, Dyckiae, Aechmeae, Disteganthеae.

Diaphoranthus Meyen 1834. Reise I. p. 406: nov. g. Nassauviacear. (D. fuscus.)
Meisn. 1839. Gen. p. 231 (142): g. Nassauviear.
= Polyachyrus Lag.

Diaphoranthus Anders. mss.
= Pringlea Anders.

Diaphorea Pers., Poir. vid. *Diaphora Lour.*

Diaphyllum Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 115: nov. g. Umbelliferar. (Bupleurum longifolium L.)

---

*) διαφορά, discrepantia: a numero staminum, quo a familia Graminum discrepat.

Diaphyllum Hoffm. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3740 *c*: sect. Bupleuri.
= Bupleuri Linn. pars.

Diaphysisteae Gaillon 1828. Dict. v. 53. p. 389: div. Thalassiophytor. Ordines: Aphlomideae, Phlomideae. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 729.

Diarina Rafin. 1809 in Desv. journ. bot. II. p. 169; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 104: nov. g. Graminear. (Festuca diandra Mich.) *Cf.* Endl. Gen. p. 102 et Schlechtend. in Bot. Zeit. 1850. p. 585.
= Diarrhena Palis.

*Diarrhagomitria**) Hampe 1847. Linnaea XX. p. 66: div. Muscor. Fam.: Sphagnaceae.

Diarrhena Palis. 1812. Agrost. p. 142. t. 25. f. 2: g. Graminear. incertae sedis. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 63. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 34. 125.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 75: g. Bambusacear.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 61. 289. n. 117: g. Diandr. Digyn. — Par. Trin. 1820. Fund. p. 95.
Link 1827. Hort. I. p. 158: g. Festucacear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 137; 1833. Agrost. p. 425. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 462. — Brongn. 1843. En. genr. p. 9. — Steud. 1854. Glum. I. p. 317.
Endl. 1837. Gen. n. 903. p. 102; 1841. Ench. p. 59: g. Bromear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1418, — Meisn. 1843. Gen. p. 425 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 165.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Schltd. 1850. Bot. Zeit. p. 585. Descriptio emend.
Synon. Römeria Zea; Corycarpus Zea; Korycarpus Lag.; Diarina Rafin.

Diarthron Turczan. 1832. Bull. soc. Mosc. V. p. 204. (Decad. pl. Mongol. et Chin. p. 25.)
Endl. 1838. Gen. n. 2096. p. 330; 1841. Ench. p. 209: g. Daphnoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2431.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 436: g. Thymelear.
Meisn. 1841. Gen. p. 330 (242): g. Daphnear. — Par. C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 359. Sect.: Eudiarthron, Arthrochlamys. — Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 558. (diplostemonear.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 63. n. 2099: g. Stellerear. Sect. ut Meyer.
Ledeb. 1851. Ross. III. p. 544: g. Thymelaear.

Diascia**) Link 1820. Icon. sel. p. 7. t. 2; 1822. En. II. p. 143: nov. g. Personatar. *Cf.* Flora 1820. II. p. 411.
Spreng 1825. Syst. II. p. 800. n. 2171: g. Scrofularinar., serius (Gen. II. p. 490) ad Hemimeridem reductum.

*) διαῤῥαγή, ruptio.
**) ἀσκός, utriculus.

Diascia Link cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3149: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 16; 1846 in DC. Pr. X. p. 256; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Hemimeridear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3887. p. 672; 1841. Ench. p. 338. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267. — Meisn. 1840. Gen. p. 305 (216). — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4499. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 358. 485. — Walp. 1845. Rep. III. p. 180. 958.

Diasia*) DC. 1803. Bull. soc. philom. Nr. 80. p. 251 (Redouté Liliac. t. 54. 163): nov. g. Iridear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 26. n. 111. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 341. 404. n. 127. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 260. — Link 1821. En. I. p. 54; 1829. Hdb. I. p 217. — Agdh. 1823. Aphor. p. 172. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 128. — Endl. 1837. Gen. n. 1244. p. 169; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 162. — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 23.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 168: g. Liliacear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 157. n. 159; 1830. Gen. I. p. 38. n. 167: g. Spathacear.
Eckl. 1827. Verz. p. 31: g. Ixiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1188; 1841. Nom. p. 44. n 1578: g. Gladiolear.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 89: g. Ixiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Phalangium Burm.; Aglaea Pers.; Melasphaerula Ker; Gladioli sp. Jacq.

Diaspasis**) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 586. Ed. Nees p. 442: nov. g. Scaevolear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 730. — Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 102. n. 4007. — Endl. 1838. Gen. n. 3039. p. 507; 1841. Ench. p. 261. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 504. — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (146). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 583. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 695.
Poir. 1811. Suppl. II. p. 468; 1819. Dict. v. 13. p. 164 (*Diapasis*): g. Lobeliacear. — Par. Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 6; 1823. Dict. v. 27. p. 98.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. IX. 167. n. 883: g. Goodenoviar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 754. n. 800: g. Lobeliear.
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2783: g. Goodenoviear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 148.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: g. Scevolear
Spreng. 1830. Gen. I. p. 170. n. 855: g. Goodeniear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 760. — Vriese 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 177.

*) διά, ἄσιος, limosus.
**) διάσπασις, ruptio, separatio.

Diasperia*) Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 317: sect. Diphyis. (D. pusilla, ciliata, cernua.)

Diastella „Salisb.“ Endl. 1838. Gen. n. 2124 *b.* p. 338; 1841. Ench. p. 215: sect. Leucospermi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2381. 2. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 259.

Diastella Knight ex Steud. 1841. Nomencl. II. p. 147 (*Deastella* ibid. I. p. 486: vaccinifolia) in synon. Mimetis.
= praeced.?

Diastema Benth. 1844. Voy. Sulph. Bot. p. 132; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 358: nov. g. Gesneriear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 402; 1852. Ann. bot. II. p. 1069.
Hook. 1846. Bot. Mag. t. 4254: g. Gesneriacear. — Par. Benth. 1846. Pl. Hartweg. II. p. 234.
Lindl. 1847. Veg. kd p. 672 (*Diastemma*): g. Gesnerear. — Par. Regel 1848. Flora I. p. 250; 1849. ibid. I. p. 180. *Cf.* Linnaea XXIV. p. 197.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 201; 1856. ibid. XXVII. p. 702. 766: g. Achimenear.
Örsted 1858. Gesn. centroam. p. 25: g. Euachimenear.
Synon. Trevirania Pöpp.

Diastemanthe Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 360: nov. g. Rottbölliacear.

Diastemation C. Müll. vid. *seq.*

Diastemella Örsted 1858. Gesn. centroam. p. 25: nov. g. Euachimenear. (D. bracteosa.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 426. 431 (melius *Diastemation*).

Diastemma Lindl. vid. *Diastema Benth.*

Diastrophis Fisch. & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petrop. II. p. 35: nov. g. Thlaspidear. (D. cristata.) *Cf.* Ann. sc. nat. 1836. 2e sér. V. p. 181 et Linnaea 1837. Litt. p. 104. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4890. p. 871; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p 166. — Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Rchb. 1841. Nom. p. 180. n. 6926: g. Biscutellear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 663: g. Siliculosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Thlaspidar.

Diatoma**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 295. Ed. Willd. p. 362: nov. g. Dodecandr. Monogyn. (D. brachiata. — An Alangii sp.? Willd. in adnot.)
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 170: g. Myrtacear.
= Petalotoma DC.

Diatoma DC. 1805. Fl. franç. II. p. 48: nov. g. Algar. (Conferva mucor et flocculosa Roth.) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 170. — Par. D'Orb. 1820. Mém. Mus. VI. p. 187. (marinar.)
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. xxxv. 118; 1821. Aphor. p. 98: g. Confervoidear. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 913.
Lyngb. 1819. Hydrophyt. dan. p. 177: g. Homalogonator.

*) διασπείρω, dispergo. (?)
**) διατομή, incisura.

Diatoma DC. cont.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 295: g. Diatomidear.
Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 198: g. Confervear.
Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 2. p. 512: g. Hydronematear.
Agdh. 1824. Syst. p. xiv. 3; 1831. Consp. Diat. p. 46: g. Diatomear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 757. n. 3860. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 4. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 22. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 733.
Fries 1825. Pl. homon. p. 354: g. Fragilarinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 450.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 374. n. 3449: g. Amphibolar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 118: g. Temachinor.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 580: g. Diatomacear. liberar.
Endl. 1836. Gen. n. 8. p. 2; 1841. Ench. p. 2: g. Frustuliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 638.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 407; 1841. Brit. Alg. p. 201: g. Fragilariear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 193. — Kütz. 1844. Bacill. p. 47; 1845. Phyc. germ. p. 64; 1849. Sp. Alg. p. 16. n. 10. — Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95. — Rabenh. 1853. Süssw. Diat.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.
Math. 1853. Belg. II. p. 545: g. Fragillariear.

Diatomaceae Agardh 1830. Consp. Diatom. p. 1: ordo Algar. Divis.: Cymbelleae, Styllarieae, Fragilarieae. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 1; 1841. Ench. p. 2. Subordines: Diatomeae, Desmidieae. — Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 94. Subordines: Hemiphractae, Amphiphractae.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 531: div. Diatomear. Series: *liberae* (gen.: Frustulia, Meridion, Exilaria, Aristella, Gomphonema, Achnanthes, Isthmia, Diatoma, Fragilaria, Melosira), *inclusae* (gen.: Encyonema, Schizonema, Berkeleya, Homoeocladia, Gloeodictyon, Micromega).
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 406; 1841. Brit. Alg. p. 15. 194: series IV. Algar. Trib.: Desmidieae, Fragilarieae, Stylarieae (1841 Styllarieae), Cymbelleae.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg.: fam. unica Algar. silicatar. (= *Diatomeae Endl.*)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 12: ordo 1 Algalium. Subord.: Cymbelleae, Hydrolineae, Desmidieae.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 18: fam. Schizophycear. Sect.: Eunotieae, Diatomeae, Naviculaceae, Cymbelleae, Gomphonemeae, Melosireae.
Thwait. 1848. Ann. and Mag. 2d. ser. I. Nr. 3. p. 161.
Rabenh. 1853. Süssw. Diat. (*cf.* Flora 1853. p. 404). Fam.: Melosireae; Eunotiaceae, Cymbelleae, Achnantheae; Cocconeideae, Surirelleae, Fragilarieae; Naviculaceae;

Diatomaceae Agardh cont.
Synedreae, Gomphonemeae, Meridieae, Tabellarieae.
Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 7: ordo Chlorospermear.

Diatomeae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71: fam. Granuliniae.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XII. 1; 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 582: ordo Algar. Gen.: Achnanthes, Frustulia, Meridion, Diatoma, Fragilaria, Meloseira, Desmidium, Schizonema; Gomphonema.
Fries 1825. Pl. homon. p. 345: cohors 4 Algar. Tribus: Undineae, Oscillatorinae, Fragilarinae, Echinelleae.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 189: subordo Algar. Gen. Agardhiana et Oscillatoria.
Agdh. 1831. Consp. Diat. p. 43: seriella Fragilariear. Gen.: Frustulia, Diatoma, Isthmia, Odontella, Desmidium.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 529 (*cf.* Flora. Lit. IV. p. 209): fam. Algar. Divis.: Diatomaceae, Desmidiaceae.
Endl. 1836. Gen. p. 2; 1841. Ench. p. 2: subordo Diatomacear. Tribus: Frustulieae, Hydrolineae.
Brébiss. 1838. Considér. sur. l. Diatomées.
Rchb. 1841. Nom. p. 19: div. Confervacear. Subdivis.: Frustulieae, Hydrolineae, Desmidieae.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 54; 1849. Sp. Alg. p. 1: subclass. Isocarpear. Fam.: Eunotieae, Meridieae, Fragilarieae, Melosireae, Surirelleae; Cocconeideae, Achnantheae, Cymbelleae, Gomphonemeae, Naviculeae; Licmophoreae, Striatelleae; Tabellarieae, Coscinodisceae, Anguliferae; Eupodisceae, Biddulphieae, Angulatae, Actinisceae.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 20: sect. Diatomacear. Gen.: Denticula, Odontidium, Fragilaria, Meridion, Diatoma, Isthmia, Odontella, Biddulphia, Bacillaria.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 94: trib. Amphiphractar. Subtrib.: Eudiatomeae, Tabellarieae.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 733: trib. Phycear. Gen.: Micromega, Schizonema, Homoeocladia, Gloionema, Berkeleya, Gaillonella, Fragilaria, Meridion, Diatoma, Biddulphia, Achnanthes, Cocconema, Gomphonema, Exilaria, Cocconeis, Sigmatella, Surirella, Navicula, Pyxidicula, Discoplaea, Actinocyclus.

Diatomideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 293: div. Hydrophytar. Gen.: Fragilaria, Biddulphia, Diatoma.

Diatomosira Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 95: nov. g. Fragilariear. (Bacillaria pectinalis Nitzsch.)

Diatonta Walp. vid. *Diodonta Nutt.*

Diatosperma Müll. vid. *Diotosperma A. Gray.*

Diatropa*) Dumort. 1827. Fl. belg. p. 76.
Bupleurum Tourn.

*) *διάτροπος*, mutabilis, diversus.

Diatrypa*) Fries 1825. Pl. homon. p. 106: sect. Hypoxyli. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 278 *d;* 1841. Nom. p. 7. n. 300. 4.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 384 *(Diatrype):* g. Sphaeriaceor.

Diatrype Fries vid. *praeced.*

Diazeuxeae D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 251: trib. Labiatiflorar. Gen. Diazeuxis, Centroclinium, Chaetachlaena, Euthrixia.

Diazeuxis**) D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 251. 302: nov. g. Diazeuxear. (Aster trinervis R. & P.)
Spreng. 1831. Gen. II. p. 797. n. 4133: g. Perdiciear.
Less. 1832. Syn. p. 97: g. Mutisiear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 35.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 22: g. Eumutisiear. (ab Endl. 1838. Gen. p. 483 cum dubio ad Lycoseridem Cass. relatum). — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 228 (141).
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3783: g. Moquiniear.
Synon. Langsdorfia Willd.

Diazia***) Philippi „Fl. Atacam. ined." 1857. Bot. Zeit. p. 681: nov. g. Portulacear. (*Cf.* descriptionem in Fl. Atacam. 1860. p. 22. t. 1. f. E: D. portulacoides.)

Diblemma J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 399; 1842. ibid. IV. p. 65: nov. g. Polypodiear. Symplophlebiear. (D. Samarensis.)
Meisn. 1843. Gen. p. 431 (332): g. Taenitidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 86: g. Vittariear.?

Dibothrospermum Knaf 1846. Flora I. p. 298: nov. g. ex typo Chrysanthemi inodori L.
= Tripleurospermum Schultz.

Dibrachia Steud. vid. *Dibrachya Sweet.*

Dibrachion†) L. R. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 138; 1844. Arch. Mus. IV. p. 102. t. 7: nov. g. Sophorear. (D. brasiliensis et guianensis.) *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 185. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 550 *(Dibrachium).* — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Dibrachium Walp. vid. *praeced.*

Dibrachya Sweet 1820. Geran. t. 52. *(Dibrachia* ex Steud. Nom. p. 502.)
Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. austr. p. 74: g. Pelargoniear.
Walp. 1842. Rep. I. p. 457: sect. Pelargonii.

Dicaeoma Nees 1816. Syst. p. 16; 1817. Überbl. p. 3: sect. Caeomatis. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 320.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 541 (p. 533 *Diceoma):* g. Coeomidear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 197: g. Hypodermior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 10.

*) *διατρυπάω*, perforo.
**) *διάζευξις*, separatio: ob flores raros dioicos in hac familia.
***) Nomen a loco „Miguel Diaz".
†) *δίς; βραχίων*, brachium.

Dicaeoma Nees cont.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 514: subg. Pucciniae.
= Pucciniae Pers. pars.

Dicaeoma Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 42: nov. g. Caeomaceor. (Caeoma betulinum W.)

Dicalix*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 663. Ed. Willd. p. 815: nov. g. Polygam. Dioec. (D. cochinchinensis.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 166: g. Myrtear.
= Dicalyx Poir.

Dicalymna Lemaire 1855. Ill. hort. II. Misc. p. 37.
= Ferdinanda Lag.

Dicalyx Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 172: g. Polygam. Dioec.
Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 81: g. Myrtear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 568. n. 1881: g. Polyandr. Monogyn.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1116: g. habitu Rosacear., sed ob fructus Ternströmiaceis, Olacineis et Santalaceis affinius.
Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5549 inter genera incognita.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 651: g. Pomacear.? — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 106 (75). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 164.
Meisn. 1837. Gen. p. 39 (29): g. Elaeocarpear.? et p. 250 (158) Styracear.
Endl. 1840. Gen. n. 5407. p. 1018; 1841. Ench. p. 530: g. Ternströmiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 167.
Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7912: g. Mocanerear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 247 a Symploco minime differre asserit.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397: g. Ternströmiacear.?
Synon. Dicalix Lour.; Sariava Reinw.

Dicarpae Hall. 1742. En. stirp. Helv. Praef. p. 34: div. Dicotyledonum petalodear. Isostemonum. Gen.: Asclepias, Pervinca.

Dicarpae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 29: cohors Monopetalar. Nixus: Gentianales, Oleales, Loganiales, Echiales, Solanales.

Dicarpaea Presl 1830. Symb. bot. I. p. 37. t. 26: nov. g. Paronychiar. (D. linifolia) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 8, et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 362.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 24: sect. Limei.

Dicarpella Bory 1823. Dict. class. III. p. 340.
= Polysiphoniae Grev. pars.

Dicarphus Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 176 (New-York med. repos. II. Hex. V. p. 355): nov. g. Fungor., intermedium inter Thelephoram et Hydnum. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 173.
= Hydnum Linn.?

*) Nomen a duplice calyce, altero sustinente drupam, altero coronante.

Dicarpiae Scopoli 1777. Introd. p. 155: gens Contortar. Gen.: Tabernaemontana, Cameraria, Plumieria, Ceropegia, Echites, Nerium, Asclepias, Cynanchum, Pergularia, Apocynum, Dichondra.

Dicaryum „Willd. herbar." Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 802. n. 792*a:* nov. g. Pentandr. Monogyn. (D. subdentatum et serrulatum.) — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 643. n. 703.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3571: g. Cerberear.
Bartl. 1830. Ord. p. 205: g. Rauwolfiear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 131. n. 655: g. Strychnear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 624.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 67: g. Strychnacear.?
Meisn. 1840. Gen. p. 262 (171): g. Ophioxylear.?

Dicella*) Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 249; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 32: nov. g. Malpighiear. (Bunchosia bracteosa Juss.) — Par. A. Juss. 1840 Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 322; 1843. Arch. Mus. III. p. 343. t. 9. — Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7865. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 346. — Walp. 1846. Rep. V. p. 195.
Endl. 1840. Gen. n. 5587. p. 1064; 1841. Ench. p. 557: g. Apterygiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390 *(Dialla):* g. Malpighear.

Dicentra**) Bernhardi 1833. Linnaea VIII. p. 468: g. Dicentrear. emendato nomine pro *Diclytra Borckh. Cf.* Bernh. 1838. Linnaea XII. p. 668. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 184. n. 7065. Sect.: Dicentra, Macrocapnos.
Meisn. 1837. Gen. p. 8 (10): g. Fumariacear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 752: g. Corydalear.
Planch. 1855. Fl. d. serr. VIII. p. 193: subg. Capnorchidis. (Fumaria Cucullaria L.)
= Cucularia Rafin.

Dicentra Endl. 1839. Gen. n. 4836. p. 859; 1841. Ench. p. 443: g. Dicentrear. Sect.: Eucapnos, Cucullaria, Macrocapnos. — Par. Pfeiff. 1857. Bot. Zeit. p. 649. Sect. similes.
Ledeb. 1842. Ross. I. p. 97: g. Fumariacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436: g. Fumariear.
Synon. Diclytrae DC. sp.

Dicentra Naudin 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 130: sect. Chaetogastrae. (Arthrostemma campanulare DC., etc.)

Dicentra Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 272: g. Dicentrear. ampliat. Sect.: Dicentra, Dactylicapnos. *Cf.* Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 177.

Dicentrae Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 32: div. Corydalidear. Gen.: Dactylicapnos, Dicentra, Lamprocapnos, Adlumia.

Dicentreae Bernhardi 1833. Linnaea VIII. p. 467: subsect. Fumariear. Gen.: Dactylicapnos, Dicentra, Eucapnos, Adlumia. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 184. Gen. ead.

*) *δίκελλα*, pastinum, bidens.
**) *κέντρον*, stimulus, calcar.

Dicentreae Bernhardi cont.
Endl. 1839. Gen. p. 859; 1841. Ench. p. 443: subtrib. Fumariear. Gen.: Dactylicapnos, Dicentra, Adlumia et 1843 (Spl. III. p. 86) Eucapnos. — Par. Pfeiff. 1857. Bot. Zeit. p. 649. Gen.: Dactylicapnos, Capnorchis, Dicentra, Bicuculla.

Diceoma Gray vid. *Dicaeoma Nees.*

Dicera*) Forst. 1776. Char. gen. p. 79. t. 40: nov. g. Polyandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 357. n. 899.
Scop. 1777. Intr. p. 263: g. Polyandrar.
Gis. 1792. Prael. p. 337: g. Bicornium.
Cram. 1803. Disp. p. 120 in Dodecandr. Tetragyn. et p. 140 in Polyandr. Tetragyn.
DC. 1824. Pr. I. p. 520: g. Elaeocarpear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5426. — Bartl. 1830. Ord. p. 340. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 560. — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 303. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4. — Meisn. 1837. Gen. p. 39 (29). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 20.
Rchb. 1837. Hdb. p. 304: g. Friesiear.
Synon. Monocerae et Friesiae sp. Endl.

Diceraea Rchb. vid. *Diceras Endl.*

Dicerandra Benth. 1834. Labiat. p. 413: g. Melissinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 789. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 420. — Walp. 1845. Rep. III. p. 745. 984.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 106. n. 4116: g. Melissear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 285 (194). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 242.
Endl. 1838. Gen. n. 3622. p. 620; 1841. Ench. p. 307: g. Melissinar.
Synon. Ceranthera Ell.

Diceras Rudolphi Hist. entoz. II. p. 258.
= Mori fructus cum stigmatibus. *Cf.* Diesing 1841 in Oesterr. med. Wochenschr. p. 1177.

Diceras Endl. 1840. Gen. n. 5385 c. p. 1011; 1841. Ench. p. 523: sect. Monocerae. (Dicera dentata Forst.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7938. 3 (*Diceraea*).

Diceratella Boissier 1844. Diagn. pl. nov. I. Nr. 5. p. 80: nomen mutatum pro *Diceratio Boiss.* propositum.
Diceratium Boiss.

Diceratium Lagasca 1815. El. hort. Madr. p. 20; 1816. Gen. et spec. p. 20: nov. g. Tetradynam. Siliquos. (Erysimum bicorne W.?)
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 230; 1821. Syst. II. p. 203; 1824. Pr. I. p. 140: sect. Notoceratis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4794 *a.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 158.
= Notoceras R. Brown.

Diceratium Boissier 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 61: nov. g. Arabidear., Matthiolae aff. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 340. — Endl. 1850. Spl. V. p. 33. n. 4845/$_2$.
Synon. Diceratella Boiss.

*) κέρας, cornu.

Dicerma*) DC. 1825. Prodr. II. p. 339 (Lég. mém. VII.): nov. g. Euhedysarear. Sect.: Phyllodium, Aphyllodium. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 298. Sect. eaed. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 230. — Meisn. 1837. Gen. p. 91 (65). — Endl. 1841. Gen. n. 6616. p. 1285; 1841. Ench. p. 670. Sect. ut DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Benth. 1852. Pl. Jungh. Fasc. II. p. 217 (excluso Phyllodio). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 544.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4001: g. Onobrychear. Sect. ut DC. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155. — Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5960. Sect.: Phyllodium, Dicerma.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 593. n. 2927: g. Leguminosar.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 259: g. Hedysarear.

Dicerocarpeae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: fam. Calicunguliae. Gen. Saxifraga, Hydatica.

Dicerocaryon Dietr. vid. *seq.*

Dicerocaryum*) Bojer 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 268. t. 10: nov. g. Pedalinar. (D. sinuatum.)
Endl. 1839. Gen. n. 4180. p. 725; 1841. Ench. p. 351: g. Pedalinear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 626 (*Dicerocaryon*).
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 249: g. Sesamear.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4536: g. Martyniear.
= Pretrea Gay.

Dicerolepis Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 10. p. 145: nov. g. Periplocear., Periplocae proximum. (D. paludosa.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 46. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 465.

Diceros*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 381. Ed. Willd. p. 463: nov. g. Didynam. Angiosperm. (D. cochinchinensis.)
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7: g. Scrophularinear. minus notum. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272 (dubium).
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 546: g. Gratiolear.
Endl. 1839. Gen. n. 4023. p. 695; 1841. Ench. p. 340: g. dubium Scrophularinar. — Par. Meisn. 1840. Comm. p. 214.
Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4465: g. Pedicularinar.?
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 584; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Scrophulariacear. non satis notum.

Diceros Pers. 1807. Ench. II. p. 164. n. 1483: g. Antirrhinear.
= Artanema Don.

Diceros Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 751: g. Scrophularinar.
= Vandellia Linn.? (Benth. in DC. Pr. X. p. 584.)

Dicersos Lour. Fl. Cochinch. II. p. 381: sphalm. pro *Diceros.*

*) χέρμα, moneta.
**) δίς, duo; κέρας, cornu; κάρυον, nux.
***) δίκερως, bicornis: ob antheras bicornes.

Dichaea Lindl. 1833. Orchid. gen. p. 208; 1834 in Hook. journ. bot. I. p. 5: nov. g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1463. p. 203; 1841. Ench. p 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2068. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (283). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. p. 178.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 3. t. 105. 106.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Brassidar.

Dichaena Fries 1825. Pl. homon. p. 108: nov. g. Dichaeneor. (Opegrapha macularis Ach.) *Cf.* Fries 1828. Elench. II. p. 89. 141. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 275. — Endl. 1836. Gen. n. 393. p. 34; 1841. Ench. p. 19.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 133: g. Sphaeriaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 402: g. Gibbereor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Hysterieor.
Synon. Polymorphum Chev.; Schizoderma Chev.; Phloeoscoria Wallr.; Heterographa Fée.

Dichaena Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 241: subsect. Chaenantherae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 742.

Dichaenacei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 380. 398: ordo Pyrenomycetum. Gen.: Cyttaria, Enslinia, Acroscyphus; Cordierites, Tympanis, Sphaeronaema, Acrospermum; Rhaphidosporei; Gibberei.

Dichaenei Fries 1825. Pl. homon. p. 108: subordo Sphaeriaceor. Gen.: Dichaena, Hypospila, Ostropa, Gibbera.
Rchb. 1828. Consp. p. 11: subdiv. Sphaeriaceor. Gen. ead.
Endl. 1836. Gen. p. 33; 1841. Ench. p. 19: subtrib. Sphaeriaceor. Gen. ead.

Dichaeta Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 383: nov. g. Gaillardiear. (D. tenella et uliginosa.)
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 379: g. Euheleniear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 45. n. $2601/_2$. — Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Walp. 1843. Rep. II. p. 628.

Dichaeta Schultz Bip. mss. olim.
= Schätzellia Schultz.

Dichaetandra Naudin 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 31: nov. g. Lasiandralium. (D. Goudotii.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 552.

Dichaetanthera Endl. 1840. Gen. n. 6227. p. 1215; 1841. Ench. p. 646: g. Miconiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6735. — Meisn. 1843. Comm. p. 355. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 49: g. Lasiandralium dubium.
Synon. Rousseauxia DC.

Dichaetaria „Nees mss.“ Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 145: nov. g. Stipacear. (D. Wightii.)

Dichaetophora A. Gray 1849. Pl. Fendl. (Mem. Amer. Ac. IV. P. 1.) p. 73 adnot.

Dichaetophora A. Gray cont. (Flora 1850. II. p. 710): nov. g. Boltoniae et Brachycomae aff. (D. campestris.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 827: g. Belliear.

Dichanthium*) Willem. 1796 in Usteri n. Ann. XII. p. 11: nov. g. Triandr. Digyn. (Andropogon annulatum Forsk.)
Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 973. *a (Dichantium):* sect. Andropogonis.

Dichantium Rchb. vid. *praeced.*

Dichapetalum Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. nr. 78 in Römer Collect. bot. p. 213: nov. g. Terebintacear.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 178: g. Terebinthacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXIV. 324. n. 950.
DC. 1825. Pr. II. p. 57: sect. Chailletiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3823 *b;* 1841. Nom. p. 145. n. 5619. 2. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 58. — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 88.

Dichasium A. Braun 1841. Flora p. 710: nov. g. Filicum.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 302: g. Aspidiear.

Dicheilus Rchb. 1832. Fl. exc. p. 522: sect. Cytisi. (C. argenteus L.)
Synon. Cytisoides Jaub. & Spach; Lotoides DC. pt.

Dichelachne**) Endl. 1833. Prodr. fl. Norfolk. p. 20: nov. g. Stipear., Lasiagrostidi Link proximum. (D. montana.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Nees 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 98.
Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838.) p. 36: sect. Stipae.
Endl. 1837. Gen. n. 796. p. 87; 1841. Ench. p. 57: g. Stipacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1197. — Meisn. 1843. Gen. p. 419 (320). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 739. — Steud. 1854. Glum. I. p. 120.
Trin. & Rupr. 1842. Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. (1849) p. 1: g. Stipaceor.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 293: g. Graminear.

Dichelactina „Hance Pl. nov. Austr. Chin. diagn. I. p. 2“ Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 375: g. Phyllanthear., Emblicae aff. (D. nodicaulis.)
= Emblica Gärtn.? (Baill.)

Dichelocalyx G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 172: sect. Mitrasacmes.

Dichelomitrium Endl. 1838. Gen. n. 3566 *d.* p. 606; 1841. Ench. p. 303: sect. Mitrasacmes. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5087. 4.
= Plecocalyx Don.

Dichelostemma***) Kunth 1843. Enum. pl. IV. p. 469: nov. g. Alliear. (Brodiaea congesta Sm.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 255.

Dichelostylis „Lestib.“ Endl. in synon. Fimbristylidis: vid. *Dichostylis Lestib.*

Dichelyma Myrin 1832. Kongl. Vet. Ac. Handl. (1834.) p. 273. t. 6. 7: nov. g.

*) διχῶς, bis, dupliciter.
**) δίχηλος, bifidus; ἄχνη, palea.
***) δίχηλος, bifidus; στέμμα, corona.

Dichelyma Myrin cont. Muscor. (Fontinalis falcata Hedw.) *Cf.* Flora 1835. I. p. 16.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92: g. Fontinaloidear.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 246: g. Dichelymacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 740; 1849. VIII. p. 400: g. Fontinalear.
Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 142: sect. Neckerae. Subsect.: Eudichelyma, Cryphaeadelphus.
Bruch, Schimp. . . . . Bryol. eur. V: g. Fontinalacear.

Dichelymaceae Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 245: subdiv. Clonocarpor. Gen. Dichelyma.

Dichenticteae*) Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69. 80: fam. Tectigraniae. Gen.: Dichosporium, Amphisporium, Licea.

Dicheranthus Webb 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 27. t. 2: nov. g. Paronychiear., Pterantho aff. (D. plocamoides.)
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 81: g. Pteranthear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 54. n. $5205/_1$.

Dichilanthe Thwaites 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 269. t. 8 A: nov. g. Lonicerear. (D. zeylanica.) An gen. Rubiacear.? (Hook. ibid. in adnot.)

Dichilos Spreng. vid. *seq.*

Dichilus DC. 1825. Prodr. II. p. 136 (Lég. mém. VI. t. 35): nov. g. Genistear. (D. lebeckoides.) — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVIII (*Dichylus*); 1828. Consp. p. 153. n. 4037; 1841. Nom. p. 151. n. 5877. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 142. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Meisn. 1837. Gen. p. 82 (58). — Endl. 1840. Gen. n. 6480. p. 1263; 1841. Ench. p. 668. — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 459; 1844. ibid. III. p. 353. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 741.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 263 (*Dichilos*); 1831. Gen. II. p. 578. n. 2829: g. Leguminosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Lotononidear.
Synon. Calycotome Meyer; Melinospermum Walp.

Dichismus Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 106: nov. gen. pro Scirpis stylo bifido et stigmatibus 2 praeditis propositum.
Endl. 1837. Gen. p. 119; 1841. Ench. p. 64 (*Distichmus*): g. Cyperacear. dubium.

Dichiton Montagne 1856. Syll. gen. Crypt. p. . . . : nov. g. Hepaticar. *Cf.* Bot. Zeit. 1856. p. 527.

Dichlidopteris (?) Brackenridge vid. *Diclidopteris.*

Dichloria Greville 1830. Alg. synops. p. XL. Menegh. 1838. Cenni p. 41: g. Sporochnoidear. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 26.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 758: g. Sporochnidear.

*) διχῆ, dupliciter; ἐντίκτω, interne gigno.

Dichloria Greville cont. Zanard. 1843. Classif. p. 10: g. Arthrocladiear. (?) — Par. J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 164.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 186: sect. Desmarestiae.
Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 741; 1849. ibid. X. p. 56: g. Sporochnear.?
Synon. Desmarestiae sp. Auct.

Dichoandra Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 304: leg. *Dichondra Forst.*

Dichodon „Bartl. mss." Rchb. 1832. Fl. exc. p. 785: sect. Stellariae. — Par. Koch 1836. Syn. p. 118. Ed. II. p. 129.
Endl. 1840. Gen. n. 5241 *a.* p. 970; 1841. Ench. p. 505: sect. Cerastii. — Par. Griseb. 1843. Rumel. p. 207. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 266.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7789: g. Arenariear.
Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 396: subg. Cerastii.
Synon. Dichoton Mert. & Koch; Cerastii et Stellariae sp. Auct.

Dichodontium Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47: subg. Dicrani. (D. pellucidum, squarrosum.)
= Angströmiae sect. Dicranella Müll.

Dichoespermum Wight 1853. Icon. pl. Ind. VI. p. 31. t. 2078: nov. g. Aneilemear. (in Indice: *Dichospermum.*) *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 158 (*Dichospermum*).

Dichoglottis Fisch. & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petrop. I. p. 25: nov. g. Caryophyllear. (D. linearifolia.) *Cf.* Ann. sc. nat. 1835. 2e sér. IV. p. 339 et Linnaea X. Litt. p. 87. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1543.
Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21): g. Alsinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Saginear.
Endl. 1840. Gen. n. 5245 *a.* p. 972; 1841. Ench. p. 506: sect. Gypsophilae. — Par. Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 288. — Walp. 1843. Flora II. p. 773. — A. Braun 1843. Flora p. 383.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7813: g. Saponariear.
Jaub. & Spach 1842. Ill. pl. or. I. p. 13. t. 6.
Walp. 1846. Rep. V. p. 78: g. Lychnidear.
Synon. Hagenia Mönch.

Dichominum Necker 1790. Elem. bot. III. p. 345. n. 1760: nov. g. Athrosophytor., a Marchantia L. sejunctum.
= Lunularia Mich.?

Dichondra*) Forst. 1776. Char. gen. p. 39. t. 20: nov. g. Pentandr. Digyn. — Par. Swartz 1788. Prodr. p. 3. 54; 1797. Ind. occ. I. p. 555. t. 11. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 176. n. 451. — Gmel. 1791. Syst. p. 457. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1353. n. 513; 1809. En. p. 297. — Elliott 1817. Sketch I. p. 338. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 173.
Scop. 1777. Intr. p. 156: g. Dicarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 129: g. Borraginear. —

*) δίς, geminus; χόνδρος, granum.

Dichondra Forst. cont.
Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 298 (et p. 309 denuo inter Convolvuleas.)
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 155: g. Petalostemonis.
Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 135: g. Pentandr. Monogyn.
Pers. 1805. Ench. I. p. 288. n. 639: g. Convolvulacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 182. n. 752. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 490. Ed. Nees p. 346. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 119. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 179 — Schult. 1820. Syst. VI. p. XIX. 207. — Link 1821. En. I. p. 249. — Kunth 1823. Syn. II. p. 231. — Bartl. 1830. Ord. p. 192. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 921. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 185.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 464; 1825. Syst. I. p. 863. n. 1008; 1830. Gen. I. p. 214. n. 1106: g. Convolvulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2992.
Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 497; 1845 in DC. Pr. IX. p. 451: g. Dichondrear. *Cf.* Flora Lit. V. p. 137. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 302. — Endl. 1839. Gen. n. 3788. p. 652; 1841. Ench. p. 323. — Meisn. 1840. Gen. p. 275 (182). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 94. — Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4404. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 55. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 632. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 742. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 630.
Synon. Steripha Banks, Gärtn.; Demidofia Gmel.; Anonymos Walt.

Dichondreae Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 405. 497: sect. Convolvulacear. Gen.: Dichondra, Falkia.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 302: trib. Convolvulacear. Gen. ead — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 275 (182). Gen. ead. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 84. Gen. ead. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 55. Gen. ead. — Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 451. Gen. ead. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 632. Gen. ead. et Hygrocharis?
Endl. 1839. Gen. p. 652; 1841. Ench. p. 323: subordo Convolvulacear. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 113: subdiv. Convolvulear. Gen. ead.

Dichone Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 320: nov. g. Gladiolear. (Ixia crispa Thunb.)

Dichonema „Nees in litt." Fries 1825. Pl. homon. p. 303: nov. g. Coenogoneor.? An thallus Coenogonii?
Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 86: g. Byssaceor. destructorior.?

Dichonemia Blume & Nees 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 11: nov. g. Mucedinum asporor., Atheliae Pers. et Hypochno Fr. aff.
Conf. Dictyonema Agdh., Mont.

Dichopetalum F. Müll. 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 378. t. 11: nov. g. Hydrocotylear. (D. ranunculaceum.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 60.

Dichophyceae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Sphaerococcear. Gen.: Dichophycus.

Dichophycus „Zanard." Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: g. Dichophycear.

Dichophyllium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phycol. gener. p. 337: nov. g. Dictyotear.
= Dictyota Lamx.

Dichopogon*) Kunth 1843. Enum. IV. p. 622: nov. g. Anthericear. (Arthropodium laxum.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 256. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.

Dichoptera Rchb. 1841. Nomencl. p. 167. n. 6489. 2: sect. Cliffortiae (Cliffortiae §. 2 dichopterae DC.)

Dichopus Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 176: nov. g. Malaxidear.? (D. insignis.)

Dichorexia*) Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 344 (Gefässb. p. 36): nov. g. Alsophilacear. (Alsophila gigantea et latebrosa.)
Fée 1852. Gen. Fil. p. 346: sect. Alsophilae.

Dichorgana Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 526): div. Heterorganor. Fam.: Abietineae, Cupressineae, Taxineae, Casuarineae; Betulaceae, etc. (94—268.)

Dichorisandra*) Mikan 1820. Del. fl. Bras. I. t. 3: nov. g. Commelinear. *Cf.* Flora 1821. I. p. 115. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 10. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 117. n. 1289; 1830. Gen. I. p. 248. n. 1292. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1055.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1175: g. Ephemerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 40: g. Commelinacear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 122 (*Dichorisondra*). — Seub. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XV. p. 235.
Schult. 1830. Syst. VII. p. LXIV. 1181: g. Commelynear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1537. (genuinar.) — Kunth 1843. Enum. IV. p. 109; 1844. Abh. Berl. Ak. (1846) p. 76. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 13.
Endl. 1837. Gen. n. 1034. p. 126; 1841. Ench. p. 71: g. Commelynacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 188.
Meisn. 1842. Gen. p. 406 (311): g. Tradescantiear.

Dichorisondra Spach vid. *praeced.*

Dichoropetalum Fenzl 1842. Pl. syr. pugill. p. 57: nov. g. Umbelliferar., Pachypleuro aff.
Meisn. 1843. Comm. p. 358: g. Pachypleurear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 406.
= Johrenia DC.

Dichosema Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 35; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 84: nov. g. Mirbeliear. (E. spinosum.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6449. p. 1259; 1841. Ench. p. 667. — Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5944. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 77. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 742.

---

*) δίχα, dupliciter; πώγων, barba.
**) ῥῆξις, ruptura.
***) χώρισις, separatio.

Dichosema Benth. cont.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1512: g. Papilionacear.
Meisn. 1843. Comm. p. 350: g. Sophorear.

Dichosemaea Endl., Rchb. vid. *Disemaea G. Don.*

Dichosma DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140; 1824. Prodr. I. p. 716: sect. Diosmae. (D. bifida Jacq.)
= Agathosmae Willd. pars.

Dichospermium Ritgen vid. *Dichosporium Nees.*

Dichospermum Dumort. 1827. Fl. Belg. p. 21: sect. Atriplicis. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 90. — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 715.
Synon. Euatriplex C. A. Meyer; Atriplexum Rchb.

Dichospermum Wight in Indice vol. VI., Müll. vid. *Dichoespermum Wight.*

Dichosporina Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 451: sect. Leocarpi. (L. granulatus, minutus.)

Dichosporium Nees 1816. Syst. p. 105; 1817. Überbl. p. 28: nov. g. Gasteromycor. diffluentium. (Spumaria physaroides Pers.)
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 14: g. Leiocarpor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 569: g. Myrotheciadear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 83: g. Gasteromycetum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 80: g. Dichentictear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 550: g. Fuliginear.?
Fries 1825. Pl. homon. p. 152: g. Myrothecior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 8. n. 166.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Sporigastreor.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 525. n. 3505: g. Dermatogasterum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Spumariacear.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 218: g. Trichodermacear. subsphaericar.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96 („*Dichospermium*“ *Nees* f. 99): g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 344: g. Placogasterum.
Endl. 1836. Gen. n. 293. p. 25; 1841. Ench. p. 16: g. Aegeriteor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 368. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 286.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 19. 56; 1842. Mycol. p. 76: g. Physareor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucorinor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 452: subg. Didymii.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Liceor.?

Dichostylis „Palis. mss.“ Lestib. 1819. Ess. Cypér.: nov. g. Scirpear. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 179, Flora 1821. I. p. 25 et Schult. Mant. II. p. 2. — Par. Nees 1834. Linnaea IX. p. 289.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 75: g. Fimbristylear.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 59: sect. Heleocharidis.
= Trichelostylis Lestib.

Dichotomaria Lamarck Anim. s. vert. II. p. 147. Ed. Milne-Edw. 1836. II. p. 197: g. Polyporum.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329: g. Batrachospermear.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 115: sect. Galaxaurae. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 22. n. 76 *c.* — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 529.

Dichotomaria C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 164: subsect. Cryphaeae.

Dichoton „Bartl. in litt.“ Mertens & Koch 1831. Deutschl. Fl. III. p. 260: sect. Stellariae.
= Dichodon Bartl.

Dichotophyllon Dillen. 1719. Gen. p. 91. t. 3: nov. g. plantar.
Mönch 1794. Meth. p. 345 (*Dichotophyllum*): g. Thalamostemonis.
= Ceratophyllum Linn.

Dichotophyllum Mönch vid. *praeced.*

Dichroa*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 301. Ed. Willd. p. 368: nov. g. Dodecandr. Tetragyn. (D. febrifuga.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 371. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 465. n. 1795; 1830. Gen. I. p. 398. n. 1998. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 30.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 180: g. Rosaceis aff.? — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 743.
Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4475: g. Rosacear.? minus cognitum.
Endl. 1841. Gen. p. 1332. n. 6822; 1841. Ench. p. 685: g. Dialypetalar. minus notum. *Cf.* Meisn. 1843. Comm. p. 372.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 721: g. Hydrangeacear.
= Adamia Wall.? (Planch. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 259.)

Dichroanthus Webb & Berth. 1836. Phytogr. Canar. I. p. 65. t. 5. 6: nov. g. Cheiranthear. (Cheiranthus mutabilis L'Her., etc.) ab ipsis Auct. (ibid. p. 220) revocatum.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 411: sect. Cheiranthi.
= Cheiranthi sect. Cheiroides DC.

Dichrocephala DC. 1823 in Guillem. Arch. bot. II. p. 517; 1834 in Wight Contrib. p. 11.
DC. 1836. Pr. V. p. 371: g. Grangeinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2396. p. 388; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 190 (128). — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 497. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3573: g. Grangeinar.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28: g. Buphthalmear.

*) δίχροος, bicolor.

Dichrocephala DC. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 44: g. Baccharidear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 189: g. Asterear.
Schltd. 1852. Linnaea XXV. p. 208.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 56: g. Asterinear.
Synon. Centipeda Cass.; Polylepis Cass.; Cotulae, Grangeae, Ethuliae sp. Auct.

Dichrolinum Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 597; 1848. ibid. VII. p. 180: series Linastri. (L. salsoloides, Ortegae.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 95.

Dichroma Cavan. 1801. Anal. cienc. nat. III. p. 233. t. 32; 1801. Ic. VI. p. 59. t. 582: nov. g. Didynam. Angiosperm. (D. coccinea.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p 398; 1825. Syst. p. 803. n. 2179: g. Scrofularinar., serius (Gen. II. p. 491) ad Ourisiam relatum.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3168: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7: g. Scrophularinear. minus notum.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 3: subg. Ourisiae.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 664: sect. Ourisiae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3986 *b.* p. 689; 1841. Ench. p. 340. — Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4481. 2. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 492. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 198.

Dichroma Pers. 1805. Ench. I. p. 57. n. 120: g. Triandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 32. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 31.
Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 15: g. Cyperacear.
Link 1827. Hort. I. p. 294: g. Cyperoidear.
= Dichromena Michx.

Dichromena*) Michaux 1803. Fl. bor. am. I. p. 37: nov. g. Cyperacear. (Schoenus stellatus.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 2. 89. n. 174. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 185. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 202. n. 222. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 202.
Vahl 1806. En. II. p. 240. n. 116: g. Triandr. Monogyn. — Par. Elliott 1817. Sketch I. p. 89.
Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 25 et Schult. Mant. II. p. 2): g. Scirpear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Presl fr. 1828. Reliq. Hänk. I. p. 197. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120.
Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1115: g. Fimbristylear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 49. n. 231: g. Cyperear.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Endl. 1837. Gen. n. 976. p. 114; 1841. Ench. p. 64: g. Schoenoidear. Sect.: Zosterospermum, Dichromena. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1458. Sect. eaed.
Torr. . . . . Ann. Lyc. N. York. III. p. 357: g. Rhynchosporear. — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 274. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 743.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Schoenidar.
Synon. Spermodon et Haloschoenus Nees; Asteroschoenus Nees?; Dichroma Pers.

*) δίς, bis; χρῶμα, color.

Dichromena Nees 1834. Linnaea IX. p. 291: g. restrict. Scirpear.
Endl. 1837. Gen. n. 976 *b.* p. 114; 1841. Ench. p. 64: sect. Dichromenae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1458. 2.
Meisn. 1842. Gen. p. 412 (315. 371): g. Rhynchosporear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146. — Steud. 1855. Glnm. II. p. 134.
Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 109: g. Haloschoenor.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 271: sect. Rhynchosporae.

Dichromus Schlechtend. 1852. Bot. Zeit. p. 15: sect. Reimariae.

Dichrostachys DC. 1825. Prodr. II. p. 445 (Lég. Mém. XII): sect. Desmanthi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4167 *c.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 398.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 271: g. Acaciear.
Meisn. 1837. Gen. p. 96 (68): g. Mimosear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 133.
Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 352: g. Adenantherar.
Walp. 1842. Rep. I. p. 863; 1846. V. p. 582: g. Adenantherear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 48. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 615.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Eumimosear.
Webb 1849 in Hook. Niger Fl. p. 127 (*Dicrostachys*): g. Leguminosar.
Synon. Cailliea Guill. & Perr.

Dichrotrichum „Reinw. mss." De Vriese . . . . in Pl. Reinw. p. 7. t. 1. 2.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 715: g. Aechynanthear. (*Tromsdorffia R. Br.*)
= Liebigia Endl.

Dichylus Rchb. vid. *Dichilus DC.*

Dichynchosia Müll. Ann. bot. V. p. 31: sphalm. pro *Dirhynchosia.*

Dickia Scop. 1777. Introd. p. 199. n. 877: g. Speciosar.
= Matourea Aubl.

Dickica Brébiss. vid. *seq.*

Dickiea Lindl., Trevisan vid. *seq.*

Dickieia*) Berk. & Ralfs 1844. Ann. and Mag. n. h. XIV. p. 328: nov. g. Diatomear.
Kütz. 1844. Bacill. p. 119; 1849. Sp. Alg. p. 109. n. 59: g. Naviculear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13 (*Dickiea*): g. Hydrolinear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97 (*Dickiea*): g. Schizonemear. — Par. Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 418 (sph. *Dickica*).

Dickneckeria**) Flor. Flum. I. t. 105 (le-

*) Dicat. Algologo Dickie.
**) Nomen compositum ex Dickson et Necker. (Wittst.)

Dickneckeria Flor. Flum. cont.
galis: Steud. Nom. I. p. 504 ad Rupalam relata.)
= Adenostephanus Klotzsch.

Dicksonia*) L'Herit. 1788. Sert. angl. p. 31: nov. g. Filicum. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1314. — Gis. 1792. Prael. p. 594. — Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 300. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 66. — Smith 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 104. (dorsiferar.) — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 6. 90 (annulatar.); 1806. Syn. Fil. p. 136. (gyratar.) — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 47. — Willd. 1809. En. p. 1076; 1810. Sp. V. p. 481. n. 1979. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 253. — Leman 1819. Dict. v. 13. p. 187. — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 316. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 121. n. 3273; 1831. Gen. II. p. 725. n. 3667. (verar.)
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 18: g. Helicogyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 31 (*Diksonia*): g. Gyrator.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 157. Ed. Nees p. 13: g. Polypodiacear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 23. — Kunth 1822. Syn. I. p. 87. — Agdh. 1822. Aphor. p. 117. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 225. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 67. — D. Don 1825. Nepal. p. 11. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 239. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.) — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 88. — Brongn. 1843. En. genr. p. 5.
Link 1822. En. II. p. 464: g. Polypodear.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 367: g. Dicksoniear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 434 (335). — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 334. Subgen.: Eudicksonia, Sitolobium. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 279.
Rchb. 1828. Consp. p. 37. n. 885: g. Davalliacear. — Par. Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 105.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Rizospermar.
Endl. 1836. Gen. n. 644. p. 63; 1841. Spl. I. p. 1350; 1841. Ench. p. 37: g. Polypodiear. Sect. (1841): Balantium, Culcita, Sitolobium, Leptopleuria, Patania. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1033. Sect. eaed. (Dicksonia loco Sitolobii.)
J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 435: g. Dicksoniar. Sejungitur Cystodium.
Hook. 1844. Spec. Fil. p. 65: g. Eudicksoniear. Subgen.: Balantium, Patania.
Kunze 1850. Bot. Zeit. p. 57.
Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 9: g. Cyathear.
Conf. Sitobolium Desv.; Adectum Link; Patania Presl.

Dicksonia Ehrh. Pl. crypt. 65.
= Schistostega Web.

Dicksonia Presl 1836. Pterid. p. 135: g. restrict. Dicksoniacear. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 39.

*) Dicat. James Dickson, botan. Londin.

Dicksonia Presl cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1033. 3: sect. Dicksoniae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
= Sitobolium Desv.

Dicksoniaceae Presl 1836. Pterid. p. 133: trib. Hymenophorear. Gen.: Balantium, Culcita, Dicksonia, Leptopleuria, Patania.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 38: subordo Polypodiacear. Gen.: Dicksonia, Balantium, Pinonia, Cibotium, Leptopleuria, Patania.

Dicksoniae J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 418; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 432: sect. Dicksoniear. Gen.: Saccoloma, Cystodium, Sitolobium, Balantium, Dicksonia, Thyrsopteris, Cibotium.

Dicksonieae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 262: subtrib. Hymenophyllacear. Gen.: Dicksonia, Balantium, Saccoloma, Pinonia.
J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 414; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 419: trib. (6) Polypodiacear. Sect.: Lindsaeae, Davallieae, Trichomaneae, Dicksoniae. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 433 (334). Gen.: Hypodematium, Sphaeropteris, Diacalpe, Woodsia, Sphaerostephanos, Hypoderris, Deparia, Dicksonia, Davallia. — Hook. 1844. Sp. Fil. Pt. I. p. 56. Subtrib.: Hypoderrideae, Woodsieae, Eudicksonieae.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: div. Polypodiacear. Gen.: Dictyoxyphium, Schizoloma, Lindsaea, Odontoloma, Nephrolepis, Humata, Saccoloma, Leptopleuria, Leucostegia, Microlepia, Davallia, Patania, Dicksonia, Culcita, Balantium, Cibotium, Deparia.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 38. 334: trib. Cathetogyratar. hypochlamydear. Gen.: Dicksonia, Deparia, Hypoderris, Woodsia, Diacalpe, Sphaeropteris.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 279: subtrib. Polypodiacear.

Dicksonioides Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 67; 1846. Chlor. protog. p. XLI: sect. Sphenopteridis.

Dicksonites Göppert 1836. Syst. Fil. p. 249: sect. Cheilanthitis.

Dicladia Ehrenb. 1844. Ber. Berl. Ak. p. 73: nov. g. Naviculaceor., ad Rhizosoleniam proxime accedens.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 24. n. 17: g. Melosirear.

Diclemia*) Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 102: nov. g. Clidemiear. (C. petiolaris.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 776.

Diclidanthera**) Martius 1827. Nov. gen. II. 2. p. 139. t. 196. 197: nov. g. Ebenacear. (D. penduliflora et laurifolia.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 379 et DC. Pr. VIII. p. 210. 245. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 42. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 744. (An familiae propriae?)

*) Anagramma nominis Clidemiae.
**) δικλίς, janua valvis duabus.

Diclidanthera Mart. cont.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 343: g. Decandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3594; 1841. Nom. p. 136. n. 5276: g. Styracear. (genuinar.) — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 332. n. 1680. — Meisn. 1839. Gen. p. 250 (158). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 417. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1387.
Endl. 1839. Gen. p. 743. n. 4253; 1841. Ench. p. 363. n. 4252: g. Ebenaceis aff. — Par. Mart. 1856. Fl. Bras. fasc. XVII. p. 11.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 795: g. monopetalum incertae sedis.
Miers 1852. Ann. and Mag. 2d. ser. IX. p. 131: g. Diclidantherear.
Synon. Pluchia Fl. Flum.

Diclidanthereae Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. IX. p. 131: trib. Hamamelidacear. Gen.: Diclidanthera.

Dicliderma „Bonn." Endl. in synon. Ceramii: vid. *Dictiderma Bonnem.*

Diclidium „Schrad." Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 51: nov. g. Cyperear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119.
Liebm. 1850. Mexico's Halvgräs.: sect Cyperi.

Diclidocarpus A. Gray 1853. Proc. Amer. Ac. III. p. 3; 1854. Un. St. expl. exp. p. 200: nov. g. Tiliacear. *Cf.* Flora 1855. p. 395. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 329.

Diclidopterides Perleb 1838. Clav. class. (Isis 1838. p. 811): ordo Filicinar. Fam. 22. 23.

Diclidopteris Brackenridge 1854. Un. St. expl. exp. XVI: nov. g. Filicum. *Cf.* Kew gard. misc. VIII. p. 94.
= Vaginularia Fée.

Diclidospermae (s. Valvatae) Tausch 1834. Flora I. p. 346: trib. Mericarpar. Subtribus: Peucedaneae, Silerineae.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 371: series Umbelliferar. Gen.: Angelica, Lophosciadium, Ferula, Caroselinum, Peucedanum, Anethum, Pastinaca, Lophotaenia, Heracleum, Opoponax, Tordylium.

Diclidospermeae Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 135. 159: sect. Umbelliferar. Sect.: Peucedaneae, Silerineae.

Diclidostigma Kunze 1843. Linnaea XVII. p. 576: nov. g. Melothriear. (D. melothrioides.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 760. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 10. 32.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315: g. Cucurbitear.

Diclinae Juss. 1824. Dict. v. 30. p. 463: class. XV. Dicotyledonum.

Diclinae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 250: sect. 9 Graminear. Gen.: Tripsacum, Zizania, Olyra, Hydropyrum, Coix, Zea.

Diclinothrys Rafin. 1825. Neogen. p. 3.
= Chamaelirium Willd. (Endl. Spl. I. p. 1357.)

Dicliptera Juss. 1807. Ann. Mus. IX. p. 267: nov. g. a Justicia L. sejunctum. (D. chinensis, etc.) *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 189.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 55. 168. n. 80: g. Acanthacear. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 236. — Kunth 1823. Syn. II. p. 33. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 789. — Bartl. 1830. Ord. p. 184.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 411; 1825. Syst. I. p. 85. n. 107; 1830. Gen. I. p. 23. n. 96: g. Acanthear. (Diandr. Monogyn.) — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 60. — Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3114.
Link 1821. En. I. p. 28: g. Acanthinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Justiciear.
Dicliptera Nees, Rungia Nees, etc.

Dicliptera Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 111; 1841. Linnaea XV. p. 373; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 160; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 473: g. restrict. Diclipterear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 110. n. 4286. — Endl. 1839. Gen. n. 4093. p. 706; 1841. Ench. p. 344. — Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 744. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 842.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31 *(Diclyptera).* 79: g. Acanthacear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 64 *(Diclyptera):* g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Diclipteridar.
Synon. Dianthera Sol.; Diapedium Röm. (Steud.) Diclipterae sect. 1 et 2 Juss.; Justicia chinensis Vahl.

Dicliptereae Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 76; 1841. Linnaea XV. p. 373: subtrib. Echmatacanthor.
Endl. 1839. Gen. p. 706; 1841. Ench. p. 344: trib. Acanthacear. Gen.: Blechum, Rungia, Dicliptera, Amphiscopia, Peristrophe, Sautiera, Hypoestes, Rhaphidospora. — Par. Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 159. Gen. bras.: Pentstemonacanthus, Dicliptera, Dactylostegium.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146: sect. Echmatacanthor. Gen. ut Endl.
Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205): subtrib. Echmatacanthor. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 110: div. Esmatacantor. Gen. ead.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 463: trib. Echmatacanthear. Gen.: Pentstemonacanthus, Blechum, Tetramerium, Rungia, Dicliptera, Henrya; Brochosiphon, Peristrophe, Rhaphidospora, Hypoëstes, Lasiocladus, Brachystephanus, Clinacanthus.

Diclipteridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 680: trib. Echmatacanthor. Gen. Diclipterear. Endl. et Monothecium.

Diclis Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 23; 1846 in DC. Prodr. X. p. 264; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: nov. g. Hemimeridear. — Par. Endl. 1829. Gen. n. 3889.

Diclis Benth. cont.
p. 672; 1841. Ench. p. 338. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267. — Meisn. 1840. Gen. p. 305 (216). — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4497. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 358. 485. — Walp. 1845. Rep. III. p. 185. 959. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 744.

Diclyptera Dietr., Brongn. vid. *Dicliptera Nees.*

Diclytra*) Borckh. 1797 in Römer Arch. I. 2. p. 46: nov. g. ex typo Fumariae Cucullariae L., jam a Necker (Elem. bot. III. p. 61) indicatum.
= Dicentra Bernh.

Diclytra DC. 1821. Syst. II. p. 107; 1824. Prodr. I. p. 125: g. Fumariacear. latius circumscriptum. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 274.
Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 177: g. Diadelph. Hexandr. (D. formosa.)
D. Don 1825. Nepal. p. 198: g. Papaveracear. (D. scandens.)
= Diclytra et Capnorchis Borckh.

Dicnemon**) Schwägr. 1824. Suppl. II. vol. I. 2. p. 126. t. 32: nov. g. Muscor. frondosor. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 172. n. 3316; 1831. Gen. II. p. 731. n. 3708.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 291 (*Dicnemum*): g. Hypnoïdear. — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60 (*Dicnemum*).
Brid. 1827. Bryol. II. p. 215: g. Pleurocarpor. peristomor. (ibid. p. XLV Sciurodeor.) — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 745.
Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 562: g. Leucodontinor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Endl. 1836. Gen. n. 582. p. 56; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 960: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 346: g. Dicranacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: g. Hypnear.
Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 63: g. Dicranear.
Synon. Eucnemis Brid.; Hollia Sieb.; Leucodontis sp. Schw.

Dicnemum Arnott, Fürnr. vid. *praeced.*

Dicocca Petit-Thouars mss.
= Dicoryphe Pet.-Thouars. (Tulasne.)

Dicoccos Herm. mss. in Mus. Lugd.
= Psydrax Gärtn.

Dicoccum Corda 1829 in Sturm Fl. Fung. II. p. 117. t. 54: nov. g. Fungor. (D. minutissimum.) *Cf.* Flora Lit. II. p. 47.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 476: g. Tubercularinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 202. p. 18; 1841. Ench. p. 13.

Dicoccum Corda cont.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 6; 1838. II. p. 5; 1839. III. p. 4; 1842. V. p. 4; 1842. Mycol. p. 13: g. Phragmidiacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 19: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 28. — Bonord. 1851. Hdb. p. 46.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Torulaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Melanconieor.?

Dicodon Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 5; 1789. Beitr. IV. p. 146.
= Linnaea (borealis).

Dicoma Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 12; 1818. ibid. p. 47; 1817. Dict. v. 7. p. 110; 1819. v. 13. p. 194: nov. g. Carlinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2299. — Bartl. 1830. Ord. p. 145.
Cass. 1827. Dict. v. 47. p. 498. 503; 1830. v. 60. p. 570: g. Xeranthemear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9.
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3785. 1: sect. Dicomae.
= Eudicoma DC.

Dicoma Lessing 1830. Linnaea V. p. 276; 1832. Syn. Compos. p. 109: g. emendat. Mutisiear. Subgen. (1832): Leucophyton, Rhigiothamnus, Macledium. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 745.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 35: g. Eumutisiear. Sect.: Eudicoma, Steirocoma (serius VII. p. 306 correctum Microcoma), Rhigiothamnus, Macledium, Pterocoma. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 486. n. 2930. Sect. ut Less. — Meisn. 1839. Gen. p. 229 (141). — Endl. 1841. Spl. I. p. 1386; 1841. Ench. p. 248. Sect. ut DC.
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3785: g. Chuquiragear. Sect.: Dicoma, Macledium, Pterocoma.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: g. Barnadesiear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 108: g. Mutisiacear.
Synon. Dicoma, Nitelium et Macledium Cass.; Schaffnera Schultz.

Diconangia Mitchell 1748. Act. Nat. Cur. VIII. App. p. 208: nov. g. plant. (Pentandr. Monogyn.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 165: g. Vaccinior.
= Itea Linn.

Dicophe Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 41 in Römer Collect. bot. p. 205: nov. g. Araliar. An Rhamnis affinius?
Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3795: g. Hederacear.?
Bartl. 1830. Ord. p. 238: g. Araliacear.? — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 113.
Vid. Dicoryphe Petit-Thouars.

Dicoris Torrey & Gray 1848 apud Emory p. 143: nov. g. Ivear.

Dicorynea Lindl. vid. *seq.*

Dicorynia Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73. 82: nov. g. Cassicar. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 98. n. 6782/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 353. (?) — Walp. 1846. Rep. V. p. 562. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555 (*Dicorynea*).

Dicorypha Hedw., Spreng., Gardn. vid. *seq.*

---

*) Etym. ex auctore: *δίς*, bis; *κλυτρον* (pro *κέντρον*), calcar.

**) *κνήμη*, crus.

Dicoryphe*) Petit-Thouars 1805. Vég. îl. Afr. I. p. 15. 31: nov. g. Tetrandr. Digyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 348. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 195. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 113. n. 574.
Hedw. 1806. Gen. p. 81. n. 376 (*Dicorypha*): g. Rhamnear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 491. n. 546 (*Dicorypha*). (?)
R. Brown 1818 in Abel narr. journ. Chin. p. 374 (Descr. pl. chin. p. 3. — Verm. bot. Schr. I. p. 561): g. Hamamelidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1901; 1841. Nom. p. 70. n. 2641. — Bartl. 1830. Ord. p. 240. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 550. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 78. — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 142.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 33. 485. n. 594: g. Araliar., vel potius Rhamnor.
Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4452: g. Spiraeear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 269: g. Hamamelear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 397. — Meisn. 1838. Gen. p. 153 (109). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 784.
Endl. 1839. Gen. n. 4588. p. 803; 1841. Ench. p. 401: g. Euhamamelear. — Par. Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 323 (*Dicorypha*).
Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 745: g. Amamelidear.
Synon. Diania Nor.; Dicocca Pet.-Th.; Dicophe Pet.-Th.; Glycoxylum Capel.

Dicotyleae Link 1841. Fil. hort. Berol. p. 1: class. I. Vegetabilium.

Dicotyledonea Bartl. 1830. Ord. nat. p. 76: div. Vegetabilium vascularium phanerogamor. Subdivis.: Chlamydoblasta, Gymnoblasta.

Dicotyledoneae DC. 1818. Syst. I. p. 123; 1824. Prodr. I. p. 1: class. I. Cotyledonear. Subclass.: Thalamiflorae, Calyciflorae, Corolliflorae, Monochlamydeae. *Cf.* A. Rich. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 745.
Meisn. 1843. Gen. p. 437: div. Vegetabilium vascularium. Subdivis.: Diplochlamydeae, Monochlamydeae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. XVI. 30: ramificatio Phanerogamar. Subramif.: Angiospermae, Gymnospermae.
Schleid. 1843. Grundz. II. p. 110: div. Thalamicar.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 1. Series: Corolliflorae, Thalamiflorae, Calyciflorae, Incompletae.
Leun. 1849. Schul-Nat. II. p. 74: class. I. Phanerogamar. vascular. Divis.: Choristopetalae, Gamopetalae, Monochlamydeae.

Dicotyledones Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 33: div. class. IV. plantar. Subdivis.: Poly-, Diplo-, Iso-, Meiostemones, Cruciatae, Papilionaceae, flore monopetalo staminibus 4 inaequalibus, floribus uni semini insidentibus congregatis (Capitatae, Corymbiferae, Radiatae, etc.)

*) κορυφή, jugum.

Dicotyledones Hall. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 70: div. III. plantar. Classes 5—15.
Gis. 1792. Prael. p. 3: class. plantar.
DC. 1805. Franç. III. p. 269: class. III. plantar.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 349. Ed. Nees p. 205. Sect.: Apetalae, Monopetalae, etc.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 872: class. 5—15 plant. Divis.: apetalae, monopetalae, polypetalae.
Sternb. 1825. Vers. I. p. XXXVII: class. Vegetabilium. Gen.: Knorria, Stigmaria, Thuites, Nymphaeites, Conites, Juglandites.
Wilbr. 1837. Hdb. p. LVIII. Classes: Hypomonopetalae, Hypopolypetalae, Discipetalae, Calycipetalae, Apetalae, Epipolypetalae, Epimonopetalae.
Unger 1838. Aphor.: class. XIII. Acramphibryar. (Linnaea 1838. Litt. p. 135.)

Dicraea*) Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 100; 1852. Arch. Mus. VI. p. 114; 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIII. p. 252: g. Eulacidear. (emend.) Sect.: Eudicraea, Blandowia (1852 Polypleurum), Macrolacis, Ceratolacis. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 436. Sect. eaed. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 782.
Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 33. t. 1917: g. Podostemacear.

Dicraeia Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. nr. 4 in Römer Collect. bot. p. 196: nov. g. Naiadum. („*Podostemon Michx.*") *Cf.* Juss. 1819. Dict. v. 13. p. 200.
Mart. 1824. Nov. gen. I. p. 6: g. Podostemear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 122 (88).
= Eudicraea Tul.

Dicranacanthus**) Oersted 1855. Centralam. Acanth. p. 23: sect. Barleriae. (An genus Barleriear.?) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 654.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 808: g. Barleriear.

Dicranaceae Bruch. Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: fam. Muscor. Gen.: Ceratodon, Trematodon, Campylostelium, Arctoa, Cynodontium, Dicranum, Dicranodontium, Campylopus, Oncophorus.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 341: trib. Acrocarpor. Gen.: Blindia, Eucamptodon, Dicnemon, Pilopogon, Holomitrium, Dicranum.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 134: subsect. Dicranoidear. Gen.: Ceratodon, Trematodon, Dicranum, Dicranodontium, Thysanomitrium, Campylostelium, Arctoa.
Bayrh. 1849. Taun. p. 4: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Trematodon, Campylopus, Dicranodontium, Ceratodon, Dicranum, Cynodontium.

Dicranantherа Presl 1832. Symb. bot. I. p. 75. t. 50: nov. g. Rhexiear. (D. hedyotidea.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 368. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 115 (82). — Endl. 1840. Gen. n. 6193. p.

*) δίκραιος, biceps, quàre nomen Dicraeiae correctum.
**) δίκρανος, biceps, furca.

Dicrananthera Presl cont.
1210; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6701. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 747.
Cham. 1834. Linnaea IX. p. 385.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 281: g. Lasiandralium.

Dicranea Rchb. 1828. Consp. p. 34: sect. Dicranoideor. Gen.: Oncophorus, Trematodon, Dicranum, Ceratodon.

Dicraneae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75: sect. Muscear. Gen.: Dicranum, etc. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 747.
Angström 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 94: div. Bryacear. Gen.: Leucobryum, Dicranum, Discelium, Trematodon, Campylopus, Didymodon, Weissia, Hymenostomum, Anictangium, Gymnostomum.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: trib. Acrocarpor. Gen.: Campylopus, Dicranum, Campylostylium, Trematodon, Leucobryum, Symblepharis, Cynodontium.

Dicranella C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 430: sect. Angströmiae.
Synon. Diobelon Hampe; Dichodontium et Dicranellum Br., Sch. & G.

Dicranella Endl. 1850 vid. *Dicranilla Fenzl.*

Dicranellum Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47: subg. Dicrani. (D. cerviculatum, etc.)
= Dicranellae Müll. pars.

Dicranema Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 45; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 173: nov. g. Gasterocarpear. (Gracilaria pumila Grev.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Plocariear.
= Cystoclonium Kütz.

Dicranilla „Fenzl" Endl. 1840. Gen. n. 5234 *e.* p. 967; 1841. Ench. p. 505; 1850. Spl. V. p. 56 *(Dicranella):* sect. Arenariae.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7783: g. Möhringiear.

Dicranobryum C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 309: sect. Bryi. (B. dicranoides Hsch.)

Dicranocarpus A. Gray 1854. Mem. Amer. Ac. n. ser. V. p. 322: nov. g. Compositar. (Heterospermum dicranocarpum Gray). *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 211 inter Melampodineas.

Dicranodontium Bruch, Schimp. & Gümb. 1847. Bryol. eur. Fasc. 41: nov. g. Dicranacear. (Didymodon longirostris Schw.) — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 148. — Bayrh. 1849. Taun. p. 4.
Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 67: g. Dicranear.

Dicranoidea Rchb. 1828. Consp. p. 34: subdiv. Acrocarpior. Sect.: Weissiacea, Dicranea, Orthotrichea, Trichostomea, Barbulacea.

Dicranoideae Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 248: trib. 9 Muscor. Gen.: Weissia, Trematodon, Dicranum, Thysanomitrion, Dydimodon, Tortula.

Dicranoideae Arnott cont.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 120: sect. Stegocarpor. Subsect.: Weisiaceae, Seligeriaceae, Dicranaceae.

Dicranoidei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV: fam. Vaginulator. acrocarpor. Gen.: Oncophorus, Trematodon, Dicranum, Ceratodon.

Dicranolepis Planchon . . . . in Hook. Icon. VIII. t. 798; 1849. Niger Fl. p. 496. t. 48: nov. g. Thymelear. (D. disticha.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 588: g. Daphnoidear.
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 599: g. Gnidiear.

Dicranopetalum Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 454: nov. g. Paulliniear., Urvilleae et Serjaniae aff.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 133: g. Sapindacear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 78. n. $5599/_1$: g. Sapindear.
= Toulicia Aubl. (Lond. journ. bot. VII. p. 104.)

Dicranophlebia Martius . . . . Crypt. p. 67. Endl. 1841. Spl. I. n. 652 *b.* p. 1351; 1841. Ench. p. 37: sect. Alsophilae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1047. 2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Cyathear.

Dicranopteris Bernhardi 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 38. t. 3. f. 13: nov. g. Pleurogyratar. (Polypodium dichotomum.) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 201.
Endl. 1836. Gen. p. 64. n. 659 *c:* sect. Gleicheniae.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 339: sect. Mertensiae.
= Mertensia Willd.

Dicranopteris „Blume" Endl. 1841. Spl. I. n. 615 *a β.* p. 1346; 1841. Ench. p. 36: subsect. Eupolypodii. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 985. 1 *b.*

Dicranopus Naudin 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 127: sect. Lasiandrae.

Dicranostachys Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 85: nov. g. Conocephalear. (D. serrata.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 653.
= Myrianthus Palis. ?

Dicranostigma Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 255: nov. g. Papaveracear. (D. lactucoides.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 172: g. Argemonear.

Dicranostyles Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 355: nov. g. Convolvulacear., Maripae et Erycibae aff. (D. scandens.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 528: g. Argyreiear.

Dicranum*) Hedwig 1782. Fund. II. p. 91. t. 8; 1801. Spec. Musc. p. 126: nov. g. Muscor. (frondosor.) *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 747. — Par. Roth 1788. Germ. I. p. 460. 461 *(Dircanum);* 1800. III. p. 156. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 759. n. 1644. — Mönch 1794. Meth. p.

*) δίκρανον, fuscina.

Dicranum Hedwig cont.
732. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 11. 79. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 297. — Rebent. 1804. Neom. p. 254. Sect.: Dicrana, Fissidentes. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 33. — DC. 1805. Franç. II. p. 470; 1815. V. p. 219. Sect. ut Rebent. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 72. Sect. eaed. — Mart. 1817. Erlang. p. 96. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 733. Sect. ut DC. — Agdh. 1822. Aphor. p. 107. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 163. n. 3313; 1831. Gen. II. p. 730. n. 3705. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 154. (odontostomor.) Sect.: Fissidens, Fuscina, Campylopus, Oncophorus. — Math. 1853. Belg. II. p. 53.

Brid. 1797. Musc. rec. I. p. 163; II. 1. p. 154; 1806. Spl. I. p. 172: g. Aploperistomator.

Batsch 1802. Tab. p. 264: g. Muscoideor.

Palis. 1804. Dict. v. 4. p. 391 *(Bifurque)*; 1805. Prodr. Aétheog. p. 18. 52; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 444: g. Ectopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 218.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 37: g. Mitrocarpor.

Brid. 1822. Meth. musc. p. 52: g. Peristomor. acrocarpor. Sect.: Oncophorus, Dicranum, Aegiceras.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75: g. Dicranear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 37. — Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 94. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 64.

Brid. 1826. Bryol. I. p. 406: g. Acrocarpor. peristomor. Sejungitur Oncophorus.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 741: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 182.

Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 252: g. Dicranoidear. Sect. ut DC.

Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV: g. Dicranoideor.

Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 617: g. Dicraneor.

Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Weissioidear. (sphalm. omissum.) — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 82.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.

Hüb. 1833. Muscol. germ. p. 225: g. Aploperistomor.

Endl. 1836. Gen. n. 527. p. 51; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 11.

Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 905: g. Calyptrobryor.

Bruch, Schimp. & Gümb. 1847. Bryol. eur. Fasc. 33—36; 1851. Fasc. 46. 47: g. Dicranacear. Subgen. (1851): Oncophorus, Dichodontium, Dicranellum, Orthodicranum, Dicranum. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 136. — C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 351. Sect.: Leucoloma, Oncophorus, Orthodicranum, Campylopus. — Bayrh. 1849. Taun. p. 4.

Synon. Glaucopis Brid.

Dicrastyleae „Drumm." Harvey 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 56: nova familia inter Verbenaceas et Cordiaceas media? Gen.: Dicrastylis.

Dicrastylis „Drumm." Harvey 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 56: nov. g. Dicrastylear. (D. fulva.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 703.

Dicratera Korthals . . . . Nederl. kruidk. Arch. II. p. 200: subg. Diplosporae. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 238.

Dicrobotryon „Willd." Endl. in synon. Guettardariae: vid. *seq.*

Dicrobotryum „Willd. mss." Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XIII. 221. n. 901: g. Pentandr. Monogyn., Naucleae aff.? (D. divaricatum W.)

= Guettardaria DC.

*Dicroophytum**) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 209: gen. 9 plant. Spec. nat.: Andromeda, Boretta, Kalmia, Rhododendrum, Adodendrum, Erica, Lopharina, Apogandrum, Vaccinium, Oxicoccus, Epigaea, Pyrola, Arbutus, Mairania, Clethra, Gaultheria, Royena, Blaeria, Penaea, Azalea, Ledum, Gynastrum, Prozetia, Hosangia, Rhexia, Inocarpus, Diospyros.

Dicrophlebis Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 74: sect. Pecopteridis.

Dicrostachys Webb vid. *Dichrostachys DC.*

Dicrus Reinw. 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Pentandr. (foetidus.)

= . . . ?

Dicrypta Lindl. 1830. Orchid. gen. p. 44 (Bot. Regist. XII. 1028): nov. g. Pleurothallear. minus notum. (D. Baueri.)

Lindl. 1833. Orchid. p. 152: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1414. p. 198; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2019. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Brongn. 1843. En. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 751.

Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 39. t. 68.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: sect. Maxillariae.

Synon. Heterotaxis Lindl.

Dictamneae Bartl. 1830. Ord. nat. p. 389: div. Diosmear. Gen. unicum: Dictamnus. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 196. Gen. id.

Spach 1834. Vég. phan. II. p. 321: trib. Diosmear. Gen. id. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1159; 1841. Ench. p. 612. Gen. id. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 276.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471: trib. Rutacear. Gen. id.

Dictamnus**) Linn. 1737. Gen. p. 124. n. 346; 1737. Cliff. p. 161; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 102; 1753. Sp. I. p. 383; 1759. Syst. ed. X. p. 1019. n. 468; 1762. Sp. ed. II. p. 548;

---

*) δίκροος, bifidus; φυτόν, planta.
**) Synonymon Fraxinellae apud Bauhinum. (Ht. Cliff.)

Dictamnus Linn. cont.
1764. Gen. ed. VI. p. 209. n. 522; 1767. Syst. ed. XII. p. 292. n. 516: g. Decandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 284. — Murr. 1774. Syst. p. 330; 1784. Syst. p. 397. — Reich. 1778. Gen. p. 213. n 564. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 287. n. 726. — Gmel. 1791. Syst. p. 676. — Pers. 1797. Syst. p. 425. — Willd. 1799. Sp. II. p. 541. n. 824; 1809. En. p. 446. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 60. 64.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 98. n. 408: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rutar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Multisiliquar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 376.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 177 (err. *Dictamus)*: g. Diplosantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 314: g. Pentapetalar. irregular.
Scop. 1777. Intr. p. 253: g. Polycarpiar.
Medic. 1789. Vorl. IV. 1. p. 253. *Cf. Fraxinella Tourn.*
Juss. 1789. Gen. p. 297: g. Rutacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 229. — Batsch 1802. Tab. p. 55. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 105 *(Dictamus)*. — Pers. 1805. Ench. I. p. 464. n. 1040. — DC. 1805. Franç. IV. p. 733. — Hedw. 1806. Gen. p. 300. n. 1192. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 673; 1825. Syst. II. p. 321. n. 1581; 1830. Gen. I. p. 348. n. 1758. — Link 1821. En. I. p. 398; 1831. Hdb. II. p. 225. — Presl 1826. Sicul. I. p. 216. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 108. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1418. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 128.
Neck. 1790. El. II. p. 299. n. 1071: g. Synathrophytor.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 33): g. Diosmear. — Par. DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140; 1824. Pr. I. p. 712. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 467. — Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5155; 1832. Fl. exc. p. 767; 1837. Hdb. p. 282. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 781. — Koch 1836. Syn. p. 145. Ed. II. p. 159. — Meisn. 1837. Gen. p. 61 (45). — Brongn. 1843. En. genr. p. 83.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 153: g. Fraxinellar.
Bartl. 1830. Ord. p. 389: g. Dictamnear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 323. — Endl. 1840. Gen. n. 6024. p. 1159; 1841. Ench. p. 612. — Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7495. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 494. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 330. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 751.
Synon. Fraxinella Tourn.

Dictamus Gmel., St. Hil. vid. *praeced.*

Dictiderma Bonnemais. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 185: nov. g. Hydrophytar. loculatar. (Ceramii sp. Roth & Agdh.)
= Ceramium Adans.

Dictilema „Rafin. Préc. somiol." g. Confervear., teste Leman 1819. Dict. v. 13. p. 201. *Cf. Dictylema.*

Dictionema Menegh. vid. *Dictyonema Agdh.*

Dictotomaria „Lamx." Flora 1843. p. 93 (g. Batrachospermear.): vid. *Dichotomaria.*

Dictyaloma „DC." Walp. vid. *Dyctioloma DC.*

Dictyanthes Rafin. (ubi?): nov. g. pro Aristolochia labiosa conditum. (Linnaea VIII. Litt. p. 71.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 173: g. Pistolochiear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 560: g. Aristolochiear.

Dictyanthus*) Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 604: nov. g. Gonolobar. (Stapelia campanulata Pav.) *Cf.* Fl. d. serr. VIII. p. 55.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Gonolobear.
Synon. Tympananthe Hassk.

Dictycia „Rafin." Leman vid. *Dycticia Rafin.*

Dictyderma „Bonn." Endl. Gen. Suppl. III. p. 36 in synon. Ceramii: vid. *Dictiderma Bonnem.*

Dictydium Schrad. 1797. Nov. gen. I. p. 11. t. 3. f. 6. t. 4. f. 1. 6: nov. g. Fungor., inter Cribrariam et Liceam quasi medium. (Cribraria cernua Pers.) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 202.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 29: g. Gastromycor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 49: g. Gymnospermor.
Nees 1816. Syst. p. 120; 1817. Überbl. p. 32: g. Trichocistor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 380.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berl. p. 14: g. Cribrariar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 578: g. Cribaridear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 80 *(Dyctidium)*: g. Trichosporear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 556: g. Trichiacear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 143: g. Trichiaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n 184; 1841. Nom. p. 9. n. 358.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: g. Fuliginear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 531. n. 3519; 1831. Gen. II. p. 772. n. 3965: g. Trichogasterum.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 164; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 456: g. Stemoniteor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 311. p. 26; 1841. Ench. p. 16. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 267.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 359: g. Angiogasterum.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 22; 1842. V. p. 21. 59; 1842. Mycol. p. 85: g. Cribrariacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.

*) δίκτυον, rete.

Dictydium Schrad. cont.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Cribrarieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 216: g. Stemonitideor.
Dictylema Rafin. 1814. Préc. Somiol. n. 54. (An *Dictilema?*)
= Microdictyon Decne. (Endl. Spl. III. p. 14.)
Dictymenia Trevisan, Sonder vid. *Dictyomenia Grev.*
Dictymia J. Smith . . . . ex Kunze 1850. Linnaea XXIII. p. 276. (*Dyctimia J. Sm.* ex Fée Gen. Fil. p. 357.)
Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 42: g. Polypodiear.
= Polypodium (Brownianum) Spreng.
Dictyocalyx Hook. f. Proc. Linn. soc. n. 28. p. 277) 1846. Linn. Trans. XX. p. 202: nov. g. Solanear.
Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148: g. Daturear. — Par. Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 537.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 572: g. Nicotianear. (1852. Ann. bot. III. p. 150 ad Thinogetonem et Polydiclidem Miers translatum.)
Synon. Nicotianae sect. Polydiclia Dun.
Dictyocarpus Wight 1837. Madras journ. Nr. 15. p. 309: nov. g. Malvacear. (Melochia truncata W.) *Cf.* Linnaea 1838. Litt. p. 225 et Ann. sc. nat. 2e sér. XI. 1839. p. 169.
= Sida Kunth.
Dictyocha Ehrenb. 1838. Leb. Kreideth.; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 207; 1844. ibid. p. 79. 80: g. Bacillarior.
Kütz. 1844. Bacill. p. 140; 1845. Phyc. germ. p. 117; 1849. Sp. Alg. p. 142. n. 101: g. Actiniscear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 51: g. dubium Schizophycear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 94: g. Dictyochear.
Dictyocheae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 94: trib. unica Hemiphractar. Gen.: Dictyocha, Mesocena, Actiniscus.
Dictyochiton Corda mss.
= Fimbriaria Nees. (Endl. Gen. p. 1337.)
Dictyocromyon C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 634; 1853. N. Verh. Berl. Gartenb. I. p. 399: sect. Croci. (C. variegatus Hoppe, etc.)
Dictyodaphne Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 17. p. 270. 332: nov. g. Cryptocaryear. An subg. Endiandrae? (D. rubescens.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 307. (?)
Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 918: subg. Endiandrae.
Dictyogenae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 211: class. V. plant. Nixus: Dictyogenae. Ordines: Triuridaceae, Dioscoreaceae, Smilaceae, Philesiaceae, Trilliaceae, Roxburghiaceae.
Dictyoglossum J. Smith . . . . . . (Acrostrichum crinitum L.) ex Kunze 1850. Linnaea XXIII. p. 213.
Dictyogramme Fée 1852. Gen. Filic. p. 170: nov. g. Hemionitidear. (Gymnogramme japonica Kze.)
Dictyoloma A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 409. t. 24: g. Zanthoxylear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5138. — Bartl. 1830. Ord. p. 386. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 800. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 361. — Meisn. 1837. Gen. p. 64 (46). — Endl. 1841. Ench. p. 608. n. 5968.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 51; 1830. Gen. I. p. 188. n. 950: g. Rutacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 834.
Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7480: g. Xanthoxylear.
Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 582: g. Spatheliear. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 174. — Endl. 1850. Spl. V. p. 100. n. $5967/_7$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 473: g. Xanthoxylacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 1.
Synon. Dyctioloma DC.; Dictyaloma Walp.; Benjaminia Fl. Flum.
Dictyomenia Greville 1830. Alg. synops. p. L.
Menegh. 1838. Cenni p. 38: g. Floridear.
Decne 1840. Bull. Ac. Brux. VII. 1. p. 414; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358 (Flora 1843. p. 98): g. Rytiphlear.
Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 27; 1842. Alg. medit. p. 146: g. Rhodomelear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 47. n. $122/_{63}$. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 182; 1852. Linnaea XXV. p. 697 (*Dictymenia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 169. — Mont. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 752 (*Dictymenia*).
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 738: g. Plocamiear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phyc. gener. p. 448: g. Rytiphloeacear.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 335; 1849. Sp. Alg. p. 847. n. 557: g. Rytiphlaeacear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 107 (*Dictymenia*): g. Rytiphlaeinear.
Synon. Volubilaria Lamx.; Euspiros Targ.
Dictyonema Agardh 1824. Syst. Alg. p. XXVI. 85: nov. g. Confervear. *Cf.* Fries 1825. Pl. homon. p. 303.
Rchb. 1828. Consp. p. 6: g. Byssaceor. dubium.
Menegh. 1838. Cenni p. 31 (*Dictionema*): g. Lemaniear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 667: g. Hydrodictyear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 88; 1843. Phycol. gener. p. 230: g. Calothrichear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 321. n. 22: g. Scytonemear.
Dictyonema „Pers.“ Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: g. Auricularinor. (Nomen.)
„Agdh.“ Montagne 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 118; 1849 in Orb. Dict. V. p. 1:

Dictyonema Pers. cont.
g. Fungor., Corae aff. Char. reform. *(Synon. Dichonemia Bl. & Nees.)*

Dictyoneura Blume 1849. Rumphia III. p. 163: nov. g. Cupaniear. *(*D. acuminata et obtusa.*)*
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 212: g. Sapindear.

Dictyoneura A. DC. 1856. Prodr. XIV. 1. p. 201: sect. Myristicae.

Dicyoneurum Rupr. 1855. Mém. Act. Pet. 6e sér. VII. p. 80. t. 7: nov. g. Laminariear. (D. californicum.*)*

Dictyopeplos Hasselt 1824 in Konst en Letter Bode p. 327. *(Dictyopeplus* ex Wittst.)
= Hymenophallus Nees. (Endl. Gen. p. 31.)

Dictyopetalum Fisch. & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petrop. II. p. 45: sect. Oenotherae. An genus distinctum? (Oenothera concinna Don.) *Cf.* Linnaea 1837. Litt. p. 115.
Endl. 1840. Gen. n. 6118 *a.* p. 1191; 1841. Ench. p. 637: sect. Boisduvaliae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 89.

Dictyophallus „Perrott." Corda 1842. Anl. Mycol. p. LXXXV. 190; 1854. Icon. Fung. VI. p. 19. t. 3. f. 45: nov. g. Phalloidear. (Phallus aurantiacus Mont.)
Bonord. 1851. Hdb. p. 259: g Phalloideor.

Dictyophora Desvaux 1809. Journ. bot. II. p. 92: nov. g. pro Phallo indusiato propositum. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 203.
Lév. 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 499. t. 13. Char. emend.
Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 228 *b:* sect. Phalli.
Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 239: g. Phalloideor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487.
= Hymenophallus Nees.

Dictyophyllum Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. t. 104.
= Polypodites Göpp.

Dictyophyllum Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. p. 201.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 132: g. Filicitum.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 248; 1846. Chlor. prot. p. LXXXVI: g. incertae sedis.

Dictyopsis Sonder 1854. Linnaea XXVI. 5. p. 519: nov. g. Rhodymeniear. *(*D. fimbriata.)

Dictyopteris Lamx. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 129: nov. g. Algar. marinar. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 204.
Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 270: g. Dictyotear. — Par. Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 370. — Rchb. 1828. Consp. p. 212[a]. n. 508[b]. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Leman 1816. Dict. v. 1. spl. p. 118 *(Dyctiopteris):* g. Ulvacear.
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XXI: g. Ulvoidear.
Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 313: sect. Fuci.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 341: g. Dictyotidear.

Dictyopteris Lamx. cont.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 455: g. Eudictyotear.
= Haliseris Targ.

Dictyopteris Brongn. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 207: sect. Filicitis. (F. meniscioides Br.*)*
= Clathropteris Brongn.

Dictyopteris Presl 1836. Pterid. p. 194: g. Polypodiear. — Par. J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 396; 1842. ibid. IV. p. 64. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 267.
Endl. 1841. Spl. I. n. 615 *i.* p. 1347 *(Dyctiopteris);* 1841. Ench. p. 36: sect. Polypodii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 985. 9.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.

Dictyopteris Gutbier 1836. Abdr. u. Verst. p. 62.
Unger 1855. Syn. pl. foss. p. 58; 1846. Chlor. prot. p. XXXIX: g. Neuropteridum.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 68: g. foss. Filicum.
= Linopteris Sternb.

Dictyopyxis Ehrenb. 1844. Ber. Berl. Ak. p. 262: subg. Pyxidiculae.
= Coscinodiscus Ehrenb.

Dictyosiphon Greville 1830. Alg. brit. p. 55; 1830. Synops. p. XLIII.
Endl. 1836. Gen. n. 106. p. 9; 1841. Ench. p. 7: g. Fucacear.
Menegh. 1838. Cenni p. 42: g. Dictyotear. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 32. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 764. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. p. 93.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 24. n. 89. — J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 81. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 3; 1849. ibid. X. p. 56.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phyc. gener. p. 301; 1845. Phyc. germ. p. 248: g. Enteromorphear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 133.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dictyotidar.
Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 368: g. Chordariear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 485. n. 304: g. Dictyosiphonear. — Par. Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 238.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 445: g. Scytosiphonear.
Harv. 1852 Ner. bor. am. I. p. 113: g. Dictyotacear.
Synon. Stereocladon Hook. & Harv.; Stereothalia Trevis.?

Dictyosiphoneae Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 484: fam. Dermatoblastear. Gen.: Chlorosiphon, Stictyosiphon, Dictyosiphon.

Dictyospermum Wight 1853. Icon. pl. Ind. VI. p. 29. t. 2069—2071: nov. g. Commelinear. *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 157.

Dictyosphaeria Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 328 (Flora 1843. p. 93): nov. g. Siphonear (Valonia favulosa Ag.) *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 3. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 18. n. 53 (dubiae affinitatis).

Dictyosphaeria Decaisne cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19: g. Halymedidar.?
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 512. n. 333: g. unicum Dictyosphaeriear.
Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 50: g. Valoniacear.

Dictyosphaerieae Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 512: fam. Coeloblastear. Gen. Dictyosphaeria.

Dictyosphaerium Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 72: nov. g. Tetrasporear.

Dictyosporium Corda 1836 in Weitenw. Beitr. z. Nat. I. p. 87: nov. g. Fungor., Exosporio et Sporidesmio aff. *Cf.* Linnaea 1837. Litt. p. 157.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 6. t. 8. f. 29; 1842. V. p. 4; 1842. Mycol. p. 16: g. Phragmidiacear. (D. elegans.)
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 27: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 33. — Bonord. 1851. Hdb. p. 50.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Torulaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Melanconieor.

Dictyostega*) Miers 1839. Proc. Linn. soc.; 1840. Ann. nat. hist. V. p. 133; 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 538. t. 37. f. 1. 2: nov. g. Burmanniacear. (D. orobanchoides.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $1218/_2$. p. 1359; 1841. Ench. p. 96. — Meisn 1842. Gen. p. 390 (292). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 119. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 58. — Karst. 1856. Linnaea XXVIII. p. 421. (Char. completus.)
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1646: g. Burmanniear.
Miers 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 549; 1848. Ann. and Mag. 2d. ser. I. p. 235: g. Apteriear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 172.

Dictyostegeae „Miers" Benth. 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 13. Novum gen.: Ptychomeria.
Conf. Apterieae Miers.

Dictyota**) Lamx. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 38: nov. g. Algar. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 205.
Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 271; 1825. Dict. class. V. p. 483: g. Dictyotear. Sect.: Padina, Dictyota. — Par. Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 370. — Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 508 (sect.: Zonaria, Haliseris); 1841. Nom. p. 22. n. 765. — Menegh. 1838. Cenni p. 42; 1842. Alg. ital. p. 212. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 395; 1841. Brit. Alg. p. 31. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 44; 1842. Pl. cell. Cub. p. 65; 1849 in Orb. Dict. V. p. 3; X. p. 56. — Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 137. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 37; 1848. Spec. Fuc. p. 86. — Endl. 1843. Spl. III. p. 24. n. 90. — Zanard. 1843. Classif. p. 10. — Kütz. 1845. Pl. germ. p. 270; 1849. Sp. Alg. p. 553. n. 363. —

*) στέγη, membrana.
**) δικτυωτός, ad modum retis factus.

Dictyota Lamx. cont.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 123. Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 154. — Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 349. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 182. — Math. 1853. Belg. II. p. 495.
Leman 1816. Dict. v. 1. spl. p. 118 (*Dyctiota*): g. Ulvacear.
Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 310: sect. Fuci.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 341: g. Dictyotidear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 328: g. Fucacear. Subgen.: Zonaria, Haliseris.
Grev. 1830. Alg. brit. p. 57; 1830. Synops. p. XLIII.
Endl. 1836. Gen. n. 105 *b*. p. 9; 1841. Ench. p. 7: sect. Zonariae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Dictyotidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Fucear.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 451: g. Eudictyotear. Subgen.: Eudictyota, Stoechospermum.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 108; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 219: g. Dictyotacear.
Synon. Myxodes? et Evyphes Targ.; Dichophyllium Kütz. 1843.

Dictyotaceae Harvey 1852. Ner. bor. am. I. p. 99: ordo Melanospermear. Gen.: Haliseris, Padina, Zonaria, Taonia, Dictyota, Stilophora, Dictyosiphon, Punctaria, Soranthera, Asperococcus, Hydroclathrus. Accedit 1858 (ibid. III. p. 23) Striaria.

Dictyoteae Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 267; 1825. Dict. class. V. p. 484: ordo Thalassiophytor. non articulator. Gen.: Amansia, Dictyopteris, Dictyota, Flabellaria. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 208.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 72: fam. Uviniae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 583: div. Fucoidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 28. Gen.: Encoelium, Dictyota.
Gaill. 1828. Dict. p. 53. p. 370: ordo Symphysistear. Gen.: Amansia, Dictyopteris, Dictyota, Padina, Asperococcus.
Menegh. 1838. Cenni p. 41: fam. Algar. Gen.: Asperococcus, Stilophora, Striaria, Punctaria, Dictyosiphon, Dictyota, Cutleria?, Padina, Haliseris, Agardhia, Hildenbrantia.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 395: trib. Melanospermear. Gen.: Asperococcus, Dictyota, Padina, Haliseris. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 3. 29. Gen.: Cutleria, Halyseris, Padina, Dictyota, Dictyosiphon, Striaria, Punctaria, Asperococcus, Chorda.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 143: trib. Phycear. Gen. ut Harv. 1838 et Chorda, Stilophora, Hydroclathrus.
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 137; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330 (Flora 1843. p. 93): ordo Aplosporear. Gen.: Dictyota, Padina, Hildenbrandtia, Zonaria, Hydroclathrus, Asperococcus, Punctaria, Striaria, Stylophora, Cutleria, Dictyosiphon, Haliseris.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phyc. gener. p. 333. 337: fam. Pycnosper-

Dictyoteae Lamx. cont. mear. Gen.: Dichophyllium, Cutleria, Stoechospermum, Spatoglossum, Haloglossum, Haliseris, Stypopodium, Phycopteris, Zonaria, Phyllitis. — Par. Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 270; 1849. Sp. Alg. p. 553. Gen. ead. (Dictyota loco Dichophyllii) et Aglaozonia, Soranthera.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 10: trib. Ectogymnosporear. Gen.: Padina, Dictyota.
Endl. 1843. Spl. III. p. 24: trib. Halyseridear. Gen.: Halyseris, Dictyosiphon, Dictyota, Zonaria, Padina, Cutleria, Arthrocladia, Scytosiphon, Soranthera, Punctaria, Asperococcus, Striaria, Stilophora, Hildenbrandtia?
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 123: div. Episporear. Gen.: Dictyota, Punctaria, Ilea, Scytosiphon?, Asperococcus, Striaria, Stilophora, Padinella, Ralfsia (sphalm. *Rulfsia*).
Rabenh. 1847. Krypt. II. p. 181: subsect. Chordariear. Gen.: Haliseris, Padina, Stiftia, Stypopodium, Dictyota, Cutleria, Asperococcus, Punctaria, Striaria.
Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 349: fam. Episporear. Gen. ut Fries (excepto Scytosiphone).
J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 68: ordo Fucoidear. Gen.: Punctaria, Asperococcus, Striaria, Dictyosiphon, Stilophora, Dictyota, Stoechospermum, Taonia, Zonaria; Cutleria; Padina; Halyseris.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 103: trib. Dermatothallar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 4; X. p. 56: trib. Phycoidear. Gen.: Dictyopteris, Dictyota, Dictyosiphon, Zonaria, Padina, Cuttleria, Soranthera, Punctaria, Asperococcus, Adenocystis, Hydroclathrus, Striaria, Stilophora, Stiftia.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 421. Char. reform. Subtrib.: Punctarieae, Scytosiphoneae, Cutlerieae, Eudictyoteae.
Math. 1853. Belg. II. p. 405: trib. 6 Algar. Gen.: Dictyota.

Dictyotei Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 142: ordo Hydrophytor. (Gen.: Padina.)

Dictyothrix Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 86; 1843. Phycol. gener. p. 202: g. Leptotrichear.
= Leptothrix Kütz.

Dictyotidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 22: trib. Halyserear. Gen. Dictyotear. Endl. 1843 et Padinella.

Dictyotideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 340 (p. 318 *Zonarideae*): div. Thalassiophytar. Gen.: Zonaria, Dictyota, Dictyopteris.

Dictyotites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 33: g. foss. Fucoidear.
Endl. 1836. Gen. n. 122 *c*. p. 11; 1841. Ench. p. 8: sect. Fucoidis.

Dictyoxiphium Hook. 1838. Gen. Fil. t. 63.
J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 422: g. Lindsaear.
Hook. 1846. Sp. Fil. I. p. 224 (*Dictyoxyphium*): g. Lindsaeear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.

Dictyoxiphium Hook. cont.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694 (*Dictyoxyphium*): g. Dicksoniear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 110 (p. 36 et 103 *Dictyoxyphium*): g. Lindsayear.

Dictyoxyphium Hook., Brongn., Fée passim: vid. *praeced.*

Dictyurus Bory 1836 in Belang. voy. p. 170.
Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 24; 1842. Alg. medit. p. 67: g. Rhodomelear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 4.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358 (Flora 1843. p. 98): g. Rytiphlear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 50. n. $122/_{75}$: g. Anomalophyllear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108: g. Claudeinear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 673. n. 445: g. Callithamniear.
Synon. Calidictyon Grev.

Dicyclophora Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 89: nov. g. Echinophorear. (D. persica.) — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 13. n. $4520/_1$.
Walp. 1846. Rep. V. p. 910: g. Scandicinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.

Dicypellia Nees 1833. Progr. p. 14: div. Laurear. Gen.: Dicypellium, Petalanthera.
Nees 1836. Laurin. p. 23. 341: trib. Laurinar. Gen. ead. et Pleurothyrium.
Endl. 1837. Gen. p. 320; 1841. Ench. p 197: trib. Laurinear. Gen. ead. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 472. Gen ead.

Dicypellieae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 326 (238): trib. Laurear. Gen. Dicypellior. Nees 1836.
Rchb. 1841. Nom. p. 70: subdiv. Laurear. Gen. ead.

Dicypellium*) Nees 1833. Progr. p. 14; 1836. Laurin. p. 343: nov. g. Dicypellior. (Licaria guianensis Aubl.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 2045. p. 320; 1841. Ench. p. 197. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1332. 1349. — Spach 1841. Vég. phan. XI. p. 472.
Meisn. 1841. Gen. p. 326 (238): g. Dicypellicar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2663. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 5.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.
Synon. Licaria Aubl.?

Dicyrta**) Regel 1848. Ind. sem. h. Turic.; 1849. Flora I. p. 181: nov. g. Gesnerear. *Cf.* Bot. Zeit. 1849. p. 706 et Linnaea XXIV. p. 198. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1068.
Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 201; 1856. XXVII. p. 700. 752: g. Achimenear.
Oersted 1858. Gesn. centroam. p. 9: g. Euachimenear.

*) *δίς*, bis; *κύπελλον*, poculi genus: ob cupulam fructus quasi duplicem.
**) *δίς*, *κυρτός*: ob tubera duo tubi corollae.

Didactyle Lindl. 1852. Fol. Orchid. 16 Octob.: nov. g. Orchidear. (Bolbophyllum gladiatum Lindl., etc.
Didactylon Moritzi 1846. Syst. Verz. p. 99: nov. g. Graminear., Oropetio aff. (D. simplex et ramosum.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 950: g. Rottbölliacear. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 358.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 479: g. Zoysiear.
Didelta L'Herit. 1785. Stirp. nov. p. 55. t. 28.
Juss. 1789. Gen. p. 182: g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 401.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 590. n. 1351: g. Syngenes. Polygam. Segregat.
Gmel. 1791. Syst. p. 1263: g. Syngenes. Polygam. Frustran. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2262. n. 1543; 1809. En. p. 924. — Pers. 1807. Ench. II. p. 479. n. 1924.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar. — Par. Link 1822. En. II. p. 354.
Cram. 1803. Dispos. p. 169: in Syngenes. Polygam. Superfl.
R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 139 (Verm. bot. Schr. II. p. 445): g. Synantherear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 573; 1826. Syst. III. p. 610. n. 2839; 1831. Gen. II. p. 638. n. 3197: g. Radiatar.
Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 221; 1821. v. 19. p. 243; 1823. v. 29. p. 448; 1830. v. 60. p. 573: g. Gorteriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2680. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14.
Bartl. 1830. Ord. p. 143: g. Arctotidear.
Less. 1832. Syn. p. 60: subg. Dideltae. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3644. 1. = Choristea Thunb.
Didelta Lessing 1832. Syn. Compos. p. 59: g. Arctotidear. emend. Subgen.: Didelta, Cuspidia. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 37.
DC. 1837. Pr. VI. p. 503: g. Gorteriear. Sect.: Choristea, Cuspidia. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2843. p. 465; 1841. Ench. p. 245. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3644. Sect. ut Less. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Synon. Favonium et Cuspidia Gärtn.
Diderma Pers. 1795 in Usteri n. Ann. IX. p. 134; 1796. Obs. mycol. I. p. 89: nov. g. Fungor. (*Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 223. Injungitur Didymium Link.) — Par. Hoffm. 1795. Bot. Taschenb. t. 9. (Hymenocarpor.)
Pers. 1797. Tent. disp. p. 9: g. Dermatocarpi.
Pers. 1801. Syn. Fung. p. XIV. 164: g. Trichospermor.
DC. 1805. Franç. II. p. 257: g. Angiocarpor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 26: g. Gastromycor.
Nees 1816. Syst. p. 112; 1817. Ueberbl. p. 29: g. Trichocistor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 374.
Diderma Pers. cont.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 14: g. Leiocarpor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 571: g. Physaridear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gastromycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 554: g. Trichiacear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: g. Fuliginear.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1028: g. Trichogastrum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 526. n. 3511: g. Dermatogasterum.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 96: g. Physareor. Tribus: Leangium (Stipitata), Botryosa, Sessilia, Adnata. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 318. p. 27; 1841. Ench. p. 17. Sect.: Pseudostylis, Eustylis, Leocarpus, Leangium. — Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 23; 1842. V. p. 20; 1842. Mycol. p. 81. — Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 365. Sect. ut Endl. (Diderma loco Pseudostylidis.) — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 281. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489. — Bonord. 1851. Hdb. p. 213.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 771. n. 3958: g. Trichogasterum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 370: g. Angiogasterum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 450: g. Didermeor. (*Leangium Link.*)
Conf. Didyderma Link.
Didermei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 450: subdiv. Physareor. Gen.: Diderma, Leocarpus, Claustria, Carcerina, Angioridium.
Diderota Comm. mss.
= Ochrosia Juss.
Didesmis Loud. ex Steud. Nomencl. I. p. 505.
= seq.
Didesmus Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 160: nov. g. pro Myagro aegyptiaco L. propositum. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 225.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 245; 1821. Syst. II. p. 657; 1824. Pr. I. p. 227: g. Raphanear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 259. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4969. p. 886; 1841. Ench. p. 451. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 8.
Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4726: g. Rapistrear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 179. n. 6913: g. Raphanistrear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 322: g. Lomentosar.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 680: g. Siliculosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Raphanidar.
Synon. Didesmis Loud. (Steud.)

Didiclia Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 557: sect. Nicotianae. Subsect.: Tabacum, Rustica, Petunioides.

Didiclis „Palis." Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 39: g. Licopodacear. (D. ornithopodioides.)

Didiplis Rafin. 1833. Atlant. journ. n. 6. p. 23: nov. g. pro Peplide diandra Nutt. *Cf.* Meisn. Comm. p. 83.
 Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6640: g. Saliceariear.? — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 355.
 = Hypobrichia Curt.

Didiscospermae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: series Umbellatar. Trib.: Hydrocotyleae.

Didiscus*) DC. 1828 in Bot. Mag. t. 2857; 1829. Coll. mém. V. p. 28. t. 4; 1830. Prodr. IV. p. 72: nov. g. Hydrocotylear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 256. — Tausch 1834. Flora I. p. 354. — Meisn. 1838. Gen. p. 140 (102). — Endl. 1839. Gen. n. 4361. p. 764; 1841. Ench. p. 377. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 931. — Brongn. 1843. En. genr. p. 110. — Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 285. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 8. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 59.
 Spreng. 1830. Gen. I. p. 220. n. 1137: g. Hydrocotylinar.
 Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Hydrocotylidar.
 F. Müll. 1857. Papers roy. soc. Tasm. (Bot. Zeit. 1859. p. 56). Sect.: Teleiocarpus, Hemicarpus.
 Synon. Lampra Lindl.; Hügelia Rchb.

Didyderma Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: g. Fuligineor. (Nomen.) An errore pro *Diderma?* (jam in eadem familia enumerata.)

Didymandra**) Willd. 1805. Spec. IV. p. 971. n. 1879: g. Polygam. Monoec.
 Pers. 1807. Ench. II. p. 577. n. 2127: g. Monoec. Monandr.
 Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 886: g. Euphorbiear.
 Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 225: g. Euphorbiacear.? — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 194.
 Spreng. 1825. Syst. I. p. 94. n. 121: g. Diandr. Monogyn.
 Spreng. 1831. Gen. II. p. 526. n. 2584: g. Monadelph. Diandr.
 = Synzyganthera Ruiz & Pav.

Didymanthera Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 622: subsect. Ectasis. (Ericae monadelphae Klotzsch.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *a* 10. p. 1411; 1841. Ench. p. 370.
 = Synactinia Rchb.

Didymanthus Endl. 1839. Nov. stirp. decad. I. nr. 10: nov. g. Chenopodear.
 Endl. 1841. Spl. I. n. $1920/_1$. p. 1376; 1841. Ench. p. 181: g. Camphorosmear.

*) Nomen a similitudine fructuum cum iis Biscutellae.
**) *δίδυμος*, duplex, binarius.

Didymanthus Endl. cont.
 — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233). — Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6374. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 8.
 Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
 Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 124: g. Panderiear.

Didymanthus Klotzsch mss.
 = Adenostephanus Klotzsch.

Didymaria Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 9; 1842. Anl. Mycol. p. 32: nov. g. Bactridiacear. (Ramularia didyma Ung.) — Par. Zobel 1854 in Corda Icon. VI. p. 8.
 Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
 Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.?

Didymeles Petit-Thouars 1804. Pl. îl. Afr.; 1806. Vég. îl. Afr. I. p. 9: nov. g. Hernandiae aff. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 226.
 Willd. 1805. Sp. IV. p. 648. n. 1750: g. Dioec. Monandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 597. n. 2173. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 899. n. 3163 *(Didymomeles.)*
 St. Hil. 1805. Expos. II. p. 388: g. Dioec. Diandr. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 704. n. 3548.
 Pet.-Th. 1809. Gen. Madag. n. 89 in Römer Collect. bot. p. 216: g. Diclinium incertae sedis.
 Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 344: g. Myristicear.
 Rchb. 1828. Consp. p. 84. n. 1831: g. Ulmear.
 Rchb. 1837. Hdb. p. 272: g. Celtidear.
 Endl. 1841. Gen. n. 6845. p. 1328; 1841. Ench. p. 685: inter genera apetala minus nota.
 Meisn. 1842. Comm. p. 256: g. Juliflorar. dubium.
 Synon. Anthaea Nor. (teste Pet.-Th.); Caruineia Pet.-Th.

Didymeria Lindl. 1839 in Mitch. East-Austral. (Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 59.)
 Endl. 1842. Spl. II. p. 92. n. $6009/_1$: g. Boroniear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 390. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
 Meisn. 1843. Comm. p. 347 *(Didymoria)*: g. Diosmear.

Didymium Schrad. 1797. Nov. gen. I. p. 22: nov. g. Fungor. (D. stellare, etc.) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 227.
 Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 48: g. Trichospermor.
 Link 1809. Berl. Mag. III. p. 26; 1816. ibid. VII. p. 42: g. Gastromycor. (1816 ampliat.)
 Nees 1816. Syst. p. 112; 1817. Ueberbl. p. 29: g. Trichocistor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 373.
 Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 14: g. Leiocarpor.
 Gray 1821. Brit. pl. I. p. 570: g. Physaridear.
 Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.

Didymium Schrad. cont.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 80: g. Trichosporear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 554: g. Trichiacear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 140; 1829. Syst. myc. III. 1. p. 113; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 451: g. Physareor. Subgen. (1849): Acionium, Dichosporium. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 184. — Endl. 1836. Gen. n. 317. p. 27; 1841. Ench. p. 17. Sect.: Acioniscium, Acormos, Pseudocormos, Cionium. — Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 17; 1842. V. p. 20; 1842. Mycol. p. 81. — Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 364. Sect. ut Endl. (Didymium loco Acormi.) — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 278. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489. — Bonord. 1851. Hdb. p. 213.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: g. Fuliginear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 771. n. 3959: g. Trichogasterum.
Wallr. 1833. Fl. crypt II. p. 364: g. Angiogasterum.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 313: g. Myxogasterum. — Par. Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 244.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Myxogastrum.
Math. 1853. Belg. II. p. 389: g. Trichiear.

Didymobulbos C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 229: sect. Gageae. (G. arvensis, etc.)

Didymocarpeae D. Don 1822. Edinb. n. phil. journ. VII. p. 28; 1825. Pr. fl. Nepal. p. 121: novus ordo plantar. Gen.: Didymocarpus, Lysionotus, Trichosporum.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 658: subtrib. Cyrtandracear. Gen.: Streptocarpus, Didymocarpus, Chirata.
Endl. 1839. Gen. p. 716: trib. Cyrtandrear. Gen.: Aeschinanthus, Lysionotus, Tromsdorffia, Chirita, Didymocarpus, Streptocarpus, Baea; Loxotis, Glossanthus, Loxonia; Epithema; Rabdothamnus. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1407) Liebigia (loco Tromsdorffiae), Agalmyla, Loxocarpus, Monophyllea, Platystemma, Quintilia, Stauranthera, 1842 (Spl. II. p. 64) Craterostigma et 1843 (Spl. III. p. 80) Napeanthus. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 348. Gen.: Aeschynanthus, Liebigia, Agalmyla, Lysionotus, Chirita, Didymocarpus, Streptocarpus, Baea, Loxocarpus, Epithema, Stauranthera, Quintilia, Loxonia, Glossanthus, Klugia, Loxotis, Monophyllaea, Platystemma, Rhabdothamnus.
Meisn. 1840. Gen. p. 302 (211): trib. Cyrtandracear. Subtrib.: Incarvilleae, Amphicomeae, Eudidymocarpeae, Ramondieae, Epithemeae, Anomorhegmieae. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 259. Subtrib.: Liebigieae, Aeschynantheae, Lysionoteae, Eudidymocarpeae, Ramondieae, Loxonieae, Loxocarpeae.

Didymocarpidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 672: trib. Cyrtandrear. Gen. Didymocarpear. Endl. 1841 et Babactes, Calosacme, Cardiolophus, Ramondia, Haberlea, Conandron, Rhynchoglossum, Napeanthus, Rehmannia, Craterostigma, Isanthera.

Didymocarpus Wallich 1819. Edinb. n. phil. journ. p. 378.
D. Don 1822. Edinb. n. phil. journ. VII. p. 28; 1825. Nepal. p. 22: g. Didymocarpear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 658. — Endl. 1839. Gen. p. 717. n. 4138; 1841. Ench. p. 349. n. 4139. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 9. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 724.
Jack 1823. Linn. Trans. XIV. 1. p. 33: g. Cyrtandracear. *Cf.* Flora 1823. II. Beil. p. 91 et Isis 1825. p. 1179.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 837. n. 2235: g. Bignoniear., serius (Gen. I. p. 21) ad Henckeliam reductum.
Jack 1831 in Hook. Bot. Misc. II. p. 60: g. Bignoniacear., Incarvilleae proximum.
R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 117: g. Cyrtandrear. (Flora 1842. I. p. 218.) — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257.
DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 302 (211); 1845. Pr. IX. p. 264: g. Eudidymocarpear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.
Synon. Röttlera Vahl?

Didymocephalon Meisn. 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 59; 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 127: subsect. Cephalophili. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1986 *e α.* p. 307; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 48.

Dichymochaeta Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 185: nov. g. Agrostear.

Didymocheton*) Blume 1825. Bijdr. Nr. 4. p. 177: nov. g. Aglaiear.
A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 230: g. Trichiliear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 685. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 180. — Meisn. 1837. Gen. p. 49 (35). — Walp. 1842. Rep. I. 431.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Guareear.
Synon. Didymochiton Spreng.

Didymochiton Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 247; 1831. Gen. II. p. 543. n. 2661: g. Meliear.
Bartl. 1830. Ord. p. 356: g. Meliacear. — Par. Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 221. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 9.
Endl. 1840. Gen. n. 5535. p. 1050; 1841. Ench. p. 551: g. Trichiliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8071. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 84. 105. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 387.
= Didymocheton Blume.

Didymochlaena Desvaux 1811 in Berl. Mag. V. p. 303. t. 7. f. 6; 1813. Journ. Bot. III. p. 23. t. 2. f. 4; 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p 282: nov. g. Filicum. (D. sinuosa.) *Cf.* Sternb. Vers. I. 3. p. 46. —

---

*) ὀχετός canalis, fossa. (Wittst.)??

Didymochlaena Desv. cont.
Par. Leman 1819. Dict. v. 13. p. 227. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 69. n. 3256; 1831. Gen. II. p. 723. n. 3649. (verar.)
Kaulf. 1824. Enum. Fil. p. 184: g. Polypodiacear. — Par. Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 195. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.) — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 73. — Brongn. 1843. En. genr. p. 4.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 261: g. Aspidiear. — Par. J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 413; 1842. ibid. IV. p. 196. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 704: g. Asplenioidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Presl 1836. Pterid. p. 89: g. Aspidiariar.
Endl. 1836. Gen. n. 637. p. 62; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1024.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 115: g. Aspidiacear.
Meisn. 1843. Gen. p. 433 (334): g. Asplenear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 216: g. Diplaziear.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 99: g. Davalliacear.
Synon. Monochlaena Gaudich.; Hippodium Gaudich.; Ceramium Reinw.; Tegularia Reinw.; Hysterocarpus Langsd.

Didymocrater Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 363; 1821. Nov. Act. Leop. X. p. 509: nov. g. Nematomycetum. (D. elegans.) *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 53. p. 439.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13: g. Ascophorar.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 531: g. Mucorear.
Link 1824. Spec. I. p. 99: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 33. (entosporor.)
Fries 1825. Pl. homon. p. 176; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 488: g. Mucoreor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 140.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 540. n. 3538; 1831. Gen. II. p. 777. n. 4004: g. Mucorum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 326: g. Mucorinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 249. p. 21; 1841. Ench. p. 15. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 241: g. Mucoroideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 17; 1842. Mycol. p. 67: g. Crateromycetum.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 134: g. Mucoroidear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Crateromyceor.

Didymodon Hedwig 1791. Musc. frond. III. p. 8. t. 4; 1801. Spec. Musc. p. 104. t. 23: nov. g. Muscor. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 760. n. 1646. — Roth 1800. German. III. p. 196. Sect.: Didymodon, Swartzia. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 32. — DC. 1805. Franc. II. p. 463; 1815.

Didymodon Hedw. cont.
V. p. 215. — Schwägr. 1811. Suppl. I. 1. p. 116; 1823. Suppl. II. vol. I. p. 80. — Mart. 1817. Erlang. p. 95. — Leman 1819. Dict. v. 13. p. 227. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 741. — Agdh. 1822. Aphor. p. 107. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 172. n. 3317; 1831. Gen. II. p. 731. n. 3709. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 180. (odontostomor.) — Math. 1853. Math. 1853. Belg. II. p. 50.
Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 160; II. 1. p. 115; 1806. Spl. I. p. 159: g. Aploperistomator. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 9. — Par. Röhl. 1814. Ann. Wett. Ges. III. 2. p. 197.
Palis. 1805. Pr. Aethéog. p. 19. 56; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 443 *(Didymodum)*: g. Ectopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 219.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 37: g. Mitrocarpor.
Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 73: sect. Trichostomi.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 100: g. Peristomor. acrocarpor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 751: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 195.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 503: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIV Trichostomoideor.)
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 263 *(Dydimodon)*: g. Dicranoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 629: g. Trichostomeor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Muscol. germ. p. 278: g. Aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 530. p. 51; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 83: g. Weissioidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 908: g. Calyptrobryor.
Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 18—20: g. Trichostomaceor. — Par. Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 378.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 95: g. Dicranear. Subgen.: Cynodontium, Ceratodon.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 102: g. Trichostomear. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 8. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 71.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.
(Genus a C. Müll. in Syn. Musc. inter plura dispersum, praecipue Leptotricho adscriptum.)
Synon. Ditrichium Timm.

Didymodoxa „E. Meyer mss.“ Weddell 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 397: nov. g. Australinear. (Australinae sp. Wedd.)

Didymodum Palis. 1805 et 1822 vid. *Didymodon Hedw.*

Didymoglosseae Presl 1843. Hymenophyll. p. 144: sect. Trichomanoidear. Gen.: Didymoglossum, Meringium, Hemiphlebium.

Didymoglossum Desvaux 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 330: nov. g. Filicum verar., a plerisque recentioribus Trichomani L. insertum. (Trichomanes muscoides Sw., Hymenophyllum lineare Sw., etc.)

Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262: g. Hymenophyllear.

Presl 1843. Hymenoph. p. 114: g. Didymoglossear. Sect.: Eudidymoglossum, Chilodium, Crepidium.

Didymogyne Weddell 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 207 (Flora 1855. p. 524): nov. g. Euböhmeriear. (Urtica pauciflora Hochst.)

= Droguetiae Gaudich. pars. (Weddell 1857.)

Didymomeles Spreng. vid. *Didymeles Pet.-Thouars.*

Didymonema*) Presl 1830. Flora II. p. 630; 1830. Symb. I. p. 5. t. 3: nov. g. Cyperacear. (Epiandria teretifolia Presl.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 51 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 358.

Steud. 1855. Glum. II. p. 153: g. Rhynchosporear.

= Caustis P. Browne?

Didymopanax Decaisne & Planch. 1854. Revue hortic. 4e sér. III. p. . . .: nov. g. Araliacear.

Didymophora Miquel 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 454: sect. Ficus. (F. gemella Wall.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 724.

Didymophyllon Göppert 1841. Gatt. foss. Pfl. I. p. 35. t. 18: nov. g. Stigmariear. *Cf.* Flora Lit. XI. p. 73. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 117; 1846. Chlor. prot. p. LIV.

Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 106: g. Sigillariear.

Didymophysa Boissier 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 379: nov. g. Cruciferar. (D. Aucheri.)

Boiss. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 179: g. Thlaspidear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 340. — Endl. 1843. Spl. III. p. 87. n. $4884/_1$. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 44.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Thlaspidar.

Didymoplexis „Griff." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: g. Pogonidar. — Par. Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172.

Didymoprieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 99: trib. Schimatothallar. Gen.: Didymoprium, Gloeoprium.

Didymoprion Mont. vid. *seq.*

Didymoprium**) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84 (sphalm. *Didymopsium*); 1843. Phycol. gener. p. 165; 1845. Phycol. germ. p. 141; 1849. Sp. Alg. p. 189. n. 141: nov. g. Desmidiear. — Par. Ralfs 1845. Edinb. trans. bot. soc. II. I. p. 119. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 57. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 10 (*Didymoprion*).

Trevis. 1828. Alghe coccot. p. 99: g. Didymopriear.

Didymopsium Kütz. vid. *praeced.*

Didymoria Meisn. vid. *Didymeria Lindl.*

Didymospermium Ritgen vid. *seq.*

Didymosporium Nees 1816. Syst. p. 33; 1817. Überbl. p. 8: nov. g. Sphaeromycor. concretor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 36.

Mart. 1817. Erlang. p. 328: g. Coniomycetum suffultor. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 563. n. 3582; 1831. Gen. II. p. 784. n. 4063.

Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Tuberculariar.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 526: g. Stilbosporear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 425.

Link 1825. Spec. II. p. 93: g. Gymnomycetum.

Fries 1825. Pl. homon. p. 193; 1832. Syst. myc. III. 2. p. 486; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 508: g. Stilbosporeor. — Par. Link 1826 in Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180. — Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 25. — Endl. 1836. Gen. n. 195. p. 17; 1841. Ench. p. 13.

Corda 1829 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. II. p. 51. t. 23 (*Dydimosporium*).

Ritg. 1831. Marb. II. p. 92 (*Didymospermium Nees* Syst. f. 29): g. Leptomycetum.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 185: g. Sporomycetum episporor.

Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 7; 1838. II. p. 5; 1842. V. p. 4; 1842. Mycol. p. 14: g. Phragmidiacear. — Par. Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 5.

Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 17: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 27. — Bonord. 1851. Hdb. p. 47.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Melanconieor.

Synon. Stilbosporae sp. Pers., etc.

Didymotheca Hook. f. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 278: nov. g. Phytolaccear. (D. thesioides.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 571.

Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 36: g. Gyrostemonear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 58. n. $5263/_2$.

Didymotoce Endl. 1838. Gen. n. 3240 *d α.* p. 549; 1841. Ench. p. 273: subsect. Anotidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2874. 4 *a.*

Didymotrichum Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 89: nov. g. Psiloniaceor. (Cladosporii sp. Corda — Leptosporium Corda?)

Didynamia Linn. Gen., Spec. et auctorum Linnaeanorum: class. XIV. plantar. Ordines: Gymnospermia, Angiospermia. — Par. GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 325. Ordines: Pericarpiferae, Capsuliferae.

---

*) *δίδυμος*, geminus; *νῆμα*, filamentum.
**) *πρίων*, serra.

Didyplosandra Wight mss. (Icon. pl. Ind. II. 4. p. 3): g. Acanthacear.
= Strobilanthes Blume.

Diectomis*) Palis. 1812. Agrost. p. 132. t. 23. f. 6: nov. g. Graminear. (Andropogon fastigiatus L. etc.) *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 229.
= Apluda Linn.

Diectomis Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 69; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 193. t. 64; 1822. Syn. I. p. 246: g. Saccharinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 965. — Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 339: g. Saccharinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Andropoginear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 166.
Presl 1830. Rel. Hänk. I: g. Andropogonear. Par. Kunth 1833. Agrost. p. 510. — Endl. 1837. Gen. n. 947. p. 108; 1841. Ench. p. 60. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 412. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1349. — Meisn. 1843. Gen. p. 428 (328). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116.
Steud. 1854. Glum. I. p. 370: sect. Andropogonis.
Synon. Andropogonis sp. Swartz; Polliniae sp. Spreng.

Dieffenbachia Schott 1829. Wien. Zeitchr. III. p. 830: nov. g. Aroidear. (Caladium Seguinum Vent.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 53. — Par. Mart. 1831. Flora II. p. 457.
Schott 1832. Melet. p. 20; 1856. Syn. Aroid. I. p. 126: g. Spathicarpear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1692. p. 238; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 53. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1104. — Meisn. 1842. Gen. p. 361 (269). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 49.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 14: g. Colocasiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Anaporear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 10.

Diellia Brackenrige 1854. Un. st. expl. exp. XVI. p. . . .: nov. g. Filicum, Schizolomae aff. *Cf.* Kew gard. misc. VIII. p. 94.

Dielytra**) Spreng. 1826. Syst. III. p. 162: sect. Corydalidis.
Cham. 1826. Linnaea I. p. 556: g. Fumariacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 260. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 140. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 35. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 66. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 94.
Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4832: g. Fumariear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 264: g. Dielytrear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 60: g. Dielytrinear.
= Dicentra (Borckh. em.) Bernh.

Dielytreae Rchb. 1837. Handb. p. 264: subdiv. Fumariear. Gen.: Adlumia, Eucapnos, Dielytra, Dactylicapnos.

Dielytrineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 60. 65: sect. Fumariear. Gen. Dielytrear. Rchb.

*) ἐκτομίς, excisa.
**) Nomen pro *Diclytra Borckh.* emend.

Diemenia Korthals . . . . Nederl. kruidk. Arch. III. p. 388: nov. g. Chrysobalanear. *Cf.* Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 649.
Blume 1855. Mél. bot. II. (Flora 1858. p. 256: *Diamenia*) Licaniae injungit.

Diena Rchb. vid. *seq.*

Dienia Lindl. 1824. Bot. Regist. X. n. 825: nov. g. Orchidear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 734. n. 3021; 1831. Gen. II. p. 672. n. 3391.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1565 (*Diena*). — Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. p. 4. t. 1630. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 51.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1830. Orchid. p. 22: g. Pleurothallear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1336. p. 189; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1923. — Meisn. 1842. Gen. p. 369 (277). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 11.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Liparidar.
Synon. Pedilea Lindl.

Dierbachia Spreng. 1825. Syst. I. p. 512. 676. n. 745; 1830. Gen. I. p. 159. n. 798: g. Solanear. (Dunalia solanacea Humb.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3297. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 712.
Bartl. 1830. Ord. p. 194: g. Solanacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 201: g. Physalidear.
Synon. Dunalia HBK.

Diervilla*) Tourn. 1706. Act. Ac. Paris. p. 85. t. 3: nov. g. plant. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 230.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 154. t. 10.
Linn. 1737. Gen. p. 53. n. 150; 1737. Cliff. p. 63; 1742. Gen. ed. II. p. 74. n. 171; 1748. Upsal. p. 42: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1809. En. p. 222. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 139.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 492.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35: g. Cymosar., abhinc Lonicerae (nomine L. Diervillae) insertum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Dipsacear.
Adans. 1763. Fam. II. p. 157: g. Caprifolior. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 147. — Juss. 1789. Gen. p. 211. — Hedw. 1806. Gen. p. 148. n. 634. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. VIII. 159. n. 879. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 764. n. 828; 1830. Gen. I. p. 169. n. 849. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 759.
Neck. 1790. El. I. p. 130. n. 222: g. Sphanidophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 597: g. Caprifoliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 455. — Link 1821. En. I. p. 222; 1829. Hdb. I. p. 666. — Bartl. 1830. Ord. p. 214 (*Diervillea*). — Sieb. & Zucc. 1835. Fl. jap. I. p. 68. t. 29—33. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 359.

*) Dicta inventori Dierville, chirurgo.

Diervilla Tourn. cont.
Pers. 1805. Ench. I. p. 214. n. 486: g. Caprifoliar. — Par. Dumort. 1829. An. fam. p. 33. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 10.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 83: g. Diervillariae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 367: sect. Lonicerae.
Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1982; 1841. Nom. p. 73. n. 2733: g. Lonicerear. (genuinar.) — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 330. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 444. — Endl. 1838. Gen. n. 3336. p. 568 (verar.); 1841. Ench. p. 282. — Meisn. 1838. Gen. p. 155 (111). — A. DC. 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 239. — Brongn. 1843. En. genr. p. 47. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 767. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 11.
C. A. Meyer 1855. Bull. Ac. Pet. XIII. p. 216: g. Diervillear. Distinguuntur Weigela et Calysphyrum.
Conf. Weigela Thunb.

Diervillaria Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: subfam. Polarniae. Gen.: Diervilla, Cormigonus.

Diervillea Bartl. vid. *Diervilla Tourn.*

Diervilleae C. A. Meyer 1855. Bull. Ac. Pet. XIII. p. 219: trib. Caprifoliacear. Gen.: Diervilla, Weigela, Calysphyrum, Calyptrostigma.

Diesingia*) Endl. 1832. Flora I. p. 113; 1833. Atact. bot. t. 1. 2: nov. g. Phaseolear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 92 (66). — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5782.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Euphaseolear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6681. p. 1298; 1841. Ench. p. 672. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 11.

Dieteria**) Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 300: nov. g. Asterinear. Subgen.: Sideranthus, Pappochroma.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 99: g. Euasterear. Sect.: Dieteria, Pappochroma. — Par. Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952.
Endl. 1842. Spl. II. p. 39. n. $2365/_1$: g. Heterothecear. Sect.: Eudieteria, Sideranthus, Pappochroma. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Walp. 1843. Rep. II. p. 586. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Dieterica***) Seringe 1830 in DC. Prodr. IV. p. 8: nov. g. Cunoniear. (Weinmannia paniculata Cav.) — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 5.
Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 50: sect. Weinmanniae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 230: g. Weinmanniear.
Caldcluvia Don.

Dieterichia†) Giseke 1792. Prael. p. (199. 208.) 228: nov. g. Scitaminear. (Amomum Zerumbet Jacq.)
= Zingiber Gärtn.

*) Dicat. C. M. Diesing.
**) διετηρίς, biennis. (?)
***) Dicat. J. G. Dieterico, Weinmannianae phytanthosae editori.
†) Dicat. Car. Fr. Dieterich.

Dietes*) Salisbury 1812. Trans. hort. soc. I. p. 307: nov. g. Iridear. (Moraea iridioides L.)
= Moraea Linn.?

Dietrichia Giseke Prael. p. 199. 208: vid. *Dieterichia Gis.*

Dietrichia Trattinick 1812. Arch. d. Gew. n. 449 (Tabular. t. 449); 1819. Thes. bot. t. 19: nov. g. ex typo Rocheae coccineae DC.
Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4182: g. Sedear.
Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. austr. III. p. 304: g. Crassulacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6183: g. Rochear.
= Rocheae sect. Franciscaria DC.

Difformariae Batsch 1802. Tab. affin. p. 25: ordo Rosacear. Fam.: Succulentae, Saxifrageae, Ciliatae, Caryophylleae, Portulaceae, Fimbriatae.

Difformes Linn. 1747. Class. plant. p. 422: ordo 10 methodus calycinae. Gen.: Zannichellia, Valantia, etc.

Digenaea Zanard. vid. *seq.*

Digenea**) Agardh 1822. Spec. Alg. I. 2. p. 388 (Aphor. p. 100); 1824. Syst. p. XXXIII. 194: nov. g. Floridear. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 12. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 335.
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 481: g. Ceramiacear.
Endl. 1836. Gen. n. 88. p. 8; 1841. Ench. p. 6: g. Floridar.
Menegh. 1838. Cenni p 32: g. Ceramiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 708. — Decne 1842. Ann. sc. nat 2e sér. XVII. p. 358 (*Digenia. Cf.* Flora 1843. p. 98.)
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 129: g. Ectocarpear.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 147: g. Rhodomelear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 46. n. $122/_{60}$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 53 (*Digenaea*).
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 105; 1843. Phyc. gener. p. 433; 1845. Phyc. germ. p. 327; 1849. Sp. Alg. p. 841. n. 548: g. Polysiphoniear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 29 (*Digenia*): g. Rhodomelacear.

Digenia Decne, Harv. vid. *praeced.*

Digera***) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Ar. p. 65: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 408.
Scop. 1777. Intr. p. 223: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 88: g. Amaranthor.
Juss. 1803. Ann. Mus. II. p. 131: g. Amarantacear. — Par. Mart. 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 285 (Beitr. Amar. p. 77). — Bartl. 1830. Ord. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 249.

*) διετής, biennis.
**) Nomen ob duplicem ejus naturam inditum.
***) Nomen a *Didjar* Arabum.

Digera Forsk. cont.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 206: g. Amaranthacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 129. n. 565. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLIV. 535. n. 1036. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 542.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 791. n. 874; 1830. Gen. I. p. 180. n. 909: g. Chenopodear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 805.
Agdh. 1825. Aphor. p. 218: g. Rivinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4370: g. Gomphrenear.
Endl. 1837. Gen. n. 1969. p. 303; 1841. Ench. p. 185: g. Desmochaetear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231). — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6419. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 323. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1044.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511: g. Achyranthear.

Digitaleae Benth. 1835. Scroph. rev. p. 2: trib. Scrophularinear. Gen.: Chelone, Pentstemon, Russelia, Digitalis, Isoplexis. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 676; 1841. Ench. p. 339. Gen. ead. (rejecta Isoplexide) et Phygelius, Colpias, Ixianthes, Rehmannia, Paulownia; Anastrabe. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. 296. Gen. ead. et Elmigera. — Meisn. 1840. Gen. p. 308 (219). Gen. ut Endl. exclusa Anastrabe. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 59: Gen. ex Endl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: sect. Antirrhinariar. Gen.: Collinsia, Pentstemon, Chelone, Elmigera, Ourisia, Digitalis, Isoplexis; Centranthera, Glossostylis, Seymeria, Gerardia, Macranthera, Virgularia, Physocalyx, Escobedia.
Rchb. 1841. Nom. p. 116: sect. Antirrhinear. Subsect.: Chelonieae, Gerardieae.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 448 (sphalm. *Digitateae)*; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: trib. Rhinanthidear. Gen.: Isoplexis, Digitalis, Erinus; Picrorhiza, Synthyris, Wulfenia, Calorhabdos? — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 459. Gen. ead.

Digitales Rüling 1774. Ord. nat. Tab.: div. Ringentium.

Digitalis*) Tourn. 1700. Inst. p. 165. t. 73: g. pl. class. III.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 241. Ed. Hall. 1745. p. 243: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 179. n. 496; 1737. Cliff. p. 318; 1740. Syst. p. 26; 1748. Ups. p. 178; 1753. Sp. II. p. 621; 1759. Syst. ed. X. p. 1114. n. 676; 1763. Sp. ed. II. p. 866; 1764. Gen. ed. VI. p. 313. n. 758; 1767. Syst. ed. XII. p. 414: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 447. — Murr. 1774. Syst. p. 470; 1784. Syst. p. 562. — Reich. 1778. Gen. p. 314. n. 816. — Lour. 1790. Coch. II. p. 378. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 410. n. 1017. — Gmel. 1791. Syst. p. 939. — Pers. 1797. Syst. p. 599. — Willd. 1800. Sp. III. p. 283. n. 1155; 1809. En. p. 647. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 99.

*) Nomen a similitudine floris cum digitali, quo mulieres inter consuendum digitos munire solent.

Digitalis Tourn. cont.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 616: g. Dymeizonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 177. n. 723: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 443.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Luridar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 384.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Scrophulariar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 120.
Adans. 1763. Fam. II. p. 213: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 75. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 363. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 278. — DC. 1805. Franç. III. p. 595; 1815. V. p. 411. — Lois. 1819. Dict. v. 13. p. 237. — Link 1822. En. II. p. 140. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 8. 164.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 193: g. Ringentium. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 354. (descisc.)
Hill 1769. Ht. kew. p. 269: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 247. t. 53. f. 6 (purpurea).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 222. 230; 1789. Phil. Bot. I. p. 75.
Neck. 1790. El. I. p. 372. n. 576: g. Plasyrgophytor.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 401: g. Capsuliferar.
Rebent. 1804. Neom. p. 70: g. Tetrandr. Monogyn.
Pers. 1807. Ench. II. p. 162. n. 1474: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3198. Sect.: Digitalis, Isoplexis. — Bartl. 1830. Ord. p. 171. — Koch 1837. Syn. p. 517. Ed. II. p. 595.
Elmiger 1812. Hist. nat. et méd. des Digitales.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 395; 1825. Syst. II. p. 787. n. 2163; 1831. Gen. II. p. 488. n. 2405: g. Scrofularinar. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 325. — Link 1829. Hdb. I. p. 533.
Lindl. 1821. Digit. Mon. (Flora 1822. II. p. 497.) Sect.: Digitalis, Isoplexis.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 378: g. Scrophularinar.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 110: g. Scrophulariear.
Kunth 1838. Berol. II. p. 61: g. Digitalear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3915. p. 678; 1841. Ench. p. 339. Sect. ut Lindl. — Meisn. 1840. Gen. p. 308 (219). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 506. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 59. — Walp. 1845. Rep. III. p. 254. 962. Sect. eaed. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 226. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 13. Sect.: Eudigitalis, Isoplexis.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 33: g. Euscrophularinear.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 602: g. Scrophulariacear.
Synon. Digitalis et Isoplexis Lindl.

Digitalis Lindl. 1821. Digit. Mon. p. 9: sect. Digitalis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3198 *a.* — Endl. 1839. Gen. n. 3915 *a.* p. 678; 1841. Ench. p. 339. — Walp. 1845. Rep. III. p. 254.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 3; 1846 in DC. Pr. X. p. 448; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Digitalear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 198. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 307.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 504: g. Scrophulariear.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4511: g. Cheloniear.
Synon. Virga regia Caesalp.; Dactylethria Ehrh.; Eudigitalis Lemr.

Digitaria „Heist." Adans. 1763. Fam. II. p. 38: g. Sorgor. (*Gramen Pluk.* t. 190. f. 2. — *Salé Rumph.* V. t. 75. f. 2. — *Coix secunda Linn.* — *Tripsacum Linn.*)
= Tripsacum Linn.?

Digitaria Scopoli 1772. Fl. Carn. I. p. 52: nov. g. Triandr. Digyn. — Par. Wigg. 1780. Holsat. p. 6. — Pers. 1805. Ench. I. p. 84. n. 158. — Willd. 1809. En. p. 91. — Elliott 1817. Sketch I. p. 131. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 55.
Neck. 1790. El. III. p. 214. n. 1584: g. Achyrophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 205: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 98: g. Graminear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 37. — Palis. 1812. Agrost. p. 50. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 25. 469. n. 266. — Lois. 1819. Dict. v. 13. p. 235. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 270. n. 283. — Link 1829. Hdb. I. p. 87. — Sond. 1851. Fl. Hamb. p. 36.
Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 45: g. Graminum. — Par. Link 1821. En. I. p. 102. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 6. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 54. n. 261.
Marsch.-Bieb. 1808. Taur. cauc. I. p. 51: sect. Panici. — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 153. — Endl. 1833. Norf. p. 18. — Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. p. 198. — Koch 1837. Syn. p. 771. Ed. II. p. 891. — Garcke 1848. Fl. Hall. p. 512. — Steud. 1854. Glum. I. p. 38. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 461.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71: g. Panicear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 155. — Agdh. 1823. Aphor. p. 148. — Link 1827. Hort. I. p. 222. — Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1280. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 46; 1850 in Webb Canar. III. p. 384. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 80. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 436. — A. Spreng. 1848. Fl. Hall. p. 76. 89. — Meyer 1849. Fl. hanov. p. 626.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 892; 1830. Fl. exc. p. 23: g. Paspalacear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 470; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 467; 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 263: g. Paspalear.

Digitaria Scopoli cont.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 22: g. Panicacear.
Scheele 1844. Flora I. p. 53: Paspalo injungit.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 435: g. Eupanicear. Sect.: genuinae, Elytroblepharum.
Synon. Syntherisma Walt.; Dactylon Vill.

Digitaria Juss. 1789. Gen. p. 29: g. Graminear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 73.
Schrad. 1806. Fl. Germ. I. p. 165: g. Triandr. Digyn.
= Cynodon Rich.

Digitateae Benth. in DC. Prodr. X. p. 448: vid. *Digitaleae.*

Diglossus Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 70; 1818. ibid. p. 184; 1819. Dict. v. 13. p. 241; 1825. v. 38. p. 203; 1829. v. 59. p. 62; 1830. v. 60. p. 574: nov. g. Tagetinear. (1829 Archetypar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 119.
Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2351: g. Tagetear.
= Tagetis Tourn. pars.

Diglottis Nees & Martius 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 170: nov. g. Fraxinellar.
DC. 1824. Pr. I. p. 732: g. Cuspariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5144; 1837. Hdb. p. 283; 1841. Nom. p. 197. n. 7528. — Bartl. 1830. Ord. p. 389. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 798. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 323. — Endl. 1840. Gen. n. 5991. p. 1151; 1841. Ench. p. 611. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 494; 1849 in Orb. Dict. V. p. 14: g. Diosmear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 62 (45).

Diglyphis*) Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VI: nov. nomen pro *Diglyphosa Blume.*
Endl. 1837. Gen. n. 1360. p. 191; 1841. Ench. p. 109: g. Dendrobiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1949. — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (278). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176 (*Diglyphys*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Dendrobidar. (?) — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 654.
Synon. Diglyphosa Blume.

Diglyphosa Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 336. f. 60: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1830. Orchid. p. 62: g. Dendrobiear.
= Diglyphis Blume.

Diglyphys Spach vid. *Diglyphis Blume.*

Dignathe Lindl. . . . . Hort. soc. journ. II. p. 268: nov. g. Vandear., Pilumnae et Aspasiae aff. (D. pygmaea.) *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 682.

Digomphia**) Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 364: nov. g. Chelonear. (D. laurifolia.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 640.

---

*) *γλυφίς*, crena.
**) *γομφία*, dens molaris. (?)

Digonocarpus Flor. Flum. t. 14 (inflatus ex Steud. Nom. I. p. 508.)
= Cupania Plum.

Digrammaria*) Presl 1836. Pterid. p. 116: nov. g. Diplaziear. (Asplenium ambiguum Sw.) — Par. Fée 1852. Gen. Fil. p. 217.
Endl. 1841. Spl. I. n. 636 *c*. p. 1349; 1841. Ench. p. 36: sect. Diplazii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1023. 3.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Synon. Microstegia Presl pt.

Digraphis Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 127: nov. g. Graminum. (Phalaris arundinacea L.)
Link 1827. Hort. I. p. 64: subg. Phalaridis.
Endl. 1837. Gen. n. 753 *b*. p. 81; 1841. Ench. p. 56: sect. Phalaridis.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 468; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 454: g. Phalaridear. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 81.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.
= Baldingera GMS.

Diksonia Lühnem. vid. *Dicksonia L'Herit.*

Dilaena Dumort. 1822. Comment. bot. p. 114: nov. g. Jungermanniacear. (Jung. Leylii, Hybernica.) *Cf. Diplolaena Dumort.*
= Pallavicinius Gray.

Dilaeneae Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 25: trib. Blasiacear. Gen.: Dilaena, Cordaea, Hymenophyton.

Dilarnia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: fam. Philisodiae. Subfam.: Cinchonaria, Geniparia.

Dilatrideae Ritgen 1831 in Schr. Marb. Ges. II. p. 129: trib. Liliacear. Gen.: Alströmeria, Gethyllis, Sternbergia, Phlebocarya, Haemodorum, Lanaria, Schwägrichenia, Conostylis, Dilatris.

Dilatris Berg. 1767. Fl. cap. p. 9. t. 3. f. 5.
Scop. 1777. Intr. p. 88: g. Liliacear.
Linn. f. 1781. Suppl. p. 10. n. 1355: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 93. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 37. n. 82. — Gmel. 1791. Syst. p. 119. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 10; 1818. Fl. cap. I. p. 257. — Pers. 1797. Syst. p. 95; 1805. Ench. I. p. 54. n. 109. — Willd. 1797. Sp. I. p. 246. n. 100. — Vahl 1806. Enum. II. p. 161. n. 103. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 24.
Juss. 1789. Gen. p. 59: g. Iridibus aff.
Neck. 1790. El. III. p. 161. n. 1508: g. Ymnodiphytor.
Gis. 1792. Prael. p. 170: g. Ensatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 143. — Gawl. 1805 in Konig Ann. bot. I. p. 235.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 11. t. 182.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 149: g. Irideis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 27. 355: g. Iridear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 343. 483. n. 135. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 242. — Schrank 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. . . . (adscitar.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 241; 1825. Syst. I. p. 158. n. 163; 1830. Gen. I. p. 39. n. 175: g. Haemodorear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 170. — Eckl. 1827. Verz. p. 5. — Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1223. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 335. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 162. — Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 15.
Bartl. 1830. Ord. p. 43: g. Haemodoracear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1254. p. 171; 1841. Ench. p. 100. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 112.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Dilatridear.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1656: g. Lanariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 153: g. Conostylear.

Dilepis Endl. 1837. Gen. n. 960 *a*. p. 111; 1841. Ench. p. 63. sect. Trilepidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1441. 1.

Dileptium Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 85.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 241; 1821. Syst. II. p. 538; 1824. Pr. I. p. 205: sect. Lepidii. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1121 *(Deleptium)*; 1841. Nom. p. 180. n. 6935. 1. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 205. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 193. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 219. — Koch 1836. Syn. p. 72. Ed. II. p. 78. — Endl. 1839. Gen. n. 4932 *f*. p. 879; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 204. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 285.
Synon. Senckenbergia GMS.; Senkenbergia Rchb.; Kandis Adans.; Nasturtioides Medic.; Nasturtiastrum Godr.

Dilepyrum*) Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 40: nov. g. Graminum, Leersiae aff. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 244.
= Mühlenbergia Schreb.

Dilepyrum Rafin. 1809. New-York med. repos. II. Hex. V. p. 350; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 260.
= Oryzopsis Rich.

Dileucaden Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 84): sect. Panici. (P. scoparium, geniculatum, villosum, etc.)

Dilivaria**) Juss. 1789. Gen. p. 103: nov. g. Acanthor.
Neck. 1790. El. I. p. 341. n. 531: g. Chasmatophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
Juss. 1804. Dict. v. 1. p. 96: g. Acanthacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 237. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 245.
Pers. 1807. Ench. II. p. 179. n. 1530: g. Acanthoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3119; 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4232: g. Acanthear. (genuinar.) — Par. Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 98; 1847 in DC. Pr. XI. p. 268. — Endl. 1839. Gen. n. 4069. p. 703; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 295 (203). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 145. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 820 *(Delivaria)*.

---

*) γραμμή, linea.

*) *δίς*, bis; *λέπυρον*, palea.
**) Nomen vernaculum.

Dilivaria Juss. cont.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 594: g. Echmatacanthor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Acanthidar. *Synon.* Cheilopsis Moq.?; Acanthi pars Spreng.

Dilleneae Salisbury 1806. Parad. lond. I. p. 73: nova fam. a Magnoliis sejuncta. Gen.: Dillenia, Wormia, Hibbertia, Candollea.
DC. 1818. Syst. I. p. 411; 1824. Pr. I. p. 411: trib. Dilleniacear. Gen.: Pachynema, Hemistemma, Pleurandra, Candollea, Adrastaea, Hibbertia, Wormia, Colbertia, Dillenia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 72. Gen. ead. et Capellia. — Meisn. 1837. Comm. p. 5. Gen. ut G. Don et Acrotrema, Reifferscheidia, Dasynema, Othlis. — Endl. 1839. Gen. p. 840. Gen.: Capellia, Colbertia, Reifferscheidia, Dillenia, Wormia, Schumacheria, Adrastea, Hibbertia, Pleurandra, Candollea, Pachynema, Hemistemma; Acrotrema. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424. Gen. ut Endl. et Actinidia, Saurauja, Trochostigma, Tetracarpaea.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI: subdiv. Dilleniacear. Gen. ut DC. et Weldenia.

Dillenia Heist. . . . . Hort. Helmst. p. 435. = Sherardia Dill.

Dillenia*) Linn. 1737. Gen. p. 162. n. 455; 1737. Cliff. p. 221; 1740. Syst. p. 25; 1753. Sp. I. p. 535; 1759. Syst. ed. X. p. 1082. n. 608; 1762. Sp. ed. II. p. 754; 1764. Gen. ed. VI. p. 277. n. 688; 1767. Syst. ed. XII. p. 373: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 422; 1784. Syst. p. 507. — Reich. 1778. Gen. p. 282. n. 745. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 372. n. 939. — Gmel. 1791. Syst. p. 866. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 21. t. 20; 1832. Ind. II. p. 650. — Pers. 1797. Syst. p. 543. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1251. n. 1071; 1809. En. p. 578.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 114. n. 474: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 76.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Culminiar.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 74: g. Annonas et Musas combinans.
Scop. 1777. Intr. p. 257: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 281: g. Magnoliis aff.
Neck. 1790. El. II. p. 318. n. 1099: g. Acascophytorum.
Thunb. 1791. Linn. Trans. I. t. 18. 19.
Batsch 1802. Tab. p. 116: g. Magnoliar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 92. n. 1344.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 77: g. Magnoliaceis aff.
DC. 1818. Syst. I. p. 435; 1824. Pr. I. p. 75: g. Dillenear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 77. — Meisn. 1837. Comm. p. 5. — Endl. 1839. Gen. p. 840. n. 4749. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 814; 1825. Syst. II. p. 644. n. 2033; 1830. Gen. I. p. 459. n. 2261: g. Dilleniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 250. — Meisn. 1837. Gen. p. 2. — Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7286. (genuinar.) — Endl. 1841. Ench. p. 431. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 311. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 16. — Hook. f. Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 69. (ampliat.) Sect.: Eudillenia, Colbertia. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 33. Sect. eaed.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 246: g. Dilleniacear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 376. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 96.
Link 1822. En. II. p. 86: g. Magnoliacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4989: g. Hibbertiear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 422: g. Dilleninear.
Synon. Syalita Rheede, Adans.

Dilleniaceae „DC. Ann. Mus. XVII. p. 400" R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 541. (Verm. bot. Schr. I. p. 22.)
DC. 1818. Syst. I. p. 395; 1819. Théor. élém. p. 243; 1824. Pr. I. p. 67: ordo 2 Thalamiflorar. Trib.: Delimaceae (1824 Delimeae), Dilleneae. *Cf.* Juss. 1819. Dict. v. 13. p. 248. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (apocarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 68. Trib. ut DC. 1818.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: fam. Thalamunguliae.
St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 23.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 588: ordo Polycarpellar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI: div. Ranunculacear. Subdivis. ut DC. 1824.
Bartl. 1830. Ord. p. 249: ordo (140) Polycarpicar. Divis.: Delimeae, Dillenieae. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 839; 1841. Ench. p. 430. Trib. ut DC. 1824. — Meisn. 1843. Gen. p. 437.
Link 1831. Hdb. II. p. 376: ordo 31 Allostemonum. Gen.: Hibbertia, Dillenia.
Lindl. 1833. Nix. p. 14: ordo Anonalium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 20; 1847. Veg. kd. p. 423: ordo Ranalium. Trib. ut DC.
Meisn. 1837. Gen. p. 2 (4): fam. 2 plant. Trib.: Delimaceae, Dillenieae.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 410: fam. (110) Polycarpicar. Trib.: Delimeae, Hemistemoneae, Hibbertieae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 96: fam. Ranunculinear. Gen.: Dillenia, Hibbertia, Candollea, Tetracera, Curatella.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 16. Trib. ut Bartl.

Dillenieae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 813: fam. 88 plant. Gen.: Dillenia, Hibbertia, Candollea, Curatella, Tetracera, Pleurandra.
Bartl. 1830. Ord. p. 250: div. Dilleniacear. Gen. Dillenear. DC. et Capellia, Othlis.
Meisn. 1837. Gen. p. 2: trib. Dilleniacear. Gen. vide *Dilleneae Meisn.* — Par. Endl. 1841. Ench. p. 431. Gen. Dillenear. Endl. 1839 et Actinidia, Tetracarpaea.

Dillenieae Rchb. 1828. Consp. p. 192: div. Ranunculacear. Subdivis.: Illicieae, Delimeae, Hibbertieae. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 750. (Subdiv. Paeoniariae). — Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. Subdivis.: Delimeae, Hemistemoneae, Hibbertieae.

---
*) Dicat. Joh. Jac. Dillenio, Dr.

Dillenieae genuinae Rchb. 1837. Handb. p. 278; 1841. Nomencl. p. 192: sect. Hibbertiear. Gen.: Dillenia, Colbertia, Capellia (1841 exclusa).

Dillenineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 414. 422: sect. Hibbertiear. Gen.: Dillenia, Colbertia, Capellia.

Dillwina Grat. mss. (teste Leman 1819. Dict. v. 13. p. 249): g. Algar. ex typo Confervae pellucidae Drap.
= Cladophorae Kütz. spec.

Dillwinia Poir. vid. *Dillwynia Smith.*

Dillwynella Bory 1822. Dict. class. I. p. 593; 1825. V. p. 507: nov. g. Oscillariar.
Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 455 *d:* sect. Oscillatoriae.
= Calothrix Agdh.

Dillwynia*) Smith 1805 in Konig Ann. of bot. I. p. 510; 1808. Linn. Trans. IX. p. 262: nov. g. Leguminosar. (D. ericifolia.) — Par. R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 15. (Verm. bot. Schr. II. p. 466: *Dyllwinia.*) — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 250 (*Dillwinia*). — Spreng. 1825. Syst. II. p. 352. n. 1658; 1830. Gen. I. p. 367. n. 1855. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1511.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 745: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 131. — DC. 1825. Pr. II. p. 108. Sect.: Dillwyniastrum, Xeropetalum. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4066. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 120. Sect. ut DC. — Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1514. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 176. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (58).
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 33; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 78: g. Pultenaear. Sect. ut DC. — Par. Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 62. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 17.
Endl. 1840. Gen. n. 6441. p. 1258; 1841. Ench. p. 667: g. Pultenear. Sect. ut DC. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5935: g. Pultenaeear. Sect.: Dillwynia, Xerotropis.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 127: g. Podalyriear.

Dillwynia Roth 1806. Catalect. bot. III. p. 71: nov. g. Diadelph. Decandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 302. n. 1709. (*Rothia* in Corrigendis.)
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear.
Westonia Spreng.

Dillwyniastrum DC. 1825. Prodr. II. p. 108: sect. Dillwyniae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 120. — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 78. — Endl. 1840. Gen. n. 6441 *a.* p. 1258; 1841. Ench. p. 667.

Dilobeia Petit-Thouars 1809. Gen. nov. Madag. n. 21 in Römer Collect. bot. p. 200: nov. g. Apetalar. incertae sedis. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 251.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 31. 476. n. 580: g. Tetrandr. Monogyn.

*) Dicat. Lewis Weston Dillwyn, Phycologo.

Dilobeia Petit-Th. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1783: g. Daphnear.?
Endl. 1841. Gen. n. 6846. p. 1328; 1841. Ench. p. 685: inter genera apetala minus cognita.

Dilobos Endl. 1839. Gen. n. 4115 *c.* p. 712; 1841. Ench. p. 346: sect. Jacarandae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4547. 3. — DC. 1845. Pr. IX. p. 230.

Dilobus Steud. Nomencl. I. p. 509: vid. *praeced.*

Dilochia*) Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 38: nov. g. Pleurothallear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1345. p. 190; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1933. — Meisn. 1842. Gen. p. 369 (277). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 17.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Coelogynidar.
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 669 (*Dilochus*): g. Epidendrear.

Dilochus „Blume" Miquel vid. *praeced.*

Dilopha Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 422: sect. Frölichiae.

Dilophia Thomson 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 19: nov. g. plantar. (D. salsa.) *Cf.* Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 209, ubi Spirolobeis? adscribitur.

Dilophosphora Bonord. vid. *seq.*

Dilophospora Desmaz. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIV. p. 6. t. 1. f. 11: nov. g. Pyrenomycetum. (Sphaeria Alopecuri Fr.)
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 30; 1842. Mycol. p. 126: g. Sphaeronemear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42 (*Dilophosporium*): g. Sphaeronemeor.
Fries 1849. Summ. voy. Scand. II. p. 419: g. Sphaeropsideor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Pestalozzieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 227 (*Dilophosphora*): g. Podosporiaceor.

Dilophosporium Lindl. vid. *praeced.*

Dilsea**) Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 55. 71: nov. g. Fucor. (D. edulis.)
= Iridaea Bory.

Dilwynia Pers. Ench. II. p. 638: sphalm. pro *Dillwynia Smith.*

Dimacria Lindl. 1820 in Sweet Geran. n. 46: g. Pelargoniear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 290; 1841. Nom. p. 201. n. 7656.
DC. 1824. Pr. I. p. 653: sect. Pelargonii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5278 *b.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 728. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 314. — Endl. 1840. Gen. n. 6048 *b.* p. 1168; 1841. Ench. p. 620.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: g. Geraniear.

Dimeianthus Rafin. 1836. Fl. Tell. p. 41. n. 555.
= Pyxidium Moq.-Tand. (DC. Pr. XIII. 2. p. 262.)

Dimeiostemon Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 85):

*) λοχεία, partus. (?)
**) Nomen a voce hyberna *Dils.*

Dimeiostemon Rafin. cont. nov. g. Graminear. (Andropogon vaginatus, sessiliflorus, etc.)

Dimelaena „Norman" Rabenh. 1858. Lich. eur. exicc. Fasc. XIII. n. 376.

Dimenostemma Steud. vid. *Dimerostemma.*

Dimera Fries 1825. Pl. homon. p. 183: nov. g. Botrydeor. (in Syst. myc. III. p. 426 Trichothecio Link insertum.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 117. *(Synon. Diplosporium Link.)*

Dimereza Labill. 1824. Nov. Caledon. p. 51. t. 51.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5213; 1837. Hdb. p. 285: g. Cupaniear.
Bartl. 1830. Ord. p. 364: g. Sapindear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 52 (38).
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 668: sect. Cupaniae.
= Cupania Plum.

Dimeria R. Brown 1810. Prodr. I. p. 204. Ed. Nees p. 60: nov. g. Graminear., Saccharo aff. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 253. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 55. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 27. 496. n. 274. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 63. n. 306.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Saccharinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 976. — Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Trin. 1820. Fund. p. 166. t. 14: g. Triandr. Digyn.
Agdh. 1823. Aphor. p. 152: g. Sacharinar.
Kunth 1830. Gram. p. 157: g. Andropogi-near.
Kunth 1833. Agrost. p. 471: g. Andropogonear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 936. p. 106; 1841. Ench. p. 60. Sect.: Haplachne, Dimeria. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 398. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1341. Sect. eaed. — Meisn. 1843. Gen. p. 428 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 167. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 18. Sect.: Haplachne, Eudimeria. — Steud. 1854. Glum. I. p. 412.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 334: g. Andropogineor.

Dimeria „Rafin." Endl. in synon. Hierochloae: vid. *Dimesia Rafin.*

Dimeria Endl. 1837. Gen. n. 936 *b.* p. 106; 1841. Ench. p. 60: sect. Dimeriae. (D. aciniformis R. Br.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1341. 2.
= Eudimeria Lemr.

Dimerostemma Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 11; 1818. ibid. p. 58; 1819. Dict. v. 13. p. 253; 1821. v. 20. p. 347; 1825. v. 38. p. 16: nov. g. Heleniear., Trattinickiae aff. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2583. — Steud. 1840. Nom. I. p. 509 *(Dimenostemma).* — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18.
Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 265; 1830. v. 60. p. 575: g. Calcinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 255: g. Compositar. incertae sedis. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 503; 1841. Ench. p. 251.

Dimerostemma Cass. cont.
Meisn. 1839. Gen. p. 207 (133): g. Eugalinsogear.
Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3120: g. Galinsogear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715: g. Asteracear. minus notum.

Dimesia Rafin. („1817. Monthly mag.") 1819 Journ. Phys. LXXXIX. p. 262: nov. g. ex typo Holci fragrantis et monticolae.
= Hierochloë Gmel.

Dimetea Walp. vid. *seq.*

Dimetia Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 406 in not.: sect. Hedyotidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3240 *c.* p. 549; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Comm. p. 115. — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2874. 3. — Walp. 1843. Rep. II. p. 494 *(Dimetea).*
Meisn. 1838. Gen. p. 160: g. Hedyotear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 195: sect. Oldenlandiae.

Dimetopia*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 71: nov. g. Hydrocotylear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 256. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 142. n. 5505. — Meisn. 1838. Gen. p. 140 (102). — Endl. 1839. Gen. n. 4358. p. 763; 1841. Ench. p. 377; 1850. Spl. V. p. 1. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; 1840. II. p. 931 *(Dimitopia).* — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 19. — Klatt 1858. Linnaea XXIX. p. 707. Sect.: Eriosciadium.
Tausch 1834. Flora I. p. 357: g. Heterospermear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 139.
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 54: g. Umbelliferar. — Par. Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 284.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Hydrocotylidar.
Synon. Pritzelia Walp.

Dimia Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 485; 1825. Syst. I. p. 853. n. 991; 1830. Gen. I. p. 212. n. 1087: g. Asclepiadear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 580. II. p. 906.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI: g. Cynanchear.
= Doemia R. Brown.

Dimidiati Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: div. Gastromycetum. Gen.: Prosthemium, Actinothyrium, Leptothyrium.

Dimitopia Dietr. vid. *Dimetopia DC.*

Dimocarpus**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 233. Ed. Willd. p. 286: nov. g. Octandr. Monogyn. („Genus sub nomine *Scytalia* a Gärtnero indicatum" Willd. in adnot.) — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 346. n. 765.
Link 1821. En. I. p. 382: g. Sapindacear.
= Nephelium Linn.

Dimorpha***) Schreb. 1791. Gen. II. p. 493. n. 1179: g. Diadelph. Decandr. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 971. n. 1340.

*) διμέτωπος, bifrons.
**) „δίδυμος, geminus: ob plantae fructum gemellum".
***) δίμορφος, biformis.

Dimorpha Schreb. cont.
Gis. 1792. Prael. p. 415: g. Papilionacear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 764. (spuriar.)
Spreng. 1826. Syst. III. p. 326. n. 2606: g. Leguminosar.
= Parivoa Aubl.

Dimorpha Dietr. vid. *Diamorpha Nutt.*

Dimorphandra „Schott" Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 404; 1830. Gen. I. p. 193. n. 977: nov. g. Leguminosar. (Pentandr. Monogyn.)
Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4169: g. Mimosear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 417. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 49. — Meisn. 1837. Gen. p. 96 (68).
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74. 101: g. Dimorphandrear. — Par. Tulasne 1844. Arch. Mus. IV. p. 183. Sect. Eudimorphandra, Pocillum, Phaneropsia. — Walp. 1846. Rep. V. p. 574. Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Endl. 1841. Gen. n. 6824. p. 1324; 1841. Ench. p. 602: g. Acaciear.
Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6118: g. Lagonychiear.

Dimorphandreae Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74; 1841. ibid. p. 133: trib. Caesalpiniear. Gen.: Mora, Dimorphandra. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 274. Gen. ead. et Pentaclethra.

Dimorphanthes Cassini 1818. Bull. soc. philom. p. 30; 1819. Dict. v. 13. p. 254: nov. g. Asterear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.)
Cass. 1825. Dict. p. 37. p. 461. 481; 1830. v. 60. p. 582: g. Erigerear.
DC. 1836. Pr. V. p. 377: sect. Conyzae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2405 *b.* p. 390; 1841. Ench. p. 236.
Synon. Eschenbachia Mönch.

Dimorphanthes „Miq." Meisn. vid. *seq.*

Dimorphanthus Miquel 1840. Comm. phyt. p. 89. t. 12: nov. g. Araliacear. (Aralia chinensis L.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 70. n. 4558/$_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 359 (*Dimorphanthes*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 430. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 749: sect. Araliae.

Dimorphococcus A. Braun 1849. Alg. unicell. p. 44 in adnot.: nov. g. Palmellacear. (D. lunatus.)

Dimorpholepis A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 227 (Hook. Ic. t. 856): nov. g. Helichrysear., Panaetiae aff. (D. australis.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 276.
Synon. Duttonia F. Müll. 1852.

Dimorphopetalum Bertero 1829. Merc. chilen. Nr. 12—14; 1830 in Sillim. Am. journ. XX (ex Linnaea VII. Litt. p. 43): nov. g. Oxalidear. (D. Tetilla.) *Cf.* Bull. sc. nat. XX. p. 100 (sine descript.)
= Tetilla DC.

Dimorphotheca Vaillant 1720. Act. Ac. Paris. p. 279: nov. g. Corymbiferar. (Ed. germ. p. 547 ex Mönch.)

Dimrphotheca Vaill. cont.
Mönch 1794. Meth. p. 585: g. Petalostemonis. (Calendula pluvialis L.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 70: g. Chrysanthemear. Sect.: Meteorina, Lestibodea, Blaxium, Osteospermopsis, Castalis, Rutidocarpaea, Arnoldia, Triplocarpaea. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2672. p. 435; 1841. Ench. p. 241. Sect. eaed. (Osteospermoides loco Osteospermopsidis.) — Meisn. 1839. Gen. p. 210 (134). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3085. Sect. ut DC. (Dimorphotheca loco Lestibodeae.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 112: g. Calendulear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 40: g. Anthemidear.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 245: g. Euchrysanthemear.
Synon. Cardispermon Trant; Lestibodea et Gattenhofia Neck.; Meteorina, Castalis et Blaxium Cass.; Dimorphotheca, Castalis et Arnoldia Less.

Dimorphotheca Lessing 1832. Syn. Compos. p. 256: g. Chrysanthemear. arctius definitum.
= Dimorphothecae DC. pars.

Dinaeba*) Delile (1814. Fl. Egypt.?) 1824. Descr. de l'Egypte XIX. p. 165. t. 11. f. 3: g. Triandr. Digyn. (Dactylis paspaloides W.)
Link 1821. En. I. p. 90: g. Graminum.
Conf. Dineba et Dinebra.

Dinckleria Necker 1790. Elem. bot. III. p. 337. n. 1754: nov. g. Phryganophytor., a Jungermannia L. disjunctum.
= . . . ?

Dineba Palis. 1812. Agrost. p. 98: g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 42. 710. n. 342. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 270 (*Dinebra s. Dineba*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 280. n. 295; 1830. Gen. I. p. 70. 338. — Link 1829. Hdb. I. p. 22.
Lagasc. 1816. Gen. et spec. p. 5 (*Dyneba*): g. Triandr. Digyn. (D. arabica et lima.)
Trin. 1820. Fund. p. 140: g. Graminum.
Link 1827. Hort. I. p. 54: g. Chloridear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 864. — Bartl. 1830. Ord. p. 30.
= Chondrosii Desv., Eutrianae Trin. et Leptochloae Steud. spec.

Dinebra Panzer 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 271: g. Graminum. (Dactylis paspaloides W.)
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 171; 1822. Syn. I. p. 231: g. Chloridear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 169. — Hochst. 1855. Flora p. 420.
Steud. 1854. Glum. I. p. 299: g. Festucacear.
Conf. Dinaeba et Dineba.

Dinema Lindl. 1826. Orch. scel. p. 16 (Linnaea II. p. 531); 1831. Orchid. gen. p. 111: nov. g. Epidendrear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1550; 1841. Nom. p. 52.

*) Nomen a voce arabica: *denab*, cauda.

Dinema Lindl. cont.
n. 1967. (genuinar.) — Endl. 1837. Gen. n. 1372. p. 193; 1841. Ench. p. 110. — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (279). — Brongn. 1843. En. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Laeliadar.

Dinemagonum A. Juss. 1843. Arch. Mus. III. p. 585 (Mon. Malpigh. p. 331); 1849 in Orb. Dict. V. p. 30: nov. g. Hirear. (D. Gayanum et Bridgesianum.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390. — Endl. 1850. Spl. V. p. 76. n. 5564/$_1$.
Walp. 1846. Rep. V. p. 342: g. Hiraeear.

Dinemandra „A. Juss. mss." Endl. 1840. Gen. n. 5565. p. 1059; 1841. Ench. p. 557: g. Meiostemonum.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7846: g. Gaudichaudiear.
A. Juss. 1843. Arch. Mus. III. p. 582. t. 19; 1849 in Orb. Dict. V. p. 30: g. Hirear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390.
Meisn. 1843. Comm. p. 346: g. Hiptagear.
Walp. 1846. Rep. V. p. 341: g. Hiraeear.

Dinemasporium Leveillé 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 274: nov. g. Sphaeriaceor. (Peziza strigosa Fr.)
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Excipuleor.

Dinetus Sweet . . . . Hort. Lond. II. p. 289.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Convolvulinear.
Endl. 1839. Gen. n. 3797 *a*. p. 653; 1841. Ench. p. 324: sect. Poranae.
Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4433: g. Convolvulear. genuinar.

Dingia Gardn. . . . . . sect. Gnidiae.
= Lasiosiphon Fres. (Meisn. in DC. Pr. XIV. p. 593.)

Dinkleria „Neck." Endl. in synon. Jungermanniae: vid. *Dinckleria Neck.*

Dinochloa*) Büse 1854. Pl. Jungh. Fasc. III. p. 387: nov. g. Bambusacear. *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 1045.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 415: g. Bambusear. (Nastus Tjankorreh R. & Sch.)

Dinophora Benth. 1849. Niger Fl. p. 355: nov. g. Rhexiear. (D. spenneroides.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 592: g. Lasiandralium.

Diobelon Hampe mss.
= Angströmiae sect. Dicranellae sp. (Müll. Syn. I. p. 438.)

Dioclea HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 437: nov. g. Papilionacear. (Dolichos ruber Jacq.) — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 99.
DC. 1825. Pr. II. p. 403: g. Phaseolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3945. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 362. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 157. — Meisn. 1837. Gen. p. 93 (66). — Brongn. 1843. En. p. 131.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 132: g. Dioclear. Sect.: Pachylobium, Eudioclea. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6662. p. 1293; 1841. Ench. p. 671. Sect. eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5818. Sect. similes. — Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 71. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 216.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 38: g. Diocleear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 555.
Synon. Hymenospron Spreng.

Dioclea Spreng. 1825. Syst. I. p. 502. 556. n. 592; 1830. Gen. I. p. 125. n. 622: nov. g. Asperifoliar. (Anchusa asperrima Delile.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 198. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 603.
Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2952: g. Echiear. = Arnebia Forsk.

Diocleae Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: subtrib. Phaseolear. Gen.: Collaea, Camptosema?, Bionia, Cleobulia, Cratylia, Dioclea; Canavalia. — Par. Endl. 1841. Gen. p. 1292; 1841. Ench. p. 671. Gen. ead. et Chloryllis. Accedit 1842 (Spl. II. p. 96) Cymbosema. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 271. Gen. ut Endl. 1842.

Diocleeae Lemaire in Orb. Dict. et Müll. Ann. bot. IV.
= Diocleae Benth.

Diodanthera Spach vid. *Diotanthera DC.*

Diodella Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 41: sect. Hedyotidis. (H. Boscii DC.)

Diodia*) „Gronov." Linn. 1737. Coroll. p. 11. n. 968; 1737. Cliff. p. 493; 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 291. n. 609: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Gron. 1743. Fl. virg. p. 71.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 164. n. 670: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520.
Linn. 1753. Sp. I. p. 104; 1759. Syst. ed. X. p. 891. n. 114; 1762. Sp. ed. II. p. 151; 1764. Gen. ed. VI. p. 51. n. 122; 1767. Syst. ed. XII. p. 116: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 125; 1784. Syst. p. 149. — Reich. 1778. Gen. p. 52. n. 129. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 67. n. 158. — Gmel. 1791. Syst. p. 235. — Pers. 1797. Syst. p. 154; 1805. Ench. I. p. 124. n. 236. — Willd. 1797. Sp. I. p. 580. n. 180. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 94. — Schult. 1827. Mant. III. p. 14.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 197; 1820. Mém. Mus. VI. p. 372. — Batsch 1802. Tab. p. 232. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 433. — Hedw. 1806. Gen. p. 65. 373. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 14. 284. n. 487. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 274. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 405. n. 395; 1830. Gen. I. p. 93. n. 465. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 481. Sect. ut DC.

*) δῖνος, vertigo.

*) διοδιος, subviaticus. (Linn. Phil. bot. p. 186.) Conf. Beckmann Lex. bot. p. 76.

Diodia Gron. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 145: g. Aparinium.
Scop. 1777. Intr. p. 139: g. Opulinar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 121. t. 25. f. 7 (virginiana).
Neck. 1790. El. I. p. 205. n. 343: g. Phyllastrophytor.
G. F. W. Meyer 1818. Fl. Esseq. p. 81. *Cf.* Flora 1819. I. p. 342.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 599: g. Spermacocear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXI. — Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 341; 1834. ibid. IX. p. 216. — Bartl. 1830. Ord. p. 210. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377. — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2772. (*genuinar.*) Sect.: Diodia, Dasycephala. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2001: g. Coffeacear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 561: g. Euspermacocear. Sect.: Eudiodia, Dasycephala. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 624. Sect. eaed. — Endl. 1838. Gen. n. 3123. p. 527; 1841. Ench. p. 271. Sect. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 28. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 38.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Diodium Ralfs (*mss.?*)
Docidium Bréb.

Diodois Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plantar.
Psyllocarpus Mart.

Diodonta Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 360: nov. g. Coreopsidear. Sect.: Meduseae, Heterodonta. *Cf.* Endl. Spl. II. p. 43. n. 2529/$_1$. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 614 (*Diatonta*). Sect.: Meduseae, Hederodonta.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 338: subsect. Eucoreopsidis.

Dioecia Linn. Gen., Syst., Spec. (sequentibus auctoribus Linnaeanis): class. XXII. plantar. Ordines: Di-, Tri-, Tetr-, Pent-, Hex-, Oct-, Enne-, Dec-, Icos-, Polyandria, Monadelphia, Syngenesia, Gynandria.

Dioiceae Hill 1769. Hort. kew. p. 413: class. 37 herbar. Typus: Hydrocharis.

Diolena Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 329: nov. g. Sonerilear. (D. hygrophila.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 885.

Diolotheca Rafin. vid. *Diototheca Rafin.*

Diomedea Cassini 1815. Bull. soc. philom. p. 175: nov. g. pro Buphthalmo frutescente L. indicatum.
Cass. 1817. Bull. soc. philom. p. 70; 1819. Dict. v. 13. p. 283; 1825. v. 38. p. 17: g. Rudbeckiear., Heliopsidi aff.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 212: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 470.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 603. n. 2827; 1831. Gen. II. p. 637. n. 3184. g. Radiatar.

Diomedea Cassini cont.
Cass. 1830. Dict. v. 60. p. 576: g. Heliopsidear. *Cf. Diomedella Cass.*
Less. 1832. Syn. p. 210: g. Diomedear.
= Borrichia Adans.

Diomedeae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 210: div. Ecliptear. Gen. unicum: Diomedea.

Diomedella Cassini 1827. Dict. v. 46. p. 398. 405; 1829. v. 54. p. 461: g. Heliopsidear. (antea *Diomedea.*)
= Borrichia Adans.

Diomedes Haworth 1823. Phil. Mag. LXII. p. 440: nov. g. Narcissor., Ajaci aff.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 945: sect. Narcissi. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1289 *c.* p. 179; 1841. Ench. p. 103. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1611. 3.
Haw. 1831. Mon. Narciss. p. 5: g. Narcissinear. *Cf.* Kunth Enum. V. p. 707.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 438: subg. Narcissi.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 17. 204: sect. Queltiae.

Dion („an *Dioon Lindl.?*") Miquel 1846. Linnaea XIX. 4. p. 414: g. Cycadear., inter Cycadem et Macrozamiam medium. (Zamia Maeleni Miq.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 747.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 225: g. Cycadeaccar. *Conf.* Dioon.

Dionaceae Dumort. 1838. Bull. Ac. Brux. IV. p. 443: nova fam. Stellarieis aff. Gen.: Dionaea.

Dionaea Ellis 1770. Nov. Act. Upsal. I. p. 98. t. 8: nov. g. plantar. (D. muscipula).
Linn. 1771. Mant. II. p. 151. n. 1307: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 335; 1784. Syst. p. 402. — Reich. 1778. Gen. p. 220. n. 584. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 288. n. 729. — Gmel. 1791. Syst. p. 685. — Pers. 1797. Syst. p. 430; 1805. Ench. I. p. 469. n. 1068. — Willd. 1799. Sp. II. p. 574. n. 855. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 367. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 277. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 284.
Scop. 1777. Intr. p. 225: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 431: g. incertae sedis. — Par. Vent. 1799. Tabl. IV. p. 21. — Hedw. 1806. Gen. p. 313. n. 1238.
Neck. 1790. El. II. p. 388. n. 1207: g. Ypsoophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 320: g. Gruinalium.
Batsch 1802. Tab. p. 31: g. Ciliatar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 779: g. Capparidum.
Link 1821. En. I. p. 396: g. Droserinar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: g. Droseraceae. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 320. — Bartl. 1830. Ord. p. 286. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 347. — Link 1831. Hdb. II. p. 266. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 492. — Meisn. 1837. Gen. p. 22 (19). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 147. — Endl. 1839. Gen. n. 5037. p. 907; 1841. Ench. p. 469. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 89. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 434. — Planch. 1848. Ann. sc. nat.

Dionaea Ellis cont.
3e sér. IX. p. 304. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 40 *(Dionea)*.
St. Hil. 1824 Mém. Mus. XI. p. 61.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 330. n. 1608: g. Hypericear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX; 1828. Consp. p. 189. n. 4912: g. Droserear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 354. n. 1791. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1470.
Lindl. 1833. Nix. pl. Ed. germ. p. 15: g. Pittosporalium?
Rchb. 1837. Hdb. p. 272; 1841. Nom. p. 188. n. 7180: g. unicum Muscipulear.
Dumort. 1838. Bull. Ac. Brux. IV. p. 443: g. Dionacear.
Synon. Dione Soland.

Dione Soland. mss.
= Dionaea Ellis.

Dionea Lemaire vid. *Dionea Ellis.*

Dionycha Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 48: g. dubium Lasiandralium. (D. Bojerii.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 867.

Dionysia Fenzl 1843. Flora p. 389: nov. g. Primulacear. — Par. Boiss. 1846. Diagn. pl. or. nov. I. Nr. 7. p. 65.
Endl. 1843. Spl. III. p. 80. n. $4198/_1$: g. Androsacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645: g. Primulidar.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 442: g. Primulear.

Dionysia Bronner 1857. Traub. Rheinth. p. 11: g. Vitium class. I.

Dioon Lindl. 1843. Bot. Regist. Aug.; Miscell. p. 59.
Miq. 1848. Linnaea XXI. p 567; 1849. Tijdschr. voor Nat. Wet. II. p. 280: g. Cycadear. *(Synon. Platyzamia Zucc.)*
Conf. Dion.

Diorthodon DC. 1837. Prodr. VI. p. 16: sect. Anacycli. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2643 *b.* p. 430; 1841. Ench. p. 241.

Dioryctandra*) Hasskarl 1855. Retzia I. p. 125; 1857. Flora II. p. 530; 1858. Hort. Bogor. p. 17: nov. g. Violacear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 235.

Diorygma**) Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 13. f. 1: nov. g. Graphidear. (Opegrapha hieroglyphica Pers.) *Cf.* Isis 1825. p. 553.
Mart. 1828. Crypt. bras. t. 6. f. 1.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 744. n. 3767: g. Hymenocarpor.
Endl. 1836. Gen. n. 147. p. 13; 1841. Ench. p. 10: g. Verrucariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 524. (p. 16. n. 543. 6: sect. Opegraphae).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Verrucaridar.

Dioscoraea Mönch vid. *seq.*

Dioscorea***) Plumier 1703. Gen. p. 9. t. 26.
Linn. 1737. Gen. p. 306. n. 754; 1737. Cliff. p. 459; 1740. Syst. p. 31; 1748. Ups. p. 297; 1753. Sp. II. p. 1032; 1759. Syst. ed. X. p. 1293. n. 995; 1763. Sp. ed. II. p. 1462; 1764. Gen. ed. VI. p. 525. n. 1122; 1767. Syst. ed. XII. p. 656: g. Dioec. Hexandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 744; 1784. Syst. p. 888. — Reich. 1778. Gen. p. 521. n. 1227. — Lour. 1790. Coch. II. p. 623. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 693. n. 1530. — Pers. 1797. Syst. p. 930; 1807. Ench. II. p. 620. n. 2237. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 239. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 789. n. 1802; 1809. En. p. 1016. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 238. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 797. — Blanco 1837. Fl. Filipin. p. 797.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 75. n. 318: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 291 *(Dioscoraea)*.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 151. n. 1380.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.
Adans. 1763. Fam. II. p. 52: g. Asparagor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 42.
Hill 1769. Ht. kew. p. 423: g. Dioicear.
Scop. 1777. Intr. p. 84: g. Liliacear.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 149: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 581.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 66. t. 17. f. 4 (sativa).
Vent. 1799. Tabl. II. p. 148: g. Smilacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 105. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 221.
Batsch 1802. Tab. p. 136: g. Hyacinthinar.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 294. Ed. Nees p. 150: g. Dioscorear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1338; 1841. Nom. p. 48. n. 1746. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 291. n. 1507. — Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Endl. 1837. Gen. n. 1201. p. 158; 1841. Ench. p. 92. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1215. — Griseb. 1842 in Mart. Fl. Bras. Diosc. p. 25. Sect.: Centrostemon, Dematostemon, Amphistemon, Epistemon, Lychnostemon, Allactostemon, Hemidematostemon. — Brongn. 1843. En. genr. p. 22. — Nees 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 33. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 22 *(Igname)*. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 570.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 273: g. Dioscorinar. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 280. — Agdh. 1823. Aphor. p. 170. — Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 20. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 131.
Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 16 *(Igname)*: g. Asparaginear.
Link 1822. En. II. p. 427; 1829. Hdb. I. p. 277: g. Smilacinar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: g. Dioscorinear. — Par. Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 54; 1850. Enum. V. p. 325. Sejungitur Helmia.
Colla . . . . Mem. Ac. Turin. XXXIX. t. 59.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: g. Dioscoridear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 202.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 359; 1847. Veg. kd. p. 214: g. Dioscoreacear. —

*) διόρυκτος, perforatus.
**) διόρυγμα, fossa.
***) Nomen in Pedanii Dioscoridis e Cilicia memoriam.

Dioscorea Plumier cont.
Par. Meisn. 1842. Gen. p. 404 (308). — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 647.
Herb. 1837. Amaryll. p. 68. 122: g. Agavear.
Schltd. 1843. Linnaea XVII. p. 602. Nova sect.: Anisostemon.
Synon. Combilium Rumph.?; Botryosicyos Hochst. (Planch.)

Dioscoreaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 359) 1847. Veg. kingd. p. 214: ordo Dictyogenar. Gen.: Tamus, Testudinaria, Rajania, Dioscorea, Oncus, Podianthus.
Meisn. 1842. Gen. p. 404 (307): ordo Coronariar. Gen.: Oncus, Tamus, Dioscorea, Rajania. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 647.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Homoblastear.

Dioscoreae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 294. Ed. Nees p. 150: ordo Monocotyledonum. Gen.: Dioscorea.
DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Endogenar. phanerogamar.
Rchb. 1828. Consp. p. 64 (1830. Fl. exc. p. 101): div. Sarmentacear. Gen.: Tamus, Testudinaria, Rajania, Dioscorea; Oncus?, Aechmea?, Floscopa?, Hollböllia?
Bartl. 1830. Ord. p. 53: ordo (38) Liliacear. Gen.: Tamus, Testudinaria, Rajania, Dioscorea.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (250) Hexapetaloidear.
Lindl. 1833. Nix. p. 35: ordo Smilalium.
Mart. 1835. Consp. p. 9: ordo 42.
Endl. 1837. Gen. p. 157; 1841. Ench. p. 91: ordo Artorhizar. Gen.: Rajania, Dioscorea, Tamus, Oncus.
Rchb. 1837. Hdb. p. 153: subdiv. Dioscorinar.
Koch 1837. Syn. p. 706. Ed. II. p. 815: ordo Endogenear. Gen.: Tamus.
Rchb. 1841. Nom. p. 48: div. Smilacear. Gen. ut Endl.
Griseb. 1842 in Mart. Fl. Bras. Diosc. p. 25: ordo plant. Gen.: Dioscorea.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 22: fam. Lirioidear. Gen.: Dioscorea, Tamus.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 199: fam. (208) Liliacear. Trib.: Tamideae, Dioscorideae. Gen. affinia: Tacca, Ataccia, Herreria.
A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 44. Gen. ut Bartl.

Dioscoridea Bronner 1857. Traub. Rheinth. p. 11: g. Vitium class. II.

Dioscorideae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 57. 59: fam. Tamaricear. Gen. Dioscorea, Rajania, Testudinaria.
Bernh. 1840. Flora II. p. 426: trib. Alliacear.
Schnizl. 1843. Bot. Zeit. p. 739. Novum genus: Podianthus.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 200: trib. Dioscorear. Gen.: Dioscorea, Rajania.

Dioscorinae HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 273: ordo plant. Gen.: Dioscorea. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 280.

Dioscorinae HBK. cont.
Agdh. 1823. Aphor. p. 169; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 585: ordo Liliiflorar. Gen.: Dioscorea, Rajania, Oncus, Aechma, Tamus.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: trib. Sarmentacear. Gen. ut Agdh.
Rchb. 1837. Hdb. p. 153: div. Sarmentacear. Subdivis.: Parideae, Roxburghia, Dioscoreae.

Dioscorineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: fam. Fructauliae. Gen.: Dioscorea, Tamnus.
Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 51; 1850. Enum. V. p. 323: fam. Monocotyledonum. Gen.: Dioscorea, Helmia, Testudinaria, Rajania, Tamus, Oncus.

Diosma*) Linn. 1737. Gen. p. 60. n. 171; 1737. Cliff. p. 71; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 198; 1759. Syst. ed. X. p. 939. n. 241; 1762. Sp. ed. II. p. 286; 1764. Gen. ed. VI. p. 108. n. 272; 1767. Syst. ed. XII. p. 182. n. 271: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 198; 1784. Syst. p. 238. — Reich. 1778. Gen. p. 110. n. 292. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 148. n. 374. — Gmel. 1791. Syst. p. 408. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 42; 1818. Fl. cap. II. p. 125. — Pers. 1797. Syst. p. 250; 1805. Ench. I. p. 246. n. 550. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1133. n. 426.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 35. n. 133: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 26.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rutar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 344: g. Pistaciar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 188: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 250: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 298: g. Rutaceis aff. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 231. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 106.
Neck. 1790. El. III. p. 356. n. 1785: g. Synathrophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 528: g. Aggregatar.
Batsch 1802. Tab. p. 55: g. Rutacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 162. n. 687. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 782. n. 863; 1830. Gen. I. p. 185. n. 934. Sect.: Adenandra, Coleonema, Acmadenia, Barosma, Agathosma, Macrostylis. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 824. Sect.: Eudiosma, Agathosma, Acmadenia, Coleonema, Adenandra, Barosma, Euchaetis.
Cram. 1803. Disp. p. 182: in Monoec. Pentandr.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 34): g. Diosmear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 667. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 287. — DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140; 1824. Pr. I. p. 713. Sect.: Adenandra, Barosma, Agathosma, Dichosma, Eudiosma.
Adenandra Willd., Diosma Berg., Barosma et Agathosma Willd.

*) Nomen a suaveolentissimo et refocillante odore totius plantae, praesertim pericarpiorum. (Ht. Cliff.)

Diosma Berg. 1767. Fl. cap. p. 62: g. restrict.
Willd. 1809. Enum. p. 257: g. Pentandr. Monogyn.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. xxxv. 452. n. 998: g. Rutacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 237; 1831. Hdb. II. p. 227.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 182: g. Diosmear. — Par. Bartl. & Wendl. 1824. Diosm. p. 12. 19. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 472; 1849 in Orb. Dict. V. p. 44. — Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5161; 1837. Hdb. p. 282. — Bartl. 1830. Ord. p. 388. — Cham. 1830. Linnaea V. p. 51. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 783. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 329. — Meisn. 1837. Gen. p. 61 (45). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 83.
Endl. 1840. Gen. n. 6017. p. 1157; 1841. Ench. p. 612: g. Eudiosmear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7507: g. Agathosmear.
Synon. Eudiosma DC.; Diosmae Linn. pars.

Diosma Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 161. Ed. Willd. p. 200: g. Pentandr. Monogyn. (D. asiatica.)
= Pseudiosma A. Juss.

Diosmeae R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 31): ordo plant. Gen.: Fagara, Xanthoxylon, Melicope, Jambolifera, Evodea, Pilocarpus, Empleurum, Dictamnus, Cusparia, Ticorea, Galipea, Monnieria, Ruta, Peganum, Diosma, Boronia, Correa, Eriostemon, Zieria, Phebalium, Diplolaena. *Cf.* Juss. 1819. Dict. v. 13. p. 293.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 666: fam. 65 plant. Gen.: Brunia, Staavia, Diosma, Hartogia, Agathosma, Boronia, Corraea, Melicope, Poranthera, Empleurum, Walkeria, Commersonia.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: fam. Thamisertiae.
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140; 1824. Pr. I. p. 709: trib. Rutacear. Gen. (1824): Ruta, Peganum (1822 exclusa), Dictamnus, Calodendron, Diosma, Empleurum, Diplolaena, Correa, Phebalium, Crowea, Eriostemon, Philotheca, Boronia, Cyminosma, Zieria, Melicope, Elaphrium?, Choisya, Evodia, Zanthoxylum, Pilocarpus?, Spiranthera, Almeidea. — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 466. Gen.: Dictamnus; Calendron, Adenandra, Coleonema, Diosma, Euchaetis, Acmadenia, Barosma, Agathosma, Macrostylis, Empleurum; Correa, Diplolaena, Phebalium, Philotheca, Crowea, Eriostemon, Boronia, Zieria; Melicope, Evodia, Esenbeckia, Metrodorea, Pilocarpus, Hortia, Choisya; Spiranthera, Almeidea, Galipea, Diglottis, Erythrochiton, Ticorea, Moniera. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 781. Gen. ead. (exclusis 7 ultimis.)
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 179: ordo pl., sejunctis Fraxinellis et Xanthoxyleis restrictus. Gen.: Eriostemum, Philotheca, Zieria, Melicope, Phebalium, Boronia, Corraea, Poranthera, Crowea, Bucco, Baryosma, Adenandra, Diosma, Empleurum, Diplolaena.
Bartl. & Wendl. 1824. Diosm. p. 3: div. Rutacear. Gen. §. 1: Euchaetis, Diosma, Coleonema, Acmadenia, Adenandra. §. 2: Barosma, Agathosma, Macrostylis, Empleurum. — Par. Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15; 1826. Isis p. 589. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI. Gen. ut A. Juss. (exclusis nonnullis.)
Rchb. 1828. Consp. p. 197 (1832. Fl. exc. p. 767): subdiv. Rutariar. Sect.: Cusparieae, Pilocarpeae?, *genuinae* (gen.: Dictamnus; Polembryum?, Calodendron, Barraldeia?, Adenandra, Coleonema, Diosma, Euchaetis, Acmadenia, Barosma, Agathosma; Zieria, Boronia, Eriostemon, Crowea, Philotheca, Phebalium, Diplolaena, Correa).
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (115) Thalamiflorar. syncarpar.
Bartl. 1830. Ord. p. 386: ordo (229) Terebinthinar. Divis.: *legitimae* (p. 388. Gen. ut 1824 et Calodendron, Polembryum), Boronieae, Pilocarpeae, Cusparieae, Dictamneae.
Lindl. 1833. Nix. p. 16: ordo ad Rutaceas accedens.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 318: fam. (18) Terebinthinear. Trib. ut Bartl. 1830.
Meisn. 1837. Gen. p. 60 (44): ordo Rutacear. Gen. §. 1: Diplolaena, Antomarchia, Correa, Philotheca, Phebalium, Crowea, Eriostemon, Geijera, Boronia, Zieria. §. 2: Calodendron, Barosma, Agathosma, Diosma, Coleonema, Adenandra, Acmadenia, Euchaetis, Macrostylis, Empleurum. §. 3: Dictamnus. §. 4: Guindilia?, Moniera, Erythrochiton, Diglottis, Galipea, Ticorea, Almeidea, Spiranthera, Evodia, Esenbeckia, Metrodorea, Pilocarpus, Hortia, Monodynamis, Choisya, Melicope, Bridgesia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 282: sect. Rutear. Subsect.: *genuinae* (gen. ut 1828 emissis Boronieis), Cusparieae, Boronieae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 196. Subsect.: Dictamneae, *genuinae* (sect.: Pilocarpeae, Agathosmeae, Boronieae), Cusparieae.
Endl. 1840. Gen. p. 1149; 1841. Ench. p. 610: ordo Terebinthinear. Trib.: Cusparieae, Pilocarpeae, Boronieae, Eudiosmeae, Dictamneae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 83: fam. Therebinthinear. Gen. ex Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 275: fam. Rutacear. Trib. ut Endl.

Diospyreae Rchb. 1831. Fl. exc. p. 433: div. Sapotacear. Gen.: Diospyros.
Rchb. 1837. Hdb. p. 214: sect. Sapotear. genuinar. Gen.: Leca, Lasianthera; Diospyros, Cargillia; Royena, Turaria; Paralea, Visnea, Embryopteris. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. Gen. Ebenacear. Endl.

Diospyrinae Link 1822. Enum. II. p. 7: fam. plant.

Diospyroideae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XXI. 72: class. Gamopetalar. hypogynar. Fam.: Ebenaceae, Oleineae?, Ilicineae, Empetreae, Sapoteae, Styraceae.

Diospyros*) Linn. 1737. Gen. p. 143. n. 403: g. Icosandr. Monogyn.

Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 149; 1740. Syst. p. 22; 1742. Gen. ed. II. p. 166. n. 385: g. Octandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1784. Fl. jap. p. 157. — Lour. 1790. Coch. I. p. 226. — Gmel. 1791. Syst. p. 617. — Blanco 1837. Filipin. p. 301.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 226. n. 936: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 471.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337.

Linn. 1753. Sp. II. p. 1057; 1759. Syst. ed. X. p. 1313. n. 1027; 1763. Sp. ed. II. p. 1510; 1764. Gen. ed. VI. p. 550. n. 1161; 1767. Syst. ed. XII. p. 679: g. Polygam. Dioec. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 771; 1784. Syst. p. 918. — Reich. 1778. Gen. p. 546. n. 1274. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 736. n. 1598. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 36. t. 46. 50. — Pers. 1797. Syst. p. 959. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 258. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 1107. n. 1911; 1809. En. p. 1061. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 309. 331.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.

Adans. 1763. Fam. II. p. 165: g. Vaccinior.

Scop. 1777. Intr. p. 200: g. Speciosar.

Juss. 1789. Gen. p. 156: g. Guajacanar.

Neck. 1790. El. I. p. 227. n. 376: g. Dicroophytor.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 444: g. Ebenacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 346. — DC. 1805. Franç. III. p. 670. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 525. Ed. Nees p. 381. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 253. — Link 1822. En. II. p. 447; 1829. Hdb. I. p. 598. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57 (*Dyospyros*). — Kunth 1823. Syn. II. p. 313. — D. Don 1825. Nepal. p. 143. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 668. — Poir. 1826. Dict. v. 41. p. 245 (*Plaqueminier*). — Bartl. 1830. Ord. p. 161. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 38. — Koch 1837. Syn. p. 480. Ed. II. p. 552. — Endl. 1839. Gen. n. 4249. p. 742; 1841. Ench. p. 363. Sect.: Ebenus, Embryopteris, Paralea. — Meisn. 1839. Gen. p. 250 (159). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 402. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 72. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 222. Sect.: Tetradiospyros, Otogyne, Eudiospyros, Amuxis. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 1. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 596. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 243. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 35. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 469. — Miq. 1852. Pl. Jungh. II. p. 203; 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVII. p. 3; 1857. Ind. bat. II. p. 1044. Sect.: Eudiospyros, Otogyne.

Diospyros Linn. cont.

Batsch 1802. Tab. p. 204: g. Sapotar.

Pers. 1807. Ench. II. p. 624. n. 2250: g. Dioec. Octandr. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 240.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 506; 1825. Syst. II. p. 202. n. 1412; 1830. Gen. I. p. 299. n. 533: g. Styracear.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII: g. Lucumear.

Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3647: g. Mimusopear.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 435; 1837. Hdb. p. 214; 1841. Nom. p. 136. n. 5290: g. Diospyrear. Sect. (1841): Diospyros, Embryopteris, Paralea.

Roxb. 1832. Ind. II. p. 427 (*Diospyrus*): g. Polyandr. Monogyn.

Synon. Ermellinus Caesalp.; Guajacana Tourn.; Hebenaster Rumph.; Paralea Aubl.; Paralia Desv.; Embryopteris Gärtn.; Cavanilla Lam.; Noltia Schum.?

Diospyros Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 209: g. plant. (Dioec.) An a Linnaeano diversum?

Diospyrus Roxb. vid. *Diospyros Linn.*

Diostomaea „Spenn." Endl. in synon. Neottiae: vid. *Distomaea Spenn.*

Diotanthera*) DC. 1828. Prodr. III. p. 131: sect. Chaetogastrae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4594 *b*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 753. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 237 (*Diodanthera*). — Endl. 1840. Gen. n. 6210 *b*. p. 1213; 1841. Ench. p. 646.

Diothonaea Lemaire vid. *seq.*

Diothonea**) Lindl. 1834 in Hook. journ. bot. I. p. 12: nov. g. Orchidear. (D. Lloensis.)

Endl. 1837. Gen. n. 1373. p. 193; 1841. Ench. p. 110: g. Epidendrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1968. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (279). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 45 (*Diothonaea*).

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Isochilidar.

Diotis Schreb. 1791. Gen. II. p. 633. n. 1423: g. Monoec. Tetrandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 368. n. 1663. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 207.

Batsch 1802. Tab. p. 172: g. Oleracear.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 312; 1826. Syst. III. p. 836. n. 3098: g. Chenopodear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4335. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278.

Link 1822. II. p. 383: g. Atriplicinar.

Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.

Rchb. 1832. Fl. exc. p. 576; 1837. Hdb. p. 238: g. Atriplicear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 609.

= Eurotia Adans.

Diotis Desfont. 1799. Fl. atlant. II. p. 261. DC. 1805. Franç. IV. p. 201: g. Corymbi-

*) Nomen ex Theophrasto.

*) *δίωτος*, biauritus.

**) *ὀθόνη*, velum.

Diotis Desfont. cont.
ferar. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 451.
Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 295: g. Anthemidear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 140. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 40. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 45.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 179; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 579: g. Santolinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2388.
DC. 1837. Pr. VI. p. 34: g. Euanthemidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2650. p. 431; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 209 (134). — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 286. (genuinar.)
Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3062: g. Ptarmicear.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 159: g. Chamomillear.
Synon. Gnaphalium Tourn.; Neesia Spreng.; Otanthus Link; Athanasiae et Filaginis sp. Linn.; Santolinae sp. Lam., Sm.

Diotocalyx DC. 1830. Prodr. IV. p. 644: sect. Morinae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 681. — Endl. 1838. Gen. n. 2190 *a.* p. 353; 1841. Ench. p. 229. — Bunge 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 321.

Diotocarpus Hochstett. 1843. Flora I. p. 70: nov. g. Rubiacear.
= Pentanisia Harv.

Diotolotus Tausch 1842. Flora I. p. 284: nov. g. Cytiso aff.
Meisn. 1843. Comm. p. 350: g. Genistear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 103. n. 6505/$_1$.

Diotosperma A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 275 (Hook. Ic. ser. nov. V. t. 855): nov. g. Partheniear., Silphiospermae aff. (D. Drummondii.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 211 *(Diatosperma).*

Diotostemon*) Salm-Dyck 1854 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 34. p. 265: nov. g. Crassulacear. (D. Hookeri.)

Diotostephus Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 543; 1830. v. 60. p. 577: nov. g. Baltimorear. *(Serpentelle.)*
Endl. 1838. Gen. n. 2471 *b.* p. 401; 1841. Ench. p. 237: sect. Chrysogoni. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3012. 2.

Diototheca Vaillant 1722. Act. Ac. Paris. p. 184: g. Dipsacear.
= Morina Tourn.

Diototheca Rafin. („Fl. Ludov. p. 74") 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 88 *(Diolotheca)*: g. Morinidiae, teste DC. (Prodr. IV. p. 644) a praecedente diversum.
= . . . ?

Dioxippe Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 33. 45: nov. g. Clausenear. (Cookia cyanocarpa Blume.)

*) δύω, duo; οὖς, auris; στήμων, stamen.

Dipcadi Medic. 1790. Act. Theod. Pal. Phys. VI. p. 431: nov. g. ex typo Hyacinthi serotini L.
Mönch 1794. Meth. p. 633: g. Petalostemonis.
Webb 1850. Canar. III. p. 340: g. Asphodelear.
Uropetalum Ker.

Dipcadioides Medic. 1790. Act. Theod. Pal. Phys. VI. p. 432: nov. g. ex typo Phormii hyacinthoidis L.
Lachenalia Jacq.

Dipera Spreng. 1826. Syst. III. p. 676. 696. n. 2937; 1831. Gen. II. p. 655. n. 3297: g. Orchidear.
Disperis Swartz.

Diperis Wight vid. *Disperis Swartz.*

Dipetalae Hill 1769. Hort. kew. p. 156: class. VIII. herbar. Typus: Circaea.

Dipetalae incompletae Hill 1769. Hort. kew. p. 336: class. XXII. herbar. Typus: Corispermum.

Dipetalae irregulares Hill 1769. Hort. kew. p. 278: class. XV. herbar. Typus: Cypripedium.

Dipetalum Dalzell 1850 in Hook. Kew gard. misc. II. p. 38: nov. g. Xanthoxylear. (Toddalia bilocularis W. & A.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 258: g. Zanthoxylear.

Diphaca*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 453. Ed. Willd. p. 554: nov. g. Diadelph. Decandr. (D. cochinchinensis.)
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Dalbergiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 313: g. Euhedysarear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 278. — Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). — Endl. 1841. Gen. n. 6590. p. 1281; 1841. Ench. p. 670. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3983; 1841. Nom. p. 153. n. 5986: g. Onobrychear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 45: g. Hedysarear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 281.

Diphalangium**) Schauer 1847. Linnaea XIX. 6. p. 702: nov. g. Agapanthear. (D. graminifolium.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 865: g. Alliear.

Diphilus „Salisb. Linn. Trans. VI" Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 664: subsect. Hermetis.

Diphiscium Palis., Desv. vid. *Diphyscium Ehrh.*

Dipholis***) A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 188 (Deless. Ic. V): nov. g. Sapotacear. (Achras salicifolia L.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 591.

Diphragmus Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 510: nov. g. Euspermacocear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 29.

*) φακῆ, legumen.
**) φαλάγγιον, aranea. (?)
***) φολίς, squama: propter appendices duplices inter lobos corollae.

Diphryllum Rafin. (1808. New-York med. repos. V. p. 356) 1808 in Desv. Journ. bot. I. p. 220; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 261: nov. g. Orchidear. (Listera convallarioides Nutt.) *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 298. — Par. Lindl. 1826. Orch. scel. p. 19. (Linnaea II. p. 532.) — Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1586.
Listera R. Brown.

Diphterium Brongn. vid. *seq.*

Diphtherium*) Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 14. 26: nov. g. Lycogalactum. *Cf.* Flora 1819. I. p. 202 et Leman 1823. Dict. v. 26. p. 401.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 551 (*Diphterium*): g. Fuliginear. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 529. n. 3515: g. Trichogasterum.
Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 347: g. Aethalinor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 218.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 22; 1842. Mycol. p. 89: g. Reticulariacear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Reticularieor.
= Reticularia Bull.?

Diphyes Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 310: nov. g. Orchidear. Sect.: Monanthes, Diptychanthes, Stachysanthes, Desmosanthes, Corymbosia, Polymeres, Diasperia, Macrocaulia.
= Bolbophyllum Pet.-Thouars.

Diphyllae Hill 1769. Hort. kew. p. 375: class. XXIX. herbar. Typus: Piper.

Diphyllea Dietr. vid. *seq.*

Diphylleia**) Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. I. p. 203. t. 19. 20: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 387. n. 850. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 360. — Elliott 1817. Sketch I. p. 411.
Hedw. 1806. Gen. p. 223. n. 906: g. Berberidear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 299. — DC. 1821. Syst. II. p. 29; 1824. Pr. I. p. 110. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 121. n. 1298; 1830. Gen. I. p. 253. n. 1318. — Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. IX. 52. — Bartl. 1830. Ord. p. 242. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 120. — Meisn. 1837. Gen. p. 6 (8). — Endl. 1839. Gen. n. 4808. p. 852; 1841. Ench. p. 440. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1040. 1073 (*Diphyllea*). — Brongn. 1843. En. genr. p. 95.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 209: g. Berberidum.
Link 1821. En. I. p. 340: g. Asparaginar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVII: g. Caulophyllear.
Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4842: g. Bocconiear.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452: g. Podophyllear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 34.
Rchb. 1837. Hdb. p. 265; 1841. Nom. p. 185. n. 7094: g. Berberear. genuinar.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 52:

Diphylleia Rich. cont.
g. Nandinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 438 (*Diphylleja*).
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 47: g. Berberidacear.

Diphylleja Lindl. vid. *praeced.*

Diphylus Steud. Nomencl. I. p. 514: vid. *Diphilus Salisb.*

Diphyma*) Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. t. 1110: sect. Gesneriae. (G. Douglasii.)

Diphysa**) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 208. t. 180: nov. g. Diadelph. Decandr. (D. carthagenensis.) — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 500. n. 1194. — Gmel. 1791. Syst. p. 1117. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1130. n. 1363. — Pers. 1807. Ench. II. p. 311. n. 1723.
Scop. 1777. Intr. p. 306: g. Leguminosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 362. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 426. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 240. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 298. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 311. n. 2594; 1831. Gen. II. p. 595. n. 2941.
Medic. (Vorles. II. p. 393) 1789. Phil. Bot. I. p. 207.
Gis. 1792. Prael. p. 415: g. Papilionacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 759: g. Coronillear.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 269. — Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3910; 1841. Nom. p. 148. n. 5744. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 244. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6555. p. 1275; 1841. Ench. p. 669. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. (?) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 48. — Benth. & Örst. .... Legum. Centroam. p. 10. Char. emend. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 493.

Diphysae Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 229: fam. Chaodinear. (Gen.: Thorea.)

Diphysciaceae C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 811: trib. Acrocarpor. Gen. unicum: Diphyscium.

Diphyscium***) Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 99; 1789. Beitr. IV. p. 149. (Webera Diphyscium.)
Weber & Mohr 1807. Taschenb. p. 377: g. Muscor.; a Buxbaumia sejunctum. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 85. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 716. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 149. n. 3298; 1831. Gen. II. p. 728. n. 3694. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 114. (anoplostomor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 68.
Löhnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 38: g. Mitrocarpor.
Brid. 1817. Muscol. rec. Suppl. III. p. 112: g. Diploperistomator.
Palis. 1822. Mém. soc. Linn. I. p. 457 (*Di-*

*) διφθέρα, corium.
**) δίς, bis; φύλλον, folium.

*) φῦμα, tuber.
**) φῦσα, vesica.
***) φυσκίον, parva vesica.

Diphyscium Ehrhart cont. *phiscium):* g. Entopogonor. *Cf.* Desv. 1825. ibid. III. p. 223 *(Diphiscium).*

Brid. 1822. Meth. musc. p. 123: g. Peristomor. acrocarpor.

Grev. & Arn. 1824. Mem. Wern. Soc. V. 1. p. 73: g. Buxbaumioidear. — Par. Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 227.

Brid. 1826. Bryol. I. p. 325: g. Acrocarpor. (1827. ibid. II. p. XLV Polytrichoideis aff.)

Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 665: g. Polytrichoideor.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Buxbaumiear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 84. — Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 90. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 48; 1849. ibid. VIII. p. 400.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.

Bruch & Schimp. 1834. Bryol. eur. Fasc. I; 1835. Mém. soc. Strasb. II: g. Buxbaumiacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 240. — Bayrh. 1849. Taun. p. 24. — Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 369.

Endl. 1836. Gen. n. 564. p. 54; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 942: g. Calyptrobryor.

C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 811: g. unicum Diphysciacear.

Synon. Webera Ehrh.; Hymenopogum Palis.

Diphystema Necker 1790. Elem. bot. I. p. 382. n. 594: g. Plasyrgophytor.
= Taligalea Aubl.

Dipidax „Laws. Catal. p. 8" Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 30: nov. g. Uvularear. (Melanthium junceum Ker.)
= Meliglossum Schltd.

Diplachne*) Palis. 1812. Agrost. p. 80. t. 16. f. 9: nov. g. Graminear. (Festuca fascicularis Lam.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 36. 614. n. 314. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 351. n. 350; 1830. Gen. I. p. 75. n. 365. — Link 1829. Hdb. I. p. 62.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 29.

Link 1821. En. I. p. 89: g. Graminum.

Link 1827. Hort. I. p. 154: g. Festucacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1002; 1830. Fl. exc. p. 41. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 559.

Koch 1837. Syn. p. 808. Ed. II. p. 934: sect. Moliniae.

Meisn. 1843. Gen. p. 421 (322): g. Chloridear. — Par. Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 159. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163.
= Leptochloa Palis.?

Diplachne R. Brown mss.
Verticordia DC.

Diplachyrium**) Nees 1828. Flora I. p. 301: g. Graminear.

Diplachyrium Nees cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 986: g. Saccharinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31.

Diplacium „Presl" Endl. Ench. p. 36: vid. *Diplazium Presl.*

Diplacrum R. Brown 1810. Prodr. I. p. 240. Ed. Nees p. 96: nov. g. Cyperacear., Sceleriae proximum. *(D. caricinum.)*

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153: g. Sclerinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 133.

Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 18): g. Scleriar.

Agdh. 1823. Aphor. p. 141: g. Caricear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 120.

Spreng. 1826. Syst. III. p. 776. n. 3070; 1831. Gen. II. p. 683. n. 3445: g. Cyperear.? *(Monoec. Androgyn.)*

Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1077: g. Scleriacear.

Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 159. t. 26: g. Sclerinear. — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 360. — Steud. 1855. Glum. II. p. 180. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 345.

Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Caricinar.

Nees 1834. Linnaea IX. p. 304: g. Sclerear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 963. p. 112; 1841. Ench. p. 63. — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1442. — Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316.) — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 49.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Sclerear.

Diplacus*) Nuttall 1838 in Jard. Ann. nat. hist. I. p. 137 *(Curt. Bot. Magaz. n. 3655):* nov. g. Personatar. (Mimulus glutinosus W.)

Endl. 1839. Gen. n. 3934. p. 681; 1841. Ench. p. 339: g. Gratiolear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Meisn. 1840. Gen. p. 311 *(221).* — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4617. *(genuinar.)* — Brongn. 1843. En. genr. p. 60. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 49.

Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 368; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Eugratiolear.

Dipladenia A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 481: nov. g. Echitear. Sect.: Eudipladenia, Micradenia.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Diplandra Bertero 1830. Sillim. Amer. journ. XX *(Linnaea VII. Litt. p. 43):* nov. g. Najadum. *(D. Potamogeton.)*
= Elodea Rich. *(Gay, Caspary.)*

Diplandra Hook. & Arnott 1837. Beech. voy. Bot. p. 291. t. 60.

Endl. 1840. Gen. n. 6128. p. 1194; 1841. Ench. p. 638: g. Lopeziear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6581. — Meisn. 1843. Comm. p. 355. — Walp. 1846. Rep. V. p. 670. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 49.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Circear.

---

*) „διπλόος, divisim; ἄχνη, palea".
**) ἄχυρον, palea.

*) δις, bis; πλακοῦς, placenta.

Diplanthera Gleditsch 1764. Syst. p. 154. n. 635: g. Petalostemonum diantherar.
= Dianthera Gron.

Diplanthera „Banks & Sol. mss." R. Brown 1810. Prodr. I. p. 448. Ed. Nees p. 304: nov. g. Solaneis Scrophularineisque aff. (*D. tetraphylla.*) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 7. 163. n. 442.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 301: g. Solanear.?
Spreng. 1825. Syst. II. p. 843. n. 2250: g. Personatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3197: g. Antirrhinear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 617: g. Scrophularinear.?
Endl. 1839. Gen. n. 3907. p. 676; 1841. Ench. p. 338: g. Salpiglossidear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Meisn. 1840. Gen. p. 307 (218)? — Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 500. — Walp. 1845. Rep. III. p. 240. 961. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 50.
Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4657: g. Brunsfelsiear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 301; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Chelonear.

Diplanthera Petit-Thouars 1809. Nov. gen. Madag. n. 7 in Römer Collect. bot. p. 196: nov. g. Naiadum.
Rchb. 1828. Consp. p. 77. n. 1669: g. Ceratophyllear.?
Meisn. 1838. Gen. p. 122 (88): g. Podostemear.?
Steinh. 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 98. t. 4: g. dioicum, flore foemineo ignoto.
= Halodule Endl.

Diplarche*) Hook. f. & Thoms. 1854. Kew gard. misc. VI. p. 382. t. 11: nov. g. Rhodorear., Loiseleuriae aff. (*D. multiflora et pauciflora.*) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 444.
Klotzsch 1857. Ber. Berl. Ak. p. 15: g. Diplarcheacear.

Diplarcheaceae Klotzsch 1857. Monatsber. Berl. Ak. p. 15: ordo novus Bicornium. Gen.: Diplarche.

Diplarhena Agardh vid. *Diplarrhena Labill.*

Diplaria Rafin. mss.
= Cassandra Don.

Diplarinus Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 106: nov. g. pro Scirpis diandris propositum.
Endl. 1837. Gen. p. 119 (*Diplarrhinus*); 1841. Ench. p. 64: g. Cyperacear. dubium.

Diplarrhena Labill. 1798. Voy. I. p. 275. t. 15 (Ed. germ. 1801. I. p. 129); 1806. Nov. Holl. II. p. 117: nov. g. Iridear., Iridi et Moraeae aff. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 304. Ed. Nees p. 160. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 259; 1825. Syst. I. p. 168. n. 173; 1830. Gen. I. p. 27. n. 118. — Agdh. 1823. Aphor. p. 172 (*Diplarhena*). — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 128. — Endl. 1837. Gen. n. 1225. p. 166; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 102. — Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1554. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293).
Schult. 1822. Mant. p. 250. 303: g. Triandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1189: g. Gladiolear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 4.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 50: g. Colletostemonum.

Diplarrhinus Endl. vid. *Diplarinus Rafin.*

Diplasia*) Rich. 1805 in Pers. Ench. I. p. 70. n. 129: nov. g. Triandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 36.
Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. p. 26 et Schult. Mant. II. p. 3): g. Scirpear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 169. n. 1404: g. Cyperacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1126: g. Fuirenear.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 288; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 69: g. Hypolytrear. — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 273. — Endl. 1837. Gen. n. 989. p. 116; 1841. Ench. p. 64. — Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1483. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — Steud. 1855. Glum. II. p. 133.

Diplasium Wittst. vid. *Diplazium Swartz.*

Diplaspis Hook. f. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 468: nov. g. Mulinear. (*D. Hydrocotyle.*) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 341. — Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 3. n. $4377/_1$. — Klatt 1858. Linnaea XXIX. p. 711 (*Displaspis*).

Diplatherum Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 89: sect. Pogonatheri.

Diplax**) „Soland. mss." Bennett 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 11.
Endl. 1841. Spl. I. n. $738/_1$. p. 1353; 1841. Ench. p. 56: g. Oryzear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1260. — Meisn. 1843. Gen. p. 414 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 158. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 8.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 288: g. Graminear.

Diplazieae Presl 1836. Pterid. p. 111: sect. Aspleniacear. Gen.: Diplazium, Anisogonium, Digrammaria, Oxygonium.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 37. 212: trib. Cathetogyratar. Gen.: Diplazium, Didymochlaena, Digrammaria, Callipteris, Pteriglyphis.

Diplazites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 273: nov. g. Pecopteridum. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 73; 1846. Chlor. prot. p. XLIII.
Synon. Desmophlebis Brongn.

*) ἀρχή, initium, origo. (?)

*) διπλάσιος, duplex.
**) δίπλαξ, laena duplex.

Diplazium*) Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 4. 61: nov. g. Filicum. (annulatar.) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 302. — Par. Swartz 1806. Syn. Fil. p. 91. (gyratar.) — Willd. 1810. Sp. V. p. 351. n. 1969. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 68. n. 3254; 1831. Gen. II. p. 722. n. 3647. (verar.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 279.

Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 28: sect. Aspleni.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 29: g. Gyrator.

Agdh. 1822. Aphor. p. 117: g. Polypodiacear. — Par. Kaulf. 1824. En. Fil. p. 182. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 49. — D. Don 1825. Nepal. p. 12. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 189. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.) — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 72. — Brongn. 1843. En. genr. p. 4. — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 288 (*Diplasium*).

Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 322: g. Aspleniear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 433 (334). — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 282.

Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 703: g. Asplenioidear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.

Endl. 1836. Gen. n. 636. p. 62; 1841. Spl. I. p. 1349; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. Sect. (1841): Eudiplazium, Anisogonium, Digrammaria, Oxygonium. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1023. Sect. eaed. (Diplazium loco Eudiplazii.)

Link 1841. Fil. h. Berol. p. 83: g. Aspleniacear.

Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 74: sect. Asplenii.

Synon. Callipteris Bory.

Diplazium Presl 1836. Pterid. p. 111: g. restrict. Diplaziear. — Par. Fée 1852. Gen. Fil. p. 212. Sect.: Callipteridastrum, Eudiplazium.

J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 407; 1842. ibid. IV. p. 172: g. Aspleniear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. (*Anisogonium* et *Digrammaria Presl.*)

Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1023. 1: sect. Diplazii.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.

Synon. Eudiplazium Endl.

*Diplecolobeae***) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 246; 1821. Syst. II. p. 154. 676; 1824. Prodr. I. p. 230: subordo Cruciferar. Tribus: Heliophileae, Subularieae, Brachycarpeae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 264. Trib. eaed. — Meisn. 1837. Gen. p. 9. Tribus: Heliophileae, Subularieae, Senebiereae. — Endl. 1839. Gen. p. 887; 1841. Ench. p. 451. Trib. ut Meisn.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 335: subordo Brassicacear. Trib.: Senebieridae, Subularidae, Heliophilidae, Schizopetalidae.

*) „διπλάζω, geminus sum."
**) πλέκω, verto, texo.

Diplecosia G. Don vid. *Diplycosia Blume.*

Diplecthrum Petit-Thouars . . . . Orchid. t. 21. 22: nov. g. Orchidear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 508. n. 1979. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 303.

= Satyrium Swartz.

Diplectria Blume 1831. Flora II. p. 501: sect. Dissochaetae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 783. — Endl. 1840. Gen. n. 6246 *b.* p. 1219; 1841. Ench. p. 647. — Walp. 1843. Rep. II. p. 145.

Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6755: g. Miconiear.

Diplectrum Petit-Thouars (ex Endl. Gen. p. 211): vid. *Diplecthrum.*

Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. (1815.) p. 287: g. Orchidear. (Satyrium cucullatum Sw.)

Ritg. 1831. Marb. II. p. 126: g. Ceropagar.

Satyrium Swartz.

Diplerisma Planchon 1848. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. I. p. 461: nov. g. Melianthear. (Melianthus minor L.)

Diplesthes*) Harvey 1842. Lond. journ. bot. I. p. 18: nov. g. Hippocrateacear., Salaciae proximum (ab Hochst. Flora 1844 ad Salaciam reductum). — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 347. — Endl. 1843. Spl. III. p. 97. n. $5702/_1$. *Cf.* Walp. 1846. Rep. V. p. 147. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 585.

Diplicosia „Blume" Endl. in synon. Gantierae: vid. *Diplycosia Blume.*

Diplocalymma Spreng. 1822. Neue Entd. III. p. 30; 1830. Gen. I. p. 161. n. 813: nov. g. Convolvulear. — Par. (?) Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3013. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 568. 715.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 506. 622. n. 659: g. Pentandr. Monogyn.

Bartl. 1830. Ord. p. 192: g. Convolvulacear. — Par. Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 462 (*Diplocalymna*)? — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 632 (*Diplocalymna*)?

= Thunbergia Linn.

Diplocalymna Choisy, Lindl. vid. *praeced.*

Diplocalyx Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 576 (Bot. Bemerk. p. 146): nov. g. Gesneriacear.

Walp. 1847. Rep. VI. p. 738: g. Besleriear.

Diplocalyx A. Rich. 1850. Pl. vasc. Cub. II. p. 81. t. 54: nov. g. Sapotear. (D. chrysophylloides.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 476.

= Schöpfia Schreb.? (Planch.)

Diplocarpus Berendt 1836. Preuss. Prov. Bl. Jun. p. 623.

= Pitys Endl. pt.

Diplocea Rafin. 1819. Sillim. Amer. journ. I. p. 252; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 262: nov. g. Graminear. (Aira purpurea Walt.) *Cf.* Flora 1824. I. p. 130 et Steud. Nom. I. p. 515 (*Diplocoea*).

Endl. 1837. Gen. n. 872 *a.* p. 97; 1841. Ench. p. 59: sect. Uralepidis.

Synon. Triodia HBK.

*) διπλόος, duplex; ἕω, ἕσω, vestio.

Diplocentrum Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. n. 1522; 1833. Orchid. p. 218: nov. g. Vandear. (D. recurvum.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1474. p. 204; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2080. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 51.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Diploceras Meisn. 1843. Gen. pl. vasc. Comm. p. 340: g. Arabidear.
= Parolinia Webb.

Diplochaeta Wittst. vid. *seq.*

Diplochaete Nees 1834. Linnaea IX. p. 296: nov. g. Rhynchosporear.
Endl. 1837. Gen. n. 966 *c d.* p. 113; 1841. Ench. p. 63: subsect. Haplostylidis.
Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1455. 2 *d:* subsect. Sclerochaetii.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Rhynchosporidar.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 288 (*Diplochaeta*): g. Cyperacear.

Diplochilos Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. n. 1499: nov. g. Ophrydear. (D. hirsutum et longifolium.)
= Diplomeris Don.

Diplochilus Steud. Nom. I. p. 515: vid. *praeced.*

Diplochita DC. 1828. Prodr. III. p. 176: g. Miconiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 786. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 258. — Meisn. 1838. Gen. p. 113 (80). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1461.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4635: g. Blakeacear.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 141. t. 274: g. Melastomacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 330: g. Melastomear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 117: sect. Miconiae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 706.
Synon. Fothergilla Aubl.; Leonicenia Scop.; Chitonia D. Don; Diplochiton Spreng.

Diplochiton Spreng. 1830. Gen. I. p. 340. n. 1720: g. Melastomear. (Nomen emend.)
Endl. 1840. Gen. n. 6250. p. 1219; 1841. Ench. p. 647: g. Miconiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6759. — Walp. 1843. Rep. II. p. 145. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 51.
Diplochita DC.

Diplochlaena Spreng., Dietr. vid. *Diplolaena R. Brown.*

Diplochlamydeae Meisn. 1843. Gen. pl. vasc. p. 437: subdiv. Dicotyledonear. Classes: Polycarpicae, Nymphaeoideae, Rhoeadeae, Polygalinae, Parietales, Caryophyllinae, Columniferae, Lamprophyllae, Malpighinae, Hesperides, Gruinales, Rutaceae, Terebinthaceae, Leguminosae, Rosiflorae, Calycanthemae, Corniculatae, Peponiferae, Frangulaceae, Umbelliflorae,

Diplochlamydeae Meisn. cont.
Rubiacinae, Aggregatae, Campanulinae, Ericineae, Ligustrinae, Plantagoideae, Petalanthae, Styracinae, Contortae, Tubiflorae, Labiatiflorae.

Diplochonia Steud. vid. *seq.*

Diplochonium*) Fenzl 1839. Nov. stirp. Dec. VII. p. 65: nov. g. Portulacear. — Par. Steud. 1841. Nom. I. p. 515 (*Diplochonia*).
Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 291: g. Sesuviear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5169. p. 948; 1841. Ench. p. 501. — Rchb. 1841. Nom. p. 163. n. 6339.
Meisn. 1843. Comm. p. 357: g. Portulacellar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 527: g. Sesuvear.

Diplocladium Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 98: nov. g. Dendrinor. (D. major et minor.)

Diploclinium Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 319: nov. g. Begoniacear. (pro speciebus placentis fissis propositum.) — Par. Wight 1852. Icon. pl. Ind. V. p. 9. t. 1814—17. (restrict.) — Klotzsch 1855. Begon. p. 190. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 684 (includens Petermanniam Klotzsch.) *Cf.* Hassk. 1858. Ht. Bogor. I. p. 326.

Diploclisia Miers 1851. Ann. and Mag. 2d ser. VII. p. 37. 42: nov. g. Platygonear. (Cocculus macrocarpus W. & A.)
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 191 Cocculo iterum injungunt.

Diplocoea „Raf." Rchb. (Consp. p. 53 in synon. Uralepidis), Steud. vid. *Diplocea Rafin.*

Diplocoma Don 1828 in Sweet Brit. fl. gard. I. t. 246.
Less. 1832. Syn. p. 162: g. Asterear.
= Heterotheca Cass.

Diplocomium Weber & Mohr 1807. Taschenb. p. 374: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 305. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 73. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 226.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 38: g. Mitrocarpor.
Brid. 1817. Musc. rec. Suppl. III. p. 100: g. Diploperistomator.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 122: g. Peristomor. acrocarpor.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 65: g. Acrocarpor. peristomor. (p. XLV Meesiar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 664: g. Funariaceor.
Endl. 1836. Gen. n. 558. p. 54; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 936: g. Calyptrobryor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: g. Meesiear.
Meesia Hedw.

Diploconchium Schauer 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 428: nov. g. Pleurothallear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 60. n. 1347/1. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.

*) χωνίον, catinus.

Diploconchium Schauer cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Dendrobidar.
Diplocrater Benth. 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 367: nov. g. Olacinear. (D. acuminatus.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 352: g. Olacacinear.
Diplocyclos Endl. 1833. Prodr. fl. Norf. p. 68: subg. Bryoniae. (Br. affinis.) — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 11. 43.
Diplocystis Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 40: g. Haematococcear. (*Polycystis Kütz.*) *Cf.* Flora 1849. p. 611.
Diploderma Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 44: nov. g. Gastromycor. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 305 et Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 21.
Nees 1816. Syst. p. 132; 1817. Überbl. p. 34: g. Dermatogasterum.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 15: g. Lycoperdor.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 560: g. Lycoperdinear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 136: g. Sclerodermeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 207.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Link 1833. Hdb. III. p. 399.
Endl. 1836. Gen. n. 335. p. 28; 1841. Ench. p. 17: g. Lycoperdeor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 398.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 24; 1842. Mycol. p. 97: g. Sclerodermacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Trichogastrum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 441: g. Diplodermeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505; VIII. p. 488: g. Geastreor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 253: g. Lycoperdaceor.
Synon. Sphaerangium Lév.?
Diplodermei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 440: div. Lycoperdacear. Gen.: Batarrea, Husseia, Tulasnodea, Mitremyces, Bromeia, Geaster, Trichaster, Diploderma.
Diplodia „Fries in litt." Montagne (1834. Ann. sc. nat. 2e sér. t. 13. f. 4) 1842. Hist. Cub. Pl. cell. p. 331; 1849 in Orb. Dict. V. p. 51: nov. g. Pyrenomycetum. (Dothidea atra Fries?)
Lév. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 290; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeropsideor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 416 (antea *Diplodina Fries*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Sphaeronemeor.
Desmaz. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 340. Char. emend.
Math. 1853. Belg. II. p. 206: g. Sphaeriacear.
Diplodictyum C. F. Braun 1843. Beitr. z. Urgesch. p. 10; 1845 in Münst. Beitr. VI. p. 13: nov. g. Filicum foss. incertae sedis. (D. obtusilobum.)
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 91; 1846. Chlor. prot. p. XLVII: g. Pecopteridum.
Diplodictyum C. F. Braun cont.
F. Braun 1847. Flora I. p. 83: g. Polypodiacear. foss.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 82: g. Filicum foss.
Diplodina Fries mss. olim vid. *Diplodia Fries*.
Diplodina Westendorp 1857. Bull. Ac. Brux. 2e sér. II. p. 562: g. Sporocadear. (Diplodia sect. Hyalospermae Desmaz.)
Diplodiscus Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 235: nov. g. plant. (D. paniculatus.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VII. p. 442. (g. Brownlowiear.)
Diplodium Swartz 1829. Adnot. bot. p. 50. = Eriochilus R. Brown.
Diplodon DC. 1828. Prodr. III. p. 94 (a): nomen emendat. pro *Diplusodonte Pohl* propositum.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 391. n. 1963: g. Salicariar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 15.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 66. t. 192.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 52: g. Lagerströmiear.
= Diplusodon Pohl.
Diplodon Angström 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 89: sect. Spachni. (S. luteum, rubrum, vasculosum, ampullaceum, sphaericum.)
Diplodonta Karsten 1856. Linnaea XXVIII. p. 439: nov. g. Osbeckiear. (D. setosa.)
Diplofractum Walp. vid. *Diplophractum Desf.*
Diplogenaea A. Juss. vid. *seq.*
Diplogenea Lindl. 1828 in Brand. quart. journ. p. 122: nov. g. Melastomacear., Conostegiae proximum. (D. viscoides.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 123.
D. Don 1832. Gen. syst. II. p. 786: g. Miconiear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 112 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6249. p. 1219; 1841. Ench. p. 647. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6758. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 54. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 75 (*Diplogenaea*).
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 297: g. Dissochaetear.
Diploglossum Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 269 (176): nov. g. Euasclepiear. (Cynanchum auriculatum et Roylii W. & A.)
= Endotropis Endl.? (Decne in DC. Pr. VIII. p. 546.)
Diplogon Rafin. (1818. New-York monthl. Mag.) 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 260: nov. g. plantar.
= Chrysopsis Nutt.
Diplogon Poir. vid. *Diplopogon R. Brown.*
Diploicia Massalongo 1853. Mem. lichen. p. 86: nov. g. Lichenum. (L. muscorum, etc.)
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 174: g. Psorinar.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 339: sect. Lecideae.

Diplolaena R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 546 (Verm. bot. Schr. I. p. 36): nov. g. Diosmear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 306. — DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140; 1824. Pr. I. p. 719. — Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 183. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 479; 1849 in Orb. Dict. V. p. 54. — Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5172; 1837. Hdb. p. 282. (genuinar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 790. — Meisn. 1837. Gen. p. 60 (44). — Bartl. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 173.

Desfont. 1817. Mém. Mus. III. p. 449: g. Rutaceis aff.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 357. n. 1679; 1830. Gen. I. p. 369. n. 1864 *(Diplochlaena)*: g. Rutacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1516 *(Diplochlaena)*.

Bartl. 1830. Ord. p. 388: g. Boroniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 322. — Endl. 1840. Gen. n. 6011. p. 1156; 1841. Ench. p. 612. — Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7522. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.

Synon. Ventenatum Lesch.

Diplolaena Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 82: g. Diplolaenear. (antea *Dilaena*). — Par. Nees 1838. Eur. Leberm. III. p. 335; IV. p. XXVII. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 54 (VI. p. 549 g. Frondosar.)

= Pallavicinius Gray.

Diplolaeneae Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 82: subtrib. Blasiacear. Gen.: Diplolaena. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 55.

Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 414; 1838. Eur. Leberm. III. p. 333; 1838. ibid. IV. p. XXVII: gradus 2 Frondosar. Gen.: Diplolaena.

= Diplomitrieae Endl.

Diplolepis R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 42 (Verm. bot. Schr. II. p. 379): nov. g. Asclepiadear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 484. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XII. 95.

Hook. & Arn. 1834. Journ. bot. I. p. 290.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 149: g. Asclepiear.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear.

= Sonninia Rchb. (Diplolepis genus Zoolog.)

Diplolobium Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 84: sect. Mirbeliae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6448 *b*. p. 1259; 1841. Ench. p. 667.

Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5943: g. Mirbeliear.

Diplolobus Duchartre 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 32: sect. Aristolochiae. (Aristolochiae verae.)

Diploloma Schrenk 1844. Bull. Ac. Pet. II. p. 195: nov. g. Cynoglossear., Mattiae et Solenantho proximum. — Par. A. DC. 1846. Pr. X. p. 166. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 171.

Diplolophium Turczan. 1847. Bull. soc. Mosc. XX. p. 173 (Bot. Zeit. 1848. p. 437 et Flora 1848. p. 318): nov. g. Umbelliferar. (Cachrys abyssinica Hochst.)

Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 356: g. Smyrnear.

Endl. 1850. Spl. V. p. 15. n. $4529/_1$: g. Eusmyrnear.

Diplomeria Benth. 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 14: sect. Ptychomeriae.

Diplomeris*) D. Don 1825. Pr. fl. Nepal. p. 26: nov. g. Orchidear. (D. pulchella.)

Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529); 1835. Orchid. p. 330: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1465; 1841. Nom. p. 50. n. 1871. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1528. p. 210; 1841. Ench. p. 112. — Meisn. 1842. Gen. p. 380 (285). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 55.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Gymnadenidar.

Synon. Diplochilos Lindl.; Paragnathis Spreng.; Diplochilus Steud.

Diplomitridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 59: trib. Jungermannear. Gen.: Hollia.

Diplomitrieae Endl. 1841. Gen. Suppl. I. p. 1339; 1841. Ench. p. 27: subtrib. Jungermanniacear. frondosar. Gen.: Blytia. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 23. Gen.: Diplomitrium. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 16. Gen.: Blyttia.

Nees 1846. Syn. Hepat. p. 474: subtrib. Jungermanniear. frondosar. Gen. unicum: Blyttia (serius ibid. p. 785: Steetzia).

Diplomitrion Corda 1829 in Opiz Beitr. I; 1830 in Sturm Jungerm. p. 6. 54: g. Jungermanniacear. (Jung. Lyellii Hook.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 80.

= Pallavicinius Gray.

Diplomitrium Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 102: g. Frondosar.

Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 830: g. Diplomitriear.

= praeced.

Diplomorpha Meisn. 1841. Regensb. Denkschr. III. p. 289 not.

C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. p. 356: g. Daphnear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.

Endl. 1847. Spl. IV. p. 66. n. $2106/_2$: g. Euthymelear.

Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 546: sect. Wikströmiae?

Diploneis Ehrenb. 1844. Ber. Ak. Berl. p. 84: sect. Pinnulariae.

= Naviculae Bory sp.

Diplonema**) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 42: nov. g. Ebenacear. (Royena polyandra L.)

= Euclea Linn. f.

*) μερίς, pars: ob flores appendice duplici instructos.
**) νῆμα, filum.

Diplonema De Notaris 1846. Prosp. fl. Ligust. (Bot. Zeit. 1847. p. 653): nov. g. Algar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Confervear.

Diplonyx Rafin. 1817. Fl. Ludov.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 279. n. 2580; 1831. Gen. II. p. 589. n. 2902: g. Leguminosar.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 219: g. Clitoriar.
Meisn. 1837. Gen. p. 87 (62): g. Clitoriear.? obscurum.
= Indigofera Linn.?

Diplopappeae DC. 1836. Prodr. V. p. 271: subdiv. Asterear. Gen.: Olearia, Diplostephium, Callistephus, Diplopappus, Rhinactina, Noticastrum, Distasis. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 376; 1841. Ench. p. 234. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 185 (126). Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 85: div. Asterinar. Gen. ead. et Asterosperma.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709: subtrib. Asteroidear. Gen. ut DC.

Diplopappus Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 137; 1819. Dict. v. 13. p. 308: nov. g. Asterear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 239. — Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 20. (includens Diplostephium Kth. et Döllingeriam Nees.) — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 45.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 460; 1830. v. 60. p. 581: g. Solidaginear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2528.
Gaud. 1829. Helv. V. p. 11. 314: g. Radiatar.
DC. 1836. Pr. V. p. 275: g. Diplopappear. Sect.: Pedunculares, Calimeridei, Amelloidei. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2321. p. 376; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 185 (126). — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3274. Sect.: Callimeridia, Amellia, Diplopappus. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 484. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Nutt. 1841. Am. phil. trans. n. ser. VII. p. 304: g. Asterinear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 56: g. Asteroidear.
Synon. Asterosperma Less.?

Diplopappus Lessing 1831. Linnaea VI. p. 110: g. Asterear. (Conyza punctata W., etc.)
= Haplopappus Endl.

Diplopappus Lessing 1832. Syn. Compos. p. 163: g. Asterear.
= Olearia Mönch, Callistephus Cass., Diplopappus Cass.

Diplopappus Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 180: g. Euasterear., injuncto Eudiplostephio a Candolleano discrepans. Sect.: Ianthe, Triplopappus.
Walp. 1843. Rep. II. p. 577: g. Diplopappear. Sect. ut Torr. & Gray et Pedunculares, Calimeridei.

Diplopeltis Endl. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 13: nov. g. Sapindacear. (D. Hügelii.) — Par. Lindl. 1839. Bot. Regist. XXV. t. 69. — Miquel 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 223.
Rchb. 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 198. n. 7582: g. Dodonaeear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 56.
Endl. 1840. Gen. n. 5625. p. 1072; 1841. Ench. p. 561: g. Dodonaeacear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 346.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385: g. Dodonear.

Diploperistomati Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 142: class. 4 Muscor. Gen.: Neckera, Orthotrichum, Leskia, Hypnum, Bryum, Mnium, Kölreutera; Webera, Bartramia, Pohlia, Buxbaumia, Timmia; Fontinalis, Meesia. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 310.

Diploperistomi Hübener 1833. Musc. germ. p. 551: series 2 Pleurocarpor. Gen.: Leptohymenium, Anomodon, Anacamptodon, Neckera, Leskea, Hookeria, Climacium, Isothecium, Hypnum, Fontinalis.

Diplopetalon Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 146; 1830. Gen. I. p. 311. n. 1593: g. Sapindear. (*Dimereza Labill.*)
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1279: g. Sapindacear.
= Cupania Plum.

Diplopetalum „Spreng." Rchb. Consp. p. 200 in synon. Dimerezae: vid. *praeced.*

Diplophacelus*) Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 84: nov. g. Rhachiopteridear. (D. arboreus.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 86: g. Rachiopteridear.

Diplophractum**) Desfont. 1819. Mém. Mus. V. p. 34: nov. g. Icosandr. Monogyn. *Cf.* Spreng. neue Entd. II. p. 293.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 311: g. Tiliacear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 514. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 578. n. 1900; 1830. Gen. I. p. 428. n. 2124. — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 554. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 36. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 242.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 334 in adnot. (Kunth Malv. p. 15.)
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5450; 1841. Nom. p. 209. n. 7957: g. Tiliear. (genuinar.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 37 (28).
Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Tiliariar. genuinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5377. p. 1009; 1841. Ench. p. 523: g. Grewiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 362 (*Diplofractum*). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 56.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.

Diplophragma***) R. Brown 1830. Suppl. p. 37 (Verm. bot. Schr. V. p. 113): sect. Dryandrae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2158 *a.* p. 343; 1841. Ench. p. 216. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 599; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 480.

*) φάκελος, fasciculus.
**) φρακτός, cinctus, tectus.
***) φράγμα, sepimentum.

Diplophragma Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 406: sect. Hedyotidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3240 *a*. p. 549; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Comm. p. 114. — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2874. 1. — Walp. 1843. Rep. II. p. 491. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 177.
Meisn. 1838. Gen. p. 160: g. Hedyotear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear.

Diplophylleia Rchb. vid. *Diplophyllum Dumort.*

Diplophyllum Lehm. 1814. Berl. Mag. VIII. 4. p. 2: nov. g. ex typo Veronicae cristae galli Stev.
Link 1821. En. I. p. 27: sect. Veronicae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3979 *a*. p. 688; 1841. Ench. p. 340. — Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4473. 2. — Walp. 1845. Rep. III. p. 335.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 76. n. 101; 1830. Gen. I. p. 22. n. 90: g. Personatar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 63.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3062 *b*: sect. Cochlidiospermae.
Link 1829. Hdb. I. p. 530: g. Rhinanthacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Veronicear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 579. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270.

Diplophyllum Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 44: sect. Jungermanniae. (Jung. albicans etc.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 809. 1 (*Diplophylleia*).
Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 15: g. Aplозiear. = Jungermanniae nemorosae. (Endl. Spl. I. p. 1344.)

Diplopogon R. Brown 1810. Prodr. I. p. 176. Ed. Nees p. 32: nov. g. Graminear. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 311. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 125 (*Dipogonia*). — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 51. 807. n. 374. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 306 (*Diplogon*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 250. n. 256; 1830. Gen. I. p. 54. n. 264.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 158: g. Avenacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 149.
Trin. 1820. Fund. p. 105: g. Triandr. Digyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 924: g. Pennisetear.
Bartl. 1830. Ord. p. 30: g. Panicear.
Kunth 1830. Gram. p. 83; 1833. Agrost. p. 253: g. Pappophorear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 828. p. 91; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 136. 327. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1302. — Meisn. 1843. Gen. p. 421 (322). — Nees 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 102. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 162. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 198.

*Diplopogoni**) Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 29: sect. 4 Muscor. Gen.: Buxbaumia, Fontinalis; Bartramia, Orthopyxis, Mnium, Amblyodum, Cyathophorum, Hypnum; Neckera; Racopilum, Pilotrichum, Orthotrichum. — Simil. Palis. 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 462. Gen.: Amblyodum, Bartramia, Ortopyxis, Mnium, Hypnum, Cyathophorum, Leskea, Climacium, Timmia, Fontinalis; Neckera, Racopilum, Pilotricum, Orthotrichum.

Diploprion*) Viviani 1824. Fl. libyc. sp. p. 48: nov. g. Medicagini aff. *Cf.* Flora 1824. II. p. 636.
DC. 1825. Pr. II. p. 523: g. Leguminosar. minus notum. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 467.
Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3886: g. Astragalear.?
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 269: g. Trifoliear.?
= Spirocarpos Ser.? (Endl. Gen. p. 1267.)

Diplopteris Griseb. vid. *seq.*

Diplopterys A. Juss. 1837 in Deless. Icon. III. p. 20. t. 33: nov. g. Malpighiacear. (Triopteris pauciflora? Mey.)
A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 256; 1843. Arch. Mus. III. p. 577. t. 20; 1849 in Orb. Dict. V. p. 57: g. Hirear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390.
Endl. 1840. Gen. n. 5567. p. 1059; 1841. Ench. p. 557: g. Pleuropterygiar.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7848: g. Triopteridear.
Meisn. 1843. Comm. p. 346: g. Banisteriear.
Walp. 1846. Rep. V. p. 339: g. Hiraeear.
Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 101 (*Diplopteris*): g. Hiraeacear.

Diplorrhiza Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 46; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Satyrium viride L.)
= Coeloglossum Hartm.

Diplosantherae Gmel. 1769. Fl. Sibir. IV. p. 118: class. XVII. plant. Gen.: Arbutus, Andromeda, Azalea, Chamaerhododendros, Ledum, Pyrola, Erica, Bryanthus, Dianthus, Lychnis, Alsine, Saxifraga, Sedum, Crassula, Rhodiola, Oxalis, Lythrum, Mitella, Zygophyllum, Paris, Ruta, Peganum, Dictamnus, Monotropa.

Diplosastera Tausch 1823. Hort. Canal. fasc. I: nov. g. Helianthear. (D. tinctoria c. ic.)
Calliopsis Rchb.

Diplosastra Wittst. in Etym. Handw. p. 291: vid. *praeced.*

Diploscyphus Liebm. 1850. Mexic. Halvgräs. p. 74: nov. g. Sclerinear. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 697. — Steud. 1855. Glum. II. p. 180.

Diplosiphon Decne 1844 in Jacquem. voy. IV. p. 166.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 770: g. Hydrocharidear. (D. oryzetorum Decne.)
Caspary 1858. Ann. wiss. Bot. I. 3; 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 385: g. Vallisneriear.

*) διπλόος, duplex; πώγων, barba.

*) πρίων, serra.

Diplospora DC. 1830. Prodr. IV. p. 477: nov. g. Coffeear. (Canthium dubium Lindl.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 565. — Endl. 1838. Gen. n 3176. p. 537; 1841. Ench. p. 272. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 57.
Meisn. 1838. Gen. p. 168 (118): g. Psychotriacear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376: g. Coffeacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2826: g. Psychotriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 237: g. Diplosporear. Subgen.: Dicratera.

Diplosporeae Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 237: subtrib. Gardeniear. Gen.: Jackia, Diplospora.

Diplosporium Link 1824. Spec. I. p. 64: nov. g. Hyphomycetum. (Botrytis didyma Kunze.) — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 302. (synsporor.)
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Aspergillacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 148: g. Aspergillinor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 10. 51. t. 2. f. 17; 1842. Mycol. p. 37: g. Helminthosporiacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 115.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 38: g. Torulaceor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cephalosporeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 98: g. Dendrinor.
= Trichothecium Link. (Fries.)

Diplostachium Palis. vid. *Diplostachyum Palis.*

Diplostachys Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 37. 56: sect. Panici. (P. paspaliforme Presl.)

Diplostachyum Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 107 (*Diplostachium* p. 104): nov. g. Lycopodior. (Lyc. helveticum L.) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 313.
Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1676 *c:* sect. Lycopodii.
= Stachygynandri Brongn. pars.

Diplostegium*) D. Don 1823. Mem. Wern. Soc. IV. 2. p. 296: nov. g. Melastomacear. (D. canescens.)
DC. 1828. Pr. III. p. 152: g. Osbeckiar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 765.
Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4601; 1841. Nom. p. 173. n. 6723: g. Osbeckiear. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 206. — Meisn. 1838. Gen. p. 116 (82). — Endl. 1840. Gen. n. 6215. p. 1213; 1841. Ench. p. 646. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1376. 1449. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 57.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 338. n. 1709: g. Melastomear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 329.

*) στέγη, tectum: ab calyptra duplici calycis.

Diplostelma*) Rafin. 1836 ex Torr. & Gray Fl. North-Am. II. p. 187.
Chaetopappa DC.

Diplostelma A. Gray 1849. Pl. Fendl. (Mem. Amer. Ac. IV. P. 1) p. 72 adnot. (Flora 1850. II. p. 709): nov. g. Bellio et Chaetopappae aff. (D. bellioides.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 826: g. Belliear.

Diplostemma „Hochst. & Steud. Pl. Schimp. n. 853" DC. 1838. Prodr. VII. 1 p. 75: g. Scolymear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 233 (143). — Endl. 1841. Spl. I. n. 2966/₁. p. 1387; 1841. Ench. p. 249. — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3753. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 5. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 58: g. Cichoracear.
Synon. Arraschkoolia Schultz (ex Endl.), Araschcoolia Schultz (ex Meisn.)

Diplostemma „Neck." DC. Prodr. VII. p. 306 in not.: lege *Diphystema Neck.*

Diplostemon Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 304: subg. Ammanniae. (diplostemoneae DC.) — Par. Blume 1855. Mus. bot. Lugd. II. p. 132.
= Euammanniae Endl. pars.

Diplostemones A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 255; 1843. Arch. Mus. III. p. 258: trib. Malpighiacear. Subtrib.: Pleuropterygieae s. Hireae, Notopterygieae s. Banisterieae, Apterygieae s. Malpighieae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 150. Sect.: Malpighieae, Banisterieae, Hiraeeae.
„A. Juss. mss." Endl. 1840. Gen. p. 1059; 1841. Ench. p. 557: div. Malpighiacear. Subdivis.: Pleuropterygiae, Notopterygiae, Apterygiae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 610: sect. Malpighiacear. Trib. ut antea.

Diplostephieae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 952: subdiv. Asterear. Gen.: Olearia, Diplostephium, Callistephus, Diplopappus, Rhinactina, Noticastrum, Distasis, Polyactidium, Heterochaeta, Therogeron, Simblocline, Phalacroloma, Stenactis, Chaetopappus, Boltonia, Heterotheca, Neja, Chrysopsis, Fresenia, Pithyopsis, Laenecia, Elachothamnus, Webbia, Chroilema.

Diplostephium HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 96: nov. g. Asterear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 403. — Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 462; 1830. v. 60. p. 582. 597. (Archetypar. verar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 45.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 543. n. 2764; 1831. Gen. II. p. 628. n. 3120: g. Radiatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2550: g. Asterinar.
Nees 1833. Aster. p. 186: g. Asterum genuinor.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.
Synon. Amphistephium DC.

*) στέλμα, cingulum.

Diplostephium DC. 1836. Prodr. V. p. 272: g. dilatat. Diplopappear. Sect.: Eudiplostephium, Amphistephium. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2319. p. 376; 1841. Ench. p. 234. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 185 (126). — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3277. Sect. similes. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 58.
= Diplostephium HBK. et Triplopappus Torr. & Gray.

Diplostichum Montagne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 116: nov. g. Muscor. (Pterigynandrum longirostrum Brid.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: g. Mielichhoferiear.
= Eustichia Brid.

Diplostoma Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 178. 181: nov. g. Lycoperdeor. (Tulostoma squamosum.)
= Tulostoma Pers.

Diplostomieae Mathieu 1853. Fl. Belg. II. p. 502: trib. 13 Algar. Gen.: Phycolapathum.
= seq.

Diplostromieae Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 483: fam. Dermatoblastear. Gen.: Diplostromium, Phycolapathum.
Synon. Phycoseridear. Kütz. pars.

Diplostromium*) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phycol. gener. p. 298; 1845. Phycol. germ. p. 246: nov. g. Phycoseridear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 137.
Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 424: g. Punctariear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 483. n. 300: g. Diplostromiear.
Synon. Punctariae Agdh. spec.

Diplostylis Sonder 1850. Linnaea XXIII. p. 113: nov. g. Acalyphear. (Acalypha acuta Thunb., Mercurialis bupleuroides Meisn., etc.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 365.
= Adenocline Turczan.

Diplostylis Karsten & Triana 1856. Linnaea XXVIII. p. 433: nov. g. Tournefortiear. (D. fasciculata.)

Diplotacteae Rchb. 1837. Handb. p. 260; 1841. Nomencl. p. 183: sect. Brassicear. Gen.: Diplotaxis.

Diplotaenia Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 308: nov. g. Peucedanear. (D. cachrydifolia.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 880. — Endl. 1850. Spl. V. p. 11. n. 4480/1.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Diplotaxis**) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 243 (*Dyplotaxis*); 1821. Syst. II. p. 628; 1824. Prodr. I. p. 221: nov. g. Brassicear. Sect. (in Mém. Mus.: Catocarpaea, Anocarpaea, tum): Catocarpum, Anocarpum. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 101. Sect. eaed. — Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4816; 1832. Fl. exc. p. 691. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 252. Sect. ut DC. — Koch 1836. Syn. p. 56. Ed. II. p. 61. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4955. p. 883; 1841. Ench. p. 451. Sect. ut DC. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 220. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 92. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 78. Sect.: Brassicaria, Sisymbriastrum, Erucastrum. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 58. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 218. Sect. ut Gren.
Link 1822. En. II. p. 74: g. Tetradynam. Siliquos.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 914. n. 2327; 1831. Gen. II. p. 523. n. 2578: g. Siliquosar. — Par. Gaud. 1829. Helv. IV. p. 191. 370. — Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Link 1831. Hdb. II. p. 319. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323. (restrict.) — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 264. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 726.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 183. n. 7039: g. Diplotactear. Sect.: Catocarpum, Diplotaxis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Brassicidar.
Synon. Euzomum Spach; Sisymbrii sp. Linn.

Diplotaxis Boissier . . . . Voy. Bot. p. 33: sect. Brassicae. (Diplotaxidis et Moricandiae sp. DC.) *Cf.* Walp. 1842. Rep. I. p. 184.

Diplotegiaceae Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 111: fam. Filicum fossilium. Gen.: Diplotegium.

Diplotegium Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 112: nov. g. Diplotegiacear. (D. Brownianum.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 95: g. Psaroniear.

Diplotheca*) Hochstett. 1846. Flora II. p. 595: nov. g. Leguminosar, Phacae et Astragalo aff.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 234: g. Astragalear.

Diplothemium**) Martius 1824. Palm. fam. p. 20; . . . . Palm. p. 108. t. 75—78: nov. g. Cocoinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1631; 1841. Nom. p. 58. n. 2277. — Endl. 1837. Gen. n. 1774. p. 256; 1841. Ench. p. 136. — Kunth 1841. Enum. III. p. 289. — Meisn. 1842. Gen. p. 358 (267.)
Spreng. 1825. Syst. II. p. 623. n. 1994; 1830. Gen. I. p. 449. n. 2220: g. Palmar. (in Polyandr. Trigyn.) — Par. Voigt 1828. Syll. Ratisb. II. p. 51 (*Diplothenium*). — Bartl. 1830. Ord. p. 65.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 17: g. Cocoinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 63 (*Diplothenium*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Cocoëar.

Diplothenium Voigt, Spach vid. *praeced.*

Diplothria Walp. vid. *seq.*

*) *στρῶμα*, stragulum, stratum.
**) *τάξις*, ordo, series.

*) *θήκη*, loculamentum.
**) *θημών*, acervus, cumulus.

Diplothrix DC. 1836. Prodr. V. p. 611: nov. g. Verbesinear. (D. acerosa et juniperifolia.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2548. p. 414; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 199 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3151. — Walp. 1843. Rep. II. p. 620 *(Diplothria)*. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 105: sect. Zinniae. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 216.

Diplotomma Flotow 1850. Bot. Zeit. p. 380; 1850. Flora p. 533: nov. g. Lecanorinar. (Lecidea canescens.) *Cf.* Krempelhuber in Flora 1853. p. 409.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 218: g. Lecidinar.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 339: sect. Lecideae.
Arnold 1858. Flora p. 475: g. Lecidear.

Diplotrichia J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 10: nov. g. Rivulariear. (D. polyotis.) — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326. (Flora 1843. p. 92.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 13. n. 19. — Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 186; 1849. Sp. Alg. p. 344. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 91. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 59; 1849. ibid. X. p. 52. (?)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Rivularidar.

Diplotropis Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 88: nov. g. Sophorear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6748. p. 1310; 1841. Ench. p. 673. — Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6031. — Walp. 1842. Rep. I. p. 808. — Meisn. 1843. Comm. p. 349. — Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 109. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 59.

Diplousodon Meisn. vid. *Diplusodon Pohl.*

Diploxyleae Corda 1840. Verh. Ges. vat. Mus. Böhm. p. 25; 1845. Fl. d. Vorw. p. 35: fam. plantar. foss. Gen.: Diploxylon.

Diploxylon Corda 1840. Verh. Ges. vat. Mus. Böhm. p. 25. t. 1. f. 1—4; 1845. Fl. d. Vorw. p. 36. t. 10. 11: g. Diploxylear. (D. cycadeoideum.)
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 127; 1846. Chlor. prot. p. LVI: g. Sigillariear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 106.

Diplusodon Pohl 1827. Flora I. p. 150; 1827. Pl. Brasil. I. p. 82. t. 66—81: nov. g. Salicariar. *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 54.
DC. 1828. Pr. III. p. 94 (a): g. Salicariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4564. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 718. — A. St. Hil. 1833. Fl. Bras. III. p. 143; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 332. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 430.
Meisn. 1838. Gen. p. 117 (83: *Diplousodon*): g. Lagerströmiear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6161. p. 1203; 1841. Ench. p. 643. — Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6661.

Diplusodon Pohl cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lagerstromear.
Synon. Diplodon DC.; Dubyaea DC.; Friedlandia Cham.; Nesaeae sp. Kunth.

Diplycosia Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 857: nov. g. Ericear., inter Gaultheriam et Andromedam medium. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1389.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 788 *(Dyplecosia)*. 838 *(Diplecosia)*: g. Andromedear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 591. — Meisn. 1839. Gen. p. 247 (154). — Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4916. — Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 18. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1054.
Synon. Amphicalyx Blume; Gautierae sp. Endl.?

Dipodium R. Brown 1810. Prodr. I. p. 330. Ed. Nees p. 186: nov. g. Orchidear. (Dendrobium punctatum Smith.) — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 313. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 721. n. 2988; 1831. Gen. II. p. 665. n. 3356.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 186; 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1980: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1518; 1841. Nom. p. 53. n. 2046. — Endl. 1837. Gen. n. 1441. p. 201; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 379 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 60.
Bartl. 1830. Ord. p. 57: g. Epidendrear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 125: g. Ceropagar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Brassidar.
Synon. Armodorum Kuhl & Hass.?

Dipogon Liebm. 1854. Ind. hort. ac. Haun. (Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 374): nov. g. Glycinear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 552.

Dipogonia Palis. vid. *Diplopogon R. Brown.*

Diporandra Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 310: subg. Cochlospermi. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 116. — Simil. Endl. 1850. Spl. V. p. 65. n. 5405 *b*.

Diporea Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 347: subsect. Eusepales. (Lysimachia evalvis Wall.)

Diporidium Wendland f. 1825 in Bartl. & Wendl. Beitr. II. p. 24: nov. g. Ochnacear. (Ochna atropurpurea DC., arborea Burch. et ciliata Lam.?) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 66 (47).
Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5186; 1837. Hdb. p. 283: g. Ochnear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 384. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 380.
= Ochnae Schreb. spec. capens.

Diposis*) DC. 1829. Coll. mém. V. p. 33. t. 3. O; 1830. Prodr. IV. p. 81: nov. g. Mulinear. (Hydrocotyle saniculaefolia Lam.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 262. — Tausch 1834. Flora I. p. 345. — Rchb. 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5524. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103).

---

*) δίς, bis; πόσις, sponsus: a floribus 2 lateralibus masculis, medio fertili.

Diposis DC. cont.
— Endl. 1839. Gen. n. 4375. p. 766; 1841. Ench. p. 377. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 934. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 134. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 60.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Mulinidar.
Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 1. n. 4355 *b:* sect. Hydrocotyles.
Synon. Spananthes sp. Spreng.

Dipsacaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 699: ordo Campanalium. Gen.: Morina, Dipsacus, Cephalaria, Knautia, Pterocephalus, Scabiosa.

Dipsaceae Vaillant 1722. Act. Ac. Paris. p. 172: class. plant. Gen. §. 1: Dipsacus, Succisa, Scabiosa, Asterocephalus, Pterocephalus, Diototheca, Valeriana, Valerianoides, Valerianella. §. 2: Antanisophyllon, Platanocephalus, Pentagonotheca, Jalapa, Caraxeron. §. 3: Olea, Phillyrea, Tinus, Viburnum, Opulus, Agnanthus, Loranthus, Morinda, Morobatindum. §. 4: Stachyarpagophora, Fraxinus, Kalophyllodendron, Phillyreastrum, Caryophyllodendron.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 662: class. Gymnomonospermar. Gen.: Valeriana, Valerianella; Globularia, Asterocephalus, Scabiosa, Succisa, Dipsacus.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 20 plantar. Gen.: Valeriana, Morina, Allionia, Dipsacus, Knautia, Scabiosa, Viburnum, Cornus, Sambucus, Triosteum, Linnaea, Lonicera, Diervilla, Mussaenda, Knoxia.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 469. Gen.: Scabiosa, Dipsacus, Viburnum, Sambucus, Valeriana.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXX: fam. Aggregatar. Divis.: Valerianeae, Scabioseae, Sambuceae, Corneae, Lorantheae, Caprifoliaceae.

Dipsaceae Juss. 1789. Gen. p. 194: ordo 1 class. XI. Gen. §. 1: Morina, Dipsacus, Scabiosa, Knautia, Allionia. §. 2: Valeriana. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 556. Gen. ead., exclusa Allionia in §. 1, addita Fedia in §. 2.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 423. t. 62. Gen. ut Vent.
Cassel 1810. Nat. Fam. p. 166.
Mirbel 1815. Élém. II. p. 887: fam. Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Scabiosa, Valeriana, Fedia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 117; 1841. Nom. p. 72: fam. Aggregatar. Divis.: Scabioseae, Morineae, Valerianeae.
= Dipsaceae et Valerianeae DC.

Dipsaceae DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 221: fam. (58) Dicotyledonum, sejunctis Valerianeis restricta. Gen.: Dipsacus, Scabiosa.
Juss. 1819. Dict. v. 13. p. 314: fam. Epicorollear. Corisantherar. Gen.: Morina, Dipsacus, Scabiosa, Knautia.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246; 1830. Pr. IV. p. 643: ordo (100) Calycillorar. Trib. (1830): Morineae, Scabioseae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 680. Trib. eaed. — Koch 1836. Syn. p. 341. Ed. II. p. 374. Gen.: Dipsacus, Cephalaria, Knautia, Succisa, Scabiosa.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 474: fam. Calyciflorar. Gen.: Dipsacus, Galedragon, Succisa, Columbaria, Scabiosa.
Wallr. 1822. Sched. crit. p. 41: fam. restricta. Gen.: Dipsacus, Succisa, Asterocephalus, Scabiosa (Vaill.), Pterocephalus, Knautia.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: fam. Tubulaciae.
Coult. 1823. Diss. Dipsac. (Genev.); 1824. Mém. soc. Genèv. II. 2. p. 13.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: ordo Subaggregatar.
Link 1829. Hdb. I. p. 676: ordo Anthodiatar. Gen.: Dipsacus, Cephalaria, Trichera, Scabiosa, Pterocephalus, Pycnocomum, Knautia.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (184) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 129: ordo (86) Aggregatar. Gen.: Knautia, Pterocephalus, Asterocephalus, Succisa, Scabiosa, Dipsacus, Morina. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 353; 1841. Ench. p. 228. Trib. ut DC.
Lindl. 1833. Nix. p. 31: ordo Dipsalium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 264.
Meisn. 1838. Gen. p. 174 (121): ordo 111 plant. (p. 441 Aggregatar.) Trib. ut DC.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 311: fam. (64) Aggregatar. Trib. eaed.
Brongn. 1843. En. genr. p. 47: fam. Loniceroidear. Gen. ex Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 61. Trib. ut DC.
Synon. Dipsacear. pars Vaill.; Dipsacear. §. 1. Juss.

Dipsaceae Rchb. 1828. Consp. p. 92 (1831. Fl. exc. p. 192): div. Caprifoliacear. ampliata. Subdivis.: Opercularinae, Scabioseae, Schradereae.

Dipsacozamia „Lehm." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 225: g. Cycadeacear.

Dipsacus*) Tourn. 1700. Inst. p. 466. t. 265: g. pl. class. XII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 212. Ed. Hall. 1745. p. 217: g. pl. class. IX.
Vaill. 1722. Act. Ac. Paris. p. 173: g. Dipsacear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 672. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 469. — Juss. 1789. Gen. p. 194; 1817. Dict. v. 7. p. 83 *(Cardère);* 1819. Dict. v. 13. p. 316. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 558. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 424. — DC. 1805. Franç. IV. p. 221; 1815. V. p. 486. — Hedw. 1806. Gen. p. 53. 366. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 1. 41. n. 405. — Link 1821. En. I. p. 126; 1829. Hdb. I. p. 676. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 474. (Sejungitur Galedragon.) — Wallr. 1822. Sched. crit. p. 46. Char. emend. *Cf.* Schult. 1827. Mant. III. p. 1. — Coult. 1823. Dipsac. p. 21.

*) *διψάω*, sitio. Sic dicta herba, quod in concavo foliorum caulem amplectentium sinu ros et aqua pluviae subsistent. (Plin.)

Dipsacus Tourn. cont.
— D. Don 1825. Nepal. p. 160. — Bartl. 1830. Ord. p. 130. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 197. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 444. — Koch 1836. Syn. p. 342. Ed. II. p. 374. — Kunth 1838. Berol. I. p. 316. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 53. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 47. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 173. — Webb . . . . Canar. II. p. 197. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 67.
Linn. 1737. Gen. p. 22. n. 60; 1737. Cliff. p. 29; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 25; 1753. Sp. I. p. 97; 1759. Syst. ed. X. p. 888. n. 107; 1762. Sp. ed. II. p. 140; 1764. Gen. ed. VI. p. 48. n. 114; 1767. Syst. ed. XII. p. 111: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 97. — Murr. 1774. Syst. p. 120; 1784. Syst. p. 143. — Reich. 1778. Gen. p. 49. n. 120. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 64. n. 148. — Gmel. 1791. Syst. p. 227. — Pers. 1797. Syst. p. 147; 1805. Ench. I. p. 119. n. 225. — Willd. 1797. Sp. I. p. 543. n. 171; 1809. En. p. 143. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 92. — Wall. 1820 in Roxb. Ind. I. p. 367. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 735.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 209: g. Aggregatar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat. — Hill 1769. Ht. kew. p. 75. — Gis. 1792. Prael. p. 528. — Batsch 1802. Tab. p. 228. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 587; 1825. Syst. I. p. 373. n. 374; 1830. Gen. I. p. 87. n. 431. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 374. 381. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 126. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 446.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 161. n. 658: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 491.
Adans. 1763. Fam. II. p. 151: g. Scabiosar.
Scop. 1777. Intr. p. 120: g. Compositar.
Neck. 1790. El. I. p. 114. n. 199: g. Psydomorphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 39. t. 86.
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1936; 1841. Nom. p. 72. n. 2694: g. Scabiosear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 645. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 682. — Endl. 1838. Gen. n. 2191. p. 354; 1841. Ench. p. 229. — Meisn. 1838. Gen. p. 174 (121). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 317. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 444.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 500: g. Dipsacacear.
Synon. Virga Hill; Galedragon Gray; Acaenops Schrad. (Steud.)

Dipsales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 31: nixus Aggregatar. Ordines: Dipsaceae, Valerianeae.

Dipsarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: ordo Gynocoronar. Fam.: Dipsaceae, Valerianaceae.

Dipsas*) Webb . . . . Phytogr. Canar. III. p. 158: subg. Gendarussae. (Justicia hyssopifolia L.)

*) διψάς, sitiens.

Diptanthera Schrank ex Steud. Nomencl. I. p. 498. 518.
= Dianthera Gron.

Diptera Borckh. 1794 in Römer Magaz. I. p. 29: nov. g. pl. (D. sarmentosa.)
Link 1821. En. I. p. 412: g. Saxifragear.
Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4203 *e;* 1841. Nom. p. 158. n. 6156. 6: sect. Saxifragae. — Par. Sternb. 1831. Rev. Saxifr. Hydatica Neck.

Dipteracanthus Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 75. 81; 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 444; 1841. Linnaea XV. p. 353; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 27; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 115: nov. g. Ruelliear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4240. — Endl. 1839. Gen. n. 4043. p. 699; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 294 (204). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 62. — Oersted 1855. Centralam. Acanth. p. 9. Char. emend. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 648. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 782.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 368. 585: g. Echmatacanthor.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 63: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar.
Synon. Neowedia Schrad.; Aphragmia Nees; Dizygandra Meisn.

Dipteraceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 98) 1847. Veg. kingd. p. 393: ordo Guttiferalium. Gen. Dipterocarpear. Endl.

Dipteridia Rchb. 1841. Nomencl. p. 167. n. 6489. 4: sect. Cliffortiae. (Cliffortiae §. 5. DC.)

Dipteris Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 3: nov. g. Filicum.
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 723 *a:* sect. Polypodii.
R. Brown 1838 in Horsf. pl. jav. rar. p. 1: subg. Polypodii.
J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 398; 1842. ibid. IV. p. 61: sect. Drynariae.
Endl. 1841. Spl. I. n. 615 *k γ aa.* p. 1347; 1841. Ench. p. 36: subsect. Drynariae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 935. 10 *c α.*
Fée 1852. Gen. Fil. p. 274: g. Polypodiear.
Synon. Atactosia Blume.

Dipterix Willd. 1801. Spec. III. 2. p. 910. n. 1320: g. Diadelph. Decandr.
Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 243: g. Leguminosar.
DC. 1825. Pr. II. p. 477: g. Geoffrear. Sect.: Coumarouna, Taralea. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 427. Sect. eaed. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (69).
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Browneear.
Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4023; 1841. Nom. p. 154. n. 6021: g. Dalbergiear. Sect. ut DC. — Par. Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 110. — Endl. 1841. Gen. n. 6728. p. 1306; 1841. Ench. p. 673. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 131.

Dipterix Willd. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Geoffroyear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 141.
= Dipteryx Schreb.

Dipterocalyx Chamisso 1832. Linnaea VII. p. 241: nov. g. Verbenacear. (D. hirtus et glabrescens.)
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227: g. Verbenear.
Walp. 1845. Rep. IV. p. 56: sect. Lippiae. — Par. Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 578; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 230.
Schltd. 1853. Linnaea XXVI. p. 647: g. restituendum censet. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 708.

Dipterocarpeae Blume 1825. Bijdr. Nr. 5. p. 222; 1829. Fl. jav. fasc. VII. p. 3: ordo plant. Gen.: Dipterocarpus.
Agdh. 1825. Aphor. p. 209: trib. Amentacear. Gen.: Dipterocarpus, Dryobalanops, Shorea, Caryolobis, Lophira.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (31) Thalamiflorar. (syncarpar.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 812. Gen. §. 1: Dipterocarpus, Shorea, Dryobalanops, Hopea, Vateria. §. 2: Lophira.
Blume 1833. Diss. nov. pl. fam.; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 90: fam. Elaeocarpeis aff. Gen.: Dipterocarpus, Dryobalanops, Shorea, Vateria.
Lindl. 1833. Nix. p. 20: ordo Malvalium.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 83. Gen.: Vateria, Vatica, Dipterocarpus, Hopea.
Meisn. 1837. Gen. p. 35 (27): ordo 28 plant. (p. 439 Lamprophyllar.) Gen. ut Wight & Arn.
Rchb. 1837. Hdb. p. 304: div. Tiliacear. Gen. ead. et Seidlia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 210. Gen. ut Endl. et Isauxis. Subdiv.: Lophireae.
Endl. 1840. Gen. p. 1012; 1841. Ench. p. 525: ordo Guttiferar. Gen.: Dipterocarpus, Dryobalanops, Vateria, Vatica, Hoppea. Accedit 1842 (Spl. II. p. 80) Anisoptera.
Brongn. 1843. En. genr. p. 76: fam. Guttiferar.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 301: fam. (233) incertae sedis. Gen. ut Rchb. 1837 et Anisoptera, Dryobalanops. *Aff.*: Lophira.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 71.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 28. Subord.: Vaterieae, Shoreae, Pterygieae.
Synon. Dipteraceae Lindl.; Shoreaceae Roxb.

Dipterocarpus Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 50. t. 187 (*costatus*) et t. 188. f. 1 (*turbinatus*). *Cf.* Juss. 1819. Dict. v. 13. p. 332.
Roxb. 1819. Corom. III. p. 10. t. 213; 1832. Ind. II. p. 611: g. Polyandr. Monogyn.
Blume 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: g. Terebinthacear.?
Spreng. 1825. Syst. II. p. 578. n. 1899; 1830. Gen. I. p. 427. n. 2119: g. Tiliacear.

Dipterocarpus Gärtn. cont.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 5. p. 223; 1829. Fl. jav. Dipt. p. 8; 1833. Nov. fam. expos.: g. Dipterocarpear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 209. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 812. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 84. — Meisn. 1837. Gen. p. 35 (27). — Rchb. 1837. Hdb. p. 304; 1841. Nom. p. 210. n. 7976. — Endl. 1840. Gen. n. 5392. p. 1013; 1841. Ench. p. 525. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 245. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 303. — Walp. 1846. Rep. V. p. 121. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 71. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 335.
Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1917 *a:* sect. Pterigii.
Lindl. 1836. Nat. syst. p. 98; 1847. Veg. kd. p. 394: g. Dipteracear.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 35: g. Pterygiear.
Synon. Pterygium Corr.; Caryolobis Gärtn.?

Dipterocome Fisch. & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petrop. I. p. 26: nov. g. Cichoracear. tribus incertae. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 122 et Linnaea X. Litt. p. 87.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 255: g. Compositar. incertae sedis.
Endl. 1838. Gen. n. 2424. p. 393; 1841. Ench. p. 236: g. Plucheinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Meisn. 1839. Gen. p. 222 (138): g. Calendulear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3560: g. Plucheinar.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 72: g. Tarchonanthear.

Dipterosperma Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 28: nov. g. Spathodeae aff. *Cf.* Endl. Spl. III. p. 80.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 152: g. Bignoniacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677 (*dubium*).
DC. 1845. Pr. IX. p. 239: g. Bignoniear. minus notum.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 514: g. Catalpear.

Dipterotheca Schultz Bip. 1842. Flora p. 434: nov. g. Podopterothecear.
Meisn. 1843. Comm. p. 361: g. Ecliptear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 145.
= Coronocarpus Schum.

Dipterygia „Presl mss.“ Fenzl 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 2. n. 4370 *a:* sect. Asteriscii.
Synon. Tritaenicum, Tritaenium Turcz.

Dipterygium Decaisne 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 66. t. 3: nov. g. Cruciferar. (D. glaucum.)
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325: g. Carcerulosar.
Endl. 1839. Gen. n. 4936. p. 880; 1841. Ench. p. 450: g. Isatidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 179. n. 6898. — Walp. 1842. Rep. I. p. 180. — Meisn. 1843. Comm. p. 341. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 72.

Dipterygium Decaisne cont.
Bunge 1842. Linnaea XVI. p. 112: g. Capparidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358: g. Cleomear.
Synon. Pteroloma Hochst. & Steud.

Dipteryx Schreb. 1791. Gen. II. p. 485. n. 1161: g. Diadelph. Decandr.
Gis. 1792. Prael. p. 415: g. Papilionacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 763; 1826. Syst. III. p. 191. n. 2508; 1831. Gen. II. p. 573. n. 2793: g. Leguminosar.
Vogel 1837. Linnaea XI. p. 383: g. Geoffroyear.
Tul. 1844. Arch. Mus. IV. p. 98: g. Dalbergiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 72.
Synon. Dipterix Willd., DC., etc.; Coumarouna Aubl.; Cumaruna Lam.; Heinzia Scop.; Baryosma Gärtn.; Taralea Aubl.; Bolducia Neck.

Diptychandra*) R. L. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 139; 1844. Arch. Mus. IV. p. 127. t. 8: nov. g. Caesalpiniear. (Leptolobium aurantiacum Mart.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 551: g. Leptolobiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Diptychantes Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 311: sect. Diphyis. (D. mutabilis.)

Dipyrena**) Hook. 1830. Bot. Misc. I. p. 365: nov. g. Verbenacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664. — Clos 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 380.
Endl. 1838. Gen. n. 3689. p. 634; 1841. Ench. p. 312: g. Lippiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 290 (199). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 371. 606. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 37. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 72.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4189. (genuinar.) — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 535.
Synon. Wilsonia Hook. & Gill.

Diracodes***) Blume 1830. Enum. pl. Jav. I. p. 55: nov. g. Amomar. (D. javanica.)
Endl. 1837. Gen. n. 1629. p. 224; 1841. Ench. p. 119: g. Amomor.
Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2217: g. Amomear. (genuinar.) — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 388 (291). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 154.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 73 (emend. *Dirhacodes*). — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 607.

Dirca†) Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 12; 1753. Sp. I. p. 358; 1759. Syst. ed. X. p. 1004. n. 437; 1762. Sp. ed. II. p. 512; 1764. Gen. ed. VI. p. 192. n. 486; 1767. Syst. ed. XII. p. 272. n. 481: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 308; 1784. Syst. p. 372. —

*) *δίς, πτυχή*, plica et *ἀνήρ*: peculiarem filamentorum aestivationem indicans.
**) *πυρήν*, nucleus, acinus.
***) *ῥακώδης*, pannosus, lacerus.
†) *Δίρκη*, regis Thebani uxor.

Dirca Linn. cont.
Reich. 1778. Gen. p. 197. n. 527. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 260. n. 665. — Gmel. 1791. Syst. p. 632. — Pers. 1797. Syst. p. 398. — Willd. 1799. Sp. II. p. 424. n. 774; 1809. En. p. 426. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 253.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Thymelear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 435. n. 968. — Agdh. 1826. Aphor. p. 233. — Hook. Fl. bor. am. II. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 436. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 120.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Veprecular. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 414.
Gled. 1764. Syst. p. 270. n. 1111: g. Calycostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 327: g. Monopetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 343: g. Seminudar.
Juss. 1789. Gen. p. 77: g. Thymelaear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 181. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 325; 1825. Syst. II. p. 242. n. 1480; 1830. Gen. I. p. 319. n. 1628. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 335. — Link 1829. Hdb. I. p. 376. — Bartl. 1830. Ord. p. 115. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1311.
Neck. 1790. El. II. p. 177. n. 885: g. Aclithrophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 237: g. Daphnoidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2091. p. 329; 1841. Ench. p. 208. — Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2439.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 181: g. Daphnacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 279. n. 1123.
Link 1821. En. I. p. 357: g. Thymelinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4546 b: g. Terminaliear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 170: g. Daphnear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 330 (242). — C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. p. 356. — Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 527. (diplostemonear.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 67. n. $2106/_6$: g. Eudaphnear.
Synon. Dofia Adans.

Dircaea Decaisne . . . . (Gesnera bulbosa Gawl.)
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 203: g. Eugesnerear.

Dircanum Roth vid. *Dicranum Hedw.*

Dirhacodes Lemaire vid. *Diracodes Blume.*

Dirhynchosia Blume 1855. Mél. bot. Nr. 1: nov. g. pro Cunonia celebica Bl. propositum, Ackamae Cunn. proximum. *Cf.* Flora 1858. I. p. 254.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 31 (sphalm. *Dichynchosia*): g. Cunoniear.

Dirichletia*) Klotzsch 1853. Monatsber. Ak. Berl. p. 494 (Flora 1853. p. 715): nov. g. Psychotriear. (D. glabra et pubescens.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 107.

*) Dicat. memoriae Gust. Lejeune-Dirichlet, prof. et academici Berol.

Dirimosperma Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 715: nov. g. Sphaeriaceor. (D. scutatum.)

Dirina Fries 1825. Pl. homon. p. 244: nov. g. Parmeliacear. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 74. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 401; 1841. Nom. p. 17. n. 569. — Endl. 1836. Gen. n. 171. p. 15; 1841. Ench. p. 11.

Fries 1831. Lich. eur. p. 4. 193: g. Parmeliear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349.

Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: g. Lecanorear. — Par. Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 13. (Flora 1854. p. 235.)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Parmeliadar.

Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 93: g. Lecanorinor.

Flot. 1850. Bot. Zeit. p. 350: g. Lecanorinar.

Dirinopsis De Notaris 1851. Giorn. bot. ital. II. 1. p. 187: nov. g. ex typo Parmeliae repandae Fr.

Dirrhynchia Benth. 1845. Pl. Hartweg. II. p. 191: sect. Rondeletiae. (R. brevipes n. sp.)

Disa*) Berg. 1767. Fl. cap. p. 348. t. 4. f. 7.

Scop. 1777. Intr. p. 91: g. Satyrior.

Linn. f. 1781. Suppl. p. 59. n. 1423: g. Gynandr. Diandr. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 817. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 605. n. 1375. — Thunb. 1792. Nov. gen. VI. p. 97. — Pers. 1797. Syst. p. 861.

Juss. 1789. Gen. p. 65: g. Orchidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 179. — Swartz 1800. Act. Holm. p. 208; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 24. t. 1. f. B. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 160. — Pers. 1807. Ench. II. p. 507. n. 1978. — R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 195. (Verm. bot. Schr. II. p. 16.) — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 336. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 697. n. 2938; 1831. Gen. II. p. 655. n. 3298.

Neck. 1790. El. III. p. 135. n. 1478: g. Synarmophytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 62: g. Diandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1794. Prodr. I. p. 4; 1807. Fl. cap. I. p. 50.

Willd. 1805. Sp. IV. p. 45. n. 1590: g. Gynandr. Monandr.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 286: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.

Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.

Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529): g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1470; 1841. Nom. p. 51. n. 1882. Sect. (1841): Disa, Calodisa. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. p. 211. n. 1537. — Lindl. 1838. Orchid. p. 347. Sect.: *a. Anthera erecta. b. Anthera supina* (subsect.: Repandra, Phlebidia, Vaginaria, Pardoglossa, Coryphaea, Stenocarpa, Oregura, Trichochila, Disella). — Endl. 1841. Spl. I. p. 1365; 1841. Ench. p. 112. Sect.: Eudisa, Calodisa. — Meisn. 1842. Gen. p. 381 (285). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 74.

*) Nomen vernaculum.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Disidar.

Disaccium*) DC. 1821. Syst. II. p. 623; 1824. Prodr. I. p. 220: sect. Sinapios; an genus proprium? — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 251.

Sinapidendron Lowe.

Disadena Miquel 1850. Stirp. sel. Surin. p. 146: nov. g. Gentianear. (Voyria flavescens Gris.)

Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 83: g. Lisianthear.

Disakisperma Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 287: nov. g. Festucacear.

Disandra Linn. 1774 in Murr. syst. p. 290: nov. g. Heptandr. Monogyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 185. n. 497. — Linn. f. 1781. Suppl. p. 32. n. 1345. — Murr. 1784. Syst. p. 352. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 224. n. 627. — Pers. 1797. Syst. p. 376; 1805. Ench. I. p. 402. n. 901. — Willd. 1799. Sp. II. p. 282. n. 713; 1809. En. p. 403.

Juss. 1789. Gen. p. 99: g. Pedicularium.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 298: g. Rhinanthoidear.

Batsch 1802. Tab. p. 192: g. Personatar. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 340. — Link 1821. En. I. p. 354 *(Distandra)*.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 229: g. Rhinanthacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 257. n. 1039. — Link 1829. Hdb. I. p. 530 *(Distandra)*.

Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 46. t. 185.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 478; 1825. Syst. II. p. 166. n. 1393: g. Gentianear.? (serius [Gen. I. p. 149] ad Sibthorpiam L. relatum.)

Duvau 1826. Ann. sc. nat. VIII. p. 176: g. Veronicear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3069; 1837. Hdb. p. 198. — Bartl. 1830. Ord. p. 171. — Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5. (?) — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270.

Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 311: g. Rhinanthear.

D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 114: g. Sibthorpiacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 641.

Endl. 1839. Gen. n. 3975 *b*. p. 687; 1841. Ench. p. 340: sect. Sibthorpiae. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 334.

Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4488: g. Sibthorpicar.

Disanthera Beckm. vid. *Dianthera Gron.*

Disarrenum „Labill." Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 341: vid. *seq.*

Disarrhenum Labill. 1806. Nov. Holl. II. p. 83. t. 332.

— Hierochloë Gmel.

*) *σάκκιον*, sacculus.

Disaspidospermae Tausch 1834. Flora I. p. 343: trib. Mericarpar. Subtrib.: Hydrocotyleae, Xanthosieae.

Disaspidospermeae Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 137. 173: trib. Umbelliferar. Sect.: Hydrocotyleae, Xanthosieae.

Discanthae Endl. 1839. Gen. p. 762; 1841. Ench. p. 375: class. Dialypetalar. Ordines: Umbelliferae, Araliaceae, Ampelideae, Corneae, Loranthaceae, Hamamelideae, Bruniaceae, Grubbiaceae, Helwingiaceae.

Discanthera Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 696: nov. g. Cucurbitacear. (D. dissecta.)

Endl. 1841. Spl. I. n. 5143/$_1$. p. 1421; 1841. Ench. p. 491: g. Cyclantherear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3942. — Walp. 1843. Rep. II. p. 203. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 75.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315: g. Cucurbitear.

= Cyclanthera Schrad. (Conf. Endl. Suppl. II. p. 77.)

Discapophysium Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 602 *c;* 1841. Nom. p. 25. n. 878. 3: sect. Splachni. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 503 *b.* p. 49; 1841. Ench. p. 31.

Discaria Hook. 1830. Bot. Miscell. I. p. 156: nov. g. Rhamnear. (D. americana.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 35. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50). — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 46.

Endl. 1840. Gen. n. 5731. p. 1099; 1841. Ench. p. 581: g. Colletiear. Sect.: Pentapasma, Tetrapasma. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5604. Sect.: Tetrapasma, Discaria. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 75.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.

Disceliaceae Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. (III. p. IV): fam. Muscor. Gen.: Discelium.

C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 149: trib. Acrocarpor. Gen. id.

Discelieae Montagne 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: trib. Acrocarpor. Gen.: Discelium.

Discelium*) Brid. 1826. Bryol. I. p. 365: nov. g. Acrocarpor. peristomor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 46. p. 330 *(Rougette).* — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 75.

Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV: g. Weissioidear.

Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 606: g. Weissiaceor.

Endl. 1836. Gen. n. 517. p. 50; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 895: g. Calyptrobryor.

C. Müll. 1843. Bot. Zeit. p. 505: g. Funariacear.

Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. III.: g. Disceliacear. — Par. C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 149.

Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 95: g. Dicranear.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Disceliear.

*) σκέλος, crus.

Discella Berkeley & Broom 1850. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. V. p. 376: nov. g. Pyrenomycetum. (Phacidium carbonaceum Fr.)

Dischidia*) R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 32 (Verm. bot. Schr. II. p. 370); 1810. Prodr. I. p. 461. Ed. Nees p. 317: nov. g. Asclepiadear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. IX. 57. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 844. n. 974; 1830. Gen. I. p. 210. n. 1070. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1059. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 43. — Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 377. t. 17. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 895.

Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 342: g. Apocinear.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 130. n. 3420: g. Pergularinar.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Pergulariear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540. — Brongn. 1843. En. genr. p. 53. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 75.

Wall. 1831. Pl. As. rar. II. p. 35. t. 142.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 133: g. Hoyacear.

Endl. 1838. Gen. n. 3508. p. 596: g. Tylophorear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (177). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5048.

Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Ceropegiear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 506.

Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 631: g. Ceropegiar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.

Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 10. p. 147: g. Hoyear.

Synon. Nummularia Rumph.; Colyris Vahl; Leptostemma Blume.

Dischidium Gingins 1824 in DC. Prodr. I. p. 300: sect. Violae. — Par. Gaud. 1828. Helv. II. p. 207. — Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4885 *c;* 1832. Fl. exc. p. 704; 1841. Nom. p. 186. n. 7138. 1. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 329. — Koch 1836. Syn. p. 86. Ed. II. p. 94. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 254. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 182.

Rchb. 1837. Hdb. p. 269: g. Violear. genuinar.

Synon. Chrysion Spach.

Dischimia Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3097: g. Selaginear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 178. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 245.

Rchb. 1837. Hdb. p. 196: g. Globulariear.

= *seq.*

Dischisma Choisy 1823. Mém. soc. Genèv. II. p. 93; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 6: nov. g. Selaginacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 667. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 76.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Selaginear. — Par. E. Meyer 1837. Comm. pl.

*) δίς, bis; σχίζω, seco.

Dischisma Choisy cont.
Afr. II. p. 250. — Endl. 1839. Gen. n. 3728. p. 641; 1841. Ench. p. 317. — Meisn. 1840. Gen. p. 292 (201). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 357. 474. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 147.
Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4441: g. Hebenstreitiear.
Synon. Dischimia Rchb.; Hebenstreitiae sp. Auct.

Dischoriste Dietr. vid. *Dyschoriste Nees.*

Disciferae Scopoli 1777. Introd. p. 321: trib. 29 plant. Gentes: A. *Fructu dehiscente.* Gen. §. 1: Cadaba, Icica, Smithia. §. 2: Ernstingia, Acronychia, Toulicia, Ruta, Thryallis, Reseda, Taparira, Evrardia, Fagara, Hamamelis, Corchorus, Ayenia, Cedrela, Aesculus, Sododa. B. *Fructu non dehiscente.* Gen. §. 1: Gluta, Cupania, Pometia, Tontalea, Vitis, Ptelea, Rhus, Passiflora. §. 2: Amyris, Melicocca, Pavia, Blakwellia, Anacardium, Limonia, Quisqualis, Schinus, Bergera, Carica, Kniphofia, Spondias.

Disciflorae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 21: class. Thalamiflorar. Fam.: Frangulaceae, Corneae, Araliaceae, Umbelliferae, Adoxeae, Acerineae, Resedaceae.

Discina Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 348: nov. g. Helvellaceor. (D. perlata).
Bonord. 1851. Hdb. p. 202: g. Pezizeor.

Discipetalae Wilbrand 1837. Handb. p. LVIII: class. (XI.) Dicotyledonum.

Disciseda Czerniaiew 1845. Bull. Mosc. Nr. 3. p. 153: nov. g. Lycoperdinear. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 130 et Flora 1847. I. p. 194.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505; VIII. p. 488: g. Geastreor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 442: subg. Bovistae.

Discocactus Pfeiffer 1837 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 31. p. 241; 1839. Nov. Act. Leop. XIX. 1. p. 119. t. 15; 1846. Abbild. bl. Cact. II. t. 1: nov. g. Cactear. (Cactus placentiformis Lehm.) *Cf.* Flora Lit. X. p. 95. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 128 (92). — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 335.
Salm-D. 1840 in Otto & Dietr. Gartenz. p. 59: g. Echinocactoidear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1422; 1841. Ench. p. 496. n. 5155.
Rchb. 1841. Nom. p. 161. n. 6264: g. Echinocactear. — Par. Salm-D. 1845. Cat. h. Dyck. p. 23. — Först. 1846. Hdb. Cact. p. 347.
Walp. 1843. Rep. II. p. 269: g. Melocactoidear. *Cf.* ibid. p. 323.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 748: g. Melocactidar.

Discocactus „Pfeiff." Walp. Repert. V. p. 817: err. pro *Disocactus Lindl.*

Discocalea DC. 1836. Prodr. V. p. 672: sect. Caleae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2616 *b.* p. 425; 1841. Ench. p. 240.
Synon. Calea R. Brown; Caba Less.; Chrysosphaerium Willd.

Discocalyx A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 107: sect. Badulae.

Discocapnos Chamisso & Schltd. 1826. Linnaea I. p. 569: nov. g. Fumariacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 260. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 146. — Meisn. 1837. Gen. p. 8 (10).
Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4828; 1837. Hdb. p. 264; 1841. Nom. p. 184. n. 7056: g. Fumariear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 96.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 470: g. Monocentrear.
Endl. 1839. Gen. n. 4840. p. 860; 1841. Ench. p. 444: g. Corydalidear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 62: g. Fumarinear.

Discocarpi Genth 1836. Fl. Nass. I. p. 311: div. Lichenum. Ordines: Peltideaceae, Parmeliaceae, Graphideae.

Discocarpus Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 201; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 52: nov. g. Buxear. *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 547. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 91. n. $5864/_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 370. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Euphorb. p. 585: g. Wielandiidear.

Discocarpus Liebm. 1851. Mexic. Urtic.; 1852. K. danske Selsk. Skrivt. V. 2. p. 308: nov. g. Urticacear., Myriocarpae aff. = Laportea Gaudich. Wedd. 1857.

Discocenia DC. 1837. Prodr. VI. p. 83: sect. Ceniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2685 *a.* p. 437; 1841. Ench. p. 241.

Discocymatii Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 319: ordo 2 Lichenum. Gen.: Arthonia, Graphis, Patellaria, Parmelia, Peltigera, Baeomyces.

Discodenia Endl. Ench. p. 241: sphalm. pro *Discocenia.*

Discogyne Sternb. 1831. Rev. Saxifr. p. . . . : sect. Saxifragae.

Discoideae Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 693: div. Corymbiferar. Gen.: Tanacetum, Artemisia, Gnaphalium, Chrysocoma, Conyza, Eupatorium, Cacalia, Petasites; Xeranthemum, Bidens.

Discoideae *) Linn. 1764. Ord. nat.: div. 3 Compositar. Gen.: Gnaphalium, Xeranthemum, Stähelina, Tanacetum, Matricaria, Carpesium, Chrysanthemum, Pteronia, Baccharis, Osmites, Conyza, Inula, Erigeron, Cineraria, Tussilago, Doronicum, Arnica, Senecio, Solidago, Chrysocoma, Aster, Leysera, Santolina, Anthemis, Anacyclus, Cotula, Athanasia, Achillea, Cacalia, Perdicium, Bellis, Ageratum, Eupatorium, Ethulia, Kuhnia. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539. Gen. ead. et Bellium, Unxia, Mutisia, Lavenia, Kleinia.
GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 105: ordo Syngenesiae. (Gen.: Artemisia, Tanacetum, Petasites, Senecio, Eupatorium, Conyza, Gnaphalium, Antennaria, Filago, Absynthium, Bidens.) — Par. Link 1822. En. II. p. 365.

*) Conferatur adnotatio Giseckei (p. 539) de nomine divisionis, errore calami pro „*Radiatae*" forsan orto, cum fere nullum genus Discoideum sit in sensu Linnaeano.

Discoidei Achar. 1810. Lich. univ. p. 19: div. Coenothalamor. Gen.: Urceolaria; Lecanora, Roccella; Evernia, Sticta, Parmelia; Borrera; Cetraria; Peltidea, Nephroma; Dufourea.
Achar. 1814. Syn. p. XII: ordo Coenothalamor. Gen. ead.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 324: series Hymenothalamor. Gen.: Biatora, Collema, Parmelia, Peltidea.

Discolobium Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 105: nov. g. Dalbergiear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6722. p. 1305; 1841. Ench. p. 673. — Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 6014. — Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 78.

Discomela Rafin. 1825. Nov. gen. p. 3. = Helianthus Linn.

Discomycetes Fries 1836. Epicr. p. 1: fam. 2 Fungor. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 79. Gen.: Morchella, Peziza, Patellaria, Stictis. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 343. Ord.: Helvellacei, Bulgariacei, Dermatei, Patellariacei, Phacidiacei, Stictei.
Bonord. 1851. Hdb. p. 197: ordo 8 Fungor. Fam.: Agyriacei, Patellariacei, Rhizinacei, Cenangiacei, Pezizei, Geoglossei, Helvellacei.
Bail 1858. Syst. p. 55: ordo Thecasporear. Fam. ut Bonord. et Phacidiacei, Sphaerosomacei.

Discophora Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. IX. p. 223; X. p. 218: nov. g. Sarcostigmear.

Discoplaea Brébiss. vid. *seq.*

Discoplea Ehrenb. 1840. Ber. Berl. Ak. p. 208: g. Bacillarior.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95: g. Eulysigoniear. Subgen.: Eudiscoplea, Pyxidaria.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 734; V. p. 79 *(Discoplaea)*: g. Diatomear.
= Cyclotella Kütz.?

Discopleura DC. 1829. Coll. mém. V. p. 28; 1830. Prodr. IV. p. 106: nov. g. Amminear. (Ammi majus Walt.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 283. — Rchb. 1837. Hdb. p. 219 (genuinar.); 1841. Nom. p. 139. n. 5382. — Meisn. 1838. Gen. p. 142 (103). — Endl. 1839. Gen. n. 4398. p. 770; 1841. Ench. p. 378. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 942. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 607. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 79.
Tausch 1834 Flora I. p. 355: g. Seselinear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.
Synon. Ptilimnium Raf.

Discopoda DC. 1836. Prodr. V. p. 604: sect. Bidentis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2541 c. p. 413; 1841. Ench. p. 238. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3597. 3.

Discopodium Hochstett. 1844. Flora I. p. 22: nov. g. Solanacear.

Discopodium Hochst. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 611: g. Solanear.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 179: g. Witheringiear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 478: g. Atropinear.

Discopodium Steud. 1855. Syn. pl. glum. II. p. 150: nov. g. Rhynchosporear. (D. Drummondii.)

Discopyle*) Endl. 1847. Syn. Conif. p. 254; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 11. n. $1816/_3$ *a:* sect. Ephedrae.
Synon. Discostoma Meyer.

Discoseris Endl. 1838. Gen. n. 2909 *b.* p. 483; 1841. Ench. p. 247: sect. Seridis.

Discosia „Lib. exsicc. 345" Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 32; 1842. Anl. Mycol. p. 132: g. Sphaeriaceor. (Sphaeria Artocreas Tode.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Lév. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 286: g. Sphaeropsideor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Pestalozzieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 423: g. Phyllosticteor.
(Bonord. 1851. Hdb. p. 315 ad Dothideam refert.)
Synon. Xylomatis sp. Pers.; Phlyctidii sp. Auct.

Discosira Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: g. Melosirear.

Discospermeae Gren. (& Godr.) 1856. Fl. France III. p. 175. 176: trib. Liliacear. Gen.: Tulipa, Fritillaria, Lilium, Lloydia, Uropetalum, Urginea.

Discospermum Dalzell 1850 in Hook. Kew gard. misc. II. p. 257: nov. g. Eugardeniear., Pouchetiae aff. (D. sphaerocarpum et apiocarpum.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 796.

Discosphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 91: g. Sphaeriear. (Sphaeria castorea, radians, etc.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Stigmaspherar.

Discostegia „Presl mss." Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 92: nov. g. Marattiacear. (Nomen.)
Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 271: g. Marattiear. (Marattia alata et laevis.) — Par. Vriese & Hart. 1853. Mon. d. Maratt.

Discostigma Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 33: nov. g. Garciniear.?, an Calophyllear.?
Meisn. 1843. Comm. p. 345: g. Calophyllear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 95. n. $5446/_1$: g. (dubium) Garciniear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 366.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 212; 1848. Pl. jav. rar. p. 276: g. Clusiacear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 145 (dubium).

*) πύλη, porta, introitus.

Discostoma C. A. Meyer 1846. Mém. sc. nat. V. (Ephedr. p. 96); 1847. Bull. Ac. Pet. V. p. 36; 1849. Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. p. 256: sect. Ephedrae.
= Discopyle Endl.

Discothesium A. DC. 1857. Esp. nouv. d. genre Thes. p. 5; 1857. Prodr. XIV. 2. p. 661: sect. Thesii.

Discovium Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 96: nov. g. Cruciferar. (inter Alyssum, Thlaspi et Lepidium intermedium.) — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 236 *(dubium)*. — Endl. 1839. Gen. p. 889; 1841. Ench. p. 451.
Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4776: g. Alyssinear.? — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 181. — Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11).
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Siliculosar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 629. 643.
Rchb. 1841. Nom. p. 180. n. 6924: g. Thlaspidear.?

Discurainia „Webb" Walp. Repert. I. p. 163: leg. *Descurainia Webb.*

Disella Lindl. 1838. Orchid. gen. p. 347. 354: sect. Disae.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1537 *b ι.* p. 1365; 1841. Ench. p. 112: subsect. Calodisae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1822. 2. *i.*

Disemaea G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 110: sect. Sophorae. (Bot. Regist. 1185.) — Par. Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 87. — Endl. 1841. Gen. n. 6738 *c.* p. 1308 *(Dichosemaea)*; 1841. Ench. p. 673. — Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6043. 3 *(Dichosemaea)*.

Disemma Labill. 1824. Sert. caledon. p. 78. t. 79.
DC. 1828. Pr. III. p. 332: g. Passiflorear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42. — Bartl. 1830. Ord. p. 271. — Endl. 1833. Norf. p. 65; 1839. Gen. n. 5100. p. 927; 1841. Ench. p. 483. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 56. — Meisn. 1838. Gen. p. 124 (90). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 276. — Brongn. 1843. En. genr. p. 109. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 131. 188. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 80. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 699. *(verar.)*
Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3471: g. Granadillear.
Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5080: g. Tacsoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 334: g. Passifloracear.
Synon. Passiflorae sp. Forst.; Murucuiae sp. Lindl.

Disepalum Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 309: sect. Comespermae. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 81. n. 5649 *c* (err. *Disopetalum)*. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 84.

Diseris Wight vid. *Disperis Swartz.*

Diserneston*) Jaub. & Spach 1843. Ill. pl. or. p. 78. t. 30: nov. g. Umbellatar., Sileri et Agasyllidi aff.
Walp. 1843. Rep. II. p. 939: g. Silerinar.
Dorema Don.

*) Dicat. Ernesto Germain et Ern. Cosson.

Disidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Ophrear. Gen.: Disa, Monadenia, Schizodium, Penthea, Forficaria, Herschelia, Brachycorythis, Brownleea. *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172.

Disisocactus G. K. . . . . 1845. Bot. Zeit. p. 530: nomen correctum pro *Disocacto Lindl.* propositum.

Disocactus*) Lindl. 1845. Bot. Regist. n. ser. XVIII. t. 9; 1847. Veg. kingd. p. 748: nov. g. Phyllanthidar. (Cereus biformis Lindl.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 817. (sphalm. *Discocactus)*: g. Cactear. *Cf.* Walp. 1847. Rep. VI. p. 773.
Först. 1846. Cact. p. 442: g. Phyllanthear., an Rhipsalidear.?
Vid. Disisocactus.

Disodea Pers. 1805. Ench. I. p. 210. n. 470: g. Rubiacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 121. n. 531. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 347. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 381.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 80: g. Disodiniae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33 *(Disodia)*: g. Machaonicar. (Nomen. An huc?)
= Lygodisodea Ruiz & Pav.

Disodia Dumort. vid. *praeced.*

Disodinia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 80: subfam. Sambucidiae. Gen.: Disodea, Virecta, Bellonia.

Disodontea G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 177: sect. Adyseti. *(Synon. Alyssi sect. Adyseton* §. 1. DC.*)*

Disomene Banks & Soland. mss.
= Misandra Comm.

Disoon**) A. DC. 1847. Prodr. XI. p. 703: nov. g. Myoporacear.

Disopetalum Endl. vid. *Disepalum Steetz.*

Disoxylon Rchb. vid. *Dysoxylon Bartl.*

Disoxylum Juss., Spach, Meisn. vid. *Dysoxylum Blume.*

Disparagineae Rchb. 1841. Nomencl. p. 85: div. Asterinar. Gen.: Amphiglossa, Disparago, Homochroma.

Disparago Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 463. t. 173: nov. g. Radiatar.
DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 68: g. Labiatiflorar.
Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 348: g. Inulear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 140.
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 563: g. Gnaphaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2440. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26.
Cass. 1825. Dict. v. 34. p. 42. Char. emend.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Seriphiear. verar.
Less. 1832. Syn. p. 362: g. Antennariear. (arctius definitum.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 257: g. Helichrysear. Sect.: Disparella, Leiachaena, Steirocoma, Steirostilpna. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2758. p. 449; 1841. Ench. p. 243. Sect.

*) *δίς, ἴσος,* aequalis; *κάκτος.* *Cf.* Flora 1846. I. p. 224.

**) Nomen ex numero ovulorum in ovario toto.

Disparago Gärtn. cont.
caed. — Meisn. 1839. Gen. p. 219 (138). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 81.
Fenzl 1839. Flora II. p. 729: g. Leysseriear.
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3310: g. Disparaginear. Sect.: Disparago, Leiachena, Steirocoma, Steirostilpna.
Synon. Wigandia Neck.; Seriphii et Stoebes sp. Auct.

Disparella DC. 1837. Prodr. VI. p. 257: sect. Disparaginis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2758 *a.* p. 449; 1841. Ench. p. 243.

Dispares Scopoli 1777. Introd. p. 95: trib. 6 plantar. Gentes: *A. Fructu polyspermo.* Gen.: Musa, Heliconia, Bromelia, Tillandsia, Bursera, Ravenalla, Hydrocharis, Nymphaea, Stratiotes, Pistia, Asarum, Cytinus, Aristolochia, Nepenthes, Meborea, Salacia, Stilago, Försteria, Hura, Tamus, Raiania, Govania, Datisca. *B. Fructu monospermo.* Gen.: Aerva, Dialium, Acaena, Colpoon, Bucida, Waldschmidtia, Saraca, Conocarpus, Hippuris, Mniarum, Gunnera, Cynomorium, Ceratocarpus, Theligonum, Elaeagnus, Hippophaë, Osyris, Terminalia, Nyssa, Viscum, Loranthus, Saclanthus.

Dispeltophorus Lehm. 1832. Ind. sem. ht. Hamb.: nov. g. Lepidinear. (D. crassifolius.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 4 et Endl. Gen. p. 880.
Rchb. 1841. Nom. p. 180. n. 6940: g. Lepidiear.? — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 81.
= Hexaptera Hook.?

Disperis*) Swartz 1800. Act. Holm. p. 218; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 38. t. 1. f. F.: nov. g. Orchidear. (Arethusa capensis L.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 160. — Pers. 1807. Ench. II. p. 509. n. 1981. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 349.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 59. n. 1593: g. Gynandr. Monandr.
Thunb. 1807. Fl. cap. I. p. 118: g. Diandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 290: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Agdh. 1823. Aphor. p. 189: g. Massulatar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 13 (Linnaea II. p. 529); 1839. Orchid. p. 369: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1482; 1841. Nom. p. 51. n. 1896. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1543. p. 212; 1841. Ench. p. 113. — Meisn. 1842. Gen. p. 381 (285). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 81. — Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 15 *(Diseris).* t. 1719 *(Diperis).*
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Corycidar.
Synon. Dryopeia Pet.-Th.; Dipera Spreng.

Disperma Gmel. 1791. Syst. p. 892: g. Didynam. Gymnosperm. *(Anonymos Walt.* Carol. p. 160. n. 230.*)*
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 350: g. Rubiacear.

*) δίς, bis; πήρα, pera.

Dispermia Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 354: sect. Oldenlandiae. *(*Hedyotis Wightiana W. & Arn.)

Disphaenia Brongn. vid. *seq.*

Disphemia Endl., Lindl. vid. *seq.*

Dispheniа*) Presl 1836. Pterid. p. 55: nov. g. Cyatheacear. *(*Cyathea arborea Sm.*)* — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694 *(Disphaenia).*
Endl. 1841. Spl. I. n. 653 *c.* p. 1351; 1841. Ench. p. 37 *(Disphemia):* sect. Cyatheae. Par. Rchb. 1841. Nom. p. 30. n. 1050. 3.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80 *(Disphemia):* g. Cyathear.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. V. p. 348: g. Cyathinear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 350: sect. Hemitheliae.

Displaspis Klatt vid. *Diplaspis Hook. f.*

Disporeae Zolling. 1846. Obs. phyt. II. p. 17 ex Hasskarl 1847. Flora II. p. 662: subordo Euphorbiacear. Tribus: Phyllantheae, Buxeae.

Disporocarpa Meyer 1841. Ind. sem. h. Petrop. VIII. p. 52.
Endl. 1843. Spl. III. p. 84. n. 4610 *f:* sect. Crassulae.
Rich. 1847. Fl. abyssin. I. p. 307: g. Crassulacear.
Synon. Combesia Rich.

Disporum Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 331: nov. g. Uvularear. (Uvularia chinensis Ker.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199.
D. Don 1825. Nepal. p. 50: g. Liliacear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XXX. 370.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1348: g. Methonicear.
Bartl. 1830. Ord. p. 51: g. Colchicaceis aff.
Endl. 1837. Gen. n. 1082. p. 136; 1841. Ench. p. 79: g. Veratrear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 235. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 82.
D. Don 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 513: g. Melanthacear. *Cf.* Ann. nat. hist. IV. 1840. p. 281 et Endl. Spl. II. Add. p. 104.
Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1714: g. Uvulariear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 206. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 551.
Synon. Drapiezia Blume; Lethea Nor.

Dispositae Rchb. 1841. Nomencl. p. 100: div. Synantherear. Subdivis.: Ambrosieae, Iveae, Calycereae.

Dissanthelium Trinius 1837. Linnaea X. p. 305: nov. g. Graminear., a Meisn. Comm. p. 325 Poae insertum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Steud. 1854. Glum. I. p. 263: g. Festucacear.

Dissochaeta**) Blume 1831. Flora II. p. 492: nov. g. Miconiear. Sect.: Dissochaeta, Diplectria. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 782. Sect. caed. — Meisn. 1838. Gen. p. 113 (81). — Endl. 1840.

*) δίς, σφήν, clava.
**) δισσός, duplex; χαίτη, seta.

Dissochaeta Blume cont.
Gen. n. 6246. p. 1218; 1841. Ench. p. 647. Sect.: Eudissochaeta, Diplectria. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1459. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6754. — Walp. 1843. Rep. II. p. 144. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 82.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 35: g. Marumiear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 69: g. Dissochaetear. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 870. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 521.

Dissochaeta Blume 1831. Flora II. p. 493: sect. Dissochaetae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 782.
= Eudissochaeta Endl.

Dissochaeteae Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 67 (sphalm. *Dissocheteae*): subtrib. Miconialium. Gen.: Dissochaeta, Dalenia, Omphalopus, Marumia, Driessenia, Bredia, Medinilla, Diplogenea, Dactyliota, Hypenanthe, Triplectrum, Erpetina, Pachycentria, Pogonanthera, Aplectrum, Anerincleistus, Oxyspora, Ochthocharis, Homocentria, Allozygia, Allomorphia, Macrolenes, Carionia, Sarcopyramis, Veprecella. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 870.

Dissodon Greville & Arn. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 461. t. 13: nov. g. Splachnoidear. (Weissia splachnoides Sw.) — Par. Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 229.
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 601 *a:* sect. Aplodontis.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Splachnear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 90. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402.
Bruch & Schimp. 1844. Bryol. eur. Fasc. 23. 24: g. Splachnacear. — Par. C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 137. Sect.: Systylium, Cyrtodon. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 93. Sect. eaed. — Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 373.

Dissolaena Lindl. vid. *seq.*

Dissolena*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 137. Ed. Willd. p. 170: nov. g. Pentandr. Monogyn. (D. verticillata.) — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 358.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLVIII. 522. n. 802: g. Apocynear.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3567: g. Cerberear. ?
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 99: g. Alyxiear.
Endl. 1838. Gen. p. 586; 1841. Ench. p. 295: g. Apocynacear. dubium. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 83 (*Dissolaena*).
Meisn. 1840. Gen. p. 263 (172): g. Ophioxylear. ?

Dissolena Lour. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5221: g. Carissear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 318: g. Verbenacear. („ex DC. mss., qui plantam vidit.“) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664 (*Dissolaena*).

Dissomeria Benth. 1849. Niger Fl. p. 362: nov. g. Homalinear. (D. crenata.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 278.

Dissorhynchium Schauer 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 434: nov. g. Ophrydear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 62. n. $1525/_1$. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180 (*Dyssorhynchium*).

Dissorrhynchium Wittst. Etym. Handw. p. 295: vid. *praeced.*

Dissothrix A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 223. t. 5: nov. g. Eupatoriacear. (Stevia imbricata Gardn.)
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 160: g. Eupatoriear.

Dissotis Benth. 1849. Niger Fl. p. 346: nov. g. Osbeckiear. (Osbeckia grandiflora Sm.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 602.

Distachya Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 68: sect. Ischaemi.

Distandra Link vid. *Disandra Linn.*

Distasis**) DC. 1836. Prodr. V. p. 279: nov. g. Diplopappear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2324. p. 377; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 185 (126). — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3279. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Asterear. verar.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.

Distaxia Presl 1850. Epimel. bot. p. 470: nov. g. Blechnear. (Blechnum fraxineum W.)

Disteganthcae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 23. 24: div. Diaphoranthemear. Gen.: Disteganthus.

Disteganthus Lemaire 1847. Fl. d. serr. III. t. 227: nov. g. Bromeliacear. (D. basilateralis.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 839.
Beer 1857. Bromel. p. 24. 160: g. Disteganthear.

Distegocarpus**) Sieb. & Zuccar. 1846. Abh. math. ph. Cl. Ak. Münch. IV. 3. p. 226; 1846. Fl. japon. II. p. 102: nov. g. Cupuliferar., Carpino aff. *Cf.* Flora 1847. II. p. 728. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 23. n. $1842/_1$. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 633.
= Carpinus Linn.? (Blume.)

Distemma Spach 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 245: subg. Cardopatii. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 731.

Distemon G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 608: sect. Hemimeridis. (H. montana et sabulosa.)

*) *δίς*, bis; *σωλήν*, tubus: ob duplicem corollae tubum.

*) *δίστασις*, dubitatio: ob affinitatem dubiam.
**) *δίς*, *στέγος*, tectum: ob foliola involucri duo opposita fructum obtegentia.

Distemon Bouché 1844. Linnaea XVIII. p. 404: nov. g. a Canna sejunctum. (Canna denudata Rosc. etc.)

Distemon Weddell 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 398: nov. g. Australinear. (Australinae sp. Wedd.)

Distemones Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 49 etc.: vid. *Plantae All.*

Distephana Juss. 1805. Ann. Mus. VI. p. 396: nov. g. Passiflorear. (Tacsonia glandulosa.) — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 132. 198.

DC. 1828. Pr. III. p. 335: sect. Tacsoniae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3469 *b*; 1841. Nom. p. 131. n. 5081. 2. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 58. — Endl. 1839. Gen. n. 5101 *b*. p. 927; 1841. Ench. p. 483.

Synon. Distephia Salisb.

Distephania Steud. Nom. I. p. 521: vid. *praeced.*

Distephanus Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 151; 1819. Dict. v. 13. p. 361; 1828. v. 57. p. 341; 1830. v. 60. p. 586: nov. g. Vernoniear. (Archetypar., 1828 verar. — Conyza populifolia Lam.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 135. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39. (verar.)

Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2195: g. Eupatorinar.

DC. 1836. Pr. V. p. 74: g. Heterocomear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2215. p. 360; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 176 (123). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 83.

Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3879: g. Pacourinear.

Synon. Vernoniae sp. Less.

Distephia Salisb. mss.

= Distephana Juss.

Disterigma*) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 57: subg. Vaccinii. (V. empetrifolium, ternifolium, etc.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1097.

Distichactis**) Endl. 1838. Gen. n. 2353 *a*. p. 381; 1841. Ench. p. 234: sect. Myriactidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3246. 1.

Disticheia Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 62; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Bromus pinnatus L.)

= Brachypodium Palis.

Distichia Brid. 1822. Meth. musc. p. 137; 1827. Bryol. un. II. p. 238: sect. Neckerae. *Cf.* Dict. 1825. v. 34. p. 323. — Par. Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 215. — Endl. 1836. Gen. n. 575 *c*. p. 55; 1841. Ench. p. 32. (*Synon. Cryptopodia Röhl.*) — Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 953. 1.

Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 546: g. Fontinaloideor.

= Euneckera et Distichia C. Müll.

---

*) στήριγμα, fundus, fulcrum.
**) δίστιχος, biseriatus.

Distichia Nees & Meyen 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 128: nov. g. Juncacear. (D. muscoides.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 192. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 879.

Steud. 1855. Glum. II. p. 309: g. Juncear.

Distichia C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 147: sect. Pilotrichi. (Distichiae Brid. pars.)

Distichiaceae C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 40: trib. Acrocarpor. Gen.: Distichium, Eustichia.

Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 118: subsect. Desmatodontear. Gen.: Distichium.

Bruch, Schimp. & Gümb. 1849. Bryol. eur. Fasc. 42: fam. Muscor. Gen.: Distichium, Eustichium.

Distichis „Pet.-Thouars" Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 181: g. Liparidar. — Par. Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 169.

Distichium Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 18—20: nov. g. Trichostomacear. — Par. Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 380. — Bayrh. 1849. Taun. p. 9 (*Distichum*).

C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 40: g. Distichiacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 118. — Bruch et Schimp. 1849. Bryol. eur. Fasc. 42.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: g. Trichostomear. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 73.

Distichlis Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 104: nov. g. Graminear. (Uniola spicata L.)

= Poae sect. Aeluropus Trin.

Distichmus Endl. vid. *Dichismus Rafin.*

Distichophyllum Dozy & Molkenb. 1846. Musc. fr. ined. t. 33—35: nov. g. Muscor., ab Hookeria separatum. *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 938.

= Mniadelphus C. Müll.

Distichum Bayrh. vid. *Distichium Br., Sch.*

Distictis „Mart. herbar. sect. Eubignoniae" DC. 1840 in Meisn. Gen. pl. vasc. p. 300 (208); 1845. Prodr. IX. p. 191: g. Eubignoniear.

Endl. 1841. Ench. p. 347. n. 4124 *f*: sect. Bignoniae.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677: g. Bignoniacear.

Distigmatia L. C. Rich. 1810 in Prael. publ. teste Cassini 1823. Dict. v. 26. p. 224: ordo Synantheriae. Sect.: Corymbiferae, Cichoraceae.

Distimum Rafin. Steud. Nom. I. p. 521: leg. *Distimus.*

Distimus Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 105: nov. g. a Cypero L. disjunctum. (C. flavescens, flavicomus, etc.)

= Cyperi Linn. pars.

Distinax Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 83): subg. Caricis. (Stigm. 2; fructus triqueter.)

= Caricis Linn. pars.

Distomaea Spenner 1829 (?) Fl. friburg. III.

= Neottia Linn.

Distrepta*) Miers 1826. Trav. in Chile II. p. 529.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 21: inter genera nondum descripta.

Distreptus Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 66; 1819. Dict. v. 13. p. 366: nov. g. Vernoniear. (Elephantopus spicatus.) — Par. Less. 1829. Linnaea IV. p. 327. — Bartl. 1830. Ord. p. 135. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39. (verar.)
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 342; 1830. v. 60. p. 586. 601: g. Elephantopear. — Par. Less. 1831. Linnaea VI. p. 690. — DC. 1836. Pr. V. p. 87. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123).
Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2194: g. Eupatorinar.
Less. 1832. Syn. p. 149: g. Elephantopodear.
= Pseudelephantopus Rohr.

Distylis Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 460. t. 80: nov. g. Goodenoviar. (D. Berardiana.)
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2779: g. Goodenoviear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 148.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 726: g. Goodeniear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 103. n. 4011. — Endl. 1838. Gen. n. 3045. p. 508; 1841. Ench. p. 261. — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (146). — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 517. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 584. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 695. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 86. — Vriese 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 178.

Distylium Sieb. & Zuccar. 1835. Fl. japon. I. p. 178. t. 94: nov. g. Hamamelidear. (D. racemosum.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 70. n. 4593/$_1$: g. Fothergillear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 359. — Walp. 1843. Rep. II. p. 435.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 784: g. Hamamelear.
Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 323: g. Parrotiear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 837.

Distylium Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 173: sect. Grossulariae. (Ribes aciculare Sm., Grossularia L., etc.)

Disynanthes „Rafin." Rchb. 1828. Consp. p. 106. n 2486: g. Buphthalmear.? (Nomen.) *Cf.* Rchb. Nomencl. (synon.) p. 39.
: seq.

Disynanthus Rafin. mss.
= Antennariae sect. Catipes DC.

Disynapheia Steud. vid. *seq.*

Disynaphia**) DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 267: nov. g. Adenostylear. *Cf.* Steud. Nom. I. p. 521 (*Disynapheia*). — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 181 (124). — Endl. 1841. Spl. I. n. 2268/$_2$. p. 1380; 1841. Ench. p. 233. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3840. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.

Disynaphia DC. cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37: g. Eupatoriear. (verar.) — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 86.

Ditassa R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 49 (Verm. bot. Schr. II. p. 387): nov. g. Asclepiadear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 484; 1827. Cur. post. p. 52; 1830. Gen. I. p. 212. n. 1086. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XII*. 112. — Mart. & Zucc. 1824. Flora I. Beil. p. 133; 1824. Nov. gen. I. p. 50. t. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 203. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 906. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3443: g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 155: g. Asclepiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3459. p. 591; 1841. Ench. p. 298: g. Ditassear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 267 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 5008. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 86.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 574: g. Ditassar.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 68. t. 277.

Ditassae Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 574: div. Asclepiadear. verar. Gen.: Ditassa, Tassadia.

Ditasseae Endl. 1838. Gen. p. 590: sect. Cynanchear. Gen.: Eustegia, Sarcostemma, Philibertia, Doemia, Ditassa. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1397 et Ench. p. 298) Decanema.
Meisn. 1840. Gen. p. 267 (174): subtrib. Cynanchear. Gen. ut Endl. 1841.
Rchb. 1841. Nom. p. 129: subdiv. Asclepiariar. Sect.: *genuinae* (gen. Endlicheriana excepta Eustegia), Eustegieae.

Ditaxia Rafin. 1814. Somiol. p. 13.
Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4587. 2 (*Ditaxis*): sect. Celsiae.
Pseudothapsus Benth. (Endl. Gen. p. 671.)

Ditaxis*) „Vahl" A. Juss. 1824. Euphorb. p. 27; 1849 in Orb. Dict. V. p. 86: nov. g. Euphorbiacear. *Cf.* Ann. sc. nat. I. 1824. p. 152. — Par. HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 169. t. 639. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 204.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 912. n. 3202; 1831. Gen. II. p. 699. n. 3525: g. Tricoccar.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5042: g. Ricinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 487.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Crozophorear.
Endl. 1840. Gen. n. 5832. p. 1118; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7388. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.

---

*) στρεπτός, tortus, volutus.
**) συνάφεια, series.

*) τάξις, ordo.

Ditaxis Vahl cont.
Meisn. 1841. Gen. p. 340 (253): g. Eucrotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 298: g. Jatrophidear.

Ditaxis „Rafin." Rchb. vid. *Ditaxia Rafin.*

Ditheca Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 304: subg. Ammanniae.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 615: g. Lythrear. = Corneliae Ard. pars. (Endl. Gen. p. 1200.)

Ditheca Steetz 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 216: sect. Tetrathecae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 69.

Dithrichum DC. vid. *Ditrichum Cass.*

Dithyraea Endl. vid. *seq.*

Dithyrea Harvey 1845. Lond. journ. bot. bot. IV. p. 77. t. 5: nov. g. Cruciferar., Biscutellae aff. (D. californica.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 38; 1853. Ann. bot. III. p. 821: g. Thlaspidear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 35. n. 4889/1 (*Dithyraea*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Thlaspidar.
Engelm. 1848. Bot. of Wisliz. exp. p. 11 adnot. Char. emend.

Dithyria Benth. . . . sect. Swartziae ex Lindl. Veg. kingd. 1847. p. 556.
= Trischidium Tul.

Dithyrocarpus*) Kunth 1841. Ber. Ak. Berl. p. 245; 1843. Enum. IV. p. 76; 1844. Abh. Berl. Ak. (1846) p. 85: nov. g. Commelynear. (Tradescantia paniculata Roxb.)
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 122: g. Commelinacear. — Par. Seub. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XV. p. 254.
= Floscopa Lour.? (ex Hassk.)

Dithyrostegia**) A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 100: nov. g. Angianthear. (D. amplexicaulis.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 262.
Synon. Gamozygis Turczan.

Ditiola Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 169; 1828. Elench. II. p. 17: nov. g. Dermear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 572: g. Pezizear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73.
Fries 1825. Pl. homon. p. 86: g. Claviculariım. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 424. p. 37; 1841. Ench. p. 20. — Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 442.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: g. Helvellaceor.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 990: g. Cupulator.
Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 310: g. Claviculator.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 766. n. 3920: g. Utrinor.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 546: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 33: g. Tubercularinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 71. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 56. — Bonord. 1851. Hdb. p. 133.

Ditiola Fries cont.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 39; 1842. Mycol. p. 163: g. Tuberculariacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 363: g. Dermateor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.
Synon. Helotii sp. Nees. Conf. Tubercularia Tode.

Ditmaria Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 45: g. Hypepidermidocarpor.

Ditmaria*) Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 704; 1825. Syst. I. p. 16. n. 18: nov. g. Onagrar. (desciscentium. — Monandr. Monogyn. — Erisma floribundum Rudge.) *Cf.* Spreng. 1827. Cur. post. p. 4.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 8. n. 19: g. Vochisiear.
Erisma Rudge.

Ditoca „Banks mss." Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 196. t. 126. f. 1 (muscosa. — Mniarum biflorum.)
= Mniarum Forst.

Ditomocladia**) Trevisan 1842. Att. IV. Riun. Ital. p. 333.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 103: g. Sporochnear.

Ditomostrophe Turczan. 1846. Bull. soc. Mosc. XIX. 2. p. 498: nov. g. Byttneriacear. *Cf.* Flora 1848. I. p. 299 et Bot. Zeit. 1848. p. 354.
Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 363: g. Lasiopetalear. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 106.
= Thomasia Gay. (ex ipso Auctore 1852.)

Ditoxia „Rafin. in Desv. journ. bot. IV. p. 270" Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 369: novum gen. pro Celsia cretica L. institutum. *Vid.* Ditaxia Rafin.

Ditrachyceros Sulz. 1802. Beschr. Eingeweidew. *Cf.* Eschricht 1841 in Müll. Arch. p. 437; Endl. Suppl. II. p. 30 et Orb. Dict. V. p. 87.
= Mori fructus cum stigmatibus.

Ditrichium Timm 1788. Fl. megap. n. 777. (*Ditrichum* ex Wittst. Etym. Handw. p. 296.)
= Didymodon Hedw.

Ditrichum Cassini 1817. Bull. soc. philom. Févr. p. 33; 1818. ibid. p. 59; 1819. Dict. v. 13. p. 371; 1825. v. 38. p. 17: nov. g. Helianthear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2625. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19. (verar.)
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 137; 1830. v. 60. p. 576: g. Spilanthear.
DC. 1836. Pr. V. p. 619 (*Dithrichum*): g. Verbesinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2551. p. 415; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 200 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3154. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Synon. Spilanthi sp. Less.

---

*) *δίθυρος*, duas januas s. portas (valvas) habens.
**) *δίθυρος*, bivalvis; *στέγη*, tectum.

*) Dicat. mycologo L. P. F. Ditmar, Rostock.
**) *διτομός*, bis sectus.

Ditrichum „Timm" Wittst. vid. *Ditrichium Timm.*

Ditroche E. Meyer mss. in pl. Dreg. = Semonvillea Gay.

Dittanthera*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 650: sect. Conradiae. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 525.

Dittmaria Endl. in synon. Erismatis: vid. *Ditmaria Spreng.*

Diuridae Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 442. 506; 1847. Veg. kingd. p. 183: div. Neottear. Gen.: Diuris, Orthoceras, Prasophyllum, Burnettia, Genoplesium. *Cf.* Duchart. 1849. in Orb. Dict. IX. p. 172.
Endl. 1841. Ench. p. 113: div. Neotticar. Gen. ead.

Diurideae Meisn. 1842. Gen. pl. vasc. p. 387 (289): subtrib. Neottiear. Gen. Diuridar. Lindl.
Endl. 1842. Spl. II. p. 21: div. Neottiear. Gen. ead.

Diuris Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 222: nov. g. Orchidear. — Par. Swartz 1800. Act. Holm. p. 229. t. 3; 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 58. t. 1. f. M. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 163. — Pers. 1807. Ench. II. p. 512. n. 1987. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 315. Ed. Nees p. 171; 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 198. (Verm. bot. Schr. II. p. 21.) — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 373. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 711. n. 2964; 1831. Gen. II. p. 661. n. 3331.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 79. n. 1600: g. Gynandr. Monandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 294: g. Coniopagar. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 189. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528): g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1419; 1841. Nom. p. 55. n. 2151. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 216. n. 1584. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 89.
Lindl. 1840. Orchid. p. 506; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Diuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1581; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 11.
Meisn. 1842. Gen. p. 387 (289): g. Diuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 21.

Diuroglossum Turczan. 1852. Bull. soc. Mosc. Nr. 3. p. 157: nov. g. Büttneriaceear., ad Herraniam et Büttneriam accedens. *Cf.* Flora 1853. p. 735.

Diurospermum Edgeworth 1848. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. I. p. 381: nov. g. Lentibulariar.

Dizonium Willd. herbar. = Geigeria Griess.

Dizygandra Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 294 (203): nov. g. Ruelliear. (Ruellia ovata et strepens W.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 62. n. $4043/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar. = Dipteracanthus Nees.

*) *διττός*, geminus.

Dizygostemon Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 379: sect. Beyrichiae.

Dobera Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. II. p. 379: g. Monadelph. Tetrandr.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 380: g. Tetrandr. Monogyn.
Endl. 1841. Gen. n. 6883. p. 1332; 1841. Ench. p. 685: g. dialypetalum minus cognitum. *Cf.* Meisn. 1843. Comm. p. 372.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 191: g. Salvadoracear. Injungitur Schizocalyx Hochst.
= Doberia Juss.

Doberia*) Juss. 1789. Gen. p. 425: g. Guttiferis, Berberidibus, an Rhamneis affinius?
Synon. Tomex Forsk.; Dobera St. Hil.; Dovera Ehrenb.?; Schizocalyx Hochst.

Dobinaea Spreng., Lemr. vid. *seq.*

Dobinea „Hamilt. mss." D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 249: nov. g. Acerinar. (D. vulgaris.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 890. n. 3153 *(Dobinaea)*; 1831. Gen. II. p. 700. n. 3535. (Monoec. Monadelph.)
Bartl. 1830. Ord. p. 361: g. Acerineis aff. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 84.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 651: g. Acerinear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40). — Endl. 1840. Gen. n. 5560. p. 1056; 1841. Ench. p. 555.
Rchb. 1841. Nom. p. 198. n. 7576: g. Acerear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 387: g. Aceracear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 92 *(Dobinaea)*.

Dobrowskia A. DC., Rchb. vid. *seq.*

Dobrowskya Presl 1836. Prodr. Lobel. p. 8; 1837 in E. Meyer Comm. pl. Afr. II. p. 283: nov. g. Lobeliear. (Lobelia unidentata Ait.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 102. n. 3985 *(Dobrowskia)*. — Endl. 1838. Gen. n. 3056. p. 510; 1841. Ench. p. 263 *(Dombrowskya)*. — A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 355 *(Dobrowskia)*. — Meisn. 1839. Gen. p. 240 (147). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 92.
Brongn. 1843. En. genr. p. 31 *(Drobowskia)*: g. Lobeliacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693 *(Dombrowskya)*: g. Lobelear.
Synon. Lobeliae sp. Thunb.; Parastranthi sp. Don.

Dochafa**) Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 24: nov. g. Dracunculinar.? (Arum flavum Forsk.)

Docidium***) Bréviss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 711 (nomen); 1849. ibid. V. p. 92: nov. g. Desmidiear. (Closterii spec.)
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 168: sect. Penii.
Synon. Diodium Ralfs; Pleurotaenium Näg.?

*) *Dober* Arabum.
**) Arabice *Dochaf* ex Forsk.
***) *δοκίδιον*, tigillum.

Docradia Hübener 1833. Muscol. germ. p. 521: sect. Polytrichi. (An sphalm.? pro *Dorcadia Wallr.)*
= Pogonatum Brid.

Dodartia*) Tourn. 1700. Inst. Cor. p. 47. t. 478: g. pl. class. III.
Linn. 1737. Gen. p. 182. n. 506; 1737. Cliff. p. 326; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 633; 1759. Syst. ed. X. p. 1119. n. 698; 1763. Sp. ed. II. p. 883; 1764. Gen. ed. VI. p. 322. n. 780; 1767. Syst. ed. XII. p. 423: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 480; 1784. Syst. p. 574. — Reich. 1778. Gen. p. 324. n. 843. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 422. n. 1047. — Gmel. 1791. Syst. p. 955. — Pers. 1797. Syst. p. 611. — Willd. 1800. Sp. III. p. 355. n. 1188; 1809. En. p. 655.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 181. n. 743: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 445.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 211. — Scop. 1777. Intr. p. 176. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 359. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 275. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 381. — Link 1822. En. II. p. 144.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Acanthor.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 200: g. Ringentium.
Hill 1769. Ht. kew. p. 272: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 245. t. 53. f. 3 (orientalis).
Juss. 1789. Gen. p. 119: g. Scrophulariar.
Neck. 1790. El. I. p. 337. n. 524: g. Chasmatophytor.
Pers. 1807. Ench. II. p. 164. n. 1479: g. Antirrhinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 399; 1825. Syst. II. p. 815. n. 2201; 1831. Gen. II. p. 496. n. 2444: g. Scrofularinar. — Par. Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 449.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVII; 1828. Consp. p. 121. n. 3061: g. Orobanchear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 3: g. Gratiolear. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 542. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199. — Endl. 1839. Gen. n. 3930. p. 680; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Meisn. 1840. Gen. p. 311 (221). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 513. — Brongn. 1843. En. genr. p. 60. — Walp. 1845. Rep. III. p. 272. 963. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 93.
Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4632: g. Buchnerear. genuinar.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 376; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Eugratiolear. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 223.

Dodartia Ruiz & Pav. 1794. Prodr. fl. peruv. p. 56.
= Galvezia Domb.

*) Dicat. memoriae Dodarti, Galli.

Dodecadenia*) Nees 1831 in Wall. Pl. As. rar. II. p. 61; 1833. Progr. p. 19: g. Daphnidior. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1333. 1363.
Nees 1836. Laurin. p. 587: g. Daphnidinar. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2063. p. 323; 1841. Ench. p. 198.
Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239): g. Daphnidiear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 94.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 474: g. Daphnidiar.
Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2646: g. Litsaeear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.

Dodecadia**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 318. Ed. Willd. p. 390: nov. g. Icosandr. Monogyn. *(D. agrestis.) Cf.* Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 94.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 890: g. Primulear.
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5447: g. Tiliear.?
= Grewia Linn.?

Dodecandria Linn. Syst., Gen., Spec., etc. sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. XI. plantar. Ordines: Mono-, Di-, Polygynia.

Dodecas Linn. f. 1781. Suppl. p. 36. n. 1392: nov. g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 445. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 316. n. 804. — Gmel. 1791. Syst. p. 751. — Pers. 1797. Syst. p. 477; 1807. Ench. II. p. 1. n. 1153. — Willd. 1799. Sp. II. p. 841. n. 928.
Juss. 1789. Gen. p. 323: g. Myrtor.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 160: g. Myrtear. — Par. Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 80.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 706; 1825. Syst. II. p. 459. n. 1773: g. Onagrar. (descisc.)
E. Meyer 1825. Nov. Act. Leop. XII. 2. p. 800: g. Salicariear. — Par. DC. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 73; 1828. Pr. III. p. 91. — Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4571; 1841. Nom. p. 172. n. 6654. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 722. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 409. — Meisn. 1838. Gen. p. 118 (84).
Spreng. 1830. Gen. I. p. 391. n. 1962: g. Salicariar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 15.
Endl. 1840. Gen. n. 6154. p. 1202; 1841. Ench. p. 643: g. Eulythrariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lythrear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 94.

Dodecaspermum Scopoli 1777. Introd. p. 219: g. Calycanthemar.
= . . . ?

Dodecastemon Hasskarl 1857. Flora II. p. 533: nov. g. Euphorbiacear., cum Macaranga comparatum. (D. Teysmanni.)
Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 27. 63: g. Buxear.

*) δώδεκα, duodecim; ἀδήν, glandula: glandularum in flore numerum insigniens.
**) Nomen a duodecim partibus corollae et calycis.

Dodecatheon*) Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 16; 1753. Sp. I. p. 144; 1759. Syst. ed. X. p. 918. n. 183; 1762. Sp. ed. II. p. 207; 1764. Gen. ed. VI. p. 81. n. 200; 1767. Syst. ed. XII. p. 151 *(Dodechateon)*: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 163; 1784. Syst. p. 194. — Reich. 1778. Gen. p. 83. n. 213. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 107. n. 261. — Curt. 1790. Bot. Mag. I. t. 12. — Gmel. 1791. Syst. p. 328. — Pers. 1797. Syst. p. 200; 1805. Ench. I. p. 170. n. 383. — Willd. 1797. Sp. I. p. 808. n. 297; 1809. En. p. 192. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 119.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Preciar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 347.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 97.

Gled. 1764. Syst. p. 206. n. 854: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 426.

Hill 1769. Ht. kew. p. 140: g. Monopetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 186: g. Speciosar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 232. t. 50. f. 9 (Meadia).

Neck. 1790. El. II. p. 29. n. 655: g. Darinyphytor.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 291: g. Primulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 222. — DC. 1805. Franç. III. p. 452. — Hedw. 1806 Gen. p. 96. n. 434. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XIV. 131. n. 656. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 182 *(Gyroselle)*. — Link 1821. En. I. p. 159; 1829. Hdb. I. p. 416. — Bartl. 1830. Ord. p. 166. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 346.

Batsch 1802. Tab. p. 207: g. Primulariar.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 384; 1825. Syst. I. p. 573. n. 614; 1830. Gen. I. p. 141. n. 705: g. Primulear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 642. — Brongn. 1843. En. genr. p. 69. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 55. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 22.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 128. n. 3357: g. Androsacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4202. p. 731; 1841. Ench. p. 356. — Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 94.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Cyclaminear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 124. n. 4831: g. Cortusear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645: g. Primulidar. *Synon.* Meadia Catesb.

Dodechateon Linn. 1767 vid. *Dodecatheon.*

Dodonaea**) (Plumier 1703. Nov. gen. p. 20. t. 12: nov. g. plant. An huc?)

Linn. 1737. Gen. p. 341. n. 855; 1737. Cliff. p. 144; 1740. Syst. p. 22; 1742. Gen. ed. II. p. 159. n. 371; 1771. Mant. II. p. 149. n. 1303: g. Octandr. Monogyn. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 207 *(Dodonea)*. — Jacq. 1763. Amer. p. 109. — Murr. 1774. Syst. p. 299; 1784. Syst. p. 362. — Reich. 1778. Gen. p. 194. n. 520. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 257. n. 654. — Pers. 1797. Syst. p. 386; 1805. Ench. I. p. 415. n. 939. — Willd. 1799. Sp. II. p. 343. n. 761; 1809. En. p. 412. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 256.

Gled. 1749. Berl. V. p. 122: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 358.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Terebintor.

Adans. 1763. Fam. II. p. 342: g. Pistaciar.

Rüling 1774. Ord. pl. p. 34: g. Aceres et Pistacias conjungens.

Scop. 1777. Intr. p. 335: g. Defloratar.

Juss. 1789. Gen. p. 375: g. Terebintaceis aff. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 455. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 260. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 385.

Neck. 1790. El. II. p. 189. n. 909 *(Dodonea)*: g. Aclithrophytor.

Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar. et p. 66 Terebinthinacear.

Cram. 1803. Disp. p. 78 in Hexandr. Monogyn., p. 183 in Monoec. Polyandr. et p. 197 in Dioec. Octandr.

Hedw. 1806. Gen. p. 281. n. 1128 *(Dodonea)*: g. Terebintacear.

Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 477: g. Sapindacear. — Par. Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 392. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1305. — Brongn. 1843. En. genr. p. 87. — Miq. 1844. Linnaea XVIII. p. 94; 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 225. Sect.: Eu-Dodonaea, Remberta. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 38.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 694: g. Acerum.

Link 1821. En. I. p. 381: g. Terebinthacear.

HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 132: g. Dodonaeacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 167. — DC. 1824. Pr. I. p. 616. — Rchb. 1828. Consp. p. 201. n. 5226. — Camb. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 35. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48 *(Dodonea)*. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 673. — Link 1831. Hdb. II. p. 442. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 114. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 68. — Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 255. — Endl. 1840. Gen. n. 5626. p. 1073; 1841. Ench. p. 561. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 381.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 242. n. 1481; 1830. Gen. I. p. 318. n. 1620: g. Sapindear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 198. n. 7583: g. Dodonaeear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 95.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385: g. Dodonear.

Dodonaea Plumier 1755. Amer. ed. Burm. t. 118.
= Comocladia P. Browne.

*) Herba Plinii aetate sic dicta a XII diis. Planta plerumque flores duodecim habet, qui tamquam XII dii in throno sedent.

**) Dicat. Remberto Dodonaeo, Archiatro.

Dodonaeaceae HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 130: sect. Sapindacear. (An fam. distincta?) Gen.: Llagunoa, Dodonaea. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 166. — Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 589. — Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 13. 33. Gen.: Kölreuteria, Cossignia, Llagunoa, Dodonaea. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. Gen. ut DC. et Phaeocarpus. — Blume 1850. Rumphia III.
DC. 1824. Pr. I. p. 615: trib. Sapindacear. Gen.: Kölreuteria, Amirola, Dodonaea, Alectryon. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. Gen.: Dodonea, Kölreuteria. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 672. Gen.: Kölreuteria, Cossignia, Llagunoa, Dodonaea, Magonia, Alectryon. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 41. 66. Gen. ut Cambess. — Mein. 1837. Gen. p. 53 (38). Gen. ut G. Don et Euceraea, Pierardia?, Xanthoceras?, Eystathes?, Valentinia?, Valenzuelia, Symphorema?, Pedicellia? — Endl. 1840. Gen. p. 1072; 1841. Ench. p. 561. Gen. ut Don (Diplopeltis loco Magoniae). *Anomala:* Plösslea, Xanthoceras, Magonia. Accedit 1850 (Spl. V. p. 79) Ophiocaryon. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 349. Gen. ead.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: subdiv. Sapindacear. Gen. ut DC. excepto ultimo.
Rchb. 1828. Consp. p. 201: subdiv. Sapindear. Gen. ut DC. et Phaeocarpus, Heterodendron?, Empleurum, Eustathes?, Racaria?, Ratonia?, Harpullia?
Link 1831. Hdb. II. p. 441: ordo 15 Apetalar. Gen.: Dodonaea.

Dodonaeariae Rchb. 1832. Fl. exc. p. 768: subdiv. Sapindacear.
= Dodonaeaceae Rchb.

Dodonaeeae Rchb. 1837. Handb. p. 285: subdiv. Sapindacear. Gen. Dodonaeacear. Rchb. 1828 et Cossignia, Diplopeltis, Magonia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 198. Gen. Dodonaeacear. Endl. et Ungnadia.

Dodonea P. Browne, Neck., Hedw., Dumort. vid. *Dodonaea Linn.*

Dodoneae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 385: subordo Sapindacear. Gen. Dodonaeacear. Endl. et Ophiocaryon.

Döllia Schultz Bip. 1842. Flora I. Beibl. p. 134 (nomen); 1843 in Walp. Repert. II. p. 953: nov. g. Dölliear. (Blumeae sp. DC.?)

Döllieae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 953: subdiv. Euconyzear. Gen.: Döllia.

Döllingeria*) Nees 1833. Aster. p. 177: nov. g. Asterum genuinor. (Aster amygdalinus Lam., scaber, etc.)
DC. 1836. Pr. V. p. 263: g. Euasterear. emend. (Typus: Aster scaber Thunb.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2314. p. 375; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (126). — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952 (*Heleastrum DC.*)

*) Dicat. Thom. Döllinger, peregrinatori.

Döllingeria Nees cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 260: g. Asterear. (verar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3301. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.

Doemia R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 50 (Verm. bot. Schr. II. p. 387): nov. g. Asclepiadear. (Asclepias cordata Forsk.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 203. — Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 59. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3444: g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539.
Endl. 1838. Gen. n. 3458. p. 591; 1841. Ench. p. 298: g. Ditassear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 267 (175). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 5009. (genuinar.)
Synon. Daemia Poir.; Dimia Spreng.; Cynanchi sp. Forsk.; Pergulariae sp. Lam.

Dörriena Borckh. . . . . Fl. Katzenellb.
= Mönchia Ehrh.

Dörrienia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 31: nov. g. plant. (*Perin-Panel Rheede* V. t. 15.)
= Acronychia Forst.

Dörrienia*) Rchb. 1841. Nomencl. p. 117. n. 4577: g. Utriculariear.
= Genlisea St. Hil.

Dofia Adans. 1763. Fam. II. p. 285: g. Thymelaear.
= Dirca Linn.

Dolia**) Lindl. 1844. Bot. Regist. adnot. ad t. 46; 1847. Veg. kingd. p. 654: nov. g. Nolanacear. (D. vermiculata et salsoloides.) *Cf.* Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 209.
Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 502. Char. ampliat.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 549: g. Nolanear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 15: g. Nolaninear.

Dolichandra Chamisso 1832. Linnaea VII. p. 657: nov. g. Bignoniacear. (D. cynanchoides.)
Endl. 1839. Gen. n. 4118 *a.* p. 712; 1841. Ench. p. 346: sect. Spathodeae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130: g. Bignoniear.
Fenzl 1841. Denkschr. Regensb. Ges. III. p. 265.
Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4553: g. Tecomear.

Dolichites Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 244; 1846. Chlor. protog. p. LXXXV: g. Papilionacear. foss.

Dolichlasium***) Lagasca 1811. Amen. nat. I. p. 33: nov. g. Chaenanthophorar.
DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 66: g. Labiatiflorar. — Par. Don 1832. Edinb. n. phil. mag. (*Cf.* Flora Lit. III. p. 153.)
Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 406; 1824. v. 33. p. 463; 1830. v. 60. p. 584: g. Mutisiear. (1824 Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2271. — Bartl. 1830. Ord. p. 137.

*) Dicat. Cathar. Helenae Dörrien.
**) *δόλιος*, fallax: ob habitum alienum.
***) *δολιχός*, longus; *λάσιος*, hirsutus.

Dolichlasium Lagasca cont.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 72: g. Trixidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2961. p. 492; 1841. Ench. p. 249. — Meisn. 1839. Gen. p. 232 (143). — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3761. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 97 *(Dolicholasium)*.

Dolichodeira Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 205: nov. g. Ligeriear. (Gloxinia tubiflora Hook.)

Dolichogyne DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 256: g. Compositar. incertae sedis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3032/4. p. 1389; 1841. Ench. p. 251. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 98.
Meisn. 1839. Gen. p. 228 (141): g. Barnadesiear.? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3804. (genuinar.?)
Rémy 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 184: g. Asteroidear., Chiliotricho aff.

Dolicholasium Spreng. (in synon. Leriae) et Lemaire vid. *Dolichlasium Lag.*

Dolicholus Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 81: nov. g. plant. (Dolichos minimus L.)
= Rhynchosiae sp. DC.

Dolichonema Nees 1821. Flora I. p. 303: nov. g. Leguminosar., Bactyrilobio et Tachiae proximum. *(Dolichonemia* Steud. Nom. I. p. 522.)
= Moldenhawera Schrad.

Dolichonemia Steud. Nom. vid. *praeced.*

Dolichos*) Linn. 1737. Gen. p. 222. n. 588; 1737. Cliff. p. 360; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 214; 1753. Sp. II. p. 725; 1759. Syst. ed. X. p. 1162. n. 778; 1763. Sp. ed. II. p. 1018; 1764. Gen. ed. VI. p. 372. n. 867; 1767. Syst. ed. XII. p. 482: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 547; 1784. Syst. p. 657. — Reich. 1778. Gen. p. 372. n. 941. — Lour. 1790. Coch. II. p. 436. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 494. n. 1181. — Gmel. 1791. Syst. p. 1102. — Pers. 1797. Syst. p. 694; 1807. Ench. II. p. 296. n. 1703. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1037. n. 1349; 1809. En. p. 754. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 112. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 51. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 300.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 133. n. 550: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 308. — Juss. 1789. Gen. p. 356. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 402. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 224. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 752; 1826. Syst. III. p. 248. n. 2563; 1831. Gen. II. p. 585. n. 2876. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 399. — Link 1822. En. II. p. 233.
Hill 1769. Ht. kew. p. 291: g. Tetrapetalar. irregular.
= Dolichos et Lablab Adans.

*) Nomen Theophrasti, pro synonyma Phaseoli habitum (Ht. Cliff.)

Dolichos Adans. 1763. Fam. II. p. 325: g. restrictum Phaseolor.
Mönch 1794. Meth. p. 154: g. Thalamostemonis. Distinguitur Soja.
Savi 1822. Osserv. sopra i generi Phaseolus e Dolichos p. 15.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 396. Sect.: Eudolichos, Catiang, Unguicularia. — Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3490; 1841. Nom. p. 149. n. 5777. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — Link 1831. Hdb. II. p. 179. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 357. Sect. ut DC. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 329. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 131. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 438.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 439: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 100. — D. Don 1825. Nepal. p. 240.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 247: g. Euphaseolear. — Par. Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 281. — Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 534. — Endl. 1841. Gen. n. 6676. p. 1297; 1841. Ench. p. 672. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 182. Sect.: genuinae, Adenophorus. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 563.
Synon. Dolichus E. Meyer, Meisn.

Dolichos Medic. (Vorles. II. p. 353) 1789. Phil. Bot. I. p. 205: g. restrict. (D. sinensis L., etc.)

Dolichos Necker 1790. Elem. bot. III. p. 44. n. 1361: g. Cyteophytor., emissis Hornera et Psophocarpo a Linnaeano discrepans.

Dolichos Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 322. t. 150.
= Lablab Adans.

Dolichospermum Thwaites 1850. Ann. nat. hist. V. p. 331: nov. g. ex typo Cylindrospermi Ralfsii Kütz. et Anabainae floris aquae Harv.
Kütz. Tab. phycol. t. 77—79: genus adoptat, injunctis nonnullis Cylindrospermi speciebus.

Dolichostylis Cassini 1828. Dict. v. 56. p. 138 *(Turpinie)*; 1830. v. 60. p. 570: nov. g. Barnadesiear. (Turpinia laurifolia Bonpl.)
= Fulcaldea Poir.

Dolichotheca Cassini 1827. Dict. v. 51. p. 476: secundum nomen pro *Campylotheca Cass.* propositum.

Dolichus E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. LIV. 140: g. Phaseolear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 94 (67).
= Dolichos Adans.

Doliocarpeae Rchb. 1837. Handb. p. 277; 1841. Nomencl. p. 191: sect. Delimear. Gen.: Doliocarpus, Empedoclea, Trachytella et 1841 Pinzonia. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413. Gen. ut Rchb. 1837.

Doliocarpus Roland. 1756. Vetensk. Ac. Handl. p. 249. t. 9: nov. gen. plant.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 348. n. 874: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791.

Doliocarpus Roland. cont.
Syst. p. 805. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 373.
Juss. 1789. Gen. p. 433: g. incertae sedis.
DC. 1818. Syst. I. p. 405: g. Delimacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 71. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (4).
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 409: g. Dilleniacear. — Par. St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 20.
DC. 1824. Pr. I. p. 69: g. Delimear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4972. — Bartl. 1830. Ord. p. 250. — Endl. 1839. Gen. n. 4761. p. 842; 1841. Ench. p. 432. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 568. n. 1883; 1830. Gen. I. p. 422. n. 2097: g. Dilleniear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 207. 220. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 101.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7270: g. Doliocarpear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413.
Synon. Calinea et Soramia Aubl.; Mappia Schreb.; Othlis Schott.

Dollinera Endl. 1841. Gen. n. 6614. p. 1285; 1841. Ench. p. 670: g. Euhedysarear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 736. — Meisn. 1843. Comm. p. 351.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5962: g. Onobrychear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 101: g. Hedysarear.
Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 225: sect. Desmodii. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 253. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 538.
Synon. Ototropis Nees & Schauer.

Dollineria Sauter 1852. Flora p. 353: nov. g. inter Alyssineas et Arabideas intermedium. (Draba ciliata Scop.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 199: g. Alyssinear.

Dolomiaea*) DC. 1833 in Guillem. Arch. bot. II. p. 330.
Royle . . . . Illustr. p. 251. t. 57.
DC. 1837. Pr. VI. p. 542: g. Carlinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2855. p. 468; 1841. Ench. p. 246. — Meisn. 1839. Gen. p. 224 (139). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 102.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10: g. Stähelinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3662: g. Arctiear.

Dolophragma**) Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 63: nov. g. Alsinear. (Cherleria grandiflora Don.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 25 (21). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Arenarinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5232. p. 966; 1841. Ench. p. 505: g. Merckiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7806. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 103.

*) Dicat. T. de Gradot de Dolomieu, prof. Paris.
**) δόλος, dolus; φράγμα, dissepimentum.

Dombeja Schreb. vid. *Dombeya Cavan.*

Dombeya L'Herit. 1784. Stirp. p. 33. t. 17. Gmel. 1791. Syst. p. 956: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 87. t. 17.
= Tourrettia (Domb.) DC.

Dombeya*) Cavan. 1786. Diss. II. App. II; 1787. III. p. 121. t. 38—42: nov. g. Monadelph. (D. palmata, etc.)
Juss. 1789. Gen. p. 277: g. Malvacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 197. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 70. — Pers. 1807. Ench. II. p. 240. n. 2621. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 411. — Link 1822. En. II. p. 200.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 704. n. 1551 *(Dombeja)*: g. Dioec. Monadelph.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 259. t. 137.
Gis. 1792. Prael. p. 451: g. Columniferar.
Willd. 1800. Sp. III. p. 724. n. 1279: g. Monadelph. Dodecandr. — Par. Roxb. 1832. Ind. III. p. 156.
Batsch 1802. Tab. p. 20: g. Festivar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 804; 1826. Syst. III. p. 79. n. 2412: g. Pentapetear.
Kunth 1821. Nov. gen. V. p. 313: g. Dombeyacear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 498. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1828. Consp. p. 204. n. 5313. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 344. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 536. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 447. — Meisn. 1837. Gen. p. 34 (27). — Endl. 1840. Gen. n. 5346. p. 1002; 1841. Ench. p. 520. — Brongn. 1843. En. genr. p. 78. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 105. — Planch. . . . . Fl. d. serr. VI. p. 225. (Char. reform.) Sect.: Eudombeya, Xeropetalum, Dombeyastrum, Pachythyrsus, Decastemon. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 325. Sect. eaed.
DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: g. Dombeyear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 291; 1841. Nom. p. 202. n. 7683. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 549. n. 2689: g. Büttnerear.
Synon. Cavanilla Gmel.

Dombeya Lamarck Illustr. t. 828.
= Araucaria Juss.

Dombeyaceae HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 313 (Kunth Malv. p. 12): sect. Büttneriacear. Gen.: Dombeya, Assonia, Ruizia, Astrapega, Pentapetes, Pterospermum, Kydia?
DC. 1824. Pr. I. p. 497: trib. Byttneriacear. Gen.: Ruizia, Pentapetes, Assonia, Dombeya, Melhania, Trochetia, Pterospermum, Astrapaea; Kydia?, Gluta? — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 535. Gen. ead. et Visenia, Maranthus. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 617. Gen. ut Endl. (Acropetalum loco Xeropetali.)
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV: div. Geraniacear. Gen.: Ruizia, Pentapetes, Dombeya, Pterospermum, Astrapaea.

*) Dicat. D. Josepho Dombey, Gallo.

Dombeyaceae HBK. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 204 (1832. Fl. exc. p. 775): subdiv. Byttnerear. Gen.: Mahernia, Hermannia, Altheria, Waltheria, Riedlea, Melochia; Pentapetes, Assonia, Dombeya, Ruizia, Melhania, Pterospermum, Trochetia; Hugonia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: trib. Hermanniacear. Gen. ut DC. (exceptis Trochetia et Gluta.)
Bartl. 1830. Ord. p. 343: ordo (199) Columniferar. Divis.: *legitimae* (gen. Dombeyacear. DC.; Hugonia? loco Glutae), Wallichieae.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 443: fam. (48) Columniferar. Divis. ut Bartl.
Meisn. 1837. Gen. p. 34 (26): trib. Büttneriacear. Gen. ut DC. et Maranthes?, Lexarza? — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1001; 1841. Ench. p. 519. Gen. ut DC. (exclusa Gluta) et Brotera, Xeropetalum, Glossostemon. Accedit 1850 (Spl. V. p. 62) Astiria.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 78: trib. Buttneriacear. Gen. ex Endl.

Dombeyaceae DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: trib. Büttneriacear. Subtrib.: Helictereae, Dombeyeae, Wallichieae.

Dombeyastrum Planch. . . . . Fl. d. serr. VI. p. 225: sect. Dombeyae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 326.

Dombeyeae DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: subtrib. Dombeyacear. Gen.: Pterospermum, Pentapetes, Astrapaea, Trochetia, Melhania, Dombeya, Assonia, Ruizia, Kydia?, Gluta?
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: sect. Hermanniear. Gen. ead. (excepta Astrapaea et 2 ultimis) et Hugonia? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 201. Gen. Dombeyacear. Endl. (excepto Glossostemone) et subsect.: Eriolaeneae, Philippodendreae, Hugonieae.
A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 197: trib. Büttneriacear. (Gen. cub.: Pentapetes.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: trib. Byttneriacear. Gen. Dombeyacear. Endl. et Paulowilhelmia.

Dombeyopsis Visiani & Massal. 1854. Flora I. p. 119: nov. g. Büttneriacear. foss.

Dombrowskya Endl., Lindl. vid. *Dobrowskya Presl.*

Domeykoa*) Philippi „Fl. Atacam. ined." 1857. Bot. Zeit. p. 681: nov. g. Umbelliferar. (Nomen. *Cf.* descriptionem in Fl. Atacam. 1860. p. 25. t. 2. f. C: D. oppositifolia.)

Donacium s. Eudonax Fries 1843. Bot. Notiser p. 131 (Bot. Zeit. 1846. p. 381): nomina pro *Donace* proposita.

Donacodes Blume 1830. Enum. pl. Jav. I. p. 54: nov. g. Amomar.
Endl. 1837. Gen. n. 1628. p. 223; 1841. Ench. p. 119: g. Amomor.
Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2216: g. Amomear. (genuinar.) — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 388 (291). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 154. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 108.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear.
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 602: sect. Elettariae.

Donaldia*) Klotzsch 1855. Begon. p. 198: nov. g. Begoniacear. (Begonia ulmifolia HBK.)

Donatia Löfling 1758. It. p. 133.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 699; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 304: sect. Avicenniae.

Donatia**) Forst. 1776. Char. gen. p. 9. t. 5: nov. g. Triandr. Trigyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 787. n. 1716. — Willd. 1797. Sp. I. p. 491. n. 160. — Pers. 1805. Ench. I. p. 111. n. 208.
Scop. 1777. Intr. p. 236: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 300: g. Caryophyllear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 33. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 110. — Hedw. 1806. Gen. p. 52. 366. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 58. 873. n. 400. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 428.
A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 22; 1815. Mém. Mus. II. p. 119: g. Saxifragear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 648; 1825. Syst. I. p. 363. n. 364; 1830. Gen. I. p. 78. n. 385. — Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4196; 1837. Hdb. p. 230; 1841. Nom. p. 157. n. 6152. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 312. — DC. 1830. Pr. IV. p. 53. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 231. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 39. (verar.) — Meisn. 1838. Gen. p. 136 (100). — Endl. 1839. Gen. n. 4630. p. 814; 1841. Ench. p. 408. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 142. 416. (?) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 108. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 80. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 24.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 568: g. Saxifragacear.

Donatophorus Zippel. ex Macklock in Bijdr. tot. nat. Wet. V. p. 142. (Feruss. Bull. XVIII. p. 92.)
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 22 inter genera nondum descripta.

Donax***) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 11. Ed. Willd. p. 14: nov. g. Monandr. Monogyn. (Arundastrum Tonchat Rumph. Amboin. cap. 10. t. 7.)
= Marantae sp. (Willd.)

Donax Palis. 1812. Agrost. p. 77: nov. g. Graminear. (Arundo Donax L.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 34. 600. n. 308.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Arundinacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 195.
Trin. 1820. Fund. p. 155: g. Triandr. Digyn.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear.

*) Dicat. dom. Ign. Domeyko, prof. Santiagensi.

*) Dicat. Donald, de Begoniaceis scriptori.
**) Dicat. Vitaliano Donati.
***) *δόναξ*, arundo: a forma plantae arundini similis.

Donax Palis. cont.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 436; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 394: sect. Arundinis. Arundo Linn. (emend.)

Dondia Adans. 1763. Fam. II. p. 261: g. Blitor.
= Suaeda Moq.

Dondia Spreng. 1813. Mém. soc. Mosc. V. p. 8; 1813. Umb. pr. p. 21; 1818. Anl. II. 2. p. 644; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXI. 341; 1825. Syst. I. p. 529. 874. n. 1031; 1830. Gen. I. p. 219. n. 1131: g. Umbelliferar. descisc. (Astrantia Epipactis L.) Par. Link 1821. En. I. p. 264. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 96. (Divis. 1.) — Bartl. 1830. Ord. p. 237. (descisc.)
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 140: g. Saniculear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3757 (*Dondisia*).
Gaud. 1828. Helv. II. p. 14. 301: g. Umbellatar.
Link 1829. Hdb. I. p. 315: g. Hydrocotylinar.
= Hacquetia Neck.

Dondisia Scopoli 1777. Introd. p. 316: g. Siliquosar.
Neck. 1790. El. III. p. 81. n. 1407: g. Styridophytor.
= Raphanistrum Tourn.

Dondisia Rchb. vid. *Dondia Spreng.*

Dondisia*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 469: nov. g. Guettardear. (a Wight & Arnott ad Canthium reductum.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 559. — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2866. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3216. p. 544; 1841. Ench. p. 273: g. Euguettardear. *Cf.* Spl. III. p. 73.
Meisn. 1838. Comm. p. 118: in synon. Canthii.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 108: g. Paederiear.

Donia**) R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 32 (Verm. bot. Schr. II. p. 442): nov. g. Synantherear. (Doronicum glutinosum W.), serius ab Auctore Grindeliae insertum. *Cf.* Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 429.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 163: g. Syngenes. Polygam. Superfl.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 563: g. Radiatar.
Link 1822. En. II. p. 336: g. Corymbiferar.
Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2521: g. Grindeliacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 138: g. Asterear.
Less. 1832. Syn. p. 199: g. Iuulear. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 25.
= Grindelia Willd.

Donia R. Brown 1819 in Ross Voy. Ed. I. p. XLI (Verm. bot. Schr. I. p. 340): nov. g. (Hexandr.), pro Rumice digyno L. indicatum.
= Oxyria Hill.

*) Dicat. Jac. de Dondis.
**) Dicat. D. Don, botan. Londin.

Donia Nuttall 1821. Journ. Ac. Philad. II. p. 118. Nova sp.: D. ciliata.
= Prionopsis Nutt. (Endl. Spl. II. p. 40.)

Donia Sweet . . . . Brit. fl. gard. II. Ser. 4. t. 397.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 467: g. Leguminosar. (Clianthus puniceus Banks & Sol. mss.)
Clianthus Sol.

Donidsia G. Don Gen. syst. III. p. 461: sphalm. pro *Dondisia.*

Donioides DC. 1836. Prodr. V. p. 477: sect. Jasoniae. (Donia canariensis Less.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2433 *d.* p. 395; 1841. Ench. p. 236.
= Vieria Webb.

Doniophyton Weddell 1852. Chloris Andina I. . . . . . nov. g. (Labiatiflorar.)

Donkelaaria Planchon 1849. Fl. d. serr. Avr. t. 459: subg. Centradeniae.

Donnia Gray Arrang. brit. pl. I. p. 679: vid. *Bazzanius Gray.*

Dontospermeae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 955: div. Buphtalmear. Subdivis.: Eudontospermeae, Chrysophthalmeae.

Dontospermum Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 955: g. Eudontospermear.
= Odontospermum Neck.

Dontostemon „Andrz. mss." C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 118: nov. g. Sisymbrear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 13 (12).
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 182. n. 7025: g. Erysimear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323: g. Siliquosar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 706.
Endl. 1839. Gen. n. 4904. p. 874; 1841. Ench. p. 449: g. Sisymbriear. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 174. — Walp. 1842. Rep. I. p. 163. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 108. — Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 25.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.
Synon. Andreoskia DC.; Hesperidopsis DC.; Dontostemum Steud.

Dontostemum Steud. Nomencl. I. p. 525: vid. *praeced.*

Dontostoma Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 441: sect. Geastri.
= Odontostoma Endl.

Donzella Lemaire vid. *seq.*

Donzellia*) Tenore 1839. Cat. sem. h. Napol.; 1840. Mem. Acc. Mod. XXII. p. 226: nov. g. inter Terebinthaceas et Rhamneas ambigens. (D. spinosa.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 379.
Meisn. 1841. Comm. p. 250: g. Euphorbiacear. obscurum.
Endl. 1841. Gen. n. 6847. p. 1328; 1841. Ench. p. 685: g. Apetalar. minus notum. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 108 (*Donzella*).

*) Dicat. Gius. Donzelli, Paduano.

Doodia*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 151. Ed. Nees p. 7: nov. g. Polypodiacear. (Woodwardia caudata Cav.) — Par. Kaulf. 1824. En. Fil. p. 164. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. (indusiatar.) — Endl. 1833. Norf. p. 11. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 4.
Leman 1819. Dict. v. 13. p. 433: g. Filicum. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 94. n. 3264; 1831. Gen. II. p. 723. n. 3657. (verar.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 285.
Link 1822. En. II. p. 463: g. Polypodear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 401: g. Doodiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 714: g. Blechnoidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Presl 1836. Pterid. p. 99: g. Blechnacear.
Endl. 1836. Gen. n. 632. p. 62; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1019. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 108. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 36.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 82 *(Doodya)*: g. Aspleniacear.
J. Smith 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 169: g. Pteridear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 432 (333).
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Aspleniear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 207 *(Doodya)*: sect. Woodwardiae.
Synon. Anchistea Presl.

Doodia Roxb. 1814. Hort. calc. p. 99; 1832. Fl. Ind. III. p. 365: nov. g. Diadelph. Decandr. (Hedysarum pictum, crinitum, etc.)
= Uraria Desv.

Doodieae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 262: subtrib. Pteridacear. Gen. Woodwardia, Doodia.

Doodya Link, Fée vid. *Doodia R. Brown.*

Doona Thwaites 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. t. 12; 1852. ibid. IV. p. 7; 1856. ibid. VIII. p. 377: nov. g. Dipterocarpear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 333.

Doornia**) De Vriese 1854. Pl. nov. h. Lugd. Bat. (Linnaea XXVI. p. 762); 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 266: nov. g. Pandanear. (D. reflexa.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 858.

Doosera Roxb. mss.
= Euglinus Endl.

Dopatrium „Hamilt. mss." Benth. 1835. Scroph. rev. p. 4; 1835. Scroph. ind. p. 30: nov. g. Gratiolear. (Gratiola juncea, etc.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 536. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4605. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 3947. p. 683; 1841. Ench. p. 339. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (220). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. —

*) In memoriam Samuelis Doody, pharmacopoei Londin.
**) Dicat. bar. Van Doorn.

Dopatrium Hamilt. cont.
Walp. 1845. Rep. III. p. 288. 965. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 109.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 407; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Eugratiolear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 685.

Doraena Thunb. 1783. Diss. nov. gen. III. p. 59; 1784. Fl. japon. p. 6: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 194. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 108. n. 264. — Gmel. 1791. Syst. p. 329. — Pers. 1797. Syst. p. 201; 1805. Ench. I. p. 173. n. 392. — Willd. 1797. Sp. I. p. 812. n. 300. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 349. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 441. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 157. n. 786. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 791.
Juss. 1789. Gen. p. 420: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 96. n. 432. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XVIII. 188. n. 676.
Neck. 1790. El. II. p. 30. n. 657: g. Darinyphytor.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 27. t. 184.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 889; 1825. Syst. I. p. 671. n. 737: g. Primulear.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 738: g. Primulacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3291: g. Solanear.?
Endl. 1839. Gen. n. 3873. p. 668; 1841. Ench. p. 332: g. Solanacear. dubium. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 124. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 109.
Meisn. 1839. Gen. p. 255 (164): g. Anagallidear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4765: g. Mandragorear. genuinar.?
= Maesa Forsk. (A. DC. Pr. VIII. p. 77.)

Doranthera Steud. vid. *Doratanthera Benth.*

Doranxylum Neraud 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 25. 29: g. Sapindear. (Nomen.) *Cf.* Endl. Gen. p. 1074. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 199. n. 7612.

Doratanthera*) „Benth. mss." Endl. 1839. Gen. n. 3961. p. 685; 1841. Ench. p. 339: nov. g. Eubuchnerear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 313 (224). — Walp. 1845. Rep. III. p. 305. 966.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270: g. Buchnerear. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 525 *(Doranthera)*. — Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4636. *(genuinar.)* — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 109.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 347; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Aptosimear.
Webb 1849 in Hook. Niger Fl. p. 167: g. Scrofularinear.

Doratanthes Lemaire vid. *Doryanthes Corr.*

Doratium „Soland. mss." Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. II. p. 267: nov. g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 375.
= Curtisia Ait.

*) *δόρυ, δόρατος*, pertica, hasta.

Doratolepis Benth. 1836. Enum. pl. Hügel. p. 64.
DC. 1837. Pr. VI. p. 163: sect. Podolepidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2736 *c.* p. 445; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3495. 3. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss I. p. 466.

Doratoloma Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 37. n. 4902/$_1$ *b:* sect. Citharelomae.

Doratometra*) Klotzsch 1855. Begon. p. 183: nov. g. Begoniacear. (*Begonia Wallichiana Steud.*)

Doratomyces Corda 1829 in Sturm Fl. Fung. II. p. 65. t. 30: nov. g. Fungor. (Periconia Stemonitis Pers.)
Corda 1836 in Weitenw. Beitr. z. Nat. I. p. 80.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 19: g. Aspergillinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 144.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 15; 1842. Mycol. p. 60: g. Stilbinor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 88: g. Mucedineor. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Stilbaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Periconieor.?
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 467: g. Sporocybeor. Sect.: Doratomyces (Periconia Nees), Leucina.
Bonord. 1851. Hdb. p. 105: g. Polyactideor.
Synon. Pachnocybe Berk.

Doratophora Lemaire vid. *Doryphora Endl.*

Doratophyllum Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 101: grex Philodendri. (Ph. daemonum Liebm., etc.)

Dorcadia „Ad.“ Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 196: sect. Polytrichi. *Cf. seq.*
= Pogonatum Palis.

Dorcadion Adans. 1763. Fam. II. p. 492: g. Muscor.
Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 622 *a:* sect. Ulotae.
= Polytrichi Dill. pars.

Dorcapteris Presl 1850. Epimel. bot. p. 526 (166): nov. g. Acrostichacear. (*Osmunda cervina L.*)

Dorcoceras**) Bunge 1832. En. pl. Chin. bor. p. 34; 1835. Mém. étr. Ac. Pet. II. p. 128: nov. g. Lentibulariear. (*D. hygrometrica.*) — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 525 (*Doroceras*).
Meisn. 1840. Gen. p. 302 (212): g. Eudidymocarpear.
= Baea Comm.

Dorema***) D. Don 1831. Edinb. phil. mag. IX. p. 46; 1833. Linn. Trans. XVI. 3. p. 601: nov. g. Peucedanear. (D. ammoniacum.) *Cf.* Isis 1834. p. 805. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 328. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5451. — Meisn. 1838. Gen. p. 146 (106). — Endl. 1839. Gen. n. 4460. p. 779; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 8. — Spach

*) μήτρα, matrix.
**) δορκάς, caprea. „Nomen a capsula cornu spiraliter tortum simulante.“
***) δώρημα, donum. Nomen euphonicum.

Dorema D. Don cont.
1839. Vég. phan. VIII. p. 135. — Boiss. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 328. Char. reform. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 306. — Walp. 1846. Rep. V. p. 879. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 111. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 74.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
Synon. Diserneston Spach.

Doria*) Dillen. 1719. Nov. gen. p. 143. t. 8: nov. g. herbae flore Composito Discoide.
Adans. 1763. Fam. II. p. 124: g. Jacobear.
Scop. 1772. Carn. II. p. 176: g. Corymbiferar. (D. Virgaurea.)
= Solidago Linn.

Doria Thunb. 1800. Nov. pl. gen. XII. p. 162; 1800. Prodr. II. p. 155. 194: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 449. 463; 1830. v. 60. p. 583: g. Othonnear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2516. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32.
Bartl. 1830. Ord. p. 138: g. Senecionear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 244: sect. Senecionis. — Par. (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 117.
= Doriae Less., Senecionis etc. spec.

Doria Lessing 1831. Linnaea VI. p. 94; 1832. Syn. Compos. p. 89: g. emend. Othonnear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 469. — Meisn. 1839. Gen. p. 222 (138).
Endl. 1838. Gen. n. 2828 *a.* p. 463; 1841. Ench. p. 245: sect. Othonnae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3232. 1.
Synon. Doriae sp. Thunb.; Othonnae sp. Linn., Thunb.

Doriena „Dennst.“ Endl. in synon. Acronychiae: vid. *Dörrienia Dennst.*

Doritis Lindl. 1833. Orchid. gen. p. 178: nov. g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1435. p. 200; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2040. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Dorobaea Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 447. 453; 1830. v. 60. p. 583: nov. g. Doronicear. (Senecio pimpinellifolius Kunth et affines.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2492. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31.
Bartl. 1830. Ord. p. 138: g. Senecionear.
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3365. 11: sect. Senecionis.
= Senecionis Less. pars.

Doroboea DC. Prodr. VI. p. 340 in synon. Senecionis: vid. *praeced.*

Doroceras Steud. vid. *Dorcoceras Bunge.*

Doroniceae Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 446; 1830. v. 60. p. 583: div. Senecionear. Gen. 1827: Doronicum, Grammarthron, Culcitium, Eriotrix, Aspelina, Dorobaea et 1830 Arnica. — Par. Rchb. 1828. Consp.

*) Dorea Narbonensium, a gallico *dorée* s. *d'or.* Conf. Beckmann Lex. bot. p. 78.

Doroniceae Cassini cont.
p. 106. Gen. ead. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31. Gen.: Arnica, Doronicum, Aronicum, Dorobaea, Aspelina, Culcitium, Tetradymia, Eriothrix, Heteractis, Notonia, Bedfordia.

Doronicum*) Tourn. 1700. Inst. p. 487. t. 277: g. pl. class. XIV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 163. Ed. Hall. 1745. p. 175: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1720. Act. Ac. Paris. p. 361: g. Corymbiferar. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 738. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1772. Carn. II. p. 174. — Juss. 1789. Gen. p. 182. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 543. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 402. — DC. 1805. Franç. IV. p. 173; 1815. V. p. 475. — Link 1822. En. II. p. 337. — Math. 1853. Belg. I. p. 271.
Linn. 1737. Gen. p. 253. n. 650; 1737. Cliff. p. 411; 1740. Syst. p. 29; 1753. Sp. II. p. 885; 1759. Syst. ed. X. p. 1220. n. 862; 1763. Sp. II. p. 1247; 1764. Gen. ed. VI. p. 427. n. 959; 1767. Syst. ed. XII. p. 559: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 639; 1784. Syst. p. 768. — Reich. 1778. Gen. p. 424. n. 1039. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 559. n. 1297. — Gmel. 1791. Syst. p. 1243. — Pers. 1797. Syst. p. 810; 1807. Ench. II. p. 454. n. 1862. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2113. n. 1492; 1809. En. p. 897. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 434.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 153: g. Compositar. ord. 4.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 253. n. 1045: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 590.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 124: g. Jacobear.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539.
Hill 1769. Ht. kew. p. 8: g. Radiatar. — Par. GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 228. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 559; 1826. Syst. III. p. 568. n. 2772; 1831. Gen. II. p. 628. n. 3124.
Scop. 1777. Intr. p. 135: g. Flosculosar.
Tausch 1828. Flora I. p. 178. Sect.: Doronicum, Pardalianches.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: g. Senecionear.
= Doronicum et Aronicum Neck.

Doronicum Necker 1791. Elem. bot. I. p. 26. n. 48: g. Actinophytor., sejuncto Aronico emendat.
Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 454: g. Senecionear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1832. Syn. p. 390. — Koch 1837. Syn. p. 380. Ed. II. p. 419. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3356. (genuinar.) Sect.: Doronicum, Chromatochaeta. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 38. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 217. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 113. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 107.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 467: g. Corymbiferar.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 447. 452; 1830. v. 60. p. 583: g. Doronicear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2487. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 270.
Link 1829. Hdb. I. p. 751: g. Asteroidear.
Gaud. 1829. Helv. V. p. 10. 337: g. Radiatar.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 234: g. Asterear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 320: g. Eusenecionear. Sect.: Eudoronicum, Chromochaeta? — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2802. p. 457; 1841. Ench. p. 244. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 216 (138). — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 300. Sect.: Eudoronicum, Pericallis. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 624.
Synon. Pardalianches Tausch.

Doronicum Tausch 1828. Flora I. p. 178: sect. Doronici.
= Aronicum Neck.

Dorrienia „Rchb.“ Endl. Gen. Suppl. II. p. 65 in synon. Genliseae: vid. *Dörrienia Rchb.*

Dorsiferae Rupp. 1718. Fl. jen. p. 322. Ed. Hall. 1745. p. 342: vid. *Epiphyllospermae Rupp.*
Scop. 1777. Intr. p. 62: gens Obsoletar. Gen. §. 1: Blechnum, Struthiopteris, Filix, Hemionitis, Polypodium, Asplenium, Acrosticum, Trichomanes, Adiantum. §. 2: Ophioglossum, Osmunda, Onoclea, Salvinia, Aytonia.

Dorstenia*) Plumier 1703. Gen. p. 29. t. 8.
Linn. 1737. Gen. p. 336. n. 840; 1737. Cliff. p. 32; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 121; 1759. Syst. ed. X. p. 899. n. 147; 1762. Sp. ed. II. p. 176; 1764. Gen. ed. VI. p. 62. n. 158; 1767. Syst. ed. XII. p. 127: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 137; 1784. Syst. p. 163. — Reich. 1778. Gen. p. 63. n. 166. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 84. n. 209. — Lour. 1790. Coch. I. p. 90. — Gmel. 1791. Syst. p. 265. — Pers. 1797. Syst. p. 169. — Willd. 1797. Sp. I. p. 682. n. 244; 1809. En. p. 168.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Scabridar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 593. — Batsch 1802. Tab. p. 178.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Amentaceis aff.
Adans. 1763. Fam. II. p. 377: g. Castanear.
Gled. 1764. Syst. p. 33. n. 127: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 340: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 401: g. Urticar.
De Paiva 1790. Mem. de hist. nat. (Hedw.)
Neck. 1790. El. II. p. 216. n. 954: g. Sysellophytor.

*) Nomen a voce arabica *Doronigi*. (Vaill.)

*) Nomen ab antiquo botanico Theod. Dorstenio. (Linn. Hort. Cliff. p. 32.)

Dorstenia Plumier cont.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 529: g. Urticear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 303. — Hedw. 1806. Gen. p. 78. n. 363. — Pers. 1807. Ench. II. p. 557. n. 2061. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 357. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 44. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 30. 472. n. 575. Sect.: Dorstenia, Kosariae, Elatostemata. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 458. — Link 1821. En. I. p. 110. — Kunth 1822. Syn. I. p. 378.
Spreng. 1800 in Schrad. Journ. I. p. 2: g. Monoec. Tetrandr.
Cram. 1803. Disp. p. 178 in Monoec. Diandr.
A. Rich. 1825. Dict. class. V. p. 600.
Desv. 1825 in Ann. soc. Linn. IV. p. 216. Sect.: Sychinium, Dorstenia.
Agdh. 1825. Aphor. p. 204: g. Artocarpear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 105.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 777. n. 3074; 1831. Gen. II. p. 684. n. 3449: g. Urticeis aff.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 511: g. Dorsteniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 84. n. 1811; 1837. Hdb. p. 172; 1841. Nom. p. 67. n. 2520. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16.
Link 1829. Hdb. I. p. 294: g. Sycoidear.
Endl. 1837. Gen. n. 1860. p. 278; 1841. Ench. p. 165: g. Morear. Sect. ut Desv. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 350 (261). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 37. 61. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 99. — Endl. 1847. Spl. IV. p. 35. Sect.: Sychinium, Eudorstenia, Kosaria. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 731. Sect.: Sychinium, Dorstenia, Lecanium, Kosaria. — Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 159.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 268: g. Moracear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 116.

Dorstenia Desvaux 1825. Ann. soc. Linn. IV. p. 216: sect. Dorsteniae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1860 *b*. p. 279; 1841. Ench. p. 165. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 732.
= Eudorstenia Endl.

Dorstenieae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 510: div. Urticear. Gen.: Dorstenia, Sychinum?
Rchb. 1828. Consp. p. 84: div. Urticacear. Gen.: Dorstenia, Ficus, Olmedia, Broussonetia, Morus, Antiaris, Artocarpus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16: trib. Ficinear. Gen.: Dorstenia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 172; 1841. Nom. p. 67: subdiv. Artocarpear. Gen. (1837 Dorstenia, Ficus, Antiaris, Artocarpus) 1841: Dorstenia, Sychinium, Kosaria?; Ficeae.

Dortmania Necker vid. *seq.*

Dortmanna*) Rudb. 1720. Act. Upsal. p. 97. t. 2.
Adans. 1763. Fam. II. p. 134: g. Campanular.
Scop. 1777. Intr. p. 147: g. Caprifolior.

*) Dicat. Dortmann, pharmacopolae Gröning.

Dortmanna Rudb. cont.
Neck. 1790. El. I. p. 132. n. 226 (*Dortmania*): g. Sphanidophytor.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 715: g. Lobeliacear.
Endl. 1838. Gen. p. 511. n. 3058 *c*; 1841. Ench. p. 264. n. 3058 *a β*: sect. Lobeliae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572: g. Lobeliear.
= Lobeliae Linn. pars.

Dortmannia Steud. Nom. vid. *praeced.*

Dorvalia Comm. mss.
= Fuchsia Plum.

Doryantheae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 58: trib. Agavinear. Gen.: Doryanthes.
Bernh. 1840. Flora II. p. 425: trib. Liliacear.

Doryanthes Correa 1802. Linn. Trans. VI. p. 211. t. 23: nov. g. Agavae et Fourcraeae aff. (D. excelsa.)
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 298. Ed. Nees p. 154: g. Amaryllidear. — Par. Schult. 1829. Syst. VI. p. XLII. 732. — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Endl. 1837. Gen. n. 1296. p. 180; 1841. Ench. p. 104. (anomalar.) — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 406. (anomalar.) — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 117 (corr. *Doratanthes*).
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 336: g. Agavear. — Par. Herb. 1837. Amaryll. p. 70. 128. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 21. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 20. 282. — Kunth 1850. Enum. V. p. 850. (?)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 238; 1825. Syst. II. p. 80. n. 1233. — Par. Link 1821. En. I. p. 334.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 462: g. Narcissear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 175: g. Bromeliacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 1283: g. Bromeliear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 130.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Doryanthear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 278. n. 1443: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1196.
Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1767: g. Alströmeriear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 393 (295).

Dorycheile Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 56. n. 2181: g. Arethusear. (Cephalanthera rubra), antea *Doryphora Rchb.*, nec Illig.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 96: sect. Cephalantherae.
= Callithronum Ehrh.

Dorychnium „Roy." Mönch 1794. Meth. p. 109: g. Thalamostemonis.
= Psoraleae Linn. pars.

Dorychnium Brongn. vid. *Dorycnium Tourn.*

Dorycnioides DC. 1825. Prodr. II. p. 168 (Mém. Légum. VI): sect. Anthyllidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4025 c. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 165.
= Dorycnopsis Boiss.

Dorycniopsis Lemaire vid. *Dorycnopsis Boiss.*

Dorycnium*) Tourn. 1700. Inst. p. 391. t. 211: g. pl. class. X.
Linn. 1737. Gen. p. 228. n. 602; 1737. Cliff. p. 370; 1740. Syst. p. 27; 1742. Gen. ed. II. p. 355. n. 711: g. Diadelph. Decandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 87. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1396. n. 1385; 1809. En. p. 798. — Pers. 1807. Ench. II. p. 354. n. 1754.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 570: g. Leguminosar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 224. — DC. 1805. Franç. IV. p. 557. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 762; 1826. Syst. III. p. 205. n. 2524; 1831. Gen. II. p. 576. n. 2813. — Lois. 1819. Dict. v. 13. p. 463. — Link 1822. En. II. p. 266. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 434. 621.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Papilionacear. (serius Loto injunctum.) — Par. Bartl. 1825. Beitr. II. p. 81. Char. emend.
Adans. 1763. Fam. II. p. 323: g. Genistar.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Trifoliear. — Par. Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 208. — Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3873; 1832. Fl. exc. p. 507. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 79. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 194. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Koch 1836. Syn. p. 176. Ed. II. p. 195. — Meisn. 1837. Gen. p. 85 (61). — Endl. 1840. Gen. n. 6512. p. 1268; 1841. Ench. p. 669. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 558. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 41. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 128 (*Dorychnium*). — Webb 1846. Canar. II. p. 87. Sect.: Dorycnium, Bonjeania. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 426. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 118. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 476.
Link 1831. Hdb. II. p. 176: g. Lotoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5700: g. Trigonellear.

Dorycnopsis Boissier 1840. Voy. en Espagne p. 163: nov. g. ex typo Anthyllidis Gerardi L. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 243.
Endl. 1840. Gen. n. 6513. p. 1268; 1841. Ench. p. 669: g. Trifoliear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 647. — Meisn. 1843. Comm. p. 350. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 425. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 118 (*Dorycniopsis*).
Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5701: g. Trigonellear.
Synon. Dorycnioides DC.

Doryopteris J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 404; 1842. ibid. IV. p. 162: nov. g. Pteridiear. chilosorear., a Litobrochia Presl sejunctum. (Pteris palmata W., etc.) — Par. Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 342. Sect.: Eudoryopteris, Lytoneuron.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 133: g. Pteridear. (*Synon. Eudoryopteris Klotzsch*).

Doryphora Rchb. 1830. Fl. exc. p. 132: sect. Cephalantherae. (C. rubra.)
= Dorycheile Rchb.

Doryphora Endl. 1837. Gen. n. 2022. p. 3015; 1841. Ench. p. 195: nov. g. Atherospermear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 324 (236). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 91. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 300. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 119 (corr. *Doratophora*). — Tul. 1855. Arch. Mus. VIII. p. 422. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 119.
Conf. Learosa Rchb.

Doryphora Kütz. 1844. Bacill. p. 74.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 81: g. Cocconeidear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Eubacillariear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 50. n. 32: g. Surirellear.

Dorystaechas „Boiss. & Heldr." Benth. 1848 in DC. Prodr. XII. p. 261: nov. g. Monardear. (D. hastata.) — Par. Boiss. 1853. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 12. p. 54. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 675.

Dorystigma Gaudich. 1842. Pandan. (ex Dunal.)

Dorystigma*) Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 347: nov. g. Solanear. (Jaborosa caulescens Hook.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 615.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Jaborosear.
= Lonchestigma Dunal.

Doryxylon Zollinger 1858. Linnaea XXIX. p. 469: nov. g. Euphorbiacear., Rottlerae aff. (D. spinosum.)

Dossinia „Morr. Ann. d. Gand. IV. p. 171" Miquel 1858. Ind. bat. III. p. 731: g. Physuridar.

Dothidea Fries 1818. Obs. myc. II. p. 347: nov. g. Sphaerioideor. (Sphaeria caespitosa Tode.) — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 760. n. 3877.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 15: g. Sclerotior.
Leman 1819. Dict. v. 13. p. 466: g. Hypoxylear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 548; 1828. Elench. II. p. 120; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 386: g. Sphaeriaceor. Subgen. (1849) Hypopteris. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 134. — Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 55. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 583: g. Sphaeriacear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 224.

*) Nomen vetustum ex Dioscoride.

*) δόρυ, hasta; στίγμα, stigma.

Dothidea Fries cont.
Fries 1825. Pl. homon. p. 112: g. Dothidinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 266. — Endl. 1836. Gen. n. 384. p. 33; 1841. Ench. p. 19. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 164.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1016: g. Sclerogastrum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 416. n. 3468: g. Myelomycetum desciscentium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Xylomatear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 863: g. Pyrenomycetum. (astomor.) — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 83; 1842. Pl. cell. Cub. p. 330.
A. Libert 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 122: g. Phacidiaceor.
Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 287: g. Dothideor. — Par. Bail 1858. Syst. p. 50.
Bonord. 1851. Hdb. p. 62: g. Ascosporeor.
Synon. Polystigma DC.; Pyrenochia Link; Sphaeriomorphium Link; Typhodium Link; Sporotheca Corda?

Dothidei Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 7: subdiv. Sphaeriaceor. genuinor. Gen.: Acrospora, Dothidea, Polystigma, Vermicularia, Schizothecium.
Bail 1858. Syst. p. 50: fam. Pyrenomycetum. Gen.: Dothidea, etc.

Dothidini Fries 1825. Pl. homon. p. 111: subordo Sphaeriaceor. Gen.: Vermicularia, Dothidea, Ascospora.
Rchb. 1828. Consp. p. 11: subdiv. Sphaeriaceor. Gen. ead.
Endl. 1836. Gen. p. 33; 1841. Ench. p. 19: subtrib. Sphaeriaceor. Gen. ead.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 164: subsect. Sphaeriaceor. genuinor. Gen.: Dothidea, Sporotheca, Polystigma, Schizothecium.

Dothiora Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 418: nov. g. Sphaeropsideor. (Dothideae sp.)

Douepea Cambess. 1837 in Jacquem. voy. IV. p. 18.
Endl. 1839. Gen. n. 4951. p. 883; 1841. Ench. p. 451: g. Brassicear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 187. — Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Rchb. 1841. Nom. p. 183. n. 7044: g. Sinapiear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 726 *(Doupea)*: g. Siliquosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 335: g. Brassicidar.

Douglasia*) Lindl. 1828 in Brand. journ. sc. p. 383; 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1886: nov. g. Primulacear. — Par. Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 119. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 343.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 137. n. 681: g. Primulear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 633. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 46.
Endl. 1839. Gen. n. 4196. p. 730; 1841. Ench. p. 356: g. Androsacear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 122.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645: g. Primulidar.
Synon. Douglassia Rchb.

Douglassia Adans. 1763. Fam. II. p. 200: g. Verbenar.
Volkameria Linn.

Douglassia Schreb. 1791. Gen. II. p. 809. n. 1761: g. Polyadelph. Polyandr.
Aiouea Aubl.

Douglassia Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3360; 1841. Nom. p. 124. n. 4826: g. Androsacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 166: g. Primulacear.
= Douglasia Lindl.

Douma Lamarck Illustr. t. 900.
= Hyphaene Gärtn.

Doupea Dietr. vid. *Douepea Camb.*

Dovea*) Kunth 1841. Enum. pl. III. p. 457: nov. g. Restiacear. (D. macrocarpa, etc.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 11. n. 1019/$_2$. — Meisn. 1842. Gen. p. 408 (312). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 121. — Steud. 1855. Glum. II. p. 248 *(Dowea)*.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139: g. Restionear.

Dovera „Ehrenb." Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1910: g. Laurear. *Cf.* Meisn. Comm. p. 237.
Bartl. 1830. Ord. p. 112: g. Laurinear.
= Doberia Juss.?

Dovyalis „E. Meyer mss." Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 251: nov. g. Rhamnear. (Flacourtia rhamnoides Eckl. & Z.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 91. n. 5888/$_4$: g. Euphorbiacear. dubium.
Meisn. 1843. Comm. p. 369: g. Rottlerear.
Sonder 1850. Linnaea XXIII. p. . . . . : g. Flacourtianear.
Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 393; 1857. ibid. VIII. p. 233: g. Flacourtiear.

Dowea Steud. vid. *Dovea Kunth.*

Draba**) Dillen. 1719. Nov. gen. p. 122?
Linn. 1737. Gen. p. 194. n. 535; 1737. Cliff. p. 333; 1740. Syst. p. 26; 1748. Ups. p. 186; 1753. Sp. II. p. 642; 1759. Syst. ed. X. p. 1127. n. 717; 1763. Sp. ed. II. p. 896; 1764. Gen. ed. VI. p. 333. n. 800; 1767. Syst. ed. XII. p. 432: g. Tetradynam. Siliculos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 489; 1784. Syst. p. 585. — Reich. 1778. Gen. p. 334. n. 864. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 436. n. 1076. — Gmel. 1791. Syst. p. 970. — Pers. 1797. Syst. p. 622. — Willd. 1800. Sp. III. p. 424. n. 1225; 1809. En. p. 664. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 62.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 538: g. Tetrapetalar. cruciatar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 63. n. 252: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 261.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gmel. 1768. Sibir.

*) Dicat. David Douglas, peregrinatori.

*) Dicat. H. G. Dove, Berolin.
**) Δράβη, nomen herbae apud Graecos.

Draba Dillen. cont.
III. p. 253. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 240. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 506. — DC. 1805. Franç. IV. p. 697; 1815. V. p. 595. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 91. (Verm. bot. Schr. V. p. 28.) — Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 171. — Lois. 1819. Dict. v. 13. p. 503 *(Drave)*. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 697.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 11: g. Siliculosar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 172. — Scop. 1772. Carn. II. p. 5. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 481. — Pers. 1807. Ench. II. p. 190. n. 1557. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 717; 1825. Syst. II. p. 872. n. 2298; 1831. Gen. II. p. 518. n. 2544. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 77. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 350. — Kunth 1824. Syn. III. p. 137. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 397. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1127. Sect.: Erophila, Draba. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 186. 249.
Neck. 1790. El. III. p. 92. n. 1418: g. Brachytophytor.
Liljeblad 1799. Nov. Act. Upsal. VI. p. 52. Char. emend.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 108: g. Alyssoidear.
Rebent. 1804. Neom. p. 150: g. Hexandr. Monogyn.
Koch & Hoppe 1823. Flora II. p. 417.
Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4761: g. Alyssinear. Sect.: Erophila, Drabella, Holarges, Leucodraba, Chrysodraba, Aizopsis. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 297. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 664. Sect.: Erophila, Draba. — Koch 1836. Syn. p. 61. Ed. II. p. 66. Sect.: Aizopsis, Leucodraba, Holarges, Erophila. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 103. Sect. ut Rchb. 1832. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 144. Sect. ut Rchb. 1828. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 121. Sect.: Petrocallis, Eudraba, Erophila. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 198.
Lindblom 1839. Linnaea XIII. p. 316. Sect.: Aizopsis, Drabaea, Drabella, Erophila.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 266: g. Latiseptar. Sect.: Aizopsis, Drabella, Erophila.
Scheele 1843. Flora p. 321. (Synopsis specierum in Germania crescentium.)
Synon. Draba et Erophila DC.

Draba DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 233; 1821. Syst. II. p. 331; 1824. Prodr. I. p. 166: g. Alyssinear., disjuncta Erophila restrict. Sect.: Aizopsis, Chrysodraba, Leucodraba, Holarges, Drabella (in Mém. Mus. Veronicella). — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 59. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 182. Sect. ut DC. — Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 67. — Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11). — Endl. 1839. Gen. n. 4880. p. 869; 1841. Ench. p. 449. Sect. ut DC.

Draba DC. cont.
Link 1822. En. II. p. 150: g. Tetradynam. Siliculos.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1128; 1832. Fl. exc. p. 664: sect. Drabae. — Par. Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 103.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Lunariear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Siliculosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 644. Sect. ut DC.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6950: g. Drabear. Sect. ut DC. (Xanthodraba loco Chrysodrabae.)
Brongn. 1843. En. genr. p. 91: g. Allyssinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Alyssidar.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 122: g. Alyssear.
Synon. Eudraba Godr.

Drabaea Lindblom 1839. Linnaea XIII. p. 318: sect. Drabae, Chrysodrabam et Holargem DC. complectens.

Drabeae Rchb. 1837. Handb. p. 259; 1841. Nomencl. p. 180: sect. Alyssear. Gen.: Erophila, Draba, Petrocallis.

Drabella DC. 1821. Syst. II. p. 351; 1824. Prodr. I. p. 171: sect. Drabae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4761 *b;* 1841. Nom. p. 180. n. 6950. 1. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 83. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 186. — Lindbl. 1839. Linnaea XIII. p. 333. — Endl. 1839. Gen. n. 4880 *a.* p. 869; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 154. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 267.
Synon. Veronicella DC.

Drabella Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 352: sect. Homalobi. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1278. n. 6575 *c.* — Walp. 1842. Rep. I. p. 711.
= Drabellia Rchb.

Drabellia Rchb. 1841. Nomencl. p. 148. n. 5764. 1: sect. Homalobi. *(Drabellae Torr. & Gr.)*

Drabopsis C. Koch 1841. Linnaea XV. p. 253: nov. g. Sisymbrear. (D. verna.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Endl. 1842. Spl. II. p. 74. n. $4906/_1$: g. Sisymbriear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 760.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.

Drabopsis Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 247: sect. Arabidis. (A. drabiformis et Boissieri.

Dracaena*) Vandell. 1762. Diss. de arbore Draconis s. Dracaena. (Röm. Script. 1796. p. 39—46.)
Linn. 1767. Mant. p. 9. n. 1256; 1767. Syst. ed. XII. p. 246: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Vand. 1771. Fasc. pl.; 1796 in Röm. Script. p. 58. t. 2. — Murr. 1774. Syst. p. 275; 1784. Syst. p. 333. — Reich. 1778. Gen. p. 171. n. 458. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 224. n. 574. — Lour. 1790.

*) δράκαινα, forma fem. vocis δράκων, serpens.

Dracaena Vandell. cont.
Coch. I. p. 196. — Gmel. 1791. Syst. p. 558. — Pers. 1797. Syst. p. 355; 1805. Ench. I. p. 371. n. 813. — Willd. 1799. Sp. II. p. 155. n. 647; 1809. En. p. 374. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 67. Ed. Schrank 1819. p. 72. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 155.
Gled. 1768. Verm. Bemerk. I. p. 180.
Behrens 1779. Dissert. (Gotting.)
Medic. 1786. Theod. spec. p. 80: g. Aloarum. Sejunguntur Taetsia et Terminalis.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 57. t. 16. f. 4 (ensifolia).
Juss. 1789. Gen. p. 40: g. Asparagor. (B. Juss. in Ht. Trian. g. Lilior.)
Neck. 1790. El. III. p. 194. n. 1559: g. Gonoophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 294: g. Sarmentacear.
Mayer 1796. Nouv. Mém. Ac. Berl. p. 29.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 142: g. Asparagoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 140: g. Draconear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 100: g. Smilacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 242. n. 983. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 125 *(Dragonier)*.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 229; 1825. Syst. II. p. 92. n. 1253; 1830. Gen. I. p. 261. n. 1358: g. Asphodelear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XXVII. 337. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1114.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 492: g. Asparaginear.
Link 1821. En. I. p. 341: g. Asparaginar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 162: g. Asparagear. (verar.) — Par. Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 8. — Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Endl. 1837. Gen. n. 1167. p. 151; 1841. Ench. p. 84. — Meisn. 1842. Gen. p. 403 (306). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 18. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 216. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1412: g. Yuccear.
Link 1829. Hdb. I. p. 187: g. Dracaenacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Dracaenear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1826. — Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 34; 1850. Enum. V. p. 2. — Webb 1850. Canar. III. p. 330. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 554.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 132: g. Medeolear.?
Synon. Störkia et Oedera Crantz; Taetsia Medic.

Dracaenaceae Link 1829. Handb. I. p. 187: subordo Liliacear. Gen.: Dracaena, Yucca.

Dracaeneae Rchb. 1828. Consp. p. 66: subdiv. Anthericear. Sect.: Abameae, Aletrineae, Yucceae. — Simil. Rchb. 1830. Fl. exc. p. 116. Gen.: Asphodeline, Asphodelus, Anthericum, Asparagus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60 *(Draceneae)*: trib. Asparaginear. Gen.: Dracaena. — Par. Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 34; 1850. Enum. V. p. 2. Gen.: Dracaena, Sanseviera, Reineckea, Cordyline, Cohnia, Dasylirium, Dianella.

Dracaeneae Rchb. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 154: subdiv. Asphodelear.
Rchb. 1841. Nom. p. 49: subsect. Asparagear. Gen.: Dianella, Duchekia, Rhuacophila, Eustrephus, Geitonoplesium, Asparagus, Myrsiphyllum, Cordyline, Dracaena.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 643: trib. Asparagacear.

Dracaenella Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1312 *a*: sect. Xerotis.

Dracaenopsis Planchon 1850. Fl. d. serr. VI. p. 110: nov. g. Smilacear. (Cordyline australis Endl.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 643: g. Dracaenear.

Draceneae Dumort. vid. *Dracaeneae Rchb.*

Dracocephalium Hassk. vid. *Dracocephalum Linn.*

Dracocephalon*) Tourn. 1700. Inst. p. 181. t. 83: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 217. Ed. Hall. 1745. p. 223: g. pl. class. IX.
Allion. 1761. Misc. Taurin. II. p. 52: g. Tetrastemonum gymnotetraspermar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 187: g. Labiatar.
Neck. 1790. El. I. p. 315. n. 494: g. Corythophytor. Sejungitur Cephaloma.
= Dracocephalum Linn.

Dracocephalum Linn. 1737. Gen. p. 173. n. 481; 1737. Cliff. p. 308; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 165; 1753. Sp. II. p. 594; 1759. Syst. ed. X. p. 1104. n. 648; 1763. Sp. ed. II. p. 828; 1764. Gen. ed. VI. p. 298. n. 729; 1767. Syst. ed. XII. p. 401: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 454; 1784. Syst. p. 543. — Reich. 1778. Gen. p. 302. n. 787. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 395. n. 984. — Gmel. 1791. Syst. p. 915. — Pers. 1797. Syst. p. 580. — Willd. 1800. Sp. III. p. 149. n. 1119; 1809. En. p. 626. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 35.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 187. n. 779: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 409. Disjunguntur Moldavica, Zornia et Cedronella.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 161. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 375.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 116. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 345. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 267. — DC. 1805. Franç. III. p. 566. — Pers. 1807. Ench. II. p. 133. n. 1411. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 322. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 476. — Link 1822. En. II. p. 117; 1829. Hdb. I. p. 485. — Kunth 1823. Syn. II. p. 95. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 692. n. 2053; 1831. Gen. II. p. 465. n. 2286. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 382. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 132 *(Dracocephalium* s. melius *Dracontocephalium)*.

---

*) δράκων, serpens; κεφαλή, caput.

Dracocephalum Linn. cont.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 231: g. Gymnospermar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 281.
Hill 1769. Ht. kew. p. 244: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 319. t. 66. f. 8 (thymiflorum).
Rebent. 1804. Neom. p. 65: g. Tetrandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 439: g. Melissear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2814: g. Salviear.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 5. 96: g. Bilabiatar.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 330; 1841. Nom. p. 105. n. 4089: g. Nepetear. (genuinar.) Sect. (1841): Keimadracon, Dracocephalum, Ruyschiana, Calodracon. — Par. Benth. 1834. Labiat. p. 490. Sect.: Keimodracon, Calodracon, Cryptodracon, Moldavica, Ruyschiana. — Koch 1837. Syn. p. 563. Ed. II. p. 647. Sect.: Moldavica, Ruyschiana. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 811. Sect. ut Benth. — Endl. 1838. Gen. n. 3638. p. 623; 1841. Ench. p. 308. Sect. eaed. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166. (restrict.) — Meisn. 1840. Gen. p. 286 (194). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 66. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 354. 434. — Walp. 1845. Rep. III. p. 791. 986. Sect. ut Benth. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 396. Sect.: Keimodracon, Boguldea, Moldavica, Ruyschiana. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 122. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 382. Sect. eaed. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 676.
Synon. Dracocephalon Tourn.; Ruyschiana Mill.; Cephaloma Neck.; Moldavica et Zornia Mönch.

Draconeae Batsch 1802. Tab. affin. p. 140: fam. Campanalium. Gen.: Dracaena, Dianella, Yucca.

Dracontéae Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 266: ordo Monocotyledonum. Gen.: Arum, Caladium, Pothos, Symplocarpus.

Dracontieae Schott 1832. Melet. bot. p. 22: subtrib. Orontiacear. Gen.: Dracontium, Symplocarpus. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 240; 1841. Ench. p. 129. Gen. ead. — Kunth 1841. Enum. III. p. 83. Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. Gen. ead. — Meisn. 1842. Gen. p. 360 (269). Gen. ead.

Dracontium*) Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 434; 1737. Coroll. p. 18. n. 985; 1740. Syst. p. 30; 1742. Gen. ed. II. p. 442. n. 841; 1753. Sp. I. p. 967; 1759. Syst. ed. X. p. 1251. n. 916; 1763. Sp. ed. II. p. 1372; 1764. Gen. ed. VI. p. 471. n. 1029; 1767. Syst. ed. XII. p. 604: g. Gynandr. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 690; 1784. Syst. p. 829. — Reich. 1778. Gen. p. 466. n. 1120. — Pers. 1797. Syst. p. 873.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 127. n. 524: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27; 1764. Ord. nat.: g. Piperitar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 123.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Aroidear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 24. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 86. — Batsch 1802. Tab. p. 159. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 57. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 78. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 125; 1826. Syst. III. p. 766. n. 3057; 1831. Gen. II. p. 680. n. 3432. (in Monoec. Androgyn.) — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 482. — Link 1821. En. I. p. 353. — Agdh. 1822. Aphor. p. 132. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 135.
Hill 1769. Ht. kew. p. 217: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 68: g. Spadicear.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 234: g. Polyandr. Polygyn.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 245. n. 630: g. Heptandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 596. — Willd. 1799. Sp. II. p. 288. n. 720; 1809. En. p. 406. — Cram. 1803. Disp. p. 82.
Neck. 1790. El. III. p. 290. n. 1685: g. Emproophytor.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 337. Ed. Nees p. 193: g. Orontiacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 68. — Rich. 1833 in Guillem. Arch. bot. I. p. . . . ; 1849 in Orb. Dict. V. p. 123.
Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 774: g. Pothoinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: g. Orontiear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 33. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 194.
Schott 1832. Melet. p. 22: g. Dracontiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1704. p. 240; 1841. Ench. p. 129. — Kunth 1841. Enum. III. p. 83. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1116. — Meisn. 1842. Gen. p. 360 (269).
Brongn. 1843. Én. genr. p. 13: g. Callacear.
Synon. Quebitea Aubl. (Rchb.)

Dracontocephalium Hassk. vid. *Dracocephalum Linn.*

Dracontomelon*) Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 15. p. 231: nov. g. Spondiacear. (Poupartia mangifera Bl., etc.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 287: g. Anacardiear.

Dracontopsis Lemaire vid. *Dracopis Cass.*

Dracophyllum Labill. 1798. Voy. II. p. 211. t. 40. Ed. germ. II. (1802.) p. 151; 1806. Nov. Holl. II. p. 118: nov. g. Spergular.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 555. Ed. Nees p. 411: g. Epacridear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 485. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. xxx. 385. n. 733. —

*) Nomen ex Dioscoride.

*) Nomen ex malaico Indigenarum. *(Pomum Draconis Rumph.)*

Dracophyllum Labill. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL. — Bartl. 1830. Ord. p. 158. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 155. n. 773. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 689. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 123. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 167.
Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3345: g. Richeacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Epacrear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 769. — Endl. 1839. Gen. n. 4292. p. 750; 1841. Ench. p. 368. Sect.: Dacryanthus, Eudracophyllum. — Meisn. 1839. Gen. p. 249 (157). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 71. — Hook. f. 1845. Antarct. voy. I. p. 45. Char. emend. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 433.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 785: g. Epacricar.
Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4813: g. Richeear. Sect.: Dacryanthus, Dracophyllum.

Dracophyllum Spach 1840. Hist. vég. phan. IX. p. 434: g. Epacrear. restrict.
Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4813. 2: sect. Dracophylli.
= Eudracophyllum Endl.

Dracopis Cassini 1825. Dict. v. 35. p. 273; 1825. v. 38. p. 17; 1827. v. 46. p. 397. 400: nov. g. Rudbeckiear. (Rudbeckia amplexicaulis Vahl.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2649; 1841. Nom. p. 92. n. 3628. — Less. 1832. Syn. p. 226. — DC. 1836. Pr. V. p. 558. — Endl. 1838. Gen. n. 2515. p. 409; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen p. 202 (131). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 158. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1535: sect. Rudbeckiae.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 42. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 123 (melius *Dracopsis* vel *Dracontopsis*).
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 316: g. Euhelianthear.

Dracopsis Lemaire vid. *praeced.*

Dracunculeae Schott 1832. Melet. bot. p. 17: subtrib. Dracunculinar. Gen.: Dracunculus, Candarum, Pythonium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: trib. Aracear. Gen.: Arisarum, Arisaema, Biarum, Arum, Typhonium, Dracunculus, Pythonium, Amorphophallus.

Dracunculeae Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 5: trib. Aroidear. efilamentatar. stenozeugmaticar. orthotropooar. Subtrib.: Biarinae, Arinae, Helicophyllinae, Dracunculinae.

Dracunculia Rchb. 1841. Nomencl. p. 236: nomen pro *Dracunculo* (sect. Artemisiae) propositum.
= Oligosporus Cass.

Dracunculinae Schott 1832. Melet. bot. p. 16: trib. Androgynanthar. Subtrib.: Arisareae, Euaroideae, Dracunculeae.
Blume 1835. Rumphia I. p. 89: trib. Aracear. Subtrib.: Arisareae, Euaroideae, Atherureae. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 234; 1847. Ench. p. 128. Subtrib.: Arisareae, Euaroideae, Pythonieae. — Meisn. 1842. Gen. p. 362 (270). Subtrib. eaed.
Rchb. 1837. Hdb. p. 142; 1841. Nom. p. 32: subdiv. Aracear. Sect.: Arisareae, Aroideae genuinae, Candareae.
Kunth 1841. Enum. III. p. 14: trib. Aroidear. verar. Subtrib. ut Endl.
Schott 1856. Aroid. I. p. 23: subtrib. Dracunculear. Gen.: Dracunculus, Dochafa, Sauromatum, Arisaema.

Dracunculineae Spach 1846. Hist. vég. phan. XII. p. 37: trib. Callacear. Sect.: Arisareae, Euaroideae, Atherureae.

Dracunculus*) Tourn. 1700. Inst. p. 160. t. 70: g. pl. class. III. *Cf.* A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 124.
Linn. 1747. Fl. Zeyl. p. 198. n. 422: g. Gynandr. obscurum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 469: g. Arorum.
Schott. 1832. Melet. p. 17: g. Dracunculear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129.
Blume 1835. Rumphia I. p. 123. t. 27: g. Euaroidear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1679. p. 235; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 29. — Meisn. 1842. Gen. p. 362 (270).
Koch 1837. Syn. p. 682. Ed. II. p. 787: sect. Ari. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 474. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 329.
Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1091: g. Aroidear. (genuinar.) — Par. Webb 1850. Canar. III. p. 294. Sect.: Choerophallus.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 14: g. Colocasiear.
Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 10: g. Dracunculinar. — Par. Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 23.

Dracunculus Rupp. 1718. Fl. jen. p. 187: g. pl. class. VIII.
Besser 1829. Bull. soc. Mosc. VIII. p. 1: sect. Artemisiae. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 325. — DC. 1837. Pr. VI. p. 93. — Endl. 1838. Gen. n. 2694 *a.* p. 439; 1841. Ench. p. 242. — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 397. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 416. — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3451. 1. (serius *Dracunculia Rchb.*) — Walp. 1843. Rep. II. p. 639. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 198. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 560.
= Oligosporus Cass.

Drakaea**) Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. LV: nov. g. Arethusear. (D. elastica.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1367. n. $1598/_1$; 1841. Ench. p. 114 (*Drakea*). — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2167. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 126.
Lindl. 1840. Orchid. p. 428: g. Euarethusear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 383 (287). — Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 10.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Caleyidar.

---

*) Nomen herbae apud Plinium.
**) Dicat. Franc. Drake, navigatori.

Drakea Endl. Ench. vid. *praeced.*

Drakensteinia „Neck." DC. et Rchb. in synon. Geoffroyae, Endl. in synon. Hecastophylli: vid. *Drakenstenia Neck.*

Drakenstenia Neck. 1790. Elem. bot. III. p. 33. n. 1344: g. Cyteophytor.
= Acouroa Aubl.

Draparnaldia*) Bory 1808. Ann. Mus. XII. p. 399: nov. g. Algar. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 501.
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XXXVI. 124; 1821. Aphor. p. 98: g. Confervoidear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 302.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 189: g. Tremelloidator.
Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 182: g. Hydrophytar. loculatar.
Agdh. 1824. Syst. p. XXIV. 57: g. Batrachospermear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 343. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78. — Endl. 1836. Gen. n. 49. p. 4; 1841. Ench. p. 3. — Menegh. 1838. Cenni p. 27. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 189. — Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 601.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 190: g. Nostochinar.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 369. n. 3438: g. Tremelloidear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 85 (*Draparnalia*).
Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 438: g. Thoreacear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 757. n. 3858: g. Tremellacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 20: g. Myxonematum.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 121: g. Chaetophoroidear.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. ex Flora 1843. p. 466 (*Draparnaudia*): g. Euconfervear.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92): g. Chaetophoridear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 15. n. 38: g. Confervear. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 130.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 93; 1843. Phyc. gener. p. 286; 1845. Phyc. germ. p. 230: g. Draparnaldiear. — Par. Römer 1845. Deutschl. Alg. p. 8. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53. — Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 222.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . . : g. Chaetophorear. — Par. Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 71.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Confervidar.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 100: g. Myxonemear.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : g. Lyngbyear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 356. n. 241: g. Ulothrichear.
Derb. & Sol. 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 267: g. Sporozoidear.
Math. 1853. Belg. II. p. 513: g. Ulothricear.
Synon. Charospermum Link.

*) Dicat. Jac. Phil. Raym. Draparnaud, prof. Monspel.

Draparnaldieae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 93; 1843. Phycol. gener. p. 286: fam. Dermatosiphear. Gen.: Draparnaldia. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 8. (ectospermear.) Gen. id.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 230: fam. Confervinar. (postea Ulothricheis inserta.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: trib. Zoospermear. Gen.: Draparnaldia, Ulothrix, Stygeoclonium.
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 222: fam. Chlorosporear. Gen.: Ulothrix, Stigeoclonium, Chaetophora, Draparnaldia.

Draparnaldina Bory 1822. Dict. class. II. p. 226
= Batrachospermi Roth pars.

Draparnalia Ritgen vid. *Draparnaldia Bory.*

Draparnaudia Trevisan vid. *praeced.*

Draparnaudieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 102: trib. Ectosporear.
= Draparnaldieae Kütz.

Drapetes*) Lamarck 1792. Journ. hist. nat. I. p. 189. t. 10.
Pers. 1805. Ench. I. p. 148. n. 320: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 80. n. 371.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 199. t. 215.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 479: g. Thymelaear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 20. 333. n. 520. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 883; 1825. Syst. I. p. 455. n. 495; 1830. Gen. I. p. 109. n. 545. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 502. — Bartl. 1830. Ord. p. 115.
Agdh. 1826. Aphor. p. 233: g. Thymelear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 540. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 436. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 222.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1773: g. Daphnear. (?) — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 330 (242); 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 518. (isostemonear.)
Endl. 1838. Gen. n. 2097. p. 330; 1841. Ench. p. 209: g. Daphnoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2432.
C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 355: g. Passerinear. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 61. n. 2094.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 126: g. Daphnacear.

Drapiezia Blume 1828. En. pl. Jav. I. p. 8: nov. g. Colchicacear., inter Uvulariam et Streptopum medium, Disporo aff. (D. multiflora.) — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XXV. 312.
Bartl. 1830. Ord. p. 53: g. Asparagear.
Endl. 1837. Gen. n. 1083. p. 137; 1841. Ench. p. 79: g. Veratrear.
Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1715: g. Uvularicar. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306).
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 127: g. Melanthacear.
= Disporum Salisb.

*) δραπέτης, fugax.

Draytonia A. Gray 1853. Proc. Amer. Ac. III. p. 31: nov. g. Ternströmiacear., Sauraujae aff. (*cf.* Flora 1855. p. 395), a Griseb. (Jahresber. p. 385) Sauraujeis adnumeratum. *Cf.* Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 350.

Drebbelia*) Zolling. 1846. Obs. phyt. III. p. 66 ex Hasskarl 1847. Flora II. p. 702: nov. g. Dalbergiear., Spatholobo Hassk. aff. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 255.
Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 238 adnot. Spatholobo injungit.

Dregea**) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 199: nov. g. Asclepiadear. verar.
Endl. 1838. Gen. n. 3494. p. 595; 1841. Ench. p. 299: g. Gonolobear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540. — Meisn. 1840. Gen. p. 269 (176). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 5014. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 127.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 618: g. Pergulariar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.
Synon. Pterophora Harv.

Dregea***) Ecklon & Zeyh. 1837. Enum. pl. Afr. austr. III. p. 350: nov. g. Peucedanear. (Laserpitium capense Thunb.) *Cf. Ifdregea Steud.* — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106).
= Sciothamnus Endl.

Drejera Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 93. 112; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 334: nov. g. Gendarussear. — Par. Oersted 1858. Centralam. Acanth. p. 41. Char. emend. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 660.

Drepanandrum Necker 1790. Elem. bot. II. p. 118. n. 793: g. Plyrontophytor.
= Topobea Aubl.

Drepania†) Juss. 1789. Gen. p. 169: nov. g. Cichoracear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 485. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 375. — DC. 1805. Franç. IV. p. 47.
Desf. 1799. Fl. Atl. II. p. 232.
Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 506: g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 146.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 63; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Hieraciear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 50.
Tausch 1828. Flora I. Erg. Bl. p. 81: sect. Tolpidis. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 86.
= Tolpis Adans.

Drepanocarpus C. F. W. Meyer 1818. Fl. Esseq. p. 236.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Dalbergiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 420. — Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4018; 1841. Nom. p. 153. n. 6001. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 377. —

*) Dicat. Drebbel, thermometri inventori.
**) Dicat. J. F. Drege.
***) Dicat. fratribus C. F. et J. F. Drege.
†) δρεπάνη, falx: e squamis falcatis.

Drepanocarpus Meyer cont.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 157. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (68). — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 95. — Endl. 1841. Gen. n. 6709. p. 1303; 1841. Ench. p. 673. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 128.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 390: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 77.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 573. n. 2796: g. Leguminosar.
Synon. Orucaria Clus.; Sommerfeldtia Schum.; Nephrosis Rich.

Drepanocladus C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 321: subsect. Mallacodii. (Hypnum uncinatum L.)
Synon. Harpidium Sulliv.

Drepanohypnum Hampe 1852. Bot. Zeit. p. 71: sect. Hypni.

Drepanolobus „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 324: sect. Hosackiae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6517 *b.* p 1269; 1841. Ench. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5705. 2. — Walp. 1842. Rep. I. p. 649.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Trifoliear. (*Synon. Syrmatium Vog.*)

Drepanometra Hasskarl 1858. Hort. Bogor. I. p. 308: nov. g. Pritzeliear.?, Begoniae et Saueriae analogum.

Drepanophyllaria C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 418: subsect. Rigodii. (Hypnum filicinum L.)
Synon. Cratoneuron et Rhytidium Sulliv.

Drepanophylleae Hampe 1837. Linnaea XI. p. 82; 1839. ibid. XIII. p. 45: fam. Muscor. Gen.: Fissidens.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 94: fam. Entophyllocarpor. (Gen.: Phyllogonium.)
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 39: trib. Acrocarpor. Gen.: Drepanophyllum.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: trib. Pleurocarpor. Gen.: Conomitrium, Fissidens, Drepanophyllum.

Drepanophyllum Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 109: nov. g. Umbelliferar. (Sium Falcaria et latifolium L.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 504. (Sium latifolium L.)
Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 881: sect. Sii. — Par. Gaud. 1828. Helv. II. p. 430.
= Falcaria Riv. et Sium Koch.

Drepanophyllum Rich. 1820 in Hook. Musc. exot. II. t. 145: nov. g. Muscor. — Par. Schwägr. 1823. Suppl. II. Vol. I. 1. p. 84. t. 125. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 148. n. 3296; 1831. Gen. II. p. 728. n. 3692. (frondosor.)
Brid. 1827. Bryol. II. p. 668: g. Entophyllocarpor. (gymnostomor.) — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60. — Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 90.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLVI: g. Filicoideor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 540.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.
Endl. 1836. Gen. n. 596. p. 57; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 974: g. Calyptrobryor.

Drepanophyllum Rich. cont.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 39: g. (unicum) Drepanophyllear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400.
Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 128: g. Fissidentear.

Drepanophyllum Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 123: g. Amminear. restrict. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 396. — Tausch 1834. Flora I. p. 354.
= Falcaria Rivin.

Drepanospron*) Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 136: sect. Phaseoli. — Par. Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 279. — Endl. 1841. Gen. n. 6674 *a*. p. 1296; 1841. Ench. p. 672. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5775. 1. — Walp. 1842. Rep. I. p. 770. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 193.

Driandra Correa vid. *Dryandra Thunb.*

Driandra Dumort. vid. *Dryandra R. Brown.*

Driessenia**) Korthals . . . . Verh. natuurl. Geschied. p. 251. t. 53.
Walp. 1846. Rep. V. p. 687: g. Lavoisierear.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 13: g. Sonerilear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 283: g. Dissochaetear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 537.

Drilosiphon***) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1843. Phycol. gener. p. 214; 1845. Phycol. germ. p. 175; 1849. Sp. Alg. p. 302. n. 209: g. Scytonemear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 129: g. Oscillatoriear.
Synon. Inoconia Lib.

Drimia Jacq. 1786. Ic. rar. t. 373—377: nov. g. Hexandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 510. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 165. n. 651. — Pers. 1805. Ench. I. p. 374. n. 827.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 131: g. Asphodelear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 238. n. 964. — Agdh. 1823. Aphor. p. 163. — Schult. 1829. Syst. VII. p. xxxviii. 594. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60.
Schrad. . . . . Comm. Götting. IV. p. 114. *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 167.
Link 1821. En. I. p. 330: g. Liliacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 75. n. 1223; 1830. Gen. I. p. 258. n. 1346. — Eckl. 1827. Verz. p. 2. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1110.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1365; 1841. Nom. p. 48. n. 1780: g. Scillear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 50. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Endl. 1837. Gen. n. 1125. p. 145; 1841. Ench. p. 84: g. Hyacinthear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 393 (303). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 338. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 315. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 131 *(Drimya)*.
Miquel 1839. Bull. Néerl. p. 40.
Brongn. 1843. En. genr. p. 19: g. Hyacinthinear.
Synon. Lachenaliae sp. Jacq.

*) δρέπανον, legumen.
**) Dicat. Driessenio, professori quondam Groningensi.
***) δρίλος, lumbricus.

Drimiopsis Lindl. 1852 in Paxt. Fl. gard. Glean. nr. 343. *Cf.* Bot. Zeit. 1852. p. 775.

Drimya Lemaire vid. *Drimia Jacq.*

Drimyphyllum Burch. mss.
= Petrobium R. Brown.

Drimys*) Forst. 1776. Char. gen. p. 83. t. 42; 1780. Nov. Act. Ups. III. p. 181: nov. g. Polyandr. Tetragyn.
Scop. 1777. Intr. p. 252 (sphalm. *Brimys)*: g. Polycarpiar.
Linn. f. 1781. Suppl. p. 43. n. 1403: g. Polyandr. Polygyn.
Neck. 1790. El. II. p. 319. n. 1101: g. Acascophytor.
DC. 1818. Syst. I. p. 442: g. Magnoliacear. Sect.: Drimys, Wintera. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 374. — Hook. f. 1853. N. Zeal. p. 12.
R. Brown 1818 in DC. Syst. I. p. 548: g. Winterear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 3 (5). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 419.
DC. 1824. Pr. I. p. 78: g. Illiciear. Sect.: Eudrimys, Wintera. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 249. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 79. Sect. ut DC. — Endl. 1839. Gen. n. 4742. p. 839; 1841. Ench. p. 428. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 131. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 43.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 628. n. 2004; 1830. Gen. I. p. 452. n. 2231: g. Magnoliear.
Synon. Drymis Juss.; Wintera Murr.; Winterana Sol.; Magallana Comm.; Canella Domb.; Boique Mol.

Drimys DC. 1818. Syst. I. p. 442: sect. Drimydis.
= Eudrimys DC.

Drimyspermum Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 15: nov. g. Lysimachiar.
Endl. 1843. Spl. III. p. 65. n. 2109; 1847. Spl. IV. p. 72: g. Aquilarinear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 409. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 443.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 579: g. Aquilariacear.
Synon. Phaleria Jack; Drymispermum Rchb.

Dripax Noronh. mss.
= Alsodeia Pet.-Thouars.

Drobowskia Brongn. vid. *Dobrowskya Presl.*

Drogouetia Steud. vid. *seq.*

Droguetia Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 505: nov. g. Forskaliear. (Urtica leptostachys Pers.) *Cf.* Endl. Gen. p. 285, Steud. Nom. I. p. 531 *(Drogouetia)* et Meisn. Comm. p. 260.
Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2505: g. Forskolear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25: g. Forskahlear. — Par. Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 211. (Flora 1855. p. 527.)
Endl. 1847. Spl. IV. p. 37. n. 1887/1 *(Drouguetia)*: g. Urticacear.
Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 396: g. Euforskohlear.
Synon. Didymogyne Wedd.

*) δριμύς, acri gustu.

Dromius Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 364: sect. Sphaerococci. (Fucus punctatus With. et ulvoides Turn.)
= Aglaophylli et Cryptopleurae sp. Kütz.

Dromophylla Lindl. vid. *Dermophylla Silva Manso.*

Drosanthe*) Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 376; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 355: g. Drosanthinear. (D. hirtella, ledifolia, etc.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 307; 1841. Nom. p. 210. n. 7993: g. Drosanthear.
Endl. 1840. Gen. n. 5464 *A b.* p. 1032; 1841. Ench. p. 539: sect. Hyperici.
Walp. 1843. Rep. II. p. 809: g. Hypericinear.

Drosantheae Rchb. 1837. Handb. p. 307; 1841. Nomencl. p. 210: sect. Hypericear. genuinar. Gen. Drosanthinear. Spach.

Drosanthineae Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 342. 374; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 354: sect. Hypericear. Gen.: Eremosporus, Drosanthe.

Drosanthus R. Brown mss. (teste Planchon.)
= Byblis Salisb.

Drosera**) Linn. 1737. Gen. p. 89. n. 253; 1740. Syst. p. 21; 1753. Sp. I. p. 281; 1759. Syst. ed. X. p. 969. n. 351; 1762. Sp. ed. II. p. 402; 1764. Gen. ed. VI. p. 154. n. 391; 1767. Syst. ed. XII. p. 225. n. 387: g. Pentandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 251; 1784. Syst. p. 303. — Reich. 1778. Gen. p. 156. n. 421. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 207. n. 531. — Lour. 1790. Coch. I. p. 186. — Gmel. 1791. Syst. p. 514. — Pers. 1797. Syst. p. 322; 1805. Ench. I. p. 336. n. 751. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1543. n. 592; 1809. En. p. 340. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 244. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 26. 462. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 113.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126 *(Drossera)*; 1764. Syst. p. 38. n. 150: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Gruinalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 320. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 190.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 90: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 190: g. Pentapetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 487: g. Sedacear.
Scop. 1777. Intr. p. 331: g. Caryophyllear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 291. t. 61. f. 2 (longifolia).
Juss. 1789. Gen. p. 245: g. Capparidibus aff.
Neck. 1790. El. II. p. 160. n. 858: g. Catotaphytor. Sejungitur Esera.
Vent. 1799. Tabl. IV. p. 19: g. incerti ordinis.
Hayne 1800 in Schrad. Journ. I. p. 36.
Batsch 1802. Tab. p. 31: g. Ciliatar.
Cram. 1803. Disp. p. 69 in Pentandr. Polygyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 5: g. Capparideis aff. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 728. — Hedw. 1806. Gen. p. 213. n. 876.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 777: g. Capparidum. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. LXVIII. 759. (?)
Lois. 1819. Dict. v. 13. p. 523: g. Droseracear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 664. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 390. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63; 1829. Anal. fam. p. 49. — Kunth 1824. Syn. III. p. 308; 1838. Berol. I. p. 97. — DC. 1824. Pr. I. p. 317. Sect.: Rorella, Ergaleium. — St. Hil. 1824. Mém. Mus. XI. p. 335; 1829. Fl. Bras. II. p. 130. — D. Don 1825. Nepal. p. 212. — Bartl. 1830. Ord. p. 286. — Link 1831. Hdb. II. p. 265. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 343. Sect.: Rorella, Ergaleum. — Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 66; 1839. Swan-River p. XX; 1847. Veg. kd. p. 434. — Koch 1836. Syn. p. 89. Ed. II. p. 97. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 489. — Meisn. 1837. Gen. p. 22 (19). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 145. — Endl. 1839. Gen. n. 5033. p. 907; 1841. Ench. p. 468. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 102. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 261. — Brongn. 1843. En. genr. p. 89. — Lehm. 1845. Pl. Preiss. I. p. 249. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 191. — Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 91. 187. Sect.: Psychophila, Arcturia, Thelocalyx, Rossolis, Crypterisma, Ptycnostigma, Arachnopus, Phycopsis, Coelophylla, Lamprolepis, Bryastrum, Lasiocephala, Ergaleium. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 136. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 69. Sect. eaed. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 19.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 141: g. Pentandr. Monogyn.
Link 1821. En. I. p. 299: g. Droserinar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 954. n. 1143; 1830. Gen. I. p. 236. n. 1244: g. Droserear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX; 1828. Consp. p. 189. n. 4910; 1832. Fl. exc. p. 711. Sect. (1828): Rorella, Ergaleium. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1017.
Arn. 1836. Bot. Mag. II. p. 313. (Spec. ind.) Sect.: Rocella, Ergaleium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 271; 1841. Nom. p. 188. n. 7175: g. Rorellear. Sect.: Anascidia, Drosera.
Synon. Ros Solis Tourn.; Rossolis Adans.; Esera Neck.

Drosera Cramer 1803. Disp. syst. p. 107: g. Decandr. Monogyn. (D. lusitanica.)
= Drosophyllum Link.

Droseraceae DC. 1813. Théor. élém. I. p. 214. Ed. II. 1819. p. 244; 1824. Prodr. I. p. 317: ordo (17) Thalamiflorar. Gen. (1824): Drosera, Aldrovanda, Romanzowia?, Byblis, Roridula, Drosophyllum, Dionaea, Parnassia? — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831.

*) *δρόσος*, ros.
**) *δροσερός*, roscidus, rorulentus. Cf. Linn. Fl. lapp. p. 77.

Droseraceae DC. cont.
Gen. syst. I. p. 343. Gen. ut DC. — Koch 1836. Syn. p. 89. Ed. II. p. 97. Gen.: Drosera, Parnassia.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 664: fam. Thalamiflorar. Gen.: Drosera.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 63: fam. Thalamunguliae. Gen.: Drosera, Dionaea.
St. Hil. 1824. Mém. Mus. XI. p. 335.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Valviflorar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 49: fam. Cistariar. Gen.: Drosera, Aldrovanda, Byblis, Drosophyllum.
Bartl. 1830. Ord. p. 285: ordo (163) Cistiflorar. Gen. ut DC. exclusis Romanzowia et Parnassia.
Link 1831. Hdb. II. p. 265: ordo 11 Anastemonum. Gen.: Drosera, Drosophyllum, Dionaea, Aldrovanda, Parnassia.
Lindl. 1833. Nix. p. 18: ordo Violalium.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 33. Subord.: Drosereae, Parnassieae.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 66) 1847. Veg. kd. p. 433: ordo Berberalium. Gen. ut Endl. et Sondera.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 486: fam. (84) Cistiflorar. Gen. ut Bartl.
Meisn. 1837. Gen. p. 22 (19): ordo 19 plant. (p. 438 Parietalium). Gen. ut DC. (exclusa Romanzowia) et Bohadschia?, Wormskioldia?
Endl. 1839. Gen. p. 906; 1841. Ench. p. 467: ordo Parietalium. Gen. ut Bartl. Accedit 1850 (Spl. V. p. 44) Sondera.
Brongn. 1843. En. genr. p. 89: fam. Violinear. Gen.: Drosera, Dionaea, Parnassia.
Lehm. 1844. Bot. Zeit. p. 109. Gen.: Drosera, Sondera, Byblis.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 79. 185. Gen. ut Bartl. *Cf.* Flora 1848. II. p. 690 et Griseb. in Arch. f. Naturg. 1849. II. p. 421.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 136. Trib. ut Wight & Arn.

Drosereae Salisb. 1809. Parad. p. 95.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX: div. Violear. Gen.: Aldrovanda, Drosera, Roridula, Drosophyllum, Dionaea.
Rchb. 1828. Consp. p. 189 (1832. Fl. exc. p. 711): div. Cistinear. Gen. ead. et Byblis. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 271; 1841. Nom. p. 188. Subdivis.: Rorelleae, Roriduleae, Muscipuleae.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 33: subordo Droseracear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 137: trib. Droseracear. Gen. ut Rchb. 1828.

Droserinae Link 1821. Enum. I. p. 396. = Droseraceae DC.

Drosocarpium Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 358: sect. Hyperici. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1033. n. 5464 *A b d*; 1841. Ench. p. 539. n. 5464 *B d c*. — Rchb. 1841. Nom. p. 210. n. 7994. 4.

Drosophorus „R. Brown" Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 306: sect. Byblidis. (B. liniflora Endl.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 79.

Drosophyllum Link 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 51: nov. g. Caryophyllear. (Drosera lusitanica L.)
St. Hil. 1816. Mém. Mus. II. p. 124.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 777: g. Capparidum.
DC. 1824. Pr. I. p. 320: g. Droseracear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 286. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 347. — Link 1831. Hdb. II. p. 265. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 488. — Meisn. 1837. Gen. p. 22 (19). — Endl. 1839. Gen. n. 5036. p. 907; 1841. Ench. p. 469. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 434. — Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 304. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 137.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 432. n. 1727; 1830. Gen. I. p. 382. n. 1925: g. Droserear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX; 1828. Consp. p. 189. n. 4911 *b*. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1384. 1616.
Rchb. 1837. Hdb. p. 271; 1841. Nom. p. 188. n. 7177: g. Rorellear.

Drossera Gled. vid. *Drosera Linn.*

Drouguetia Endl. vid. *Droguetia Gaudich.*

Drozia Cassini 1825. Dict. v. 34. p. 206. 217; 1830. v. 60. p. 584: g. Trixidear. (Opusc. phyt. II. p. 171.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34.
Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2285: g. Nassauviear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 137.
Less. 1830. Linnaea V. p. 20; 1832. Syn. p. 410: subg. Pereziae.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 61: sect. Clarioneae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2962 *a β*. p. 492; 1841. Ench. p. 249.
Conf. Palesia D. Don.

Drummondia*) Hook. . . . . in Drumm. Musc. Amer. nr. 62.
Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 43: g. Orthotrichear. — Par. C. Müll 1849. Syn. Musc. I. p. 686.
Synon. Anodontium Brid.; Chaenomitrium Müll.

Drummondia DC. 1830. Prodr. IV. p. 49: nov. g. Saxifragear. (Mitella pentandra Hook.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 228. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 64. (verar.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 230: g. Mitellear. = Mitellaria Meisn.

Drummondita Harvey 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 53: nov. g. Diosmear. (D. ericoides.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 408.

Drupaceae Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: ordo 38 plant. Gen.: Amygdalus, Prunus, Cerasus, Padus.
DC. 1805. Franç. IV. p. 479: ordo Rosacear. Gen.: Cerasus, Prunus, Armeniaca, Amygdalus, Persica.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 589: fam. Calyciflorar. Gen.: Cerasus, Prunus.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Caliculiae.

*) Dicat. James L. Drummond, peregrinatori.

Drupaceae Linn. cont.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. LXXVIII: div. Pomacear. Gen.: Prunus; Ribes?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 557: ordo Rosalium. Gen.: Pygeum, Amygdalus, Ceraseidos, Prunus, Cerasus.
= Amygdaleae Juss.

Druparia Rafin. 1808. New-York med. repos. V. p. 358: g. Fungor., Lycogalae et Sclerodermati aff., teste Leman 1819. Dict. v. 13. p. 527. *Cf. Drupasia Rafin.*

Druparia Silva Manso 1836. Cataract. Bras. p. 25.
Endl. 1843. Spl. III. p. 91. n. 5152/5: g. Cucurbitacear. dubium. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 765. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 21. 110.

Drupasia Rafin. 1808 in Desv. journ. bot. I. p. 223: nov. g. Fungor. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 31 (dubium).
= Druparia Rafin. (teste Leman 1819. Dict. v. 13. p. 527.)

Drupatris*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 314. Ed. Willd. p. 384: nov. g. Icosandr. Monogyn. (D. cochinchinensis.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 167: g. Myrtear. — Par. Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 81. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 479. n. 1820.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 528: g. Ebenacear.
Meisn. 1839. Gen. p. 250 (158): g. Styracear.?

Drupeae C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 352. Gen.: Prunus, Amygdalus.
= Amygdaleae Juss.

Drupiferae Batsch 1802. Tab. affin. p. 4: fam. Frugariar. Gen.: Prunus, Petrocarya, Grangeria, Chrysobalanus, Hedycrea, Acioa, Cuepia.

Drupiferae Karsten 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 217: div. Gymnospermar. Fam.: Taxineae, Gnetaceae.

Drupina Linn. 1775. Amoen. acad. VIII. Ed. 1785. p. 259: nov. g. Didynamiae non descriptum.
= Besleria bivalvis Linn. Suppl.
= Picria Lour. (ex Spreng.)

Drusa DC. 1807. Ann. Mus. X. p. 466. t. 38: nov. g. Umbelliferar. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 529 et Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 137. — Par. Spreng. 1813. Umbell. prodr. p. 15. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 94. (Divis. 1.) — Bartl. 1830. Ord. p. 236 (desciscens).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 630; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXIII. 363; 1825. Syst. I. p. 880. n. 1038; 1830. Gen. I. p. 221. n. 1139: g. Hydrocotylinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3770: g. Hydrocotylear.?
DC. 1830. Pr. IV. p. 80: g. Mulinear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 261. — Tausch 1834. Flora I. p. 345. — Rchb. 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5521. — Meisn. 1838. Gen. p. 140 (102). — Endl. 1839. Gen. n. 4372. p. 765;

*) „Etym. Quasi drupa ternaria, quae tres nucleos continet."

Drusa DC. cont.
1841. Ench. p. 377. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 934. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 134. — Parlat. . . . . in Webb Canar. II. p. 147. — Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Mulinidar.

Dryadanthe Endl. 1840. Gen. n. 6366. p. 1242; 1841. Ench. p. 659: nov. g. Chamaerhodear. (Sibbaldia tetrandra Bunge.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 37. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 33. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 138.
Rchb. 1841. Nom. p. 167. n. 6491: g. Sibbaldiear.
Meisn. 1843. Comm. p. 354: g. Dryadear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 564: g. Potentillidar.

Dryadeae Vent. 1799. Tabl. III. p. 346: sect. Rosacear. Gen.: Tormentilla, Potentilla, Fragaria, Comarum, Geum, Dryas, Rubus.
DC. 1805. Franç. IV. p. 454: ordo Rosacear. Gen. ead.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 577: fam. Calyciflorar. Gen.: Dryas, Geum, Sibbaldia, Potentilla, Fragaria, Rubus.
DC. 1825. Pr. II. p. 549: trib. (5) Rosacear. Gen.: Dryas, Geum, Waldsteinia, Comaropsis, Rubus, Cylactis, Dalibarda, Fragaria, Potentilla, Sibbaldia, Agrimonia, Aremonia, Brayera. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 524. Gen. ead. et Sieversia, Coluria, Cowania, Duchesnea, Tormentilla, Comarum, Horkelia, Chamaerhodos. — Koch 1836. Syn. p. 208. Ed. II. p. 231. Gen.: Dryas, Geum, Rubus, Fragaria, Comarum, Potentilla, Tormentilla (1843 emissa), Sibbaldia, Agrimonia, Aremonia. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73). Gen. fere ut G. Don. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 419. Subtrib.: Eudryadeae, Cercocarpeae, Sanguisorbeae, Chamaerhodeae, Fragarieae, Dalibardeae. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125. Gen. ex Endl.
Bartl. 1830. Ord. p. 401: ordo (239) Calophytar. Gen.: Rubus, Cylactis, Dalibarda, Fragaria, Comarum, Potentilla, Sibbaldia, Dryas, Cowania, Geum, Sieversia, Biebersteinia, Waldsteinia, Comaropsis, Agrimonia, Aremonia, Brayera, Cercocarpus, Alchemilla, Cephalotus?, Margyricarpus, Polylepis, Acaena, Sanguisorba, Poterium, Cliffortia.
Link 1831. Hdb. II. p. 98: ordo 32 Perigynar. Gen.: Dryas, Geum, Waldsteinia, Sibbaldia, Potentilla, Fragaria, Comarum, Rubus, Agrimonia, Aremonia.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 451: fam. 8 Calophytar. Gen. ut Bartl. et Horkelia, Coluria.
Endl. 1840. Gen. p. 1241; 1841. Ench. p. 659: subordo Rosacear. Sect. ut Torr. & Gray. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 649.
Rchb. 1841. Nom. p. 167: subdiv. Potentilear. Sect.: Sibbaldieae, Potentilleae genuinae, Dryadeae *genuinae* (gen.: Waldsteinia,

Dryadeae Vent. cont. Comaropsis, Sieversia, Fallugia, Geum, Cowania, Coluria, Dryas).

Griseb. 1843. Rumel. I. p. 95: subtrib. Rosear. Gen.: Dryas, Geum, Potentilla, Fragaria, Rubus, Rosa, Agrimonia, Aremonia, Alchemilla, Poterium.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 208: fam. Rosacear. Trib. ut Endl.

Dryados Tausch 1823. Hort. Canal. fasc. I: sect. Gei.
= Eugeum Torr. & Gray.

Dryandra*) Thunb. 1783. Nov. gen. III. p. 60; 1784. Fl. japon. p. 13: nov. g. Monadelph. Enneandr. (a R. Brown [Linn. Trans. X. p. 211] synonymum Aleuritis Forst. declaratum.) — Par. Murr. 1784. Syst. p. 612. — Gmel. 1791. Syst. p. 1014. — Pers. 1797. Syst. p. 650.

Juss. 1789. Gen. p. 389: g. Euphorbiar.

Neck. 1790. El. III. p. 359. n. 1790: g. Comizophytor.

Schreb. 1791. Gen. II. p. 708. n. 1557: g. Dioec. Monadelph. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 203. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 865. n. 1847. — Pers. 1807. Ench. II. p. 634. n. 2294.

Batsch 1802. Tab. p. 169: g. Tricoccar.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 283: g. Euphorbiacear. — Par. Correa 1806. Ann. Mus. VIII. p. 69 *(Driandra)*. t. 1. f. 1. — Agdh. 1823. Aphor. p. 194.
Synon. Abrasin Kämpf.; Elaeococca Comm.; Vernicia Lour.; Elaeococcos Wittst.

Dryandra**) R. Brown 1809. Linn. Trans. X. p. 211 (Verm. bot. Schr. II. p. 325); 1810. Prodr. I. p. 396. Ed. Nees p. 252: g. Proteacear. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 530. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 28. 445. n. 561. — Wendl. 1819. Flora I. p. 130. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 486. n. 532; 1830. Gen. I. p. 108. n. 542. — Link 1829. Hdb. I. p. 386. — — Bartl. 1830. Ord. p. 118. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 539. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 589; 1847. II. p. 265. Sect. ut R. Brown et Eudryandra.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 339: g. Embothriear.

Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1768; 1841. Nom. p. 63. n. 2389: g. Banksiear. Sect. (1841): Dryandra, Aphragma. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18 *(Driandra)*. — Endl. 1838. Gen. n. 2158. p. 343; 1841. Ench. p. 216; 1847. Spl. IV. p. 89. Sect. ut R. Brown et 1847 Eudryandra. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 431. — Meisn. 1841. Gen. p. 333 (246); 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 567. Sect. ut Endl. 1847. — Brongn. 1843. En. genr. p. 121.

R. Brown 1830. Suppl. I. p. 37. (Verm. bot. Schr. V. p. 113.) Sect.: Diplophragma, Aphragma.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Banksidar.
= Josephia Knight.

Dryas*) Linn. 1737. Gen. p. 148. n. 419; 1737. Cliff. p. 195; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 501; 1759. Syst. ed. X. p. 1065. n. 562; 1762. Sp. ed. II. p. 717; 1764. Gen. ed. VI. p. 256. n. 637; 1767. Syst. ed. XII. p. 352: g. Icosandr. Polygyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 366. — Murr. 1774. Syst. p. 399; 1784. Syst. p. 480. — Reich. 1778. Gen. p. 261. n. 693. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 343. n. 868. — Pers. 1797. Syst. p. 516; 1807. Ench. II. p. 57. n. 1244. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1118. n. 1003; 1809. En. p. 558. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 309. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 296. 415.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 335: g. Gymnopolyspermar.

Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 177. n. 1141: g. Calycostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Senticosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Batsch 1802. Tab. p. 10. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 329.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 188. — Lois. 1819. Dict. v. 13. p. 509. — Link 1822. En. II. p. 66. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 417. n. 2080. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 193.

Adans. 1763. Fam. II. p. 295: g. Rosar.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 187: g. Calyciflorar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 226: g. Polypetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 221: g. Calycanthemar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 352. t. 74. f. 2 (octopetala).

Juss. 1789. Gen. p. 338: g. Potentillar.

Neck. 1790. El. II. p. 95. n. 760: g. Sarcodiphytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 861: g. Polyandr. Polygyn.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 349: g. Dryadear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 473; 1825. Pr. II. p. 549. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 578. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 266. — Bartl. 1830. Ord. p. 402. — Link 1831. Hdb. II. p. 98. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 524. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 47. — Koch 1836. Syn. p. 209. Ed. II. p. 232. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73). — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6507. (genuinar.) — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 95. — Brongn. 1843. En. genr. p. 125. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 518. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 138.

Nestl. 1816. Potentill. p. 16: g. Fragariacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 79.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 865; 1825. Syst. II. p. 527. n. 1861: g. Potentillear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII; 1828. Consp. p. 167. n. 4446; 1832. Fl. exc. p. 599.

Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 419:

*) Dicat. Jon. Dryander, Suevo.

**) Dryandra Forst. ab Auctore ad Aleuritem Forst. reducitur.

*) Dryades (a δρῦς, quercus) silvarum deae. Nomen ob foliorum formam. (Linn. Fl. lapp. p. 173.)

Dryas Linn. cont.
g. Eudryadear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6389. p. 1247; 1841. Ench. p. 659. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 20.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Potentillidar.

Dryinosphaera*) Dumort. 1822. Comm. bot. p. 87: g. Sphaeriear. (Sphaeria Pinastri, stricta, flexilis [dryina], etc.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Dryinospherar.

Dryinospherae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: trib. Sphaeriacear. Gen.: Trichosphaera, Phialisphaera, Siphosphaera, Dryinosphaera.

Drymaria „Willd. herb." Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXI. 406. n. 976: nov. g. Pentandr. Monogyn. (D. arenarioides, etc.)
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 21. t. 515. 516: g. Caryophyllear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 341. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 942. n. 1117; 1830. Gen. I. p. 193. n. 978. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 168. — Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 232. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 849.
DC. 1824. Pr. I. p. 395: g. Alsinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 426. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205.
Bartl. 1825. Beitr. II. p. 158; 1830. Ord. p. 302: g. Spergulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4273; 1841. Nom. p. 162. n. 6308. — Meisn. 1838. Gen. p. 133. — Endl. 1840. Gen. n. 5220. p. 962; 1841. Ench. p. 504. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 138. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 246.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: g. Paronychiear. — Par. Bartl. 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 6.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 358: g. Illecebrear.
Meisn. 1838. Comm. p. 97: g. Spergulariear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 104: g. Polycarpear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1053.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.

Drymaria Rchb. Consp. p. 38: vid. *Drynaria Bory.*

Drymcosphace Duch. vid. *Drymosphace Benth.*

Drymeia Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 58; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Carex Drymeia.)

Drymiphila Juss. vid. *Drymophila R. Brown.*

Drymis Juss. 1789. Gen. p. 280: g. Magnoliar.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 70: g. Tulipiferar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 75: g. Magnoliacear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 533. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 53. — Kunth 1824. Syn. III. p. 122. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 24.

*) δρύινος, quercinus.

Drymis Juss. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX; 1828. Consp. p. 192. n. 4968: g. Illiciear. Sect. (1828): Eudrymis, Wintera. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 96.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7298: g. Winterear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 436: g. Winterinear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 214. 289: g. Dilleniear.
= Drimys Forst.

Drymispermeae Meisn. 1857 in DC. Prodr. XIV. 2. p. 603: trib. Aquilarinear. Gen.: Pseudais, Drymispermum.

Drymispermum Rchb. 1841. Nomencl. p. 65. n. 2448: g. Daphnoidear.
Decne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 38: g. Aquilariear. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 598.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 289: g. Aquilarinear.
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 603: g. Drymispermear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 884.
= Drimyspermum Reinw.

Drymoda*) Lindl. 1838. Sert. Orchid. t. 8 c: nov. g. Epidendrear. *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 467. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $1397/_2$. p. 1363; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 1998. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (279.) — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Dendrobidar.?

Drymoglossum Presl 1836. Pterid. p. 227: nov. g. Taenitidear. *Cf.* Presl 1850. Epimel. bot. p. 517. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 140. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693.
Endl. 1841. Spl. I. n. 614 *b*. p. 1346; 1841. Ench. p. 36: sect. Notochlaenae. — Par. Rchb. 1841. Nom p. 28. n. 1001. 2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 94: g. Vittariear. Sect.: Eudrymoglossum, Lemmaphyllum.

Drymonaetes Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 52; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Bromus giganteus L.)
= Festucae spec.

Drymonia**) Martius 1829. Nov. gen. III. p. 57. t. 224: nov. g. Gesnerear. (D. calcarata.) *Cf.* Flora Lit. I. p. 11. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 653: g. Besleriear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 543. — Meisn. 1840. Gen. p. 304 (214). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 62. — Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 360.
Endl. 1839. Gen. n. 4160. p. 720; 1841. Ench. p. 349: g. Episciear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4685. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 578. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 139.

*) δρυμώδης, sylvosus, sylvestris.
**) δρυμονία, sc. βοτάνη, planta sylvestris.

Drymonia Martius cont.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257: g. Gesneriear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 4. t. 204.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 207: g. Drymoniear. (D. calcarata et serrulata Mart., bicolor Lindl.)

Drymonieae Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 199: subtrib. Besleriear. Gen.: Episcia, Cyrtodeira, Physodeira, Skiophila, Heintzia, Paradrymonia, Nautilocalyx, Alsobia, Drymonia.
Oersted 1858. Gesn. centroam. p. . . . : div. Eubesleriear. Gen. ead. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 432.

Drymopalaeus „Zipp." Lindl. vid. *Drymophlaeus Zipp.*

Drymophila*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 292. Ed. Nees p. 148: nov. g. Smilacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 161. — Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1318. — Schult. 1829. Syst. VII. p. xxv. 313.
Juss. 1816. Dict. v. 3. spl. p. 53 *(Drymiphila)*: g. Asparaginear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 536.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 99. n. 1266; 1830. Gen. I. p. 270. n. 1406: g. Sarmentacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1157.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Maianthemear.
Bartl. 1830. Ord. p. 53: g. Asparagear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 403 (306). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 210. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Endl. 1837. Gen. n. 1179. p. 154; 1841. Ench. p. 88: g. Convallariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1728. — Lemaire 1849 in Orb. Dict. V. p. 139.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 211: g. Uvulariear. dubium.

Drymophlaeus**) Zippel 1829. Flora I. p. 185. *Cf.* Meisn. Comm. p. 267 *(Drymophloeus)* et Endl. Spl. III. p. 68.
Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2281 *(Drymophloeus)*: g. Cocoinar.?
Hassk. 1842. Flora II. Beibl. p. 14: g. Palmar., Caryotae et Oraniae aff.
Meisn. 1843. Comm. p. 370: g. Arecinar. — Par. Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 63. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 750.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138 *(Drymopalaeus)* in synon. Ptychospermae.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 464: sect. Seaforthiae.
Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 29: sect. Ptychospermae.

Drymophloeus Meisn., Rchb. vid. *praeced.*

Drymopogon „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 90. Ed. Hall. 1745. p. 124: g. pl. class. V.
= Aruncus Linn.

Drymospartum Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 567: nov. g. Genistear. (Genista purgans L.)

*) δρυμός s. δρυμόν, sylva.
**) φλοιός, cortex.

Drymosphace Benth. 1833 in Hook. Bot. Misc. III. p. 373; 1833. Labiat. p. 218; 1848 in DC. Pr. XII. p. 275: sect. Salviae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 554. Ed. II. p. 637. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 726. — Endl. 1838. Gen. n. 3597 *c.* p. 614; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4144. 5. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 108. — Walp. 1845. Rep. III. p. 609. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 370 *(Drymcosphace)*. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 359.

Drymyrhizeae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 65: fam. Fructifloriae. Gen.: Canna, Costus.

Drymyrrhizae Vent. 1799. Tabl. II. p. 202: ordo 2 class. IV. Gen.: Canna, Amomum, Costus, Kämpferia.
DC. 1819. Théor. élém. p. 248 *(Drymyhizées)*: ordo Endogenar. phanerogamar.

Drynaria Bory 1825. Ann. sc. nat. V. p. 464.
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 363: g. Polypodiear. — Par. J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 397; 1842. ibid. IV. p. 60. Sect.: Phymatodes, Phyllitidis (1842 Drynaria), Dipteris. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 269. (emend.) Sect.: Pleopeltis, Eudrynaria.
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 723 *b* (sphalm. *Drymaria)*: sect. Polypodii. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 60. n. 615 *f.* — Meisn. 1843. Gen. p. 431 (331).
Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 985. 10 *c b*: subsect. Drynariae.
= Eudrynaria Endl.

Drynaria Presl 1836. Pterid. p. 197: sect. Phymatodis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 615 *k γ.* p. 1347; 1841. Ench. p. 36. Subsect.: Dipteris, Eudrynaria. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 985. 10 *c.* Subsect.: Dipteris, Drynaria.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.

Dryobalanops Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 49. t. 186. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 537 et Colebr. Asiat. research. XII. p. 536.
Agdh. 1825. Aphor. p. 209: g. Dipterocarpear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 813. — Endl. 1840. Gen. n. 5393. p. 1013; 1841. Ench. p. 525; 1850. Spl. V. p. 64. — Rchb. 1841. Nom. p. 210. n. 7977. — Meisn. 1843. Comm. p. 344. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 307. — Walp. 1846. Rep. V. p. 125. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 139. — Jungh. 1851. Nederl. kruidk. Arch. III. 1. p. 1. (Char. emend.) — De Vriese 1851. Pl. Jungh. I. p. 80; 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 36. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 336.
Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1917 *c*: sect. Pterigii.
Jack 1835 in Hook. Bot. Mag. Comp. I. p. 264: g. Monadelph. Polyandr. *Cf.* Endl. Spl. II. p. 80.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 394: g. Dipteracear.

Dryobalanops Gärtn. cont.
Korth. . . . . Verh. nat. Gesch. Ned. bez. 1039—1042. p. 67.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 37: g. Pterygiear.
Oudemans 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. V. p. 90.

Dryomenis*) Fée 1852. Gen. Fil. p. 225: nov. g. Menisciear. (Drynaria meniscifolia J. Sm.)

Dryonoptelea Spach vid. *Dryoptelea Spach.*

Dryopaeia Lindl. vid. *seq.*

Dryopeia Petit-Thouars 1822. Orchid. afr. t. 1—3: nov. g. Orchidear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 744. n. 3040; 1831. Gen. II. p. 656. n. 3302.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529: *Dryopaeia*): g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1478. (*Dryopoeia*).
A. Rich. 1828. Mém. soc. h. n. Par. IV. p. 30.
A. Rich. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 81: g. Neottiar.
= Disperis Swartz?

Dryopetalon A. Gray 1853. Pl. Wright. II. p. 11. t. 11: nov. g. Arabidear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 191.

Dryophilum Schweinitz . . . . Trans. Amer. phil. soc. IV. p. 268.
Endl. 1836. Gen. n. 282. p. 24; 1841. Ench. p. 16: g. Sclerotieor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 318.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeropsideor.?

Dryopoeia Rchb. vid. *Dryopeia Pet.-Th.*

Dryopsis Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 588: sect. Myriodesmatis.

Dryoptelea Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 361; 1842. Vég. phan. XI. p. 100 (*Dryonoptelea*): sect. Ulmi. (U. campestris et fulva.) — Par. Ledeb. 1851. Ross. III. p. 646.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 260. 271: subg. Ulmi. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 425.

Dryopterideae Link 1841. Fil. hort. Berol. p. 116: subordo Polypodiacear. Gen.: Craspedaria, Marginaria, Pleopeltis, Chrysopteris, Campyloneurum, Anaxetum, Polypodium, Goniopteris, Sphaerostephanos, Woodsia, Microsorium.

Dryopteris**) Adans. 1763. Fam. II. p. 20: g. Filicum.
Presl 1836. Pterid. p. 75: sect. Lastreae.
Endl. 1841. Spl. I. n. 639 c. p. 1349; 1841. Ench. p. 37: sect. Nephrodii. (*Synon. Lastraea Presl.*) Subsect.: Eudryopteris, Thelypteris, Arthrobotrys. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1027. 3. Subsect. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.

Dryostachium Smith vid. *seq.*

Dryostachyon Fée vid. *seq.*

*) Nomen e syllabis initialibus Drynariae et Meniscii.
**) Filicis nomen apud Plinium.

Dryostachynm J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 399 (*Dryostachium*); 1842. ibid. IV. p. 62: nov. g. Polypodiear. Symplophlebiear. (D. splendens et pilosum.) — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 275 (*Dryostachyon*).
Kunze 1844. Farrenkr. I. Lief. 7. t. 61. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 616.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Metten. 1856. Fil. hort. Lips. p. 20: g. Acrostichacear.

Drypeae Rchb. 1837. Handb. p. 298; 1841. Nomencl. p. 205: subdiv. Caryophyllear. Gen.: Drypis et 1841 Plinthine, Acanthophyllum.

Drypetes Vahl 1815. Eclog. Fasc. III. p. 49.
Poit. 1815. Mém. Mus. I. p. 152. t. 8—10: g. Rhamnis aff.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 657: g. Terebinthacear.
Poit. 1819. Dict. v. 13. p. 539: g. Rhamnear.
A. Juss. 1824. Euphorb. p. 12: g. Euphorbiacear. *Cf.* Ann. sc. nat. I. p. 146.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 902. n. 3175; 1831. Gen. II. p. 705. n. 3554: g. Tricoccar.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5088; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 195. n. 7442: g. Buxear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 370. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486. — Endl. 1840. Gen. n. 5874. p. 1124; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 344 (255). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Euphorb. p. 606: g. Wielandiidear.
Synon. Liparena Poit.

Dryphele Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 371: sect. Rhytismatis. (Rh. Montiniae etc.)

Drypideae Endl. 1840. Gen. p. 974; 1841. Ench. p. 506: trib. Silenear. Gen.: Drypis, Acanthophyllum.

Drypis*) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 24. t. 23: g. pl. class. VIII.
Linn. 1737. Gen. p. 132. n. 370; 1740. Syst. p. 23; 1753. Sp. I. p. 413; 1759. Syst. ed. X. p. 1030. n. 501: g. Decandr. Trigyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 37. n. 146: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 332. — Juss. 1789. Gen. p. 303. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 249. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 119. — Hedw. 1806. Gen. p. 208. n. 854. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 832 (genuin.); 1825. Syst. I. p. 942. n. 1118. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXIV. 680. — Link 1821. En. I. p. 293. — Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5355.

*) δρύπτω, lacero vel lanio.

Drypis Micheli cont.
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 390; 1764. Gen. ed. VI. p. 150. n. 381; 1767. Syst. ed. XII. p. 221. n. 378: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 246; 1784. Syst. p. 298. — Reich. 1778. Gen. p. 153. n. 412. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 202. n. 519. — Gmel. 1791. Syst. p. 507. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1513. n. 581. — Pers. 1797. Syst. p. 317; 1805. Ench. I. p. 331. n. 741. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 230. n. 1207. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 999.
Adans. 1763. Fam. II. p. 255: g. Alsinium.
Neck. 1790. El. II. p. 154. n. 847: g. Catotaphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 218. t. 128.
Batsch 1802. Tab. p. 36: g. Portulacear.
Seringe 1824 in DC. Pr. I. p. 388: g. Silenear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1832. Fl. exc. p. 812. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 306. — Link 1831. Hdb. II. p. 249. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 418. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 201. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21). — Koch 1837. Syn. in Add.; 1843. Ed. II. p. 117. — Fenzl 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 309. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 163. — Brongn. 1843. En. genr. p. 103. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298; 1841. Nom. p. 205. n. 7808: g. Drypear.
Endl. 1840. Gen. n. 5252. p. 974; 1841. Ench. p. 506: g. Drypidear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 141.
A. Braun 1843. Flora p. 365: g. Lychnidear.

Drypsis Duchartre vid. *Dypsis Nor.*

Dryptodon*) Brid. 1826. Bryol. I. p. 191: g. Acrocarpor. peristomor.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIII: g. Grimmioideor.
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 591: g. Grimmiaceor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Grimmioidear.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 135: g. Muscor. odontostomor.
Endl. 1836. Gen. n. 492. p. 48; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 867: g. Calyptrobryor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 142; 1849. ibid. VIII. p. 401: g. Grimmiear.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 797: sect. Grimmiae.
Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 75: sect. Racomitrii.

Dryptopetalum Arnott 1838 in Jard. Ann. nat. hist. I. p. 372: nov. g. Rhizophorear. (Microtropis coriacea Wall.)
Endl. 1840. Gen. n. 6103. p. 1186; 1841. Ench. p. 635: g. Legnotidear.

*) δρύπτω, lacero; ὀδούς, dens.

Dryptopetalum Arnott cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 171. n. 6628: g. Cassipourear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 355. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 605. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 142.
= Gynotroches Blume.

Duabanga*) Hamilt. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 177: nov. g. ex typo Lagerströmiae grandiflorae Roxb.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 101: g. Lagerströmiear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6165. p. 1204; 1841. Ench. p. 643. — Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6668. — Meisn. 1843. Comm. p. 355. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 624.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lagerstromear.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 109: g. Lythrariear.

Dubautia**) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 469. t. 84: nov. g. Senecionear. (D. plantaginea.)
Less. 1831. Linnaea VI. p. 163: g. Anthemidear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 797. n. 4130: g. Eupatorinar.
Hook. & Arn. 1832 in Beech. voy. Bot. Pt. II. p. 88. Char. emend.
Less. 1832. Syn. p. 247: g. Galinsogear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3121. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
DC. 1836. Pr. V. p. 680: g. Eugalinsogear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2625. p. 427; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 207 (133).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18: g. Heleniear.

Duboisia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 448. Ed. Nees p. 304: nov. g. Solanear. (D. myoporoides.) — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 544. — Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 409.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 843. n. 2246; 1831. Gen. II. p. 506. n. 2489: g. Baccatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3202: g. Caprariacear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 479: g. Anthocercear.
Endl. 1839. Gen. n. 3906. p. 676; 1841. Ench. p. 338: g. Salpiglossidear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Meisn. 1840. Gen. p. 307 (218). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 500. — Walp. 1845. Rep. III. p. 240. 961. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 191; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684.
Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4656: g. Brunsfelsiear.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 165: g. Duboisiear.

Duboisia***) Karsten 1847 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 50. p. 394 (Bot. Zeit. 1848. p. 96): nov. g. Pleurothallear. (D. Reymondi.) — Par. Rchb. f. 1849 in Walp. Ann. bot. I. p. 773.
= Dubois-Reymondia Karst.

*) *Duyabangya* s. *Banurhola* Tripurens.
**) Dicat. J. E. Dubaut.
***) Dicat. Dubois-Reymond.

Duboisieae Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. Nr. 15. p. 165: trib. Atropacear. Gen.: Duboisia, Anthocercis, Anthotroche.

Dubois-Reymondia Karsten 1848. Bot. Zeit. p. 397: g. Pleurothallear., antea *Duboisia.*

Dubreuilia Decne vid. *seq.*

Dubrueilia Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 495: nov. g. Elatostemear. (D. peploides.)
Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 489 *(Dubreuilia)*: g. Urticear.
= Pilea Lindl.

Dubyaea*) DC. mss. olim.
= Diplusodon Pohl. (DC. Pr. III. p. 94 a.)

Dubyaea DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 247: nov. g. Hieraciear. Sect.: Hieracidium, Sonchidium. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). — Endl. 1841. Spl. I. n. 3027/$_1$. p. 1388; 1841. Ench. p. 251. Sect. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 32. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3731: g. Mulgediear. Sect.: Dubyaea, Sonchidium.
Synon. Micrauchenia DC.

Duchartrea**) Decaisne 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 109: nov. g. Gesneriear. (D. viridiflora.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 736.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 205: g. Rhytidophyllear.
Oersted 1858. Gesn. centroam. p. . . . : g. Eurytidophyllear.

Duchassaingia***) Walp. 1850. Linnaea XXIII. p. 741: nov. g. ab Erythrina separatum. (E. caffra Thunb., etc.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 424: g. Erythrinear.
Hassk. 1858. Hort. Bogor. p. 189. Char. emend.

Duchekia†) Kostel. 1831. Med. pharm. Bot. I. p. 213: nov. g. ex typo Dianellae triandrae Afz.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1358; 1841. Ench. p. 84: g. Asparagear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. (?)
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1819: g. Dracaenear.

Duchesnea††) Smith 1811. Linn. Trans. X. p. 373.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 865: g. Potentillear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 167. n. 6496. (genuinar.)
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 545: g. Rosacear. — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 233.
DC. 1825. Pr. II. p. 571: sect. Fragariae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4438 *b.* — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 300. — Endl. 1840. Gen. n. 6361 *b.* p. 1242; 1841. Ench. p. 659.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 549: g. Dryadear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 371.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 663: g. Fragariear.

*) Dicat. J. E. Duby.
**) Dicat. D. Petro Duchartre.
***) Dicat. Dr. Plac. Duchassaing, medico Panamensi.
†) Dicat. Duchek, Dr. med. Prag.
††) Dicat. Jos. Duchesne, botan. gall.

Duchesnia Cassini 1817. Bull. soc. philom. Oct. p. 153; 1819. Dict. v. 13. p. 545; 1822. v. 23. p. 565: nov. g. Inulear. (1822 Archetypar. — Aster crispus Forsk.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2460. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 139.
= Francoeuria Cass.

Duchola Adans. 1763. Fam. II. p. 357: g. Tithymalor.
= Omphalea Linn.

Ducroisia Endl. vid. *seq.*

Ducrosia*) Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 341: nov. g. Peucedanear. (Zozimia anethifolia DC.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 891. — Endl. 1850. Spl. V. p. 10. n. 4478/$_1$ *(Ducroisia).*
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Ductulosae Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. . . . : div. 1 Acotyledonum.
= Filices.

Dudresnaja J. Agardh vid. *seq.*

Dudresnaya Bonnemais. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 180: nov. g. Hydrophytar. loculatar. (Batrachospermi, Rivulariae et Chaetophorae sp.)
Crouan 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. III. p. 98.
Menegh. 1838. Cenni p. 28: g. Batrachospermear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 605 b.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 84 *(Dudresnaja)*: g. Gloiocladear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 36. n. 122/$_{26}$.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): g. Cryptonemear.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 288: g. Callithamniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Gloiocladidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : g. Ceramiacear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: g. Eududresnayear. Subgen.: Eududresnaya, Gloiosiphonia, Endogloea, Helminthora.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Gloeocladear.
= Nemalion Targ. (Kütz.)

Dudresnayeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 105: trib. Centrothalamar. Subtrib.: Eududresnayeae, Scinaieae.

Dudresneya Wittst. Etym. Handw. p. 305: vid. *Dudresnaya Bonnem.*

Dübenia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 356: nov. g. Helvellaceor. (Stictis sp. Fr.)

*) Dicat. memoriae rev. Ducros, botanici Helveti.

Dufourea „Bory" Willd. 1810. Spec. V. p. 55. n. 1937: nov. g. Stachyopteridum.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 110: subg. Lycopodii.* (Delendum! Spreng. ibid. 1818. II. 2. p. 873.)
Röm. & Schult. 1817. Syst. 1. p. 8. 49. n. 44: g. Monandr. Trigyn. — Par. Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 79. 114.
A. St. Hil. 1823. Mém. Mus. X. p. 471; 1825. Fl. Bras. I. p. 82: g. inter Junceas et Restiaceas medium.
A. Rich. 1824. Dict. class. V. p. 635.
= Tristicha Pet.-Thouars.

Dufourea*) Achar. 1810. Lich. univ. p. 103. 524; 1814. Syn. Lich. p. 246: nov. g. Discoideor. (Parmelia mollusca et flammea Ach.) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 547.
Agdh. 1821. Aphor. p. 93: g. Ramalinear. — Par. Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 12. (Flora 1854. p. 234.)
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 23: g. Plocariar.
Fries 1831. Lich. eur. p. 1. 24: sect. Everniae.
Körb. 1846. Lich. eur. sp. p. 3: g. Cladoniacear.
= Siphula Fries.

Dufourea HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 113. t. 314: nov. g. Convolvulacear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 548. — Kunth 1823. Syn. II. p. 226. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 920.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 79: g. Convolvulear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 214. n. 1103. — Endl. 1839. Gen. n. 3794. p. 652; 1841. Ench. p. 323. — Meisn. 1840. Gen. p. 275 (181). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 94. — Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4429. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.
Synon. Prevostia Choisy; Dethardingia Nees & Mart.; Reinwardtia Spreng.; Calycobolus Willd.

Dufourea Grenier . . . . Act. soc. Linn. Bord. IX. p. 25.
= Alsines Wahlenb. et Arenariae Linn. sp.

Dufresnea Meisn., Ledeb., Lindl. vid. *seq.*

Dufresnia**) DC. 1829. Coll. mém. VII. p. 8. t. 3; 1830. Prodr. IV. p. 624: nov. g. Valerianear. (D. orientalis.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 667. — Endl. 1838. Gen. n. 2180. p. 351; 1841. Ench. p. 227. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (120 *[Dufresnea]*). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 304. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 428 *(Dufresnea)*. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 138.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2705: g. Valerianellear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 698 *(Dufresnea)*: g. Valerianacear.

Dugagelia Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 513: nov. g. Piperacear.(?) — Par. Kunth 1839. Linnaea XIII. p. 562.
Endl. 1837. Gen. p. 265. n. 1820 *b:* sect. Piperis.
Meisn. 1841. Gen. p. 335 (248): g. Piperear.
= Micropiper Miq.

Dugaldea „Cass." DC. Prodr. V. p. 642 in synon. Actinellae: vid. *seq.*

Dugaldia Cassini 1828. Dict. v. 55. p. 264: g. Heleniear. verar.
= Actinellae Pers. pars.

Duglassia Houst. 1781. Reliq. p. 13. (Ammann Herb. p. 579.)
= Volkameria Linn.

Dugortia Scopoli 1777. Introd. p. 217. n. 956: g. Calycanthemar.
Neck. 1790. El. II. p. 120. n. 797: g. Plyrontophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 816: g. Polyandr. Monogyn.
= Parinarium Juss.

Duguetia*) A. St. Hilaire 1825. Fl. Bras. I. p. 35. t. 7: nov. g. Anonacear. (D. lanceolata.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 247. — Schltd. 1834. Linnaea IX. p. 320. — Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 496. — Mart. 1841. Fl. Bras. fasc. II. p. 21.
Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 5002: g. Unonear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 97 *(Duquetia)*.
A. DC. 1833. Mém. soc. Genèv. V. p. 216.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7307: g. Guatteriear.
Endl. 1839. Gen. n. 4722. p. 833; 1841. Ench. p. 423: g. Anonear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 85. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 308. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 422. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 57.
Synon. Cardiopetalum Schltd.

Duguldea Meisn. Gen. Comm. p. 133 in synon. Cephalophorae sphalm. pro *Dugaldia.*

Duhaldea**) DC. 1836. Prodr. V. p. 366: nov. g. Solenogynear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2387. p. 387; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 189 (127). — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3586. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952 *(Duhaldia)*: g. Erigerear.

Duhaldia Schultz Bip. vid. *praeced.*

Duhamela Rafin. vid. *seq.*

Duhamelia***) Pers. 1805. Ench. I. p. 203. n. 454: g. Rubiacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 149. n. 639. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XX. 265. n. 929.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. p. 82 *(Duhamela)*: g. Hamellidiae.
= Hamelia Jacq.

Duhamelia Domb. (mss.?)
= Manglilla Juss. (Rchb. Consp.)

*) Dicat. Dr. Léon Dufour.
**) Dicat. cl. P. Dufresne, qui de Valerianeis egregie disseruit.

*) Nomen a ven. Abbate J. J. Duguet.
**) Dicat. Joh. Bapt. Duhalde, peregrinatori.
***) Dicat. Duhamel du Monceau.

Dulacia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 414. n. 1236: g. Omoplephytor. *(Acioa Aubl.)* = Moquilea Mart. & Zucc.

Dulacia Arrab. Fl. Flum. I. t. 78: g. Triandr. Monogyn. (singularis) ex Steud. Nom. I. p. 533.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 11. 20: g. Olacear. (Olax Velloziana Benth.) = Olax Linn.? (Endl. Spl. II. p. 83.)

Dulcamara*) „Siegesb." Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 123: nov. g. ex typo Solani Dulcamarae L.
Mönch 1794. Meth. p. 514: g. Petalostemonis.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 331: g. Solanear.
C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 237: sect. Solani. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4761. 5. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 187.

Dulcichium Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 305 (a voce dulcis): corr. pro *Dulichium Rich.*

Dulia Adans. 1763. Fam. II. p. 165: g. Vaccinior. (Nec *Dalia* ex Endl.) = Ledum Linn.

Dulichieae Rchb. 1828. Consp. p. 56 (1830. Fl. exc. p. 74); 1837. Handb. p. 147: subdiv. Cyperinar. Gen.: Nomochloa, Dulichium, Rhynchospora; Carpha, Chaetospora, Machaerina.

Dulichium**) Rich. 1805 in Pers. Ench. I. p. 65. n. 122: nov. g. Triandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 33. — Elliott 1817. Sketch I. p. 73. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 35.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153: g. Cyperacear. (verar.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 136; 1825. Syst. I. p. 194. n. 217. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 551. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 223.
Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 24 et Schult. 1824. Mant. II. p. 5): g. Cyperear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 48. n. 226. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 119. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 283. — Endl. 1837. Gen. n. 1002. p. 118; 1841. Ench. p. 64. — Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1475. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — Steud. 1855. Glum. II. p. 2.
Link 1827. Hort. I. p. 322: g. Cyperoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1108: g. Dulichiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Kunth 1837. Cyper. p. 329: g. Rhynchosporear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 412 (315). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145.
Synon. Pleuranthus Rich.; Dulcichium Wittst.; Schoeni et Cyperi sp. Linn.; Scirpi sp. Michx.

Dulipanum Reboul 1851. Giorn. bot. it. II. p. 57: sect. Tulipae.

---

*) Fictum nomen e Graecorum γλυκύπικρος.
**) δουλιχός, jonice pro δολιχός, longus.

Dulongia*) HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 76. t. 623: nov. g. Celastrinis aff.? (D. acuminata.) — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 190.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 53: g. Rhamnear.
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3821: g. Frangulacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 217. n. 1124: g. Pentandr. Digyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 926.
Bartl. 1830. Ord. p. 379: g. Celastrinear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 404.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 14: g. Celastrineis aff. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1090. n. 5699 (in Ench. omissum).
Meisn. 1837. Gen. p. 67 (48): g. Evonymear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7890: g. Dulongiear.
Synon. Phyllonoma Willd.

Dulongieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 207: subdiv. Celastrear. Gen.: Dulongia.

Dumartroya Gaudich. Voy. Bonite . . . = Malaisia Blanco. (Planch.)

Dumasia**) DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 96: nov. g. Leguminosar. (D. villosa et pubescens.) — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 263; 1831. Gen. II. p. 578. n. 2832. (Diadelph. Decandr.)
DC. 1825. Pr. II. p. 241 (Lég. mém. VI): g. Clitoriar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 220.
Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3962: g. Glycinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 410: g. Clitoriear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 206. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 245. — Meisn. 1837. Gen. p. 87 (62). — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 112; 1852. Pl. Jungh. II. p. 231. — Endl. 1841. Gen. n. 6631. p. 1288; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5787. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 226. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 551.

Dumerilia***) „Lagasc. mss." DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 64. 71. t. 15. 16: g. Labiatiflorar. (D. axillaris et paniculata.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 558; 1826. Syst. III. p. 506. n. 2755: g. Perdiciear. (1827 Cur. post. p. 297 ad Jungiam reductum).
Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 553: g. Nassauviear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2275. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 137.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 156: g. Jacobear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 441.
Cass. 1825. Dict. v. 34. p. 205; 1830. v. 60. p. 584: g. Trixidear.
= Jungia Linn. f.

---

*) Dicat. P. L. Dulong.
**) Dicat. Joh. Bapt. Dumas, prof. Paris.
***) Dicat. Andr. Mar. Const. Dumeril, prof. Paris.

Dumerilia Lessing 1830. Linnaea V. p. 13; 1832. Syn. Compos. p. 407: nov. g. Trixidear. (Perdicium senecioides W., Proustia mexicana Don.) — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 66. — Endl. 1838. Gen. n. 2959. p. 492; 1841. Ench. p. 249. — Meisn. 1839. Gen. p. 232 (142). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34. — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3765. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.

Dumontia*) Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 133 (Essai p. 45); 1825. Dict. class. V. p. 643: nov. g. Floridear. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 13. p. 554. — Par. Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 363. — Math. 1853. Belg. II. p. 482.

Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 197. t. 18: g. Dumontiar.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: g. Ulvacear.

Grev. 1830. Alg. brit. p. 165 (Synops. p. LXII): g. Gastrocarpear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 397. — Menegh. 1838. Cenni p. 37. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. 19.

Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 165; 1849 in Orb. Dict. V. p. 145; 1849. ibid. X. p. 54: g. Gasterocarpear. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 51. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 66. — Endl. 1843. Spl. III. p. 39. n. $122/_{41}$.

Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 718: g. Halymeniear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phyc. gener. p. 393; 1845. Phyc. germ. p. 300; 1849. Sp. Alg. p. 718. n. 478. Sect.: Dumontia, Halisaccion. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 150.

Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): g. Chondriear.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 127: g. Cryptocarpear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 312.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Gasterocarpidar.

Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : g. Graciləriear.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106: g. Dumontiear.

Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 254: g. Cryptonemiacear.

Dumontiae Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 197: fam. Encoelior. Gen.: Dumontia, Asperococcus, Solenia.

Dumontieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Halymeniear. Gen.: Dumontia.

Dumortiera**) Reinw., Blume & Nees 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 410: nov. g. Hepaticar. (Marchantia hirsuta Sw.)

Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 528 *b*: sect. Marchantiae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Cephalothecear.

Bisch. 1833. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 969. 975: g. Marchantiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 844. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 146; VI. p. 549.

Endl. 1836. Gen. n. 469. p. 45; 1841. Spl. I. p. 1338; 1841. Ench. p. 27: g. Marchantiacear.

Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXX. 151; 1846. Syn. Hepat. p. 542: g. Jecorariar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 58: g. Marchantear.

Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 169: g. Marchantiar.

Synon. Hygrophila Mack.; Hygrophyla Tayl.; Spathysia Nees.

Dumortieria Westendorp 1857. Bull. Ac. Brux. 2e sér. II. p. 572: nov. g. Cytisporear. (Sphaeria micula Fries.)

*Dumosae**) Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: ordo 19 plantar. Gen.: Viburnum, Tinus, Opulus, Sambucus, Rondeletia, Bellonia, Maurocenna, Cassine, Rhus, Cotinus, Celastrus, Euonymus, Ilex, Tomex, Prinos, Callicarpa, Lawsonia.

Linn. 1764. Ord. nat.**): ordo 43 plantar. Gen. §. 1: Sideroxylon, Rhamnus, Phylica, Ceanothus, Chrysophyllum, Achras, Prinos, Ilex, Tomex, Callicarpa, Evonymus, Celastrus, Cassine, Viburnum. §. 2? Sambucus. §. 3? Rhus, Schinus, Fagara. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 499. Gen. ead. Accedunt in §. 1: Bumelia, Büttneria, Rochefortia.

Scop. 1777. Intr. p. 207: trib. 18 plantar. Gentes: *A. Staminibus non pluribus ac petala.* Gen.: Embothrium, Blackburnia, Colletia, Freyeria, Zizyphus, Rumpfia, Chloroxylon, Cassine, Sirium, Rhamnus, Paliurus, Evonymus, Celastrus, Phylica, Salmonia, Outea, Ammania, Commersonia, Peplis, Turnera, Itea, Parfonsia, Pentaglossum. *B. Staminibus pluribus ac petala.* Gen.: Causea, Pemphis, Lythrum, Cuphea, Ginora, Mitella, Grislea, Tococa, Leonicenia, Kallströmia, Quajacum, Osbeckia, Rhexia, Bäckea, Savastania, Ocotea, Glinus, Topobea, Maieta, Melastoma, Jaravaea.

Dumreichera Steud. & Hochst. in Schimp. herb. Arab. 1837.

= Serraea Cavan.

Dunalia R. Brown 1814 in Salt It. abyssin. Suppl. p. LXIV (Verm. bot. Schr. I. p. 249): nov. g. Didynam. non descriptum. (D. acaulis.)

= Torenia Linn.

Dunalia***) Spreng. 1815. Pl. pugill. I. p. 25; 1825. Syst. I. p. 411. n. 409; 1830. Gen. I. p. 94. n. 469: nov. g. (Tetrandr. Monogyn.) Rubiacear. (Peplis tetrandra Jacq.) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 11. 189. n. 468. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 485.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 602: g. Coffeacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2015.

Synon. Lucya DC.; Hedyotidis sp. Sw.

*) Dicat. Ch. Dumont.

**) Dicat. B. C. Dumortier, Belg.

*) Dumus = Nemus.

**) „Hic ordo mihi ipsi nondum satisfecit, ulterius examinandus." (Linn.)

***) Dicat. Mich. Fel. Dunal, prof. Monspel.

Dunalia HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 55. t. 194: nov. g. Solanear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 555. — Kunth 1823. Syn. II. p. 182. — Juss. 1827. Dict. v. 49. p. 409.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 486: g. Cestrinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3866. p. 667; 1841. Ench. p. 332. — Meisn. 1840. Gen. p. 278 (185). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 57. — Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4767. (genuinar.) — Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 333. (Char. emend.) — Walp. 1847. Rep. VI. p. 628.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 621: g. Rectembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Jochromear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 483: g. Lycinear.
= Dierbachia Spreng.

Dunantia*) DC. 1836. Prodr. V. p. 626: nov. g. Verbesinear. (D. Achyranthes et microcephala.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2554. p. 416; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 200 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3157. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19: g. Helianthear. verar.

Dunbaria**) Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 258: nov. g. Euphaseolear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 93 (66). — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113. — Endl. 1841. Gen. n. 6682. p. 1298; 1841. Ench. p. 672. — Walp. 1842. Rep. I. p. 782. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. Bat. I. p. 176. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 565.
Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5783: g. Phaseolear.
Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 242: g. Cajanear. Sect.: Eudunbaria, Rhyncholobium.

Duncania Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5127: g. Zanthoxylear. (*Boscia Thunb.*, non Lam.)
Meisn. 1837. Gen. p. 65 (47): g. Zanthoxylacear. dubiae affinitatis.
= Vepris Comm.

Dunstervillia Bowerbank 1845. Ann. and Mag. n. h. XV. p. 297: nov. g. Spongiar., a Th. Austin (ibid. p. 407) Zoophytis adscriptum.
Cf. Bot. Zeit. 1847. p. 603.

Dupatya Flor. Flumin. I. t. 85—87: g. Cyperacear. (aequalis, hirsuta et ligulata) ex Steud. Nom. I. p. 533.
= Eriocaulon Gron. (Endl. Gen. p. 1355.)

Duperreya***) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 452. t. 63: nov. g. Convolvulacear. (D. sericea.)
Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3302: g. Solanear.
Bartl. 1830. Ord. p. 194: g. Solanacear.

*) Dicat. amico Phil. Dunant.
**) Dicat. prof. G. Dunbar, Edinb.
***) Dicat. L. Is. Duperrey.

Duperreya Gaudich. cont.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 789. n. 4089: g. Pentandr. Monogyn.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 298: g. Convolvulear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3798. p. 653; 1841. Ench. p. 324. — Meisn. 1840. Gen. p. 275 (181). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 94. — Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4434. — Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 436. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.

Dupinia Scopoli 1777. Introd. p. 195. n. 847: nov. g. Speciosar.
Neck. 1790. El. II. p. 256. n. 1008: g. Dapsilophytor. (*Taonabo Aubl.*)
Ternströmia Mutis.

Duplicati Linn. 1747. Class. plant. p. 417: ordo 6 meth. calycinae. Gen.: Craniolaria, Gossypium, etc.

Dupontia R. Brown*) 1824. Suppl. App. of Parry's voy. p. CCXC (Verm. bot. Schr. I. p. 424): nov. g. Graminear., Deschampsiae proximum. (D. Fischeri.) *Cf.* Flora 1824. II. Beil. p. 109.
Schult. 1827. Mant. III. p. 326. 640: g. Triandr. Digyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1037; 1841. Nom. p. 36. n. 1207: g. Avenacear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 98; 1833. Agrost. p. 288. — Endl. 1837. Gen. n. 858. p. 95; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 337. — Meisn. 1843. Gen. p. 423 (323). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Steud. 1854. Glum. I. p. 235.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 69: sect. Airae.
Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Bromear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 386: g. Poëar.

Dupratzia Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 54: nov. g. imperfecte cognitum, an forte Ericeis associandum? (D. scoparia.)
Schult. 1829. Syst. VII. p. XI. 63: g. Hexandr. Monogyn.
= Phlox Linn.?

Dupuisia „A. Rich." Guillem. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 148. t. 38: nov. g. Terebinthacear.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 186: g. Anacardiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 550.
Meisn. 1837. Gen. p. 75 (54): g. Cassuviear.
Endl. 1840. Gen. n. 5894. p. 1128; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.
Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5657: g. Pistaciear.

Duquetia G. Don vid. *Duguetia St. Hil.*

Durandea Delarbre 1800. Fl. Auvergn. Ed. 2. I. p. 365.
= Raphanistrum Tourn.

Durandea Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 594; 1848. ibid. VII. p. 527: nov. g. Hugoniear. (D. serrata.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 97; 1851. ibid. II. p. 137.

*) Dicat. J. D. Dupont, botanico gall.

Duranta*) Linn. 1737. Gen. p. 367. n. 920; 1742. Gen. ed. II. p. 521. n. 1005: nov. g. ex *Castorea Plum.* constitutum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 170 *(Durantia)*. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.
Linn. 1753. Sp. II. p. 637; 1759. Syst. ed. X. p. 1121. n. 704; 1763. Sp. ed. II. p. 888; 1764. Gen. ed. VI. p. 324. n. 786; 1767. Syst. ed. XII. p. 425: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 482; 1784. Syst. p. 577. — Reich. 1778. Gen. p. 326. n. 849. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 424. n. 1052. — Gmel. 1791. Syst. p. 960. — Pers. 1797. Syst. p. 604; 1807. Ench. II. p. 141. n. 1433. — Willd. 1800. Sp. III. p. 380. n. 1197; 1809. En. p. 657. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 46.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Verbenar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 200.
Gled. 1764. Syst. p. 171. n. 697: g. Petalostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 277: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 272. t. 57. f. 3 (Plumieri).
Juss. 1789. Gen. p. 109: g. Viticum.
Neck. 1790. El. I. p. 369. n. 571: g. Plasyrgophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 320: g. Pyrenacear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 249: g. Verbenacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 253. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 557. — Link 1822. En. II. p. 126. — Kunth 1823. Syn. II. p. 46. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 425; 1825. Syst. II. p. 764. n. 2129; 1831. Gen. II. p. 480. n. 2371: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2909. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22. — Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227.
Endl. 1838. Gen. n. 3709. p. 637; 1841. Ench. p. 312: g. Lantanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 291 (199). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 372. 618. — Brongn. 1843. En. genr. p. 65. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 78.
Benth. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 448: g. Durantear. — Par. Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 615; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 270.
Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4210: g. Viticear.
Synon. Castorea Plum.; Ellisia P. Browne.

Duranteae Benth. 1839 in Jard. Ann. nat. hist. II. p. 448: trib. Verbenacear. Gen.: Petraea, Citharexylum, Duranta, Pöppigia.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 608; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 265: subtrib. Verbenear. Gen.: Citharexylum, Duranta. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 185. Gen. ead.

*) Dicat. Castor Durante, medico romano.

Durantia Scop. vid. *Duranta Linn.*

Duretia Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 500 in adnot.: nov. g. Böhmeriear., pro Urtica palustri Juss. et cylindrica L. propositum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2494. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24.
Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 212: sect. Böhmeriae.
= Euböhmeriae Endl. pars.

Duria Scop. vid. *Durio Rumph.*

Duriaea Bory & Mont. 1843. Compt. rend. Mai 22; 1843. Inst. Fr. p. 4; 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 228: nov. g. Duriaear. (D. helicophylla). *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 622. — Par. Nees 1846. Syn. Hepat. p. 593. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 147.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 57: g. Ricciacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549: g. Ricciear.
= Riella Mont.

Duriaea Lindl. Veg. kingd. p. 779 vid. *Durieua Boiss. & Reut.*

Duriaeeae Bory & Mont. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 234: div. Ricciear. Gen.: Duriaea. — Par. Nees 1846. Syn. Hepat. p. 593. Gen. id. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 148.

Durieua Mérat 1829. Diss. in Mém. soc. ac. Lille *(Durieva* ex Steud. Nomencl. I. p. 533.)
= Lafuentea Lag.

Durieua*) Boiss. & Reut. 1842. Diagn. pl. Hisp. p. 14.
Meisn. 1843. Comm. p. 359: g. Caucalinear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 83. n. $4497/_1$: g. Daucinear. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 77.
Walp. 1843. Rep. II. p. 421: g. Scandicinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779 *(Duriaea)*: g. Daucidar.

Durieva Steud. vid. *Durieua Mér.*

Durio Rumph. 1741. Amboin. I. p. 99. t. 29.
Adans. 1763. Fam. II. p. 399. g. Malvar.
Scop. 1777. Intr. p. 289 *(Duria)*: g. Columniferar.
Reich. 1778. Gen. p. 390. n. 977: g. Polyadelph. Polyandr. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 698. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 516. n. 1221. — Gmel. 1791. Syst. p. 1154. — Pers. 1797. Syst. p. 736. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1434. n. 1395. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 399.
Juss. 1789. Gen. p. 244: g. Capparidum.
Neck. 1790. El. II. p. 398. n. 1217: g. Phalarsiphytor.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 4: g. Capparidear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 563.
Kön. . . . . Linn. Trans. VII. p. 266.
Pers. 1807. Ench. II. p. 74. n. 1311: g. Polyandr. Monogyn.

*) Dicat. Durieu de Maisonneuve, de plantis Algeriae benemerito.

Durio Rumph. cont.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 801; 1826. Syst. III. p. 340. n. 2627: g. Malvacear. (genuinar.)
DC. 1824. Pr. I. p. 480: g. Bombacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1828. Consp. p. 205. n. 5327. — Bartl. 1830. Ord. p. 346. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 600. n. 2961. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 513. — Schott & Endl. 1832. Melet. p. 34. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 439. — Meisn. 1837. Gen. p. 28 (24). — Endl. 1840. Gen. n. 5305. p. 990; 1841. Ench. p. 515. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 361.
Rchb. 1837. Hdb. p. 295; 1841. Nom. p. 204. n. 7757: g. Adansoniear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615.

Duroia*) Linn. f. 1781. Suppl. p. 30. n. 1384: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 342. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 230. n. 592. — Gmel. 1791. Syst. p. 574. — Pers. 1797. Syst. p. 365. — Willd. 1799. Sp. II. p. 222. n. 672.
Juss. 1789. Gen. p. 203; 1820. Mém. Mus. VI. p. 389: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 441. — Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 564.
Batsch 1802. Tab. p. 234 *(Duroja)*: g. Cinchonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2073.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
= Genipa Plum.

Duroja Batsch vid. *Duroia Linn. f.*

Durvillaea**) Bory 1826. Dict. class. IX. p. 192: g. Laminariear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 43. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 771.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 65. t. 1. t. 2. f. 1: g. Laminariar.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 358: g. Fucacear. — Par. J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 3; 1848. Sp. Fuc. p. 187. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 148. — Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 216 *(D'Urvillaea)*.
Endl. 1843. Spl. III. p. 29. n. 122: g. Fucoidear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 350; 1849. Sp. Alg. p. 585. n. 395: g. Fucear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56. — Aresch. 1855. Nov. Act. Upsal. ser. tert. I. p. 340.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 32: g. Fucidar.
Synon. Durvillea Cunn.

Durvillea A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 328: g. Laminariear.
Decne 1840. Bull. Ac. Brux. XVII. p. 410; 1841. Arch. Mus. II. p. 151; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330 (Flora 1843. p. 93): g. Fucacear.
= Durvillaea Bory.

*) Dicat. Joh. Phil. Duroi, botanico Brunsvic.
**) Dicat. D'Urville.

Dutra*) Bernhardi (Tromsd. n. Journ. Pharm. XXVI. 1) 1833. Linnaea VIII. Litt. p. 127: sect. Daturae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 474. — Endl. 1839. Gen. n. 3845 c. p. 664; 1841. Ench. p. 331. — Walp. 1845. Rep. III. p. 17. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 541. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 667.
Synon. Datura Rchb. 1837.

Duttonia**) F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 409: nov. g. Compositar., Ixiolaenae aff. (D. sessiliceps.)
= Dimorpholepis A. Gray.

Duttonia F. Müll. 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 73. t. 1: nov. g. Myoporinear. (D. gibbifolia.)

Duvalia Haworth 1812. Syn. succ. p. 44 (Ed. Schrank 1819. p. 47); 1819. Suppl. p. 13 *(Duvallia)*: nov. g. Pentandr. Digyn., a Stapelia L. sejunctum.
Schult. 1820. Syst. VI. p. 43: sect. Stapeliae. — Par. Link 1821. En. I. p. 257 *(Duvallia)*. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 837; 1830. Gen. I. p. 208. — Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3411 *c*; 1841. Nom. p. 130. n. 5018. 1. — Endl. 1838. Gen. n. 3524 *i*. p. 598; 1841. Ench. p. 300. — Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 661.
Link 1829. Hdb. I. p. 434: g. Asclepiadear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Stapeliear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 121.
Synon. Pectinaria Haw.

Duvalia Nees 1817. Berl. Mag. VIII. p. 271: nov. g. Hepaticor.
Agdh. 1822. Aphor. p. 104: g. Hepaticar.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 528 *a*: sect. Marchantiae.
Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 5 *(Duvallia)*: g. Marchantiacear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 76. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $463/_1$. p. 1337; 1841. Ench. p. 27.
Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXXI. 248; 1846. Syn. Hepat. p. 553: g. Jecorariar.
Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 848: g. Grimaldiear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 7.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 58: g. Marchantear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 149: g. Marchantiear.

Duvallia Haw. Suppl., Link vid. *Duvalia Haw.*

Duvallia Corda vid. *Duvalia Nees.*

Duvaua***) Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 340 (Tereb. gen. p. 8); 1825 in HBK. Nov. gen. VII. p. 3 adnot.; 1825. Syn. IV. p. 144 adnot.: nov. g. Terebinthacear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 323. n. 1645. (Octandr. Trigyn.) — Hook. & Arn. 1832. Beech. voy. Bot. Pt. II. p. 55 *(Duvoa)*. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1319.
DC. 1825. Pr. II. p. 74: g. Sumachinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Bartl. 1830. Ord. p. 396. — G. Don

*) Dutra Anagramma Daturae.
**) Dicat. Franc. Dutton, coloniae senatori.
***) Dicat. Aug. Duvau.

Duvaua Kunth cont.
1832. Gen. syst. II. p. 76. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 222.
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3852: g. Sumachinar.
Meisn. 1837. Gen. p. 74 (54): g. Cassuviear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 227; 1841. Nom. p. 146. n. 5665: g. Pistaciear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 84.
Endl. 1840. Gen. n. 5902. p. 1130; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.
Walp. 1842. Rep. I. p. 550: g. Anacardiear.

Duvaucellia Bowdich 1825. Madeir. p. 396.
Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5550: inter genera vix cognita.
Endl. 1841. Gen. n. 6863. p. 1330; 1841. Ench. p. 685: inter genera gamopetala dubiae sedis. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 372.

Duvernaya Desp. mss.
= Cuphea Jacq.

Duvernoia E. Meyer 1837. Catal. pl. Dreg. *(Duvernoya Wittst.)*
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Acanthacear.?
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 322: g. Gendarussear.

Duvernoya Wittst. Etym. Handw. p. 307: vid. *praeced.*

Duvoa Hook. & Arn. vid. *Duvaua Kunth.*

Dyanthus P. Browne vid. *Dianthus Linn.*

Dychotria Rafin. vid. *Psychotria Linn.*

Dyckia*) Schult. f. 1830. Syst. VII. p. LXV. 1194. n. 1472: nov. g. Bromeliacear. — Par. Lindl. 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1782; 1847. Veg. kd. p. 148. — Endl. 1837. Gen. n. 1312. p. 184; 1841. Ench. p. 106. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 24.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1627: g. Tillandsiear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299). — A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 740.
Beer 1857. Bromel. p. 24. 157: g. Dyckiar.

Dyckiae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 23. 24: div. Diaphoranthemear. Gen.: Dyckia.

Dycticia Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 176: nov. g. Clathro aff. *(Cf. Dictycia.)*
= Cletria P. Browne.

Dyctidium Dumort. vid. *Dictydium Schrad.*

Dyctimia „J. Smith" Fée vid. *Dictymia J. Smith.*

Dyctioloma**) DC. 1825. Prodr. II. p. 89: nov. g. Terebinthaceis, an potius Rutaceis aff.?
Endl. 1840. Gen. p. 1145. n. 5968: g. Zanthoxylear.
= Dictyoloma A. Juss.

Dyctiopteris Leman vid. *Dictyopteris Lamx.*

Dyctiopteris Endl. Spl. I. p. 1347: vid. *Dictyopteris Presl.*

Dyctiospora „Reinw. mss." Korth. . . . . in Nederl. kruidk. Arch. II. p. 157: nov. g. ex typo Hedyotidis vaginatae Reinw.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 195: g. Hedyotidear.

Dyctiota Leman vid. *Dictyota Lamx.*

Dyctyophora Leman 1817. Dict. v. 8. p. 105: sphalm. pro *Dictyophora.*

Dydimodon Arnott vid. *Didymodon Hedw.*

Dydimosporium Corda vid. *Didymosporium.*

Dyllwinia R. Brown Verm. bot. Schr. II. p. 466: vid. *Dillwynia Smith.*

Dymeizones Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 608: ordo Dicotyledonum petalodear. (Didynamiae Linn.) Gen.: *A.* Montia, Linnaea, Limosella, Tozzia, Orobanche, Squamaria, Pinguicula, Lentibularia. *B.* Antirrhinum, Digitalis, Gratiola, Scrophularia, Pedicularis, Alectorolophus, Stähelinia, Melampyrum, Odontites, Euphrasia, Ageratum. *C. Gymnotetraspermae.*

Dyneba Lagasca vid. *Dineba Palis.*

Dyosmia A. Rich. vid. *Dysosmia DC.*

Dyospyros Dumort. vid. *Diospyros Linn.*

Dyplecosia G. Don vid. *Diplycosia Blume.*

Dyplolabia (?) Massalongo 1854. Neagen. Lich. p. . . . : nov. g. Lichenum.

Dyplotaxis DC. vid. *Diplotaxis DC.*

Dypsis „Noronh. ex Thouars Mélang. 2" Martius . . . . Palm. p. 180. t. 143. t. 158.
Endl. 1837. Gen. n. 1729. p. 247; 1841. Ench. p. 135: g. Arecinar. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 188. — Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2260. — Meisn. 1842. Gen. p. 355 (265).
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 60: g. Arecinear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 424 *(Drypsis).*
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.
Synon. Noronha Petit-Thouars.

*Dysbrya**) Ritgen 1831 in Schr. Marb. Ges. II. p. 108: ordo Muscor. Gen.: Jungermannia, Lejeunia, Lunularia, Marchantia, Fimbraria, Grimaldia, Targionia, Corsinia, Anthoceros, Monoclea, Blandovia, Sphaerocarpus, Riccia.
= Hepaticae Adans.

Dyschoriste**) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 81; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 106: nov. g. Ruelliear. (Ruellia littoralis L.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4238. — Endl. 1839. Gen. n. 4041. p. 699; 1841. Ench. p. 343. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Meisn. 1840. Gen. p. 294 (203). — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 781.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 368 (585 *Dischoriste*): g. Echmatacanthor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar.

Dysemone „Soland. mss." Forst. 1789. Comm. Gotting. IX. p. 45: nov. g. dioicum. (D. integrifolia. — Nomen.)
= Gunnera Linn.

Dysinanthus „Rafin. in litt." DC. Prodr. VI. p. 270 in synon. Antennariae plantagineae: vid. *Disynanthus Raf.*

---

*) Dicat. principi de Salm-Dyck.
**) *δυκτιον* in multis compositis falso pro *δίκτυον*, rete.

*) *δυς* in compositionibus: malo, vix.
**) *δυςχώριστος*, aegre separabilis.

Dysmicodon*) Endl. 1838. Gen. n. 3086 *b.* p. 518; 1841. Ench. p. 267: sect. Specularíae.
Nutt. 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 255: g. Campanulacear. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1051.
Synon. Triodallus Rafin.; Hesperocodon Webb.

Dysoda**) Loureiro 1790. Fl. Cochinch. I. p. 145. Ed. Willd. p. 180: nov. g. Pentandr. Monogyn. *(D. fasciculata.)*
= Serissa Comm.

Dysodia Spreng. vid. *Dyssodia Willd.*

Dysodia DC. 1836. Prodr. V. p. 639: g. Tagetear. Sect.: Eudysodia, Boebera, Boeberoides, Gymnolaena, Aciphyllaea? — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2577. p. 419; 1841. Ench. p. 239. Sect. eaed. (Aciphylla.) — Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132). — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3208. Sect.: Dysodia, Boebera, Boeberella, Gymnolaena, Aciphylla. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 361: g. Tagetinear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 41.
Synon. Dyssodia Cavan.; Boebera Willd.

Dysodiopsis A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 115: sect. Hymenatheri.

Dysodium Rich. 1807 in Pers. Ench. II. p. 489. n. 1935: nov. g. Syngenes. Necessar.
Cass. 1819. Dict. v. 13. p. 573; 1825. v. 38. p. 17: g. Milleriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2703.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 273: sect. Melampodii. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 500.
Colla 1823. Mem. Ac. Torino XXVII. p. 323: g. inter Melampodium et Polymniam intermedium.
= Zarabellia Cass.

Dysophylla Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 826: nov. g. Labiatar. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 472. n. 2326.
Benth. 1833. Labiat. p. 156: g. Menthoidear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 712. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 352. 402.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188: g. Menthear.
Endl. 1838. Gen. n. 3587. p. 612; 1841. Ench. p. 306: g. Pogostemear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (192). — Walp. 1845. Rep. III. p. 579. 979.
Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4053: g. Pogostemonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Pogostemidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 156: g. Elsholtziear.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 964: sect. Pogostemonis.
Synon. Chotekia Opiz & Corda; Choteckia Wittst.; Menthae sp. Linn.; Pogonostemonis sp. Hassk.

*) δυσμικός s. δυτικός, occidentalis.
**) δυσώδης, foetidum.

Dysopsideae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 435: div. Euphorbiacear. uniovulatar. Gen.: Dysopsis, Micrococca, Erythrococca, Tetrorchidium, Acalypha, Alchornea, Lepidoturus, Stipellaria, Lautembergia, Orfilea, Platygyne, Amperea, Adenocline, Cnesmone, Tragia, Lassia, Seidelia, Sphaerostylis, Aparisthmium, Cladogynos, Centrostylis, Chloradenia, Adenochlaena, Symphyllia, Cephalocroton, Astrococcus, Leucandra, Leptobotrys, Chlorocaulon, Sajorium, Dalechampia, Mercurialis, Claoxylon, Ctenomeria, Leptorachis, Zuckertia, Fragariopsis, Angostyles, Odonteilema, Bia, Palissya, Traganthus, Polyboea, Phaedra, Tyria, Passaea, Alevia.

Dysopsis Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 435: g. Dysopsidear.
Synon. Molina Gay; Mirabellia Bert.

Dysosidendron „Gardn. Calcutta journ. VII. p. 36“ Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 325: g. Pyrostriear.

Dysosmia DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 436; 1828. Prodr. III. p. 331: sect. Passiflorae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3472 *f;* 1841. Nom. p. 131. n. 5078. 4. (?) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 54. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 275. — Endl. 1839. Gen. n. 5098 *d.* p. 926; 1841. Ench. p. 483. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 602 *(Dyosmia).*
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 131. 149: g. Passiflorear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 334: g. Passifloracear.

Dysosmia Korthals . . . . Nederl. kruidk. Arch. II. p. 224: sect. Mephitidiae.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 325: g. Pyrostriear.

Dysosmon Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 48.
= Sesamum Linn.?

Dysoxylon Bartling 1830. Ord. p. 356: g. Meliacear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 153.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313 *(Disoxylon):* g. Guareear.
Endl. 1840. Gen. n. 5529. p. 1049; 1841. Ench. p. 551: g. Trichiliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8065. — Walp. 1842. Rep. I. p. 429. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 83. 101. (restrict.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 387.
= Dysoxylum Blume.

Dysoxylum Blume 1825. Bijdr. Nr. 4. p. 172: nov. g. Aglaiear. Sect.: Dysoxylum, Macrocheton.
A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 224 *(Disoxylum):* g. Trichiliear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 683. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 180 *(Disoxylum).* — Meisn. 1837. Gen. p. 48 (35) *[Disoxylum].*
Synon. Dysoxylon Auct.; Prasoxylon Röm.

Dysphania*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 411. Ed. Nees p. 267: nov. g. Chenopodeis aff. (D. littoralis.) — Par. Endl. 1837. Gen.

*) δυσφανής, indistinctus.

Dysphania R. Brown cont. n. 1953. p. 300; 1841. Ench. p. 182. — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6407.
Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 574: g. Atripliceis aff.
Schult. 1822. Mant. p. 69. 227: g. Diandr. Monogyn.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 94. n. 122; 1830. Gen. I. p. 29. n. 130: g. Chenopodear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 216. — Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4336. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.
Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233): g. Camphorosmear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 86: g. Blitear.

Dysphinctium Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 109: g. Desmidiacear. Sect.: Actinotaenium, Calocylindrus, Dysphinctium.
= Closterii, Cosmarii, Euastri sp. (Jessen in Bot. Zeit. 1849. p. 827.)

Dysrhachyobryum Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 107: subg. Lycopodii.

Dyssochroma Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 248: nov. g. Solandrear. (D. viridiflora et longipes.)
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 152: g. Daturear.?
Miers . . . . Ill. South-Am. pl. II. p. 46. Char. emend. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 586.

Dyssodia Cavan. 1802. Anal. cienc. nat. VI. p. 334.
Lagasc. 1816. Gen. et spec. p. 29: g. Corymbiferar. — Par. Link 1822. En. II. p. 339.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 396; 1825. v. 38. p. 203: g. Tagetinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143.
Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2354: g. Tagetear.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 61; 1830. v. 60. p. 574: g. Dyssodiear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 16.
Less. 1832. Syn. p. 388: g. Senecionear.
= Dysodia DC.

Dyssodia Willd. 1809. Enum. p. 900: g. Syngenes. Superfl.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 564 *(Dysodia)*: g. Radiatar.
= Lebetina Cass.

Dyssodieae Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 61; 1830. v. 60. p. 574: div. Tagetinear. Gen.: Clomenocoma, Dyssodia, Schlechtendalia, Lebetina. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 16. Gen. ead. (Adenophyllum loco Schlechtendaliae.)

Dyssorhynchium Spach vid. *Dissorhynchium Schauer.*

Dysticia „Rafin.“ Rchb. Consp. p. 15 inter genera Fungor. ulterius inquirenda: vid. *Dycticia Raf.*

E.

Earina*) Lindl. 1834. Bot. Regist. XX. (n. ser. VII.) n. 1699: nov. g. Malaxidear., Coelogynae et Dilochiae aff. (Epidendrum autumnale Forst.) *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 58.
A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 376: g. Orchidear. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 239.
Endl. 1837. Gen. n. 1346. p. 190; 1841. Ench. p. 109: g. Pleurothallear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1934. — Meisn. 1842. Gen. p. 368 (277). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Coelogynidar.

Eatonia**) Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 104: nov. g. Graminear. (Aira pennsylvanica Spreng.)
Endl. 1837. Gen. n. 880. p. 99; 1841. Ench. p. 59: g. Bromear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 425 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 165.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1387: g. Poariar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Synon. Reboulea Kunth; Chondrachyrum Nees?

Ebelia***) Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 74. n. 2773: g. Spermacocear. genuinar.
= Triodon DC.

*) [illegible]
**) Dicat. Amos Eaton, botanico anglo.
***) Dicat. Cl. W. Ebel, Armeriae monographo. (Triodon genus piscium.)

Ebelingia Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5180: g. Quassiear.
Harrisonia R. Brown.

Ebenaceae Vent. 1799. Tabl. II. p. 443: ordo 1 class. IX. Gen. §. 1: Diospyros, Royena, Styrax, Halesia. §. 2: Camellia, Hopea.
Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 417 (1819. Dict. v. 14. p. 140). Gen.: Embryopteris, Diospyros, Royena, Mocanera, Maba, Pouteria, Andreusia. Segregantur Styrax et Halesia.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 346. t. 54. Gen. §. 1: Diospyros, Embryopteris, Royena, Maba, Puteria, Ferreola, Styrax, Halesia. §. 2: Alstonia, Symplocos, Omphalocarpum, Ciponima, Paralea, Hopea.
DC. 1805. Franç. III. p. 669: fam. (52) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Diospyros, Styrax. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 524. Ed. Nees p. 380. Novum genus: Cargillia.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246: ordo Corolliflorar. — Par. Koch 1837. Syn. p. 480. Ed. II. p. 552. Gen.: Diospyros. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 209. Gen.: Royena, Euclea, Gunisanthus, Rospidios, Macreightia, Diospyros, Maba, Cargillia.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: fam. Calicitubiae. Gen.: Dyospyros.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: ordo Aridifoliar.
Link 1829. Hdb. I. p. 598: ordo (35) Hypanthar. Gen. ut DC. 1805.

Ebenaceae Vent. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21. 27: fam. Jasminariear. Gen.: Diospyros, Royena, Cargillia, Maba.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (202) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 160: ordo (98) Styracinar. Gen.: Diospyros, Embryopteris, Royena, Cargillia, Maba; Pouteria, Phelline. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 250 (159). Gen. ut Endl. et Ximenia?, Götzea, Phelline.
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo Primulalium.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 226) 1847. Veg. kd. p. 595: ordo Gentianalium. Gen. ut A. DC. et Erycibe.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 37: ordo Corollaeflorar. Gen.: Diospyros, Embryopteris, Paralea, Royena, Diplonema, Diclidanthera, Cargillia, Maba.
Endl. 1839. Gen. p. 741; 1841. Ench. p. 362: ordo Petalanthar. Gen.: Maba, Cargillia, Diospyros, Rymia, Royena.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 399: fam. (152) Styracinear. Gen. ut Endl. et Paralea, Götzea, Phelline?, Hornschuchia?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 72: fam. Diospyroidear. Gen.: Diospyros, Royena.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 170.
Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 1. Gen. bras.: Diospyros, Macreightia.
Synon. Vacciniorum Adans. pars; Guajacanarum sect. 1 Juss.

Ebenidium Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 162: nov. g. inter Ebenum et Anthyllidem quasi medium. (E. lagopus.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 527: g. Euhedysarear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Galegear.

Ebenotypus Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 151: sect. Ebeni. (E. cretica L.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 897.

Ebenoxylon Spreng. vid. *seq.*

Ebenoxylum Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 613. Ed. Willd. p. 751: nov. g. Dioec. Triandr. (E. verum.) *Cf.* Juss. 1819. Dict. v. 14. p. 142.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 40. n. 183 (*Ebenoxylon*): g. Triandr. Monogyn.
= Maba Forst.

Ebenus*) Linn. 1753. Spec. II. p. 764; 1759. Syst. ed. X. p. 1176. 1376. n. 1159; 1763. Sp. ed. II. p. 1076; 1764. Gen. ed. VI. p. 386. n. 895; 1767. Syst. ed. XII. p. 480: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 545; 1784. Syst. p. 655. — Reich. 1778. Gen. p. 371. n. 938. — Gmel. 1791. Syst. p. 1100. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 491. n. 1175. — Pers. 1797. Syst. p. 692.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 303. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 571. n. 2782.
Adans. 1763. Fam. II. p. 321: g. Genistar.

*) Nomen ex Virgilio.

Ebenus Linn. cont.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415.
Gled. 1764. Syst. p. 130. n. 533: g. Thalamostemonum.
Neck. 1790. El. III. p. 10. n. 1307: g. Cyteophytor.
Desf. . . . . Act. soc. h. n. Par. I. p. 21. t. 3.
DC. 1825. Pr. II. p. 350 (Lég. Mém. VII): g. Euhedysarear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 308. — Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). — Endl. 1841. Gen. n. 6624. p. 1286; 1841. Ench. p. 671. — Walp. 1843. Rep. II. p. 897 (ex Spach).
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4007; 1841. Nom. p. 152. n. 5957: g. Onobrychear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 296.
Link 1831. Hdb. II. p. 215: g. Hedysarear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 130.
Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 149. (Monogr.) Sect.: Ebenotypus, Hedysaroides, Onobrychioides, Tragacanthoides.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 12: g. Anthyllidear.
Synon. Anthyllidis sp. Lam.

Ebenus Comm. mss. ex Juss. gen.
Endl. 1839. Gen. n. 4249 *a*. p. 742; 1841. Ench. p. 363: sect. Diospyri.
Synon. Guaiacana Tourn.; Diospyros Gärtn.

Eberlea Ridd. in herb. Hook.
= Hygrophila R. Brown.

Ebermaiera*) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 75; 1836 in Lindl. nat. syst. ed. II. p. 285; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 15; 1847 in DC. Pr. XI. p. 70: nov. g. Nelsoniear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 293 (*Ebermayera*). — Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 17 (*Ebermiera*). t. 1488. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 772 (*Ebermayera*). Sect. genuinae, Erythracanthus.
Rchb. 1837. Handb. p. 190: g. Elytrariear.
Synon. Staurogyne Wall.; Stiftia Pohl; Ebermeyera Endl.

Ebermayera Meisn., Miq. vid. *praeced.*

Ebermeyera Endl. 1839. Gen. n. 4034. p. 698; 1841. Ench. p. 343: g. Nelsoniear. — Par. Meisn. 1840. Comm. p. 202. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Rchb. 1841. Nom. p. 110. n. 4300. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 368. 584.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Nelsonear.
= Ebermaiera Nees.

Ebermiera Wight vid. *Ebermaiera Nees.*

Eborilingues Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 109: sect. Vandear. Fam.: Cycnochideae, Cataseteae.

Ebulus**) Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 323: sect. Sambuci. (S. Ebulus L.)
Bernh. 1846. Allg. thür. Gartenz. (*cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 399): subg. Sambuci.

*) Dicat. Joh. Erdm. Chr. Ebermaier.
**) Nomen ex Virgilio.

Ecalyptrata Hoffm. 1795. Bot. Taschenb. p. 81: ordo 6 Cryptogamiae. Gen.: Jungermannia, Marchantia, Targionia, Anthoceros, Blasia, Riccia.

Ecastaphyllum*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 299: nov. g. Diadelph. Decandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 277. n. 1670.
Adans. 1763. Fam. II. p. 320: g. Genistar.
Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 156: g. Leguminosar.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Dalbergiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 420. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 378. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 366. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (68). — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 93. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 452.
Synon. Pterocarpus Berg.; Acouroa Aubl.; Acourea Scop.; Acuroa Gmel.; Drakenstenia Neck.; Monetaria Bronn; Hecastophyllum HBK.; Hecastaphyllum Spreng.

Ecbalium*) Rich. mss. ex DC. Prodr. III. p. 311 sub Momordica. (An proprium genus?)
Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2753; 1831. Fl. exc. p. 294: g. Cucurbitear. (Momordica Elaterium L.) — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 215. — Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 276. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 269. — Meisn. 1843. Comm. p. 356. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29 *(Ecballium)*: g. Cucurbitacear. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 162. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 116. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 140. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 604 *(Ecballium)*.
Endl. 1839. Gen. n. 5132. p. 937; 1841. Ench. p. 491: g. Bryoniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3946. — Walp. 1843. Rep. II. p. 199. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 173.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 13. 52: g. Momordicear.
Synon. Elaterium Rupp.; Ecballion Rich.

Ecballion Rich. 1825. Dict. class. VI. p. 19.
Koch 1836. Syn. p. 251. Ed. II. p. 277: g. Cucurbitacear.
= Ecbalium Rich.

Ecballium Dumort., Godr. vid. *Ecbalium Rich.*

Ecbolium „Riv." Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 73; 1790. Act. Theod. Pal. Phys. VI. p. 393: g. ex typo Justiciae Ecbolii L. *Cf.* Medic. Phil. Bot. II. p. 44. 68.

*Eccalyptrocarpa****) Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 39: class. VI. Cryptogamor. Gen.: Jungermannia, Marchantia, Anthoceros, Targionia, Sphaerocarpos.
Vid. Ecalyptrata Hoffm.

Ecchyna Fries 1819. Novit. fl. Suec. V. p. 80: nov. g. Fungor. (Nomen.)

Eccilea Léveillé vid. *seq.*

Eccilia*) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 207; 1825. Pl. homon. p. 68: tribus Hyporhodii.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *G c;* 1841. Nom. p. 12. n. 502. 4 *a:* subsect. Hyporrhodii. — Par. Lév. 1841 in Orb. Dict. I. p. 170 *(Eccilea)*. — Math. 1853. Belg. II. p. 362.
Endl. 1836. Gen. n. 453 *VI a*. p. 41; 1841. Ench. p. 22: subsect. Hyporhodii. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 502.
Fries 1836. Epicr. p. 159; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 288: subg. Hyporhodii.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.

Ecclimusa „Mart." A. DC. Prodr. VIII. p. 156 in synon. Chrysophylli: vid. *seq.*

Ecclinusa**) Martius 1837. Herb. fl. Bras. p. 177. (An *Ecclimusa?* ex A. DC.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 4234/$_1$. p. 1410; 1841. Ench. p. 361: g. Sapotacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 174.
Rchb. 1841. Nom. p. 137. n. 5297: g. Mimusopear.
= Chrysophyllum Linn.

Ecclinusia „Mart." Meisn. Gen. Comm. p. 177 in synon. Chrysophylli: vid. *praeced.*

Eccoilopus Steud. 1854. Syn. pl. glum. p. 123: nov. g. Stipacear. (Andropogon cotuliferum Thunb.?)

Eccremanthus***) Thwaites 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 272. t. 9: nov. g. Sapindacear. (E. eximius.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 375: g. Sapindear.

Eccremidium Hook. & Wils. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 450.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 425: g. Leptotrichacear.

Eccremocarpeae Endl. 1839. Gen. p. 709; 1841. Ench. p. 345: subordo Bignoniacear. Gen.: Calampelis, Eccremocarpus, Fridericia.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130: sect. Bignoniacear. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 116: subsect. Bignoniear. pterospermar. Gen. ead.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 238: subtrib. Bignoniear. Gen.: Eccremocarpus.

Eccremocarpus Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 90. t. 18: nov. g. Didynam. Angiosperm.
Pers. 1807. Ench. II. p. 173. n. 1513: g. Bignoniacear. — Par. Kunth .... Journ. Phys. LXXXVII. p. 452; 1818 in HBK. Nov. gen. III. p. 150; 1823. Syn. II. p. 250. (verar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23. — Bartl. 1830. Ord. p. 186. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677.
Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 229. t. 65: g. Bignoniar.

---

*) *ἕκαστος*, singuli. Ratio nominis ignota.
**) *ἐκβάλλω*, ejicio.
***) *ἐκκαλύπτω*, manifesto, denudo.

*) *ἐγκοιλόω*, excavo.
**) *ἐκκλίνω*, flecto, declino.
***) *ἐκκρεμής*, pendulus.

Eccremocarpus Ruiz & Pav. cont.
Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 157: g. Bignoniear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 836. n. 2229; 1831. Gen. II. p. 503. n. 2472. — Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3264.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VII. p. 88: g. Tourretiear. Sejungitur Calampelis. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 153. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 231. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 567.
DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123: g. Catalpear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 301 (209).
Endl. 1839. Gen. n. 4107. p. 710; 1841. Ench. p. 345: g. Eccremocarpear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130. — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4539. — DC. 1845. Pr. IX. p. 238. Sect.: Eueccremocarpus, Calampelis. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 174.

Eccrina Leidy 1850. Proc. Phil. Ac. V. p. 53; 1853. Smithson. Contrib. V. p. 29. t. 5: nov. g. Algar., in animalibus vivis occurrens.

Ecdysanthera Hook. & Arn. 1836 in Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 198. t. 42: nov. g. Apocynear. (E. rosea.)
Endl. 1838. Gen. n. 3418. p. 584; 1841. Ench. p. 295: g. Echitear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. — Meisn. 1840. Gen. p. 264 (173). — Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5158. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 442. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 174. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 451.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Echaltium Wight 1841. Icon. pl. Ind. II. 2. p. 4. t. 472: nov. g. Euapocynear. (Nerium piscidium Roxb.)
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 416: g. Echitear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.?

Echeandia*) Ortega 1797. Dec. pl. p. 90. (DC. & Redouté Liliac. t. 313.)
Endl. 1837. Gen. n. 1158. p. 150; 1841. Ench. p. 84: g. Conantherear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1814. — Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301).
Mart. & Gal. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 386: g. Liliacear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 627: g. Anthericear. — Par. Schltd. 1845. Bot. Zeit. p. 643. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 386. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Brongn. 1843. En. genr. p. 19: g. Hyacinthinear.
Synon. Antherici sp. Cavan.; Conantherae sp. Pers.

Echenais Cassini 1818. Bull. soc. philom. Mars p. 33; 1819. Dict. v. 14. p. 170; 1822. v. 25. p. 226: nov. g. Carduinear. (Carlina echinus MB.) *Cf.* Cass. 1820. Bull. soc. philom. p. 4. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 660. — Endl. 1838. Gen. n. 2891. p. 479; 1841. Ench. p. 247. — Meisn. 1839. Gen. p. 225 (140). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 36. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 746. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 180. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 403 (*Echinais*).
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 311. 325; 1830. v. 60. p. 572: g. Silybear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2321.
Bartl. 1830. Ord. p. 144: g. Carduacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3900: g. Cirsiear.

Echeveria*) DC. 1828. Prodr. III. p. 401: nov. g. Crassulear. (Cotyledon coccinea Cav.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 113. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 560. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 181.
Haw. 1828. Phil. Mag. IV. p. 261: g. Crassulacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 310. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 89. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 106.
Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4188: g. Sedear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Cotyledonear.
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): g. Umbilicear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4621. p. 811; 1841. Ench. p. 405. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 11.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1626: sect. Cotyledonis.

Echiales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 29: nixus Dicarpar. Ordines: Borragineae, Ehretiaceae, Cordiaceae, Hydrophylleae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 649: nixus Exogenar. perigynar. Ord.: Jasminaceae, Salvadoraceae, Ehretiaceae, Nolanaceae, Boraginaceae, Brunoniaceae, Lamiaceae, Verbenaceae, Myoporaceae, Selaginaceae.

Echieae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 447: ordo Asperifoliar. Gen.: Echium, Echiochilon, Nonea, Colsmannia, Trichodesma, Lithospermum, Pulmonaria, Heliotropium, Onosma, Purshia, Moltkia, Coldenia. — Simil. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVI. Gen.: Echium, Onosma, Lithospermum, Onosmodium, Lycopsis, Pulmonaria, Tiaridium.
Rchb. 1828. Consp. p. 118 (1831. Fl. exc. p. 335): div. Asperifoliacear. Gen. ut 1827 et Echiochilon, Nonea, Colsmannia, Craniospermum, Dioclea, Rindera, Moltkia, Coldenia, Cerinthe, Preslea; Trichodesma.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: trib. Boraginear. Gen.: Echium, Echiochilon.
Rchb. 1837. Hdb. p. 192: subdiv. Schizocarpicar. Gen. ut 1828 (exclusis ultimis) et Echiopsis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 111. Gen.: Echium, Echiopsis, Lobostemon, Echiochilon, Onosmodium, Onosma, Cerinthe, Moltkia, Macrotomia, Pulmonaria, Steenhammera, Winkleria, Lithospermum, Batschia, Margarospermum, Macromeria, Craniospermum, Colsmannia, Nonnea, Meneghinia.

*) Dicat. Greg. Echeand, prof. bot. Saragoss.

*) Dicat. pictori Echeveria, Mexicano.

Echieae Spreng. cont.
DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 281 (190): trib. Borraginear. Gen.: Lobostemon, Echium, Macrotomia, Echiochilon.
DC. 1846. Pr. X. p. 4: subtrib. Borragear. Gen. ut in Meisn.

Echinacanthus*) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 75. 90; 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 285; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 168: nov. g. Ruelliear. (Ruellia attenuata Wall.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4255. — Endl. 1839. Gen. n. 4058. p. 701; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 294 (203). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 145. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 183. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 793.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 591: g. Echmatacanthor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar.

Echinacea Mönch 1794. Meth. p. 591: nov. g. Petalostemonis. (Rudbeckia purpurea L.) *Cf.* Juss. 1819. Dict. v. 14. p. 183.
Cass. 1825. Dict. v. 35. p. 274; 1825. v. 38. p. 17; 1827. v. 46. p. 397. 400; 1830. v. 60. p. 576: g. Rudbeckiear. (1827 verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2650; 1841. Nom. p. 92. n. 3630. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Less. 1832. Syn. p. 225. — DC. 1836. Pr. V. p. 554. — Endl. 1838. Gen. n. 2513. p. 409; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 202 (131). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 151. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 183.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1535: sect. Rudbeckiae.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 42.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 305: g. Euhelianthear.
Synon. Bobartia Petiv.; Brauneria Neck.; Helichroa Raf.

Echin-Agaricus Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 32: g. pl. class. I. (Agaricorum ordo 6 Mich.)

Echinais C. Koch vid. *Echenais Cass.*

Echinalysium**) Trin. 1820. Fund. Agrost. p. 142: g. Graminum, pro *Elytrophoro Palis.* (nomine nimis vago) propositum.

Echinanthus Necker 1790. Elem. bot. I. p. 91. n. 166: g. Siphoniphytor.
= Echinops Linn.

Echinaria Desfont. 1799. Fl. Atl. II. p. 385.
DC. 1805. Franç. III. p. 74: g. Graminear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 43. n. 202. — Palis. 1812. Agrost. p. 83. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 37. 617. n. 317. — Lois. 1819. Dict. v. 14. p. 184. — Link 1829. Hdb. I. p. 78.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Chlo-

*) ἐχῖνος, erinaceus.
**) ἅλυσις, catena parva.

Echinaria Desfont. cont.
ridear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 171.
Link 1821. En. I. p. 83: g. Graminum.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 629: g. Triandr. Digyn.
Link 1827. Hort. I. p. 198: g. Echinariacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 992; 1830. Fl. exc. p. 35: g. Festucacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Pappophorear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 84; 1833. Agrost. p. 256. — Endl. 1837. Gen. n. 832. p. 92; 1841. Ench. p. 58. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 48. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 136. 329. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1306. — Meisn. 1843. Gen. p. 421 (322). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 8. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 162. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 405. — Steud. 1854. Glum. I. p. 201.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear.
Koch 1837. Syn. p. 788. Ed. II. p. 910: g. Sesleriacear. — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 400. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 455.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 444: g. Festucear.
Synon. Panicastrella Mönch.

Echinaria Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 73; 1849. Spec. Alg. p. 41: sect. Synedrae.

Echinariaceae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 197: fam. Graminear. Gen.: Echinaria.

Echinastrum Nägeli mss.
= Sorastrum Kütz.

Echinella Achar. 1810 in Web. Beitr. z. Naturk. II. p. 340. t. 4: nov. g. Algar. (E. radiosa.) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 185.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 208: g. Tremelloidator.
Agdh. 1821. Aphor. p. 98: g. Confervoidear.
Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 198: g. Confervear.
Grev. 1822. Mem. Wern. Soc. IV. 1. p. 213.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XVII. 15: g. Nostochinar. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 187.
Fries 1825. Pl. homon. p. 355: g. Echinellear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 448. — Endl. 1836. Gen. n. 22. p. 3; 1841. Ench. p. 2.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78: g. Frustuliacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 120: g. Placanthior.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 611: g. Desmidiacear. inclusar.
Menegh. 1838. Cenni p. 34: g. Desmidiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 658. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13.
= Gomphonematis, Synedrae, Meridionis, Podosphenіae etc. sp. Kütz.

Echinella DC. 1824. Prodr. I. p. 41: sect. Ranunculi. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 739. — Presl 1826. Sicul. I. p. 18. — Link 1831. Hdb. II. p. 394. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 40. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 45. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 313.

Webb 1836. Canar. I. p. 9: sect. Chrysobatrachii. = Echinobatrachium Rchb.

Echinelleae Fries 1825. Pl. homon. p. 355: trib. Diatomear. Gen.: Meridium, Echinella, Achnanthes, Frustulia.

Rchb. 1828. Consp. p. 26: div. Confervacear. Gen. ead. et Gomphonema, Acetabulum.

Endl. 1836. Gen. p. 3; 1841. Ench. p. 2: trib. Desmidiear. Gen.: Echinella, Gloionema, Desmidium.

Echinephora Rupp. Fl. jen. p. 264: vid. *Echinophora Rupp.*

Echinobatrachium Rchb. 1841. Nomencl. p. 190. n. 7221. 1: sect. Ranunculi.

Synon. Echinella DC.; Philonotis Rchb.; Pachyloma Spach; Brachybiastrum Gren.

Echinobotrium Corda vid. *seq.*

Echinobotryon „Corda" Endl. Gen. et Ench. in synon. Dematii: vid. *seq.*

Echinobotrys Lindl. vid. *seq.*

Echinobotryum Corda 1837 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 51. t. 26: nov. g. Fungor. (E. atrum.)

Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 2; 1842. V. p. 3 *(Echinobotrium)*; 1842. Mycol. p. 10: g. Caeomacear.

Corda 1839. Prachtfl. p. 17. t. 8. f. 10—13 (parasitans).

Rchb. 1841. Nom. p. 1. n. 15: g. Uredineor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 21. (genuinar.)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42 *(Echinobotrys)*: g. Torulaceor.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.?

Bonord. 1851. Hdb. p. 44: g. Caeomaceor. = Dematium Fries? (Endl. Gen. p. 20.)

Echinobrychis DC. 1825. Prodr. II. p. 348: sect. Onobrychidis? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4004 *d*; 1841. Nom. p. 152. n. 5952. 4. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 306. — Endl. 1841. Gen. n. 6619 *d*. p. 1286; 1841. Ench. p. 670.

Echinocacteae Rchb. 1841. Nomencl. p. 161: sect. Opuntiear. Gen.: Discocactus, Echinocactus, Astrophytum?

Salm-Dyck 1845. Cact. p. 16: trib. 2 Cactear.

Echinocactidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 748: trib. Cactacear. Gen.: Echinocactus, Pelecyphora.

Echinocactoideae Salm-Dyck 1840 in Otto & Dietr. Gartenz. p. 59: trib. Cactear. Gen.: Echinocactus, Discocactus. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1422; 1841. Ench. p. 496. Gen. ead.

Echinocactus Link & Otto . . . . . Berl. Gartenb. Verh. III. p. 420: nov. g. Cactear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4243. — Link 1831. Hdb. II. p. 9. — Pfeiff. 1837. Enum. diagn. p. 47; 1837. Beschr. Cact. p. 46. — Zuccar. 1837. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. II. p. 668. —

Echinocactus Link cont. Lemr. 1838. Cact. Monv. p. x. 14; 1839. Cact. gen. p. 12. — Meisn. 1838. Gen. p. 128 (92). — Miq. 1839. Bull. Néerl. 2e livr. p. 105. (Injungitur Discocactus.) — Endl. 1839. Gen. p. 943. n. 5155. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 96. — Walp. 1843. Rep. II. p. 309. 936; 1846. V. p. 813. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 106.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 493; 1830. Gen. I. p. 410: sect. Cacti.

DC. 1828. Mém. Mus. XVII. p. 25. 35. t. 7—10; 1828. Pr. III. p. 461: g. Opuntiacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 161.

Bartl. 1830. Ord. p. 277: g. Nopalear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 143; 1846. ibid. XIII. p. 350.

Rchb. 1837. Hdb. p. 233: g. Opuntiear.

Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 554: g. Cactacear.

Salm-Dyck 1840 in Otto's Gartenz. p. 59: g. Echinocactoidear. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 496. n. $5155/_1$.

Rchb. 1841. Nom. p. 161. n. 6265: g. Echinocactear. — Par. Salm-Dyck 1845. Cact. h. Dyck. p. 17. — Först. 1846. Hdb. Cact. p. 280.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 748: g. Echinocactidar.

Engelm. 1856. Syn. Cact. p. 271 (Emory Cact. p. 18): g. Cactacear. tubulosar. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 38.

Synon. Astrophytum Lemaire.

Echinocarpus Blume 1825. Bijdr. Nr. 2. p. 56: nov. g. Bixinear. *Cf.* Linnaea I. p. 645. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 190. n. 4930. — Bartl. 1830. Ord. p. 282. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 295. — Meisn. 1837. Gen. p. 19 (17). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 115. — Endl. 1839. Gen. n. 5062. p. 918; 1841. Ench. p. 478. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 234.

Spreng. 1827. Cur. post. p. 201; 1830. Gen. I. p. 426. n. 2114: g. Bixear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 274; 1841. Nom. p. 189. n. 7215. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328. — Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 364; 1857. ibid. VIII. p. 266.

A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 588: g. Bixacear.

Echinocaulon Meisn. 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 58; 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 19; 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 131: sect. Polygoni. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1986 *d*. p. 307; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 47. — Rchb. 1841. Nom. p. 163. n. 6317. 5. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1010.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 521: g. Polygonear.

Echinocaulon Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phycol. gener. p. 405; 1845. Phycol. germ. p. 306; 1849. Sp. Alg. p. 762. n. 510: nov. g. Gelidiear. (Gelidium Hystrix Zan.)

Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 186: g. Cryptonemear.

Synon. Helminthochorton Zanard.

Echinocaulon Hasskarl 1848. Pl. jav. rar. p. 224: g. Polygonear. (Polygonum perfoliatum L.) *Cf. Echinocaulos Hassk.*
= Chylocalyx Hassk.

Echinocaulos Hasskarl 1844. Cat. Bogor. alt. p. 85: g. Polygonear. (Polygonum perfoliatum L.)
= Echinocaulon Hassk.

Echinocephalum Gardn. 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 294: nov. g. Senecionidear., Oyedaeae aff. (E. latifolium, lanceolatum et angustifolium.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 858: g. Coreopsidear.

Echinoceras Kütz. 1841. Linnaea XV. p. 731. 756; 1843. ibid. XVII. p. 100; 1843. Phycol. gener. p. 380; 1845. Phycol. germ. p. 291; 1849. Sp. Alg. p. 680. n. 453: nov. g. Ceramiear.
Menegh. 1844 in Parlat. giorn. ital.: subg. Ceramii.
Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 167: sect. Ceramii. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 143.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubias.

Echinocereus Engelm. 1848. Bot. Wisliz. exp. p. 7 adnot.: nov. g. Cactear. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 895.
Salm-Dyck 1850. Cat. h. Dyck. p. 41. 187: sect. Cerei.
Engelm. 1856. Syn. Cact. p. 278 (Emory Cact. p. 28): subg. Cerei. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 42.

Echinochlaena Spreng. vid. *Echinolaena Desv.*

Echinochloa Palis. 1812. Agrost. p. 53. t. 11. f. 2: nov. g. Graminear. (Panicum Crus galli L.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 26. 476. n. 270. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 188. — Link 1829. Hdb. I. p. 82. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 122. — Sond. 1851. Fl. Hamb. p. 36.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 154: g. Panicear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 157. — Link 1827. Hort. I. p. 203. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 30. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 436. — Meyer 1849. Fl. hanov. p. 625.
Link 1821. En. I. p. 76: sect. Panici. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 80. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 157. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 255. — Endl. 1833. Norf. p. 17. — Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835.) p. 213. — Koch 1837. Syn. p. 772. Ed. II. p. 892. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 40; 1850 in Webb Canar. III. p. 382. — Garcke 1848. Fl. Hall. p. 513. — Steud. 1854. Glum. I. p. 46. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 460.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 891; 1830. Fl. exc. p. 23: g. Paspalacear. Sect. (1828): Urochloa, Echinochloa.
Kunth 1833. Agrost. p. 42: sect. Oplismeni. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 778 *b.* p. 84; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 288. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1281. 2.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 469; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 473; 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 264: g. Paspalear.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 186: subg. Oplismeni.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 463: g. Eupanicear.
Synon. Orthopogon A. Spreng.

Echinocystis Torrey & Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 542: nov. g. Cucurbitacear. (Momordica echinata Mühl.)
Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 276: g. Cucurbitear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 356. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Endl. 1841. Spl. I. n. $5141/_1$. p. 1421; 1841. Ench. p. 491: g. Cucumerinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3963. — Walp. 1843. Rep. II. p. 203. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 16. 83. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 187.

Echinodiscus DC. 1825. Prodr. II. p. 418: sect. Pterocarpi. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 376.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 94: g. Dalbergiear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6706. p. 1303; 1841. Ench. p. 672. — Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 189. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 136.
Synon. Weinreichia Rchb.

Echinodium Poir. mss.
= Acanthospermum Schrank.

Echinodorus Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365: nov. g. Alismacear., ab Alismate sejunctum.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 1605: sect. Alismatis. — Par. Kunth 1843. Enum. III. p. 151. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 106.
= Alismatis spec. polyandr.

Echinoglossum „Blume" Rchb. Nomencl. p. 54: vid. *Echioglossum Blume.*

Echinogyna Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Blasiear., pro *Fasciola Dumort.* (non Zool.) substitutum.
Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 83. t. 2. f. 22: g. Scopulinear. (Jung. furcata.)
= Metzgeria Raddi.

Echinolaena Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 75: nov. g. Graminear. (E. hirta.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 14. 322. n. 220. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 192. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 301. n. 314; 1830. Gen. I. p. 65. n. 317 (*Echinochlaena*).
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 118; 1822. Syn. I. p. 189; 1830. Gram. p. 54; 1833. Agrost. p. 171: g. Panicear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Endl. 1837. Gen. n. 789. p. 86; 1841. Ench. p. 57. Sect.: Echino-

Echinolaena Desvaux cont.
laena, Navicularia. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 133. 298. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1297. Sect. eaed. — Meisn. 1843. Gen. p. 418 (320). — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 136. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Trin. 1820. Fund. p. 181: g. Graminum. — Par. Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 9.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 883 (et n. 890): g. Paspalacear.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 127: sect. Panici.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 265: g. Paspalear.

Echinolema Jacq. fil. mss. (*Echinoloma* ex Steud. Nom. I. p. 537, *Echynolema* ibid. p. 17.)
= Acicarpha Juss.

Echinolitrum Steud. Nom. p. 537: leg. *Echinolytrum Desv.*

Echinolobium Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 123: nov. g. Leguminosar. (Hedysari sp.)
DC. 1825. Pr. II. p. 340: sect. Hedysari. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4003 *a.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 299. — Endl. 1841. Gen. n. 6618 *a.* p. 1286; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 698.
Synon. Sulla Medic.

Echinoloma Steud. vid. *Echinolema Jacq.*

Echinolytrum*) Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 17. t. 1. f. 176: nov. g. Cyperacear. (Scirpus dipsaceus Rottb.)
Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1114: g. Fimbristylear.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 289: g. Scirpear.
= Fimbristylis Vahl.

Echinomelocactus Linn. 1753. Spec. I. p. 466: sect. Cacti.
= Melocactus Link et Mammillaria Haw.

Echinomeria Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 356: nov. g. Rudbeckiear. (Rudbeckia apetala Nutt.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 42. n. $2513/_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Walp. 1843. Rep. II. p. 611. 983. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
= Helianthus Linn.?

Echinomitrion Corda 1832 in Sturm Jungerm. p. 77: nov. g. Jungermanniacear. (Jung. furcata L.)
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 46: g. Jungermanniear. (Dermatophyllinar.) — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 73.
= Metzgeria Raddi.

Echinomitrium Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 103: g. Frondosar. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 93.
= Metzgeria Raddi.

Echinonyctanthus*) Lemaire 1839. Cact. gen. p. 10: nov. g. Cactear. Phymatocotyledonear.
= Echinopsis Zuccar.

Echinopanax Decaisne & Planch. 1854. Revue hort 4e sér. III. p. . . . : nov. g. Araliacear.

Echinopea Fresen. 1834. Mus. Senkenb. I. p. 84: ordo Synantherear.
= Echinopsideae Rich.

Echinopeae DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 152: div. Cinarocephalar. Gen.: Boopis, Rolandra, Echinops. *Cf.* Cass. 1819. Dict. v. 14. p. 196.
Rchb. 1828. Consp. p. 102 (1831. Fl. exc. p. 292): div. Homoianthar. Subdivis.: Gymnostyleae, Lagascineae, Rolandreae, *genuinae* (p. 103. Gen.: Echinops).
Link 1829. Hdb. I. p. 814: ordo Anthodiatar. Gen.: Echinops.
Bartl. 1830. Ord. p. 144: div. Synantherear. Gen. id.
Rchb. 1837. Hdb. p. 182: subdiv. Segregatar.

Echinophora**) Tourn. 1700. Inst. App. p. 656. t. 423: g. pl. class. VII.
Linn. 1740. Syst. p. 20; 1742. Gen. ed. II. p. 525. n. 1017; 1753. Sp. I. p. 239; 1759. Syst. ed. X. p. 954. n. 292; 1762. Sp. ed. II. p. 344; 1764. Gen. ed. VI. p. 129. n. 329; 1767. Syst. ed. XII. p. 204. n. 326: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 226; 1784. Syst. p. 274. — Reich. 1778. Gen. p. 133. n. 359. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 180. n. 461. — Gmel. 1791. Syst. p. 471. — Pers. 1797. Syst. p. 290. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1379. n. 525; 1809. En. p. 301. — MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 199.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 52. n. 204: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Umbelliferar. — Par. Crantz 1767. Cl. Umbell. p. 115. (deliquesc.) — Juss. 1789. Gen. p. 225. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 480. (anomalar.) — DC. 1805. Franç. IV. p. 351. (anomalar.) — Hedw. 1806. Gen. p. 193. n. 795. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 644; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXI. 338; 1825. Syst. I. p. 873. n. 1028; 1830. Gen. I. p. 219. n. 1128. (descisc.) — Lois. 1819. Dict. v. 14. p. 197. — Link 1821. En. I. p. 263. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 510. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 106. (divis. 3.) — Bartl. 1830. Ord. p. 237. (descisc.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 102: g. Ginsenum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 301. n. 671.
Hill 1769. Ht. kew. p. 78: g. Aggregatar.
Scop. 1777. Intr. p. 109: g. Umbelliferis aff.
Neck. 1790. El. I. p. 157. n. 264: g. Gitonophytor.

---

*) ἐχῖνος, erinaceus; ἔλυτρον, involucrum.

*) ἐχῖνος, erinaceus; νύξ, nox; ἄνθος, flos.
**) ἐχινοφόρα, echinum ferens. (Plinio nomen conchae.)

Echinophora Tourn. cont.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 235; 1836. Syn. p. 319. Ed. II. p. 351: g. Smyrnear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 234. Sect.: Leucophora, Chrysophora. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 371. Sect. eaed. — Endl. 1839. Gen. n. 4522. p. 789; 1841. Ench. p. 380. Sect. eaed. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 586; II. p. 985. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 113. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 355. Sect. eaed. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 748. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 190.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3742; 1832. Fl. exc. p. 440; 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5340: g. Smyrniear. Sect. (1841): Echinophora, Chrysophora.
Link 1829. Hdb. I. p. 314: g. Hydrocotylinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: g. Pimpinellear.
Tausch 1834. Flora I. p. 357: g. Echinophorear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 150 (108). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 140. — Endl. 1850. Spl. V. p. 13.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 386: g. Monospermar. Sect. ut DC.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.

Echinophora Rupp. 1718. Fl. jen. p. 265. Ed. Hall. 1745. p. 277: g. pl. class. XII. = Orlaya Hoffm. et . . . ?

Echinophoreae Tausch 1834. Flora I. p. 357: subtrib. Angiospermar. Gen.: Arctopus, Echinophora, Exoacantha?, Anisosciadium.
Meisn. 1838. Gen. p. 150 (107): subtrib. Smyrnear. Gen.: Pycnocycla, Echinophora, Exoacantha, Anisosciadium. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 13. Gen. ead. et Dicyclophora, Thecocarpus.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 140: sect. Umbelliferar. anomalar. Gen. ut Tausch.

Echinopi Adans. 1763. Fam. II. p. 113: sect. 2 Compositar. Gen.: Echinopus, Gundelia, Sphaeranthus.

Echinoplaca Fée 1824. Meth. p. 35. t. 1. f. 25: nov. g. Lichenum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 317 et Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 191.
Rchb. 1841. Nom. p. 17. n. 570. 1 *b:* subsect. Squamariae.
= Lecidea Achar.

Echinoplaca „Fée“ Endl. Ench. p. 10 in synon. Lecideae: vid. *praeced.*

Echinopodeae Cassini 1826. Dict. v. 41. p. 339; 1830. v. 60. p. 572: trib. 5 Synantherear. Gen. unicum: Echinopus. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 13. 97. Gen.: Echinops, Acantholepis.

Echinopogon Palis. 1812. Agrost. p. 42. t. 9. f. 5: nov. g. Graminear. (Agrostis ovata Labill.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 23. 421. n. 257. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 273. n. 287; 1830. Gen. I. p. 56. n. 275. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 297.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Agrostidear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 150.
Trin. 1820. Fund. p. 126: g. Triandr. Digyn.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 677): g. Calamagrostideor.
Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 946: g. Phalaridear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Alopecurear.
Endl. 1837. Gen. n. 808 *c.* p. 89; 1841. Ench. p. 57: sect. Cinnae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1175. 3.
Trin. 1841. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 251: g. Agrosteor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Agrostear. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 182.

Echinops*) Linn. 1737. Gen. p. 242. n. 625; 1737. Cliff. p. 391 *(Echinopsis);* 1740. Syst. p. 28; 1742. Gen. ed. II. p. 386. n. 759; 1748. Ups. p. 248; 1753. Sp. II. p. 814; 1759. Syst. ed. X. p. 1198. n. 829: g. Syngenes. Polygam. Aequal.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 100: g. Capitatar. — Par. Linn. 1764. Ord. nat. — Gis. 1792. Prael. p. 538. — Batsch 1802. Tab. p. 251.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 240. n. 985: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Capitator.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cinarocephalar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 175. (anomalar.) — Vent. 1799. Tabl. II. p. 506. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 389.
Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1314; 1764. Gen. ed. VI. p. 453. n. 999; 1767. Syst. ed. XII. p. 581: g. Syngenes. Polygam. Segregat. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 664; 1784. Syst. p. 797. — Reich. 1778. Gen. p. 448. n. 1048. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 592. n. 1353. — Gmel. 1791. Syst. p. 1280. — Pers. 1797. Syst. p. 839; 1807. Ench. II. p. 499. n. 1966. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2396. n. 1579; 1809. En. p. 942. — Link 1822. En. II. p. 367. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 14. 419. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 446.
Hill 1769. Ht. kew. p. 80: g. Aggregatar.
Scop. 1777. Intr. p. 125: g. Flosculosar. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 885.
DC. 1805. Franç. IV. p. 70: g. Cynarocephalar. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 228. — Math. 1853. Belg. I. p. 293.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 153: g. Echinopear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2349; 1831. Fl. exc. p. 292. — Link 1829. Hdb. I. p. 814. — Bartl. 1830. Ord. p. 144.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 538; 1826. Syst. III. p. 394. n. 2660; 1831. Gen. II. p. 608. n. 2998: g. Cynarear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 44.
Cass. 1819. Dict. v. 14. p. 199: g. unicum Echinopsear.
A. Rich. 1825. Dict. class. VI. p. 38.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Echinopsidear. — Par. Less. 1832. Syn. p.

*) ἐχῖνος, echinus; ὄψις, facies.

Echinops Linn. cont.
13. — DC. 1837. Pr. VI. p. 522. — Koch 1837. Syn. p. 392. Ed. II. p. 451. — Endl. 1838. Gen. n. 2847. p. 467; 1841. Ench. p. 245. Sect.: Terma, Ritro, Psectra. — Meisn. 1839. Gen. p. 224 (139). — Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3926. Sect.: Terma, Echinops, Psectra. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 37. — Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 322. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 652. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 279. Sect. ut Endl. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 191. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 201.
Trautv. 1833. De Echinope. (Mitav.) *Cf.* Linnaea 1834. Litt. p. 55 et Flora Lit. IV. p. 203.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 13. 98: g. Echinopodear.
Synon. Echinopus Tourn.; Echinanthus Neck.

Echinopseae Cassini 1818. Dict. v. 10. p. 156; 1819. v. 14. p. 200; 1821. v. 20. p. 362: trib. 5 Synantherear. Gen. unicum: Echinops. *Cf. Echinopodeae Cass.*

Echinopsideae Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 23.
L. C. Rich. 1810. Prael. publ.: sect. Monostigmatiae. *Cf.* Cass. 1819. Dict. v. 14. p. 203.
Cass. 1815. Bull. soc. philom. p. 173: trib. 6 Synantherear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: fam. Tubulaciae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: subtrib. Cynaracear. Gen.: Echinops.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 88; 1832. Syn. p. 13: subtrib. Cynarear. Gen.: Echinops, Acantholepis. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 522. Gen. ead. — Endl. 1838. Gen. p. 466; 1841. Ench. p. 245. Gen. ead. — — Meisn. 1839. Gen. p. 224 (139). Gen. ead. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 37. Gen.: Echinops. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 451. Gen.: Echinops. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. Gen. ut Less.
Koch 1837. Syn. p. 392: trib. Cynarocephalar. Gen.: Echinops.
Rchb. 1841. Nom. p. 100: subdiv. Segregatar. Gen. ut Less.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 322: div. Acharacopappear. Gen.: Echinops. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 428.
Synon. Echinopeae DC.; Echinopseae Cass.; Echinopodeae Cass.; Echinoporum pars Adans.

Echinopsideae HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 24: div. Carduacear. Gen.: Lagascea, Elephantopus, Rolandra, Trichospira, Spiracantha. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 890. Gen.: Elephantopus, Sphaeranthus, Tetraotis.

Echinopsilon*) Moquin-Tand. 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 127: nomen pro *Willemetia Märkl.* (non *Neck.*) propositum.

*) ψιλός, gracilis.

Echinopsilon Moq.-Tand. cont.
Endl. 1837. Gen. n. 1927. p. 296; 1841. Ench. p. 181: g. Kochiear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233). — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 134. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 191. — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 750.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. en. p. 85: g. Camphorosmear.
Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6381: g. Betear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 102: g. Cyclolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 25: subg. Kochiae.
Synon. Bassia All.; Willemetia Märkl.; Willemeta Gmel.; Villemetia Moq.; Kochia R. Brown; Suaeda Rchb.

Echinopsis Linn. Cliff. vid. *Echinops Linn.*

Echinopsis Zuccar. 1837. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. II. p. 675: nov. g. Cactear. — Par. Miq. 1839. Bull. Néerl. 2e livr. p. 109. — Endl. 1839. Gen. p. 943. n. 5156. — Walp. 1846. Rep. V. p. 818.
Salm-Dyck 1840 in Otto's Gartenz. p. 60; 1845. Cact. h. Dyck p. 25: g. Cereastrear. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 496. n. 5156/₁. — Rchb. 1841. Nom. p. 161. n. 6267. — Walp. 1843. Rep. II. p. 275. 323. — Först. 1846. Hdb. Cact. p. 357.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 748: g. Cereidar.
Synon. Echinonyctanthus Lemaire; Cerei globosi DC.; Echinocacti sp. Auct.

Echinopteris Lindl. vid. *seq.*

Echinopterys A. Juss. 1843. Arch. Mus. III. p. 342. t. 9: nov. g. Malpighiear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 194. — Endl. 1850. Spl. V. p. 77. n. 5586/₁.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390 *(Echinopteris)*: g. Malpighear.
Synon. Coelostylis A. Juss. 1840.

Echinopus Tourn. 1700. Inst. p. 463. t. 262: g. pl. class. XII.
Vaill. 1718. Act. Ac. Par. p. 150: g. Cynarocephalar.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 188. Ed. Hall. 1745. p. 196: g. pl. class. VIII.
Adans. 1763. Fam. II. p. 114: g. Echinoporum.
Scop. 1772. Carn. II. p. 121: g. Capitatar.
Mönch 1794. Meth. p. 531: g. Petalostemonis.
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 314; 1830. v. 60. p. 573: g. Echinopodear.
= Echinops Linn.

Echinoschoenus Nees 1834 in Meyen Reise I. p. 116: nov. g. Cyperacear.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 297; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 103: g. Rhynchosporear. (Schoenus triceps Vahl.)
Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 131: g. Haplostylear.
= Zosterospermum Palis.

Echinospartum Spach 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 251: subsect. Spartocarpi. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 467.

Echinosperma Hasskarl vid. *Echinospermum Sw.*

Echinospermae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: series Umbellatar. Trib. unica: Caucalideae.

Echinospermum Swartz 1818 in Lehm. Asperif. I. p. 113: nov. g. Asperifoliar. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 567. n. 602; 1830. Gen. I. p. 127. n. 633. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 4. 59. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 197. — Bartl. 1830. Ord. p. 198. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 610. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 138 *(Echinosperma)*.

Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 211: g. Borraginear. — Par. Link 1821. En. I. p. 165; 1829. Hdb. I. p. 574. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 846. — Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2969; 1831. Fl. exc. p. 345. — Kunth 1838. Berol. II. p. 36. — Lehm. 1840 in Hook. Fl. bor. am. II. p. 83. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 103.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 89 (in Ind.): g. Cynoglossear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 496. Ed. II. p. 571. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 348. — Rchb. 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 111. n. 4345. — Endl. 1839. Gen. n. 3786. p. 650; 1841. Ench. p. 321. — Meisn. 1840. Gen. p. 279 (187). — DC. 1846. Pr. X. p. 135. Sect.: Homalocaryum, Lappula, Sclerocaryum. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 154. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 535.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 30: g. Asperifoliear.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 57: g. Anchusear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Cynoglossidar.

Synon. Lappula Mönch; Rochelia Röm. & Sch.; Myosotis Ell.; Hackelia et Echinospermum Opiz.

Echinospermum Opiz . . . . Oekon. Fl. Böhm. II. p. 147: g. disjuncta Hackelia restrict.

= Echinospermi Swartz pars.

Echinosphace Benth. 1833. Labiat. p. 302; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 349: sect. Salviae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 753. — Endl. 1838. Gen. n. 3597 *i.* p. 614; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4144. II. — Walp. 1845. Rep. III. p. 671.

Echinosphaera Sieb. mss.

= Ricinocarpos Desfont.

Echinostachys Brongn. 1828. Ann. sc. nat. XV. p. 456; 1828. Dict. v. 57. p. 137: g. Monocotyledonum foss. (E. oblongus.)

Schimp. & Moug. 1844. Pl. foss. Vosg. p. 45.

Unger 1845. Syn. p. 179; 1846. Chlor. prot. p. LXIX: g. Typhacear. — Par. F. Braun 1847. Flora I. p. 86.

Echinostachys E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 243: nov. g. Ajugoidear.

= Pycnostachys Hook.

Echinostachys Beer 1857. Fam. Bromel. p. 22. 148: g. Macrochordiar.

Echinus Hall. 1768. Helv.

= Hydnum Linn.

Echinus*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 633. Ed. Willd. p. 777: nov. g. Dioec. Polyandr. (E. trisulcus.) *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 186 et A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 193.

Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5104: g. Euphorbiacear. minus cognitum. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5887. p. 1125; 1841. Ench. p. 589. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.

Meisn. 1841. Gen. p. 338 (252): g. Acalyphear.?

Synon. Ulassium Rumph.

Echiochilon**) Desfont. 1800. Fl. Atlant. I. p. 166. t. 47: nov. g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Schrad. Journ. I. p. 354. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 164. n. 364.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 300: g. Borraginear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 89. n. 406. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 215.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 448: g. Echiear. Par. Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2944; 1841. Nom. p. 111. n. 4313. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Endl. 1839. Gen. n. 3758. p. 647; 1841. Ench. p. 320. — Meisn. 1840. Gen. p. 281 (190). — DC. 1846. Pr. X. p. 27.

Lehm. 1818. Asperif. II. p. 477: g. Asperifoliar. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. IV. 9. n. 623. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 555. n. 588; 1830. Gen. I. p. 124. n. 618. — Bartl. 1830. Ord. p. 197. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 602.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 335: g. Lithospermear.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31: g. Asperifoliear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.

Synon. Chilechium Rafin. (An Chilochium? ex DC.)

Echioglossum Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 364: nov. g. Orchidear.

Lindl. 1833. Orchid. p. 233: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1488. p. 206; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2093 *(Echinoglossum)*. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (281). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 690.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Echioides Tourn. 1703. Coroll. p. 46: g. pl. class. II.

Dill. 1719. Nov. gen. p. 100. t. 3.

Desf. 1800. Fl. Atlant. I. p. 163.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 302: g. Borraginear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 92. n. 418. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 214.

= Nonea Medic.

Echioides Rupp. 1718. Fl. jen. p. 213. Ed. Hall. 1745. p. 218: g. pl. class. IX.

= Anchusa et Lycopsis Linn.

---

*) Nomen a capsulis echinatis.

**) ἔχιον, Echium; χεῖλος, labrum.

Echioides Mönch 1794. Meth. p. 416: g. Petalostemonis.
= Myosotis Linn.

Echiopsis Rchb. 1837. Handb. p. 192; 1841. Nomencl. p. 111. n. 4311 (c. char.): g. Echiear. (Echium fruticosum L.)

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31: g. Asperifoliear.
= Lobostemon Lehm.

Echisachys (male pro *Echinostachys*) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 228. n. 1611: nov. g. Achyrophytor., a Cenchro Linn. disjunctum.
= Lappago Schreb.

Echiteae Rchb. 1828. Consp. p. 133 (1831. Fl. exc. p. 429): subdiv. Apocynear. Gen. (§. 1. *ecoronatae*): Alafia?, Echites, Haemadictyon, Ichnocarpus, Beaumontia, Holarrhena, Isonema, Vallaris, Parsonsia, Lyonsia, Apocynum, Cryptolepis, Thenardia, Alstonia, Syringosma?; (§. 2. *coronatae*) Prestonia, Balfuria, Nerium, Systrepha?, Strophanthus, Wrightia. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 211. Gen. ead. et Kamettia. — Rchb. 1841. Nom. p. 133. Gen. ut Endl., exceptis 4 ultimis (Nerieis).

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: trib. Apocynear. Gen. ex Rchb. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. 527. Gen. ut Endl. et Adenium. — Meisn. 1840. Gen. p. 264 (172). Gen. ead. et Alafia?, Vahea?, Adenium?, Haemadictyon. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 52. Gen. ex Endl. et Alstonia, Wrightia.

Bartl. 1830. Ord. p. 204: div. Apocynear. Gen.: Haemadictyon, Ichnocarpus, Beaumontia, Holarrhena, Isonema, Vallaris, Parsonsia, Lyonsia, Apocynum, Cryptolepis, Thenardia, Prestonia, Balfouria, Nerium, Strophanthus, Wrightia, Alstonia, Vinca, Lochnera, Tabernaemontana, Vahea, Urceola, Cameraria, Amsonia, Plumeria, Plectaneia, Allamanda, Aspidosperma.

Endl. 1838. Gen. p. 583: trib. Euapocynear. Gen.: Echites, Ichnocarpus, Beaumontia, Holarrhena, Pachypodium, Isonema, Thenardia, Vallaris, Parsonsia, Ecdysanthera, Heligme, Lyonsia, Pottsia, Apocynum, Ectadium, Cryptolepis, Prestonia, Balfouria, Nerium, Strophanthus. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1396 et Ench. p. 294) Mandevilla, Skytanthus, Haemadictyon.

A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 412: trib. Apocynacear. Gen.: Haplophyton, Holarrhena, Alafia?, Isonema, Echaltium?, Christya?, Strophanthus, Nerium, Neriandra, Motandra, Pachypodium, Baissea, Heligme?, Thenardia, Haemadictyon, Prestonia, Chonemorpha, Rhyncospermum, Cercocoma?, Aganosma, Ichnocarpus, Forsteronia, Apocynum, Pottsia, Ecdysanthera, Anodendron, Chavannesia, Robbia, Secondatia, Echites, Laseguea, Dipladenia, Laubertia, Mascarenhasia; Skytanthus?, Tayotum?

Echites*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 181. t. 16. f. 2: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 307; 1764. Gen. ed. VI. p. 117. n. 299; 1767. Syst. ed. XII. p. 190. n. 295. — Jacq. 1763. Amer. p. 29. t. 21—30. — Murr. 1774. Syst. p. 209; 1784. Syst. p. 253. — Reich. 1778. Gen. p. 121. n. 324. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 164. n. 421. — Gmel. 1791. Syst. p. 436. — Pers. 1797. Syst. p. 266. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1237. n. 482. — Ruiz & Pav. 1797. Fl. peruv. II. p. 18. t. 134—136. (reform.) — Roxb. 1819. Corom. III. p. 78. t. 281; 1832. Ind. II. p. 11.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Apocinor.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402. — Batsch 1802. Tab. p. 201. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 12. Ed. Schrank 1819. p. 13. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 631. n. 681. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 649.

Gled. 1764. Syst. p. 198. n. 819: g. Petalostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 155: g. Dicarpiar.

Juss. 1789. Gen. p. 146: g. Apocinear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 425. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 330. — Hedw. 1806. Gen. p. 110. n. 490.

Neck. 1790. El. I. p. 256. n. 408: g. Campylophytor.

Cram. 1803. Disp. p. 175: in Syngenes. Monogam.

Pers. 1805. Ench. I. p. 270. n. 621: g. Apocynear. — Par. R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 59. (Verm. bot. Schr. II. p. 396.) — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 490; 1830. Gen. I. p. 144 n. 722. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 211. (verar.) — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 220. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXX. 386. n. 735. — Link 1821. En. I. p. 204. — Kunth 1823. Syn. II. p. 286. (verar.) — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1038. Sect.: Echites, Aganosma. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII. — Stadelmeyer 1841. Flora I. Beibl. p. 1.

Thunb. 1818. Fl. cap. I. p. 150 (*Echithes*): g. Pentandr. Digyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 161. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 30.

Desfont. 1819. Mém. Mus. V. p. 274. t. 20.

Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3513; 1841. Nom. p. 133. n. 5146: g. Echitear. (Sect. 1841 ex Endl.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Endl. 1838. Gen. n. 3409. p. 583; 1841. Spl. I. p. 1396; 1841. Ench. p. 294. Sect. (1841): Euechites, Chonemorpha, Aganosma, Exothostemon. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. — Meisn. 1840. Gen. p. 264 (173). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 52.
= Echites, Chonemorpha etc. Don.

Echites G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 72: g. Echitiear., disjunctis Chonemorpha, Aganosma et Exothostemone restrictum.

*) Echite Plinio herba, Echites autem lapis.

Echites G. Don cont.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 446: g. Echitear., ulterius emendat. Sect.: Euechites, Orthocaulon, Megasiphon.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 69. t. 278.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.
Synon. Mandevilla Lindl.; Exothostemon Don; Euechites Endl.

Echithes Thunb. vid. *Echites P. Browne.*

Echitieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 72: trib. Apocynear. Gen.: Echites, Chonemorpha, Aganosma, Beaumontia, Pachypodium, Ichnocarpus, Holarrhena, Isonema, Vallaris, Helygia, Parsonsia, Lyonsia, Thenardia, Adenum; Apocynum, Cryptolepis, Exothostemon, Haemadictyon, Cercocoma, Prestonia, Balfouria, Nerium, Strophanthus.

Echitonium Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 230; 1846. Chlor. protog. p. LXXXII: nov. g. Apocinacear. foss.

Echium*) Tourn. 1700. Inst. p. 135. t. 54: g. pl. class. II.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 212. Ed. Hall. 1745. p. 218: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 38. n. 107; 1737. Cliff. p. 43; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 35; 1753. Sp. I. p. 139; 1759. Syst. ed. X. p. 916. n. 175; 1762. Sp. ed. II. p. 199; 1764. Gen. ed. VI. p. 78. n. 191; 1767. Syst. ed. XII. p. 148: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 129. — Murr. 1774. Syst. p. 160; 1784. Syst. p. 189. — Reich. 1778. Gen. p. 80. n. 203. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 103. n. 251. — Lour. 1790. Coch. I. p. 102. — Gmel. 1791. Syst. p. 322. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 33; 1818. Fl. cap. II. p. 6. — Pers. 1797. Syst. p. 195; 1805. Ench. I. p. 163. n. 363. — Willd. 1797. Sp. I. p. 781. n. 286; 1809. En. p. 186.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 513: g. Asperifoliar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 160. — Gis. 1792. Prael. p. 489. — Batsch 1802. Tab. p. 188. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 116. — Schrank 1818. Nov. Act. Leop. IX. p. 110. — Lehm. 1818. Asperif. I. p. 4. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. IV. 9. n. 624. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 113. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 550. n. 587; 1830. Gen. I. p. 124. n. 617. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 2. 30. — Bartl. 1830. Ord. p. 197.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 194. n. 800: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 423.
Adans. 1763. Fam. II. p. 178: g. Borraginum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 122: g. Monopetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 478: g. Borraginear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 130. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 388. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 300. — DC. 1805. Franç. III. p. 621; 1815. V. p. 418. — Hedw. 1806. Gen. p. 89. n. 405. — Link 1821. En. I. p. 170; 1829. Hdb. I. p. 584. — Lois. 1829. Dict. v. 58. p. 266 *(Vipérine).*
Neck. 1790. El. I. p. 289. n. 458: g. Trachytophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 447: g. Echiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2943; 1831. Fl. exc. p. 335. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 356: g. Boraginear. — Par. Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61.
Cham. 1829. Linnaea IV. p. 451: g. Nuculatar.
D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 240: g. Lithospermear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 327. — Koch 1837. Syn. p. 502. Ed. II. p. 577.
= Echium Gärtn. et Lobostemon Lehm.

Echium Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 326. t. 67. f. 7 (creticum).
Buek 1837. Linnaea XI. p. 429.
Kunth 1838. Berol. II. p. 40: g. Boraginear. — Par. Lehm. 1840 in Hook. Fl. bor. am. II. p. 89. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 82. (Sect.: Euechium.) — Decne . . . . in Webb Canar. III. p. 41. — Fres. 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIX. p. 61.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 599: g. Asperifoliar.
Endl. 1839. Gen. n. 3757. p. 647; 1841. Ench. p. 320: g. Anchusear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 56. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 253 *(Vipérine).*
DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 281 (190): g. Echiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 111. n. 4310. — A. DC. 1846. Pr. X. p. 13. Sect.: Trichobasis, Synlobus, Euechium. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 103. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 629. Sect.: Holostigma, Schizostigma.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31: g. Asperifoliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 521: g. Lithospermear.

Echmacantheae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 63: trib. Acanthacear. Gen. ex Echmatacanthis Nees.

*Echmathacantheae**) Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 79: subordo Acanthacear. Trib.: Hygrophileae, Ruellieae, Barlerieae, Acantheae, Aphelandreae, Gendarusseae, Eranthemeae, Dicliptereae, Andrographideae.

Echmatacanthi Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 75: trib. Acanthacear. Subtrib.: Hygrophileae, Ruellieae, Barlerieae, Acantheae, Justicieae, Dicliptereae, Andrographideae. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 698; 1841. Ench. p. 343. Subtrib. eaed.

*) *ἔχις*, vipera. Num a similitudine florum, an seminum (Diosc.) cum capite viperino; an quod contra viperarum ictus valeat? (Beckm. Lex. bot. p. 81.)

*) *ἔχμα*, vinculum, articulus.

Echmatacanthi Nees cont.
— Meisn. 1840. Gen. p. 294 (203). Subtrib. eaed. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. Sect. eaed.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: subordo Acanthacear. Trib.: Hygrophilidae, Ruellidae, Barleridae, Acanthidae, Justiciadae, Dicliptendae, Andrographidae.

Echthronema „Herb." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 161: g. Iridacear.

Echtrus*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 344. Ed. Willd. p. 420: nov. g. Polyandr. Tetragyn. (E. trivialis. — „An Argemone mexicana?" Willd. in adnot.) *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 227.
= Argemone Tourn.

Echyrospermum Schott „1822. Bras. Nachr. II" 1823. Isis p. 1049: nov. g. Leguminosar. (An pro *Achyrospermum?*)

Eckardia „Rchb." Endl. in synon. Peristerae: vid. *seq.*

Eckartia Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 53. n. 2031: g. Vandear. (Nomen *Peristerae Hook.* mutatum ob genus avium.)

Eckebergia Batsch vid. *Ekebergia Sparrm.*

Ecklonea Steud. 1829. Flora I. p. 138: nov. g. Cyperacear.
= Trianoptiles Fenzl.

Ecklonia**) Hornem. 1828. Act. Hafn. III. p. 379: nov. g. Algar. (Fucus buccinalis L.)
Rchb. 1828. Consp. p. 29. n. 511b *(Eklonia)*: g. Laminariacear. — Par. Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 217.
Endl. 1836. Gen. n. 109. p. 10; 1841. Ench. p. 7: g. Fucacear.
Menegh. 1838. Cenni p. 43: g. Laminariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 779. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. p. 93.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 27. n. 105. — J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 144. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 194. — Sond. 1852. Linnaea XXV. p. 666.
Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. 2.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 350; 1849. Sp. Alg. p. 586. n. 397: g. Fucear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Laminaridar.
Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 359: g. Phaeosporear.

Ecklonia Schrad. 1832. Comm. Gott. VII. p. 134: g. Cyperear. (Uncinia spartea Spr.)
Nees 1834. Linnaea IX. p. 299: g. Cladiear.
Kunth 1837. Cyper. p. 287: g. Rhynchosporear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 139.
= Trianoptiles Fenzl.

Eclipta***) Linn. 1771. Mant. II. p. 157. n. 1321: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 647; 1784. Syst. p. 778. — Reich. 1778. Gen. p. 433. n. 1056. — Lour. 1790. Coch. II. p. 505. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 569. n. 1316. — Gmel. 1791. Syst. p. 1255. — Pers. 1797. Syst. p. 820; 1807. Ench. II. p. 470. n. 1895. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2217. n. 1526; 1809. En. p. 916. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 169. — MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 585. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 438.
Scop. 1777. Intr. p. 135: g. Flosculosar.
Juss. 1789. Gen. p. 147: g. Corymbiferar. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 525. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 413.
Neck. 1790. El. I. p. 32. n. 60: g. Actinophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar. — Par. Link 1822. En. II. p. 349.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 245: g. Petalostemonis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 568; 1826. Syst. III. p. 602. n. 2826; 1831. Gen. II. p. 636. n. 3183: g. Radiatar.
Cass. 1819. Dict. v. 14. p. 231; 1825. v. 38. p. 17: g. Rudbeckiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2651. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 264: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 497. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 914. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Less. 1830. Linnaea V. p. 148.
Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 399. 410; 1830. v. 60. p. 577: g. Heliopsidear.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 153: g. Ecliptar.
Less. 1832. Syn. p. 212: g. Ecliptear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 489. Sect.: Eu-eclipta, Plateclipta. — DC. 1837 in E. Meyer Comm. pl. Afr. II. p. 321 *(Eclypta)*. — Endl. 1838. Gen. n. 2446. p. 397; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 268. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3096. Sect. fere ut DC. — Brongn. 1843. En. genr. p. 43. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 512. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 64.
Synon. Eupatoriophalacron Vaill.; Micrelium Forsk.

Ecliptae Lessing 1831. Linnaea VI. p. 153: subtrib. Asteroidear. (Heliantheae Less. 1830.) Gen.: Eclipta, Siegesbeckia, Cryphiospermum.

Eclipteae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 210: subtrib. Asteroidear. Divis.: Diomedeae, Siegesbeckieae, Georgineae, *Eclipteae* (p. 212. Gen.: Eclipta, Blainvillea). — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 488. Gen.: Borrichia, Eclipta, Blainvillea, Salmea, Dahlia, Leptocarpha, Siegesbeckia, Sabazia, Cryphiospermum. — Endl. 1838. Gen. p. 396; 1841. Ench. p. 236. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 182 (125). Gen. ead. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. Gen. ead.

*) „ἐχθρός, odium, inimicitia, ob innumeras spinas, quibus tota planta armata ferit."
**) Dicat. Chr. Fr. Ecklon.
***) ἐκλιπής, deficiens, supervisus. (?)

Eclipteae Lessing cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 81: div. Anthemidear. Gen. ut DC. et Trimetra.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951: div. Senecionidear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 43: subtrib. Asteracear. Gen. ex DC.

Ecliptoides Endl. 1838. Gen. n. 2452 *a*. p. 398; 1841. Ench. p. 237: sect. Sabaziae.

Eclopes*) Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 440. t. 169: nov. g. Radiatar., a Juss. (1806. Ann. Mus. VIII. p. 178) ad Relhaniam reductum.
Cass. 1827. Dict. v. 45. p. 30: subg. Relhaniae. (R. pungens L'Her.)
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 223; 1830. v. 60. p. 579: g. Leyserear.
Less. 1832. Syn. p. 378: g. Relhaniear. Subgen.: Eclopes, Odontophyllum, Rigiophyllum, Nanophyton. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 287. Sect.: Eueclopes, Odontophyllum, Rigiophyllum. — Endl. 1838. Gen. n. 2782. p. 454; 1841. Ench. p. 244. Sect. ut DC. — Meisn. 1839. Gen. p. 220 (138). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3541. Sect. ut Less. excepta ultima. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Fenzl 1839. Flora II. p. 731: g. Osmitear.

Eclopes Lessing 1832. Syn. Compos. p. 378: subg. Eclopis. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3541. 1.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27: g. Gnaphaliear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 38.
= Eueclopes DC.

Eclypta „DC." E. Meyer Comm. pl. Afr. II. p. 321 (g. Eclyptear.): vid. *Eclipta Linn.*

Ecphymacalyx Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plantar.
= Eupterandra Endl.

Ecpomanthera Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plantar. (Nomen.)
= ?

Ectadium**) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 188: nov. g. Echitear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3423. p. 585; 1841. Ench. p. 295. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. — Meisn. 1840. Gen. p. 265 (173). — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5163.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 500: g. Periplocear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.

Ectasis***) D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 156: g. Ericear. normalium. (Erica Plukenetii L.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 826.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 614: subg. Ericae. Sect.: Callicodon, Desmia, Polydesmia, Chromostegia, Eriodesmia, Amphodea, Geissostegia, Gigandra, Pelostoma, Didymanthera. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *a*. p. 1411; 1841. Ench. p. 369. Sect. eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4887. 1. Sect. eaed. (Synactinia loco Didymantherae.)

*) *ἐκλωπίζω*, denudo (?)
**) *ἐκτείνω*, expando; nomen fructui adaptatum.
***) *ἔκτασις*, extensio.

Ecthrus „Lour." Endl. in synon. Argemones: vid. *Echtrus Lour.*

*Ectoangiosporeae**) Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab.: sect. Angiosporear.

Ectobasides Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 486: subdiv. Basidiosporeor. Trib.: Idiomycetes, Aserosmei.

Ectocarpaceae Harvey 1852. Ner. bor. am. I. p. 132: ordo Melanospermear. Subord.: Sphacelarieae, Ectocarpeae.

Ectocarpeae Agardh 1824. Syst. Alg. p. XXX; 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 583: div. Confervoidear. Gen.: Ectocarpus, Sphacelaria, Cladostephus.
Agdh. 1828. Sp. Alg. II. 1. p. 9: ordo Algar. Gen. ut antea et Dasycladus.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 396; 1841. Brit. Alg. p. 4. 36: trib. Melanospermear. Gen.: Sphacelaria, Ectocarpus et 1841 Cladostephus, Myriotrichia.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 148: trib. Phycear. Gen. ut Agdh. 1824.
Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. . . . : trib. Algar. Gen.: Chordaria, Ectocarpus.
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 127: trib. Aplosporear. Gen.: Sphacelaria, Galaxaura, Digenea. — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329 (Flora 1843. p. 93). Gen.: Ectocarpus.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 26: trib. Fucoidear. Gen.: Ectocarpus.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 10: trib. Antheridio-sporear. Gen. id.
Endl. 1843. Spl. III. p. 21: trib. Vaucheriear. Gen.: Leiblinia, Chantransia, Ectocarpus, Bulbochaete.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 93; 1843. Phyc. gener. p. 287: fam. Dermatosiphear. Gen.: Ectocarpus.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 231: fam. Confervinar. Gen.: Ectocarpus, Corticularia, Spongomorpha. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 449. Gen.: Ectocarpus, Corticularia, Spongonema, Tilopteris, Halopteris, Sphacelaria, Stypocaulon, Chaetopteris, Cladostephus, Myriotrichia, Desmotrichum.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 128: div. Hemicarpidear. Gen. ut Agdh. 1824 et Chantransia.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : g. Mesogloeacear. Gen.: Ectocarpus.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 115: subsect. Confervear. Gen.: Chantransia, Ectocarpus, Bulbochaete.
J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 6: ordo Fucoidear. Gen.: Elachista, Myriotrichia, Ectocarpus.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 102: trib. Ectosporear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56: trib. Phycoidear. Gen. ut Endl. 1843 et Chroolepus.
Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 396: fam. Syntamiidear. Gen.: Ectocarpus.

*) *ἐκτός*, externe.

Ectocarpeae Agardh cont.
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 234: fam. Phaeosporear. Gen. id.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 134: subordo Ectocarpacear. Gen. id.
Math. 1853. Belg. II. p. 504: trib. 15 Algar. Gen. id.

Ectocarpidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 22: trib. Vaucheriar. Gen. Ectocarpear. Endl.

Ectocarpus*) Lyngbye 1819. Tent. hydroph. dan. p. 130. t. 42—44: nov. g. Siphonigonator. (Conferva littoralis L.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 445.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 321: g. Ceramidear.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXX. 161; 1828. Spec. II. 1. p. 35: g. Ectocarpear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 396; 1841. Brit. Alg. p. 40; 1852. Ner. bor. am. I. p. 138. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. . . . — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 150; 1842. Pl. cell. Cub. p. 69; 1849 in Orb. Dict. V. p. 204; 1849. ibid. X. p. 56. — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 26; 1848. Sp. Fuc. I. p. 14. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 329. (Flora 1843. p. 93.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 21. n. 71. — Zanard. 1843. Classif. p. 10. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 93; 1843. Phyc. gener. p. 287; 1845. Phyc. germ. p. 231; 1849. Sp. Alg. p. 449. n. 281. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 128. — Menegh. 1846. Alg. ital. Fasc. V. (*Cf.* Kütz. in Bot. Zeit. 1847. p. 170.) — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 116. — Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . — Aresch. 1850. Nov. Act. Upsal. XIV. p. 397. — Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 234. — Math. 1853. Belg. II. p. 504.
Fries 1825. Pl. homon. p. 337: g. Ulvacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 347. n. 3415; 1831. Gen. II. p. 752. n. 3817: g. Confervinar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 85.
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 470: g. Confervear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Ceramidear.
Duby 1832. Mém. soc. Genèv. V. p. 339: g. Ceramiear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 71. p. 6; 1841. Ench. p. 4. — Menegh. 1838. Cenni p. 32. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 710.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 73: g. Myclothamnior.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Ectocarpidar.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 222: g. Ectocarpacear.
Synon. Lyngbya Gaill.; Macrocarpus Bonnem.; Ectocarpus, Capsicarpellae et Pylaiellae sp. Bory; Opospermum et Calospermum Raf.?

Ectocarpus Bory 1825. Dict. class. IV. p. 993.
= Ectocarpi Lyngb. pars.

*) ἐκτός, extra: quoniam capsulae sunt externae.

Ectoclini Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: subdiv. Clinosporeor. Trib.: Sarcopsidei, Coniopsidei.

Ectogloiosporeae Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab.: sect. Gloiosporear.

Ectogymnosporeae Zanardini 1843. Classif. Fic. p. 10: sect. Gymnosporear. Tribus: Laminarieae, Dictyoteae, Zonarieae, Sporochneae, Asperococceae.

Ectolechia Trevisan 1845 (mss.?)
= Sporopodium Mont. (Trevis.)

Ectopogoni Palis. 1805. Prodr. Aéthéog. p. 16: sect. 2da Muscor. Gen.: Fissidens, Cecalyphum, Dicranum, Didymodum, Swartzia, Cynontodium; Trichostomum, Splachnum; Encalypta, Grimmia, Funaria, Lasia; Pterigynandrum, Bryum. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 237. — Par. Palis. 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 439. Gen. ead. et Trematodum, Codriophorus.

Ectosperma Vauch. 1800. Conferv. p. 3: nov. g. Algar. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 238.
Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 5: g. a Conferva L. distinctum. *Cf.* Flora 1821. II. p. 511.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71; 1829. Anal. fam. p. 77: g. Vaucheriacear.
Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 2. p. 517: g. Hydronematear.
Unger 1827. Nov. Act. Leop. XIII. 2. p. 789. (Metamorphosis.)
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 212: g. Bryopsidear. — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 101.
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 472: g. Vaucheriear. Sect.: Botrydium, Vaucheria.
Rchb. 1837. Hdb. p. 136: g. Ectospermear.
Conf. Vaucheria DC.

Ectospermeae Rchb. 1837. Handb. p. 136: subdiv. Vaucheriear.

Ectosporeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 102: subdiv. Trichothallar. Tribus: Draparnaudieae, Chantransieae, Ectocarpeae, Sphacelarieae.

Ectostroma Fries 1819. Novit. fl. Suec. V. p. 80: nov. g. Fungor., Leptostromati simillimum.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 601: g. Xylomaceor. (asporor.) — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 123. (spurior.) — Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 231; 1841. Nom. p. 6. n. 252. (genuinor.) — Endl. 1836. Gen. p. 31; 1841. Ench. p. 19. (asporor.)
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 138: g. Sphaeronemear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 519: g. Strumacear.

Ectotheci Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: subdiv. Thecasporeor. Trib.: Mitrati, Cyathidei.

*) ἐκτός, extra; πώγων, barba.

Ectozoma*) Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 166: nov. g. Solandrear.
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 172: g. Solanear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 537: g. Daturear.

Ectrosia**) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 185. Ed. Nees p. 41: nov. g. Graminear., Chloridi aff. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 94. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 41. 694. n. 335. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 238. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 296. n. 307; 1830. Gen. I. p. 73. n. 355.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 172: g. Chloridear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 151.
Trin. 1820. Fund. p. 165: g. Triandr. Digyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 933: g. Paniceariar.
Bartl. 1830. Ord. p. 30: g. Panicear.
Kunth 1830. Gram. p. 127; 1833. Agrost. p. 390: g. Festucacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 139. 372. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 206. — Steud. 1854. Glum. I. p. 300.
Endl. 1837. Gen. n. 896. p. 101; 1841. Ench. p. 59: g. Bromear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 425 (325). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 164.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1407: g. Cynosurear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.

Eddya***) Torrey & Gray 1857. Rep. bot. exp. capt. Pope p. 18: nov. g. Borraginear., Tiquiliae aff. (E. hispidissima.) *Cf.* Flora 1858. p. 625 et Müll. Ann. bot. V. p. 538.

Edechi Löfling 1758. Iter hisp. p. 259. 271.
= Guettardaria DC.

Edgeworthia Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 330 (242); 1841. Regensb. Denkschr. III. p. 280: nov. g. Daphnear. (Daphne Gardneri Wall.) — Par. C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. p. 356. — Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 542. (diplostemonear.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531 *(Edgworthia)*: g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 66. n. $2106/_1$: g. Euthymelear.

Edgeworthia Falcon. 1842. Linn. Trans. XIX. p. 99; . . . . Ann. and Mag. X. p. 362: nov. g. Theophrastear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 80. n. $4230/_1$.
= Monotheca A. DC.

Edgworthia Lindl. vid. *Edgeworthia Meisn.*

Edmondia Cassini 1818. Bull. soc. philom. Mai p. 75: nov. g. Inulear. (Xeranthemum sesamoides L.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 140.
Cass. 1819. Dict. v. 14. p. 252; 1822. v. 23. p. 562: g. Gnaphaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2427. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 206.

Edmondia Cassini cont.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224: g. Helichrysear.
Less. 1832. Syn. p. 321: subg. Helichrysi.
DC. 1837. Pr. VI. p. 214: sect. Helipteri. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2742 c. p. 447; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3489. 3.
Synon. Xeranthemum Neck.; Aphelexis Don.

Edmonstonia „Seemann 1853. Fl. panam. p. 98" Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 438: nov. g. Samydear.
= Tetrathylacium Pöpp.

Edosmia*) „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 612: g. Amminear. (Ataenia Gardneri Hook. & Arn.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 358. — Walp. 1846. Rep. V. p. 862.
Synon. Ataenia Hook. & Arn.; Atenia Endl.

Edraiantha**) A. DC. 1830. Mon. Campan. p. 129: sect. Wahlenbergiae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 738. — Endl. 1838. Gen. p. 516. n. 3079 *a.*
= *seq.*

Edraianthus A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 448: g. Wahlenbergiear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 31.
Meisn. 1839. Comm. p. 149: g. Lightfootiear.
Endl. 1841. Ench. p. 266. n. $3081/_1$: g. Prismatocarpear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691.
Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4042: g. Roëllear.
Koch 1844. Syn. ed. II. p. 543: g. Campanulacear.
Synon. Edraiantha A. DC.; Hedraeantha Griseb.; Campanulae sp. Auct.

Edrissa Rafin. 1820. Ann. sc. gen.
= Panetos Raf. (Endl. Spl. II. p. 53.)

Eductulosae Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. . . . : div. 2 Acotyledonum.
= Cellulares DC.

Edusaron Medic. (Vorles. II. p. 371); 1789. Vorles. IV. 1. p. 352; 1789. Phil. Bot. I. p. 209: nov. g. ex typo Hedysari canariensis L.
= Chalarium DC.

Edwardia Rafin. 1814. Specch. I. p. 158.
= Sterculiae sect. Cola Schott & Endl.

Edwardsia***) Salisb. 1805. Linn. Trans. IX. p. 298.
R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 1 (Verm. bot. Schr. II. p. 450): g. Leguminosar. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 255. — Link 1821. En. I. p. 400. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 349. n. 1645; 1830. Gen. I. p. 364. n. 1837. (Decandr. Monogyn.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1580. 1502. — Hook. 1853. N. Zeal. I. p. 51.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 742: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 131.

---

*) *ζῶμα*, subligaculum.
**) *ἔκτρωσις*, abortus.
***) Dicat. Casp. Wistar Eddy, botanico.

*) *ἡδύς*, suavis.
**) *ἑδραῖος*, sessilis.
***) Dicat. Sydenham Edwards, botanico.

Edwardsia Salisb. cont.
— DC. 1825. Pr. II. p. 97. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4089; 1841. Nom. p. 154. n. 6044. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40 *(Edwarsia)*. — Bartl. 1830. Ord. p. 408. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 111. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 161. — Meisn. 1837. Gen. p. 80 (57). — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 86. — Endl. 1841. Gen. n. 6737. p. 1308; 1841. Ench. p. 673. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 131. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 585.
Link 1831. Hdb. II. p. 146: g. Sophoracear.

Edwardsia „Neck." Endl. in synon. Bidentis vid. *Edwarsia Neck.*

Edwarsia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 187. n. 157: nov. g. Siphoniphytor.
= Bidentis Linn. pars.

Edwarsia Dumort. vid. *Edwardsia Salisb.*

Egania Rémy 1849 in Gay Fl. Chil. III. p. 324. t. 36. f. 1: nov. g. Mutisiacear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 992.

Egenolfia Fée vid. *seq.*

Egenolphia Schott 1834. Gen. Fil. Fasc. IV. t. 1: nov. g. Filicum. (Polybotrya marginata Blume.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 48 *(Egenolfia)*: g. Acrostichear. Sect.: Euegenolfia, Granulina.
Synon. Lacaussadea Gaudich.

Egeria Neraud 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 28: g. Rubiacear. (Nomen.) *Cf.* Endl. 1838. Gen. p. 566; 1841. Ench. p. 275. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 2995.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonacear.

Egeria Planchon 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 79: nov. g. Hydrocharidear. (E. densa et Naias.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 509: g. Hydrocharacear.

Egletes*) Cassini 1817. Bull. soc. philom. Oct. p. 153; 1819. Dict. v. 14. p. 265: nov. g. Inulear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139.
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 566: g. Buphthalmear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2479. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224: g. Pyrardear.
Cass. 1830. Dict. v. 60. p. 581: g. Grangeinear.
Less. 1832. Syn. p. 252: g. Chrysanthemear., injuncto Xerobio emendat. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 42. — Endl. 1838. Gen. n. 2659. p. 432; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 210 (134). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 411. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3078. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 276: g. Pyrethrear.
Synon. Xerobius Cass.; Eyselia Rchb.; Matricariae sp. Sw.; Pyrethri sp. Willd.

*) αἰγλήτης, fulminans. (?)

Ehrartha Palis., Harv. vid. ***Ehrharta Thunb.***

Ehrenbergia Spreng. 1821. Neue Entd. II. p. 129; 1825. Syst. II. p. 133. n. 1318: nov. g. Sapotear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3646: g. Mimusopear.?
Meisn. 1838. Comm. p. 112: g. Rubiacear.? anomalum.
= Amaioua Aubl. (Spreng. Gen. I. p. 242.) *Cf.* Meisn. Comm. p. 77 sub Melanopsidio.

Ehrenbergia*) Martius 1827. Nov. gen. II. p. 72. t. 163: nov. g. Zygophyllear. (E. tribuloides.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 369. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 769. (verar.) — Meisn. 1837. Gen. p. 59 (43).
Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5193; 1837. Hdb. p. 285: g. Tribulear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 391. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 305.
= Kallströmia Scop.

Ehretia**) P. Browne 1756. Jamaic. p. 168. t. 16. f. 1: nov. g. Pentandr. Monogyn.
Adans. 1763. Fam. II. p. 177: g. Borraginum.
Scop. 1777. Intr. p. 158: g. Asperifoliar. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 647. n. 707; 1830. Gen. I. p. 135. n. 673.
Neck. 1790. El. I. p. 274. n. 432: g. Trachytophytor.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 497. Ed. Nees p. 353: g. Boraginear. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 64. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. L. 527. n. 812. — Kunth 1823. Syn. II. p. 189. — D. Don 1825. Nepal. p. 102. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 160.
Mart. 1827. Nov. gen. II. 2. p. 138: g. Ehretiacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 388.
Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. t. 1097: g. Cordiacear. (E. serrata.)
Bartl. 1830. Ord. p. 197: g. Tournefortiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 112. n. 4370. — Endl. 1839. Gen. n. 3743. p. 645; 1841. Ench. p. 320. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 32. — A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 657. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 55.
Synon. Euehretia DC.

Ehretia Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 936. 1363. n. 1119; 1762. Sp. ed. II. p. 274; 1764. Gen. ed. VI. p. 102. n. 257; 1767. Syst. ed. XII. p. 176. n. 256: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 192; 1784. Syst. p. 230. — Reich. 1778. Gen. p. 105. n. 278. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 139. n. 352. — Gmel. 1791. Syst. p. 393. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 41. t. 55—57; 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 340; ed. 1832. I. p. 596. — Pers. 1797. Syst. p. 240; 1805. Ench. I. p. 166. n. 370. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1077. n. 397; 1809. En. p. 248.

*) Dicat. Dr. C. G. Ehrenberg, de fungorum historia optime merito.
**) Dicat. G. Dionysio Ehret.

Ehretia Linn. cont.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 128. — Duchesne 1804. Dict. v. 6. p. 24 *(Cabrillet)*. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 296. — Hedw. 1806. Gen. p. 118. n. 519. — Link 1821. En. I. p. 161. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 841.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Asperifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 489. — Batsch 1802. Tab. p. 188. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 629.

Gled. 1764. Syst. p. 212. n. 885: g. Petalostemonum.

Hill 1769. Ht. kew. p. 440 *(Erhetia)*: g. Arborum.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 382: g. Sebestenar.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 464: g. Convolvulear.

Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2985: g. Hydrophyllear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Ehretiear. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 502. Sect.: Euehretia, Bourreria, Carmona, Xeroderma. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 919. Sect. genuinae, Bourreria, Carmona.

Meisn. 1840. Gen. p. 278 (186): g. Tournefortiear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653: g. Tournefortear.

Synon. Ehretia et Bourreria P. Browne; Ehretia et Beurreria Jacq., Kunth; Lutrostylis G. Don.

Ehretiaceae Schrad. 1820. Diss. Asperif. p. 20.

Mart. 1827. Nov. gen. II. 2. p. 138. Gen.: Ehretia, Tournefortia (cum Messerschmidia), Rhabdia, Beurreria.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (224) Monopetalar.

Lindl. 1833. Nix. p. 29; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 273; 1847. Veg. kd. p. 653: ordo Echialium. Trib.: Tournefortеae, Heliotropeae.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 387: trib. Cordiacear. Gen.: Ehretia, Beurreria, Cortesia, Carmona, Lutrostylis, Rhabdia, Morelosia.

Endl. 1839. Gen. p. 645; 1841. Ench. p. 320: subordo Asperifoliar. Trib.: Tournefortieae, Heliotropeae.

Meisn. 1840. Gen. p. 278 (186): ordo Tubiflorar. Trib. ut Endl.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31. 43: trib. Borraginear. Sect. ut Endl.

Ehretieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: trib. Cordiacear. Gen.: Tournefortia, Ehretia, Messerschmidia, Rhabdia. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 919. Gen.: Ehretia.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 273.

A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 657: trib. Asperifoliear. Subtrib.: Tournefortieae, Heliotropieae.

DC. 1845. Pr. IX. p. 502: trib. Borraginear. Gen.: Ehretia, Menais, Rhabdia, Cortesia, Amerina, Tournefortia, Rotula?

Ehrhardia Scopoli 1777. Introd. p. 107. n. 277: g. Strictar.

= Aiouea Aubl.

Ehrhardta Hedw. vid. *seq.*

Ehrharta*) Thunb. 1779. Vetensk. Ac. Handl. p. 216. t. 8; 1781. Nov. gen. I. p. 16; 1794. Prodr. I. p. 66; 1818. Fl. cap. II. p. 335: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 28. n. 1383. — Murr. 1784. Syst. p. 327. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 236. n. 608. — Gmel. 1791. Syst. p. 549. — Pers. 1797. Syst. p. 347; 1805. Ench. I. p. 393. n. 872. — Willd. 1799. Sp. II. p. 246. n. 694; 1809. En. p. 396.

Linn. f. 1779. Gram. gen. Ed. 1790. (Amoen. ac. X.) p. 34: g. Graminum. (paniculator.) — Par. Gis. 1792. Prael. p. 136. — Link 1821. En. I. p. 304.

Juss. 1789. Gen. p. 32 *(Erharta)*: g. Graminear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 87 *(Erharta)*. — Hedw. 1806. Gen. p. 247. n. 1005 *(Ehrhardta)*. — Palis. 1812. Agrost. p. 60 *(Ehrartha)*. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 268. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 114. n. 1285; 1830. Gen. I. p. 245. n. 1282. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 146. t. 24. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 288.

Neck. 1790. El. III. p. 235. n. 1623: g. Achyrophytor.

Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 65: g. Thalamostemonis.

Swartz 1802. Linn. Trans. VI. p. 40. t. 3. 4.

Cram. 1803. Disp. (p. 25 in Triandr. Digyn. et) p. 79 in Hexandr. Digyn. (E. panicea, calycina.) — Par. Trin. 1820. Fund. p. 198.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74; 1830. Gram. p. 9; 1833. Agrost. p. 11: g. Oryzear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 181. — Agdh. 1823. Aphor. p. 152. — Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 960; 1841. Nom. p. 36. n. 1257. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXXVII. 1366. — Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Endl. 1836. Gen. n. 736. p. 79; 1841. Ench. p. 56. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 374 *(Ehrartha)*. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 131. 232. — Meisn. 1843. Gen. p. 414 (317). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 11. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 158. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 5.

Schrad. 1821. Gött. gel. Anz. Nr. 208. p. 2076. (Revisio crit.)

Link 1827. Hort. I. p. 233: g. Ehrhartinar.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Oryzacear.

Trin. 1839. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. Bot. p. 58: g. Phalarideor.

Synon. Trochera Rich.; Airae sp. Linn.; Melicae sp. Thunb.

*) Dicat. Ehrhart, Helveto.

Ehrhartia*) Wiggers 1780. Prim. fl. Holsat. p. 63: nov. g. Gynandr. Triandr. (Phalaris oryzoides L.)
= Leersia Sol.

Ehrhartinae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 233: fam. Graminear. Gen.: Ehrharta.

Eichhornia**) Kunth 1842. Diss. (Berol.); 1843. Enum. IV. p. 129: nov. g. Pontederiacear. (Pontederia azurea Sw. etc.) — Par. Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 89.
Endl. 1843. Spl. III. p. 59. n. 1088/$_1$: g. Pontederacear. (antea Pontederiae sect. *b.* Pontederia.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 206.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 393: g. Pontederear.

Eichwaldia***) Ledeb. 1831 in Eichw. Fl. Casp. Cauc. p. 38. t. 34.
Endl. 1840. Gen. n. 5481. p. 1038; 1841. Ench. p. 542: g. Reaumuriacear. — Par. Ledeb. 1844. Ross. II. p. 138. — Walp. 1846. Rep. V. p. 808. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 407.
Rchb. 1841. Nom. p. 166. n. 6468: g. Reaumuriear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 357.

Eicosia Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VII: g. Orchidear. (Nomen absque synonymia.)

Eilemanthus†) Hochstett. 1846. Flora II. p. 593: nov. g. Genistear.?, an Galegear.? — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 224.

Einomeia Rafin. 1828. Med. Flora I. Nr. 10: nov. g. ab Aristolochia sejunctum. *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 7 et IX. Litt. p. 98.
Rchb. 1837. Hdb. p. 173: g. Pistolochiear.
Meisn. 1841. Gen. p. 334 (246) [*Einomenia*]: sect. Aristolochiae.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 560 (*Enomeia*): g. Aristolochiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2579 (*Einomeria*).

Einomenia „Rafin." Endl., Meisn. vid. *praeced.*

Einomeria Rchb. vid. *praeced.*

Eisenmannia Schultz Bip. (Flora 1842. I. Beibl. p. 134.)
= Blainvillea Cass.

Eisothea††) DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 91; 1825. Prodr. II. p. 121: sect. Priestleyae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4045 *a.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 132.
Synon. Isothea Endl.

Eizaguirrea Rémy 1849 in Gay Fl. Chil. III. p. 401: nov. g. ex typo Leuceriae floribundae DC.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 996: g. Nassauviacear.

Ekebergia†††) Sparrm. 1779. Vetensk. Ac. Handl. p. 282. t. 9: nov. g. Decandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1782. Nov. gen. II. p. 43; 1794. Prodr. I. p. 79. — Murr. 1784. Syst. p. 399. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 284. n. 719. — Gmel. 1791. Syst. p. 680. — Pers. 1797. Syst. p. 427. — Willd. 1799. Sp. II. p. 549. n. 835. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 391.
Juss. 1789. Gen. p. 265: g. Meliar.
Neck. 1790. El. II. p. 439. n. 1271: g. Comizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 53 (*Eckebergia*): g. Hesperidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 45: g. Meliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 303. n. 1201. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 277. — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 519. — Bartl. 1830. Ord. p. 356. — Brongn. 1843. En. genr. p. 86. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 220.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 685; 1826. Syst. III. p. 69. n. 2392; 1831. Gen. II. p. 543. n. 2662: g. Meliear. (Monadelph. Decandr.)
DC. 1824. Pr. I. p. 623: g. Trichiliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 212. n. 5513; 1841. Nom. p. 212. n. 8074. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 233. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 683. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 191. — Meisn. 1837. Gen. p. 49 (36). — Endl. 1840. Gen. n. 5538. p. 1051; 1841. Ench. p. 551. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 86. 109. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Heyneear.

Eklonia Rchb. vid. *Ecklonia Hornem.*

Elachanthus F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 410: nov. g. Compositar., Pteropogoni aff. (E. pusillus.)

Elachia*) DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 256: nov. g. Compositar. dubium. (An Mutisiacea aff. Chaetantherae? An Senecionea aff. Madaracti?) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3032/$_3$. p. 1389; 1841. Ench. p. 251.
Meisn. 1839. Gen. p. 215 (136): g. Eusenecionear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3370: g. Senecionear. genuinar.?
Decne . . . . in Deless. Ic. sel. IV. t. 99.
Rémy 1849 in Gay Fl. chil. III. p. 313; 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 178: g. Mutisiacear.

Elachista**) Fries 1835. Fl. scan. p. 316.
Endl. 1843. Spl. III. p. 23. n. 80 *b*: sect. Myrionematis.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 124: g. Myrionemear. — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 103.
Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 377: g. Chordariear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 178.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : g. Stilophorear.
J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 7: g. Ectocarpear. (*Myriactis* et *Phycophila Kütz*, *Elachista* et *Areschougia Men.*)
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 131: g. Chordariacear.

---

*) Dicat. F. Ehrharto, Helveto.
**) Dicat. F. Eichhorn, Berol.
***) Dicat. Ed. M. Eichwald, prof. Wilnensi.
†) εἴλημα, involucrum s. bractea.
††) εἴσος s. ἴσος, aequalis.
†††) Dicat. Car. Gust. Ekeberg.

*) ἐλαχύς, parvus.
**) ἐλάχιστος, minimus, brevissimus.

Elachista „Duby Bot. gall. II. p. 972" Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 265; 1849. Sp. Alg. p. 540. n. 348: g. Mesogloeacear.
= Elachistea Duby.

Elachista Areschoug 1842. Linnaea XVI. p. 231: g. tribus propriae, Chordarieis aff. (E. stellaris, curta, breviarticulata, etc.)
= Phycophila Kütz.

Elachistea Duby 1832. Mém. soc. Genèv. V. p. 339: g. Ceramiear. (Conferva scutulata E. B.) *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 221. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 60. p. 5; Ench. p. 4. — Menegh. 1838. Cenni p. 31. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 697.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56: g. Chordariear.
Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 236: g. Myrionemear.
Synon. Elachista Kütz.

Elachocroton „F. Müll. 1857. Hook. journ. p. 17" Baillon 1858. Euphorb. p. 517: sect. Stillingiae.

Elachothamnos*) DC. 1836. Prodr. V. p. 398: nov. g. Euconyzear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2408. p. 390; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 190 (128).
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3585: g. Conyzear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.

Elachothamnus Wittst. Etym. Handw. p. 315: vid. *praeced.*

Elaeachnus Burm. vid. *Elaeagnus Tourn.*

Eleagia Weddell 1849. Hist. d. Quinq. p. 94: nov. g. Cinchonear. (E. utilis et Mariae.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 777: g. Rondeletiear.

Elaeagnaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 194) 1847. Veg. kingd. p. 257: ordo Amentalium. Gen.: Shepherdia, Hippophaë, Conuleum, Elaeagnus.
Schltd. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 606: ordo (168) Monochlamydear. Gen. ead. et Octarillum? Aextoxicon?

Elaeagneae Batsch 1802. Tab. affin. p. 183: fam. Nuciferar. Gen.: Thesium, Quinchamalium, Osyris, Fusanus, Hippophaë, Elaeagnus, Nissa, Conocarpus; Bucida, Terminalia, Chuncoa.
DC. 1805. Franç. III. p. 351: fam. (29) Dicotyledonum. Gen.: Thesium, Osyris, Hippophaë, Elaeagnus.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 350.
Juss. 1819. Dict. v. 14. p. 296: ordo Peristaminear. Gen.: Elaeagnus, Hippophaë.
DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Monochlamydear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 623. Ed. II. p. 719. Gen. ut Juss.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 264: fam. Monochlamydear. Gen.: Hippophaë.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 55: fam. Fructitegmiae.

*) ἐλαχύς, parvus; θάμνος, frutex.

Elaeagneae Batsch cont.
A. Rich. 1823. Mém. soc. h. n. Par. I. p. 374.
Agdh. 1826. Aphor. p. 231; 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 586: ordo Epichlamydear. Gen. §. 1: Elaeagnus. §. 2: Hippophaë, Shepherdia, Conuleum.
Rchb. 1828. Consp. p. 80: div. Santalear. Gen. ut Agdh.
Link 1829. Hdb. I. p. 374: ordo (9) Perigoniatar. Gen. ut Juss.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (59) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 113: ordo (79) Proteinar. Gen. ut Agdh.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 162: div. Proteacear. Gen. ut Juss. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 169; 1841. Nom. p. 64. Gen. ut 1828.
Lindl. 1833. Nix. p. 23: ordo Daphnalium.
Endl. 1838. Gen. p. 333; 1841. Ench. p. 211: ordo Thymelaear. Gen. ut Agdh.
Meisn. 1841. Gen. p. 329 (241): ordo Daphnoidear. Gen. ead.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 453: fam. (171) Proteinear. Gen. ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 222. Gen. ead.

Elaeagni Adans. 1763. Fam. II. p. 77: fam. 12 plant. Gen.: Elaeagnus, Hippophaë, Osyris, Tupelo, Tsjerucaniram, Viscum, Horau, Chytralia, Bucida, Rudbeckia, Thesium, Limnopeuce, Cynomorium, Ceratocarpus, Cynocrambe, Nux.
Juss. 1789. Gen. p. 74: ordo 1 class. VI. Gen. §. 1: Thesium, Quinchamalium, Osyris, Fusanus, Hippophaë, Elaeagnus, Nyssa, Conocarpus. §. 2: Bucida, Terminalia, Chuncoa, Pamea, Tanibouca. (*Cf. Osyrideae Juss.*)
Cass. 1810. Nat. Fam. p. 114.

Elaeagnideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 18. (*Eleagnideae*).
= Elaeagnaceae Lindl.

Elaeagnoidae Link 1822. En. II. p. 422.
= Elaeagneae R. Brown.

Elaeagnoideae Vent. 1799. Tabl. II. p. 232: ordo 1 class. VI. Gen.: Thesium, Osiris, Hippophaë, Elaeagnus, Nyssa.

Elaeagnus*) Tourn. 1703. Coroll. p. 53. t. 489: g. pl. class. XX.
Linn. 1737. Gen. p. 31. n. 84; 1737. Cliff. p. 38; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 31; 1753. Sp. I. p. 121; 1759. Syst. ed. X. p. 899. n. 148; 1762. Sp. ed. II. p. 176; 1764. Gen. ed. VI. p. 62. n. 159; 1767. Syst. ed. XII. p. 127: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 137; 1784. Syst. p. 163. — Reich. 1778. Gen. p. 64. n. 168. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 85. n. 213. — Lour. 1790. Coch. I. p. 89. — Gmel. 1791. Syst. p. 275 (*Elaeagrus*). — Pers. 1797. Syst. p. 169; 1805. Ench. I. p. 148. n. 317. — Willd. 1797. Sp. I. p. 688. n. 249; 1809. En. p. 169. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 97. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 823. —

*) Nomen ex Theophrasto; ἐλαία, oliva et ἄγνος, vitex.

Elaeagnus Tourn. cont.
Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 459; ed. 1832. I. p. 439. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 547.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 92. t. 39 (*Elaeachnus*).
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Thymelear. — Par. Ledeb. 1829. Alt. I. p. 153.
Adans. 1763. Fam. II. p. 80: g. Elaeagnor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 75. — Hedw. 1806. Gen. p. 79. 368.
Gled. 1764. Syst. p. 162. n. 1084: g. Calycostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 369 (p. 440 *Eleagnus*): g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 101: g. Disparium et p. 269 denuo inter Polyandras.
Pallas 1789. Fl. Ross. I. 1. p. 23. 25 (ubique *Elaeagrus*).
Neck. 1790. El. III. p. 111. n. 1442: g. Daphonophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 638: g. Petalostemonis.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 234: g. Elaeagnoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 183: g. Elaeagnear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 354. — Lois. 1817. Dict. v. 8. p. 71 (*Chalef*). — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 31. 478. n. 582. — Juss. 1819. Dict. v. 14. p. 296. — Link 1821. En. I. p. 111; 1829. Hdb. I. p. 274. — A. Rich. 1823. Mém. soc. h. n. Par. I. p. 381. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 637. — D. Don 1825. Nepal. p. 67. — Agdh. 1826. Aphor. p. 231. — Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1715; 1831. Fl. exc. p. 163; 1841. Nom. p. 64. n. 2423. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 112. n. 563. — Bartl. 1830. Ord. p. 114. — Koch 1837. Syn. p. 624. Ed. II. p. 719. — Endl. 1838. Gen. n. 2115. p. 334; 1841. Ench. p. 212. — Meisn. 1841. Gen. p. 329 (242). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 454. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 319. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 551. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 69. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 979.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 203. t. 216.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 176: g. Eleagnor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 327; 1825. Syst. I. p. 488. n. 535: g. Thymelaear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18 (*Eleagnus*): g. Eleagnidear.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 194; 1847. Veg. kd. p. 257: g. Elaeagnacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. III. p. 372 (*Chalef*). — Schltd. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 608.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 121 (*Eleagnus*): g. Eleagnear.

Elaeagrus Pall., Gmel. vid. *praeced.*

Elaeis*) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 280. t. 172 (Ed. picta t. 257): nov. g. Palmar. (E. guineensis.) — Par. Murr. 1784. Syst. p. 985. — Gis. 1792. Prael. p. 40. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 137. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 95. — Spreng. 1825. Syst. II. p 141. n. 1350; 1830. Gen. I. p. 285. n. 1478. — Link 1829. Hdb. I. p. 259. — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1204.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 17. t. 6. f. 2.
Neck. 1790. El. III. p. 303. n. 1700: g. Pocilmophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 568: g. Hexandr. Monogyn.
Mart. 1824. Gen. Palm. bras. fasc. III. p. 61. t. 54—56; 1824. Palm. fam. p. 18: g. Cocoinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 71. n. 1624; 1841. Nom. p. 58. n. 2274. — Endl. 1837. Gen. n. 1771. p. 255; 1841. Ench. p. 136. — Kunth 1841. Enum. III. p. 278. — Meisn. 1842. Gen. p. 357 (267).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Cocoinear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 16. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 121.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Cocoëar.
Synon. Elais Linn.; Alfonsia HBK.

Elaeobalanus Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 24. n. 1845 *A. II:* sect. Esculi. (Quercus olivaeformis et macrocarpa Michx.) = Cerroides Spach.

Elaeocarpaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 97.
C. Müll. 1849. Adnot. de fam. Elaeocarp.: fam. Legnotideis peraffinis, e Tiliaceis excludenda. *Cf.* Griseb. Jahresber. p. 320. = seq.

Elaeocarpeae Juss. 1808. Ann. Mus. XI. p. 223. *Cf.* Link 1831. Hdb. II. p. 348.
DC. 1819. Théor. élém. p. 244; 1824. Pr. I. p. 519: ordo (28) Thalamiflorar. Gen.: Elaeocarpus, Aceratium, Dicera, Friesia, Vallea, Tricuspidaria, Decadia? — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 558. Gen. ut DC. et Acronodia.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: fam. Thalamisertiae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: div. Tiliacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. (1832. Fl. exc. p. 828.) Gen.: Friesia, Vallea, Dicera, Elaeocarpus et 1828 Tricuspidaria, Ageratium, Acronodia; Vateria. — Bartl. 1830. Ord. p. 340. Gen. ut DC. et Acronodia, Vateria? — Rchb. 1837. Hdb. p. 303; 1841. Nom. p. 209. Subdivis.: *genuinae* (gen. (1837): Elaeocarpus, Vallea, Mollia, Tricuspidaria, Aceratium, Monocera et 1841 Beythea; Tricuspidarieae), Aristotelieae, Friesieae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 46: fam. Malvariear. Gen. Candolleana 4 prima.
Lindl. 1833. Nix. p. 20: ordo Malvalium.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4. 44: trib. Tiliacear. Gen. ut DC. (Acronodia loco Decadiae.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 39 (29). Gen. ut DC. et Acronodia, Monocera, Euthemis?, Vateria?, Crinodendron?, Dicalyx?

*) „Nomen genericum ab oleo imposui“.

Elaeocarpeae Juss. cont.
Endl. 1840. Gen. p. 1011; 1841. Ench. p. 523: subordo Tiliacear. Tribus: *verae* (gen.: Elaeocarpus, Monocera, Beythea; Friesia?, Acronodia?), Tricuspidarieae. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372. Gen. Endlicheriana.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 583: subfam. Tiliacear. Trib.: *verae* (gen. ut Endl.), Cuspidarieae.

Elaeocarpinae Link 1822. Enum. II. p. 73.
= praeced.

Elaeocarpus Linn. 1747. Amoen. ac. I. p. 129; 1747. Fl. zeyl. p. 92. n. 206 (Nov. gen. zeyl. p. 10. n. 1057); 1753. Sp. I. p. 515; 1759. Syst. ed. X. p. 1075. n. 589; 1762. Sp. ed. II. p. 734; 1764. Gen. ed. VI. p. 268. n. 663; 1767. Syst. ed. XII. p. 363: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 410; 1784. Syst. p. 494. — Reich. 1778. Gen. p. 272. n. 719. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 356. n. 898. — Lour. 1790. Coch. I. p. 338. — Gmel. 1791. Syst. p. 816. — Pers. 1797. Syst. p. 529. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1169. n. 1035. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 592.
Gled. 1764. Syst. p. 113. n. 468: g. Thalamostemonum.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 202. t. 43. f. 3 (oblonga).
Juss. 1789. Gen. p. 258: g. Guttiferis et Aurantiis aff. — Simil. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 31.
Neck. 1790. El. II. p. 271. n. 1028: g. Catizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar. et p. 90 denuo inter Guttaeferas.
Cram. 1803. Disp. p. 90: in Octandr. Monogyn.
Pers. 1807. Ench. II. p. 69. n. 1289: g. Guttiferar.
Juss. 1808. Ann. Mus. XI. p. 223: g. Elaeocarpear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 519 (quoad characterem, exclusis speciebus, ab Endl. ad Monoceram Jack relatum). — Spreng. 1825. Syst. II. p. 449. n. 1752; 1830. Gen. I. p. 392. n. 1968. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5430; 1837. Hdb. p. 304; 1841. Nom. p. 209. n. 7937. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 340. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 559. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 82. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 44. — Meisn. 1837. Gen. p. 39 (29). — Endl. 1840. Gen. n. 5384. p. 1011; 1841. Ench. p. 523. (verar.) Sect.: Elaeocarpus, Ganitrus. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 19. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 32. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 331.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 820: g. Tiliacear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 133 (*Ganitre*). — A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 67.
Link 1822. En. II. p. 73: g. Elaeocarpinar.
Synon. Elaiocarpos Burm.; Perinkara Adans.; Lochneria Scop.; Adenodus Lour.?; Aceratium DC.; Ageratium Rchb.; Eriostemum Colla. (Steud.)

Elaeocharis Juss., Brongn. vid. *Eleocharis.*

Elaeochytris*) Fenzl 1843 in Russegg. Reise I. p. 951. t. 19.
Endl. 1843. Spl. III. p. 82. n. $4430/_1$: g. Seselinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.
= Eupeucedanum DC.

Elaeococca „Comm." A. Juss. 1824. Euphorb. p. 38. t. 11; 1849 in Orb. Dict. V. p. 223: nov. g. Euphorbiacear. *Cf.* Ann. sc. nat. I. 1824. p. 156. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 545 (*Elaeococcus*). — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 315 (*Elaeococcos*).
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 618: g. Crotonear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5804. p. 1114; 1841. Ench. p. 588. — Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7398. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 884. n. 3140; 1831. Gen. II. p. 698. n. 3524: g. Tricoccar.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5062: g. Ricinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Crozophorear.
Meisn. 1841. Gen. p. 341 (253): g. Jatrophear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 318: g. Jatrophidear.
= Dryandra Thunb.

Elaeococcos Wittst. vid. *praeced.*

Elaeococcus Steud. vid. *praeced.*

Elaeodendreae Endl. 1840. Gen. p. 1087; 1841. Ench. p. 575: trib. Celastrinear. Gen.: Ptelidium, Wimmeria, Frauenhofera, Pleurostylia, Hartogia, Elaeodendron, Myginda, Oreophila (1841 Pachystima). Gen. dubia: Carpodetus, Blesa, Actegiton, Tralliana, Lepta, Goupia, Perrottetia, Alzatea. Accedit 1850 (Spl. V. p. 83) Schäffera. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. III. p. 252. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 208: subdiv. Celastrear. Gen. ut Endl. (excepta Alzatea.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588: trib. Celastracear. Gen. ut Endl. (excepto Carpodeto.)

Elaeodendron Jacq. f. 1787. Nov. Act. Helv. I. p. 36 (jam 1780 communicat.): nov. g. plant.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 662; 1825. Syst. I. p. 779. n. 854; 1830. Gen. I. p. 182. n. 923: g. Rhamnear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 819.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXVIII. 344. n. 966: g. Pentandr. Monogyn.
Link 1821. En. I. p. 229: g. Rhamnoidear.
DC. 1825. Pr. II. p. 10: g. Evonymear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Meisn. 1837. Gen. p. 69 (49). — Rchb. 1837. Hdb. p. 301.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI: g. Celastrinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 379. — Endl. 1833. Norf. p. 81. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 156. — Spach

*) χυτρίς, olla parva.

Elaeodendron Jacq. cont.
1834. Vég. phan. II. p. 403. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 88. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 342.
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5394: g. Celastrear.
Endl. 1840. Gen. n. 5688. p. 1088; 1841. Ench. p. 575: g. Elaeodendrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7896. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588. — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 107.
Synon. Elaeodendrum Murr.; Rubentia Comm.; Schrebera Retz.; Portenschlagia Tratt.; Neerija Roxb.; Parilia Dennst.; Lamarckia Hort.; Elaeodendrum, Scytophyllum, Lauridia, Mystroxylon et Crocoxylon Eckl. & Zeyh.; Nerija Steud.

Elaeodendrum Murray 1784. Syst. p. 241: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 152. n. 385. — Gmel. 1791. Syst. p. 417. — Pers. 1797. Syst. p. 253; 1805. Ench. I. p. 241. n. 535. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1148. n. 438; 1809. En. p. 261. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 431; ed. 1832. I. p. 638.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 274. t. 57. f. 5 (indicum).
Vent. 1799. Tabl. III. p. 466: g. Rhamnoidear.
Hedw. 1806. Gen. p. 156. n. 668: g. Rhamnear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 279; 1825. v. 36. p. 45 (*Olivetier*).
= Elaeodendron Jacq.

Elaeodendrum Ecklon & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. austr. p. 127: g. Celastrinear. valde restrictum. (E. capense.)

Elaeoselineae „Koch mss." DC. 1830. Prodr. IV. p. 215: trib. Campylospermar. Gen.: Elaeoselinum. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 359. Gen. id. — Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107). Gen. id. — Endl. 1839. Gen. p. 785; 1841. Ench. p. 380. Gen. id. et Margotia. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 97. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 139: subsect. Caucalinear. Gen. ut Endl.

Elaeoselinidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 779: trib. Apiacear. Gen.: Elaeoselinum, Margotia.

Elaeoselinum „Koch mss." DC. 1830. Prodr. IV. p. 215: nov. g. Elaeoselinear. (Laserpitium meoides Desf.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 360. — Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107). — Endl. 1839. Gen. n. 4498. p. 785; 1841. Ench. p. 380. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 586; II. p. 979. — Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5372. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 678.
Tausch 1834. Flora I. p. 346: g. Laserpitiear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 135.
Rchb. 1837. Hdb. p. 219: g. Caucalinar.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 380: g. Pterygospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Elaeoselinidar.
Synon. Thapsiae sp. Guss.

Elaeosticta*) Fenzl 1843. Flora II. p. 458; 1843 in Endl. Gen. Suppl. III. p. 82. n. 4411/$_1$: nov. g. Amminear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 858.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Elaiocarpos Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 93. t. 40.
= Elaeocarpus Linn.

Elaionema Berkeley 1833. Glean. of Alg. V. p. 49. *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 224.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 28: g. Sporochnoidear.
= Arthrocladia Duby.

Elais Linn. 1767. Mant. p. 21; 1767. Syst. ed. XII. p. 730. n. 1284: g. Palmar. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 827. — Reich. 1778. Gen. p. 567. n. 1340. — Juss. 1789. Gen. p. 38. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 776. n. 1695. — Pers. 1797. Syst. p 1023; 1807. Ench. II. p. 622. n. 2239. — Batsch 1802. Tab. p. 127. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 799. n. 1805: g. Dioec. Hexandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 200: g. Phoenicear.
= Elaeis Jacq.

Elaphaglossum Klotzsch vid. *seq.*

Elaphoglossum**) Schott . . . . Gen. Fil. Fasc. III. t. 3 in not.: nov. g. pro Acrosticho simplice, conformi etc. propositum. *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 175.
J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 400; 1842. ibid. IV. p. 148: g. Acrostichiear.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 418 (*Elaphaglossum*): sect. Acrostichi.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693: g. Acrostichear.
= Olfersiae Raddi pars.

Elaphomices Dumort. vid. *Elaphomyces.*

Elaphomycei Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 51: subordo Tuberaceor. Gen.: Elaphomyces.
Bail 1858. Syst. Pilz. p. 49: fam. Gasteromycetum. Gen. id.

Elaphomyces Nees 1820. Syn. gen. Mycol. p. LXIX.
Fries 1825. Pl. homon. p. 134; 1829. Syst. myc. III. 1. p. 57; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 444: g. Sclerodermeor. Sect. (1849): Ceraunion, Ceratogaster. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 211; 1841. Nom. p. 10. n. 387. — Endl. 1836. Gen. n. 328. p. 28; 1841. Ench. p. 17. — L. R. & C. Tulasne 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 5. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 290.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74 (*Elaphomices*): g. Sclerodermear.
Vittad. 1831. Tuberac. p. 62.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 24; 1842. Mycol. p. 96: g. Sclerodermacear.

---

*) στικτός, punctatus, maculatus.
**) ἔλαφος, cervus.

Elaphomyces Nees cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Tuberaceor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491. — Bonord. 1851. Hdb. p. 276.
Math. 1853. Belg. II. p. 381: g. Lycoperdinear.
Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 51: g. Elaphomyceor. — Par. Bail. 1858. Syst. p. 49.
Synon. Hypogeum. Pers.; Hypogaeum Gray; Phymatium Chev.; Ceraunium Wallr.; Lycoperdi sp. Linn.; Tuberis sp. Nees.

Elaphrium*) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 105. t. 71: nov. g. Octandr. Monogyn. (E. tomentosum.) *Cf.* Juss. 1819. Dict. v. 14. p. 285.
Scop. 1777. Intr. p. 225: g. Nomadear.
Neck. 1790. El. II. p. 383. n. 1196: g. Ypsoophytor.
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 141; 1824. Pr. I. p. 723: g. Diosmear.?
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 347 (Gen. Tereb. p. 15); 1825 in HBK. Nov. gen. VII. p. 26. t. 611—613; 1825. Syn. IV. p. 158: g. Burseracear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56). — Endl. 1840. Gen. n. 5931. p. 1136; 1841. Ench. p. 602. — Schltd. 1842. Linnaea XVI. p. 523. (An Burserae injungendum?)
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3835 (*Elaphryum*); 1841. Nom. p. 145. n. 5637: g. Burserear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 294.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 306. n. 1565: g. Terebinthear.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 86: g. Burseriacear. Sejungitur Fagarastrum.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 231: g. Amyridear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1271: g. Terebinthacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 460: g. Burseridar.

Elaphryum Rchb. vid. *praeced.*

Elate**) Linn. 1737. Mus. Cliff. p. 12; 1753. Sp. II. p. 1189; 1759. Syst. ed. X. p. 1355. n. 1091; 1763. Sp. ed. II. p. 1659; 1764. Gen. ed. VI. p. 564. n. 1226; 1767. Syst. ed. XII. p. 734: g. Palmar. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 828; 1784. Syst. p. 986. — Scop. 1777. Intr. p. 70. — Reich. 1778. Gen. p. 568. n. 1342. — Juss. 1789. Gen. p. 38. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 777. n. 1697. — Gis. 1792. Prael. p. 38. — Pers. 1797. Syst. p. 1024; 1807. Ench. II. p. 562. n. 2081. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 127. — Batsch 1802. Tab. p. 128. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 94. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 290. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 141. n. 1352; 1830. Gen. I. p. 250. n. 1304. — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1063.
Gled. 1764. Syst. p. 24. n. 94: g. Thalamostemonum.

*) „Nomen a ligni levitate (ἐλαφρία)."
**) Elate Plinio est involucrum fructus palmae.

Elate Linn. cont.
Aiton 1789. Hort. kew. III. p. 477.
Neck. 1790. El. III. p. 301. n. 1696: g. Pocilmophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 94: g. Triandr. Monogyn.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 403. n. 1682: g. Monoec. Hexandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 200: g. Phoenicear.
Mart. 1824. Palm. fam. p. 19: g. Cocoinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1635.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Cocoinear.
= Phoenix Linn.

Elate*) Endl. 1837. Gen. n. 1810. p. 263; 1841. Ench. p. 147: g. Coniferar. foss. (*Synon. Abies Brongn.*)
Endl. 1842. Spl. II. p. 26. n. 1803: g. Abietinar. foss.
Unger 1843. Chlor. prot. p. 70. t. 19 (1846. p. LXXIV); 1845. Syn. pl. foss. p. 199: g. Abietinear. foss.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 283; 1847. Gen. Spl. IV. p. 12. n. $1816/_{20}$ *a:* sect. Pinitis. Subsect.: Abietites, Piceites, Laricites, Palaeocedrus.
Synon. Thujoxylon Hart.?

Elateriosperma Hassk. vid. *seq.*

Elateriospermum**) Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 620: nov. g. Crotonear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5800. p. 1113; 1841. Ench. p. 588. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 236 (*Elateriosperma*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Meisn. 1841. Gen. p. 339 (252): g. Rottlerear.
Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7378 (*Elaterispermum*): g. Ricinear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 232: g. Euphorbiacear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 397: g. Crotonidear.

Elaterispermum Rchb. vid. *praeced.*

Elaterium***) „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 47. Ed. Hall. 1745. p. 46: g. pl. class. I. (Cucumis sylvestris asininus Tourn.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 139: g. Bryoniar. (Momordica 6 Linn. sp. 1010.)
Mönch 1794. Meth. p. 503: g. Petalostemonis. (Momordica Elaterium L.)
= Ecbalium Rich.

Elaterium Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 241. t. 154 (Ed. pict. p. 118. t. 232): nov. g. Monoec. Monandr. — Par. Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1375; 1764. Gen. ed. VI. p. 477. n. 1036; 1767. Syst. ed. XII. p. 614. — Murr. 1774. Syst. p. 701; 1784. Syst. p. 839. — Reich. 1778. Gen. p. 473. n. 1128. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 619. n. 1398. — Pers. 1797. Syst. p. 883; 1807. Ench. II. p. 534. n. 2023. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 192. n. 1650; 1809. En. p. 950.

*) ἐλάτη, abies.
**) ἐλατήριον, purgans.
***) ἐλατήριον, quidquid ventrem deorsum purgat.

Elaterium Jacq. cont.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Cucurbitacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 151. — Juss. 1789. Gen. p. 394. — Gis. 1792. Prael. p. 439. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 512. — Batsch 1802. Tab. p. 221. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 294. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 120. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 291. — Kunth 1822. Syn. I. p. 426. — Link 1822. En. II. p. 376. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 47. n. 2365; 1831. Gen. II. p. 532. n. 2612. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. — Bartl. 1830. Ord. p. 275. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 116.
Gled. 1764. Syst. p. 151. n. 621: g. Petalostemonum.
Neck. 1790. El. I. p. 236. n. 328: g. Sygolliphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 11: g. Monandr. Monogyn.
Cram. 1803. Disp. p. 180 in Monoec. Triandr.
Seringe 1825. Mém. Genèv. III. 1. p. 25; 1828 in DC. Pr. III. p. 310: g. Cucurbitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2748. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 34. — Meisn. 1838. Gen. p. 127 (92). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 187. — Arnott 1841. Hook. journ. bot. III. p. 278. — Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 270. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Endl. 1839. Gen. n. 5141. p. 939; 1841. Ench. p. 491: g. Cucumerinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3962. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 15. 81.

Elatinaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 88) 1847. Veg. kingd. p. 480: ordo Rutalium. Gen. Elatinear. Cambess. et Tetradiclis, Anatropa, Tridia?
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 203: ordo Dicotyledonum. Gen.: Elatine.

Elatine Caesalp. 1583. Lib. 9. cap. 32.
= Specularia Heist.

Elatine Rupp. 1718. Fl. jen. p. 238. Ed. Hall. 1745. p. 242: g. pl. class. IX.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 116. t. 6: g. a Linaria distinctum.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 112.
Mönch 1794. Meth. p. 524: g. Petalostemonis.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 321: g. Scrofularinar.
= Linaria Tourn.

Elatine*) Linn. 1737. Gen. p. 118. n. 335; 1740. Syst. p. 22; 1753. Sp. I. p. 367; 1759. Syst. ed. X. p. 1008. n. 451; 1762. Sp. ed. II. p. 527; 1764. Gen. ed. VI. p. 198. n. 502; 1767. Syst. ed. XII. p. 278. n. 497: g. Octandr. Tetragyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 315; 1784. Syst. p. 381. — Reich. 1778. Gen. p. 202. n. 544. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 267. n. 685. — Gmel. 1791. Syst. p. 641. — Pers. 1797. Syst. p. 407; 1805. Ench. I. p. 446. n. 992. — Willd. 1799. Sp. II. p. 472. n. 795. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 5. 51.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 85. n. 356: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Inundatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 326.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172 (9): g. Tetrapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 331: g. Caryophyllear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 300. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 241. — Batsch 1802. Tab. p. 33. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 113. — Hedw. 1806. Gen. p. 287. n. 1150. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 838 (anomal.); 1825. Syst. II. p. 261. n. 1516; 1830. Gen. I. p. 326. n. 1660. — Lois. 1819. Dict. v. 14. p. 293. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1329.
Neck. 1790. El. II. p. 158. n. 854: g. Catotaphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 142. t. 102. f. 2.
Cram. 1803. Disp. p. 27 in Triandr. Trigyn. (E. triandra.)
DC. 1805. Franç. IV. p. 771; 1815. V. p. 609; 1824. Pr. I. p. 390: g. Alsinear. (?) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 650. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 420. — Link 1831. Hdb. II. p. 251. — Math. 1853. Belg. I. p. 88.
A. Braun 1824. Syll. Ratisb. I. p. 81.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 245: g. Alsinacear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Lythrear.
Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4553: g. Salicariear.
Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 229: g. Elatinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 37. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 449. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 639; 1837. Hdb. p. 248; 1841. Nom. p. 172. n. 6631. Sect. (1841): Elatine, Potamopitys. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 41. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 418. — Koch 1836. Syn. p. 125. Ed. II. p. 137. — Meisn. 1838. Gen. p. 131 (95). — Kunth 1838. Berol. I. p. 135. — Endl. 1840. Gen. n. 5475. p. 1036; 1841. Ench. p. 541. Sect.: Crypta, Hydropiper, Alsinastrum. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 421. — Seub. 1842 in Walp. Rep. I. p. 283; 1844. Verh. nat. Ver. Rheinl.; 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 38. Sect.: Crypta, Elatinella, Potamopitys. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 107. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 220. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 277. — Endl. 1850. Spl. V. p. 70. Sect.: Crypta, Hydropiper, Potamopitys. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 27.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49: g. Elatinidear.
Lindl. 1836. Nat. syst. p. 85; 1847. Veg. kd. p. 481: g. Elatinacear. — Par. Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 203.
Synon. Willisellus Gray.

*) ἐλάτινος, abietinus.

Elatineae Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 225; 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 159: novus ordo plant. Gen.: Elatine, Bergia, Merimea.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (143) Thalamiflorar. (syncarpar.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 449. Gen. ut Cambess.
Bartl. 1830. Ord. p. 317: div. Lythrariear. Gen.: Elatine, Bergia. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 639. Gen.: Elatine.
Arnott 1830. Edinb. journ. nat. and geogr. sc. p. 426.
Fisch. & Meyer 1835. Linnaea X. p. 69. (Observ. de familia.)
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 418: trib. Lythrariear. Gen. ut Bartl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 248: subdiv. Lythrear. Gen. Crypta, Elatine, Alsinastrum, Bergia, Tetradiclis, Merimea. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 172. Gen. ut Endl. et Crypta.
Meisn. 1838. Gen. p. 131 (95): ordo 93 plant. (p. 438 Caryophyllinar.) Gen. ut Cambess. et Tetradiclis?, Anisadenia?
Endl. 1840. Gen. p. 1036; 1841. Ench. p. 541: ordo Guttiferar. Gen. ut Cambess. et Tridia?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 107: fam. Crassulinear. Gen.: Elatine.
Seub. 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 36. Gen. ut Bartl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 232. Gen. ut Cambess.
Synon. Elatinaceae Lindl.

Elatinella Torrey & Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 42: sect. Hedyotidis. (H. glomerata Ell.)

Elatinella Seubert 1842 in Walp. Repert. I. p. 284; 1844. Verh. nat. Ver. Rheinl.; 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 46: sect. Elatines.
= Hydropiper Endl.

Elatines Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 280: sect. Campanulae. (C. pyramidalis, cenisia L., versicolor Andr., etc.)

Elatinideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 49: fam. Stellariear. Gen.: Elatine, Bergia.

Elatinoides Chav. 1833. Antirrh. Mon. p. 103: sect. Linariae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 519. — Endl. 1839. Gen. n. 3891 *d.* p. 673; 1841. Ench. p. 338. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 22. — Walp. 1845. Rep. III. p. 192. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 267. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 204. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 574.
Synon. Kickxia Dumort.; Leontostomium Rchb.

Elatinoides Seubert 1842 in Walp. Repert. I. p. 285: sect. Bergiae.
Endl. 1850. Spl. V. p. 71. n. 5476 *b α*: subsect. Eubergiae.

Elatorchideae Dumort. 1827. Prodr. fl. Belg. p. 133; 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 5; 1836. Flora I. p. 52: div. Orchidear. Trib.: Ophrydeae, Gastrodieae.

Elatostema*) Forst. 1776. Char. gen. p. 105. t. 53: nov. g. Monoec. Pentandr.
Scop. 1777. Intr. p. 339: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 403: g. Urticar.
Batsch 1802. Tab. p. 178: g. Scabridar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 307: g. Urticear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 557. n. 2060. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 206. t. 45. 46 A. B.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 475: sect. Dorsteniae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262: g. Urticacear. — Par. Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 11. t. 1983—1985 et p. 35. t. 2091 (ter *Elatostoma).*
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 187: g. Lecanthear. *Cf.* Flora 1855. p. 518.
Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 365: g. Procridear.
Synon. Elatostemma Endl.; Elatostema, Sciophila et Langeveldia Gaudich.; Procris Spreng.; Langefeldia Steud.

Elatostema Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 493: g. Elatostemear. restrictum. (E. serratum Forst.)
= praecedentis pars.

Elatostemeae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 493: div. Urticear. Gen.: Elatostema, Sciophila, Pellionia, Langeveldia, Dubrueilia. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24. Gen. ead. (Schychowskya et Pilea loco Dubrueiliae.)

Elatostemma Endl. 1833. Prodr. fl. Norf. p. 39; 1837. Gen. n. 1880. p. 283; 1841. Ench. p. 170; 1847. Spl. IV. p. 37: g. Urticacear. Sect. (1837): Sciophila (1847 Sciobia), Elatostemma. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259).
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 18: g. Urticear. — Par. Hook. 1853. N. Zeal. I. p. 226.
= Elatostema Forst.

Elatostemma Endl. 1837. Gen. n. 1880 *b.* p. 283; 1841. Ench. p. 170; 1847. Spl. IV. p. 37: sect. Elatostemmae.
Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2487: g. Elatostemmear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24: g. Elatostemear.
Synon. Elatostema et Langeveldia Gaudich.; Vanieria Lour.; Vaniera St. Hil.

Elatostemmeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 66: subdiv. Urticear. Gen.: Elatostemma, Sciobia, Schychowskya, Malaisia, Pilea, Pellionea.

Elatostoma Wight vid. *Elatostema Forst.*

Elatoxylon Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 168. 190: g. Abietinear. foss. (E. Withamii.)

Elcaia Hedwig vid. *seq.*

Elcaja**) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 127: nov. g. Monadelph. Decandr.
Scop. 1777. Intr. p. 286: g. Columniferar.
Juss. 1789. Gen. p. 265: g. Meliarum.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.

*) *ἐλατός*, elasticus; *στῆμα*, stamen.
**) *Djouz elkai* Arabum.

Elcaja Forsk. cont.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 44: g. Meliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 303. n. 1200 *(Elcaia).*
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 86. 116 *(Elkaja):* g. Trichiliear.
= Eutrichilia Endl.

Eleagneae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 121: fam. Proteinear. Gen.: Hippophaë, Sheperdia, Eleagnus.

Eleagni Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 175. t. 28: fam. plant. Gen.: Thesium, Quinchamalium, Octarillum, Osyris, Fusanus, Hippophaë, Elaeagnus, Myoschylos, Nyssa, Conocarpus.
Conf. Elaeagni Juss.

Eleagnideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 18: fam. Protteariear. Gen.: Eleagnus, Hippophaë, Sheperdia, Conuleum.

Eleagnus Hill, Dumort., Brongn. vid. *Elaeagnus Tourn.*

Eleanthes „Presl" Endl. in synon. Hexiseae: vid. *Elleanthus Presl.*

Eleanthus Wittst. Etym. Handw. p. 316: vid. *praeced.*

Electra Panzer 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 299. t. 9. f. 3: nov. g. Graminum. (Festuca calicina.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 164: g. Festucacear.
Trin. 1820 Fund. p. 148: sect. Schismi. (Aira media Gouan.)

Electra*) DC. 1836. Prodr. V. p. 630: nov. g. Verbesinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2561. p. 416; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3166. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19: g. Coreopsidear.

Electra Noronh. . . . . A. B. V. p. 65.
= Sapindus Linn.

Electrosperma F. Müll. 1854. Trans. phil. soc. Victoria I. Nr. 1; 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 333: nov. g. Eriocaulonear. (E. australasicum.) *Cf.* Bot. Zeit. 1855. p. 685 et Flora 1855. p. 624.

Elegia Linn. 1771. Mant. II. p. 162. n. 1331: g. Dioec. Triandr. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 675. n. 1494. — Thunb. 1792. Nov. gen. VI. p. 101. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 729. n. 1767. — Pers. 1807. Ench. II. p. 607. n. 2192.
Scop. 1777. Intr. p. 81: g. Liliacear.
Thunb. 1794. Prodr. I. p. 14; 1818. Fl. cap. I. p. 311: g. Triandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 187; 1825. Syst. I. p. 362. n. 358: g. Restiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 156. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 272. — Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Endl. 1837. Gen. n. 1020. p. 122; 1841. Ench. p. 67. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 415. — Kunth 1841. Enum. III. p. 460. — Rchb. 1841. Nom.

*) Electra, uxor Atlantis, alludens ad plantam transatlanticam.

Elegia Linn. cont.
p. 42. n. 510. — Meisn. 1842. Gen. p. 408 (312). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 121. — Steud. 1855. Glum. II. p. 261.
Palis. mss. ex Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 39: g. Elegiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1133: g. Restionear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62 *(Eligia).* — Bartl. 1830. Ord. p. 36. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 76. n. 374: g. Restiear.

Elegieae „Palis. mss." Desvaux 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 39: fam. Monocotyledonear. (gen. §. 1: Cannomois, Hypolaena, Calopsis; §. 2: Elegia, Chondropetalum, Calorophus, Anarthria?, Lepirodia), a Desv. (ibid. p. 41) Restiaceis inserta.

Eleiotis*) DC. 1825. Prodr. II. p. 348 (Lég. mém. VII): nov. g. Euhedysarear. (Hedysarum sororium L.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 307. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 231. — Meisn. 1837. Gen. p. 91 (65). — Endl. 1841. Gen. n. 6620. p. 1286; 1841. Ench. p. 671. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4005; 1841. Nom. p. 152. n. 5953: g. Onobrychear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 575. n. 2810: g. Leguminosar.

Elemanthus „Hochst." Bot. Zeit. 1847. p. 150: vid. *Eilemanthus Hochst.*

Elemi Adans. 1763. Fam. II. p. 342: g. Pistaciar.
= Amyris Linn.

Elemifera Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 486: genus incertae sedis. *(Toxicodendrum Catesb.)*
= seq.?

Elemifera Plumier 1755. Amer. ed. Burm. IV. p. 87.
= Amyris Linn.

Elengi Rheede 1678. Ht. Malab. I. p. 33. t. 20.
Adans. 1763. Fam. II. p. 166: g. Vaccinior.
Endl. 1839. Gen. n. 4243 *a.* p. 741; 1841. Ench. p. 361: sect. Mimusopis.

Eleocarpeae A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 303.
= Elaeocarpeae Juss.

Eleocharis**) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 224. Ed. Nees p. 80: nov. g. Cyperacear., a Scirpo L. disjunctum. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 3. 149. n. 178. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 329. — D. Don 1825. Nepal. p. 41. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 68. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 189. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 269.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 77: g. Scirpidear.

*) Vulgo ab Indis dicitur Auricula gliris ἐλειός, glis.
**) ἕλος, (nec ἑλος), palus.

Eleocharis R. Brown cont.
Link 1821. En. I. p. 42: sect. Scirpi. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 203. — Endl. 1837. Gen. n. 1000 c. p. 118; 1841. Ench. p. 64. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 418; 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 268. — Math. 1853. Belg. I. p. 575.
Agdh. 1823. Aphor. p. 142: g. Scirpear. — Par. Presl. fr. 1828. Reliq. Hänk. I. p. . . . — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 294 (disjunguntur Eleogenus et Limnochloa); 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 104; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 96. — Kunth 1837. Cyper. p. 139; 1838. Berol. II. p. 319. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 12 (*Elaeocharis*). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 243 (*Elaeocharis*). — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 380. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 299.
Link 1827. Hort. I. p. 280; 1829. Hdb. I. p. 100: g. Cyperoidear.
Conf. Heleocharis Lestib.

Eleodeae Leman 1817. Dict. v. 8. p. 167: fam. plantar., Onagrariis aff. Gen.: Chara.
= Characeae Rich.

Eleogenus*) Nees 1834. Linnaea IX. p. 294; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 101: nov. g. Scirpear. (Heleocharis ovata Vahl.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 424 (*Heleogonus*).
Kunth 1837. Cyper. p. 150: sect. Eleocharidis. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 78.
= Heleocharis Lestib.

Eleogiton Link 1827. Hort. Berol. I. p. 284; 1829. Handb. I. p. 101: nov. g. Cyperoidear. (Scirpus fluitans.)
Nees 1834. Linnaea IX. p. 291; 1835. ibid. X. p. 163: g. Scirpear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 313.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 192: g. Cyperacear.
= Isolepis R. Brown.

Eleoxylon Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 125: nov. g. Coniferar. foss. (Lignum. — Peuce acerosa Ung., etc.)

Elephantopeae Cassini 1828. Dict. v. 57. p. 342; 1830. v. 60. p. 586: subdiv. Vernoniear. Archetypar. Gen.: Dialesta, Distreptus, Elephantopus.
Less. 1830. Linnaea V. p. 135; 1831. ibid. VI. p. 688: subtrib. Vernoniacear. Gen.: Elephantopus, Elephantosis, Distreptus. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. Gen.: Elephantopus.
DC. 1836. Pr. V. p. 85: div. Vernoniear. Gen. ut Less. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 362; 1840. Ench. p. 232. Gen. unicum: Elephantopus. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123). Gen. ut DC.

*) γένος, genus, origo.

Elephantopeae Cassini cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 182: subdiv. Segregatar.
Rchb. 1841. Nom. p. 100: div. Rolandrear. Gen.: Elephantopus.
Synon. Elephantopodeae Less.

Elephantopodeae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 149: subtrib. Vernoniacear. Gen.: Elephantosis, Elephantopus, Distreptus.
= praeced.

Elephantopsis Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 518: sect. Elephantopodis. (Elephantosis biflora Less.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 390.

Elephantopus*) Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 309: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 178. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 394.
Linn. 1737. Gen. p. 249. n. 642; 1737. Cliff. p. 390; 1740. Syst. p. 28; 1742. Gen. ed. II. p. 384. n. 755; 1748. Ups. p. 247; 1753. Sp. II. p. 814; 1759. Syst. ed. X. p. 1198. n. 827: g. Syngenes. Polygam. Aequal.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 239. n. 982: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Semiflosculosor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: p. Cichoracear.
Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1313; 1764. Gen. ed. VI. p. 452. n. 997; 1764. Syst. ed. XII. p. 580: g. Syngenes. Polygam. Segregat. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 663; 1784. Syst. p. 796. — Reich. 1778. Gen. p. 447. n. 1081. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 589. n. 1347. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 315. Char. emend. — Gmel. 1791. Syst. p. 1279. — Pers. 1797. Syst. p. 838; 1807. Ench. II. p. 498. n. 1956. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2389. n. 1571; 1809. En. p. 941. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 187. — Link 1822. En. II. p. 366. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 52. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 445.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Capitatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.
Hill 1769. Ht. kew. p. 38: g. Tubulatar.
Scop. 1777. Intr. p. 125: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 92. n. 167: g. Siphoniphytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 549; 1826. Syst. III. p. 454. n. 2706; 1831. Gen. II. p. 616. n. 3051: g. Eupatorinar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 26: g. Echinopsidear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 366. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 890.
D. Don 1825. Nepal. p. 169: g. Carduacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2344: g. Lagascinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: g. Vernoniear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 46.

*) Nomen imitatio vocis malabaricae *Ana-Schovadi*, vestigium pedis elephantis significantis, a foliorum inferiorum forma.

Elephantopus Vaill. cont.
Endl. 1838. Gen. n. 2231. p. 362; 1841. Ench. p. 232: g. Elephantopear. Sect.: Euelephantopus, Elephantosis, Pseudelephantopus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3928. Sect. fere eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 514. Sect. ut Endl. et Micropappus, Elephantopsis. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 390. Sect. eaed.
Synon. Anaschovadi Adans.

Elephantopus Cassini 1819. Dict. v. 14. p. 341: g. restrict. Vernoniear. (Emittitur Distreptus.) — Par. Less. 1829. Linnaea IV. p. 323. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 60. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40. (verar.) — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 21.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 342; 1830. v. 60. p. 586: g. Elephantopear. — Par. Less. 1830. Linnaea V. p. 135; 1831. ibid. VI. p. 689. — DC. 1836. Pr. V. p. 85. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123). — Gardn. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 237.
Less. 1832. Syn. p. 149: g. Elephantopodear.
Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3928. 1: sect. Elephantopodis.
= Euelephantopus Endl.

Elephantorhiza Meisn. vid. *seq.*

Elephantorrhiza Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 344: nov. g. Adenantherar. (Prosopis elephantorrhiza Spr.)
Walp. 1842. Rep. I. p. 861; 1846. V. p. 581: g. Adenantherear.
Meisn. 1843. Comm. p. 353 (*Elephantorhiza*): g. Mimosear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Eumimosear.

Elephantosis Lessing 1829. Linnaea IV. p. 322: nov. g. Vernoniear. (E. biflora et quadriflora.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40. (verar.)
Less. 1830. Linnaea V. p. 136; 1831. ibid. VI. p. 689: g. Elephantopear. (Elephantopus angustifolius Sw.) — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 87. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123).
Less. 1832. Syn. p. 149: g. Elephantopodear.
Endl. 1838. Gen. n. 2231 *b*. p. 362; 1841. Ench. p. 232: sect. Elephantopodis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3928. 2. — Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 517. (restrict.) — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 390.

Elephantusia Willd. 1805. Spec. IV. p. 1156. n. 1934: g. Polygam. Dioec.
Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 342: g. Typhinear.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 197: g. Pandanear.
= Phytelephas Ruiz & Pav.

Elephas Tourn. 1703. Coroll. p. 48. t. 482: g. pl. class. III.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129: g. Petalostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 211: g. Personatar.

Elephas Tourn. cont.
Guss. 1828. Fl. sic. II. p. 155.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 6: g. Rhinanthear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 619: g. Rhinanthiear.
= Rhinanthus MBieb.

Elettari Rheede 1692. Malab. XI. p. 9. t. 4. 5.
= seq.

Elettaria White & Matton 1809. Linn. Trans. X. p. 249.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 2. 22: g. Scitaminear.
Link 1821. En. I. p. 443: g. Alpiniacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Curcumacear.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 50: g. Amomar. Sect.: Amomum, Geanthus.
Endl. 1837. Gen. n. 1627. p. 223; 1841. Ench. p. 119: g. Amomor. Sect.: Cardamomum, Geanthus.
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: g. Amomear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2215. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 388 (291). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 163.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 600. Sect.: Euelettaria, Donacodes.
Synon. Elettari Rheede; Pacoseroca Adans.; Mattonia Smith.

Eleusine Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 7. t. 1. f. 11: nov. g. Graminum. (E. coracana et indica.) — Par. Michx. 1803. Fl. am. I. p. 64. — Link 1821. En. II. p. 104. — Hamilt. 1826. Ind. occ. p. 6.
Mönch 1794. Meth. p. 210: g. Thalamostemonis. (Cynosurus indicus L.)
Batsch 1802. Tab. p. 156: g. Graminear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 82. — Hedw. 1806. Gen. p. 48. n. 229. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 186. Ed. Nees p. 42. — Palis. 1812. Agrost. p. 72. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 32. 581. n. 298. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 344. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 349. n. 348; 1830. Gen. I. p. 71. n. 346. — Link 1829. Hdb. I. p. 23.
Pers. 1805. Ench. I. p. 87. n. 165: g. Triandr. Digyn. — Par. Willd. 1809. En. p. 112. — Elliott 1817. Sketch I. p. 175. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 75. — Trin. 1820. Fund. p. 132. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. I. p. 343; ed. 1832. I. p. 342.
Panz. 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 300. t. 8. f. 1. (Revisio crit.)
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 164; 1822. Syn. I. p. 225; 1830. Gram. p. 91; 1833. Agrost. p. 272: g. Chloridear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 169. — Agdh. 1823. Aphor. p. 151. — Link 1827. Hort. I. p. 60. — Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 868; 1841. Nom. p. 37. n. 1315. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 439; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 137. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Endl. 1837. Gen. n. 841. p. 93; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839.

Eleusine Gärtn. cont.
Syn. I. p. 136. 334. — Meisn. 1843. Gen. p. 421 (322). — Brongn. 1843. En. genr. p. 9. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 199. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 429. — Parlat. 1850 in Webb Canar. III. p. 396. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 452. — Steud. 1854. Glum. I. p. 210.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Eleusinear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 385.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Chlorear.

Eleusineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: subtrib. Poacear. Gen.: Sclerochloa, Eleusine, Dactylotenium, Leptochloa.
Miq. 1857. Fl. Ind. bat. III. p. 358: cohors Chloridear. Gen.: Dactyloctenium, Eleusine, Chloris, Leptochloa, Tripogon.

Eleutera Palis. Prodr. Aethéog. p. 30 not.: vid. *Eleuteria Palis.*

Eleuteria Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 56: novum nomen pro *Neckera Hedw.* propositum. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 348 et Pfeiffer 1857. Bot. Zeit. p. 644.

Eleutharrheneae Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 36: div. Leptogonear. Gen.: Menispermum, Pericampylus, Hypserpa, Pselium.

Eleutheranthera*) Poit. 1803. Nouv. dict. h. n. VII. p. 498: nov. g. Corymbiferar. *Cf.* Cassini 1825. Dict. v. 35. p. 447, et Steud. Nom. I. p. 549 *(Eleuthrantheron).* = Ogiera Cass.

Eleutheria „Palis." Leman et Auct.: vid. *Eleuteria Palis.*

Eleutheria Kunze 1844. Bot. Zeit. p. 296. = Notophoria Presl.

Eleutherine Herbert 1843. Bot. Regist. t. 57: nov. g. Iridacear. *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 861. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161.

Eleutherocarpa Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 53: class. XIII. Cryptogamor. Gen.: Epichysium, Ascophora, Periconia, Ceratium, Isaria, Botrytis, Monilia, Dematium, Erineum, Racodium, Himantia, Rhizomorpha, Mesenterica.

Eleutherochaeta DC. 1837. Prodr. VI. p. 448: sect. Robinsoniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2821 *b.* p. 461; 1841. Ench. p. 245. — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3378. 2.

Eleutherococcus Maxim. 1858. Mém. sav. étr. Ac. Pet. IX. p. 132: nov. g. Araliacear. (E. senticosus.)

Eleutherogeron DC. 1836. Prodr. V. p. 293: sect. Erigerontis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2332 *d.* p. 378; 1841. Ench. p. 234. — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3263. 4.

Eleutherogynae Lennis 1849. Schul-Naturg. II. p. 190: div. Monocotyledonear. Ordines: Liliaceae, Palmae, Aroideae, Helobiae, Juncinae, Glumaceae.

Eleutherolepis DC. 1837. Prodr. VI. p. 448: sect. Robinsoniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2821 *c.* p. 461; 1841. Ench. p. 245. — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3378. 3.

Eleutheropetalum Wendland . . . . Ind. Palm. p. 58.
Oerst. 1858. Palm. Centroam. p. 6: g. Chamaedoreear.

Eleutherophyllina Rchb. 1828. Consp. p. 31: div. Jungermannieor. Subdiv.: Sphagnea, Andreaeacea.

Eleutherospermum C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 365: nov. g. Utriculosar.
Meisn. 1843. Comm. p. 359: g. Cachrydear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 83. n. $4537/_1$: g. Smyrnear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 426. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 364.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 15: g. Eusmyrnear.

Eleutherostemon Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 219: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum: Erica galioides Lam.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 244 (152). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 696: sect. Philippiae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4311 *b.* p. 754; 1841. Ench. p. 369. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4889. 2.

Eleutherostemones Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 217: trib. Ericear. Gen.: Erica, Calluna, Nabea, Eremia, Eleutherostemon, Hexastemon, Blaeria, Ericinella, Thamnium, Comacephalus, Grisebachia, Acrostemon, Thoracosperma, Sympieza, Pachycalyx, Plagiostemon, Octogonia, Coilostigma, Thamnus, Simocheilus, Finckea, Anomalanthus, Codonanthemum, Syndesmanthus, Macrolinum, Omphalocaryon, Tristemon.
Meisn. 1839. Gen. p. 244: subtrib. Ericear. Gen. ead. et Pentapera, Microtrema.

Eleutherotion Basiner 1846. Bull. Ac. Pet. IV. p. 310: sect. Hedysari. (Isolom.)

Eleuthrantheron Steud. vid. *Eleutheranthera Poit.*

Eliaea*) Cambess. 1830. Ann. sc. nat. XX. p. 400: nov. g. Hypericear. (Hypericum articulatum Lam.)
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 613 *(Eliea)*: g. Eucryphiear.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 341; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 351: g. Tridesminear.
Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33) *[Eliea]*: g. Carpodontear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 308; 1841. Nom. p. 211. n. 8005: g. Tridesmear.
Endl. 1840. Gen. n. 5469. p. 1034; 1841. Ench. p. 539: g. Elodear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 391. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406.
Synon. Cussonia Comm.; Lanigerostemma Chapel.

*) ἐλεύθερος, liber.

*) Dicat. Elle de Beaumont.

Elichryseae Link 1829. Handb. I. p. 712: ordo Anthodiatar. Gen.: Artemisia, Tanacetum, Gnaphalium, Chamaezelum, Filago, Leontopodium, Xeranthemum, Elichrysum, Astelma, Micropus, Gymnostyles, Carpesium, Baccharis, Conyza, Tussilago.

Elichrysum Tourn. 1700. Inst. p. 452. t. 259: g. pl. class. XII. *Cf. Elychrysum Tourn.* et *Auct.*
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 183. Ed. Hall. 1745. p. 192: g. pl. class. VIII.
Adans. 1763. Fam. II. p. 122: g. Conysar.
Mönch 1794. Meth. p. 575: g. Petalostemonis. (Gnaphalium arenarium L.)
Vent. 1799. Tabl. II. p. 513: g. Corymbiferar. — Par. Link 1822. En. II. p. 320.
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1903. n. 1476; 1809. En. p. 869: g. Syngenes. Superfl. — Par. Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 21.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 550; 1826. Syst. III. p. 482. n. 2726; 1831. Gen. II. p. 619. n. 3072: g. Eupatorinar.
Link 1829. Hdb. I. p. 722: g. Elichrysear.
= Helichrysum Vaill.

Elide Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 71: nov. g. ex typo Medeolae asparagoidis L.
= Myrsiphyllum Willd.

Eliea G. Don, Meisn. vid. *Eliaea Cambess.*

Eligia Dumort. vid. *Elegia Linn.*

Elionurus Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 69: g. Saccharinear. — Par. Nees 1829. Agrost. Bras. p. 355.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 192. t. 62. 63: g. Saccharinar. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 246.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 802. n. 368: g. Graminear.
Kunth 1830. Gram. p. 161: g. Andropoginear.
Presl 1830. Rel. Hänk. I. p. . . . : g. Andropogonear. — Par. Kunth 1833. Agrost. p. 480. — Endl. 1837. Gen. n. 944. p. 107; 1841. Ench. p. 60. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 400. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1346. — Meisn. 1843. Gen. p. 429 (328). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 167. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 276. — Hochst. 1856. Flora I. p. 81.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 259: sect. Andropogonis. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 364.
= Elyonurus Willd.

Elisa Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 282: nov. g. Oscillatoridear. (Conferva fontinalis, bicolor, distorta, mirabilis, etc.)
= Calothrix Agdh., etc.

Elisabetha Meisn. vid. *Elizabetha Schomb.*

Elisabetha Bronner 1857. Traub. Rheinth. p. 11: g. Vitium class. II.

Elisanthe Endl. 1840. Gen. n. 5246 *b γ*. p. 972; 1841. Ench. p. 506: subsect. Silenanthae. (Silene noctiflora L.)
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7827: g. Silenear.
Fenzl 1842 in Endl. Spl. II. p. 78. n. 5248 *e*: sect. Silenes. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 314. — Walp. 1843. Rep. II. p. 779.
A. Braun 1843. Flora p. 371: sect. Melandrii.

Elisena Herbert 1837. Amaryll. p. 75. 201; 1838. Bot. Regist. App. p. 47: nov. g. Amaryllidear. (Pancratiformium. — Pancratium ringens Fl. Per.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Narcissear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 656: g. Pancratiear.
Synon. Liriope Herb.; Liriopsis Rchb.

Elisena Römer 1847. Fam. nat. syn. IV. p. 10. 63: g. Amaryllear., pro *Imhofia Herb.* App. (non Amaryll.) propositum. (Brunsvigia marginata Ait.)

Elisia Linn. 1767 vid. *Ellisia Linn.*

Elizabetha*) „Schomb. mss." Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 92: nov. g. Amherstiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 843. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Endl. 1842. Spl. II. p. 98. n. $6794/_1$: g. Caesalpiniear.
Meisn. 1843. Comm. p. 353 *(Elisabetha)*: g. Cassiear.

Elizaldia Willkomm 1852. Strand- u. Steppengeb. p. 128: novum g. pro Nonnea multicolore Kz. propositum.

Elkaja Römer vid. *Elcaja Forsk.*

Elleanthus Presl 1827. Rel. Hänk. I. 2. p. 97: nov. g. Epidendrear. (*Cf.* Flora 1828. I. p. 345.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1552. — Bartl. 1830. Ord. p. 58.
Lindl. 1831. Orchid. p. 113: subg. Isochili. An genus?
= Isochilus R. Brown? (*Cf. Eleanthes Endl.*)

Ellebocarpus Rchb., Bartl. vid. *Ellobocarpus Kaulf.*

Ellertonia**) Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. 2. p. 2., t. 1295: nov. g. Alstoniear. (E. Rheedei.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 39.

Ellimia „Nutt. mss." Torrey & Gray 1838. Fl. North-Amer. I. p. 125: nov. g. Resedacear. (E. ruderalis.)
= Oligomeris Cambess.

Elliotia Spach, Rchb. vid. *seq.*

Elliottia***) Mühlenb. 1817 in Elliott Sketch bot. South-Carol. I. p. 448: nov. g. Octandr. Monogyn. (E. racemosa.) — Par. Nutt. 1818. Gen. II. Add.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 204. n. 1414; 1830. Gen. I. p. 299. n. 1532: g. Ericear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 156. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227. 1262. (?)
Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3404: g. Rhodoracear.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 590: g. Andromedear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4321. p. 756; 1841. Ench. p. 370. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443 *(Elliotia.)*
Meisn. 1839. Gen. p. 247 (155): g. Clethrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4883 *(Elliotia)*.
Planch. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 128; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 256: g. Cyrillear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 422.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 445: g. Cyrillacear.

*) Dicat. principissae regiae Borussiae.
**) Dicat. J. Ellerton Stocks, Bombay.
***) Dicat. Steph. Elliott, prof. Charlestown.

Ellipeia*) Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 104: nov. g. Uvariear. (E. cuneifolia.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 50.

Ellipsaria DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 240; 1821. Syst. II. p. 530; 1824. Prodr. I. p. 203: sect. Lepidii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4751 *a*; 1841. Nom. p. 180. n. 6935. 3. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 217. — Endl. 1839. Gen. n. 4932 *b*. p. 879; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 203.

Ellisia**) P. Browne 1756. Jamaic. p. 262. t. 29. f. 1: nov. g. Didynam. Angiosperm. — Par. Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1121. 1375. n. 1156.
= Duranta Linn.

Ellisia Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1662; 1764. Gen. ed. VI. p. 97. n. 244; 1767. Syst. ed. XII. p. 169. n. 243 *(Elisia)*: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 164; 1784. Syst. p. 195. — Reich. 1778. Gen. p. 85. n. 218. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 109. n. 268. — Gmel. 1791. Syst. p. 330. — Pers. 1797. Syst. p. 201; 1805. Ench. I. p. 168. n. 376. — Willd. 1797. Sp. I. p. 815. n. 304. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 117.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Luridar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 183. — Gis. 1792. Prael. p. 384.
Juss. 1789. Gen. p. 129: g. Borraginear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 298. — Hedw. 1806. Gen. p. 126. n. 551 *(Ellysia)*. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 353. — Link 1821. En. I. p. 174.
Neck. 1790. El. I. p. 283. n. 448: g. Trachytophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 381: g. Sebestenar.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 154: g. Petalostemonis.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 451; 1825. Syst. I. p. 670. n. 732; 1830. Gen. I. p. 135. n. 675: g. Asperifoliar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 631.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LI. 544. n. 815: g. Borraginear.
Schrad. 1820. Comm. Gott. rec. IV. p. 192: g. Hydrophyllear. — Par. R. Brown 1823. App. to Frankl. journ. p. 764. (Verm. bot. Schr. I. p. 542.) — Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2980. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Bartl. 1830. Ord. p. 196. — Benth. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 273. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 394. — Endl. 1839. Gen. n. 3828. p. 659; 1841. Ench. p. 328. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (181). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 49.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. . . .; 1847. Veg. kd. p. 639: g. Hydrophyllacear. — Par. A. DC. 1845. Pr. IX. p. 291.
Rchb. 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 112. n. 4376: g. Ellisiear.
Synon. Planta Lithospermo affinis Ehret.; Macrocalyx s. Colpophyllos Trew; Nyctelea Scop.

Ellisieae Rchb. 1837. Handb. p. 193; 1841. Nomencl. p. 112: subdiv. Capsularium. Gen.: Ellisia.

Ellisius Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 333: nov. g. Hutchinsidear. (Conferva arbuscula Dillw., coccinea Huds.)
= Eupogonii et Trichothamnii sp. Kütz.

Ellobium Lilja 1841. Linnaea XV. p. 262: nov. g. Fuchsiear. (E. fulgens et plurimae Fuchsiae longiflorae DC., antea *Spachia Lilja.)*
= Fuchsia Spach.

Ellobocarpus*) Kaulfuss 1824. Enum. Fil. p. 147: nov. g. Polypodiacear. (Acrostichum thalictroides L.) — Par. Presl 1825. Rel. Hänk. 1. p. 53. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar. — *Ellebocarpus).*
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 709 *(Ellebocarpus)*: g. Blechnoidear.
= Ceratopteris Brongn.

Ellobum Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 746: nov. g. Scrophularinar.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 549: g. Gratiolear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3937. p. 681; 1841. Ench. p. 339. — Meisn. 1840. Gen. p. 311 (222). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4615. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 361. 516. — Walp. 1845. Rep. III. p. 277. 964.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 416: sect. Vandelliae. (?) — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 693.

Ellysia Hedwig vid. *Ellisia Linn.*

Elmigera**) Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3177 b: nov. g. Antirrhinear. (Chelone barbata Cav.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Digitalear. — — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 299.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4506: g. Cheloniear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 329: sect. Pentstemonis.

Elobryum Angström 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 87: sect. Bryi. (B. roseum, bimum, pallens, argenteum, etc.)

Elodea „Adans." Vent. 1799. Tabl. III. p. 144: g. Hypericoidear. *Cf. Elodes Adans.*
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 24: g. Hypericear. — Par. Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 345. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 612. — Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 167.
Pursh 1814. Fl. bor. am. II. p. 379.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 17: g. Polyandr. Di- — Pentagyn. — Par. Elliott 1821. Sketch II. p. 33.
Choisy 1821. Prodr. Hyper. p. 43; 1824 in DC. Pr. I. p. 546: sect. Hyperici.
Endl. 1840. Gen. n. 5465. p. 1033; 1841. Ench. p. 539: g. Elodear. Sect.: Elodea, Elodes, Triadenia. — Par. Ledeb. 1842. Rep. I. p. 452. — Walp. 1842. Rep. I. p. 390. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406.

*) ἐλλιπής, deficiens.
**) Dicat. John Ellis, de zoophytis scriptori.

*) ἔλλοβος καρπός: fructus clausus in siliqua.
**) Dicat. Jos. Elmiger, de Digitalibus scriptori.

Elodea Adans. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8004 *(Helodea)*: g. Helodear. Sect.: Helobia, Helodea, Triadenia.
Brongn. 1843. En. genr. p. 74: g. Hypericinear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 361.
Hance 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 472. Char. emend.
Synon. Triadenum Raf.; Triadenium Rchb.; Martia Spreng.

Elodea*) Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 20: nov. g. (Hydrocharideum?) Triandr. Monogyn. *Cf.* Caspary 1858. Ann. wiss. Bot. I; 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 354.
Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 150. t. 128: g. Hydrocharidum.
Rich. 1811. Mém. Inst. II. p. 61: g. Hydrocharidear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 58. 874. n. 402. — Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 121. — Agdh. 1822. Aphor. p. 127. — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 160. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 196. — Bartl. 1830. Ord. p. 76. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 36. n. 155.
Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 803: g. Stratiotear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: g. Elodeacear.
Ritg. 1821. Marb. II. p. 112: g. Anacharidear.
Caspary 1857. Monatsber. Berl. Ak. p. 43: g. Hydrillear.
Synon. Udora Nutt.; Philotria Rafin.; Serpicula Rostk. & Schm.; Diplandra Bert.

Elodea Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 363; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 165. 353: g. Elodeinear. (Hypericum virginicum L., etc.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 308: g. Elodeinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5465 *a.* p. 1034; 1841. Ench. p. 539: sect. Elodeae.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 14: g. Elodear.

Elodeaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: fam. Hydrochariar. Gen.: Elodea, Anacharis, Hydrilla.

Elodeae Endl. 1840. Gen. p. 1033; 1841. Ench. p. 539: trib. Hypericinear. Gen.: Elodea, Vismia, Psorospermum, Haronga, Eliaea, Ancistrolobus, Tridesmis, Cratoxylon; Lancretia? — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 781. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406: trib. Hypericacear. Gen. ut Endl. (excepto ultimo) et Parnassia.

Elodeinae Rchb. 1837. Handb. p. 308: sect. Vismiear. Gen. Elodeinear. Spach.

Elodeineae Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 341. 362; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 353: sect. Desmostemonear. Gen.: Elodea, Elodes, Triadenia.

*) ἑλώδης, palustris.

Elodes*) „Clus." Adans. 1763. Fam. II. p. 444: g. Cistor. (Hypericum aegypticum L.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Hypericear.
Triadenia Spach.

Elodes Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 369; 1836. Ann. sc. nat. V. p. 171. 353: g. Elodeinear. (Hypericum elodes L.) *Cf.* Flora 1836. II. p. 683.
Rchb. 1837. Hdb. p. 308: g. Elodeinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5465 *b.* p. 1034; 1841. Ench. p. 539: sect. Elodeae.
Koch 1843. Syn. ed. II. p. 148: sect. Hyperici.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 320: g. Hypericinear.
Synon. Helobia Rchb.

Elodium Sulliv. 1856. Musc. Un. St. p. . . . : sect. Hypni. (H. paludosum.)
= Anomodon Müll. pt.

Elphegea Cassini 1818. Bull. soc. philom. Févr. p. 31; 1819. Dict. v. 14. p. 361: nov. g. Asterear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1831. Linnaea VI. p. 126.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 459; 1830. v. 60. p. 581: g. Psiadiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2522: g. Psiadiacear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Solidaginear.
= Psiadiae Jacq. pars.

Elphegea Lessing 1832. Syn. Compos. p. 182: g. Asterear. Subgen.: Detrioides, Zyrphelis, Polyarrhena.
= Agathaeae Cass., Mairiae et Feliciae DC. sp.

Elpidophora**) „Ehrenb." Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 172. 180: g. Sclerotiacear. (in foliis Palmarum.)
= Graphiola Poit.?

Elsbolzia Rchb. vid. *Elsholtzia Willd.*

Elschotzia Brongn. vid. *praeced.*

Elsholtia Koch vid. *praeced.*

Elsholtzia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 256. n. 1007: g. Dapsilophytor.
= Couroupita Aubl.

Elsholtzia***) Willd. 1790 in Römer & Usteri Mag. Bot. XI. p. 3; 1800. Spec. III. p. 59. n. 1098; 1809. Enum. p. 603: nov. g. Didynam. Gymnosperm. (E. cristata.) — Par. Roxb. 1832. Ind. III. p. 4 *(Elshotzia)*.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 259: g. Labiatar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 114. n. 1377. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 364. — Link 1822. En. II. p. 103. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 721. n. 2089; 1831. Gen. II. p. 471. n. 2323. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 824. (Sect. Rabdosia.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 433: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2868 (sph. *Elsbolzia*). — Bartl. 1830. Ord. p. 182.

*) ἕλος, palus.
**) ἐλπίς, fides, spes. (?)
***) Dicat. D. Joh. Sigism. Elsholtz.

Elsholtzia Willd. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Catariear.
Benth. 1833. Labiat. p. 164: sect. Elsholtziae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 714. — Endl. 1838. Gen. p. 612. n. 3588 c. — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4050. 1. — Walp. 1845. Rep. III. p. 584.
Koch 1837. Syn. p. 549. Ed. II. p. 631 (sph. *Elsholtia*): g. Menthoidear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163.
= Euelsholtzia Endl. *(Cf. Elsholzia Mönch.)*

Elsholtzia Benth. 1833. Labiat. p. 160. 713: g. Menthoidear. emend. Sect.: Aphanochilus, Cyclostegia, Elsholtzia. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 713. Sect. eaed. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 352. 403. — Brongn. 1843. En. genr. p. 68 *(Elschotzia)*.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188: g. Menthear.
Endl. 1838. Gen. n. 3588. p. 612; 1841. Ench. p. 306: g. Elsholtziear. Sect. ut Benth. (1841 Euelsholtzia). — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (192). — Rchb. 1841. Nom. p. 104. n. 4050. Sect. eaed. — Walp. 1845. Rep. III. p. 581. 979. Sect. eaed. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 159. Sect. eaed. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 335.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Elsholtzidar.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 965: g. Satureiear.

Elsholtzidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 661: trib. Menthear. Gen. Elsholtziear. Endl.

Elsholtzieae Endl. 1838. Gen. p. 612; 1841. Ench. p. 306: subtrib. Menthoidear. Gen.: Elsholtzia, Tetradenia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (192). Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 104: subdiv. Menthear. Gen. ead.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 149: div. Satureiear. Gen.: Pogostemon, Dysophylla, Colebrookia, Tetradenia; Elsholtzia.

Elsholzia Mönch 1794. Meth. p. 389: g. Petalostemonis.
Link 1829. Hdb. I. p. 461: g. Labiatar.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 315: g. Hyssopear.
= Elsholtzia Willd.

Elshotzia Roxb. vid. *Elsholtzia Willd.*

Elsneria*) Walpers 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 346: nov. g. Umbelliferar.
Endl. 1843. Spl. III. p. 81. n. 4370/$_1$: g. Mulinear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 843.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Mulinidar.
= Bowlesia Ruiz & Pav.

Elsota Adans. 1763. Fam. II. p. 358: g. Tithymalor. (Spartium Plum. ic. 247. f. 1. 248. f. 1.)
= Securidaca Linn.

*) Dicat. Maur. Elsner, auctori florae Cervimont.

Elutheria „Petiv. coll. 4. n. 276" Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 486: g. incertae sedis.
= Croton Eluteria Linn.

Elutheria P. Browne 1756. Jamaic. p. 369: in Appendice.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 87. 122: g. Xylocarpear. (Guarea? microphylla Hook.)
= Guarea Linn.?

Elvasia*) DC. 1811. Ann. Mus. XVII. p. 422. t. 20: nov. g. Ochnacear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 366. — St. Hil. 1825. Fl. bras. I. p. 69 adnot. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 817. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 389 (anomalum). — Meisn. 1837. Gen. p. 66 (47).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 812; 1827. Cur. post. p. 145; 1830. Gen. I. p. 305. n. 1558: g. Ochnear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5184. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1270.
DC. 1824. Pr. I. p. 738: g. Ochnaceis aff.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 214. n. 1431: g. Octandr. Monogyn.
Bartl. 1830. Ord. p. 384: g. Castelear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5957. p. 1142; 1841. Ench. p. 606. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 475.
Rchb. 1837. Hdb. p. 283; 1841. Nom. p. 197. n. 7542: g. Elvasiear.
Planch. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 255; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 648: g. Gomphiear. Subgen.: Euelvasia, Hostmannia. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 179. Sect. eaed. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99. n. 5961. Sect. eaed.

Elvasieae Rchb. 1837. Handb. p. 283; 1841. Nomencl. p. 197: sect. Ochnear. Gen.: Elvasia.

Elvela Linn. 1737. Gen. p. 327. n. 809; 1737. Cliff. p. 479; 1740. Syst. p. 32; 1745. Fl. suec. p. 384; 1753. Sp. II. p. 1180; 1759. Syst. ed. X. p. 1351. n. 1079; 1764. Gen. ed. VI. p. 568. n. 1214: g. Fungor. — Par. Gled. 1753. Meth. Fung. p. 36. — Scop. 1772. Carn. II. p. 476. *(Synon. Peziza, Pissida, Trombetta Adans.)*
Scop. 1777. Intr. p. 361: g. Fungoidear. — Par. Wigg. 1780. Holsat. p. 104.
Batsch 1802. Tab. p. 269: g. Fungoideor.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 217: sect. Pezizae.
= Helvella Linn.

Elvellaceae Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 1: div. Hymenomycetum. Subdiv.: Mitrati, Cupulati.

Elvellacei Fries 1825. Pl. homon. p. 84: ordo Hymenomycetum. Trib.: Mitrati, Cupulati, Claviculares, Stictei.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: subordo Ascomycetum. Gen.: Morchella, Helvella, Verpa, Geoglossum, Mitrula, Spathulea, Leotia, Rhizina, Peziza, Desmazierella, Solenia, Ascobolus, Agyrium, Stictis, Cryptodiscus, Melittiosporium, Cryptomyces, Propolis, Bulgaria, Cyttaria, Vibrissea, Sarea, Ditiola.

*) Dicat. Franc. Manuel d' Elvas.

Elvina Steud. Nomencl. 1840. I. p. 550: sphalm. pro *Elvira.*

Elvira Cassini 1824. Dict. v. 30. p. 67; 1825. v. 38. p. 17; 1829. v. 59. p. 235; 1830. v. 60. p. 577: nov. g. Millieriear. (Milleria biflora L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2704. — DC. 1836. Pr. V. p. 502. — Endl. 1838. Gen. n. 2457. p. 399; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 196 (129). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Bartl. 1830. Ord. p. 141: g. Helianthear.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 43: g. Melampodiear.

Synon. Meratia Cass.; Delilia Spreng.; Eugamelia Fl. mex.; Elvina Steud.

Elwendia*) Boissier 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 140: nov. g. Amminear. (E. caroides.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 852. — Endl. 1850. Spl. V. p. 4. n. $4406/_1$.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Elychrysum Tourn. 1700. Inst. p. 452. t. 259: g. pl. class. XII.

DC. 1805. Franç. IV. p. 130; 1815. V. p. 467: g. Corymbiferar. — Par. Math. 1853. Belg. I. p. 282.

HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 86: g. Vernoniacear. — Par. Kunth 1822. Syn. II. p. 398.

Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 348: g. Eupatorinear.

= Elichrysum Tourn.

Elymus Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 210: nov. g. plantar.

= Zizania Linn.

Elymus**) Linn. 1748. Upsal. p. 22; 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 20; 1753. Sp. I. p. 83; 1759. Syst. ed. X. p. 879. n. 91; 1762. Sp. ed. II. p. 122; 1764. Gen. ed. VI. p. 39. n. 96; 1767. Syst. ed. XII. p. 100: g. Triandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 107; 1784. Syst. p. 125. — Reich. 1778. Gen. p. 40. n. 102. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 54. n. 128. — Gmel. 1791. Syst. p. 197. — Pers. 1797. Syst. p. 129; 1805. Ench. I. p. 107. n. 195. — Willd. 1797. Sp. I. p. 467. n. 149; 1809. En. p. 130. — Hoffm. 1800. Bot. Tasch. III. 1. p. 63; III. 2. t. 11. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 401. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 86. — Trin. 1820. Fund. p. 152. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 717.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 135. — Host 1801. Gram. Austr. I. p. 21. t. 27. 28. — Link 1821. En. I. p. 99. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 79. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 71. 347. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 118.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 395. — Juss. 1789. Gen. p. 31. — Vent. 1799. Tabl. II.

Elymus Linn. cont.

p. 105. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 83. — DC. 1805. Franç. III. p. 90. — Hedw. 1806. Gen. p. 48. 364. — Palis. 1812. Agrost. p. 106. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 45. 773. n. 351. — Lois. 1819. Dict. v. 14. p. 367. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 327. n. 331; 1830. Gen. I. p. 70. n. 341. — Link 1829. Hdb. I. p. 5.

Gled. 1764. Syst. p. 15. n. 52: g. Thalamostemonum.

Neck. 1790. El. III. p. 224. n. 1604: g. Achyrophytor.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74; 1830. Gram. p. 146; 1833. Agrost. p. 449; 1838. Berol. II. p. 410: g. Hordeacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 174. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 91. Sect.: Elymus, Cuvieria. — Agdh. 1823. Aphor. p. 151. — Link 1827. Hdb. I. p. 14. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 17. — Koch 1837. Syn. p. 826. Ed. II. p. 954. — Endl. 1837. Gen. n. 915. p. 103; 1841. Ench. p. 59. Sect.: Psammochloa, Elymus. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 46. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 140. 391. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1377. Sect. ut Endl. — Meisn. 1843. Gen. p. 426 (326). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 10. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 244. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 433. — Steud. 1854. Glum. I. p. 348. Sect. ut Griseb. 1853. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 596.

Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 842: g. Cenchrinar. Sect.: Cuviera, Elymus.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Hordear.

Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 329: g. Triticear. Sect.: Medusather, Clinelymus, Psammelymus. — Par. Math. 1853. Belg. I. p. 635. (verar.)

Synon. Cuviera Köl.; Cuvieria Gray; Sitanion Raf.?; Sitospelos Adans.; Orthostachys Ehrh.

Elyna Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 155: nov. g. Triandr. Monogyn. — Par. Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 457.

Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 4. 156. n. 179: g. Cyperacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 188. n. 214. — C. A. Meyer 1833 in Ledeb. Alt. IV. p. 234.

Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 19): g. Kobresiar. *Cf.* Schult. Mant. II. p. 3.

Link 1827. Hort. I. p. 332; 1829. Hdb. I. p. 110: g. Cyperoidear.

Rchb. 1828. Consp. p. 55. n. 1065; 1830. Fl. exc. p. 55: g. Elynacear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Elynear. — Par. Nees 1834. Linnaea IX. p. 304. — Endl. 1837. Gen. n. 961. p. 111; 1841. Ench. p. 63. — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1440. — Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 147. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 48. n. 223: g. Cyperear.

---

*) Nomen a monte Elwend circa Ispahan.

**) Nomen e Dioscoride mutuatum.

Elyna Schrad. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Caricinar. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 245.
Kunth 1837. Cyper. p. 532: g. Caricinear. — Par. Lang 1851. Linnaea XXIV. p. 492. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 261.
Koch 1837. Syn. p. 746. Ed. II. p. 861: g. Caricear. — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 384.
Synon. Fröhlichia Wulf.
Elynaceae Rchb. 1828. Consp. p. 55 (1830. Fl. exc. p. 55): subdiv. Caricinar. Gen.: Elyna, Kobresia, Catagyna, Diaphora?
Elynanthus „Palis. mss." Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 21 et Schult. 1824. Mant. II. p. 4): nov. g. Cyperear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1094.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Cyperinar.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 298; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 77: g. Cladiear.
Endl. 1837. Gen. n. 977. p. 114; 1841. Ench. p. 64: g. Schoenoidear. Sect.: Elynanthus, Chapelliera. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1459. Sect. eaed.
Kunth 1837. Cyper. p. 308: g. Rhynchosporear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 412 (315). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146. — Steud. 1855. Glum. II. p. 153.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Schoenidar.
Synon. Trasus Palis.; Trasia Bartl.; Vincentia Gaudich.; Baumea Gaudich.; Chapelliera Nees.
Elyneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: subtrib. Caricear. Gen.: Elyna, Kobresia.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 304: trib. Cyperacear. Gen. ead. et Trilepis, Aulacorhynchus. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 111; 1841. Ench. p. 63. Gen.: Trilepis, Elyna, Kobresia. — Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316). Gen. ut Nees et Diaphora? — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 147. Gen. ut Nees.
Rchb. 1841. Nom. p. 40: subdiv. Caricinar. Gen. ut Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: subordo Cyperacear. Gen. ead.
Elyonorus Bartl. vid. *seq.*
Elyonurus*) Willd. 1805. Spec. IV. p. 941. n. 1869: g. Polygam. Monoec.
Palis. 1812. Agrost. p. 120: g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 49. n. 368. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 369.
Agdh. 1823. Aphor. p. 152: g. Sacharinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 964: g. Saccharinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31 (*Elyonorus*).
Conf. Elionurus Kunth.
Elythranthe Endl., Rchb. vid. *Elytranthe Blume.*
Elythranthe Endl. Ench. p. 14. n. 1594 *b:* vid. *Elytranthe Lindl.*
Elythraria Dietr. vid. *Elytraria Michx.*
Elythrophorus Dumort., Dietr., Steud. vid. *Elytrophorus Palis.*

*) ἑλύω, volvo, involvo; οὐρά, cauda.

Elythrostamna Bojer 1837. Hort. Maurit. p. 230 (ex Endl. Suppl. I. p. 1403): g. inter Jacquemontiam et Convolvulum collocatum. Quid?
Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4410: g. Convolvulear. genuinar.
Elytracanthus Rchb. vid. *Erythracanthus Nees.*
Elytranthe*) Blume 1829. Fl. jav. Loranth. p. 16: sect. Loranthi *Cf.* Schult. Syst. VII. p. 1611. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4586 *k.* p. 802; 1841. Ench. p. 399 (*Elythranthe*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 443.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 425: g. Loranthacear. (Symphyanthi DC. §. 1. 3. 4. 5). — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 234. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791 (*Elythranthe*). — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 832.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2719 (*Elythranthe*): g. Loranthear. genuinar.
Elytranthe Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. L: sect. Glossodiae. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 114. n. 1594 *b* (*Elythranthe*).
= Elytranthera Endl.
Elytranthera Endl. 1841. Gen. Suppl. I. p. 1367. n. 1594 *b:* sect. Glossodiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2162. 2.
Synon. Elytranthe Lindl.
Elytraria**) Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 8: nov. g. Diandr. Monogyn. (Tubiflora caroliniensis Gm. et Justicia acaulis L.) — Par. Vahl 1805. Enum. I. p. 106. n. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 23. n. 58. — Willd. 1809. Enum. p. 28. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 10. — Elliott 1821. Sketch I. p. 11.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 238: g. Acanthacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 12. 348. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 55. 139. n. 77. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 234. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 370. — Kunth 1823. Syn. II. p. 32. — Bartl. 1830. Ord. p. 185. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 64 (*Elythraria*).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 401: g. Scrofularinar.
Link 1821. En. I. p. 28: g. Acanthinar.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 77. n. 105; 1830. Gen. I. p. 24. n. 100: g. Acanthear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3110.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Elytrariear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190.
Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 75. 79; 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 285; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 13; 1847 in DC. Pr. XI. p. 62: g. Nelsoniear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4031. p. 697; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 293 (202). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Rchb. 1841. Nom. p. 110. n. 4297. — Brongn. 1843. En. genr. p. 63. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 770.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Nelsonear.
Synon. Tubiflora Gmel.

*) ἔλυτρον, involucrum.
**) ἔλυτρον, vagina.

Elytrarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: trib. Acanthidear. Gen.: Nelsonia, Elytraria, Adenosma.
Rchb. 1837. Hdb. p. 190: sect. Acanthariar. Gen. ead. et Ebermaiera, Elytracanthus.
Elytregia Isis vid. *seq.*
Elytrigia Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 74: nov. g. a Tritico sejunctum. *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 376 et Isis 1823. p. 701 *(Elytregia).*
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 853 *a:* sect. Agropyri.
= Agropyrum Gärtn.
Elytroblepharum Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 37. 43: sect. Panici. (P. eminens Steud.)
Schltd. 1854. Linnaea XXVI. 5. p. 533 *(Erythroblepharum):* g. Panicear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 439: sect. Digitariae.
Elytropappus Cassini 1816. Bull. soc. philom. Déc. p. 199: nov. g. Inulear. (Gnaphalium hispidum W.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 140.
Cass. 1819. Dict. v. 14. p. 376; 1822. v. 23. p. 563: g. Gnaphaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2442. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224: g. Seriphiear. verar.
Less. 1832. Syn. p. 342: g. Helichrysear. Subgen.: Elytropappus, Rhinocerotis. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 356. — Endl. 1838. Gen. n. 2759. p. 449; 1841. Ench. p. 243. — Meisn. 1839. Gen. p. 219 (138). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3480. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.
Elytropappus Lessing 1832. Syn. Compos. p. 343: subg. Elytropappi.
= Achyrocome Schrank.
Elytrophorum Poir. vid. *seq.*
Elytrophorus Palis. 1812. Agrost. p. 67. t. 14. f. 11: nov. g. Graminear. (Gramen alopecuroides Pluk.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 30. 519. n. 288. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 377 *(Elytrophorum).* — Spreng. 1825. Syst. I. p. 348. n. 343; 1830. Gen. I. p. 72. n. 352.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 898. p. 101; 1841. Ench. p. 59. — Meisn. 1843. Gen. p. 424 (324).
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 840: g. Cenchrinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63 *(Elythrophorus):* g. Cynosurear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1409.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear.
Kunth 1830. Gram. p. 128; 1833. Agrost. p. 391: g. Festucacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 139 *(Elythrophorus).* 372. — Steud. 1854. Glum. I. p. 300 *(Elythrophorus).*
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 399: g. Festucinear.
Synon. Echinalysium Trin.

Elytrospermum C. A. Meyer 1831. Mém. prés. Ac. Pet. I. p. 200. t. 2: nov. g. Cyperacear. (E. californicum.) *Cf.* Linnaea VII. Litt. p. 58.
Pterolepis Schrad.
Elytrostegia Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 689: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d.* 47. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4. *v.*
Embelia Juss. 1789. Gen. p. 427: nov. g. incertae sedis.
Gmel. 1791. Syst. p. 280: g. Tetrandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 354: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 384. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 285; ed. 1832. I. p. 586.
D. Don 1825. Nepal. p. 147: g. Myrsinear. — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 50; 1830. Gen. I. p. 129. n. 641. — Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3603. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 620. — Miq. 1852. Pl. Jungh. II. p. 187.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Ardisiacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 164: g. Embeliear. — Par. A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 81; 1844. Pr. VIII. p. 83. Sect.: Euembelia, Heterembelia. — Endl. 1842. Spl. II. p. 67. Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1010.
A. DC. 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 129; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 298: g. Ardisiear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 20. — Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 125. n. 4858. — Endl. 1839. Gen. n. 4223. p. 736; 1841. Ench. p. 359. — Meisn. 1839. Gen. p. 253 (162). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 374. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 70. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 286.
Synon. Ribes Burm.; Ribesioides Linn.; Aembilla et Ghaesaembilla Herm.; Rhamnicastrum Linn.; Pattara Adans.; Dauceria Dennst.
Embelica Bojer Hort. Maurit. p. 279 (teste Baill.): vid. *Emblica Gärtn.*
Embelieae Bartl. 1830. Ord. nat. p. 164: div. Ardisiacear. Gen.: Embelia, Othera.
A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 78. 131: trib. Myrsineacear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 67: sect. Ardisiear. Gen.: Embelia, Choripetalum.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 83: trib. Eumyrsineacear. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648: trib. Myrsinacear. Gen. ead. et Orixa?
Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 271: trib. Eumyrsinear.
Embira s. Pindaiba Pison. 1648. Brasil. p. 71.
= Xylopia Linn.
Emblemia Pers. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 184: nov. g. Graphidear. (Allographa dichotoma Chev.) *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 287.
= Sclerophyton Eschw.

Emblica*) Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 122. t. 108. f. 2. (Mirobalanus Emblica Rumph.)

A. Juss. 1824. Euphorb. p. 20; 1849 in Orb. Dict. V. p. 287: g. Euphorbiacear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 433.

Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 590: g. Phyllanthear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5076; 1841. Nom. p. 195. n. 7413. — Bartl. 1830. Ord. p. 378. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 495. — Endl. 1840. Gen. n. 5830. p. 1120; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 342 (254.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.

Spreng. 1826. Syst. III. p. 20. n. 2343; 1831. Gen. II. p. 529. n. 2600: g. Tricoccar. (Monadelph. Triandr.)

Baill. 1858. Euphorb. p. 626: sect. Phyllanthi. Injungitur Dichelactina.

Synon. Nelli-Camaram Rheede; Embelica Boj.; Phyllanthi sp. Linn.

Embolium Endl. 1836. Gen. n. 312 *b*. p. 26; 1841. Ench. p. 17: sect. Stemonitidis. (Mucor Embolus L.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 359. 2.

Embolus**) Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 8. t. 1. f. 1: nov. g. pl. class. I.

Wigg. 1780. Holsat. p. 110: g. Fungoidear. = Cephalotrichum Link.

Embolus Batsch 1783. El. Fung. I. p. 263. t. 30. f. 176.

Roth 1788. Germ. I. p. 557: g. Fungor. (E. bicolor.)

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 579: sect. Stemonitidis.

Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 563: g. Coniocymatior.

= Clathroidastrum Mich.

Embothrieae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 335: ordo Proteacear. Gen. §. 1: Anadenia, Grevillea, Hakea, Lambertia, Xylomelum, Orites, Ropala, Knightia, Embothrium, Oreocallis, Telopea, Lomatia, Stenocarpus. §. 2: Banksia, Dryandra.

Agdh. 1826. Aphor. p. 236: trib. Proteacear. Gen. ead. (Josephia loco Dryandrae.) — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 443. Gen. ut Rchb.

Rchb. 1828. Consp. p. 82: div. Proteacear. restricta. Gen.: Stenocarpus, Lomatia, Oreocallis, Embothrium, Telopea.

Endl. 1838. Gen. p. 342; 1841. Ench. p. 216: subtrib. Grevillear. Gen. ut Rchb. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 63. Gen. ead.

Embothrium***) Forst. 1776. Char. gen. p. 15. t. 8: nov. g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Linn. f. 1781. Spl. p. 16. n. 1364. — Murr. 1784. Syst. p. 166. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 162. n. 145. — Gmel. 1791. Syst. p. 279. — Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 15 *(Embotrium)*; 1798. Fl. peruv. I. p. 62. — Pers. 1797. Syst. p. 171; 1805. Ench. I. p. 117. n. 220. — Willd. 1797. Sp. I. p. 537. n. 168; 1809. En. p. 142.

Scop. 1777. Intr. p. 207: g. Dumosar.

Juss. 1789. Gen. p. 79: g. Protear.

*) Nomen vernaculum.

**) ἔμβολος, paxillus, ridicula.

***) βόθριον, foveola.

Embothrium Forst. cont.

Gis. 1792. Prael. p. 402: g. Contortar.

Batsch 1802. Tab. p. 183: g. Proteariar.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 187: g. Proteacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 74. n. 351. — R. Brown 1809. Linn. Trans. X. p. 195. (Verm. bot. Schr. II. p. 303.) — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 26. 431. n. 555. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 385. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 483. n. 527; 1830. Gen. I. p. 107. n. 537. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 536.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 337: g. Embothriear. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 237. — Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1766; 1841. Nom. p. 64. n. 2404. — Endl. 1838. Gen. n. 2152. p. 342; 1841. Ench. p. 216; 1847. Spl. IV. p. 88. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 287. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 443.

Meisn. 1841. Gen. p. 333 (245): g. Rhopalear.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Grevillear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Grevillidar.

Synon. Catas Juss. sp. (Steud.)

Embotrium Ruiz & Pav. vid. *praeced.*

Embryogonia Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 122: nov. g. Combretacear., inter Combretum et Cacouciam intermedium. (Combretum trifoliatum Vent.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 673.

Embryonatae Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt (1811.) p. 58: div. plantar. Subdivis.: Endorhizae, Exorhizae. Accedunt in editione germanica p. 172. 188 Synorhizae. = Phanerogamae.

Embryopteris Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 145. t. 29. f. 2: nov. g. plantar. (E. peregrina.)

Roxb. 1795. Corom. I. p. 49. t. 70: g. Dioec. Polyandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 836. n. 1836.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 347: g. Ebenacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 433. — Bartl. 1830. Ord. p. 161. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 41.

Rchb. 1828. Consp. p. 212 b. n. 3647 b: g. Mimusopear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 215: g. Diospyrear.

Endl. 1839. Gen. n. 4249 *b*. p. 743; 1841. Ench. p. 363: sect. Diospyri. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5290. 2.

= Eudiospyros A. DC. pt.

Embryosphaera Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 36: nov. g. Euprotococcear. (Chlorococcum infusionum Men.) *Cf.* Flora 1849. p. 611.

Emelia Wight vid. *Emilia Cass.*

Emeorhiza*) Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plantar.

Meisn. 1838. Gen. p. 158 (114): g. Cinchonear.?

Endl. 1842. Spl. II. p. 53. n. $3135/_1$: g. Euspermacocear., Machaoniae proximum.

Synon. Emmeorhiza Endl.; Endlichera Presl.

*) ἐμέω, vomeo.

Emericia Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXIII. 401. n. 739: g. Apocynear. (Pergularia glabra W.)
= Vallaris Burm.

Emerocallis Rach vid. *Eremocallis Salisb.*

Emerus*) Tourn. 1700. Inst. p. 650. t. 418: g. pl. class. XXII.
Adans. 1763. Fam. II. p. 326: g. Phaseolor.
Scop. 1777. Intr. p. 308: g. Leguminosar. — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 119. — Lois. 1819. Dict. v. 14. p. 401.
Medic. (Vorles. II. p. 368) 1789. Phil. Bot. I. p. 205.
Neck. 1790. El. III. p. 19. n. 1321: g. Cyteophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 156: g. Thalamostemonis.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear.
DC. 1825. Pr. II. p. 309: sect. Coronillae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3978 *b;* 1832. Fl. exc. p. 542; 1841. Nom. p. 152. n. 5951. 2. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 274. — Koch 1836. Syn. p. 187. Ed. II. p. 208. — Endl. 1840. Gen. n. 6585 *a.* p. 1280; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 694.
Scheele 1843. Flora II. p. 443: g. Papilionacear.

Emerus Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 93. t. 41.
Hornem. 1815. Hort. reg. Hafn. p. 666.
Schumach. 1827. Beskriv. Guin. pl.; 1829 in Danske Vid. Selsk. Afh. IV. p. 127. (E. aculeata.)
= Sesbania Pers.

Emex Necker 1790. Elem. bot. II. p. 214. n. 948: nov. g. Sysellophytor., a Rumice L. disjunctum.
Campd. 1819. Mon. Rumic. p. 18. 56: g. Polygonear. (Rumex spinosus L.) — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 162. n. 1386; 1830. Gen. I. p. 293. n. 1515. (Hexandr. Trigyn.) — Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4285. (genuinar.) — Link 1829. Hdb. I. p. 307. — Schult. 1830. Syst. VII. p. XC. 1476. — Bartl. 1830. Ord. p. 109. — Endl. 1837. Gen. n. 1992. p. 308; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 51. (verar.) — Meisn. 1840. Linnaea XIV. p. 489; 1841. Gen. p. 317 (228); 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 625. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1049. 1221. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 521. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 100. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504. — Webb . . . . Canar. III. p. 218.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Rumicear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162. n. 6310. — C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 143.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 290: g. Eupolygonear.
Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 5; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 40: g. Ceratogonear.
(Conf. Steinheil Ann. sc. nat. IX. p. 195.)
= Vibo Medic.

Emilia Cassini 1817. Bull. soc. philom. Avr. p. 68; 1819. Dict. v. 14. p. 405; 1825. v. 34. p. 393: nov. g. Senecionear. (Cacalia sagittata W.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3346. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 38. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 101.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 449. 461; 1830. v. 60. p. 583: g. Othonnear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2512. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 273.
DC. 1837. Pr. VI. p. 301: g. Eusenecionear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2793. p. 456; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (136). — Lemr. 1845 in Orb. Dict. V. p. 291.
Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 11 *(Emelia).* t. 1123: g. Senecionidear.
Synon. Crassocephali sp. Less.

Eminium Blume 1835. Rumphia I. p. 116: sect. Ari. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1676 *b.* p. 235; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 25. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1087. 2.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 16: g. Arinar.

Emmenanthe*) Benth. 1835. Linn. Trans. XVII. 1. p. 281: nov. g. Hydrophyllear. (E. penduliflora.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 397. — Endl. 1839. Gen. n. 3832. p. 660; 1841. Ench. p. 329. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (181). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 49.
Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4381: g. Nemophilear.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 301: g. Hydrophyllacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 639. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 291.

Emmenanthus Hook. & Arn. 1836 in Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 217: nov. g. ordinis incerti, Byttneriaceis et Tiliaceis accedens. (E. chinensis.)
= Ixonanthes Jack.

Emmeorhiza „Pohl" Endl. 1838. Gen. n. 3326. p. 565; 1841. Ench. p. 275: g. Rubiacear. dubiae tribus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2984. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 291.
Walp. 1843. Rep. II. p. 469; 1847. VI. p. 35: g. Euspermacocear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
Conf. Emeorhiza Pohl.

Emmoteae Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. IX. p. 223: trib. Icacinear. Gen.: Emmotum.

Emmotium Meisn. vid. *seq.*

Emmotum**) Desvaux 1825 in Hamilt. Pr. fl. Ind. occ. p. 29: nov. g. Pentandr. Monogyn. (E. fagifolium.)
Meisn. 1838. Comm. p. 112 *(Emmotium):* g. Rubiacear.? anomalum.
Walp. 1846. Rep. V. p. 137: g. Icacinear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 9. 15.
Miers 1852. Ann. and Mag. 2d. ser. IX. p. 223; X. p. 176: g. Emmotear.
Synon. Pogopetalum Benth.

---

*) Nomen ex Caesalpino originis incertae.

*) ἐμμενής, permanens.
**) ἐν, μοτός, linteum.

Emodiana Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 48: sect. Argyrolobii. (Cytisus flaccidus Royle.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 843.

Empedoclea*) St. Hilaire 1825. Fl. Bras. I. p. 19. t. 3: nov. g. Dilleniacear. (E. alnifolia.)
Spreng. 1827. Cur. post. p. 201; 1830. Gen. I. p. 422. n. 2096: g. (Polyandr. Monogyn.) Dilleniear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 207. 220. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 292.
Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4973: g. Delimear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4762. p. 843; 1841. Ench. p. 432. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 71: g. Delimacear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 2 (4).
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 192. n. 7272: g. Doliocarpear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413.

Empedoclea Benth. 1834. Labiat. p. 574; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 438: sect. Sideritidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 837. — Endl. 1838. Gen. n. 3655 *b*. p. 627; 1841. Ench. p. 308. — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4092. 2. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 144. — Walp. 1845. Rep. III. p. 848. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 694. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 401.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166: g. Stachydear.
Vid. Empedoclia Rafin.

Empedoclia Rafin. 1810. Caratt. gen. Sic. p. 78.
Synon. Navicularia Heist. *Conf. Empedoclea Benth.*

Empetraceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 117; 1847. Veg. kingd. p. 285: ordo Euphorbialium. Gen.: Empetrum, Corema, Ceratiola, Oakesia.
= seq.

Empetreae Nuttall 1818. Gen. am. II. p. 233: sect. Coniferar. Gen.: Ceratiola, Empetrum.
Don 1828. Edinb. n. phil. mag. II. p. 59.
Rchb. 1828. Consp. p. 196 (1832. Fl. exc. p. 765): subdiv. Rutariar. Gen.: Ceratiola, Corema, Empetrum, Cyminosma, Cneorum. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 196. Sect.: *genuinae* (gen.: Empetrum, Cyminosma [1841 emiss.], Ceratiola, Corema), Stackhousieae, Cneoreae.
Link 1829. Hdb. I. p. 617: subordo Ericear. Gen.: Empetrum.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (91) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 372: ordo (218) Tricoccar. Gen.: Empetrum, Corema, Ceratiola. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1105; 1841. Ench. p. 584. Gen. ead. Accedit 1843 (Spl. III. p. 97) Oakesia. — Meisn. 1841. Gen. p. 336 (249). Gen. ut Bartl.
Lindl. 1833. Nix. p. 25: ordo Urticalium.

*) Dicat. in memoriam Empedoclis Agrigentini.

Empetreae Nuttall cont.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 482: fam. (29) Tricoccar. Gen. ut Bartl.
Mart. 1835. Consp. p. 55: ordo 266.
Koch 1837. Syn. p. 625. Ed. II. p. 721: ordo Monochlamydear. Gen.: Empetrum.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 73: fam. Diospyroidear. Gen. id.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 292. Gen. ut Bartl.
Synon. Empetraceae Lindl.; Empetrideae Gray; Empetrineae Dumort.

Empetrideae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 732: fam. Monochlamydear. Gen.: Empetrum.
= praeced.

Empetrineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 80: fam. Sapindariear. (?) Gen.: Empetrum.

Empetrum*) Tourn. 1700. Inst. p. 579. t. 421: g. pl. class. XVIII.
Linn. 1737. Gen. p. 319. n. 775; 1740. Syst. p. 32; 1742. Gen. ed. II. p. 499. n. 935: g. Polygam. Trioec.
Linn. 1737. Cliff. p. 470: g. Polygam. Polyoec.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 162: g. ordinis 3 class. III.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 12. n. 41: g. Thalamostemonum.
Linn. 1753. Sp. II. p. 1022; 1759. Syst. ed. X. p. 1288. n. 977; 1763. Sp. ed. II. p. 1450; 1764. Gen. ed. VI. p. 515. n. 1100; 1767. Syst. ed. XII. p. 649: g. Dioec. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 737; 1784. Syst. p. 880. — Reich. 1778. Gen. p. 511. n. 1202. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 676. n. 1496. — Pers. 1797. Syst. p. 923; 1807. Ench. II. p. 605. n. 2184. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 712. n. 1759; 1809. En. p. 1009. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 197. 275.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 448: g. Cistor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Miscellanear.? — Par. Gis. 1792. Prael. p. 594.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 16: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 419: g. Dioicear.
Scop. 1777. Intr. p. 231: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 162: g. Ericis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 363.
Neck. 1790. El. II. p. 371. n. 1180: g. Osariphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 209: g. Triandr. Enneagyn.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 465: g. Bicornibus aff. — Par. Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 648.
Batsch 1802. Tab. p. 218: g. Ericariar.
Michx. 1803. Fl. am. II. p. 255: g. Polygam. Dioec.
Duchesne 1804. Dict. v. 6. p. 279 *(Camarine)*: g. Ericaceis aff.
DC. 1805. Franç. III. p. 685: g. Ericacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 521: g. Epacridum.

*) ἔμπετρον Plinii et Dioscoridis (in rupibus crescens.)

Empetrum Tourn. cont.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 233: g. Empetrear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 900. n. 3167; 1831. Gen. II. p. 705. n. 3552. — Don 1828. Edinb. n. phil. mag. II. p. 62. — Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5116; 1832. Fl. exc. p. 765; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 196. n. 7464. (genuinar.) — Link 1829. Hdb. I. p. 617. — Bartl. 1830. Ord. p. 373. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 483. — Lindl. 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1783. — Koch 1837. Syn. p. 625. Ed. II. p. 721. — Endl. 1840. Gen. n. 5761. p. 1106; 1841. Ench. p. 585. — Meisn. 1841. Gen. p. 336 (249). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 73. — A. Gray 1848. Mem. Amer. Ac. n. ser. III. p. . . . — Orb. 1849. Dict. III. p. 87 (*Camarine*). — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 555. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 74.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 401: g. Ericinar. (serius p. 732 Empetridear.) — Par. Link 1822. II. p. 422.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 80: g. Empetrinear.
Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 292: g. Ericeis aff.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 117; 1847. Veg. kd. p. 285: g. Empetracear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 293.

Emphysopus Hook. f. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 113: nov. g. Compositar. (E. Gunnii.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 719: g. Bellidear.

Emplectocladus*) Torrey 1853. Pl. Fremont. p. 10. t. 5 (*cf.* Flora 1853. p. 705): nov. g. Dryadear.? — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 656.

Empleurosma Bartling 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 228: nov. g. Diosmear. (E. virgata.)
Endl. 1850. Spl. V. p. 103. n. $6023/_1$: g. Eudiosmear.

Empleurum Soland. 1789 in Ait. hort. kew. III. p. 340: nov. g. Monoec. Tetrandr. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 812. n. 1765. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 333. n. 1654.
Juss. 1789. Gen. p. 298: g. Rutaceis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 107 (*Emplevrum*).
Gmel. 1791. Syst. p. 268: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 149. n. 325.
Batsch 1802. Tab. p. 55: g. Rutacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 77. n. 359. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 29. 461. n. 568.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. t. 211.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 33): g. Diosmear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 669; 1825. Syst. I. p. 454. n. 490; 1830. Gen. I. p. 110. n. 554. — DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140; 1824. Pr. I. p. 718. — Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 182. — Bartl. & Wendl. 1824. Diosm. p. 14. 200. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 476; 1849 in Orb. Dict. V. p. 294. — Bartl. 1830. Ord. p. 388. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 790. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 334. — Meisn. 1837. Gen. p. 61 (45). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 542.
Rchb. 1828. Consp. p. 201. n. 5228b: g. Dodonaeacear.
Endl. 1840. Gen. n. 6023. p. 1159; 1841. Ench. p. 612: g. Eudiosmear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7513: g. Agathosmear.

Emplevrum St. Hil. vid. *praeced.*

*Emproophytum**) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 285: g. 50 plant. Spec. natur.: Ambrosinia, Colocasia, Alocasia, Arum, Dracontium, Hovttinia, Calla, Orontium, Pothos, Acorus, Piperiphorum, Zostera, Rademachia, Saururus.

Emprosthea Achar. 1803. Meth. Lich. p. xxxv: sect. Peltideae.

Empusa**) Lindl. 1824. Bot. Regist. X. n. 822 not.: nov. g. Orchidear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 734. n. 3020; 1831. Gen. II. p. 671. n. 3390.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1830. Orchid. p. 17: g. Pleurothallear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Liparidar.
Conf. Empusaria Rchb.

Empusa Cohn 1854. Jahresber. XXXII. Schles. Ges. p. 43: nov. g. Entophytor. *Cf.* Bot. Zeit. 1858. p. 883.

Empusaria Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1566: g. Malaxidear.
Endl. 1837. Gen. n. 1333. p. 188; 1841. Ench. p. 109: g. Pleurothallear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1920. — Meisn. 1842. Gen. p. 369 (277). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.
Synon. Empusa Lindl., non Zoolog.

Enalcida Cassini 1819. Bull. soc. philom. Févr. p. 31; 1819. Dict. v. 14. p. 443; 1825. v. 38. p. 203; 1829. v. 59. p. 62; 1830. v. 60. p. 574: nov. g. Tagetinear. (1829 Archetypar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 16.
Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2355: g. Tagetear.
= Tagetis Tourn. pars.

Enantia Falconer 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 75: nov. g. Menispermacear.
= Sabia Colebr. (Hook. & Th.)

*Enantioblastae****) Martius 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 71: ordo plant. Fam.: Restiaceae, Eriocauleae, Xyrideae, Commelyneae.

---

*) ἐμπλεκτός, implicatus, innexus.

*) ἐμπρόω, exuro, accendo; φυτόν, planta.
**) ἔμπουσα, spectrum.
***) ἐναντίος, oppositus.

Enantioblastae Martius cont.
Endl. 1837. Gen. p. 119; 1841. Ench. p. 65: class. Amphibryor. Ordines: Centrolepideae, Restiaceae, Eriocauloneae, Xyrideae, Commelynaceae. — Par. Unger 1845. Syn. p. 168; 1846. Chlor. prot. p. LXVI. (Ordo: Restiaceae.)
Meisn. 1842. Gen. p. 406. 442 (310): class. 46 Monocotyledonear. Ordines: Commelinaceae, Mayaceae, Xyrideae, Eriocauleae, Restiaceae, Centrolepideae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: subdiv. Perispermear. Fam.: Centrolepideae, Restiaceae, Eriocauleae, Xyrideae, Commelineae.

Enantiotrichum E. Meyer in Herb. Dreg. = Euryops Cass.

Enargea*) „Banks" Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 283. t. 59. f. 3: nov. g. plant. (E. marginata.)
Schreb. 1789. Gen. I. p. 232. n. 598: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 547. — Willd. 1799. Sp. II. p. 230. n. 681.
= Callixene Comm.

Enartea „Gärtn." Steud. Nom. I. p. 553: leg. *Enargea*.

Enarthrocarpeae C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 212: trib. Orthoplocear. Gen.: Crambe et in adnot.: Enarthrocarpus. *Cf.* Meisn. 1837. Comm. p. 14.
Webb 1836. Canar. I. p. 82: subtrib. Brassicear. Gen.: Raphanus, Hirschfeldia, Rapistrum, Crambe.

Enarthrocarpus**) Labill. 1812. Syr. Decad. V. p. 4. t. 2; 1812. Bull. soc. philom. p. 57: nov. g. Cruciferar., Raphano aff. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 444 (*Enartocarpus*). — Lois. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 421.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 245; 1821. Syst. II. p. 660; 1824. Pr. I. p. 228: g. Raphanear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 260. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4970. p. 886; 1841. Ench. p. 451 (sph. (*Euarthrocarpus*). — Brongn. 1843. En. genr. p. 93. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 298. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 221.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 855. n. 2273; 1831. Gen. II. p. 513. n. 2517: g. Synclistar.
Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4727: g. Rapistrear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 212 in adnot.: g. Enarthrocarpear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 251; 1841. Nom. p. 179. n. 6914: g. Raphanistrear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 322: g. Lomentosar.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 728: g. Siliquosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355 (*Euarthr.*): g. Raphanidar.

*) ἐναργής, clarus, manifestus.
**) ἔναρθρος, articulatus.

Enarthrum Necker 1790. Elem. bot. III. p. 352. n. 1779: nov. g. Athrosophytor., a Conferva L. disjunctum.
— . . . ?

Enartocarpus Poir. vid. *Enarthrocarpus Labill.*

Encalypta*) Schreb. 1791. Gen. II. p. 759. n. 1643: g. Muscor. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 445. — Par. Roth 1800. Germ. III. p. 150. — Hedw. 1801. Spec. p. 60. (frondosar.) — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 11. 78. — DC. 1805. Franç. II. p. 453. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 31. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 72. — Mart. 1817. Erlang. p. 115. — Gray 1821. Br. pl. I. p. 725. — Agdh. 1822. Aphor. p. 107. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 152. n. 3304; 1831. Gen. II. p. 730. n. 3701. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 123. (odontostomor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 59.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 26: g. Calyptrator.
Palis. 1805. Prodr. Aëthéog. p. 25; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 448: g. Ectopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 220.
Brid. 1806. Musc. rec. Suppl. I. p. 88: g. Aploperistomator. — Par. Röhl. 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 115.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 36: g. Mitrocarpor.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 28: g. Peristomor. acrocarpor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 760: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 161.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 138: g. Acrocarpor. peristomor. — Par. Nees & Hornsch. 1827. Bryol. germ. II. 1. p. 25.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 247: g. Grimmoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 637: g. Barbulaceor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69 (*Eucalypta*): g. Grimmiear.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Encalyptar.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 97 (err. *Eucalypta*): g. Acrocarpor. aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 537. p. 52; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 80: g. Encalyptoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 915: g. Calyptrobryor.
Bruch, Schimp. & Gümb. . . . . Bryol. eur. Fasc. IV: g. Encalyptear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 169. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 299; 1849. ibid. VIII. p. 401. — Bayrh. 1849. Taun. p. 11.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 513: g. Calymperacear. Sect.: Psilotheca, Rhabdotheca.
Bruch, Schimp. . . . . Bryol. eur. III. p. III: g. Encalyptacear.
Synon. Leersia Hedw.; Bryi sp. Linn.

*) ἐγκαλύπτω, tego, abscondo.

Encalyptaceae Bruch & Schimp. . . . . Bryol. eur. III. p. III: fam. Muscor. Gen.: Encalypta.

Encalyptae Fürnrohr 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: fam. 6 Muscor. Gen.: Encalypta.

Encalypteae Bruch & Schimp. . . . . Bryol. eur. Fasc. IV: fam. Muscor. Gen.: Encalypta.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92: div. Bryacear. Gen. id.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 169: sect. Stegocarpor. Gen. id.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: fam. Acrocarpor. Gen. id.
Bayrh. 1849. Taun. p. 11: fam. Muscor. frondosor. Gen. id.

Encalyptoideae Hampe 1837. Linnaea XI. p. 80: fam. Muscor. Gen.: Encalypta.

Encelia Adans. 1763. Fam. II. p. 128: nov. g. Calthar.
Scop. 1777. Intr. p. 134: g. Flosculosar.
Juss. 1789. Gen. p. 186: g. Corymbiferar. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 522. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 411.
Gmel. 1791. Syst. p. 1261: g. Syngenes. Frustran. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 479. n. 1922.
Cavan. 1791. Icon. I. p. 44. t. 61. Char. ampliat.
Cass. 1819. Dict. v. 14. p. 447; 1825. v. 38. p. 17; 1829. v. 59. p. 139; 1830. v. 60. p. 576: g. Helianthear. (Archetypar., 1829 verar.) — Par. HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 206. — Kunth 1823. Syn. II. p. 467. — Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2626. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 42.
Less. 1832. Syn. p. 227: g. Rudbeckiear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 566. — Endl. 1838. Gen. n. 2524. p. 410; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 202 (131). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 357. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3615. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 300 (melius *Enchelya*).
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 317: g. Euhelianthear.
Synon. Pallasia L'Herit.; Coreopsidis sp. Jacq.; Eucalia Räusch.?

Encentrus Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 463: nov. g. pro Celastro lineari Thunb. propositum.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 190: g. Celastrinear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 82. n. 5679/1 *(Eucentrus)*: g. Evonymear.

Encephalartos*) Lehm. 1834. Pugill. VI. p. 3. t. 1—3: nov. g. Cycadear. *Cf.* Flora Lit. V. p. 166 et Ann. sc. nat. 2e sér. III. 1835. p. 59. — Par. Vriese 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. X. p. 152. — Steud. 1840. Nom. I. p. 553 *(Encephalartus)*. — Morris 1841. Ann. and Mag. VII. p. 113. — Meisn. 1842. Gen. p. 353 (264). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 136. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 300.
Endl. 1836. Gen. n. 705. p. 71; 1841. Ench. p. 50: g. Cycadeacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 30. n. 1067. — Endl. 1842. Spl. II. Add. p. 103 *(Encephallartes)*. Sect.: Artodendron, Macrozamia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 225.
Miquel 1839 in Hoev. & Vriese Tijdschr. VI. p. 94.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 442: g. Zamiacear.
Synon. Zamiae sp. Auct.

Encephalartos Miquel 1841. Mon. Cycad. p. 93; 1843. Linnaea XVII. p. 709: g. Cycadear., sejuncta Macrozamia restrictum. = Artodendron Endl.

Encephalartus Steud. vid. *Encephalartos Lehm.*

Encephalium Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 33: nov. g. Mucedinum. (Tremelloidear.) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 449.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 15: g. Tremellar.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 98: sect. Tremellae.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 569: g. Tremellinear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Tremelloideor.
= Naematelia Fries.

Encephallartes Endl. vid. *Encephalartos Lehm.*

Encephalographa Massalongo 1854. Geneacaena lich. p. . . . : nov. g. Lichenum.

Enchelya Lemaire vid. *Encelia Adans.*

Enchelyum Leman vid. *Enchylium Achar.*

Enchidium**) Jack 1835 in Bot. Mag. Comp. I. p. 257: nov. g. Euphorbiacear. (E. verticillatum.) — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 302. — Baill. 1858. Euphorb. p. 652 (incertae sedis).
Endl. 1840. Gen. n. 5838. p. 1119; 1841. Ench. p. 588: g. Phyllanthear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 343 (255). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7427: g. Cluytiear. genuinar.

Encholirium**) Martius 1830 in Schult. f. Syst. VII. p. LXVIII. 1233. n. 1478: nov. g. Bromeliacear. (E. spectabile.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1313. p. 184; 1841. Ench. p. 106. — R. Schomb. 1846. Berl. Gartenb. Verh. XVIII. 1. p. 156. (Char. emend.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 148.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1628: g. Tillandsiear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 395 (298). — A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 740.
Beer 1857. Fam. Brom. p. 16. 27: g. Eubromeliar.

*) ἐγκέφαλος, cerebrum; ἄρτος, panis.

*) ἔγχεια, hasta.
**) ἔγχος, hasta, sagitta.

Enchylaena R. Brown 1810. Prodr. I. p. 407. Ed. Nees p. 263: nov. g. Chenopodear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 216. — Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4353. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 228. n. 1197 (sph. *Euchylaena)*. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 587 *(Euchylaena)*; 1840. II. p. 995.
Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 451: g. Atriplicear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. XXIV. 251.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 923. n. 1092: g. Chenopodiear. (Pentandr. Digyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 297.
Endl. 1837. Gen. n. 1925. p. 295; 1841. Ench. p. 181: g. Kochiear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233). — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 127. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 302.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 97: g. Camphorosmear. — Par. Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 635. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1018.
Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6379: g. Betear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.

Enchylium*) Achar. 1810. Lich. univ. p. 629; 1814. Syn. Lich. p. 309: sect. Collematis. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 230. — Leman 1818. Dict. v. 10. p. 69 *(Enchelyum)*. — Flot. 1850. Linnaea XXIII. p. 152.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 396: g. Collematidear.
Massal. 1855. Lich. exs. It. I. p. 14; 1856. Flora I. p. 213: g. Omphalariear.
Rabenh. 1857. Lich. eur. exsicc. Fasc. IX. (Bot. Zeit. 1857. p. 624.)
Synon. Synalissa Nyl.

Enchylus Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 35; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Sedum annuum L.)

Enchysia**) Presl 1836. Prodr. mon. Lobel. p. 40: nov. g. Lobeliear. (Lobelia erinoides L.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 186 *(Euchysia)*; 1841. Nom. p. 102. n. 3992. — Meisn. 1839. Gen. p. 240 (147). — A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 408. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572.
Endl. 1838. Gen. n. 3061 *b*. p. 512; 1841. Ench. p. 264: sect. Laurentiae.
Synon. Monopsis sp. Salisb.

Encilia Rchb. vid. *Ercilla A. Juss.*

Enckea***) Kunth 1839. Linnaea XIII. p. 590: nov. g. Piperacear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 11. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 98.
Miq. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 288; 1852 in Mart. Fl. Bras. fasc. XI. p. 27: g. Piperear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 335 (248). — Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2575.

*) ἔγχυλος, succulentus.
**) ἔγχυσις, infusio.
***) Dicat. Astronomo J. F. Encke.

Enckea Kunth cont.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1823 *b*. p. 1374; 1841. Ench. p. 149: sect. Ottoniae.
Miq. 1844. Syst. Piperac. II. p. 346: g. Piperinar. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 17. n. 1823/8.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 518: g. Piperidar.
Synon. Piperis sp. Auct.

Enckianthus Desf. (teste DC.)
= Encyanthus Spreng.

Enckleia Griff. 1843 in Calc. journ. n. h. IV. p. 234 ex Walp. Ann. bot. I. p. 587: nov. g. Thymelaeear. *(Cf. Enkleia)*.
= Lasiosiphon Fres.

Encladium Rabenh. vid. *Eucladium Bruch & Schimp.*

Enclaytonia Ledeb. vid. *Euclaytonia Walp.*

Encliandra*) Zuccar. 1837. Abh. math. phys. Cl. bayr. Ak. II. p. 335: nov. g. Onagrariar.
Endl. 1840. Gen. n. 6125 *a*. p. 1193; 1841. Ench. p. 638: sect. Fuchsiae. Subsect.: Brebissonia, Lyciopsis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 94. Subsect. eaed.
Lilja 1841. Linnaea XV. p. 261: g. Fuchsiear.
Synon. Eucliandra Steud.

Encoelia**) Hill 1773. Syst. II. p. 56.
= Peziza Dill.

Encoelia Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 74: trib. Aleuriae.
Endl. 1836. Gen. n. 430 *C i*. p. 37; 1841. Ench. p. 21: subsect. Aleuriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 3 *a*. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 366.
Synon. Phibalis Wallr.; Octosporae sp. Hedw.

Encoelieae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 96; 1843. Phyc. gener. p. 336; 1845. Phyc. germ. p. 269; 1849. Sp. Alg. p. 551: fam. Pycnospermear. Gen.: Encoelium, Halodictyon (serius omissum), Striaria.

Encoelii Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 195: ordo Hydrophytor. Fam.: Dumontiae, Bryopsideae.

Encoelites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 32: g. foss. Fucoidar.
Endl. 1836. Gen. n. 122 *f*. p. 11; 1841. Ench. p. 8: sect. Fucoidis.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 33: g. Fucoiditum.
Unger 1843 in Endl. Spl. III. p. 54. n. 122/94: g. Algar. foss.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 5; 1846. Chlor. prot. p. XXVI: g. Phycear. foss. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57.

Encoelium***) Agardh 1821. Sp. Alg. I. 1. p. 144 (Aphor. p. 101): nov. g. Fucoidear.
Agdh. 1824. Syst. p. XXXVI. 261: g. Laminariear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 329: g. Fucacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 328. n. 3393: g.

*) ἐγκλείω, includo.
**) ἔγκοιλος, excavatus.
***) ἐγκοίλιον, intestinum.

Encoelium Agardh cont.
Phycoidear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 507: g. Dictyotear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 754. n. 3830: g. Solenotar.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 121: g. Placunthior.
Endl. 1843. Spl. III. p. 25. n. 98 *a:* sect. Asperococci. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 183. — J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 76.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 96; 1843. Phyc. gener. p. 336; 1845. Phyc. germ. p. 269; 1849. Sp. Alg. p. 551. n. 361: g. Encoeliear.
Conf. Asperococcus Grev.; Hydroclathrus Bory; Halodictyon Kütz.

Encopea*) Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 513 (Bot. Bemerk. p. 83): nov. g. Coffeear.? — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 37.

Encurea Walp. vid. *Enourea Aubl.*

Encyanthus Spreng. 1825. Syst. II. p. 287. n. 1543; 1827. Cur. post. p. 157; 1830. Gen. I. p. 333. n. 1686: g. Ericear. (Nomen emend.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3388. — Bartl. 1830. Ord. p. 155.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: g. Andromedear. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 757. n. 4326. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 308.
Rchb. 1841. Nom. p. 128. n. 4953: g. Ledear.
Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 86: g. Arbutear.
Conf. Enkianthus Lour.; Enckianthus Desf.; Enkyanthus DC.; Melidora Sal.

Encycla Nuttall . . . . Journ. Ac. Philad. n. ser. I.
= Eriogonum Michx.

Encyclia Hook. 1828. Bot. Mag. t. 2831: nov. g. Orchidear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 673. n. 3401.
Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1546; 1841. Nom. p. 52. n. 1969: g. Epidendrear. (1841 genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 58. — Lindl. 1831. Orchid. p. 111. — Endl. 1837. Gen. n. 1374. p. 193; 1841. Ench. p. 110. — Meisn. 1842. Gen. p. 372 (279). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 10. t. 113. 114.

Encyclium Lindl. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 81; 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. Misc. p. 28; 1853. Fol. Orchid. (10 Jan.) p. 3: subg. Epidendri. *Cf.* Endl. 1842. Spl. II. p. 16. n. 1371 *c.*
Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 137: subsect. Acranthii.

Encyclopia Benth. vid. *Eucyclopia.*

*) ἐγκοπή, fissura.

Encyonema Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 589 (Syn. Diat. p. 61): nov. g. Diatomacear. inclusar. (E. paradoxum.)
Endl. 1836. Gen. n. 13. p. 2; 1841. Ench. p. 2: g. Hydrolinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 642. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13.
Kütz. 1844. Bacill.; 1845. Phyc. germ. p. 87; 1849. Sp. Alg. p. 61. n. 40: g. Cymbellear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 39. — Math. 1853. Belg. II. p. 539.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: g. Encyonemear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. V. p. 308: g. Diatomear. (1849. ibid. XI. p. 418: g. Schizonemear.?)
Synon. Monema Berk.; Gloeonema Ehr.?

Encyonemeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 96: subtrib. Cymbellear. Gen.: Syncyclia, Encyonema.

Endacinus Rafin. 1814. Somiol. p. 51 teste Leman 1819. Dict. v. 14. p. 469. *Conf. Eudacinus.*
= Polysaccum DC.

Endallex Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 84): nov. g. Graminear. (Phalaris arundinacea.)
= Baldingera GMS.

Endespermum Blume 1823. Catal. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 132: nov. g. Hedysarear.
DC. 1825. Pr. II. p. 415: g. Dalbergiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4012. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 374. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 157. — Meisn. 1837. Gen. p. 95 (67).
Conf. Endospermum Endl.

Endiandra*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 402. Ed. Nees p. 258: nov. g. Laurinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 341 (*Endyandra*); 1825. Syst. I. p. 176. n. 189; 1830. Gen. I. p. 45. n. 208. — Agdh. 1825. Aphor. p. 227.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 343. 484. n. 137: g. Triandr. Monogyn.
Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 469: g. Laurinear. — Par. Juss. 1822. Dict. v. 25. p. 349. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16 (*Eudiandra* — genuin.) — Bartl. 1830. Ord. p. 112.
Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1905: g. Laurear.
Nees 1833. Progr. p. 12: g. Cryptocaryar.
Nees 1836. Laurin. p. 193: g. Cryptocaryear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 2033. p. 318; 1841. Ench. p. 197. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1331. 1341. — Meisn. 1841. Gen. p. 325 (238). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 470. — Rchb. 1841. Nom. p. 71. n. 2677. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 309. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 918. Subg.: Dictyodaphne.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.

*) ἔνδιον, cubiculum, sedes. (?)

Endictya Ehrenb. 1845. Ber. Ak. Berl. p. 71. 76: nov. g. Naviculaceor., Coscinodisco et Dictyopyxidi aff. (*E. oceanica.*)
= Coscinodiscus Ehrenb.

Endiplus Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 99: nov. g. Phacelidar., Phaceliae, Ellisiae et Hydrophyllo aff.
= Phacelia Juss.

Endivia C. Bauh. vid. *Intybus C. Bauh.*

Endlichera*) Presl 1832. Symb. bot. I. p. 73. t. 49: nov. g. Cinchonacear. (*E. brasiliensis.*) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 368.
= Emeorhiza Pohl.

Endlicheria Nees 1833. Linnaea VIII. p. 37: nov. g. Laurinar. (*E. hirsuta et sericea.*)
Nees 1833. Progr. p. 16: g. Oreodaphnear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 326 (238). *Vid.* Göppertia Nees.

Endoangiosporeae**) Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab.: sect. Angiosporear.

Endocarpaceae Arnold 1858. Flora p. 231: ordo Gnesiolichenum. Trib.: Endocarpeae, Dermatocarpeae.

Endocarpeae Fries 1825. Pl. homon. p. 258: trib. Gasterothalamor. Gen.: Endocarpon, Dermatocarpon, Sagedia, Porina. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 14; 1841. Ench. p. 10. Gen.: Pertusaria, Sagedia, Endocarpon.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: fam. Lichenariear. Trib.: *genuinae* (gen.: Endocarpon), Verrucarieae.
Fries 1831. Lich. eur. p. 5. 407: trib. 2 Lichenum (angiocarpor.) Gen.: Endocarpon, Sagedia, Chiodecton, Pertusaria. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 309 (gen. ead. et Porina); 1849. ibid. VII. p. 350. Gen. ut Endl. et Stegobolus, Thelotrema, Ascidium.
Genth 1836. Nass. I. p. 314. 388: ordo Pyrenocarpor. Gen.: Endocarpon, Sagedia, Pertusaria, Thelotrema, Verrucaria.
Rchb. 1841. Nom. p. 15: div. Gasterothalamar. Gen. ut Endl. et Thecaria.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 28: sect. Limboriear. Gen.: Endocarpon.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: fam. Lichenum (heteromericor. amphiblastor.) Gen. id. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 94. Gen. ut Endl. additis Stigmatidio et Thelotremate.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 119: div. Lichenum nucleiferor. Gen.: Endocarpon, Pertusaria, Petractis, Segestrella.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 14 (Flora 1854. p. 236): trib. Nucleiferar. Gen.: Thelocarpon, Endocarpon, Thelenella, Verrucaria, Limboria, Strigula, Endococcus.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 99: fam. Phylloblastor. Gen.: Endocarpon.
Arnold 1858. Flora p. 231: trib. Endocarpacear. Gen. id.

*) Dicat. Steph. Endlicher.
**) ἔνδον, intus.

Endocarpei Schärer 1850. En. Lich. eur. p. 231: fam. Lichenum verrucarioideor. Gen.: Endocarpon.

Endocarpicae Rchb. 1828. Consp. p. 21 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Gasteropsorar. Gen.: Sagedia, Dermatocarpon, Endocarpon, Antrocarpon.

Endocarpidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: trib. Gasterothalamear. Gen. Endocarpear. Endl.

Endocarpon Hedwig 1789. Stirp. crypt. II. p. 56. t. 20: nov. g. Lichenum. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 471. — Par. Achar. 1798. Lich. suec. p. 140. (foliaceor.) — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 18. 229 (*Endocarpum*). — DC. 1805. Franç. II. p. 413; 1815. V. p. 191. — Mart. 1817. Erlang. p. 253. (verrucosor.)
Pers. 1794 in Usteri n. Ann. I. p. 23: g. fam. tertiae plantar. lichenosar.
Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXI. 125: g. Idiothalamor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 43: g. Angiocarpor.
Achar. 1810. Lich. un. p. 55. 297; 1814. Syn. Lich. p. 97: g. Heterogeneor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 499: g. Verrucaridar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 92: g. Lobiolatar.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 324: g. Verrucariar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 78: g. Globigerear.
Eschw. 1824. Syst. p. 22: g. Dermatocarpear.
Meyer 1825. Flecht. p. 325: g. Myelocarpor. — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 185. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 239. n. 3360; 1831. Gen. II. p. 742. n. 3756.
Wallr. 1825. Nat. d. Flecht. I. p. 648.
Fries 1825. Pl. homon. p. 259; 1831. Lich. eur. p. 7. 407; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 119: g. Endocarpear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71. (genuinar.) — Genth 1836. Nass. I. p. 388. — Endl. 1836. Gen. n. 157. p. 14; 1841. Ench. p. 10. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 125; 1849 in Orb. Dict. V. p. 310; 1849. ibid. VII. p. 350. — Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 538. — Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 28. — Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 100. — Bayrh. 1849. Taun. p. 94. — Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 15. (Flora 1854. p. 236.) — Arnold 1858. Flora II. p. 531. — Lönnroth 1858. Flora II. p. 620. (*Synon. Dermatocarpon et Sphaeromphale Massal., Stigmatomma Körb.*)
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 873: g. Gasterothalamar.
Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 380: g. Endocarpicar.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 94 (*Endocarpum*): g. Verrucariear. — Par. Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 379.

Endocarpon Hedwig cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Endocarpidar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 231: g. Endocarpeor.
Math. 1853. Belg. II. p. 90: g. Lichenear. sect. 1.
Synon. Epistictum Ehrh.; Dermatocarpon Eschw.; Entosthelium Wallr.; Endococcus Nyl.?

Endocarpon Wallroth 1831. Fl. crypt I. p. 311: g. Pyrenocymatior. Sect.: Porosthelium, Entosthelium.
= Endocarpon Hedw. et Pertusaria DC.

Endocarpum GMS., Hampe vid. *Endocarpon Hedw.*

Endocladia J. Agardh 1841. Linnaea XV. p. 449: nov. g. Gloiocladear. (E. vernicata.)
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 66: g. Nemostomear.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 361 (Flora 1843. p. 99): g. Choristosporear. incertae sedis.
Endl. 1843. Spl. III. p. 137. n. $122/_{32}$: g. Nemastomear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 310; 1849. ibid. X. p. 54.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Nemastomidar.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 182: g. Endocladiear.
= Acanthobolus Kütz.

Endocladieae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 160: trib. Gigartinear. Gen.: Endocladia, Gloiopeltis.

Endoclini Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: subdiv. Clinosporeor. Sect.: Actinothyriei, Labrellei, Asteromei, Pestaloziei, Sphaeronaemei, Sphaeropsidei.

Endococcus Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 15 (Flora 1854. p. 236): g. Endocarpear. (Nomen.)

Endoconia Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 106: nov. g. Coniosporor.

Endodaca*) Rafin. 1828. Med. Flora I. Nr. 10: nov. g. ab Aristolochia sejunctum. *Cf.* Linnaea 1834. Litt. p. 98 et Endl. 1838. Gen. p. 345.
Rchb. 1837. Hdb. p. 173 (*Endodeca*): g. Pistolochiear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 560 (*Eudodeca*): g. Aristolochiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2578.
Meisn. 1841. Gen. p. 334 (246): sect. Aristolochiae.

Endodeca Rchb. vid. *praeced.*

Endodia Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. p. 220: nov. g. Graminear. *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 84.
= Leersiae Swartz pars.

Endodromia Berkeley 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 78: nov. g. Hyphomycetum. (Mucoris evolutio altior.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucorinor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Mucorineor.

*) ἑν, δώδεκα, duodecim. (Wittst.)

Endogenae DC. 1813. Théor. élém. p. 207. Ed. II. 1819. p. 248; 1818. Syst. I. p. 22: class. Cotyledonear.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: subclass. Vascularium. Tribus: Petaloideae, Glumaceae.
Lindl. 1833. Nix. pl. p. 32: class. III. plantar. Cohortes: Epigynae, Gynandrae, Hypogynae, Imperfectae, Glumaceae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 95: class. IV. plantar. Nixus: Glumales, Arales, Palmales, Hydrales, Narcissales, Amomales, Orchidales, Xyridales, Juncales, Liliales, Alismales.
Amphibrya Endl.

Endogenae cryptogamae DC. 1819. Théor. élém. ed. II. p. 249: div. Endogenar. Ordines: Naiades, Equisetaceae, Marsilacaceae, Lycopodineae, Filices.
= Acrobrya protophyta Endl.

Endogeneae Link 1829. Handb. I. p. 1: class. I. plant. Ordines: Gramineae, Cyperoideae, Junceae, Melanthaceae, Commelineae, Liliaceae, Amaryllideae, Bromeliaceae, Irideae, Scitamineae, Musaceae, Orchideae, Palmae, Cycadeae, Pandaneae, Aroideae, Asparagineae, Smilacinae, Parideae, Alismaceae, Stratioteae, Vallisneriaceae, Hydrocharideae, Hydrogetones, Hippurideae, Lemnaceae.

Endogenites Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 209. 210. 300: g. Vegetabilium fossilium class. I. (= Ligna monocotyledonea fossilia.)
Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXXVI: g. Palmar.
Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 137; 1828. Prodr. p. 126: g. Monocotyledonar. foss.
= Palmacites Brongn.

Endogenites A. Spreng. 1838. Comm. de psarol. p. 40.
= Fasciculites et Tubicaulis Cotta.

Endogloea*) Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 105: subg. Dudresnayae. (Dumontia Calvadosii Lamx.
= Nemalii sp. Kütz.

Endogloiosporeae Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab.: sect. Gloiosporear.

Endogone Link 1809. Berl. Mag. III. p. 33. f. 52: nov. g. Gastromycor. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 474.
Nees 1816. Syst. p. 158; 1817. Ueberbl. p. 40: g. Sphaeroideor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Pisocarpior.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 295: g. Tuberacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 563: g. Tuberear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 130: g. Tuberaceor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 10. n. 220. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 415. n. 3464; 1831. Gen. II. p. 762. n. 3887: g. Angiogasterum.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.

*) γλοῖα, gluten.

Endogone Link cont.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 864: g. Pyrenomycetum astomor.
Endl. 1836. Gen. n. 345. p. 30; 1841. Ench. p. 17: g. Tubereor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 327. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 245.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 25; 1842. Mycol. p. 100: g. Pisocarpiacear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 438: g. Endogoneor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Polygastreor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 238: g. Pisocarpiaceor.
Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 47: g. Myelomycetum fam. incertae.
Synon. Glomus Tul.

Endogonei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 438: div. Tuberaceor. Gen.: Endogone.

Endogonia Turczan. 1840. Bull. soc. Mosc. p. 257: sect. Myosotidis. (Flora 1842. Lit. p. 48.)
Endl. 1843. Spl. III. p. 78. n. 3772 *a β*: subsect. Myosotidis.
A. DC. 1846. Pr. X. p. 128: sect. Eritrichii. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 153.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.
Conf. Trigonotis Steven.

Endogonites „Brongn." Endl. in synon. Palmacitae: vid. *Endogenites Brongn.*

Endogymnosporeae Zanardini 1843. Classif. Fic. p. 10: sect. Gymnosporear. Tribus: Sargasseae, Fuceae.

Endogynia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 76: class. III. Vegetabilium. (Class. 10 et 11 Juss.) Subclass.: Synantheria, Corisantheria.

Endolasia Turczan. 1848. Bull. Mosc. XXI. 1. p. 579: nov. g. Cinchonacear., prope Voigtiam Kl. ponendum. (E. Funckii.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 711.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 790: g. Eucinchonear.

Endoleuca Cassini 1819. Bull. soc. philom. Mars p. 47; 1819. Dict. v. 14. p. 474; 1822. v. 23. p. 562: nov. g. Gnaphaliear. (Gnaphalium capitatum Lam.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2435. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Seriphiear. verar.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.
= Metalasiae R. Brown pars.

Endonema A. Juss. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 26: nov. g. Penaeacear. (Penaea lateriflora Thunb.) — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 74. n. $2117/_1$. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 322.
A. DC. 1856. Pr. XIV. 1. p. 490: g. Endonemear.

Endonemeae A. DC. 1856. Prodr. XIV. 1. p. 490: trib. Penaeacear. Gen.: Glischrocolla, Endonema.

Endoneuron Lév. vid. *seq.*

Endoneurum Czerniaiew 1845. Bull. Mosc. Nr. 3. p. 151: nov. g. Lycoperdinear. (Bovista suberosa Fries.) *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 130 et Flora 1847. I. p. 194.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505; 1849. ibid. VIII. p. 488 *(Endoneuron)*: g. Phellorineor.

Endophyllum Léveillé . . . . Bull. sc. nat. VI. p. 232; 1825. Ann. soc. Linn. Par. IV. p. 202: nov. g. Uredineor. (Uredo Sempervivi.)
= Ustilago Link.

Endopogon Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 76. 99; 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 285: nov. g. Aphelandrear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4075. p. 704; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4267. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 312.
Rchb. 1837. Hdb. p. 190: g. Ruelliariar.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 66: g. Acanthacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Justiciadar.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 103: g. Ruelliear. — Par. Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 19. t. 1497—1501. 1521.

Endopogoni Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: series prima Muscor. Trib. unica: Dawsoniaceae.

Endoptera*) DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 178: nov. g. Lactucear. Sect.: Gatyona, Nemauchenes. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 236 (145).
= Crepidium Tausch.

Endoptychum Czerniaiew 1845. Bull. soc. Mosc. Nr. 3. p. 146: nov. g. Lycoperdinear. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 130 et Flora 1847. p. 194.
= Gyrophragmium Mont.

Endopyrenium „Flotow mss." Schuch. 1855. Bot. Zeit. p. 131: nov. g. a Sagedia separatum. (S. cinerea Fr.)
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 323: g. Dacampiear. (emendat.)

Endorhizae Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt 1811. p. 58: subdiv. Embryonatar. *Cf.* Mirbel 1810. Ann. Mus. XVI. p. 419.
= Amphibrya Endl.

Endorima Rafin. 1819. Amer. monthl. mag.; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 260: novum nomen pro *Balduina Nutt.* propositum.
= Balduina Nutt.

Endosigma**) Bréhiss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 418: g. Schizonemear.

Endosperma Rafin. 1810. Caratt. gen. Sic. p. 91: g. Rivuliniar. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 277 et 1827. ibid. p. 45. n. 490.

---

*) ἔνδον, intus; πτερόν, ala.
**) Frustulae extremitatibus in formam S tortae.

Endospermum Endl. 1841. Gen. n. 6716. p. 1304; 1841. Ench. p. 673: g. Dalbergiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 6008. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 314.
= Endespermum Blume.

Endotheci Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: subdiv. Thecasporeor. Trib.: Rhegmostomei, Stegillei, Sphaeriacei, Angiosarci.

Endothia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 385: nov. g. Sphaeriaceor.

Endotricha „Fröl." DC. 1805. Fl. franç. III. p. 658: sect. Gentianae. (Gentianae endotrichae Fröl.) — Par. Griseb. 1834 in Hook. Fl. bor. am. II. p. 63. — Koch 1837. Syn. p. 491. Ed. II. p. 564.
= Amarellae Griseb. pars.

Endotriche Bunge 1829. Mém. soc. Mosc. VII. *(*1824.*)* p. 207. 243: sect. Gentianae. (G. Amarella, campestris, etc.)
= praeced.

Endotrichum Corda 1838. Icon. Fung. II. p. 25. t. 12. f. 94: nov. g. Pyrenomycetum. (E. xylogrammicum.)
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 258: g. Leptostromateor.
Corda 1842. Ic. Fung. p. 35; 1842. Mycol. p. 146: g. Labrellulinor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 142: g. Sphaeronemear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Phragmotrichaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Hysterieor. *(*p. 492 Labrelleor.*)*

Endotrichum Dozy & Molk. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 303; 1845. Musc. fr. Arch. Ind. Fasc. I. t. 1. 2: nov. g. Muscor., Neckerae et Carovagliae comparatum. *(*E. densum et elegans.*)*
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 403: g. Muscor. minus cognitum.
= Cyrtopus Brid.

Endotropis Endl. 1838. Gen. n. 3462. p. 591; 1841. Ench. p. 299: nov. g. Cynoctonear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 *(*175*)*. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 314.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 128. n. 4960. *(*genuinar.*)*
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Asclepiadear. verar. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 546: g. Eustegiar.
Synon. Diploglossum Meisn.?; Cynanchi sect. 2 R. Brown; Cynanchi sect. 5 Wight & Arn.; Periplocae sp. Retz.

Endoxylae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 11: div. prima plant. Subdivis.: Sepalanthae, Coronanthae, Petalanthae.

Endrach Flac. 1661. Madag. p. 137. f. 100.
= seq.

Endrachium Juss. 1789. Gen. p. 133: nov. g. Convolvulor. *(Endrach Flac.)*
Gmel. 1791. Syst. p. 339: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 176. n. 415.

Endrachium Juss. cont.
Batsch 1802. Tab. p. 210: g. Convolvulacear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 478. — Bartl. 1830. Ord. p. 192.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 307: g. Convolvulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 113. n. 502.
= Humbertia Comm.

Endressia*) Gay 1832. Ann. sc. nat. XXVI. p. 223.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 315: g. Seselinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4446. p. 777; 1841. Ench. p. 379. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5439. — Walp. 1843. Rep. II. p. 405. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 700. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 314.
Meisn. 1838. Gen. p. 143 (104): g. Amminear.? et p. 145 (105) Seselinear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Endusa Miers 1851. Ann. nat. hist. 2d. ser. VIII. p. 172: nov. g. Olacinear.

Endyandra Spreng. vid. *Endiandra R. Brown.*

Endymion Dumort. 1827. Fl. belg. p. 140; 1829. Anal. fam. p. 60: g. Asphodelear.
Koch 1837. Syn. p. 722. Ed. II. p. 834: g. Hemerocallidear.
Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 214: g. Hyacinthear.
Synon. Agraphis Link.

Enemion Rafin. 1820. Journ. Phys. XCI. p. 70.
DC. 1824. Pr. I. p. 48: g. Helleborear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 254. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 47. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 29. — Endl. 1839. Gen. n. 4791. p. 848; 1841. Ench. p. 435. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 315.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7240: g. Isopyrear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 291: g. Isopyrinear.
Steud. 1840. Nom. I. p. 554 *(Enemium)*: g. Ranunculacear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 217. 338.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 660: sect. Isopyri.

Enemium Steud. vid. *praeced.*

Enemosyne Lehm. vid. *Eremosyne Endl.*

Enerthenema**) Bowman 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 152. t. 16: nov. g. Gasteromycetum. (E. elegans.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 167.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 800. n. 4145: g. Trichogasterum.
Endl. 1836. Gen. n. 314. p. 26; 1841. Ench. p. 17: g. Stemoniteor.
Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 361: g. Trichiaceor.

---

*) Dicat. Endress, peregrinatori botan.
**) ἔνερθε, inferne, sub.

Enerviae Rchb. 1828. Consp. p. 77; 1831. Fl. exc. p. 145. 147; 1837. Handb. p. 161; 1841. Nomencl. p. 59: ordo Synchlamidear. Formationes: Najadeae, Imbricatae.

*Engastriocarpa**) Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 45: class. XI. Cryptogamor. Ordines: Sclerocarpa, Sarcocarpa, Dermatocarpa.

Engelhardia „Lesch." Blume 1825. Bijdr. Nr. 10. p. 528: g. Amentacear.
= seq.

Engelhardtia**) „Leschen." Blume 1828. Fl. jav. Fasc. VIII. p. 5. t. 1—5: g. Juglandear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 180. — Meisn. 1837. Gen. p. 74 (54). — Endl. 1840. Gen. n. 5892. p. 1127; 1841. Ench. p. 597. — Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5632. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 841.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 696. n. 3511: g. Amentacear. (Monoec.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 293: g. Juglandacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 316.
Synon. Dammara Rumph.; Pterilema Reinw.; Engelhardia Blume.

Engelia***) Karsten mss. ex Bot. Zeit. 1847. p. 694: nov. g. Acanthacear., Mendoziae aff.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 721: g. Thunbergiear.

Engelmannia†) Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 253: nov. g. Crotonear. (Croton ellipticum Nutt.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 98. n. $5826/_1$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Meisn. 1843. Comm. p. 369: g. Eucrotonear.
Synon. Angelandra Endl. 1850.

Engelmannia Torrey & Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 283: g. Silphiear. (E. pinnatifida.)
= Angelandra Endl. 1843.

Engelmannia Pfeiffer 1845. Bot. Zeit. p. 673; 1846. ibid. p. 18: nov. g. Cuscutacear. (Cuscuta suaveolens Ser.) *Cf.* Walp. 1847. Rep. VI. p. 544 adnot.
Visiani 1847. Fl. Dalm. II. p. . . . : sect. Cuscutae. *Cf.* Flora 1848. I. p. 9.
= Cuscutina Pfeiff.

Engizostoma††) Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 508. 519: nov. g. Spherideár. (Sphaeria ciliata, corniculata, microstoma, leucostoma, scutellata Pers. et pustulata Hoffm.)
= Valsa Adans.

Englemannia „Gray mss." Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 343: nov. g. Silphiear. (E. pinnatifida.)
= Engelmannia Torr. & Gray.

Engyzostoma „Gray" Endl. in synon. Valsae: vid. *Engizostoma Gray.*

*) *ἐγγάστριος*, quod in ventre est.
**) Dicat. N. Engelhardt, gubernatori Javae bor. occid.
***) Dicat. Engelio, dum vivebat Theatro Berolinensi praeposito.
†) Dicat. botanico G. Engelmann.
††) *ἐγγίζω*, approximo.

Enhalus*) Rich. 1811. Mém. Inst. II. p. 64: nov. g. Hydrocharidear. (Stratiotes acoroides L.) — Par. Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 121. — Agdh. 1822. Aphor. p. 127 (*Evhalus*). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 4 (*Euhalus*).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: g. Stratiotear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 112 (*Evhalus*). — Meisn. 1842. Gen. p. 365 (273). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 142. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 237.
Endl. 1837. Gen. n. 1212. p. 262; 1841. Ench. p. 95: g. Stratiotidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 34. n. 1157. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 323.
Synon. Acorus marinus Rumph.

Enhydra DC. 1836. Prodr. V. p. 636: g. Flaveriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2574. p. 418; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132). — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3015. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 100 (*Enhydros*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 324. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 83.
= Enydra Lour.

Enhydros Hassk. vid. *praeced.*

Enicostema**) Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 848: nov. g. Gentianear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 250. (verar.) — Steud. 1840. Nom. I. p. 555 (*Enicostemma*).
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 135: g. Hippiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 66: g. Erythraeacear.
Conf. Henicostemma Endl.

Enicostemma Steud. vid. *praeced.*

Enkianthus***) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 276. Ed. Willd. p. 339: nov. g. Decandr. Monogyn. (E. quinqueflora et biflora.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 366. — Hedw. 1806. Gen. p. 317. n. 1254.
Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 510: g. Rhodoracear. — Par. Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 410. (?)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Ericacear.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 833: g. Andromedear.
Meisn. 1839. Gen. p. 247 (154): g. Arbutear.
= Encyanthus Spreng.

Enkleia (an *Enckleia?*) Griffith 1843. Calc. journ. IV. Nr. 13. p. 139: nov. g. Thymelaear. *Cf.* Flora 1844. II. p. 434.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 587: g. Daphnoidear.
= Lasiosiphon Fries.

*) *ἅλς*, sal, mare.
**) *ἑνικός*, simplex, unicus.
***) „*ἔγκυμος*, praegnans."

Enkyanthus DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 732: g. Ericacear. dubiae tribus.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1371. 1398: g. Ericear.
Endl. 1841. Ench. p. 370. n. 4326: g. Andromedear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Andromedidar.
= Encyanthus Spreng.

Enkylia Griffith . . . . On Dr. Cantor's coll. p. 27. not. t. 4.
Endl. 1850. Spl. V. p. 50. n. 5121/2: g. Nhandirobear.

*Enneandria**) Linn. Gen., Syst., Spec. etc., sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. IX. plantar. Ordines: Mono-, Tri-, Hexagynia.

Enneapogon „Desv. mss." Palis. 1812. Agrost. p. 81. t. 16. f. 11: nov. g. Graminear. (Pappophorum gracile R. Br., etc.) — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 70. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 36. 615. n. 315. — Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 512.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Chlorideär.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Pappophorear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 91: sect. Pappophori. — Par. Kunth 1833. Agrost. p. 254. — Endl. 1837. Gen. n. 830 *a*. p. 92; 1841. Ench. p. 58. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1304. 1. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 404. — Steud. 1854. Glum. I. p. 199.

Enneastemones Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 57: vid. *Plantae All.*

Enodium „Pers. et Gaud." Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 31. 531. n. 291: g. Graminear. (Aira coerulea L.)
„Palis." Link 1821. Enum. I. p. 79: g. Graminum.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1029 *b*: sect. Moliniae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Poëar. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 77.
Math. 1853. Belg. I. p. 616: g. Festucear.
= Molinia Mönch.

Enomeia Spach vid. *Einomeia Raf.*

Enosanthes A. Cunningh. mss. *Cf. Euosanthes.*
= Homoranthus Cunn. (teste Schauer.)

Enourea*) Aublet 1775. Guian. I. p. 587. t. 235: nov. g. Polyandr. Trigyn. (E. capreolata.)
Scop. 1777. Intr. p. 291: g. Columniferar.
Juss. 1789. Gen. p. 249: g. Sapindis aff.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 697: g. Sapindear. — Par. Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 36. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 662. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (37)? — Endl. 1840. Gen. n. 5604. p. 1069; 1841. Ench. p. 561. — Walp. 1842. Rep. I. p. 414 (*Encurea*). — Lindl. 1847.

*) ἐννέα, novem.
**) Nomen vernaculum *Eymara-enourou.*

Enourea Aublet cont.
Veg. kd. p. 385. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 329.
Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 514: g. Saponacear.
DC. 1824. Pr. I. p. 618: g. Sapindaceis aff.?
Rchb. 1828. Consp. p. 201. n. 5239: g. Cardiospermear.
Bartl. 1840. Ord. p. 363: g. Paulliniear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 199. n. 7587: g. Cupaniear.?
Synon. Geeria Neck.; Enurea Gmel.

Enrila*) Manuel Blanco 1837. Flora de Filip. p. 709: nov. g. Monoec. Pentandr. (E. dichotoma.) *Cf.* Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 329.
Endl. 1841. Gen. n. 6884. p. 1332; 1841. Ench. p. 685 (*Eurila*): inter genera dialypetala minus nota. *Cf.* Meisn. 1843. Comm. p. 373.

Ensaluta**) Zobel 1854 in Corda Icon. Fung. VI. p. 54: nov. g. Tuberaceor. genuinor. (Tuber panniferum Tul.)

Ensatae Linn. 1751. Phil. bot. p. 27: ordo 5 plantar. Gen.: Iris, Gladiolus, Antholyza, Ixia, Sisyrinchium, Commelina, Xyris, Eriocaulon, Aphyllanthes.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 6 plantar. Gen.: Ferraria, Sisyrinchium, Crocus, Ixia, Wachendorfia, Antholyssa, Gladiolus, Moraea, Iris, Xyris, Eriocaulon, Callisia, Commelina, Tradescantia, Pontederia. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170. Gen. ead. et Dilatris, Witsenia, Xiphidium, Galaxia.
Batsch 1802. Tab. p. 143: fam. unica Gladialium. Gen.: Galaxia, Sisyrinchium, Tigridia, Ferraria, Iris, Moraea, Ixia, Marica, Watsonia, Gladiolus, Antholyza, Witsenia, Aristea, Crocus, Xyphidium, Wachendorfia, Dilatris, Argolasia.
Bell.-Gawl. 1805 in Konig Ann. bot. I. p. 219: ordo plantar. Gen.: Crocus, Trichonema, Geissorhiza, Hesperantha, Sparaxis, Ixia, Anomatheca, Tritonia, Watsonia, Gladiolus, Melasphaerula, Antholyza, Babiana, Wachendorfia, Dilatris, Aristea, Witsenia, Lapeyrousia, Moraea, Galaxia, Ferraria, Iris, Marica, Tigridia, Sisyrinchium, Pardanthus.
Eckl. 1827. Verz. p. 11: fam. plant. Ordines: Irideae, Ixiaceae, Gladioli.
Rchb. 1828. Consp. p. 59; 1830. Fl. exc. p. 3. 80: formatio Caulo-Acroblastor. Fam.: Irideae, Narcisseae, Bromeliaceae.
Bartl. 1830. Ord. p. 40: class. (XI.) Monocotyledoneor. Ordines: Burmanniaceae, Hypoxideae, Haemodoraceae, Irideae, Amaryllideae, Bromeliaceae. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 390. 442 (292). Ord. iid. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 395. Fam. eaed.
Endl. 1837. Gen. p. 159; 1841. Ench. p. 93: class. Amphibryor. Ordines: Hydrocharideae, Burmanniaceae, Irideae, Haemodo-

*) Dicat. Don Pascual Enrile.
**) Anagramma nominis Tulasne.

Ensatae Linn. cont.
raceae, Vellozieae, Hypoxideae, Amaryllideae, Agaveae, Bromeliaceae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 141; 1841. Nom. p. 43: formatio Caulocoleophytor. Familiae: Typhaceae, Irideae, Narcissineae.
Leunis 1849. Schul-Naturg. II. p. 188: ordo (48) Symphysogynar. Fam.: Amaryllideae, Irideae, Bromeliaceae.

Ensifera Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 394: sect. Malaxidis. (M. lunata, similis, microphylla, equitans, etc.)

Enslenia Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 35: g. Acanthacear.? *Cf.* Poir. 1825. Dict. v. 34. p. 352, ubi proponitur nomen *Nelensia.*
= Pedicularis Rchb.

Enslenia*) Nuttall 1818. Gen. amer. I. p. 164: nov. g. Pentandr. Digyn.
Poir. 1819. Dict. v. 14. p. 517: g. Apocynear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 850. n. 981; 1830. Gen. I. p. 211. n. 1077: g. Asclepiadear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 202 (*Enslinia*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580. 901. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI; 1828. Consp. p. 131. n. 3428 (*Enslinia*): g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 143: g. Asclepiadear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4975. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3483. p. 593; 1841. Ench. p. 299: g. Euasclepiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 269 (176).
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 518: g. Haplostemmar.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 330: g. Euasclepiadear.
Synon. Ampelanus Rafin.

Enslinia Rchb., Bartl. vid *Enslenia Nutt.*

Enslinia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 399: nov. g. Dichaenaceor., Poroniae aff. (Sphaeria Pocula, candida.)

Enstoma A. Juss. vid. *Eustoma G. Don.*

Entada Adans. 1763. Fam. II. p. 318: g. Cassiar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 325. n. 1590; 1830. Gen. I. p. 350. n. 1770: g. Leguminosar. (Decandr. Monogyn.)
DC. 1825. Pr. II. p. 424 (Lég. mém. XII): g. Mimosear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4161. — Bartl. 1830. Ord. p. 417. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 381. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 49. — Meisn. 1837. Gen. p. 96 (68). — Brongn. 1843. En. genr. p. 133.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX; 1841. Nom. p. 156. n. 6129: g. Acaciear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 267. — Endl. 1841. Gen. n. 6832. p. 1325; 1841. Ench. p. 683. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 330.
Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 332: g. Adenantherar.

Entada Adans. cont.
Walp. 1842. Rep. I. p. 858; 1846. V. p. 578: g. Adenantherear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 44.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 473: g. Mimosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Eumimosear.
Synon. Gigalobium P. Browne; Pusaetha Linn.; Adenopodia Presl; Mimosae sp. Auct.

Entagonum Poir. vid. *Entoganum Banks.*

Entaticus*) Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 198. 205: nov. g. Orchidear. (Satyrium albidum et viride L.)
= Gymnadeniae R. Brown pars et Coeloglossum Hartm.

Entelea**) R. Brown 1824. Bot. Mag. n. 2480 (Verm. bot. Schr. V. p. 423): nov. g. Tiliacear. (E. arborescens.) — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 201; 1830. Gen. I. p. 425. n. 2112. (Polyandr. Monogyn.) — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 541. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4. — A. Cunn. 1840. Ann. nat. hist. IV. p. 22. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 234. — Brongn. 1843. En. genr. p. 76. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 31.
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5438; 1841. Nom. p. 209. n. 7965: g. Tiliear. (genuinar.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 36 (28).
Endl. 1840. Gen. n. 5368. p. 1007; 1841. Ench. p. 522: g. Grewiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.

Enteridium***) Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 14: nov. g. Lycogalactum. *Cf.* Leman 1823. Dict. v. 26. p. 401.
Ehrenb. 1820 in Link Jahrb. I. 2. p. 55: g. Gastromycetum, Lignydio aff.
Fries 1825. Pl. homon. p. 146: g. Aethalinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 180; 1841. Nom. p. 9. n. 345. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 254.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 532. n. 3521: g. Aërogasterum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 336: g. Placogasterum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 22; 1842. Mycol. p. 90: g. Reticulariacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 142.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Reticularicor.
= Reticularia Bull. (Spreng., Endl.)

Enterobotryum Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 733: nov. g. Sphaeriaceor. (E. conicum.)

Enterobryus Leidy 1849. Proc. Philad. Ac. IV. p. 225; 1850. Ann. nat. hist. V. p. 72; 1853. Smiths. Contrib. V. Art. 2. p. 19. t. 1—4: formatio mycodermacea in intestinis animalium viventium.

Enterographa Fée 1825. Meth. p. 17. t. 1. f. 12.
Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 543. 7: sect. Opegraphae?
= Sagedia Achar.

*) Dicat. Aloysio Enslen, peregrinatori botanico.

*) *ἐντατικός*, roborans.
**) *ἐντέλεια*, perfectio: ob filamenta omnia antherifera.
***) *ἔντερον*, intestinum.

Enterolobium Martius 1837. Herb. Bras. p. 128.
Endl. 1841. Gen. n. 6837 *d.* p. 1326; 1841. Ench. p. 683: sect. Ingae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6134. 4.
Meisn. 1843. Comm. p. 353: g. Mimosear.
Benth. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 223: g. Acaciear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 621. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.

Enteromorpha Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 5: nov. g. Confervar. (Ulva intestinalis L.) *Cf.* Flora 1821. II. p. 511 et Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 332.
Link 1826 in Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 192: g. Ulvacear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 406; 1841. Brit. Alg. p. 173; 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 264. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 181; 1849 in Orb. Dict. X. p. 53. — Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 117; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327. (Flora 1843. p. 92.) — J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 15. — Hass. 1845. Brit. freshw.-Alg.
Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. . . . : g. Ulvoidear.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 20: g. Ulvear. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 129. — Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . — Aresch. 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 414. — Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 56.
Endl. 1843. Spl. III. p. 19. n. 58 *a:* sect. Ulvae.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phyc. gener. p. 300; 1845. Phyc. germ. p. 247: g. Enteromorphear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 6. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 132.
Synon. Ilea Fries; Hydrosolen Mart.; Solenia Agdh.; Tubularia Rouss.; Fistularia Grev.

Enteromorpha Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 478. n. 298: g. Enteromorphear., injuncta Zignoa et segregata Phycoseride emendat.
Synon. ut supra et Percursaria Menegh.

Enteromorpheae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 94; 1843. Phyc. gener. p. 300; 1845. Phyc. germ. p. 246: fam. Dermatoblastear. Gen.: Enteromorpha, Chlorosiphon (1845 omiss.), Stictyosiphon, Dictyosiphon. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 6. Gen.: Enteromorpha. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 475. Gen.: Phycoseris, Enteromorpha, Physodictyon.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 132: subsect. Ulvear. Gen. ut Kütz. 1845.

Enteropogon Nees 1836 ex Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 448. *Cf.* Steud. 1854. Glum. I. p. 216.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163: g. Chloridear.
= Heterostega Desv.?

Enthostodon Rchb. vid. *Entosthodon Schwägr.*

Entobasides Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: subdiv. Basidiosporeor. Trib.: Coniogastri, Cyophorei, Hysteraugiei.

Entodesmium*) Riess 1854. Hedwigia Nr. 6: nov. g. Pyrenomycetum.

Entodon C. Müll. 1844. Bot. Zeit. p. 740; 1844. Linnaea XVIII. p. 704: nov. g. Muscor. (Leskea compressa Hedw., etc.) — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 403 (minus cognitum).
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 248: g. Leskeacear.
C. Müll. 1850. Syn. II. p. 59; 1850. Bot. Zeit. p. 658: sect. Neckerae.
Synon. Cylindrothecium Bruch & Schimp.

Entoganum „Banks" Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 331. t. 68. f. 6: nov. g. plant. (E. laevigatum.)
Poir. 1823. Dict. v. 29. p. 523 (*Entagonum, Mélicope*): g. Octandr. Monogyn.
= Melicope Forst.

Entoloma Fries 1836. Epicr. p. 143; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 286: subg. Hyporhodii. — Simil. Bail 1858. Syst. p. 38. t. 37.
Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 502. 4 *e:* subsect. Hyporrhodii. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 508.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.

*Entomomycetes***) Wallroth vid. *Entomophyta Wallr.*

Entomoneis Ehrenb. 1845. Ber. Berl. Ak. p. 71: nov. g. Naviculaceor. (ibid. p. 154 ad Naviculam reductum.)
= Amphiprora Ehrenb. (Kütz.)

Entomophlomus Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 47: sect. Verbasci. (V. pinnatifidum, undulatum.)

Entomophyta Wallroth 1844. Beitr. z. Bot. I. 2. p. 154: div. Fungor. Sect.: Hyphoentomycetes, *Entomomycetes pileati* (gen.: Coprinus), Entomo-pyrenomycetes.

Entomo-pyrenomycetes Wallroth 1844. Beitr. z. Bot. I. 2. p. 162: sect. Entomophytor. Gen.: Kentrosporium.

Entomycelium Endl. vid. *seq.*

Entomyclium Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 189: nov. g. Sporomycetum episporor.
Endl. 1836. Gen. n. 194. p. 17 (*Entomycelium*); 1841. Ench. p. 13: g. Stilbosporeor.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 33: g. Phragmidiaceor.? — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 33.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 3; 1842. Mycol. p. 12: g. Caeomacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: inter genera Fungalium minus nota.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.?
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 506: sect. Sporidesmii.

Entophyllina Rchb. 1828. Consp. p. 31: div. Jungermannieor. Gen.: Lejeunia, Jungermannia.

Entophyllocarpi Brid. 1822. Meth. musc. p. XVII. 186: ordo Peristomor. Gen.: Octodiceras, Fissidens.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XL. 668: class. 5 Muscor. Gen. ead. et Schistostega, Drepanophyllum, Phyllogonium.

---

*) ἐντός, intus.
**) ἐντομή, incisio.

Entophyllocarpi Brid. cont.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: fam. 17 Muscor. Gen. ut Brid. 1827 et Rhizogonium?
Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. I. p. 90: series Bryacear. Gen.: Drepanophyllum, Phyllogonium, Fissidens.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 94: subdiv. Acromitrior. Fam.: Fissidenteae, Drepanophylleae.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 303: div. Bryacear. Subdivis.: Fissidenteae, Schistostegeae.

Entophyllocarpia Rchb. 1828. Consp. p. 32: div. Bryoideor. Gen.: Schistostega, Drepanophyllum, Octodiceras, Phyllogonium, Fissidens, Rhizogonium.

Entophyllocarpiae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Homorganor. caulosporor. Gen.: Fissidens, Schistostega, Rhizogonium.

Entophyllocarpica Rchb. 1837. Handb. p. 138: div. Phyllobryorum.

Entophysalis Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 85; 1843. Phyc. gener. p. 177; 1845. Phyc. germ. p. 154: nov. g. Hydrococcear. — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 72.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 225. n. 169: g. Palmellear.

Entophytae Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XXXIX: ordo Coniomycetum. Subordines: Hypodermia, Stilbosporei. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 549.

Entophytae Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLIII: sect. Mucedinum. Gen.: Sepedonium, Mycogone.

Entophyti Nees 1816. Syst. p. 9.
Fries 1825. Pl. homon. p. 188: ordo Coniomycetum. Tribus: Sporodesmii, Stilbosporei, Naemasporei, Hypodermii.
Rchb. 1828. Consp. p. 3: div. Uredineor. Subdivis. ut Fries et *Ambigui* (gen.: Exosporium, Sporidesmium, Corynodesmium).
Endl. 1836. Gen. p. 16; 1841. Ench. p. 13: subordo Gymnomycetum. Gen.: Papularia, Uredo, Aecidium, Cylindrosporium, Bullaria, Puccinia, Sporidesmium, Gymnosporangium.
Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 245: ordo Gymnomycetum. Fam.: Aecidinei, Uredinei.

Entopogoni)* Palis.-Beauv. 1805. Prodr. Aethéog. p. 27: sect. 3 Muscor. Gen.: Streblotrichum, Tortula, Barbula, Cieclidotus, Hymenopogum. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 14. p. 549. — Par. Palis. 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 453. Gen.: Cieclidotus, Streblotrichum, Tortula, Barbula, Diphiscium, Buxbaumia.

Entospira Brébisson mss.
= Cylindrocystis Kütz.

Entosthelium Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 316: sect. Endocarpi.
= Endocarpon Hedw.

*) ἐντός, intra; πώγων, barba.

Entosthodon*) Schwägr. 1823. Suppl. II. 1. p. 44. t. 113: nov. g. Muscor. frondosor.
Brid. 1826. Bryol. un. I. p. 378: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLV g. Funariar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 661 *(Enthostodon)*: g. Funariaceor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59 *(Entostodon)*: g. Funarioidear.
Endl. 1836. Gen. n. 555. p. 53; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 30; 1849 in Orb. Dict. V. p. 337; 1849. ibid. VIII. p. 400: g. Funariear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 933: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1843. Bot. Zeit. p. 505; 1848. Syn. Musc. I. p. 120: g. Funariacear. — Par. Bruch & Schimp. . . . . Bryol. eur. III. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 88. — Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 371. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 91.
C. Müll. 1844. Linnaea XVIII. p. 696: subg. Physcomitrii.
Synon. Bergia Fürnr.

Entosthymenium**) Brid. 1826. Bryol. univ. I. Suppl. p. 761: nov. g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIII Gymnostomoideis aff.) *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 337.
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 587: g. Gymnostomeor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Desmatodontoidear.
Endl. 1836. Gen. n. 488. p. 48; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 863: g. Calyptrobryor.
C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 635: g. Pottiacear. dubium.

Entostodon Fürnrohr vid. *Entosthodon Schwägr.*

Entothrix Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 86; 1843. Phycol. gener. p. 202; 1845. Phycol. germ. p. 167; 1849. Sp. Alg. p. 273. n. 193: nov. g. Leptotrichear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 48. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 81. — Bréb. 1849 in Orb. Dict. V. p. 337.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: g. Leptothricear.

Enuchoglossum Endl. vid. *Eunuchoglossum DC.*

Enula Necker 1790. Elem. bot. I. p. 4. n. 1: g. Actinophytor.
= Inula Gärtn.

Enula Duby 1828. Bot. gall. I. p. 267: sect. Inulae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 358. Ed. II. p. 392.
= Bubonium DC.

*) ἔντοσθεν, intus.
**) ἔντοσθεν, intus; ὑμήν, membrana.

Enurea Gmelin 1791. Syst. p. 748: g. Dodecandr. Monogyn.

Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 13: g. Saponaceis aff.

= Enourea Aubl.

Enydra*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 510. Ed. Willd. p. 624: nov. g. Syngenes. Polygam. Segregat. (E. fluctuans.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 499. n. 1964.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 898: g. Cynarear.

Cass. 1819. Dict. v. 14. p. 553; 1825. v. 38. p. 17: g. Milleriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2705. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21.

Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 236; 1830. v. 60. p. 577: g. Sigesbeckiear.

Synon. Meyera Schreb.; Sobreyra Ruiz & Pav.; Meyera et Sobrya Pers.; Hingtsha Roxb.; Tetraotis Reinw.; Phyllimena Blume (an Phyllinema Bl. ex Endl.?); Enhydra DC., Endl., Meisn.; Enhydros Hassk.

Enydria Arrab. Fl. Flum. I. t. 150: g. Myriophyllear. (aquatica) ex Steud. Nom. I. p. 555.

= Myriophyllum Vaill. (Endl. Gen. p. 1196.)

Enymonospermum Spreng. mss.

= Pleurospermum Hoffm.

Epacreae Rchb. 1828. Consp. p. 128; 1837. Handb. p. 203: subdiv. Epacridear. Sect.: Richeaceae, Sprengeliaceae, Lysinemaceae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 123. Subdivis.: Richeeae, Sprengelieae, Lysinemeae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: trib. Epacridear. Gen.: Dracophyllum, Sprengelia, Andersonia, Lysinema, Epacris, Ponceletia, Cosmelia. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 760. Gen.: Epacris, Lysinema, Prionotes, Cosmelia, Andersonia, Ponceletia, Sprengelia, Cystanthe, Pilitis, Richea, Dracophyllum, Sphenotoma. — Endl. 1839. Gen. p. 748; 1841. Ench. p. 368. Gen. ead. et Allodape (1841 Lebetanthus). — Meisn. 1839. Gen. p. 249 (157). Gen. ut DC. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 71. Gen. ex DC. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 342. Gen. ut Endl.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 434: sect. Epacridear. Gen. ut Endl. et Dacryanthus.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449: trib. Epacridacear. Gen. ut Endl.

Conf. Epacrieae G. Don; Epacridear. sect. 2 R. Brown; Epacrideae genuinae Bartl.

Epacridaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 222; 1847. Veg. kingd. p. 448: ordo Ericalium. Trib.: Styphelieae, Epacreae. — Par. Alef. 1856. Linnaea XXVIII. p. 6.

*) ἔνυδρος, aquaticus; quare haud bene nomen mutavit DC.

Epacrideae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 535. Ed. Nees p. 391: ordo Dicotyledonum monopetalar. Gen. §. 1: Styphelia, Astroloma, Stenanthera, Melichrus, Cyathodes, Lissanthe, Leucopogon, Monotoca, Acrotriche, Trochocarpa, Decaspora, Pentachondra, Needhamia, Oligarrhena. §. 2: Epacris, Lysinema, Prionotes, Cosmelia, Andersonia, Ponceletia, Sprengelia, Cystanthe, Richea, Dracophyllum. *Cf.* Juss. 1819. Dict. v. 15. p. 1.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: ordo Aridifoliar.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL: div. Primulear. Gen.: Coris; Melichrus, Lissanthe, Monotoca, Richea, Styphelia, Prionotes, Dracophyllum, Ponceletia, Sprengelia, Andersonia, Lysinema, Epacris.

Rchb. 1828. Consp. p. 127: div. Lysimachiacear. Subdivis.: Stypheliaceae, Epacreae.

Link 1829. Hdb. I. p. 601: subordo Ericacear. Gen.: Epacris.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21. 28: fam. Ericariear. Trib.: Epacreae, Stenanthereae.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (171) Monopetalar.

Bartl. 1830. Ord. p. 157: ordo (96) Ericinear. Divis.: Styphelieae, *genuinae* (gen. Epacridear. §. 2 R. Brown). — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 248 (156). Tribus: Styphelieae, Epacreae.

Kunth 1831. Hdb. p. 442.

D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 152: trib. Ericacear.

G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 773: ordo Calyciflorar. Trib.: Styphelieae, Epacrieae. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 734. Trib.: Styphelieae, Epacreae.

Mart. 1835. Consp. p. 26.

Rchb. 1837. Hdb. p. 203; 1841. Nom. p. 123: div. Plumbaginear. Subdivis.: Stilbeae, Styphelieae, Epacreae.

Endl. 1839. Gen. p. 746; 1841. Ench. p. 366: ordo Bicornium. Trib. ut DC. — Par. Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 12.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 432: fam. (154) Ericinear. Sect.: Styphelieae, Epacreae.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 70: fam. Ericoidear. Trib. ut Meisn.

Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 342. Trib. ut DC.

Synon. Epacridaceae Lindl.; Ericarum gen. Juss.

Epacrides Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 517: ordo Ericear. Gen.: Epacris, Lysinema, Cosmelia, Andersonia, Sprengelia, Cystanthe, Styphelia, Cyathodes, Monotoca; Empetrum, Ceratiola, Hudsonia, Vaccinium, Argophyllum, Baeobotrys.

Epacridium DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 759: sect. Pentachondrae. (An genus proprium?) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4793. 2.

Epacrieae G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 774. 781: trib. Epacridear. Gen. Epacridear. §. 2 R. Brown et Sphenotoma.

= Epacreae DC.

Epacris*) Forst. 1776. Char. gen. p. 19. t. 10: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 19. n. 1369. — Murr. 1784. Syst. p. 198. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 113. n. 279. — Gmel. 1791. Syst. p. 336. — Cavan. 1797. Icon. IV. p. 25. t. 344. 345. (reform.) — Pers. 1797. Syst. p. 205; 1805. Ench. I. p. 173. n. 397. — Willd. 1797. Sp. I. p. 834. n. 315; 1809. En. p. 198.

Scop. 1777. Intr. p. 193: g. Speciosar.

Juss. 1789. Gen. p. 161: g. Ericar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 360. — Hedw. 1806. Gen. p. 108. n. 483.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 77. t. 94.

Batsch 1802. Tab. p. 218: g. Ericariar.

Labill. 1804. Nov. Holl. I. p. 41. t. 55—58.

Smith 1805. Exot. bot. I. p. 75. t. 39. 40.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 550. Ed. Nees p. 406: g. Epacridear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 2. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXIX. 379. n. 729. — Link 1821. En. I. p. 210; 1829. Hdb. I. p. 602. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 628. n. 672; 1830. Gen. I. p. 154. n. 772. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL. — Bartl. 1830. Ord. p. 158. — Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1531. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 687. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 343. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 166.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 518: g. Epacridum.

Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3352: g. Lysinemacear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Epacrear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 760. — Endl. 1839. Gen. n. 4281. p. 748; 1841. Ench. p. 368. — Meisn. 1839. Gen. p. 249 (157). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 437. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 71. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 449.

G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 781: g. Epacriear.

Rchb. 1841. Nom. p. 123. n. 4821: g. Lysinemear.

Epactium „Willd. mss." Schult. 1827. Mantissa III. p. 15. 254: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (E. arenarium.)

Epallage**) DC. 1837. Prodr. VI. p. 3: nov. g. Euanthemidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2638. p. 429; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 209 (134).

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 25: g. Anthemidear. (verar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 343.

Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3057: g. Ptarmicear.

Synon. Helicta Less.; Anthemidis sp. Boj.

Epallage Endl. 1838. Gen. n. 2098 *f.* p. 331; 1841. Ench. p. 209: sect. Pimeleae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2429. 6.

Endl. 1847. Spl. IV. p. 61. n. 2093 *d:* sect. Calyptrostegiae.

Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 511: subsect. Eupimeleae.

*) ἐπί, ἄκρις, cacumen.

**) ἐπαλλαγή, permutatio: alludens ad mutationem nominis et ordinis.

Epaltes Cassini 1818. Bull. soc. philom. Sept. p. 139; 1819. Dict. v. 15. p. 6: nov. g. Vernoniear.? (Ethulia divaricata L.)

Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 339; 1830. v. 60. p. 586: g. Plucheinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 461. — Endl. 1838. Gen. n. 2422. p. 393; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 38. — Walp. 1843. Rep. II. p. 600 *(Epalthes).* — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Less. 1830. Linnaea V. p. 147: g. Tarchonanthear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 343.

Less. 1832. Syn. p. 206: g. Epaltidear.

Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3558: g. Plucheinar.

Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Eumicropear.

Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 61: g. Conyzear.

Synon. Ethulia Gärtn.

Epalthes Walp. vid. *praeced.*

Epaltideae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 205: div. Tarchonanthear. Gen.: Micropus, Filago, Epaltes, Leptogyne, Denekia, Cylindrocline, Pluchea, Tessaria, Gynheteria.

= Plucheineae Cass.

Epanthae Link 1829. Handb. I. p. 622: subclass. 6 Exogenear. Ordines: Campanulaceae, Lobeliaceae, Stylideae, Cucurbitaceae, Rubiacinae, Sambucinae, Caprifoliaceae, Halesiaceae, Valerianeae.

Eperua*) Aublet 1775. Guian. I. p. 369. t. 142: nov. g. Decandr. Monogyn. (E. falcata.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 672. — Blanco 1837. Fl. Filipin. p. 368.

Scop. 1777. Intr. p. 300: g. Leguminosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 349. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 206. — Pers. 1805. Ench. I. p. 462. n. 1027. — Hedw. 1806. Gen. p. 317. n. 1252. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 17.

Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.

Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsicar.

DC. 1825. Pr. II. p. 510: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 457. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (70).

Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 4130; 1841. Nom. p. 155. n. 6102: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 118. — Endl. 1841. Gen. n. 6800. p. 1319; 1841. Ench. p. 674. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 346.

Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.

Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Amherstiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 844. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.

Synon. Rotmannia Neck.; Panzera Willd.

Epeteiorhiza**) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 449: sect. Physalidis. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 24. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 440.

*) Eperu, nomen fructus in Guyana.

**) ἐπέτειος, annuus.

Epetetiorhiza Steud. Nomencl. II. 1841. p. 328: vid. *praeced.*

Epetorhiza Steud. Nomencl. I. 1840. p. 556: vid. *praeced.*

Ephebe*) Fries 1825. Pl. homon. p. 256: nov. g. Collemacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 396; 1841. Nom. p. 16. n. 556. — Endl. 1836. Gen. n. 161. p. 14; 1841. Ench. p. 10. — Bornet 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 155.
Mont. 1842 in Orb. Dict. II. p. 792; 1849. ibid. VII. p. 351: g. Coenogoniear.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 48: sect. Collematis. — Par. Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 378.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 122: g. Byssear. — Par. Flot. 1850. Linnaea XXIII. p. 150. 171.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Ephebidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 346: g. Byssacear. — Par. Flot. 1850. Bot. Zeit. p. 73.
Bornet 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 168: g. Lichenum. Char. emend. *(Synon. Stigonema Ag.)*
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 8 (Flora 1854. p. 232): g. Ephebear.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 353: g. Byssaceor. (Status evolutionis: Thermutis.)

Ephebeae Nylander 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 8 (Flora 1854. p. 232): trib. Lichinacear. Gen.: Ephebe, Gonionema.

Ephebidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: sect. Hymenothalamear. Gen.: Micarea, Ephebe, Coenogonium.

Ephebopogon Nees & Meyen . . . . g. Andropogonear. (Steud. 1840. Nomencl. I. p. 556.)

Ephebus „Lindl. Linn. Trans. VI." Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 670: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d* 39. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4 *n.*

Ephedra**) Tourn. 1700. Inst. p. 663. t. 477: g. pl. class. XVIII. *Cf.* Linn. 1747. Cl. plant. p. 361.
Linn. 1737. Gen. p. 312. n. 766; 1737. Cliff. p. 465; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. II. p. 1040; 1759. Syst. ed. X. p. 1298. n. 1007; 1763. Sp. ed. II. p. 1472; 1764. Gen. ed. VI. p. 532. n. 1136; 1767. Syst. ed. XII. p. 661: g. Dioec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 750; 1784. Syst. p. 895. — Reich. 1778. Gen. p. 528. n. 1242. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 707. n. 1554. — Pers. 1797. Syst. p. 937. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 858. n. 1843; 1809. En. p. 1024. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 201. 304.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 145: g. Coniferar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 354. — Juss. 1789. Gen. p. 411. — Gis. 1792. Prael. p. 586. — Vent. 1799. Tabl. III.

*) ἔφηβος, puber.
**) ἐφέδρα Plinii.

Ephedra Tourn. cont.
p. 575. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 325. — DC. 1805. Franç. III. p. 280. — Pers. 1807. Ench. II. p. 633. n. 2289. — Mirb. 1812. Bull. soc. philom. p. 56. Char. emend. — Link 1822. En. II. p. 435. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 355.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 171: g. Amentacear.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 145. n. 604: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 348.
Adans. 1763. Fam. II. p. 481: g. Pinuum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 425: g. Dioicear.
Neck. 1790. El. III. p. 270. n. 1668: g. Lepyrophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 1013: g. Monadelph. Hexandr.
Batsch 1802. Tab. p. 167: g. Sempervirentium.
Rich. 1808. Anal. fr. Ed. Voigt p. 121: g. Galbuliferar.
Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 297: g. Taxinar. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 2. — Kunth 1822. Syn. I. p. 350. — Agdh. 1825. Aphor. p. 212. — Bartl. 1830. Ord. p. 96.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 216; 1826. Syst. III. p. 65. n. 2383: g. Juniperear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 300.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 53: g. Taxinear. — Par. A. Rich. 1826. Conif. p. 135. t. 4. 29.
Rchb. 1828. Consp. p. 79. n. 1691; 1831. Fl. exc. p. 156; 1837. Hdb. p. 166; 1841. Nom. p. 61. n. 2333: g. Ephedrear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 287.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: g. Ephedracear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 469.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 541. n. 2653: g. Taxear.
Koch 1837. Syn. p. 664. Ed. II. p. 764: g. Ephedrinar.
Endl. 1837. Gen. n. 1804. p. 263; 1841. Ench. p. 146: g. Gnetacear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). — Brongn. 1843. En. genr. p. 135. — C. A. Meyer 1846. Mém. sc. nat. V. p. 35; 1847. Bull. Ac. Pet. V. p. 33; 1849. Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. p. 253. (Monogr.) Sect.: Plagiostoma, Discostoma. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 775. — Endl. 1847. Syn. Conif. p. 253; 1847. Gen. Spl. IV. p. 11. n. 1816/$_3$. Sect.: Discopyle, Plagiopyle. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 234. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 346. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 662. — (Gren. &) Godr. 1855. France III. p. 160. — Tulasne 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. X. p. 120.

Ephedraceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11. 12: fam. Ephedrariear. Gen.: Ephedra, Batis.
Link 1831. Hdb. II. p. 469: ordo 8 Amentacear. Gen.: Ephedra.

Ephedrarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11: ordo Julosepalar. Fam.: Ephedraceae, Casuarineae.

Ephedreae Rchb. 1828. Consp. p. 79: div. Taxear. Gen.: Ephedra, Batis.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 156; 1837. Hdb. p. 166; 1841. Nom. p. 61: div. Taxinear. Gen.: Ephedra.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 281: trib. Taxinear. Gen.: Gnetum, Ephedra.

Ephedrinae „Nees Gen. Fasc. I" Koch 1837. Syn. p. 664. Ed. II. p. 764 *(Ephedrineae)*: trib. Coniferar. Gen.: Ephedra.

Ephedrineae Koch vid. *praeced.*

Ephedrites Göppert & Ber. 1845. Bernst. p. 105.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 310; 1847. Gen. Spl. IV. p. 14. n. $1816/_{35}$: g. Gnetacear. foss.

Ephedrospartum Spach 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 243: sect. Spartocarpi. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 463.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 350: sect. Genistae.

Ephedrosphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 90: g. Sphaeriear. (Sphaeria decolorans, coccinea, etc.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Stigmaspherar.

Ephelis Fries „Fung. Mex." 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 370: nov. g. Phacidiaceor.

Ephemera Batsch 1802. Tab. affin. p. 125: fam. Dialium. Gen.: Rapatea, Majaca, Pollia, Callisia, Syena, Commelina, Tradescantia.

Ephemereae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 65: fam. Caliciflorae. Gen.: Commelina.
Rchb. 1828. Consp. p. 58: subdiv. Commelinear. Gen. §. 1: Leptanthus, Heteranthera, Pontederia. §. 2: Commelina, Ananthopus, Aclisia, Campelia, Tradescantia, Cyanotis. §. 3: Callisia, Ancilema, Palisota, Dichorisandra.

Ephemereae C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 101; 1848. Syn. Musc. I. p. 30: trib. Cleistocarpor. Gen. (1847 Ephemerum. Physedium): Ephemerum, Ephemerella, Voitia.

Ephemerella C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 34: g. Ephemerear., antea *Physedium C. Müll.*

Ephemerum*) Herm. 1690. Fl. Lugd. Bat.: g. Tricapsularium. *(*Linn. Cl. pl. p. 147.*)*
= Tradescantia et Commelina Linn. (= Eranthemum Adans.)

Ephemerum Tourn. 1700. Inst. p. 367. t. 193: g. pl. class. IX.
Mönch 1794. Meth. p. 237: g. Thalamostemonis.
Tradescantia Linn.

Ephemerum „Matth." Rchb. 1828. Consp. p. 127. n. 3327 *d;* 1831. Fl. exc. p. 409: sect. Lysimachiae.
Rchb. 1841. Nom. p. 124. n. 4844; 1844. Fl. sax. p. 245: g. Lysimachiear. genuinar. (Lysimachia nemorum L.)
= Lerouxia Merat.

*) *ἐφήμερον* Veterum fuit species Colchici, adeo perniciosa ut sumta una die interficiat.

Ephemerum Duby 1828. Bot. gall. I. p. 380; 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 61: sect. Lysimachiae. (L. Ephemerum L.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4207 *d.* p. 732; 1841. Ench. p. 356. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 7. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 26. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1002.
Synon. Palladia Mönch; Bernardina Baudo.

Ephemerum Hampe 1832. Linnaea VIII. p. . . . ; 1837. Bot. Zeit. p. 285: nov. g. Muscor.
C. Müll. 1843. Bot. Zeit. p. 505: g. Funariacear. — Par. Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 371.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 97: sect. Phasci.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 84: g. Phascacear. Sect.: Ephemerum, Physedium. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 1. — Bruch, Schimp. & Gümb. 1849. Bryol. eur. Fasc. 42.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 31: g. Ephemerear.

Ephialis Soland. mss. *(Ephialum Wittst.* Etym. Handw. p. 325: g. Verbenear.*)*
= Vitex Linn.

Ephidatia Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 353: nov. g. Alcyonidear. (E. Gibbsii.)
= Spongilla Lam.?

Ephielis Schreb. 1789. Gen. I. p. 253. n. 647: g. Octandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 611. — Willd. 1799. Sp. II. p. 328. n. 747. — Pers. 1805. Ench. I. p. 413. n. 932. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 52.
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 697; 1825. Syst. II. p. 223. n. 1460; 1830. Gen. I. p. 312. n. 1597: g. Sapindear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1280: g. Sapindacear.
= Matayba Aubl.

Ephippiandra*) Decaisne 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 278: nov. g. Monimiear. (E. myrtoidea.)

Ephippiorhynchium Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 134: nov. g. Haplostylear. *Cf.* Steud. 1855. Glum. II. p. 144.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Rhynchosporidar.
= Haplostylis Nees. (Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 271.)

Ephippium Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 308: nov. g. Orchidear.
= Ephippium et Cirrhopetalum Lindl.

Ephippium Lindl. 1833. Gen. Orchid. p. 231: g. restrict. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1486. p. 205; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2091. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 689.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

*) *ἐφίππιον*, ephippium.

Epiandria Presl 1828 in Oken's Isis XXI. p. 270: nov. g. Cyperacear., pro Gahnia psittacorum Sieb. (nec Labill.) indicatum. = Caustis P. Browne?

Epibaterium*) Forst. 1776. Char. gen. p. 107. t. 54: nov. g. Monoec. Hexandr. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 640. n. 1435. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 397. n. 1677. — Pers. 1807. Ench. II. p. 561. n. 2705.
Scop. 1777. Intr. p. 253 (sph.? *Epibiastrum):* g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 285: g. Menispermor. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 117.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 83: g. Menispermear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 676. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 62. — Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1879. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 243. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 7. = Cocculus DC.

Epibiastrum Scopoli vid. *praeced.*

Epiblasteae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phycol. gener. p. 370. 382; 1845. Phycol. germ. p. 293; 1849. Sp. Alg. p. 691: ordo Paracarpear. Fam.: Porphyreae, Spongiteae, Corallineae.

Epiblema**) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 315. Ed. Nees p. 171: nov. g. Orchidear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 63. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 711. n. 2963; 1831. Gen. II. p. 661. n. 3330.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 294: g. Coniopagar. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 189. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528): g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1420; 1841. Nom. p. 55. n. 2152. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 216. n. 1585. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 522; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Thelymitridar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1585. p. 113; 1842. Spl. II. p. 21; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 13.
Meisn. 1842. Gen. p. 387 (289): g. Thelymitridear.

Epibrissonia E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 111: sect. Apodynomenes. — Par. Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 527; 1842. Rep. I. p. 673. — Endl. 1840. Gen. n. 6538 *a.* p. 1272; 1841. Ench. p. 669.

Epibryus Pers. 1822. Mycol. eur. 1. p. 115: sect. Thelephorae. (Th. muscigena.) — Par. Leman 1828. Dict. v. 53. p. 445.

Epicampes***) Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. 238: nov. g. Agrostidear. *Cf.* Flora 1830. II. Erg. Bl. p. 96. — Par. Kunth 1833. Agrost. p. 209. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161.
Endl. 1837. Gen. n. 808 *b.* p. 89; 1841. Ench. p. 57: sect. Cinnae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1175. 2.

*) ἐπί, βαίνω, inscendo.
**) ἐπίβλημα, vestis, ornamentum.
***) ἐπικαμπής, inflexus, curvatus.

Epicampes Presl cont.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 134. 312: g. Agrostoidear.
Trin. 1841. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 270: g. Agrosteor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Agrostear. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 186.

Epicarpiae Scopoli 1777. Introd. p. 137: trib. 10 plantar. Gentes: Polyprema, Aparines, Opulinae, Caprifolia.

Epicarpura Hassk. vid. *seq.*

Epicarpurus Blume 1825. Bijdr. Nr. 10. p. 488: nov. g. Coenosanthear.
Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 499. t. 21: g. Celtidear.
Endl. 1837. Gen. n. 1855. p. 277; 1841. Ench. p. 165: g. Morear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2525. — Meisn. 1842. Gen. p. 351 (262). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 37. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 74 *(Epicarpura).*
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 268: g. Moracear. *Synon.* Albrandia Gaudich.

Epicea DC. 1805. Fl. franç. III. p. 275: sect. Abietis. (Pinus abies L.)
Koch 1837. Syn. p. 667: sect. Laricis. = Picea Link.

Epicharis*) Blume 1825. Bijdr. Nr. 4. p. 166; 1828. Fl. jav. Praef. p. VII: nov. g. Trichiliear. (Guareae spec.) — Par. A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 228. t. 15. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 684. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 180. — Meisn. 1837. Gen. p. 49 (35). — Endl. 1840. Gen. n. 5533. p. 1050; 1841. Ench. p. 551. — Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8069. — Walp. 1842. Rep. I. p. 430. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 84. 102. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464.
Bartl. 1830. Ord. p. 356: g. Meliacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Guareear.

Epichlamydeae Agardh 1825. Aphor. p. 224; 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 586: class. III. Phanerocotyledonear. incompletar. Ordines: Ulmaceae, Laurinae, Santalaceae, Elaeagneae, Thymeleae, Proteaceae.

Epichroma Bentham 1846 in DC. Prodr. X. p. 528: sect. Castillejae.

Epichroxantha Ecklon & Zeyl. mss. = Gnidiae Linn. pars. (Meisn. in DC. Pr. XIV. p. 580.)

Epichrysium Dumort. (pluries): vid. *seq.*

Epichysium**) Tode 1790. Meckl. II. p. 1. t. 8. f. 60: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 15. p. 63. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1460.
Alb. & Schwein. 1805. Nisk. p. 356.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 53: g. Eleutherocarpor.
Nees 1816. Syst. p. 90 not.; 1817. Ueberbl. p. 25: g. Sarcocephalor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13: g. Tubercularìar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.

*) ἐπίχαρις, gratus, amoenus.
**) ἐπίχυσις, infusio, etiam vas aliquod.

Epichysium Tode cont.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83 *(Epichrysium)*: g. Tremellinear.?
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 547: g. Isariear. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 125. (?)
Fries 1825. Pl. homon. p. 172: g. Scoriadeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 44. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 543. n. 3544: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Krypt. II. p. 313. *(synsporor.)*
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75 *(Epichrysium)*: g. Cephalosporear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 96: g. Orthomycetum.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 782. n. 4043: g. Byssoideor.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 293: g. Cephalotricheor. (dubium.) — Par. Endl. 1836. Gen. n. 263. p. 22; 1841. Ench. p. 15. — Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 220.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 43; 1842. Mycol. p. 183: g. Polyporeor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41.

Epicladium Lindl. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 81; 1847. Veg. kingd. p. 181; 1853. Fol. Orchid. 10 Jan. p. 2: subg. Epidendri.
Cf. Endl. 1842. Spl. II. p. 16. n. 1371 *b.*

Epiclinastrum Bojer mss.
= Lasiopus Cass.

Epiclinium*) Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 475: nov. g. Coryneaceor. (Didymosporium pezizoideum.)

Epiclinochilus Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 244: sect. Anisochili. *(Anisochilus* sect. Benth.)

Epicoccum Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 32: nov. g. Mucedinum. (Sphaerobasium). *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 15. p. 64.
Nees 1816. Syst. p. 32; 1817. Ueberbl. p. 7: g. Sphaeromycor. concretor.
Mart. 1817. Erlang. p. 327: g. Coniomycetum suffultor. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 563. n. 3583; 1831. Gen. II. p. 784. n. 4064.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Tuberculariar.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 524: g. Fusidiear.
Link 1825. Spec. II. p. 107: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 173: g. Dermosporior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 39.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Tuberculariaceor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 234: g. Sporomycetum perisporor.
Corda (1836 in Weitenw. Beitr. I. p. 80. *Cf.* Linnaea 1837. Litt. p. 157) 1837. Ic. Fung. I. p. 5: g. Cacomacear.

*) ἐπικλινής, inclinatus, declivis.

Epicoccum Link cont.
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 32: g. Tubercularinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 78. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 58. — Bonord. 1851. Hdb. p. 131.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 38; 1842. Mycol. p. 162: g. Tuberculariacear. — Par. Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 740.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Stilbaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 476: g. Sclerotiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.
Math. 1853. Belg. II. p. 425: g. Stilbosporear.

Epicorolleae Juss. 1824. Dict. v. 30. p. 463: div. Dicotyledonum. Classes: Synantherae, Corisantherae.

Epicoryne Rchb. „1837. Deutschl. Fl. p. 60" 1841. Nomencl. p. 182. n. 7005. 1: sect. Cardamines.

Epicranthes Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 306: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1830. Orchid. p. 61: g. Dendrobiear. = *seq.*

Epicrianthes*) Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VII: g. Orchidear.
Endl. 1837. Gen. n. 1357. p. 191; 1841. Ench. p. 109: g. Dendrobiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1947. — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (278.) — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Lindl. 1847. Vég. kd. p. 181: g. Dendrobidar. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 654.
Synon. Epicranthes Blume, Lindl.

Epidendreae HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 335: sect. Orchidear. Gen.: Telipogon, Trichoceros, Pachyphyllum, Isochilus, Cymbidium, Bletia, Catasetum, Anguloa, Oncidium, Jonopsis, Cyrtochilum, Odontoglossum, Epidendrum, Vanilla, Epistephium, Stenoglossum, Dendrobium, Masdevallia, Stelis, Pleurothallis, Restrepia, Rodriguezia. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 326. Gen. ead.
Lindl. 1826. Orchid. scel. p. 7 *(Linnaea II. p. 527)*: subordo Orchidear. Trib.: Vandeae, Epidendreae, Malaxideae.
Bartl. 1830. Ord. p. 57: div. Orchidear. Gen.: Angraecum, Aëranthus, Cryptopus, Aërides, Rodriguezia, Vanda, Zygopetalon, Eulophia, Lissochilos, Dipodium, Jonopsis, Sarcochilos, Sarcanthus, Gastrochilus, Robiquetia, Cymbidium, Anguloa, Cuitlanzina, Catasetum, Geodorum, Macradenia, Aeonia, Pholidota, Colax, Maxillaria, Ptilocnema, Pleione, Gongora, Coelogyne, Oncidium, Odontoglossum, Brassia, Masdevallia, Cyrtochilos, Cyrtopodium, Gomezia, Cirrhaea, Stelis, Pleurothallis, Notylia, Pachyphyllum, Trichoceras, Lockhartia, Trizeuxis, Tribrachia, Bulbophyllum, Anisopetalum, Xylobium, Lepanthes, Epidendrum, Dendrobium, Malaxis, Microstylis, Liparis, Cryptarrhena, Sunipia,

*) ἐπίχρῖον, antenna.

Epidendreae HBK. cont.
Thelypogon, Stenoglossum, Restrepia, Polystachya, Sophronia, Ornithocephalus, Pinalia, Arpophyllum, Psittacoglossum, Alamannia, Calanthe, Bletia, Centrosis, Octomeria, Eria, Brassavolea, Isochilos, Empusa, Dienia, Orchidium, Ornithidium, Megaclinium, Broughtonia, Camaridium, Encyclia, Cattleya, Tipularia, Corallorhiza, Schismoceras, Elleanthus, Acronia, Pedilea; Vanilla.

Epidendreae Lindl. 1826. Orch. scel. p. 16 (Linnaea II. p. 530): trib. Epidendrear. Gen.: Bletia, Brassavola, Epidendrum, Cattleya, Broughtonia, Isochilus, Dinema. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. Gen. ead. exceptis primo et ultimo.
Rchb. 1828. Consp. p. 69: div. Orchidear. Gen. ead. et Pleione, Encyclia, Schismoceras, Elleanthus, Acronia.
Lindl. 1831. Orchid. Pt. 2. p. 95: trib. 2 Orchidear. Gen.: Collabium, Epidendrum, Dinema, Encyclia, Isochilus, Ponera, Brassavola, Laelia, Cattleya, Broughtonia, Tetramicra, Spathoglottis, Bletia, Ipsea, Arundina, Phajus, Cytheris, Callostylis, Ania, Ceratium, Apaturia, Trichotosia, Tainia, Plocoglottis. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 371 (278). Gen. fere ut Endl. 1841. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 26. Gen. ex Lindl. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176. Gen. fere ead. — Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 169. Sect. ut Lindl. 1847.
Dumort. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 6: subtrib. Epidendrinear. Novum genus: Maelenia.
Endl. 1837. Gen. p. 193: subordo Orchidear. Gen. ut Lindl. 1831 (Tylostylis, Cylindrolobus et Mitopetalum loco Callostylidis, Ceratii et Tainiae) et Diothonea, Arophyllum, Leptotes, Sophronitis. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1362 et Ench. p. 110): Schomburgkia, Hartwegia, Barkeria, Pesomeria, Acanthephippium, Cryptochilus, Physinga, Drymoda et 1843 (Spl. III. p. 60) Trichosma.
Rchb. 1837. Hdb. p. 155: subdiv. Orchidear. genuinar.
Lindl. 1840. Gen. Orchid. p. XVII; 1847. Veg. kd. p. 181. trib. Orchidacear. Sect. (1847): Coelogynidae, Isochilidae, Laeliadae, Bletidae.
Klotzsch . . . . in Hayne Arzneig. XXIV: subdiv. Ceracear. Gen.: Epidendrum, Brassavola, etc.
Rchb. f. 1852. Poll. gen. p. 15: div. Operculatar.

Epidendreae Rchb. 1841. Nomencl. p. 52: div. Ceriorchidear. Subdivis.: *genuinae* (gen. Epidendrear. Endl. 1841), Vandeae.

Epidendrineae Dumort. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 6; 1836. Flora I. p. 52: trib. Cerorchidear. Subtrib.: Epidendreae, Vandeae.

Epidendron Linn. Cliff., Gled. 1749: vid. *Epidendrum Linn.*

Epidendron Link vid. *Epidendrum Juss.*

Epidendrum*) Linn. 1737. Gen. p. 272. n. 688; 1737. Cliff. p. 430 *(Epidendron)*; 1740. Syst. p. 29; 1753. Sp. II. p. 952; 1759. Syst. ed. X. p. 1246. n. 907; 1763. Sp. ed. II. p. 1347; 1764. Gen. ed. VI. p. 464. n. 1016; 1767. Syst. ed. XII. p. 595: g. Gynandr. Diandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 680; 1784. Syst. p. 817. — Reich. 1778. Gen. p. 458. n. 1101. — Lour. 1790. Coch. II. p. 523. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 606. n. 1377. — Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 124. t. 27. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 34. t. 42—44. — Pers. 1797. Syst. p. 862.
Linn. 1740. Act. Upsal. p. 35: g. ordinis quarti naturalis.
Gled. 1749. Berl. V. p. 133 *(Epidendron)*; 1764. Syst. p. 283. n. 1164: g. Stylostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27; 1764. Ord. nat.: g. Orchidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 279.
Hill 1769. Ht. kew. p. 348: g. Pentapetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 91: g. Satyrior.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 30: g. Diandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 63.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 47. t. 14. f. 6 (terrestre).
= Epidendrum et Vanilla Juss.

Epidendrum Juss. 1789. Gen. p. 66: g. Orchidear., sejuncta Vanilla restrict. — Par. Swartz 1799 in Schrad. Journ. II. p. 201; 1799. Nov. Act. Ups. VI. p. 66; 1806 in Schrad. Journ. I. p. 79. (Disjungitur Cymbidium.) — Batsch 1802. Tab. p. 101. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 165. — Pers. 1807. Ench. II. p. 518. n. 1998. — R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 217. (Verm. bot. Schr. II. p. 45.) — Link 1822. En. II. p. 371; 1829. Hdb. I. p. 254 *(Epidendron)*. — D. Don 1825. Nepal. p. 37. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 735. n. 3026; 1831. Gen. II. p. 673. n. 3399. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 196. t. 43.
Neck. 1790. El. III. p. 132. n. 1473: g. Synarmophytor. Distinguuntur Phadrosanthus, Eydisanthera et Vanillophorum.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 114. n. 1606; 1809. En. p. 946: g. Gynandr. Monandr. — Par. Swartz 1806. Ind. occ. III. p. 1485. 1996. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 198.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 351: g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 337. — Lindl. 1826. Orch. scel. p. 16 (Linnaea II. p. 531); 1831. Orchid. p. 96. — Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1544; 1841. Nom. p. 52. n. 1964. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Bartl. 1830. Ord. p. 58. — Endl. 1837. Gen. n. 1371. p. 193; 1841. Ench. p. 110. — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (278). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176. — A. Rich. 1849 in

*) Nomen novum ex ἐπί et δένδρον, quia sit herba parasitica.

Epidendrum Juss. cont.
Orb. Dict. V. p. 357. — Klotzsch .... in Hayne Arzneigew. XXIV.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 290: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Agdh. 1823. Aphor. p. 189: g. Massulatar.
La Llave & Lex. 1825. Nov. veg. II. Orch. p. 22: g. Rinemaspermar. epidendrar.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 1. t. 101—103.
Lindl. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 81. Subgen.: Hormidium, Epicladium, Encyclium, Diacrium, Aulizeum, Osmophytum, Lanium, Spathium, Amphiglottium, Euepidendrum. *Cf.* Endl. 1842. Spl. II. p. 16. — Simil. Lindl. 1853. Fol. Orch. 10 Jan. Accedunt sect.: Psilanthemum, Pleuranthium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Laeliadar. Sect. ut 1841.
Rchb. f. 1849. Linnaea XXII. p. 836. Nova sect.: Pleuranthium.
Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 134. Sect.: Acranthium, Psilanthemum, Pleuranthium.
Synon. Auliza et Amphiglottis Salisb.; Anacheilium Hoffmsg.; Anacheilum Wittst.; Encycliae sp. Hook.

Epidermeae Bonnemaison 1828. Mém. Mus. XVI. p. 67: fam Hydrophytar. loculatar. Gen.: Ptilota, Grammita, Dasytrichia, Torularia, Boryna, Sphacelaria, Gaillona.

Epidochium Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 471: nov. g. Hymenulaceor. (Agyrium atrovirens.)

Epifagus*) Nuttall 1818. Gen. amer. II. p. 60: g. Didynam. Angiosperm. (Orobanche virginiana L.) *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 71 et Spreng. Neue Entd. I. p. 132.
= Epiphegus Spreng.

Epifegus Steud. Nom. I. p. 559: vid. *praeced.*

Epigaea**) Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 17; 1753. Sp. I. p. 395; 1759. Syst. ed. X. p. 1023. n. 486; 1762. Sp. ed. II. p. 565; 1764. Gen. ed. VI. p. 219. n. 550; 1767. Syst. ed. XII. p. 300. n. 541: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 339; 1784. Syst. p. 407. — Reich. 1778. Gen. p. 223. n. 594. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 295. n. 748. — Gmel. 1791. Syst. p. 696. — Pers. 1797. Syst. p. 435. — Willd. 1799. Sp. II. p. 615. n. 869. — Swartz 1800. Fl. Ind. occ. II. p. 842. (emend.) — Elliott 1817. Sketch I. p. 500. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 269.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 165: g. Vacciniior.
Linn. 1764. Ord. nat. *(Epigea)*: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337.
Gled. 1764. Syst. p. 228. n. 940: g. Petalostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 140: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 194: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 161: g. Ericarum.

*) Nomen hybridum.
**) Nomen novum: ἐπίγαιος, humi repens.

Epigaea Linn. cont.
Neck. 1790. El. I. p. 218. n. 360 *(Epigea)*: g. Dicroophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 452: g. Rhodoracear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 353. — Hedw. 1806. Gen. p. 320. n. 1263. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 410. — Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3395. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27 *(Epigea)*.
Batsch 1802. Tab. p. 218: g. Ericariar.
Pers. 1805. Ench. I. p. 482. n. 1089: g. Ericoidear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 510: g. Rhododendrear.
Link 1821. En. I. p. 395: g. Ericinar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 288. n. 1545; 1830. Gen. I. p. 333. n. 1685: g. Ericear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 155. — Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 42. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1371. 1398. — Brongn. 1843. En. genr. p. 71.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL: g. Callunear.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 841: g. Andromedear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4322. p. 756; 1841. Ench. p. 370. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 591. Sect.: Euepigaea, Brossaea. — Meisn. 1839. Gen. p. 246 (154). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443. — Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4914.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: g. Chamaeledear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Andromedidar.
Synon. Memaecylon Mitch.; Brossaea Plum.?

Epigea Linn. Ord. nat., Neck., Dumort. vid. *praeced.*

Epigeios Koch 1837. Syn. p. 783. Ed. II. p. 905: sect. Calamagrostidis. — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 387. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 430. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 475.
= Calamagrostis Palis.

Epigenia Flor. Flum. IV. t. 37 (crenata et integerrima).
= Eustyrax Endl.

Epigenia Flor. Flum. IV. t. 138: g. nondum descriptum ex Endl. Gen. p. 1334. n. 26.

Epiglossum Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 878. n. 581: nov. g. Delesseriear. (Polyphacum Smithii Hook. & Harv.)

Epigogium Koch 1837 vid. *Epipogium Rich.*

Epigynae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 16: cohors Polypetalar. Nixus: Onagrales, Myrtales, Cornales, Cucurbitales, Begoniales.

Epigynae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 28: cohors Monopetalar. Nixus: Campanales, Goodenales, Cinchonales, Capriales, Stellales.

Epigynae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 33: cohors Endogenar. Nixus: Amomales, Narcissales, Ixiales, Bromeliales, Hydrales.

Epigynanthus Blume 1825. Flora II. p. 679: nov. g. Najadear. indescriptum. *Cf.* Endl. Gen. p. 232.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 144: g. Naiadacear.
= Hydrilla Rich.

Epigynium Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 49: nov. g. Vacciniear. (Agapetes §. 2 Dunal.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1094.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1060: sect. Vaccinii.

Epigynum Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. 2. p. 4. t. 1308: nov. g. Echitear. (E. Griffithianum.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 42.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 459: g. dubium, vix in ordine Apocynear. admittendum.

Epilasia Bunge 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 376: sect. Scorzonerae.

Epilatoria „Comm." Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 326: g. Compositar. Quid?

Epilepis Bentham 1839. Pl. Hartweg. p. 17: nov. g. Coreopsidear. (E. rudis.) *Cf.* Flora Lit. XI. p. 102. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2528/$_1$. p. 1382; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711 *(Epilepsis)*. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 161. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 359.
Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3620: g. Rudbeckiear.

Epilepsis Lindl. vid. *praeced.*

Epilethes Rchb. vid. *Epilithes Blume.*

Epilinella Pfeiff. 1845. Bot. Zeit. p. 673; 1846. ibid. p. 18: nov. g. Cuscutacear. (Cuscuta Epilinum Auct.) *Cf.* Walp. 1847. Rep. VI. p. 544 adnot.
Visiani 1847. Fl. Dalm. II. p. . . . : sect. Cuscutae. *Cf.* Flora 1848. I. p. 9.
Des Moul. 1853. Ét. org. s. l. Cusc. p. . . . : g. Cuscutear.

Epilitheae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 318 (230): trib. Nyctaginear.? Gen.: Epilithes.

Epilithes Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 734: nov. g. Nyctaginear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 2013. p. 312; 1841. Ench. p. 193. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 516 (dubium). — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 86 *(Epilithos)*. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 359.
Meisn. 1841. Gen. p. 318 (230): g. Epilithear.
Rchb. 1841. Nom. p. 69. n. 2608 *(Epilethes)*: g. Allioniear. dubium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 507: g. Nyctaginacear.?
Choisy 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 458: g. ordinis incerti, an Onagrariear.?
= Serpicula Linn.

Epilithia Nyland. 1853. Collect. lichenol.: nov. g. (fungillum lichenoideum). *Cf.* Bot. Zeit. 1855. p. 66.

Epilithos Hassk. vid. *Epilithes Blume.*

Epilobeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 725: trib. Onagracear. Gen. Epilobiear. Endl. et Chamaenerion.

Epilobiaceae „Vent." DC. 1828. Prodr. III. p. 35: vid. *Epilobianae Vent.*

Epilobiaceae Meisn. 1838. Gen. pl. vasc. p. 120 (85): trib. Onagrariar. Subtrib.: Jussieae, Onagreae, Gaureae, Fuchsieae.

Epilobianae Vent. 1799. Tabl. III. p. 307: ordo 3 class. XIV. Gen. §. 1: Trapa. §. 2: Circaea, Lopezia, Ludwigia. §. 3: Jussiaea, Oenothera, Epilobium, Gaura. §. 4. *Affine:* Fuchsia.

Epilobieae Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 338. 382: sect. Onagrear. Gen.: Cratericarpium, Boisduvalia, Godetia, Phaeostoma, Clarkia, Chamaenerium, Epilobium, Zauschneria.

Epilobieae Rchb. 1837. Handb. p. 246; 1841. Nomencl. p. 170: subdiv. Oenotherear. Sect.: Camissonieae (earum loco 1841 Sphaerostigmeae), Onagreae, Zauschnerieae.
Endl. 1840. Gen. p. 1189: trib. Oenotherear. Gen.: Gayophytum, Sphaerostigma, Meriolix, Oenothera, Godetia, Cratericarpium, Boisduvalia, Clarkia, Eucharidium, Epilobium, Zauschneria. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1826 et Ench. p. 637) Eulobus.

Epilobineae Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 171: sect. Onagrear. Gen.: Cratericarpium, Boisduvalia, Godetia, Phaeostoma, Clarkia, Chamaenerium, Epilobium, Crossostigma; Zauschneria?
Torr. & Gr. 1840. North-Am. I. p. 486: subtrib. Onagrear. Gen.: Zauschneria, Epilobium.

Epilobium*) Linn. 1737. Gen. p. 112. n. 319; 1737. Cliff. p. 145; 1740. Syst. p. 22; 1753. Sp. I. p. 347; 1759. Syst. ed. X. p. 999. n. 426; 1762. Sp. ed. II. p. 493; 1764. Gen. ed. VI. p. 188. n. 471; 1767. Syst. ed. XII. p. 264. n. 466: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 296; 1784. Syst. p. 359. — Reich. 1778. Gen. p. 190. n. 507. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 251. n. 639. — Lour. 1790. Coch. I. p. 225. — Gmel. 1791. Syst. p. 607. — Pers. 1797. Syst. p. 383. — Willd. 1799. Sp. II. p. 313. n. 732; 1809. En. p. 410. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 249.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 408: g. Dicotyledonum Diplostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 268. n. 1101: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Calycanthemor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Onagrear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 319. — Batsch 1802. Tab. p. 77. — Pers. 1805. Ench. I. p. 409. n. 921. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 702; 1825. Syst. II. p. 232. n. 1471; 1830. Gen. I. p. 315. n. 1606. — Link 1821. En. I. p. 379. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 94. — Kunth 1824. Syn. III. p. 389. — D. Don 1825. Nepal. p. 222. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1290. Sect. ut Tausch.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Calycanthemar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 332. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 230.

*) Nomen a Gesnero fictum: ἴον ἐπὶ λόβον, viola supra siliqua.

Epilobium Linn. cont.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 164: g. Fructiflorar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172[8]: g. Tetrapetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 489: g. Oenotheratar.
Scop. 1777. Intr. p. 103: g. Strictar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 157. t. 31. f. 6 (montanum).
Neck. 1790. El. II. p. 138. n. 823: g. Coryphophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 313: g. Epilobianar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 153: g. Onagrariar. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 420. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 899. — Lois. 1819. Dict. v. 15. p. 74. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 560. Sejungitur Chamaenerion. — Tausch 1823. Ht. Canal. fasc. I. Divis.: Chamaenerion, Lysimachion. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 4. 7. — Link 1831. Hdb. II. p. 57. — Webb .... Canar. II. p. 7. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 57.
Hedw. 1806. Gen. p. 265. n. 1068: g. Onagrear. — Par. Seringe 1828 in DC. Pr. III. p. 40. Sect. ut Tausch. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 68; 1844. Ross. II. p. 105. Sect. (1844) eaed. et Chrysonerion. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 679. Sect. ut Ser. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 204. Sect. eaed. — Koch 1836. Syn. p. 238. Ed. II. p. 264. Sect. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 120 (86).
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: g. Oenotherear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 319. — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 325. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 117.
Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4500; 1832. Fl. exc. p. 634: g. Gaurear. Sect. ut Ser.
Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 266: g. Onagrariear. — Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 163. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 111. Sect. ut Ser.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 486: g. Epilobinear. Sect.: Chamaenerion, Chrysonerion, Cordylophorum, Lysimachion.
Endl. 1840. Gen. n. 6121. p. 1192; 1841. Ench. p. 637: g. Epilobiear. Sect. ut Ser. et Crossostigma. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 90. Sect. ut Torr. & Gr. — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 159. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 576. Sect. ut Ser. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 360. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 678.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Epilobear. Distinguitur Chamaenerion.
Synon. Rhododaphne Gesn.; Chamaenerion Tourn.

Epilobium Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 398: g. Epilobiear., emissis Chamaenerio et Crossostigmate restrict.
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 174: g. Epilobinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6571: g. Onagrear.

Epimedieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50: trib. Berberidear. Gen.: Leontice, Epimedium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 265; 1841. Nomencl. p. 185: sect. Berberear. Gen.: Epimedium, Vancouveria, Aceranthus.

Epimedineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 33. 55: sect. Berberear. Gen. Epimediear. Rchb.

Epimedium*) Tourn. 1700. Inst. p. 232. t. 117: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 30. n. 81; 1737. Cliff. p. 37; 1740 Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 29; 1753. Sp. I. p. 117; 1759. Syst. ed. X. p. 897. n. 138; 1762. Sp. ed. II. p. 171; 1764. Gen. ed. VI. p. 59. n. 148; 1767. Syst. ed. XII. p. 124: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 111. — Murr. 1774. Syst. p. 133; 1784. Syst. p. 159. — Reich. 1778. Gen. p. 60. n. 154. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 79. n. 193. — Gmel. 1791. Syst p. 256. — Pers. 1797. Syst. p. 164; 1805. Ench. I. p. 143. n. 295. — Willd. 1797. Sp. I. p. 660. n. 227; 1809. En. p. 164. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 816.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 25. n. 99: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 278.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Corydalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 371.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lauror.
Adans. 1763. Fam. II. p. 432: g. Papaverum.
Hill. 1769. Ht. kew. p. 172[7]: g. Tetrapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 314: g. Anomalar.
Juss. 1789. Gen. p. 287: g. Berberidum.
Neck. 1790. El. III. p. 66. n. 1390: g. Amorphophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 86: g. Berberidear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 86. — DC. 1805. Franç. IV. p. 628; 1821. Syst. II. p. 28; 1824. Pr. I. p. 110. — Hedw. 1806. Gen. p. 66. 373. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 15. 290. n. 490. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 671; 1825. Syst. I. p. 441. n. 458; 1830. Gen. I. p. 97. n. 482. — Lois. 1819. Dict. v. 15. p. 77. — Link 1821. En. I. p. 143; 1831. Hdb. II. p. 219. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 708. — Bartl. 1830. Ord. p. 242. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 119. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 702. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 30. — Morr. & Decne 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 352. Sect.: Macroceras, Microceras. — Koch 1836. Syn. p. 27. Ed. II. p. 29. — Meisn. 1837. Gen. p. 6 (8). — Endl. 1839. Gen. n. 4811. p. 853; 1841. Ench. p. 440. Sect. ut M. & D. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 497. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 81. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 295. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 95. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 231.

*) Nomen ex Plinio.

Epimedium Tourn. cont.
Batsch 1802. Tab. p. 114: g. Berberinar.
Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 497: g. Siliquosar.
Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4836: g. Bocconiear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50: g. Epimediear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 265; 1841. Nom. p. 185. n. 7088.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 524: g. Berberinear.
Lindl. 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1906: g. Berberacear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 55: g. Epimedinear. Sect. ut Morr. & D.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 438: g. Nandinear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 361: g. Berberidacear.

Epimelas Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 113: sect. Biatorae. (B. denigrata, rivulosa, straminea, aurantiaca.)

Epimenia Sonder vid. *Epymenia Kütz.*

Epimeredi*) Adans. 1763. Fam. II. p. 192: g. Labiatar. (Stachys indica H. R. Par.) = . . . ?

Epimonopetalae Wilbrand 1837. Handb. p. LVIII: class. VII. Dicotyledonum.

Epineuron Hook. f. & Harv. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 532: nov. g. Rhodomelear. (Fucus lineatus et fraxinifolius Turn.) — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55 (sph. *Epineuvron).*
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 107: g. Rytiphlaeinear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 848. n. 558: g. Rytiphlaeacear.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 223: g. Rhodomelacear.

Epineuvron Montagne vid. *praeced.*

Epinyctis Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 582: g. Lichenum amphibolor. (E. fuliginea = Nodularia atra Flk.)

Epipacteae Rchb. 1830. Fl. exc. p. 131: div. Orchidear. Gen.: Goodyera, Cephalanthera, Neottia, Listera, Epipactis, Cypripedium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 155: subdiv. Orchidear. genuinar.

Epipactis**) Feuillé 1714. Peruv. II. t. 17—19. = Asarca et Chloraea Lindl.

Epipactis Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 277: g. Orchidum. *(Pseudorchis Johr., Orchioides Trew.)*
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 13: g. Palmar. = Goodyera R. Brown.

Epipactis Adans. 1763. Fam. II. p. 70: g. Orchidum. — Simil. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 456.
Neck. 1790. El. III. p. 127. n. 1465: g. Synarmophytor.
Rebent. 1804. Neom. p. 3: g. Monandr. Monogyn.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 83. n. 1602; 1809. En. p. 944: g. Gynandr. Monandr. — Par. Roxb. 1832. Ind. III. p. 453.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 163: g. Orchidear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 258; 1815. V. p. 334. — Swartz 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 62. — Pers. 1807. Ench. II. p. 513. n. 1991.
= Epipactis R. Brown, Listera R. Brown, etc.

Epipactis R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 201. (Verm. bot. Schr. II. p. 23): g. Orchidear., sejuncta Listera emendat. — Par. Rich. 1818. Mém. Mus. IV. p. 43. 51; 1818. Orch. eur. p. 29. — Lois. 1819. Dict. v. 15. p. 84. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 211. — Link 1822. En. II. p. 370; 1829. Hdb. I. p. 250. — D. Don 1825. Nepal. p. 28. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 706. n. 2956; 1831. Gen. II. p. 659. n. 3321. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 566. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1552. 1574. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 421. 465. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 172.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 286: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125 *(Epipactum).*
Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1453: g. Arethusear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 133: g. Epipactear.
Koch 1837. Syn. p. 694. Ed. II. p. 800: g. Limodorear.
Endl. 1837. Gen. p. 213. n. 1553: g. Neottiear. — Par. Kunth 1838. Berol. II. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2120. — Brongn. 1843. En. genr. p. 28. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 363. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 82. — Math. 1853. Belg. I. p. 526. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 270.
Lindl. 1840. Orchid. p. 460; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Listeridar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1557. p. 113; 1842. Spl. II. p. 19.
Irmisch 1842. Linnaea XVI. p. 450; 1846. ibid. XIX. p. 119. Sect.: Arthrochilium, Euepipactis.
Meisn. 1842. Gen. p. 385 (288): g. Listeridear.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 94: g. Ceriorchidear.
Klotzsch . . . . in Hayne Arzneigew. XXIV: g. Ponthievear.
Synon. Helleborine Riv., Rupp.; Limonias Ehrh.; Serapias Pers.

Epipactum Ritg. vid. *Epipactis R. Brown.*

Epiperigonicae Wilbrand 1837. Handb. p. LVIII: class. VI. Monocotyledonum.

Epipetaleae Juss. 1824. Dict. v. 30. p. 463: class. XII. Dicotyledonum.

Epiphagus Rylands 1843. The phytologist II. p. 341: nov. g. Algar. byssoidear.

Epiphanes*) Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 421: nov. g. Orchidear.
Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 175: sect. Gastrodiae. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 717.
= Gastrodia R. Brown.

---

*) Nomen Indorum.
**) Nomen Veratri albi apud Veteres.

*) ἐπιφανής, distinctus, insignis.

Epiphegus*) Spreng. 1820. Neue Entd. I. p. 264: g. Personatar.
Darlingt. 1825. Fl. cestr. p. 72.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 819. n. 2209; 1831. Gen. II. p. 498. n. 2451: g. Orobanchear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 1053; 1841. Nom. p. 119. n. 4665. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23. — Bartl. 1830. Ord. p. 174. — D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 113. — Endl. 1839. Gen. n. 4182. p. 726; 1841. Ench. p. 353. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 261. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 93. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 372. 619. — Walp. 1845. Rep. III. p. 457 (*Epiphejus*). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 364.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 634: g. Orobanchiear.
Meisn. 1840. Gen. p. 314 (225): g. Euorobanchear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 611: g. Orobanchacear. — Par. Reut. 1847 in DC. Pr. XI. p. 3.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 4: g. Lathraeear.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 206 (*Epiphejus*): g. Lathraeacear.
Synon. Epifagus Nutt.; Leptamnium Rafin.; (Leptaminium Steud.); Mylanche Wallr.; Mylachne Steud.; Epifegus Steud.

Epiphejus Walp. vid. *praeced.*

Epiphora Lindl. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 201: nov. g. Orchidacear. (E. pubescens.)
Endl. 1837. Gen. n. 1408. p. 197; 1841. Ench. p. 110: g. Vandear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2013. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Brassidar.

Epiphylla Stackh. 1816. Ner. brit. ed. alt. p. . . . : nov. g. Algar. *Cf.* Spreng. n. Entd. I. p. 98.
= Phyllophora Grev. etc. (Rchb. Nom. Syn. p. 43.)

Epiphyllarion Griseb. 1839. Linnaea VIII. p. 256: sect. Byrsonimae.

Epiphyllina Rchb. 1828. Consp. p. 31: div. Jungermannieor. Gen.: Sedgwickia, Sphaerocarpus, Corsinia, Monoclea, Anthoceros, Blandovia, Fimbriaria, Marchantia, Lunularia, Merkia.

Epiphyllospermae (s. *Dorsiferae*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 322: sect. prima class. XVI. Gen.: Thelypteris, Filix, Filicula, Trichomanes, Polypodium, Spicant, Phyllitis, Asplenium, Muraria.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 130: class. IV. plant.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 342: sect. class. XVII. Gen. ut Rupp. et Filicastrum, Osmunda, Lunaria, Ophioglossum, Equisetum, Pinastella, Hippuris.
Wigg. 1780. Holsat. p. 73: ordo 2 Cryptogamiae. Gen.: Pteris, Struthiopteris, Asplenium, Polypodium.

*) φηγός, fagus.

Epiphyllospermae Rupp. cont.
Spreng. 1806. Fl. hal. (Römer Collect. bot. p. 277): ordo 2 Ateliae.
Mart. 1817. Erlang. p. 3: ordo 2 Cryptogamiae. Gen.: Polypodium, Asplenium, Aspidium, Pteris, Blechnum.
Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): ordo Filicinar. Fam. 24—27.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 15: div. Filicum. Ordines: Ophioglosseae, Osmundaceae, Anemiaceae, Marattiaceae, Polypodiaceae.

Epiphyllosporae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Synorganor. sporiferor. Divis.: Chlamydosporangiae, Gymnosporangiae.
Meyer 1836. Chlor. hann. p. 673: cohors Cryptogamar. vascularium. Familiae: Polypodiaceae, Osmundaceae, Ophioglosseae.

Epiphyllum Herm. 1698. Parad. Lugd. Bat. Addend.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 197. Ed. Schrank 1819. p. 216: g. Icosandr. Monogyn. (Cactus Phyllanthus L.)
Link 1822. En. II. p. 24: sect. Cacti. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4244 *a.*
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L: g. Nopalear.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 170: g. Opuntiacear.
= Phyllarthus Neck. et seq.

Epiphyllum Pfeiff. 1837. Enum. diagn. Cact. p. 127; 1837. Beschr. Cact. p. 137: g. Cactear., ex typo Cerei truncati emendat. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 128 (92). — Miq. 1839. Bull. Néerl. 2e livr. p. 113. — Endl. 1840. Gen. p. 944. n. 5159. — Walp. 1843. Rep. II. p. 342. 936. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 38. 111.
Lemaire 1839. Cact. gen. p. 65. 75: g. Phyllariocotyledonear.
Salm-D. 1840 in Otto's Gartenz. p. 60: g. Phyllanthoidear.
Endl. 1841. Ench. p. 496. n. 5159: g. Phyllocactoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 161. n. 6271: g. Phyllocactear. — Par. Salm-D. 1845. Cact. hort. Dyck p. 37. — Först. 1846. Hdb. Cact. p. 443.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 307: g. Nopalear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 748: g. Phyllanthidar.
Synon. Epiphylli pars Haw.; Cacti sp. Link; Cerei sp. DC.

Epiphysca Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 303: sect. Tococae. *Cf.* Walp. 1843. Rep. II. p. 141.

Epiphystis Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 97. t. 1: nov. g. Triandr. Digyn. (E. ophiuroides.) *Cf.* Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 95 adnot., ubi Cyperaceis adscribitur. — Par. Schult. 1824. Mant. II. p. 7.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 880: g. Paspalacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 30: g. Panicear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 414: g. Graminear. anomalum.

Epiphytae Link 1809. Berl. Mag. III. p. 5: ordo Anandrar. Gen.: Caeoma, Puccinia, Bullaria, Sporidesmium, Stilbospora, Fusidium, Conisporium, Melanconium, Gymnosporangium, Podisoma, Exosporium, Helmisporium, Fusarium, Atractium.

Epiphyti Leman 1817. Dict. v. 8. p. 106: sect. Angiocarpor. Gen.: Aecidium, Mucor, Licea, Tubulina, Onygena.

Epiphyti Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLVI: sect. Byssacear. Gen.: Herpotrichum.

Epiphyti Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: fam. Mycetum. Divis.: Uredinei, Stilbosporei, Tuberculariacei, Isariacei, Exosporii, Pucciniastri.

Epipogieae Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 176. 187: trib. Arethusear. Gen.: Stereosandra, Galera, Lecanorchis.

Epipogium Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 87; 1789. Beitr. IV. p. 149. (Satyrium Epipogium L.)

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 285: g. Ceropagar.

Spreng. 1826. Syst. III. p. 696. n. 2935; 1831. Gen. II. p. 654. n. 3295: g. Orchidear. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 565. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1553. 1578. — Link 1829. Hdb. I. p. 255. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 423. 488.

Lindl. 1826. Orch. scel. p. 11 (Linnaea II. p. 529); 1840. Orchid. p. 383: g. Gastrodiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1456. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. p. 212. n. 1545. — Meisn. 1842. Gen. p. 382 (286). — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 274.

Rchb. 1830. Fl. exc. p. 135: g. Malaxidear.

Koch 1837. Syn. p. 693 (sphalm. *Epigogium*); ed. II. p. 799: g. Limodorear.

Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1545: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1897.

Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181: g. Arethusear. — Par. A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 365. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 717.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Gastrodidar.

Synon. Epipogum Gmel.; Limodori sp. Swartz.

Epipogon Ledeb. vid. *seq.*

Epipogum*) Gmelin 1747. Fl. Sibir. I. p. 11. t. 2. f. 2: nov. g. Palmar.

Rich. 1818. Mém. Mus. IV. p. 42. 50 (Orchid. eur. p. 28): g. Orchidear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 143.

Rchb. 1844. Fl. sax. p. 91: g. Coniorchidear.

Klotzsch .... in Hayne Arzneigew. XXIV: g. Gastrodiear.

Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 593: g. Neottiear.

Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 77 (*Epipogon*): g. Arethusear.

Conf. Epipogium Ehrh.

*) ἐπί, πώγων, barba „quia barba hujus floris inverso ordine superius disposita est."

Epipolypetalae Wilbrand 1837. Handb. p. LVIII: class. VIII. Dicotyledonum.

Epireineria E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 113: sect. Apodynomenes. — Par. Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 527; 1842. Rep. I. p. 643. — Endl. 1840. Gen. n. 6538 *b.* p. 1272; 1841. Ench. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5727. 2.

Epirhixanthes Steud. Nom. lege *Epirixanthes Blume.*

Epirhizanthus (Blume emend.) Endl. 1839. Gen. n. 4192. p. 728; 1841. Ench. p. 353: g. dubium Orobanchear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 261. — Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4668. — Walp. 1845. Rep. III. p. 482. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 366. — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 327 (*Epirrhizanthus).*

Meisn. 1840. Gen. p. 314 (224): g. Aeginetiear.

Reut. 1847 in DC. Pr. XI. p. 44: g. Orobanchacear. dubium.

Synon. Epirixanthes Blume; Epirizanthe Blume.

Epirixanthes Blume 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 133: nov. g. Orobanchear.

praeced.

Epirizanthe Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VII: g. Orobanchae aff.

praeced.

Epirrhizanthus Wittst. vid. *praeced.*

Episanthera Hochstett. mss.

Paulo-Wilhelmia Hochst.

Episcia*) Martius 1829. Nov. gen. III. p. 39. t. 216. 217: nov. g. Gesnerear. (Besleria melittifolia L.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 655: g. Besleriear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 546. — Meisn. 1840. Gen. p. 304 (214). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 62.

Endl. 1839. Gen. n. 4164. p. 721; 1841. Ench. p. 349: g. Episciear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4679. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 580. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 367.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 258: g. Gesneriear.

Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 360: g. Cyrtandrear.

Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 207: g. Drymoniear.

Episcieae Endl. 1839. Gen. p. 720 (sph. *Episicieae*); 1841. Ench. p. 349: trib. Gesnerear. Gen.: Drymonia, Tapina, Nematanthus, Alloplectus, Episcia. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 120. Gen. ead. et Klugia, Tussaca.

Episicieae Endl. vid. *praeced.*

Episperma Rafin. 1814. Préc. somiol. n. 53: nov. g. Algar. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 15. p. 90, ubi ad Vaucheriam genus reducitur.

= Ceramium Agdh. (Endl. Gen. p. 5.)

*) σκιά, umbra, quia loca umbrosa diligunt.

Episporeae „Aresch." Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 123: series Fucacear. Divis.: Laminarieae, Dictyoteae, Myrionemeae.
Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 340: ordo Fucacear. Fam.: Laminarieae, Sporochneae, Dictyoteae, Chordarieae.

Epistamineae Juss. 1824. Dict. v. 30. p. 463: class. V. Dicotyledonum.

Epistemon Griseb. 1842 in Mart. Fl. Bras. Diosc. p. 39: sect. Dioscoreae.

Epistemum Walpers 1839. Linnaea XIII. p. 473: nov. g. Genistear. (*Amphithalea cuneifolia* Eckl. & Zeyh.?) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6468. p. 1262; 1841. Ench. p. 668. — Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5890. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 350. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 368.
= Amphithalea Eckl. & Zeyh.

Epistephium Kunth 1822. Synops. I. p. 340 et 1825 in HBK. nov. gen. VII. p. 158. t. 632: nov. g. Epidendrear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 716. n. 2979; 1831. Gen. II. p. 663. n. 3346: g. Orchidear.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 11 (Linnaea II. p. 529): g. Gastrodiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1459. — Bartl. 1830. Ord. p. 57.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Arethusear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1612. p. 220; 1841. Ench. p. 114. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 368.
Blume 1835. Rumphia I. p. 196: g. Vanillear. (?) — Par. Lindl. 1840. Orchid. p. 432. — Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2186. — Meisn. 1842. Gen. p. 384 (287).
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 52. t. 91. 92.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Vanillidar.

Epistictum Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 70; 1789. Beitr. IV. p. 148. (*Lichen miniatus*.)
= Endocarpon Hedw.

Epistomi Brid. 1822. Meth. musc. p. XVII. 193: class. Muscor. frondosor. Ordines: Gymnostomi (Calymperes), Peristomi (Polytrichum, Catharinaea.)

Epistylium*) Swartz 1800. Fl. Ind. occ. II. p. 1095. t. 22: nov. g. Monadelph. Diandr.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 570. n. 1742: g. Monoec. Monadelph.
Pers. 1807. Ench. II. p. 588. n. 2145: g. Euphorbiaceur. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 90. — Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 17.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 370: g. Euphorbiear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 804. n. 3083; 1831. Gen. II. p. 686. n. 3459: g. Tricoccar. (in Monoec. Diandr.)

*) ἐπιστύλιον, capitellum s. fastigium, quod columnae imponitur.

Epistylium Swartz cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5069; 1841. Nom. p. 195. n. 7421: g. Phyllanthear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486. — Endl. 1840. Gen. n. 5858. p. 1121; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 343 (254). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Euphorb. p. 646: g. Phyllanthidear. Sect.: Euepistylium, Eriococcus.

Epitea Fries 1832. Syst. mycol. III. 2. p. 510: nov. g. Hypodermior.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 511: g. Epiteor. (*Synon. Lecythea Lév.*)
Bonord. 1851. Hdb. p. 130: g. Tubercularinor.
= Melampsora Cast. (ex Tulasne.)

Epitei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 511: subdiv. Uredineor. Gen.: Epitea, Podocystis, Coleosporium, Cystopus.

Epithecia „Knowl. & Westc." Steud. 1840. Nomencl. I. p. 561: nov. g. Vandear. (E. glauca.)

Epithema*) Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 737: nov. g. Primulacear.
Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 403: g. Gesneriacear.
Benth. 1835. Scroph. ind. p. 57.
R. Brown 1838 in Horsf. pl. jav. rar. p. 120: g. Cyrtandrear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257.
Endl. 1839. Gen. p. 718. n. 4144; 1841. Ench. p. 349. n. $4140/_3$: g. Didymocarpear.
DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 303 (212); 1845. Pr. IX. p. 278: g. Epithemear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 736.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4712: g. Henckeliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.
Synon. Aikinia R. Brown.

Epithema Brébiss. 1838. Consid. p. 16: novum g. Diatomear., serius (1849 in Orb. Dict. V. p. 369) ab auctore ad Eunotiam Ehr. reductum.
= Epithemia Kütz.

Epithemeae „DC. mss." Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 303 (212): subtrib. Didymocarpear. Gen.: Stauranthera, Epithema. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 278. Gen. ead. et Quintilia.

Epithemia Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 57; 1849. Spec. Alg. p. 1. n. 1: g. Eunotiear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 547.
Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: g. Eunotiaceur.
Synon. Epithema Bréb.; Cymbella Hass.; Naviculae, Eunotiae et Frustuliae sp. Auct.

Epithinia Jack . . . . Malay. misc. I. n. 2. p. 12; 1831 in Hook. Bot. Misc. II. p. 67: nov. g. Rubiacear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 477: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 565.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 423: g. Guettardeur. — Par. Meisn. 1838. Gen.

*) ἐπίθεμα, operculum, corona.

Epithinia Jack cont.
p. 165 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2869.
Endl. 1838. Gen. n. 3219. p. 545; 1841. Ench. p. 273: g. Euguettardear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.

Epitrachys DC. 1828 in Duby Bot. gall. I. p. 286: sect. Cirsii. *(Epitrachis Wittst.* Etym. Handw. p. 328.*)* — Par. Koch 1837. Syn. p. 392. Ed. II. p. 452 et Nägeli 1845. ibid. p. 989. — Rchb. 1844. Fl. sax. p. 183. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 249.
C. Koch 1857. Linnaea XXIV. p. 396: g. Carduinear. Sect.: Lophiolepis, Eriolepis.
Conf. Eriolepis Cass.

Epitriche Turczan. 1851. Bull. soc. Mosc. XXIV. 2. p. 74: nov. g. Angianthear. (E. cuspidata.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 260.

Epochnium*) Link 1809. Berl. Mag. III. p. 18: nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 15. p. 93. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 338. — Agdh. 1821. Aphor. p. 80. — Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 24.
Nees 1816. Syst. p. 45; 1817. Ueberbl. p. 11: g. Sporomycor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Sporotrichor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 550: g. Mucedinear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 539: g. Sporotrichear.
Link 1824. Spec. I. p. 32: g. Hyphomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 186: g. Trichomycor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 110.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Byssacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Leptomycetum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 448: g. Sepedonieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 213. p. 18; 1841. Ench. p. 14. — Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 97. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 69. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 9; 1842. Mycol. p. 33: g. Bactridiacear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 496: g. Sepedoniaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 90: g. Psiloniaceor.

Epymenia Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 787. n. 525: nov. g. Sphaerococcear. (Phyllophora obtusa Grev.)
Sond. 1852. Linnaea XXV. p. 677 *(Epimenia):* g. Cryptonemear.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 248: g. Cryptonemiacear.

Equisesites Unger Syn. pl. foss. p. 16: sphalm. pro *Equisetites.*

*) ὄχνη, pyrus sylvestris.

Equiseta Endl. 1836. Gen. p. 58: class. Acrobryor. Protophytor. Ordo unicus: Equisetaceae.
= Calamariae Endl.

Equisetaceae Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. II. p. 281: ordo Cryptogamiae. Gen.: Equisetum. *Cf.* Orb. Dict. V. p. 381.
DC. 1805. Franç. II. p. 580: fam. Monocotyledonum cryptogamar. Gen. id.
Mirb. 1815. Élém. I. p. 386: fam. Cryptogamar. (Structura.) — Par. Leman 1819. Dict. v. 15. p. 138. Gen. id.
Mass. 1818. Dict. v. 12. p. 97: div. Cryptogamar.
DC. 1819. Théor. élém. p. 249: ordo Endogenar. cryptogamar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 25: fam. plantar. endogenar. cryptogamar. Gen. id.
Vauch. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 329. *(Monogr.)*
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 67: fam. Arcaniae.
Agdh. 1822. Aphor. p. 119; 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 584: class. 4 Pseudocotyledonear. Gen. id. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 99. Gen.: Ortholepidodendrum, Columnaria, Calamites, Culmites, Bajera, Equisetum.
Kaulf. 1824. En. Fil. p. 1: ordo Filicum. Gen.: Equisetum.
Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXV: ordo 4 Acotyledonum. Gen. foss.: Columnaria, Calamites, Culmites, Bajera.
Rchb. 1828. Consp. p. 79; 1831. Fl. exc. p. 153; 1837. Hdb. p. 165; 1841. Nom. p. 61: fam. Inconspicuar. Gen. Equisetum.
Brongn. 1828. Hist. vég. foss. p. 99.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo *(263)* Filicoidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 21: ordo Gonyopteridum. Gen. id.
Lindl. 1833. Nix. p. 32: ordo Gymnospermar.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 312; 1847. Veg. kd. p. 61: ordo Muscalium. Gen. id.
Endl. 1836. Gen. p. 58: ordo unicus Equisetor. Gen.: Equisetum, Calamites.
Meyer 1836. Chl. hann. p. 665: fam. unica Conosporar. Gen.: Equisetum.
Kunth 1838. Berol. II. p. 426: fam. Filicoidear. Gen. id.
Endl. 1841. Ench. p. 33: ordo Calamariar. Gen.: Equisetum, Oncylogonatum. — Par. Unger 1845. Syn. p. 29; 1846. Chlor. prot. p. XXXII. Gen.: Equisetum.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 9: ordo Peltispermar. Gen.: Equisetum.
Meisn. 1843. Gen. p. 429 *(329)*: ordo Acotyledonear. vasculariear. Gen. id.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 6: fam. Filicinear. Gen. id.
Schleid. 1843. Grundz. II. p. 90: div. Agamar.
Koch 1845. Syn. ed. II. p. 963: ordo Endogenear. cryptogamar. Gen. id.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 332: subordo Filicoidear. Gen. id.

Equisetaceae Rich. cont.
Leun. 1849 Schul-Naturg. II. p. 211: fam. unica Goniocaular.
Sjöstrand 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 503: fam. Juliflorar. (Appendix.)
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 16. 121: fam. Cryptogamar. vascularium. Gen. id.
Synon. Peltata Hoffm.; Julospermae Wigg.; Peltigerae Batsch; Gonopterides Willd.; Stachyocarpa Lühnem.; Equisetinae Link; Equiseteae Spreng.; Equisetineae Dumort.; Peltasporae Schulz; Goniocaulae Leun.

Equisetaceites Sternb. Vers. II. p. 106 vid. *Equisetoidites Sternb.*

Equisetarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: ordo Dermogynar. Fam. unica: Equisetineae.

Equiseteae Spreng. 1827. Syst. IV. p. 10; 1831. Gen. II. p. 717: fam. Cryptogamar. secr. 1. Gen.: Equisetum.
Bisch. 1828. Krypt. Gew. Fasc. I. *Cf.* Flora 1829. II. p. 673.

Equisetinae Link 1822. Enum. II. p. 454 (err. typ. *Equisitinae*): ordo Filicum.
Genth 1836. Nass. I. p. 5: fam. Filicoidear. Gen.: Equisetum.

Equisetineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66. 67: fam. Equisetariear. Gen.: Equisetum.
= Equisetaceae Rich.

Equisetites Sternb. 1838. Vers. II. p. 43: g. Equisetoiditum. (p. 106 Equisetaceitum.)
Unger 1844. Bot. Zeit. p. 180; 1845. Syn. p. 26; 1846. Chlor. prot. p. XXXI (*Equisesites*): g. Calamitear.
Synon. Oncylogonatum Kön.; Equisetum Brongn.

Equisetoidites Sternb. 1838. Vers. II. p. 39 (p. 106 *Equisetaceites*): ordo plant. foss. Gen.: Equisetites, Calamites, Volkmannia.

Equisetum*) Tourn. 1700. Inst. p. 532. t. 307: g. pl. class. XV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 328: g. pl. class. XVI.
Linn. 1737. Gen. p. 322. n. 777; 1737. Cliff. p. 471; 1740. Syst. p. 32; 1753. Sp. II. p. 1061; 1759. Syst. ed. X. p. 1308. n. 1033; 1763. Sp. ed. II. p. 1516; 1764. Gen. ed. VI. p. 559. n. 1169; 1767. Syst. ed. XII. p. 684: g. Filicum. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 134. — P. Browne 1756. Jamaic. p. 108 (*Equisitum*). — Hill 1769. Ht. kew. p. 431. — Scop. 1772. Carn. II. p. 285. — Murr. 1774. Syst. p. 778; 1784. Syst. p. 925. — Reich. 1778. Gen. p. 554. n. 1284. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 328. — Roth 1788. Germ. I. p. 440. — Lour. 1790. Coch II. p. 671. — Gmel. 1791. Syst. p. 1288. — Mönch 1794. Meth. p. 719. — Pers. 1797. Syst. p. 966. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 70. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 29. (spurior.) — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 49. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 247.

Equisetum Tourn. cont.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 142; 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 348: g. Epiphyllospermar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Algar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 481: g. Pinuum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Coniferar.? — Par. Scop. 1777. Intr. p. 355. — Gis. 1792. Prael. p. 586.
Gled. 1764. Syst. p. 287. n. 1170: g. Filicinar.
Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Palat. II. p. 455: g. Filicear.
Wigg. 1780. Holsat. p. 74: g. Julospermar.
Juss. 1789. Gen. p. 17: g. Filicibus aff.
Neck. 1790. El. III. p. 283. n. 1679: g. Catabophytor.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 753. n. 1614: g. Miscellanear. — Par. Roth 1800. Germ. II. p. 3.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 2: g. unicum Peltator.
Bernh. 1800 in Schrad. Journ. II. p. 134: g. Periaedoeatar.
Willd. 1802. Bem. üb. Farrenkr.: g. Stachyopteridum. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 245.
Batsch 1802. Tab. p. 260: g. unicum Peltigerar.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 281: g. Equisetacear. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 580; 1815. V. p. 244. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 42. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 25. — Vauch. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 359. — Kunth 1822. Syn. I. p. 99; 1838. Berol. II. p. 426. — Agdh. 1822. Aphor. p. 120. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 1. — Leman 1826. Dict. v. 43. p. 273 (*Prêle*). — Rchb. 1828. Consp. p. 79. n. 1689; 1831. Fl. exc. p. 154; 1841. Nom. p. 61. n. 2332. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 274. — Bartl. 1830. Ord. p. 21. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 103. — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 3. — Endl. 1836. Gen. n. 601. p. 58 (sect. Equisetum, Oncylogonatum); 1841. Ench. p. 34. — Meyer 1836. Chl. hann. p. 665. — Link 1841. Fil. h. Berol. p. 10. — Meisn. 1843. Gen. p. 429 (329). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 6. — Koch 1845. Syn. ed. II. p. 963. — Unger 1845. Syn. p. 29; 1846. Chlor. prot. p. XXXII. 124. t. 37. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 62. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 332. — Webb 1850. Canar. III. p. 457. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 485. — Math. 1853. Belg. II. p. 7. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 122. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 643.
Willd. 1809. Enum. p. 1064; 1810. Sp. V. p. 1. n. 1935: g. Gonopteridum. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 1.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 27: unicum g. Stachyocarpor.
Wahlenb. 1815. Nov. Act. Ups. VII. p. 177: g. Tetradidymar.?
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 113: g. Rhizospermar.?

*) Nomen ex Plinio. („Equisetum est pilus terrae equinae setae similis".)

Equisetum Tourn. cont.
Link 1822. En. II. p. 454: g. Equisetinar. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 5.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 688: g. Filicoidear. verticillatar.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 10. n. 3215; 1831. Gen. II. p. 717. n. 3606: g. Equisetear. — Par. Bisch. 1828. Krypt. Gew. I. p. . . . — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 320.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Equisetinear.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 5: g. Conopteridum.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): g. Peltasporar.
A. Braun 1839. Isis p. 836. Sect.: heterophyadica, homophyadica.

Equisetum Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 47: g. Equisetacear. foss.
= Equisetites Sternb.

Equisitum P. Browne vid. *Equisetum Tourn.*

Eraclissa*) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 208: nov. g. Pentandr. Hexagyn. *Cf.* Juss. 1819. Dict. v. 15. p. 158. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 520.
Scop. 1777. Intr. p. 239 *(Eraclyssa)*: g. Tricoccar.
= Telephioides Tourn.

Eraclyssa Scop. vid. *praeced.*

Eragrostideae Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. . . . : subtrib. Bromear. Nova gen.: Opizia, Polyschistis, Cathestecum.

Eragrostis**) Palis. 1812. Agrost. p. 70. t. 14. f. 11: nov. g. Graminear. (Poa Eragrostis L.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 32. 574. n. 295. — Link 1829. Hdb. I. p. 75.
Trin. 1820. Fund. p. 37: g. (Triandr. Digyn.) Graminum. — Par. Ledeb. 1829. Alt. I. p. 94. — Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 395; 1838. ibid. IV. p. 70.
Link 1821. En. I. p. 87: sect. Poae. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 134; 1841. Nom. p. 39. n. 1383. 3. — Endl. 1837. Gen. n. 876 *b*. p. 98; 1841. Ench. p. 59.
Link 1827. Hort. I. p. 187: g. Glycerinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1031; 1830. Fl. exc. p. 48: g. Poacear. Sect.: Eragrostis, Megastachya. — Par. Rupr. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 235. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 407.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Poëar. — Par. Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 137. 163. 203; 1846 in Lehm. Pl Preiss. II. p. 106. — Griseb. 1843 in Ledeb. Ross. IV. p. 381.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 493: g. Festucear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 440.
Presl 1830. Rel. Hänk. I. p. . . . : g. Eragrostidear.

*) Nomen ex loco natali *Eraclissa*.
**) ἦρ, ver; Agrostis.

Eragrostis Palis. cont.
Koch 1837. Syn. p. 799. Ed. II. p. 924: g. Festucacear. — Par. Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 41. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 158; 1850 in Webb Canar. III. p. 409. — Steud. 1854. Glum. I. p. 263. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 547.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 390: g. Festucinear.
Synon. Brizoma Nutt.; Erochloe Rafin.

Erangelia Renealm. 1611. Spec. t. 96.
= Galanthus Linn.

Eranthemeae Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 76: div. Justiciear. Gen.: Eranthemum, Chameranthemum, Justicia, Rhinacanthus. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 110. Gen. ead. — Endl. 1839. Gen. p. 705; 1841. Ench. p. 344. Gen. ead. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. Gen. ead. — Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205). Gen. ead.
Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 151: trib. Acanthacear. Gen. bras.: Chaetothylax, Heinzelia, Chamaeranthemum, Eranthemum, Sebastiano-Schaueria.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 425: trib. Echmatacanthear. Gen.: Justicia, Rhinacanthus, Sericospora; Anisacanthus, Eranthemum, Chameranthemum, Anthacanthus, Chaetacanthus.

Eranthemum*) Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 6 (Nov. gen. zeyl. p. 3. n. 1032); 1747. Amoen. ac. I. Ed. 1749. p. 110; 1753. Sp. I. p. 9; 1759. Syst. ed. X. p. 848. n. 23; 1762. Sp. ed. II. p. 12; 1764. Gen. ed. VI. p. 11. n. 23; 1767. Syst. ed. XII. p. 56: g. Diandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 55; 1784. Syst. p. 57. — Reich. 1778. Gen. p. 11. n. 24. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 15. n. 30. — Lour. 1790. Coch. I. p. 19. — Gmel. 1791. Syst. p. 27. — Pers. 1797. Syst. p. 57; 1805. Ench. I. p. 10. n. 43. — Willd. 1797. Sp. I. p. 51. n. 41. — Vahl 1805. Enum. I. p. 304. n. 66. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 110. Ed. 1832. p. 110. — Roth 1821. Nov. spec. p. 1. Sejungitur Campylanthus.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Jasminor.
Gled. 1764. Syst. p. 152. n. 628: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 189: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 110: g. Viticibus aff.
Neck. 1790. El. II. p. 4. n. 607: g. Darinyphytor.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 252: g. Verbenacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 9. 346. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 159.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 476. Ed. Nees p. 332: g. Acanthacear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 791. — Link 1829. Hdb. I. p. 502. — Bartl. 1830. Ord. p.

*) Ἠράνθεμον Veterum, quia vere floret.

Eranthemum Linn. cont.
184. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 70. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 383.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 56. 173. n. 82: g. Verbenaceis aff.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 411; 1825. Syst. I. p. 88. n. 109; 1830. Gen. I. p. 24. n. 98: g. Acanthear. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 63. — Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3116.
Link 1821. En. I. p. 28: g. Acanthinar.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1097: g. Ruelliear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Justiciear.
Nees 1832 in Wall. Pl. rar. III. p. 76. 106; 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 285; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 155; 1847 in DC. Pr. XI. p. 445: g. Eranthemear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 110. n. 4280. Sect. ut Endl. — Endl. 1839. Gen. n. 4087. p. 705; 1841. Ench. p. 344. Sect.: Eueranthemum, Planetanthemum, Hesperanthemum. — Meisn. 1840. Gen. p. 247 (205). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 156. — Oersted 1855. Centralam. Acanth. p. 664. Subg.: Siphoneranthemum. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 664. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 834.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 64: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Justicidar.
Synon. Ephemerum Herm.? (ex Adans.); Pigafetta Adans.

Eranthis Salisb. 1807. Linn. Trans. VIII. p. 303: nov. g. ex typo Hellebori hyemalis L.
DC. 1818. Syst. I. p. 314; 1824. Pr. I. p. 46: g. Helleborear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4963. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50 *(Eranthus)*. — Bartl. 1830. Ord. p. 254. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 45 *(Eranthus)*. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Koch 1836. Syn. p. 19. Ed. II. p. 21. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4). — Endl. 1839. Gen. n. 4788. p. 848; 1841. Ench. p. 435. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 52. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 97. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Gren. *(& Godr.)* 1848. France I. p. 40. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 383. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 29.
Röpert 1820. Flora I. p. 123. Char. emend.
Link 1822. En. II. p. 97: g. Ranunculacear. — Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 422. 562. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 217. 336.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX: g. Calthear. (ibid. II. p. 984: sect. Hellebori.)
Spreng. 1830. Gen. I. p. 460. n. 2270: g. Ranunculear.
Link 1831. Hdb. II. p. 387 *(Eranthus)*: g. Aconitear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 745: g. Helleborinar.

Eranthis Salisb. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7252: g. Helleborastror.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 322: g. Helleborinear.
Synon. Aconitum Rupp.; Helleboroides Adans.; Helleborus Mönch; Robertia Mérat; Köllea Biria; Röhlingia Röp.

Eranthus Dumort., G. Don, Link vid. *praeced.*

Erasma „Soland." R. Brown 1818 in Abel Narr. Chin. p. 374 (Verm. bot. Schr. I. p. 562): g. Bruniacear. (Nomen). *Cf.* Endl. Gen. p. 808 et Meisn. Comm. p. 51. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 785.
Rchb. 1841. Nom. p. 159. n. 6211: g. Bruniear.?
= Gravenhorstia Nees?

Erasmia*) Miquel 1843. Syst. Piperac. p. 199: nov. g. Peperomiear. (E. floribunda.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 518: g. Peperomidar.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 15. n. 1821 *c:* sect. Peperomiae.

Erato**) DC. 1836. Prodr. V. p. 317: nov. g. Psiadiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2366. p. 383; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 188 (127). — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3321. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Solidaginear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 384: g. Chrysocomear.

Eratobotrys „Fenzl mss." Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 13. n. 1122: nov. g. Hyacinthear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 371. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 678. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 254.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Scillear.

Erblichia Seemann 1853. Fl. panam. p. 130. t. 27: nov. g. Passifloreas cum Turnereis jungens.

Ercilia Endl. vid. *seq.*

Ercilla A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 11: nov. g. Menispermear. (Suriana volubilis Domb.)
D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 273: g. Phytolaccear. *(Cf.* D. Don 1833. ibid. XIV. p. 261.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 166. n. 6453. (genuinar.: *Encilia)*.
Endl. 1840. Gen. n. 5263. p. 977 *(Ercilia)*; 1841. Ench. p. 508: g. Giesekiear. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 34. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 384 *(Ercilia)*.
Meisn. 1841. Gen. p. 322 (235): g. Gisekiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 509: g. Phytolaccacear.
Synon. Suriana Domb.; Bridgesia Hook. & Arn.; Ericilla Steud.

*) Dicat. Desiderio Erasmo Rotterodamo.
**) Nomen Musae; genus habitu Polymniae aff.

Erebinthus*) Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 210: nov. g. plantar., a Clitoria L. sejunctum, a Linnaeo (Amoen. ac. III. p. 9) ad Craccam reductum.
= Tephrosiae sect. Brissonia DC.

Erebonema**) Römer 1845: Alg. Deutschl. p. 70. t. 11. f. 300: nov. g. Leptomitear. (E. hercynica.) *Cf.* Mont. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 134. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 10. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 157. n. 109.

Erechthites Less., Spach, Brongn., Lemaire vid. *Erechtites Rafin.*

Erechthitoides DC. vid. *Erechtitoides.*

Erechtiteae DC. 1837. Prodr. VI. p. 293: div. Senecionear. Gen.: Faujasia, Eriothrix, Stilpnogyne, Erechtites, Cremocephalum. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 454; 1841. Ench. p. 224. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (135). Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 91: subdiv. Conyzear. Gen. ead.
Synon. Cacalieae Less. (exclusa Cacalia.)

Erechtites***) Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 65.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 449. 461; 1830. v. 60. p. 583: g. Othonnear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2511. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32 (*Erechthites*).
Bartl. 1830. Ord. p. 138: g. Senecionear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 38 (*Erechthites*). — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 96.
Less. 1832. Syn. p. 395 (*Erechthites*): g. Cacaliear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 294: g. Erechtitear. Sect.: Neoceis, Microderis, Tulodiscus, Plagiotome. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2790. p. 455; 1841. Ench. p. 244. Sect.: Neoceis, Microderris, Tylodiscus, Plagiotome? — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (136). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 433. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3549. Sect. ut Endl. (Erechtites loco Neoceidis). — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 483. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 385 (*Erechthites*). — Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 523. Sect.: Microderis, Tubodiscus, Plagiostome.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713: g. Neurolaenear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 141: g. Compositar.
Synon. Neoceis Cass.; Crassocephali sp. Less.; Senecionis sp. Auct.

Erechtitoides DC. 1837. Prodr. VI. p. 339 (*Erechthitoides*): sect. Kleiniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2809 *b*. p. 458; 1841. Ench. p. 244. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3363. 2 (*Erechtitopsis*).

Erechtitopsis Rchb. vid. *praeced.*

*) ἐρέβινθος Veterum = Cicer.
**) ἔρεβος, obscurus.
***) ἐρέχθω, rumpo, frango. (?) — Synonymum Senecionis apud Dioscoridem.

Ereciciphyllum DC. Pr. VI. p. 197: vid. *Ereicephyllum Less.*

Erecciphyllum Endl. Ench. in synon. Lepiclines: vid. *praeced.*

*Eredophytum**) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 219: gen. 24 plant. Spec. natur.: Smithia, Custinia, Fagarat, Evodia, Hamamelis, Vitis, Rhus, Pocophorum, Cotinus, Zygophyllum, Agophyllum, Ptelea, Cedrela, Toulicia, Ritinophora, Ruta, Amyris, Ernstingia, Melicocca, Oesculus, Pavia, Passiflora, Erndelia, Tephranthus, Limonia, Schinus, Bergiera, Bocconia, Salabertia, Laurus, Nyrophylla, Adaphus, Anacardium, Geeria, Reseda, Astrocarpus, Calodendrum.

Ereicephyllum**) Lessing 1832. Syn. Compos. p. 312: subg. Helichrysi.
Lepiclines DC. pars.

Ereicotis DC. 1830. Prodr. IV. p. 131: sect. Anotidis. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 533 (*Ericiotis*).
Endl. 1838. Gen. n. 3240 *d ε*. p. 549; 1841. Ench. p. 273: subsect. Anotidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2874. 4 *e*. — Walp. 1843. Rep. II. p. 497.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar. (*Synon. Scleromitrion W. & A.*)

Eremadenia Didrichsen 1857. Nat. For. Vid. Medd. . . . subg. Julocrotonis. (J. triqueter.)

Eremaea***) Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. XI: nov. g. Myrtacear. (E. ericifolia, pilosa, fimbriata.)
Endl. 1840. Gen. n. 6304. p. 1229; 1841. Ench. p. 650: g. Leptospermear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6843. — Walp. 1843. Rep. II. p. 166. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 737. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 385.
Meisn. 1843. Comm. p. 354: g. Euleptospermear.
Schauer 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 6; 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 156: g. Calothamnear.

Eremanthe†) Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 421; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 363: nov. g. Androsaeminear. (Hypericum calycinum L.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 308; 1841. Nom. p. 210. n. 7999: g. Androsaemear.
Endl. 1840. Gen. p. 1033. n. 5464 *B g;* 1841. Ench. p. 539. n. 5464 *C i:* sect. Hyperici.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 23: sect. Noryscae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 359.

Eremanthis Cassini 1827. Dict. v. 51. p. 63: sect. Stoebes.
DC. 1837. Pr. VI. p. 261: sect. Seriphii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2761 *a*. p. 450; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3924. 1.

*) ἐρείδω, fulcio; φυτόν, planta.
**) ἐρείκη, erica.
***) ἐρημαῖος, solitarius.
†) ἔρημος, solitarius, orbus.

Eremanthus Lessing 1829. Linnaea V. p. 317; 1830. ibid. VI. p. 682; 1832. Syn. Compos. p. 147: g. Vernoniear. (*E. glomerulatus.)*
Spreng. 1831. Gen. II. p. 649. n. 3273: g. Compositar. desciscent.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40: g. Rolandrear.
= Albertiniae sect. Isotrichia DC.

Eremia D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 156: nov. g. Ericear. normalium. (Erica Thotta Thunb.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 828. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4892. (genuinar.) Sect. ut Benth. (Eremia loco Eremiastrae.)
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 699: g. Salaxidear. Sect.: Eremiastra, Poderemia, Micreremia, Hexastemon. — Par. Rach 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 789 (*Euremia).*
Endl. 1839. Gen. n. 4306. p. 753; 1841. Ench. p. 369: g. Sympiezear. Sect. ut Benth. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 385.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.
Synon. Eremia et Hexastemon Klotzsch.

Eremia Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 218: g. restrict. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 244 (152). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443.
Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4892. 1: sect. Eremiae.
= Eremiastra Benth.

Eremiastra Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 699: sect. Eremiae. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 753. n. 4306 *b;* 1841. Ench. p. 369. n. 4306 *a.* — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 329 (*Eremiastrum).*
Synon. Eremia Klotzsch.

Eremiastrum A. Gray 1854. Mem. Amer. Ac. n. ser. V. p. 320: nov. g. Compositar. (E. bellioides.) *Cf.* Flora 1855. p. 587.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 186: g. Belliear.

Eremiastrum Wittst. vid. *Eremiastra Benth.*

Eremiris Spach 1846. Hist. vég. phan. XIII. p. 32; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 97: subg. Iridis. (I. triflora Balb.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 820.

Eremocallis Salisb. . . . . Hort. Trans. II. „Salisb. mss." Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 398: g. Ericinar. (Erica tetralix et cinerea L.)
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 665: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d* 35. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4 *i.* — Rach 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 782 (sph. *Emerocallis).*

Eremocarpus Rchb. 1837. Handb. p. 307; 1841. Nom. p. 210. n. 7992: g. Drosanthear.
= Eremosporus Spach.

Eremocarpus Benth. 1844. Voy. Sulph. Bot. p. 53. t. 26.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281: g. Crotonear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 91. n. 5826/$_2$.
Baill. 1858. Euphorb. p. 381: g. Crotonidear.

Eremocarpus „Bunge" Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 778: g. Seselinidar., inter Deverram et Soranthum collocatum.

Eremocephala DC. 1837. Prodr. VI. p. 137: sect. Pentziae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2700 *b.* p. 440; 1841. Ench. p. 242. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3458. 2.

Eremocharis Philippi „Fl. Atacam. ined." 1857. Bot. Zeit. p. 681: nov. g. Umbelliferar. (Nomen. *Cf.* descriptionem in Fl. Atacam. 1860. p. 25. t. 2. f. B: E. fruticosa.)

Eremochloa Büse 1854. Pl. Jungh. Fasc. III. p. 357: nov. g. Andropogonear. (E. Horneri.) — Par. Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 480.

Eremocosmus F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 428: nov. g. pro Eremophila viscida Endl. propositum.

Eremodaucus Bunge 1843. Del. sem. h. Dorp.; 1844. Linnaea XVIII. p. 151; 1847. Reliq. Lehm. p. 140; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 316: nov. g. Smyrnear. (E. Lehmanni.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 919: g. Scandicinear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 14. n. 4528/$_1$: g. Eusmyrnear. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 80.

Eremodendron „DC. mss." Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 292 (201): nov. g. Myoporinear. (Deless. Ic. sel. pl. V. p. 43.) — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 628. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 138; 1847. VI. p. 693.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 665: g. Myoporacear. — Par. A. DC. 1847. Pr. XI. p. 712. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 386.

Eremodon Brid. 1826. Bryol. I. p. 233: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIII g. Splachnoideor.) — Par. Nees & Hornsch. 1831. Bryol. germ. II. 2. p. 161.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Splachnoidear.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 91: g. Aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 502. p. 49; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear. Sect.: Cyrtodon, Aplodon.
Bruch & Schimp. . . . . Bryol. II. 2. p. 161.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 877: g. Calyptrobryor. Sect. ut Endl.
Mont. 1849 in Orb. Dict. (V. p. 386: g. Splachnacear.) VIII. p. 402: g. Splachnear. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 93.
= Tayloriae et Dissodontis sp. Müll.

Eremoglaston Bunge (1847. Arb. Rig. Ver. I?) 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 214: sect. Isatidis.

Eremogone Fisch. & Meyer (ubi?)
Fenzl 1833. Verbr. d. Alsin. p. 13.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Arenarinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5234 *a.* p. 967; 1841. Ench. p. 505: sect. Arenariae.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7794: g. Arenariear.
Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 360: subg. Arenariae.

Eremogongyle*) Endl. 1839. Gen. n. 4974 *b.* p. 887; 1841. Ench. p. 451: sect. Erucariae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 179. n. 6911. 2.

Eremolepis Griseb. 1856. Abh. Gött. Ges. VI. p. 124 (Diagn. pl. Phil. et Lechl. p. 36): nov. g. Loranthacear. (Lepidoceras punctulatum Clos.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 90.

Eremolobium Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 45: sect. Argyrolobii. (Cytisus uniflorus Decne.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 843. — Benth. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 348.

Eremophila R. Brown 1810. Prodr. I. p. 518. Ed. Nees p. 374: nov. g. Myoporinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3047; 1837. Hdb. p. 196. — Bartl. 1830. Ord. p. 177.
Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 162: g. Verbenacear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 767. n. 2137; 1831. Gen. II. p. 482. n. 2379: g. Verbenear.
Endl. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 203; 1839. Gen. n. 3735. p. 642; 1841. Spl. I. p. 1401; 1841. Ench. p. 318: g. Myoporinear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 292 (201). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 247. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 628. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 139.
Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4450: g. Stenochilear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 665: g. Myoporacear. — Par. A. DC. 1847. Pr. XI. p. 712. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 387.
R. Brown 1849. App. to Sturt p. 84: Eromodendron A. DC. injungit.
F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 428 in adnot.: subg. Stenochili.

Eremopyrum Ledeb. 1829. Fl. Alt. I. p. 112: sect. Tritici. (T. prostratum, orientale, cristatum, sibiricum.) — Par. Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 336.
Jaub. & Spach 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 360 (Ill. pl. or. IV. t. 319): g. a Tritico sejunctum (opponente Griseb. in Arch. f. Nat. 1853. II. p. 399).
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 784: g. Hordeacear.
Conf. Ctenopyrum Link; Pycnopyrum C. Koch.

Eremosis DC. 1836. Prodr. V. p. 77: sect. Monosidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2220 *b.* p. 360; 1841. Ench. p. 232. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3884. 2.
Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 506: sect. Vernoniae.
Synon. Turpinia La Llave & Lex.?

Eremosparton Fisch. & Meyer 1841 in Schrenk En. pl. nov. p. 76: nov. g. ex typo Spartii aphylli Pall.
Endl. 1842. Spl. II. p. 109. n. $6569/_1$: g. Astragalear.
Ledeb. 1842. Ross. I. p. 575: g. Galegear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 350. — Walp. 1843. Rep. II. p. 860. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.

Eremospermeae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 82; 1843. Phycol. gener. p. 146; 1845. Phycol. germ. p. 118; 1849. Sp. Alg. p. 145: ordo Gymnospermear. Subordines: Mycophyceae, Chamaephyceae, Tiloblasteae, Dermatoblasteae, Coeloblasteae. — Simil. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 4.

Eremosphaera De Bary 1858 . . . (g. Palmellacear.? ex Rabenh. Alg. p. 23.)

Eremosporus Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 374; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 355: nov. g. Drosanthinear. (E. Oliverii.)
Endl. 1840. Gen. n. 5464 *A a.* p. 1032; 1841. Ench. p. 539: sect. Hyperici?
Synon. Eremocarpus Rchb.

Eremostachys*) Bunge 1830 in Ledeb. Fl. Alt. II. p. 414 (Ledeb. Ic. pl. II. t. 122): nov. g. Labiatar. (Phlomis laciniata L.)
Benth. 1834. Labiat. p. 636: g. Stachydear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 855. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 356. 462. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 66.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188; 1841. Nom. p. 106. n. 4108: g. Phlomitear.
Endl. 1838. Gen. n. 3666. p. 629; 1841. Ench. p. 308: g. Ballotear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 288 (197). — Walp. 1845. Rep. III. p. 891. 990.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Ballotidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 547: g. Lamiear. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 439.

Eremosyce Steud. vid. *seq.*

Eremosyne Endl. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 53: nov. g. Saxifragacear. (E. pectinata.) Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 566 (*Eremosyce*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 568.
Meisn. 1838. Gen. p. 136 (100): g. Saxifragear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4629. p. 813; 1841. Ench. p. 408. — Rchb. 1841. Nom. p. 157. n. 6151. (genuinar.) — Walp. 1843. Rep. II. p. 362. — Lehm. 1847. Pl. Preiss. II. p. 236 (sph. *Enemosyne*). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 387.

Eremurus Marsch.-Bieb. 1818. Cent. pl. Ross. II. t. 61; 1819. Fl. taur. cauc. III. p. 269: nov. g. Hexandr. Monogyn. (Asphodelus altaicus Pall.)
Link 1821. En. I. p. 328: g. Liliacear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 83. n. 1237; 1830. Gen. I. p. 267. n. 1389: g. Asphodelear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXV. 482. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 25. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1146.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1390: g. Abamear.
Link 1829. Hdb. I. p. 175: g. Hyacinthinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: g. Anthericear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1140. p. 147; 1841. Ench. p. 84. — Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1794. — Meisn. 1842. Gen. p. 400 (304). — Kunth 1843. Enum. IV. p.

*) γογγύλη, rapum.

*) ἔρημος, solitarius; στάχυς, spica.

Eremurus Marsch.-Bieb. cont.
553. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 366. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 387. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 90.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 19: g. Aloinear.

Ereption Steud. Nom. I. p. 566: lege *Erpetion Sweet.*

Eresda*) Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 101: nov. g. Resedinear. (Reseda alba Sibth. et fructicosa Jacq.)
= Reseda Tourn.

Eresia**) Plumier 1703. Gen. p. 8. t. 25.
= Clavija Ruiz & Pav.

Ergaleium***) DC. 1824. Prodr. I. p. 319: sect. Droserae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4910 *b (Ergaleium).* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 346 *(Ergaleum).* — Arn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 314. — Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 94. 291. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 73.
Synon. Esera Neck.?

Ergaleum G. Don vid. *praeced.*

Erharta Juss., St. Hil. vid. *Ehrharta Thunb.*

Erhetia Hill vid. *Ehretia Linn.*

Eria Lindl. 1825. Bot. Regist. XI. t. 904: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 17 (Linnaea II. p. 531): g. Malaxidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1554. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — A. Rich. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 19.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear. — Par. Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 182. Subgen.: Cylindrolobus, Trichotosia.
Lindl. 1830. Orchid. p. 65: g. Dendrobiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1363. p. 192; 1841. Ench. p. 109. Sect. Dendrolirium, Pinalia. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1952. Sect. eaed. — Meisn. 1842. Gen. p. 370 (277). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 25. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Dendrobidar. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 656. Sect ut Blume et Dendrolirium, Urostachya, Tylostylis, Mycaranthes, Hymeneria, Eriura.
Synon. Dendrolirium Blume; Pinalia Lindl.; Erioxantha Rafin.; Lichinora Wight.

Eriachaenium Schultz Bip. 1850. Flora I. p. 120: nov. g. Osteospermear. (E. magellanicum.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 349 *(Eriochaenium).*

Eriachne†) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 183. Ed. Nees p. 39: nov. g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 40. 693. n. 334. Sect. Eriachnes, Achneriae. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 173. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 69. n. 333.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 160: g. Avenacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 149. — Kunth 1830. Gram. p. 105; 1833. Agrost. p. 309. — Endl. 1837. Gen. n. 869. p. 97; 1841. Ench. p. 58. Sect.: Eriachne, Achneria. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 344. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1220. Sect. eaed. — Meisn. 1843. Gen. p. 423 (324). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 390. — Steud. 1854. Glum. I. p. 236. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 428.
Trin. 1820. Fund. p. 143: g. Triandr. Digyn.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear.
Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838) p. 2: g. Avenaceor.
Nees 1841. Fl. Afr. austr. ill. I. p. 273; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 102: g. Avenear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116.

Eriachne Palis. 1812. Agrost. p. 93: g. Graminear., sejuncta Achneria restrictum.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 693: sect. Eriachnes. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 869 *a.* p. 97; 1841. Ench. p. 58. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1220 2.

Eriantha Barnéoud 1845. Mon. Plantag. p. . . . : sect. Plantaginis.
= Coronopus Tourn.

Erianthemis Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 205: sect. Anthemidis. (A. tomentosa L.)

Erianthera Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 115; 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 485; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 514: nov. g. Andrographidear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 110. n. 4292. — Endl. 1839. Gen. n. 4099. p. 707; 1841. Ench. p. 344. — Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 147. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 390.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 81: g. Acanthacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Andrographidar.

Erianthera Benth. 1833 in Hook. Bot. Miscell. III. p. 380: nov. g. Nepetear. (E. rhomboidea.)
= Lamiopsis Dumort.

Erianthera G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 639: sect. Pentstemonis. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 249. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 320.

Erianthus Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. I. p. 54: nov. g. Graminum, Sacharo aff. — Par. Link 1821. En. I. p. 105.
Pers. 1805. Ench. I. p. 103: sect. Sacchari. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 36. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 60. — Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 310. — Steud. 1854. Glum. I. p. 407.
Willd. 1809. Enum. p. 46: g. Diandr. Digyn. — Par. Elliott 1821. Sketch I. p. 38.
Palis. 1812. Agrost. p. 14: g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 14. 323. n. 221. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 175. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 92.

*) Anagramma nominis Reseda.
**) Dicat. Theophrasto Eresio, Melanthii Fullonis filio.
***) ἐργαλεῖον, instrumentum.
†) ἔριον, lana; ἄχνη, palea.

Erianthus Rich. cont.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Saccharinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 177. — Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 988. — Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. 1. Spl. I. p. 183.
Schult. 1824. Mart. II. p. 9. 179: g. Triandr. Digyn.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Saccharinear. — Par. Nees 1829. Agrost. Bras. p. 313.
Kunth 1830. Gram. p. 160: g. Andropoginear.
Kunth 1833. Agrost. p. 478: g. Andropogonear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 769. Ed. II. p. 889. — Endl. 1837. Gen. n. 942. p. 107; 1841. Ench. p. 60. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 20. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 399. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1344. — Meisn. 1843. Gen. p. 428 (327). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 10. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 167. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 441. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 390. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 470.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 472; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 475: g. Saccharear.
Synon. Ripidium Trin.; Microstegium Nees?; Sacchari sp. Linn.

Erica*) Tourn. 1700. Inst. p. 602. t. 373: g. pl. class. XX.
Linn. 1737. Gen. p. 110. n. 312; 1737. Cliff. p. 147; 1740. Syst. p. 22; 1753. Sp. I. p. 352; 1759. Syst. ed. X. p. 1002. n. 435; 1762. Sp. ed. II. p. 501; 1764. Gen. ed. VI. p. 192. n. 484; 1767. Syst. ed. XII. p. 268. n. 479: g. Octandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 274. — Murr. 1774. Syst. p. 301; 1784. Syst. p. 363. — Reich. 1778. Gen. p. 196. n. 524. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 258. n. 659. — Gmel. 1791. Syst. p. 622. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 69. — Pers. 1797. Syst. p. 388; 1805. Ench. I. p. 420. n. 963. — Willd. 1799. Sp. II. p. 356. n. 770; 1809. En. p. 416.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 83. n. 347: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 49.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 460. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 237.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 164: g. Vaccinior.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 129: g. Diplosantherar.
Scop. 1777. Intr. p. 193: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 160: g. Ericar. — Par. Palis. 1804. Dict. v. 5. p. 386 *(Bruyére)*. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 358. — Hedw. 1806. Gen. p. 276. n. 1112.

Erica Tourn. cont.
Neck. 1790. El. I. p. 215. n. 355: g. Dicroophytor. Disjunguntur Lopharina, Apogandrum.
Wendl. 1798. Ericar. icon. et descript.
Andrews 1802. Engravings of Heaths. Lond. 4 vol.
Batsch 1802. Tab. p. 218: g. Ericariar.
Salisb. 1802. Linn. Trans. VI. p. 323. Sejunguntur Calluna et Salaxis.
DC. 1805. Franç. III. p. 676; 1815. V. p. 430: g. Ericacear. — Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 4. 23. Sect.: Calluna, Erica. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28. — Koch 1837. Syn. 476.
Waitz 1805. Beschr. d. Gatt. u. Arten der Heiden. (Isis 1825. p. 680.)
Mirb. 1815. Élém. II. p. 883: g. Rhodoracear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 514; 1825. Syst. II. p. 177. n. 1408; 1830. Gen. I. p. 298. n. 1529: g. Ericear. (1818 bicornium). — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3379; 1831. Fl. exc. p. 412; 1841. Nom. p. 125. n. 4887. Subgen. (1841) ut Benth. — Link 1829. Hdb. I. p. 611. (genuinar.) Subgen.: Solenerica, Craspederica, Physerica, Calycerica, Tetralix. — Bartl. 1830. Ord. p. 156. — Klotzsch 1834. Linnaea IX. p. 359; 1838. ibid. XII. p. 217 (Eleutherostemonum). — Tausch 1837. Flora II. p. 481. — Kunth 1838. Berol. II. p. 4. — Meisn. 1839. Gen. p. 244 (152). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 445. — Dietr. 1840. Gen. II. p. 1227. 1232. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 389. Sect.: Arsace, Gypsocallis. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 71. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 547. — Webb . . . . Canar. III. p. 13. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 428.
Link 1821. En. I. p. 358: g. Ericinar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL: g. Callunear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: g. Andromedear.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 612: g. Euericear. Subgen.: Ectasis, Syringodea, Stellanthe, Euerica. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4313. p. 754; 1841. Spl. I. p. 1411; 1841. Ench. p. 369. Sect. (1841) ut Benth. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 914.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.
Synon. Erica spuria Hall.; Tetralix Hall.; Apogandrum et Lopharina Neck.?; Gypsocallis et Eremocallis Salisb.; Pachysa, Ceramia, Desmia, Eurylepis, Eurystegia, Lophandra, Lamprotis, Callista, Euryloma, Chona, Syringodon, Dasyanthus, Ectasis, Eriodesmia et Octopera D. Don.

Erica Rupp. 1718. Fl. jen. p. 80. Ed. Hall. 1745. p. 90: g. pl. class. IV.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 418: g. Dicotyledonum Diplostemonum.
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 488: g. Vacciniatar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 302. t. 63. f. 3 (vulgaris).
= Calluna Salisb.

---

*) ἐρείκη Veterum.

Erica D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 152: g. Ericear. normalium, emissis multis restrictum. (E. cinerea L.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 790.
= Ericae Tourn. pars.

Erica spuria s. *Tetralix* Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 39: g. pl. class. I.
= Erica Tourn. (exclusa Calluna.)

Ericaceae DC. 1805. Fl. franç. III. p. 675: fam. (54) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Erica, Calluna, Andromeda, Arbutus, Pyrola, Empetrum, Vaccinium.
Rchb. 1828. Consp. p. 129; 1831. Fl. exc. p. 411: fam. Crateriflorar. Divis.: Pyroleae (1831 Monotropeae), Ericeae, Rhodoraceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 205; 1841. Nom. p. 125. Divis.: Ericariae, Vaccinieae, Rhodoreae (1841 Rhodoraceae).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21. 28: fam. Ericariear. Gen.: Arbutus, Arctostaphylos, Gualteria, Enkianthus, Andromeda, Lyonia, Mylocaryum, Clethra, Cyrilla, Brossaea, Sympieza, Calluna, Erica, Menziesia, Diapenzia, Pyxidanthera, Galax.
D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 152. (*Cf.* Flora 1835. Beibl. p. 71.) Tribus: Ericeae, Rhodoreae, Vaccinieae, Pyroleae, Monotropeae, Epacrideae.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 785: ordo Calyciflorar. Trib. ut D. Don exclusis Epacrideis. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 580. Trib.: Arbuteae, Andromedeae, Ericeae, Rhodoreae.
Mart. 1835. Consp. p. 26: ordo 152.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 220.
Koch 1837. Syn. p. 475: trib. Ericinear. Gen.: Arbutus, Arctostaphylos, Andromeda, Calluna, Erica.
Endl. 1839. Gen. p. 750; 1841. Ench. p. 368: ordo Bicornium. Subord.: Ericinae, Vaccinieae, Rhododendreae. — Par. Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 11. 12. (restrict.) *Cf.* Walp. Ann. bot. II. p. 1077.
Meisn. 1839. Gen. p. 244 (152): ordo Ericinear. Trib.: Ericeae, Andromedeae, Arbuteae, Clethreae, Pyroleae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 440: fam. (155) Ericinear. Trib.: Ericeae, Andromedeae, Rhodoreae, Pyroleae, Monotropeae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 71: fam. Ericoidear. Trib.: Ericeae, Vaccinieae, Rhododendreae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 453: ordo Ericalium. Subord.: Ericeae, Rhododendreae. — Par. Alef. 1856. Linnaea XXVIII. p. 6.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 391. Trib.: Ericineae, Rhododendreae.

Ericae Juss. 1789. Gen. p. 159: ordo 3 class. IX. Gen. §. 1: Cyrilla, Blaeria, Erica, Andromeda, Arbutus, Clethra, Pyrola, Epigaea, Epacris, Gaultheria, Brossaea. §. 2: Argophyllum, Maesa, Vaccinium. *Affinia:* Empetrum, Hudsonia.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 357. t. 56. Gen. §. 1 ut Juss. et Styphelia. §. 2: Thibaudia, Ceratostema. *Aff.:* Grubbia.

Ericala Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 335: g. Gentianar. verar. (Gentiana verna, bavarica et nivalis.)
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 425: subsect. Cyanaeae.
D. Don 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 511: g. Gentianear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 188. (verar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3528 *e.* p. 600; 1841. Ench. p. 302: sect. Gentianae.
Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5130. 2 *a:* subsect. Gentianae.
= Ericoila Ren., Borckh.

Ericales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 27: nixus Polycarpar. Ordines: Pyrolaceae, Ericeae, Vaccinieae, Epacrideae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 446: nixus Exogenar. hypogynar. Ord.: Humiriaceae, Epacridaceae, Pyrolaceae, Francoaceae, Monotropaceae, Ericaceae.
Alef. 1856. Linnaea XXVIII. p. 5: class. Dicotyledonum. Ord.: Monotropaceae, Diapensiaceae, Epacridaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, Vacciniaceae.

Ericameria Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 318: nov. g. Chrysocomear. (Aplopappus ericoides DC.)
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 236: g. Solidaginear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 40. n. $2381/_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 130.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Ericaria Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 56. 80: nov. g. Fucor. (E. tamarisca, Selago.)
= Cystoseirae Kütz. pars.

Ericariae Batsch 1802. Tab. affin. p. 218: fam. Biforarum. Gen.: Blaeria, Erica, Andromeda, Arbutus, Epigaea, Epacris, Gaultheria, Brossaea, Argyreja, Empetrum, Hudsonia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206; 1841. Nom. p. 125: div. Ericacear. Subdivis.: Ericeae, Monotropeae, Pyroleae.

Ericarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21: ordo Torocoronar. Fam.: Fouquieriaceae, Rhodoraceae, Ericaceae, Epacrideae.

Ericaulon Lour. vid. *Eriocaulon Linn.*

Ericeae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 557. Ed. Nees p. 413: fam. plantar., disjunctis Epacrideis restricta. (Gen.: Gualtheria.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 508: fam. 52 plant. Ordines: Rhododendreae, Ericeae *bicornes* (gen.: Erica, Salaxis, Blaeria, Andromeda, Arbutus, Diapensia, Clethra, Pyrola, Chimaphila, Gaultheria, Galax, Lasiopetalum, Cuellaria), Epacrides.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: ordo Aridifoliar. (Divis.: Rhodoraceae, Vaccinieae, Pyrolaceae.)
D. Don 1825. Nepal. p. 148. Sect.: *verae* (gen.: Andromeda, Gaultheria), Monotropeae, Rhodoraceae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL: fam. Crateriflorar. Divis.: Monotropeae, Calluneae, Rhodoraceae.

Ericeae R. Brown cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 129 (1831. Fl. exc. p. 412): div. Ericacear. Gen.: Sympieza, Blairia; Salaxis, Erica, Calluna, Menziesia, Phyllodoce, Andromeda, Lyonia, Arbutus, Arctostaphylos, Pernettia, Encyanthus; Brossaea, Gaultheria.
Link 1829. Hdb. I. p. 601: ordo (38) Hypanthar. Subord.: Epacrideae, *genuinae* (gen.: Kalmia, Rhododendron, Azalea, Chamaeledon, Ledum, Pyrola, Chimophila, Clethra, Arbutus, Andromeda, Menziesia, Erica), Myrtilloideae, Empetreae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (170) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 154: ordo (95) Ericinear. Gen.: Arbutus, Arctostaphylos, Pernettia, Encyanthus, Kalmia, Rhododendron, Rhodora, Azalea, Loiseleuria, Fischera, Ledum, Calodryum, Epigaea, Befaria, Lyonia, Andromeda, Gaultheria, Pterospora, Pyrola, Chimophila, Cliftonia, Elliotia, Clethra, Phyllodoce, Menziesia, Erica, Salaxis, Blairia, Sympieza; Diapensia, Pyxidanthera, Sonerila.
Lindl. 1833. Nix. p. 27: ordo Ericalium.
D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 152: trib. Ericacear. Subtribus: Ericeae *normales* (gen.: Erica, Gypsocallis, Pachysa, Ceramia, Desmia, Eurylepis, Eurystegia, Lophandra, Lamprotis, Callista, Euryloma, Chona, Syringodea, Dasyanthes, Ectasis, Eriodesmia, Octopera, Eremia, Salaxis, Calluna, Blaeria), Andromedeae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 786. Subtrib. eaed. (Ericeis normalibus accedit Sympieza.) — Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 612. Subtrib.: Euericeae, Salaxideae. — Meisn. 1839. Gen. p. 244 (152). Subtrib. ut Klotzsch. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 442. 445. Gen. §. 1: Salaxis, Coccosperma, Lagenocarpus, Blepharophyllum, Omphalocaryon, Tristemon, Codonostigma, Coilostigma, Thamnium, Codonanthemum, Anomalanthus, Syndesmanthus, Macrolinum, Sympieza, Plagiostemon, Thamnus, Simocheilus, Octogonia, Pachycalyx, Acrostemon, Comocephalus, Thoracosperma, Microtrema, Griesebachia, Finckea, Eremia, Hexastemon. §. 2: Blaeria, Ericinella, Philippia, Eleutherostemon, Synactinia, Bruckenthalia, Erica, Pentapera, Nabea, Calluna. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 71. Gen. ex Endl.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 221) 1847. Veg. kd. p. 455: subordo Ericacear. Trib.: Ericidae, Andromedidae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: subdiv. Ericariar. Sect.: Calluneae, Andromedeae, Arbuteae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 125. Sect.: *genuinae* (gen. Euericear. et Salaxidear. Benth. accedente Finckea), Andromedeae.
Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 211. Tribus: Symphysandrae, Adelphostemones, Eleutherostemones. *Cf.* Klotzsch 1838. Flora p. 225.
Endl. 1839. Gen. p. 751; 1841. Ench. p. 369: trib. Ericinar. Subtrib. ut Benth.

Ericeae R. Brown cont.
Koch 1844. Syn. ed. II. p. 547: trib. Ericinear. Gen.: Calluna, Erica.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 392: subsect. Ericinear. verar. Gen.: Blaeria, Ericinella, Philippia, Bruckenthalia, Erica, Pentapera, Macnabia, Calluna.

Ericibe Poir. vid. *Erycibe Roxb.*

Ericidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 455: trib. Ericear. Gen. Salaxidear. et Euericear. Endl.

Ericilla Steud. Nom. I. p. 225. 582 in synon. Bridgesiae: lege *Ercilla A. Juss.*

Ericinae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 396: fam. Calyciflorar. Gen. §. 1: Menziesia, Phyllodoce, Eremocallis, Gypsocallis, Calluna, Andromeda, Arbutus, Uva-Ursi. §. 2: Chamaecistus, Empetrum, Pyrola, Moneses. §. 3: Monotropa.
Endl. 1839. Gen. p. 751: subordo Ericacear. Trib.: Ericeae, Andromedeae.

Ericineae Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 422: fam. plant., a Rhodoraceis distincta. Gen.: Erica, Andromeda, Pyrola, Gaultheria, Vaccinium, Clethra, Epacris, Arbutus, Perojoa, Poiretia, Styphelia.
Desv. 1813. Journ. bot. p. 28.
Juss. 1819. Dict. v. 15. p. 178: fam. Pericorollear.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246: ordo Calyciflorar. — Par. Koch 1837. Syn. p. 475. Trib.: Ericaceae, Rhodoraceae. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 546. Trib.: Arbuteae, Andromedeae, Ericeae, Rhodoreae.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: fam. Calicitubiae.
Bartl. 1830. Ord. p. 152: class. (31) Gymnoblastor. Ord.: Vaccinieae, Ericeae, Monotropeae, Epacrideae.
Zuccar. 1837. Abh. bayr. Ak. II. p. 331. Novum genus: Comarostaphylis.
Meisn. 1839. Gen. p. 243. 441 (151): class. 24 Diplochlamydear. Ord. ut Bartl.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 430: class. (32) Dicotyledoneor. monopetalor. Fam.: Epacrideae, Ericaceae, Vaccinieae.
Endl. 1841. Ench. p. 369: subordo Ericacear. *Vid. Ericinae Endl.*
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 392: trib. Ericacear. Sect.: *verae* (subsect. Salaxideae, Ericeae), Andromedeae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 155: ordo Gamopetalar. Trib.: Ericeae, Vaccineae, Monotropeae.

Ericinella Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 222: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 244 (153). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4890. (genuinar.)
Benth. 1839 in DC. Pr. XII. 2. p. 697: g. Euericear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4310. p. 753; 1841. Ench. p. 369. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 394.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.

Ericiotis G. Don vid. *Ereicotis DC.*

Ericocarpum Endl. vid. *Eriocarpum Dunal.*

Ericogalium DC. 1830. Prodr. IV. p. 604: subsect. Eugalii.
Endl. 1838. Gen. n. 3100 *g*. p. 523; 1841. Ench. p. 271: sect. Galii. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 456.

Ericoideae Pers. 1805. Ench. I. p. 478: ordo plant. Gen. decandra: Vaccinium, Ceratostema, Andromeda, Epigaea, Gaultheria, Arbutus, Clethra.

Ericoideae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XXI. 70: class. Gamopetalar. hypogynar. Fam.: Epacrideae, Ericaceae, Pyroleaceae, Monotropeae, Brexiaceae?

Ericoides Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 90: g. pl. class. IV.
= Alsinastrum Tourn.?

Ericoila (*Ηρικοιλη*) Renealm. 1611. Spec. hist. pl. p. 75. ic. p. 68.
Borckh. 1796 in Röm. Arch. I. 1. p. 26: g. pro Gentiana cruciata, verna, etc. admissum.
Link 1829. Hdb. I. p. 421: sect. Gentianae.
Synon. Hippion Schmidt; Calathianae Fröl.; Ericala Gray; Eriocoila Wittst.

Ericomyrtus Turczan. 1847. Bull. soc. Mosc. XX. p. 154: nov. g. Bäckeacear. *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 346, Flora 1848. I. p. 347 et Turczan. 1852. Bull. Ac. Pet. X. p. 328, ubi Oxymyrrhinae Schauer proximum declaratur.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 308: g. Bäckeear.

Erigenia*) Nuttall 1818. Gen. am. I. p. 187: nov. g. Umbellatar. (Sium bulbosum Michx.)
Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 180: g. Umbelliferar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 236. (desciscent.)
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3766; 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5506: g. Hydrocotylear. — Par. DC. 1829. Coll. Mém. V. p. 27; 1830. Pr. IV. p. 71. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 256. — Tausch 1834. Flora I. p. 354. — Meisn. 1838. Gen. p. 140 (102). — Endl. 1839. Gen. n. 4359. p. 764; 1841. Ench. p. 377; 1850. Spl. V. p. 1. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 137. — Sulliv. . . . . in Sillim. Amer. journ. XLII. p. 50. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 395. — A. Juss. 1849. ibid. IX. p. 95 (*Erigonia*).
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 644: g. Coriandrear. anomalum. *Cf.* Meisn. 1843. Comm. p. 359.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Hydrocotylidar.
Synon. Hydrocotyles sp. Pursh, Spreng.

Erigereae Cassini 1825. Dict. v. 37. p. 461; 1830. v. 60. p. 582: subdiv. Baccharidear. Gen.: Dimorphanthes, Laennecia, Trimorphaea, Erigeron, Munychia, Podocoma, Stenactis et (1830) Phalacroloma.
Rchb. 1828. Consp. p. 108: sect. Asterear. genuinar. Gen.: Eschenbachia, Laennecia, Trimorphaea, Erigeron, Munychia, Podocoma, Stenactis.

Erigereae Cassini cont.
DC. 1836. Pr. V. p. 279: subdiv. Asterear. Gen.: Melanodendron, Leptocoma, Vittadinia, Fullartonia, Polyactidium, Heterochaeta, Therogeron, Erigeron, Rhynchospermum, Microgyne. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 377; 1841. Ench. p. 234. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 186 (126). Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Asteroidear. Gen. ead.

Erigereae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 951: subdiv. Asterear. Gen.: Mairia, Felicia, Munychia, Agathea, Bellidiastrum, Turczaninowia, Calimeris, Eurybiopsis, Asteropsis, Tetramolopium, Henricia, Eurybia, Melanodendron, Leptocoma, Vittadina, Fullartonia, Erigeron, Phagnalon, Heteropappus, Minuria, Gymnostephium, Charieis, Sommerfeldtia, Erato, Psiadia, Homochroma, Bigelowia, Solidago, Amphirhaphis, Commidendrum, Steiractis, Rochonia, Cyclopappus, Pyrrhocoma, Lessingia, Chrysocoma, Duhaldia, Microtrichia, Nolletia, Sarcanthemum, Leptothamnus, Chrysoma, Chrysothamnus, Homopappus, Stenotus, Prionopsis, Haplopappus, Ericameria, Macronema, Isopappus, Centauridium, Isocoma, Ammodia, Eriocarpum, Pentachaeta, Thespis, Berthelotia, Chionolaena.

Erigeridium Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 176: sect. Erigerontis. (E. vernum.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 581.

Erigerineae (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 83. 92: trib. Corymbiferar. Gen.: Solidago, Linosyris, Phagnalon, Conyza, Erigeron, Stenactis, Aster, Bellidiastrum.

Erigeroides Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 197. n. 420: g. Syngenes. obscurum. (Mudhamama Herm. zeyl. 61.)

Erigeron*) Linn. 1737. Cliff. p. 407; 1740. Syst. p. 29; 1742. Gen. ed. II. p. 400. n. 782; 1748. Ups. p. 258; 1753. Sp. II. p. 863; 1759. Syst. ed. X. p. 1213. n. 855; 1763. Sp. ed. II. p. 1209; 1764. Gen. ed. VI. p. 422. n. 951; 1767. Syst. ed. XII. p. 549: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 627; 1784. Syst. p. 753. — Reich. 1778. Gen. p. 419. n. 1031. — Lour. 1790. Coch. II. p. 500. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 553. n. 1287. — Gmel. 1791. Syst. p. 1222. — Pers. 1797. Syst. p. 794; 1807. Ench. II. p. 430. n. 1852. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1952. n. 1482; 1809. En. p. 872. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 146. Sect.: Erigeron, Caenotus. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 432.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 724: g. Corymbiferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1772. Carn. II. p. 159. — Juss. 1789. Gen. p. 180. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 537. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I.

*) Ἠριγένεια, nomen Aurorae.

*) ἠριγέρων, vere senex.

Erigeron Linn. cont.
p. 398. — DC. 1805. Franç. IV. p. 142. — Link 1822. En. II. p. 323. — Math. 1853. Belg. I. p. 274.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 194: g. Compositar. ord. quarti.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 254. n. 1049: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 597. Disjungitur Eschenbachia.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539.
Hill 1769. Ht. kew. p. 23: g. Radiatar. — Par. GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 216. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 560; 1826. Syst. III. p. 516. n. 2760; 1831. Gen. II. p. 627. n. 3115. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 517. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1349. 1466. Sect.: Trimorphaea, Erigeron. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 11. 262. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 89.
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 468: g. Solidaginear.
Scop. 1777. Intr. p. 130: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 22. n. 40: g. Actinophytor.
Rebent. 1804. Nom. p. 107: g. Pentandr. Monogyn.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 88: g. Asterear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 399; 1838. Berol. I. p. 332. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 239. Sect. ut 1828. — Less. 1832. Syn. p. 190. — Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 16. — Koch 1837. Syn. p. 353. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 238. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 45. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 186.
Link 1829. Hdb. I. p. 733: g. Asteroidear.
DC. 1836. Pr. V. p. 283: g. Erigerear. Sect.: Euerigeron, Trimorphaea, Pterigeron?, Eleutherogeron? — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2332. p. 378; 1841. Ench. p. 234. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 186 (126). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 486. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 396.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 306: g. Asterinear. Sect.: Phaenactis, Olygotrichium, Trimorphaea, Caenotus. — Par. Koch 1843. Syn. ed. II. p. 388. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 29.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3263: g. Erigeronear. Sect. ut DC.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 3: g. Asteracear.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 96: g. Erigerinear.
Synon. Erigerum Linn. 1737; Virgaurea Rupp.; Panios Adans.

Erigeron Cassini (1816. Dict. v. 3. spl. p. 64) 1819. Dict. v. 15. p. 181: g. Asterear., sejuncta Trimorphaea restrict. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 466: g. Corymbiferar.

Erigeron Cassini cont.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 462; 1830. v. 60. p. 582: g. Erigerear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2546.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1467; 1831. Fl. exc. p. 239: sect. Erigerontis.
Euerigeron DC.

Erigeron D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 171: g. Carduacear. (E. alatum, leucanthum, etc.)
= Blumea DC.

Erigeron Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 166: g. Euasterear., alio modo circumscriptum. Sect.: Caenotus, Euerigeron, Stenactis, Phalacroloma, Erigeridium, Pseuderigeron.
Walp. 1843. Rep. II. p. 579: g. Erigerear. Sect. eaed.

Erigeron Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 951: g. Erigerear. (*Erigeron, Conyza, Microglossa* et *Nidorella DC.*) — Par. Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 205. Sect.: Eschenbachia, Conyzella.

Erigeroneae Rchb. 1841. Nomencl. p. 84: subdiv. Asterinar. Gen. Erigerear. DC.

Erigerum Linn. 1737. Gen. p. 254. n. 653; 1737. Fl. Lapp. p. 242. Ed. Smith p. 251: g. Syngenes. Polygam. Superfl.
= Erigeron Linn.

Erigonia A. Juss. vid. *Erigenia Nutt.*

Erimatalia Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXVII. 331. n. 959: nov. g. Pentandr. Monogyn. (*Erima-Tali Rheede* Malab. VII. t. 39.)
= Erycibe Roxb.

Erimatalieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 392: trib. Cordiacear. Gen. unicum: Erysibe.
= Erycibeae Endl.

Erinacea Clus. 1601. Hist. I. p. 107.
Tourn. 1700. Inst. p. 646: g. pl. class. XXII.
Adans. 1763. Fam. II. p. 321: g. Genistar.
DC. 1825. Pr. II. p. 169: sect. Anthyllidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4025 *e*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 165.
Link 1831. Hdb. II. p. 156: g. Genistoidear. (Anthyllis Erinacea L.)
Boiss. . . . . Voy. en Espagne p. 145.
Endl. 1840. Gen. n. 6494. p. 1265; 1841. Ench. p. 668: g. Genistear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5865. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 350. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 127. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 345. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 396.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Cytisear.

Erinacea Lamx. 1825. Dict. class. V. p. 387.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 497 *f*: sect. Sphaerococci. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 94 *c*. p. 8; 1841. Ench. p. 6.
Grateloupiae Agdh. sp. (Kütz.)

Erinaceae Duvau 1826. Ann. sc. nat. VIII. p. 177: fam. plant. Gen.: Manulea, Buchnera, Erinus.

Erinaceus Dillen. 1719. Nov. gen. p. 74. t. 1: g. Fungor.
Mich. 1729. Nov. pl. gen. p. 132. t. 72: g. pl. class. XVII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 31: g. pl. class. I.
Endl. 1836. Gen. n. 442 *a*. p. 39; 1841. Ench. p. 21: sect. Hydni.
Synon. Odontia Pers.; Dicarphus Rafin.?; Sistotrematis sp. Pers.

Erinacoides Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 109: sect. Stenocarpi. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 483.

Erineae Link 1829. Handb. I. p. 510: subordo Personatar. Gen.: Limosella, Erinus, Lindernia, Manulea.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: trib. Rhinanthidear. Gen.: Erinus, Manulea, Buchnera, Buddleja.

Erineideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 548. 555: div. Nematomycear. Gen.: Erineum, Rubigo.

Erinesa D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 287: sect. Chuquiragae. (C. hispida, etc.)
= Flotovia Spreng.

Erineum*) Pers. 1796. Obs. mycol. I. p. 99: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 15. p. 184. — Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 28. 385.
Pers. 1797. Tent. p. 43: g. Nematothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XIX. 699: g. Naematothecior.
Rebent. 1804. Neom. p. 395: g. Byssor. — Par. Nees 1816. Syst. p. 63; 1817. Ueberbl. p. 17. (entophytor.)
DC. 1805. Franç. II. p. 73: g. Gymnocarpor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 21: g. Mucedinum.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 54: g. Eleutherocarpor.
Grev. 1812. Edinb. phil. journ. I. p. 71.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 221: gen. restrictum. (*Synon. Rubigo Link.*)
Mart. 1817. Erlang. p. 346: g. Inomycetum. (aëreor.) — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 559. n. 3578; 1831. Gen. II. p. 783. n. 4058. Sect. ut Pers. 1822.
Fries 1818. Obs. myc. II. p. 371: g. Sphaerioideor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Dematior.
Fries 1821. Syst. I. p. XLII; 1832. Syst. myc. III. 2. p. 521; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 518: g. Phylleriacear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 91; 1842. Pl. cell. Cub. p. 420.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 555: g. Erineidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 316. (spuriar.)
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 2: g. Trichomycor. Sect.: Phyllerium, Grumaria, Taphria.

Erineum Pers. cont.
Schltd. 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. 73. (Monogr.) *Cf.* Flora 1823. I. p. 311 et Isis 1823. p. 855.
Kunze 1823. Mykol. Heft. II. p. 117. Monogr. Subdivis. ut Pers. 1822.
Link 1824. Spec. I. p. 146: g. Hyphomycetum. Subgen.: Phyllerium, Erineum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 529: g. Phyllerioar. (Rubiginis sp. Link.) — Par. Fée 1834. Mém. s. l. Phyll. (Paris.) *Cf.* Flora 1835. I. p. 82.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1033: g. Mucoroideor.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 58: g. Byssaceor. cellularium. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 21 IV*e*; 1841. Ench. p. 15. Sect.: Taphrina, Grumaria, Phyllerium.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 126: g. Asporomycetum gongromorphor.
Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 1; 1842. V. p. 47: g. Byssinor.
Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 89: g. Phylleriaceor. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 2; 1842. Mycol. p. 5. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 65.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.
Math. 1853. Belg. II. p. 447: g. Phylliriear. Sect.: Phyllirium, Grumaria, Taphria.

Erinia Noul. 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 120. (*Erineon Plin.*)
= Eucodon A. DC.

Erinocarpus Hasskarl 1855. Retzia I. p. 137; 1858. Hort. Bogor. I. p. 107: nov. g. Tiliacear., Heliocarpo aff. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 328.

Erinoides Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. 150: sect. Campanulae. — Par. Link 1821. En. I. p. 216.
= Eucodon A. DC. pt.

Erinosma Herbert 1837. Amaryll. p. 80. 330: nov. g. Galanthear. (Leucojum vernum L.) — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 6. 22. — Kunth 1850. Enum. V. p. 474.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Amaryllear.
= Nivaria Heist.

Erinus*) Linn. 1737. Coroll. p. 11. n. 967; 1737. Cliff. p. 320; 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 301. n. 629; 1753. Sp. II. p. 630; 1759. Syst. ed. X. p. 1117. n. 689; 1763. Sp. ed. II. p. 878; 1764. Gen. ed. VI. p. 318. n. 771; 1767. Syst. ed. XII. p. 420: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 477; 1784. Syst. p. 570. — Reich. 1778. Gen. p. 320. n. 832. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 417. n. 1034. — Gmel. 1791. Syst. p. 951. — Pers. 1797. Syst. p. 607. — Willd. 1800. Sp. III. p. 332. n. 1173. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 92.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 178. n. 732: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 211.

---

*) ἐρινεόν, fructus caprifici.

*) ἐρῖνος, Plinio eadem arbor quae caprificus.

Erinus Linn. cont.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 174. — Gis. 1792. Prael. p. 487. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 356. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — DC. 1805. Franç. III. p. 578. — Lois. 1819. Dict. v. 15. p. 183. — Link 1822. En. II. p. 143. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 8. 168.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 270: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 261. t. 55. f. 5 (alpinus).
Juss. 1789. Gen. p. 100: g. Pedicularium.
Neck. 1790. El. I. p. 363. n. 561: g. Plasyrgophytor.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 230: g. Rhinanthacear.
Pers. 1807. Ench. II. p. 147. n. 1450: g. Rhinanthoidear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 387; 1825. Syst. II. p. 768. n. 2145; 1831. Gen. II. p. 484. n. 2387: g. Primulear.
Duvau 1826. Ann. sc. nat. VIII. p. 177: g. Erinacear.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 321: g. Rhinanthear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVIII; 1828. Consp. p. 122. n. 3103; 1841. Nom. p. 119. n. 4633: g. Buchnerear. *(genuinar.)* — Par. Benth. 1835. Scroph. rev. p. 4. — D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 596.
Link 1829. Hdb. I. p. 510: g. Erinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24.
Bartl. 1830. Ord. p. 171: g. Veronicear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 373: g. Antirrhinear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 524. Ed. II. p. 602.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: g. Gratiolear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3928. p. 680; 1841. Ench. p. 339. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 513. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 60. — Walp. 1845. Rep. III. p. 270. 963. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 397.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 453; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Digitalear.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 601: g. Scrophulariacear.
Synon. Ageratum Tourn.
Erinus „All. Fl. Pedem. t. 7. f. 1" Spreng. 1825. Syst. I. p. 736; 1830. Gen. I. p. 169: sect. Campanulae.
= Eucodon A. DC. pt.
Eriobotrya*) Lindl. 1821. Linn. Trans. XIII. p. 102 (Bot. Reg. V. 365); 1847. Veg. kingd. p. 560: nov. g. Pomacear. (Mespilus japonica Thunb.) *Cf.* Flora 1823. I. p. 168. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 631. — Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4464; 1841. Nom. p. 168. n. 6532. — Bartl. 1830. Ord. p. 400. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 415. n. 2071. — G. Don 1832.

*) ἔριον, lana.

Eriobotrya Lindl. cont.
Gen. syst. II. p. 602. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 302. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 81. — Meisn. 1837. Gen. p. 106 (75). — Endl. 1840. Gen. n. 6349. p. 1238; 1841. Ench. p. 656. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 124. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 163. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 102. 147. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 397. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 388. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 670.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1102: g. Rosacear.
Zucc. 1835 in Sieb. Fl. japon. I. p. 182. t. 97.
Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. sub n. 1956: g. Pomear.
Eriocachrys DC. mss.
= Magydaris Koch.
Eriocalia*) Smith 1806. Exot. bot. II. p. 37. t. 78. 79: nov. g. Pentandr. Digyn. *(E. major.)*
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 644; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXI. 339; 1825. Syst. I. p. 873. n. 1079; 1830. Gen. I. p. 219. n. 1129: g. Umbelliferar. (descisc.) — Par. Lag 1821. Amen. nat. II. p. 105. (divis. 1.) — Bartl. 1830. Ord. p. 237.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3752: g. Eryngiear.
Actinotus Labill.
Eriocalyx Rchb., Endl. (in synon. Aspalathi) vid. *Eriocylax Neck.*
Eriocarpa Lag. in herb. Deless. (peduncularis).
= Lasiospermi sp. (DC. Pr. VI. p. 38).
Eriocarpaea Bertol. . . . . Nov. comm. Ac. Bonon. VI. p. 234.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 968: g. Genistear.
Eriocarpha Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 236; 1830. v. 60. p. 577: g. Sigesbeckiear.
DC. 1836. Pr. V. p. 564: sect. Montagnaeae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2522 *a.* p. 410; 1841. Ench. p. 238.
Eriocarpum Dunal 1824 in DC. Prodr. I. p. 273: sect. Helianthemi. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 123. — Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4915 *d;* 1841. Nom. p. 188. n. 7190. 2. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 306. — Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 361; 1838. Vég. phan. VI. p. 20. — Endl. 1839. Gen. n. 5029 *b.* p. 905 *(Ericocarpum);* 1841. Ench. p. 467.
Eriocarpum Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 320: nov. g. Chrysocomear., Aplopappo aff. (E. grindelioides.)
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 242: subsect. Aplodisci.
Endl. 1842. Spl. II. p. 40. n. $2385/_2$: g. Solidaginear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Walp. 1843. Rep. II. p. 593. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

*) χαλία, nidus.

Eriocaulaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 122: ordo Glumalium. Gen.: Lachnocaulon, Eriocaulon, Leucocephala, Paepalanthus, Tonina, Philodice, Cladocaulon, Stephanophyllum, Symphachne?

Körnicke 1856. Linnaea XXVII. p. 564. Trib.: Paepalantheae, Eriocauleae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 919.

Eriocauleae HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 251 (Kunth 1822. Syn. I. p. 262): sect. Restiacear. Gen.: Eriocaulon.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54. 55: fam. Commelinariar. Gen. id.

Bartl. 1830. Ord. p. 36: div. Restiacear. Gen.: Lyginia, Anarthria, Eriocaulon, Tonina.

Lindl. 1833. Nix. pl. p. 36: ordo ad Restiaceas accedens.

Mart. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 3. 71: fam. Enantioblastar. Gen.: Nasmythia, Eriocaulon, Paepalanthus, Tonina, Philodice.

Kunth (1841. Ber. Ak. Berl. p. 110); 1841. Enum. III. p. 492: ordo Monocotyledonum staminibus perigynis. Gen.: Tonina, Philodice, Lachnocaulon, Paepalanthus, Eriocaulon, Symphachne?

Meisn. 1842. Gen. p. 407 (312): ordo Enantioblastar. Gen.: Eriocaulon, Tonina, Lachnocaulon, Symphachne, Philodice.

Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 140: trib. Restiacear. Gen. ut Kunth et Nasmythia.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Enantioblastear.

Körn. 1856. Linnaea XXVII. p. 572: trib. Eriocaulacear. Gen.: Mesanthemum, Eriocaulon. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 921.

Eriocaulon*) Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 35. n. 81; 1753. Sp. I. p. 87; 1759. Syst. ed. X. p. 880. n. 95; 1762. Sp. ed. II. p. 128; 1764. Gen. ed. VI. p. 40. n. 100; 1767. Syst. ed. XII. p. 103; 1771. Mant. II. p. 167 (reform.): g. Triandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 109; 1784. Syst. p. 127. — Reich. 1778. Gen. p. 42. n. 106. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 56. n. 132. — Lour. 1790. Coch. I. p. 60 (sphalm. *Ericaulon*). — Gmel. 1791. Syst. p. 206. — Pers. 1797. Syst. p. 132; 1805. Ench. I. p. 110. n. 202. — Willd. 1797. Sp. I. p. 485. n. 154. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 90. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 16.

Gled. 1749. Berl. V. p. 133: g. Stylostemonis.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170.

Adans. 1763. Fam. II. p. 283: g. Thymelaear.

Gled. 1764. Syst. p. 23. n. 90: g. Thalamostemonum.

Hill 1769. Ht. kew. p. 159: g. Tripetalar.

*) καυλός, caulis.

Eriocaulon Linn. cont.

Scop. 1777. Intr. p. 204: g. Pseudocompositar.

Juss. 1789. Gen. p. 44: g. Juncor.

Neck. 1790. El. I. p. 116. n. 203: g. Psydomorphytor.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 14.

Batsch 1802. Tab. p. 152: g. Juncear.

Cram. 1803. Dispos. p. 182 in Monoec. Hexandr.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 108: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 51. 365. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 56. 861. n. 394.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 253. Ed. Nees p. 109: g. Restiacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 187; 1826. Syst. III. p. 774. n. 3069; 1831. Gen. II. p. 683. n. 3444. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 158. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 239 *(Joncinelle)*. — Agdh. 1823. Aphor. p. 157. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 272. — Link 1829. Hdb. I. p. 135. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Bongard 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 601. (Spec. bras.) Contin. 1833. ibid. II. p. 219 (sect. Eulepis); 1838. ibid. III. Bot. p. 9.

Rich. 1811. Ann. Mus. XVII. p. 52: g. Eriocaulonear. — Par. Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. 47. — Endl. 1837. Gen. n. 1022. p. 123; 1841. Ench. p. 68. Sect.: Nasmythia, Eriocaulon (1841 Leucocephala), Paepalanthus. — Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1516. Sect. ut Endl. 1837. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 397. Sect. eaed. — Steud. 1855. Glum. II. p. 268. Sect. eaed. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 523.

HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 251: g. Eriocaulear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 262. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55. — Bartl. 1830. Ord. p. 36. — Mart. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 7. Subgen.: Nasmythia, Eriocaulon, Paepalanthus. — Meisn. 1842. Gen. p. 407 (312).

Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1147: g. Xyridear. Sect.: Nasmythia, Schoenocaulon.

Synon. Dupatya Fl. Flum.; Schoenocaulon Rchb.

Eriocaulon Martius 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 13: g. Eriocaulear. restrict. (an subgenus?) — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 539 (includens Nasmythiam et Sphaerochloam). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 140. — Körn. 1856. Linnaea XXVII. p. 577. Subgen.: Astole, Trichopeplus, Spathopeplus, Eueriocaulon. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 922.

Endl. 1837. Gen. p. 123. n. 1022 *b*: sect. Eriocaulonis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1516. 2. — Steud. 1855. Glum. II. p. 269.

Leucocephala Roxb.

Eriocaulon Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 122: g. restrict. Eriocaulacear.

Nasmythia Huds.

Eriocauloneae Rich. 1811. Ann. Mus. XVII. p. 52.
Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 47: fam. Monocotyledonear. Gen.: Randalia, Eriocaulon, Symphachne, Tonina.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 387.
Endl. 1837. Gen. p. 122; 1841. Ench. p. 67: ordo Enantioblastar. Gen.: Eriocaulon, Tonina, Philodice. Accedit 1842 (Suppl. II. p. 12) Lachnocaulon.
Rchb. 1841. Nom. p. 42: subdiv. Xyridear. Gen. ut Endl.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 12: fam. Juncinear.
Steud. 1855. Glum. II. p. 267: ordo Glumacear. Gen. ut Endl. 1842.
Conf. Eriocauleae HBK.

Eriocephaleae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 268: div. Artemisiear. Gen.: Eriocephalus. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 88. Gen. id.
DC. 1837. Pr. VI. p. 145: div. Anthemidear. Gen. id. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 441; 1841. Ench. p. 242. Gen. id. — Meisn. 1839. Gen. p. 213 (135.) Gen. id.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: subtrib. Senecionidear. Gen. id.

Eriocephalus Vaillant 1718. Act. Ac. Par. p. 160: g. Cynarocephalar.
= Cirsii Tourn. pars.

Eriocephalus Linn. 1737. Gen. p. 265. n. 674; 1737. Cliff. p. 424; 1740. Syst. p. 29; 1753. Sp. II. p. 926; 1759. Syst. ed. X. p. 1235. n. 890; 1763. Sp. ed. II. p. 1310; 1764. Gen. ed. VI. p. 450. n. 994; 1767. Syst. ed. XII. p. 579: g. Syngenes. Polygam. Necessar. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 662; 1784. Syst. p. 795. — Reich. 1778. Gen. p. 445. n. 1078. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 586. n. 1344. — Gmel. 1791. Syst. p. 1277. — Pers. 1797. Syst. p. 837; 1807. Ench. II. p. 497. n. 1952. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2384. n. 1566; 1809. En. p. 939.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 260. n. 1079: g. Petalostemonis. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 590.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 186. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 521. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 410.
Adans. 1763. Fam. II. p. 126: g. Calthar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Nucamentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 541.
Hill 1769. Ht. kew. p. 23: g. Radiatar. — Par. Gärtn. 1791. Fr. II. p. 428. t. 168. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 576; 1826. Syst. III. p. 681. n. 2861; 1831. Gen. II. p. 642. n. 3219.
Scop. 1777. Intr. p. 135: g. Flosculosar.
Neck. 1790. Pl. I. p. 25. n. 46: g. Actinophytor.
Cass. 1819. Dict. v. 15. p. 188; 1823. v. 29. p. 180: g. Anthemidear. (1823 Archetypar. verar.?) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 140. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 39.

Eriocephalus Linn. cont.
— Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 398.
Link 1822. En. II. p. 365: g. Discoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2398: g. Anthemear.
Less. 1832. Syn. Comp. p. 268: g. Eriocephalear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 145. Sect.: Phaenogyne, Cryptogyne. — Endl. 1838. Gen. n. 2710. p. 441; 1841. Ench. p. 242. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 213 (135). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. Sect.: Eriocephalus, Cryptogyne. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Eriocephalus Cassini 1827. Dict. v. 50. p. 493. 498; 1830. v. 60. p. 578: g. restrict. Cotulear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 23: g. Chrysanthemear.
Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3464. 2: sect. Eriocephali.
Phaenogyne DC.

Eriocephalus Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 20: sect. Anemones. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 13.

Eriochaenium Müll. vid. *Eriachaenium Schultz Bip.*

Eriochaeta Figari & De Not. 1854. Mem. Ac. Torin. p. 374 (Müll. Ann. bot. VI. p. 967): nov. g. Panicear. (Penniseti sp. Kunth, Endl.)

Eriochaete „Torrey" Steud. 1840. Nomencl. I. p. 586 *(Eriochaeta)*; II. p. 454 in synon. Rhynchosporae.
Steud. 1855. Glum. II. p. 139: sect. Rhynchosporae.

Eriochilos Spreng. vid. *seq.*

Eriochilum Ritg. vid. *seq.*

Eriochilus R. Brown 1810. Prodr. I. p. 323. Ed. Nees p. 179: nov. g. Orchidear. (Epipactis cucullata Labill.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 714. n. 2974 *(Eriochilos)*; 1831. Gen. II. p. 663. n. 3342. — Steud. 1840. Nom. I. p. 586 *(Eriochylus)*.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 10 (Linnaea II. p. 528): g. Arethusear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1442; 1841. Nom. p. 50. n. 2160. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1592. p. 217; 1841. Ench. p. 114. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 398.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 125 *(Eriochilum)*: g. Ceropagar.
Lindl. 1840. Orchid. p. 426: g. Euarethusear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 384 (287). — Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 9.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Limodoridar.
Synon. Diplodium Swartz.

Eriochlaena Spreng. 1826. Syst. III. p. 123. n. 2450: g. Pentapetear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 558. n. 2729: g. Büttnerear.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 70: g. Eriochlaenear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 35.
= Eriolaena DC.

Eriochlaeneae Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 70: trib. Byttneriacear. Gen. Eriochlaena, Microchlaena.
Meisn. 1837. Gen. p. 35 (27): trib. Büttneriacear. Gen. ead.
Conf. Eriolaeneae Endl.

Eriochlamys Sonder & F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 488: nov. g. Angianthear. (E. Behrii).

Eriochloa HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 94. t. 30. 31: nov. g. Panicear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 171; 1830. Gram. p. 30; 1833. Agrost. p. 71. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 152. — Agdh. 1823. Aphor. p. 148. — Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Endl. 1837. Gen. n. 767. p. 83; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 252. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1268. — Meisn. 1843. Gen. p. 417 (319). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 398.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 15. 330. n. 225: g. Graminear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 189. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 249. n. 253; 1830. Gen. I. p. 53. n. 258.
Trin. 1820. Fund. p. 104: g. Triandr. Digyn.
Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 5: g. Graminum.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 885: g. Paspalacear.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 467; 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 263: g. Paspalear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 441: g. Eupanicear.
Synon. Oedipachne Link; Helopus Trin.; Aglycia Willd. (Alycia W. ex Steud.)

Eriochosma*) J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 50: sect. Notholaenae. (N. lanuginosa, etc.)

Eriochrysis Palis. 1812. Agrost. p. 8. t. 4. f. 11: nov. g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 13. 290. n. 215. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 190. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 265. n. 271; 1830. Gen. I. p. 56. n. 277.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 183; 1822. Syn. I. p. 239: g. Saccharinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 989 *b:* sect. Sacchari.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Sacchariaear. — Par. Nees 1829. Agrost. Bras. p. 312.
Kunth 1830. Gram. p. 157: g. Andropoginear.
Kunth 1833. Agrost. p. 473: g. Andropogonear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 938. p. 106; 1841. Ench. p. 60. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1353. — Meisn. 1843. Gen. p. 427 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 398.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 314: g. Andropogineor.
Synon. Plazerium Willd.

Eriochylus Steud. vid. *Eriochilus R. Brown.*

Eriocladium Lindl. 1839. Veg. Swan-River p. XXIV: nov. g. Athanasiear. (E. pyramidatum.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2692/$_1$. p. 1384; 1841. Ench. p. 242. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3850. — Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 211.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24: g. Anthemidear. verar.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 398: g. Senecionidear.

Eriocladus Léveillé 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 158: nov. g. Clavarieor. (Clavaria fistulosa Fries, etc.) *Cf. Lachnocladium Lév.*
Synon. Thelephorae sp. Lév.

Eriocline Cassini 1818. Bull. soc. philom. Sept. p. 142: subg. Osteospermi. (O. spinosum.)
Cass. 1819. Dict. v. 15. p. 191: g. Calendulear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 15.
Cass. 1824. Dict. v. 30. p. 324; 1830. v. 60. p. 574: g. Osteospermear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2736.
Bartl. 1830. Ord. p. 143: g. Calendulacear.
Less. 1832. Syn. p. 89: sect. Osteospermi.
= Osteospermi Linn. pars.

Eriocnema Naudin 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 144: nov. g. Melastomacear. (E. fulva et Hilariana.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 683: g. Lavoisierear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 330: g. Sonerilear.

Eriococcus Hasskarl 1844. Cat. Bogor. alt. p. 242: nov. g. Phyllanthear. (E. gracilis.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Endl. 1850. Spl. V. p. 93. n. 5858/$_1$: g. Crotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 648: sect. Epistylii.
Synon. Reidia Wright.

Eriocoila Wittst. Etym. Handw. p. 332: vid. *Ericoila Borckh.*

Eriocoma Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 40: nov. g. Triandr. Monogyn. (Stipa membranacea Pursh.) *Cf.* Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 192.
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 920 *c:* sect. Stipae.
Endl. 1837. Gen. n. 799. p. 88; 1841. Ench. p. 57: g. Stipacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1200. — Meisn. 1843. Gen. p. 419 (320). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161.
Trin. & Rupr. 1842. Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. (1849) p. 19: sect. Urachnes. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 728. — Steud. 1854. Glum. I. p. 122.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Stipear.

*) χῶμα, agger, collis.

Eriocoma HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 267: nov. g. Helianthear. (*E. floribunda.*) — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 498. — Bartl. 1830. Ord. p. 141.
Cass. 1819. Dict. v. 15. p. 193; 1825. v. 38. p. 17: g. Milleriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2706.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 611. n. 2845; 1831. Gen. II. p. 639. n. 3203: g. Radiatar.
Less. 1832. Syn. p. 226: g. Rudbeckiear.
= Montagnaea DC.

Eriocoryna Steud. Nomencl. I. p. 586: vid. *seq.*

Eriocoryne „Wall. mss." DC. 1837. Prodr. VI. p. 541: sect. Aplotaxidis.
Endl. 1838. Gen. n. 2854 *c.* p. 468; 1841. Ench. p. 246: sect. Haplotaxidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3894. 3. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 673.
Synon. Serratula D. Don.

Eriocycla Lindl. 1835 in Royle Himal. p. 232. t. 51. f. 2.
Meisn. 1838. Gen. p. 145 (105): g. Seselinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4429. p. 774; 1841. Ench. p. 378. — Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5421. — Walp. 1843. Rep. II. p. 401. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 399.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Eriocylax*) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 25. n. 1331: nov. g. Cyteophytor., ab Aspalatho L. disjunctum.
Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4034 *a (Eriocalyx)*: sect. Aspalathi.
= Aspalathi Linn. pars.

Eriodaphne Nees 1836. Laurin. p. 143: subg. Perseae. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 492.
Endl. 1837. Gen. n. 2027 *b.* p. 317; 1841. Ench. p. 197: sect. Perseae. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1339. — Rchb. 1841. Nom. p. 71. n. 2678. 2.

Eriodaphus Spach vid. *Eriudaphus Nees.*

Eriodendreae Rchb. 1837. Handb. p. 295: sect. Bombacear. genuinar. Gen.: Bombycospermum?, Ochroma, Erione, Eriodendron, Gossampinus, Campylanthera, Eriotheca, Montezuma; Chorisia, Salmasia; Bombax. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 204. Subsect.: Ochromeae, Chorisieae, Ceibeae.

Eriodendron DC. 1824. Prodr. I. p. 479: nov. g. Bombacear. — Par. Mart. & Zucc. 1824. Nov. gen. I. p. 86. t. 96—98. — A. Juss. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 264. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 346. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 512. — Schott & Endl. 1832. Melet. p. 35. (restrict.: E. leiantherum DC.) — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 427. — Meisn. 1837. Gen. p. 28 (24). — Endl. 1840. Gen. n. 5302. p. 989; 1841. Ench. p. 515. Sect.: Ceiba, Campylanthera, Gossampinus, Erione? — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 179. —

*) κύλη, κύλιξ, calix.

Eriodendron DC. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 361. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 399.
Rchb. 1837. Hdb. p. 295: g. Eriodendrear.
Rchb. 1841. Nom. p. 204. n. 7749: g. Ochromear. Sect.: Eriodendron, Campylanthera, Gossampinus.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615: g. Adansoniear.
Synon. Ceiba Plum.; Bombacis sp. pentandrae Auct.

Erioderma Fée 1824. Crypt. cort. p. 145. t. 34. *Cf.* Montagne 1849 in Orb. Dict. V. p. 399.
Endl. 1836. Gen. n. 174 *a.* p. 15; 1841. Ench. p. 11: sect. Peltigerae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 17. n. 566. 4.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350: g. Peltigerear.
Mont. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 309: g. Collemacear.? Char. emend.
Synon. Saccolina Rchb.?

Eriodesmia*) D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 156: g. Ericear. normalium. (Erica capitata L.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 828.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 617: subsect. Ectasis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *a.* 5. p. 1411; 1841. Ench. p. 370. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4887. 1 *e.*

Eriodictyon Benth. 1844. Voy. Sulph. Bot. p. 35.
Choisy 1846 in DC. Pr. X. p. 183: g. Namear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 639: g. Hydrophyllacear.

Eriodon**) Montagne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 98: nov. g. Muscor. (E. conostomus.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: g. Hypnear.
= Leptohymenii sp. Müll.

Eriogenia „Hook." Steud. Nomencl. I. p. 587: lege *Eriogynia.*

Erioglossum Blume 1825. Bijdr. Nr. 5. p. 229: nov. g. Sapindacear. (Sapindus edulis Blume.)
Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 27: g. Sapindear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 666. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 57. — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (37). — Endl. 1840. Gen. n. 5611. p. 1070; 1841. Ench. p. 561. — Walp. 1842. Rep. I. p. 417. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 400.
Rchb. 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 199. n. 7591: g. Cupaniear.
Blume 1850. Rumphia III. p. . . . : g. Allophylear, injuncta Moulinsia Camb.
Synon. Vitenia Nor. (Camb.)

Erioglossum Guillem. & Perr. 1832. Fl. Seneg. t. 28.
Arnott 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 23.
= Cupania Plum.

*) δέσμη, fasciculus.
**) „ἐρίοδον, magnos habens dentes."

Eriogonaceae Walpers 1853. Ann. bot. III. p. 297: ordo Monochlamydear. Gen.: Eriogonum.

Eriogoneae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 17: trib. Chenopodiacear. Gen.: Eriogonum.

Benth. 1836. Linn. Trans. XVII. 3. p. 401: trib. Polygonear. Gen.: Eriogonum, Chorizanthe, Mucronea. *Cf.* Isis 1839. p. 57. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 305; 1841. Ench. p. 188. Gen. ead. et Pterostegia. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 521. Gen. ut Endl.

Rchb. 1837. Hdb. p. 174: subdiv. Allioniear. Gen.: Eriogonum.

C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845) p. 142: trib. Polygonacear. (verar.) Gen. ut Endl. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504. Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 386. Gen. ead.

Meisn. 1841. Gen. p. 317 (229): ordo Oleracear. Gen. ead.

Rchb. 1841. Nom. p. 163: subsect. Amblygonear. Gen. ead.

Benth. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 5: subordo Polygonacear. Gen. ead. et Oxytheca, Nemacaulis, Centrostegia.

Eriogonum*) Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. I. p. 246. t. 24: nov. g. Enneandr. Monogyn. (Polygonear.?) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 450. n. 999. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 365. — Elliott 1817. Sketch I. p. 464.

Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 480: g. Polygonear. — Par. Nutt. 1817. Journ. Ac. Philad. I. p. 24. *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 161. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 305; 1825. Syst. II. p. 272. n. 1531; 1830. Gen. I. p. 329. n. 1674. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 194. — Campd. 1819. Mon. Rum. p. 18. — Agdh. 1825. Aphor. p. 222. — Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 346. — Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4292. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 109. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 133. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1334. 1367.

Hedw. 1806. Gen. p. 291. n. 1161: g. Polygoneis aff.

Nutt. 1818. Gen. I. p. 260: g. Enneandr. Trigyn.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Eriogonear. — Par. Benth. 1836. Linn. Trans. XVII. 3. p. 405; 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1774; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 5. — Endl. 1837. Gen. n. 1982. p. 306; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 44. — Rchb. 1837. Hdb. p. 174; 1841. Nom. p. 163. n. 6325. — C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845) Bot. p. 142. — Meisn. 1841. Gen. p. 317 (229). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 521. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 400.

Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 297: g. Eriogonacear.

Synon. Espinosa Lag.; Encycla et Stenogonum Nutt.

*) ἔριον, lana; γόνυ, genu.

Eriogyne „Hook." Steud. vid. *seq.*

Eriogynia Hook. 1833. Fl. Bor. Am. I. p. 255. t. 88: nov. g. Saxifragear. (Saxifraga pectinata Pursh.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 226. — Rchb. 1837. Hdb. p. 230. (genuinar.) — Steud. 1840. Nom. I. p. 587 (*Eriogyne*).

Ledeb. 1844. Ross. II. p. 19: sect. Spiraeae. = Lütkea Bong.

Eriolaena DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 102. t. 5; 1824. Prodr. I. p. 501: nov. g. Wallichiear. (E. Wallichii.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 344. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 539. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 457.

Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5289: g. Götheacear.

Meisn. 1837. Comm. p. 27: g. Eriochlaenear.

Endl. 1840. Gen. n. 5354. p. 1003; 1841. Ench. p. 520: g. Eriolaenear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7690. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 401.

Synon. Eriochlaena Spreng.

Eriolaeneae Endl. 1840. Gen. p. 1003; 1841. Ench. p. 520: trib. Büttneriacear. Gen.: Eriolaena, Microlaena (1841 Schillera), Visenia?, Exitelia? *Cf. Eriochlaeneae Wight & Arn.*

Rchb. 1841. Nom. p. 202: subsect. Dombeyear. Gen. ead.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: trib. Byttneriacear. Gen. ead. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 617. Gen. ead. (exclusa Visenia.)

Eriolema Endl. vid. *Erioleuca DC.*

Eriolepis Cassini 1825. Dict. v. 35. p. 172; 1825. v. 36. p. 146; 1826. v. 41. p. 313. 331: g. Carduinear. (Archetypar. verar.)

Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2332: g. Carduinar. genuinar.

Bartl. 1830. Ord. p. 144: g. Carduacear.

DC. 1837. Pr. VI. p. 635: sect. Cirsii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2887 *b.* p. 478; 1841. Ench. p. 247. — Rchb. 1844. Fl. sax. p. 183. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 726. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 208.

Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 418: sect. Circii.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 93: subg. Cirsii.

C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 398: sect. Epitrachydis.

Synon. Phoenix Lobel.; Epitrachys DC.; Eriocephali sp. Vaill.; Cardui et Cnici sp. Auct.

Erioleuca DC. 1828. Prodr. III. p. 126: sect. Trembleyae. (*Cf. Erioloma Wittst.*) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4591 *c*; 1841. Nom. p. 173. n. 6714. 3. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 749. — Endl. 1840. Gen. n. 6206 *c.* p. 1212 (*Eriolema*); 1841. Ench. p. 646.

Eriolithis „Gärtn." Steud. 1840. Nomencl. I. p. 587: g. Amygdalacear.? (E. mirabilis.)

Eriolobus DC. 1825. Prodr. II. p. 636: sect. Pyri. (Crataegus trilobata Labill.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 648. — Endl. 1840. Gen. n. 6342 *e*. p. 1237; 1841. Ench. p. 656. — Rchb. 1841. Nom. p. 169. n. 6540. 4.

Römer 1847. Fam. nat. III. p. 104. 216: g. Pomacear.

Erioloma „DC." Wittst. Etym. Handw. p. 332 (Lythrariae): err. pro *Erioleuca DC.?*

Erione Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 34: nov. g. Bombacear. (Eriodendron jasminiodorum St. Hil.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 28 (24).

Rchb. 1837. Hdb. p. 295: g. Eriodendrear.

Endl. 1840. Gen. n. 5302 *d*. p. 989; 1841. Ench. p. 515: sect. Eriodendri? — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 330.

Rchb. 1841. Nom. p. 204. n. 7748: g. Ochromear.

Eriopappus Dumort. 1827. Fl. belg. p. 65: sect. Cinerariae.

= Senecionis sect. Heloseris DC.

Eriopappus Arnott 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 443.

Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 394: sect. Layiae. (Blepharipappus glandulosus Hook.)

= Blepharipappus Hook.

Eriope „Humb. & Bonpl. mss." Benth. 1833. Labiat. p. 142: nov. g. Ocymoidear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 707. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 352. 399.

Rchb. 1837. Hdb. p. 189: g. Melittear.

Endl. 1838. Gen. n. 3584. p. 611; 1841. Ench. p. 306: g. Hyptidear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (191). — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4132. — Walp. 1845. Rep. III. p. 570. 978. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 401. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 157.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Hyptidar.

Benth. 1840 in DC. Pr. XII. p. 140: g. Ocimear.

Eriopetalum Wight 1834. Contrib. p. 35: nov. g. Asclepiadear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 579. 888.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 123: g. Stapeliear.

Endl. 1838. Gen. n. 3520. p. 598; 1841. Ench. p. 299: g. Ceropegiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 271 (178). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5026. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 211. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 401.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: g. Pergulariear.

Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 646: g. Ceropegiar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.

Synon. Microstemma Wall.

Eriopha Hill 1769. Hort. kew. p. 69: nov. g. Associatar. (Centaurea Eriopha.)

= ?

Eriophila Rchb. vid. *Erophila DC.*

Eriophorum Linn. 1737. Gen. p. 12. n. 34; 1737. Cliff. p. 22; 1740. Syst. p. 17; 1753. Sp. I. p. 52; 1759. Syst. ed. X. p. 868. n. 63; 1762. Sp. ed. II. p. 76; 1764. Gen. ed. VI. p. 30. n. 68; 1767. Syst. ed. XII. p. 84: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 87; 1784. Syst. p. 102. — Reich. 1778. Gen. p. 31. n. 74. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 41. n. 95. — Gmel. 1791. Syst. p. 124. — Pers. 1797. Syst. p. 104; 1805. Ench. I. p. 70. n. 125. (sejuncto Trichophoro). — Willd. 1797. Sp. I. p. 312. n. 115; 1809. En. p. 80. — Hoffm. 1800. Bot. Tasch. III. 1. p. 26. t. 3. — Vahl 1806. Enum. II. p. 388. n. 125. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 148. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 36. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 452.

Gmel. 1747. Sibir. I. p. 85: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 79. (spurior.) — Host 1801. Gram. Austr. I. p. 29. t. 37—40.

Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 13. n. 45: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 319.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Calamariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 129 (sphalm. *Eriphorum*). — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 29.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 397.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 10. t. 2. f. 4 (polystachion).

Juss. 1789. Gen. p. 27: g. Cyperoidear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 92. — Link 1821. En. I. p. 48; 1827. Hort. I. p. 328; 1829. Hdb. I. p. 109.

Neck. 1790. El. III. p. 244. n. 1633: g. Chortodiphytor.

Batsch 1802. Tab. p. 157: g. Scirpear. — Par. Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153; 1837. Cyper. p. 176; 1838. Berol. II. p. 323. — Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 26 et Schult. Mant. II. p. 2.) — Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1123; 1830. Fl. exc. p. 79; 1841. Nom. p. 41. n. 1476. Sect. (1841) ut Koch. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 293. — Koch 1837. Syn. p. 744. Ed. II. p. 859. Sect.: Trichophorum, Eriophorum. — Endl. 1837. Gen. n. 1001. p. 118; 1841. Ench. p. 64. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 12. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 401. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 252. — Math. 1853. Belg. I. p. 579. — Steud. 1855. Glum. II. p. 128. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 365. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 330.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 66: g. Cyperacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 131; 1815. V. p. 298. — Hedw. 1806. Gen. p. 34. 360. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 4. 156. n. 180. — Lois. 1823. Dict. v. 26. p. 495 (*Linaigrette*). — Spreng.

Eriophorum Linn. cont.
1825. Syst. I. p. 214. n. 225. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 64. 126. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 70. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 207. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 418.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 136: g. Scirpinar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 80: g. Scirpidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: g. Scirpinear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 50. n. 234: g. Cyperear.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Synon. Linagrostis Tourn.; Trichophorum Pers.; Scirpi sp. Vahl.

Eriophorus Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 212: g. Cichoracear.
= Andryala Linn.

Eriophylica DC. 1825. Prodr. II. p. 34: sect. Phylicae.

Eriophyllum Lagasca 1816. Nov. gen. et spec. p. 28: nov. g. Corymbiferar. (E. trollifolium et staechadifolium.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 900: g. Eupatorinar.
Cass. 1819. Dict. v. 15. p. 195; 1821. v. 20. p. 348; 1825. v. 38. p. 16; 1828. v. 55. p. 263; 1830. v. 60. p. 575: g. Heleniear. (1828 verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2084. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 631. n. 3142: g. Radiatar.
= Bahiae DC. pars.

Eriophyton Benth. 1829 in Wall. Pl. As. rar. I. p. 63; 1834. Labiat. p. 638: nov. g. Stachydear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 855. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 356 *(Eriophytum)*. 463.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188; 1841. Nom. p. 106. n. 4109: g. Phlomitear.
Endl. 1838. Gen. n. 3667. p. 629; 1841. Ench. p. 308: g. Ballotear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 289 (197). — Walp. 1845. Rep. III. p. 892. 990. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 401 *(Eriophytum)*.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Ballotidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 549: g. Lamiear.

Eriophytum Steud., Dietr. vid. *praeced.*

Eriopoda DC. 1837. Prodr. VI. p. 2: sect. Oederiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2635 *b*. p. 429; 1841. Ench. p. 240.
Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3061. 2: sect. Oederae.

Eriopogon Endl. 1837. Gen. n. 939 *b*. p. 107; 1841. Ench. p. 60: sect. Sacchari. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1356. 1.

Eriopsis Lindl. 1847. Bot. Regist. t. 18: nov. g. Maxillaridar. *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 461.
Rchb. f. 1849 in Walp. Ann. bot. I. p. 782: g. Vandear.

Eriopus Brid. 1827. Bryol. II. p. 339: sect. Chaetephorae. (Leskea cristata Hedw.)
C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 828; 1848. Linnaea XXI. p. 195: g. Lepidopilear.
C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 205: subsect. Eriopodis.
Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 125: sect. Hookeriae.
Synon. Chaetephora, Chaetophora Brid.; Lophobryum Arn.

Eriopus C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 201: sect. Hookeriae. Subsect.: Pterygophyllum, Eriopus.

Eriorhaphe Miquel 1854. Pl. Jungh. Fasc. III. p. 289: nov. g. Byttneriacear., Pentapetae, Trochetiae et Dombeyae aff. (Pentapetes angustifolia Blume?)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 325: g. Dombeyacear.

Eriosciadium Klatt 1858. Linnaea XXIX. p. 707: sect. Dimetopiae.

Eriosema DC. 1825. Prodr. II. p. 388: sect. Rhynchosiae. (An genus proprium?) — Par. Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 587.
Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3934: g. Phaseolear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 347. — E. Meyer 1832. Linnaea VII. p. 170; 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 127. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 156. — Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 256. — Meisn. 1837. Gen. p. 94 (67). — Miq. 1844. Linnaea XVIII. p. 573.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Rhynchosiear. — Par. Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 535; 1842. Rep. I. p. 784. — Endl. 1841. Gen. n. 6691. p. 1300; 1841. Ench. p. 672. — Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5836. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 402.
Synon. Euriosma Desv.; Pyrrhotrichia Wight & Arn.; Glycines et Cytisi sp. Auct.

Eriosolena Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 651: nov. g. Thymelaear.
Endl. 1838. Gen. n. 2104. p. 331; 1841. Ench. p. 209: g. Daphnoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2447.
Meisn. 1841. Gen. p. 331 (243): g. Lagettear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 436: g. Thymelear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 68. n. $2106/_{10}$: g. Eudaphnear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 402: g. Daphnacear.
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIX. 2. p. 540: sect. Daphnes.
Synon. Scopolia Linn. f.

Eriosorus Fée 1852. Gen. Fil. p. 152: nov. g. Eucheilanthear. (Arostichi sp. Rz.)

Eriosperma Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 177: nov. g. Fungor., nomine indicatum.
Rchb. 1828. Consp. p. 15: g. Lycoperdaceor.?

Eriospermeae Endl. 1837. Gen. p. 156; 1841. Ench. p. 90: fam. Smilaceis aff. Gen.: Eriospermum.
Rchb. 1841. Nom. p. 48; sect. Convallariear. Gen. id.
Meisn. 1842. Gen. p. 400 (364): trib. Asphodelear. Gen. id.

Eriospermum Jacq. 1796. Collect. suppl. p. 81: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 110. n. 638; 1809. En. p. 367. — Pers. 1805. Ench. I. p. 363. n. 802. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 294.
Hedw. 1806. Gen. p. 241. n. 977: g. Asphodelear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 197. — Agdh. 1823. Aphor. p. 163. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXVI. 502. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Bartl. 1830. Ord. p. 51. (descisc.) — Spreng. 1830. Gen. I. p. 266. n. 1387. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1144.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 237; 1825. Syst. II. p. 76. n. 1227: g. Liliacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 325. — Eckl. 1827. Verz. p. 2.
Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 783: g. Taccear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Endl. 1837. Gen. n. 1196. p. 156; 1841. Ench. p. 90: g. Eriospermear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1741. — Meisn. 1842. Gen. p. 400 (304). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 402.
Brongn. 1843. En. genr. p. 19: g. Hyacinthinear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 649: g. Asphodeleis aff. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 390.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Anthericear.

Eriosphaera DC. 1828. Prodr. III. p. 180: sect. Miconiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4639 *b*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 790. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 262. — Endl. 1840. Gen. n. 6258 *b*. p. 1221; 1841. Ench. p. 647. — Crüger 1847. Linnaea XX. p. 110 *(Eriosphaeria)*.
= Hypoxanthus Rich.

Eriosphaera Lessing 1832. Syn. Compos. p. 270: nov. g. Craspediear. (Gnaphalium oculus cati L.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 333 *(Eriosphaeria)*.
DC. 1837. Pr. VI. p. 166: g. Helichrysear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2739. p. 446; 1841. Ench. p. 243. — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3492. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 402: g. Senecionidear.

Eriosphaera Dietr. ex Steud. Nomencl. I. p. 588. (E. multifida.)
= Santolina eriosperma Desf. = Lasiospermum pedunculare Lag. *(DC.)*

Eriosphaeria Benth. 1833. Labiat. p. 88; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 99: sect. Hyptidis. Subsect. (1848): Ditassoides, Passerinae, Velutinae, Sessilifoliae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 691. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *g*. p. 611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 7. — Walp. 1845. Rep. III. p. 533.

Eriosphaeria Crüger vid. *Eriosphaera DC.*

Eriosphaeria Wittst. vid. *Eriosphaera Less.*

Eriospora Hochstett. 1850 in Rich. Fl. Abyss. II. p. 508: nov. g. Cyperacear. (Rhynchospora trigyna Hochst.) *Cf.* Walp. Ann. bot. III. p. 693.
Steud. 1855. Glum. II. p. 151: g. Rhynchosporear.

Eriospora Berkeley & Broom 1850. Ann. nat. hist. 2d. ser. V. p. 455: nov. g. Pyrenomycetum.

Eriosporangium Bertero 1830. Sillim. Amer. journ. (ex Linnaea VII. Litt. p. 47): nov. g. Fungor. *Cf.* Bull. sc. nat. g. XX. 3: g. Sphaerinor.? *(Endl. Gen. p. 24.)*

Eriostachys Rchb. 1831. Fl. exc. p. 319; 1841. Nom. p. 105. n. 4078. 5: sect. Stachydis. (St. palustris, silvatica, germanica, etc.)

Eriostachys Benth. 1834. Labiat. p. 534; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 462: sect. Stachydis restricta. — Par. Koch 1837. Syn. p. 567. Ed. II. p. 652. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 824. — Endl. 1838. Gen. n. 3650 *c*. p. 626; 1841. Ench. p. 308. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 137. — Walp. 1845. Rep. III. p. 818. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 685. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 410. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 687.
Synon. Eriostomum Hoffmsg. & Link; Eriostemum Steud.

Eriostegia DC. 1828. Prodr. III. p. 174: sect. Conostegiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4634 *a*; 1841. Nom. p. 174. n. 6757. 1. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 785. — Endl. 1840. Gen. n. 6248 *a*. p. 1219; 1841. Ench. p. 647.
= Calyptraria Naud.

Eriostemoides Endl. 1840. Gen. n. 6009 *b*. p. 1156; 1841. Ench. p. 612: sect. Phebalii.
Synon. Lepidotia Rchb.

Eriostemon Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 221.
Pers. 1805. Ench. I. p. 465. n. 1042: g. Rutacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 307. n. 1215. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 674; 1825. Syst. II. p. 321. n. 1582; 1830. Gen. I. p. 348. n. 1759. — A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 74.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 35): g. Diosmear. — Par. DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140; 1824. Pr. I. p. 720. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 481. — Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5168; 1837. Hdb. p. 282. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 792.

Eriostemon Smith cont.
— Meisn. 1837. Gen. p. 60 (44). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 83. — Bartl. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 171.
Bartl. 1830. Ord. p. 388: g. Boroniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 338. — Endl. 1840. Gen. n. 6006. p. 1155; 1841. Ench. p. 612. — Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7517. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 412.
Synon. Eriostemum Poir.

Eriostemon Lessing 1832. Syn. Compos. p. 12: nov. g. Carlinear. (Centaurea taraxacifolia Don.)
= Haplotaxis Endl.

Eriostemum Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 198: g. Rutaceis aff.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 180: g. Diosmear.
Endl. 1837. En. pl. Hügel. p. 15: g. Rutacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1418.
= Eriostemon Smith.

Eriostemum Colla ex Steud. Nomencl. I. p. 545. 588. (E. dentatum.)
= Elaeocarpus reticulatus Smith.

Eriostemum „Hoffmsgg." Steud. Nomencl. I. 588: vid. *seq.*

Eriostomum Hoffmsg. & Link 1809. Fl. Portug. p. 66.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 373: g. Labiatar. (Stachys germanica L.)
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2879 *c*: sect. Stachydis.
= Eriostachydis Benth. pars.

Eriostylis R. Brown 1809. Linn. Trans. X. p. 168 (Verm. bot. Schr. II. p. 173); 1810. Prodr. I. p. 378. Ed. Nees p. 234: sect. Grevilleae. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 413 *(Eryostylis)*. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 434. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 476. — Endl. 1838. Gen. n. 2143 *c*. p. 341; 1841. Ench. p. 215. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 528. — Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2393. 3. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 539.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Grevillear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 83. n. 2143 *A III*: subsect. Aphanopterae. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 369.
Synon. Stylurus Knight & Sal.; Embothrii sp. Smith.

Eriosycea Miquel 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 455: sect. Ficus. (F. gossypina Wall.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 724.

Eriosynaphe*) DC. 1829. Coll. mém. V. p. 50; 1830. Prodr. IV. p. 175: nov. g. Peucedanear. (Ferula longifolia Fisch.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 329. — Tausch 1834. Flora I. p. 346. — Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5452. — Endl. 1839. Gen. n. 4461. p. 779; 1841. Ench. p. 379. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 135. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 307. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 405.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Eriotheca Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 35: nov. g. Bombacear. (Bombax parviflorum et pubescens Mart.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 28 (24). — Endl. 1840. Gen. n. 5301. p. 989; 1841. Ench. p. 515. — Walp. 1842. Rep. I. p. 330. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 361. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 403.
Rchb. 1837. Hdb. p. 295: g. Eriodendrear.
Rchb. 1841. Nom. p. 204. n. 7750: g. Ochromear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615: g. Adansoniear.

Eriothrix Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2490: g. Doronicear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31.
Bartl. 1830. Ord. p. 138: g. Senecionear.
Less. 1832. Syn. p. 394: g. Cacaliear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 293: g. Erechtitear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2788. p. 455; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (136). — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3547.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713: g. Neurolaenear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 403: g. Senecionidear.
Synon. Eriotrix Cass.; Conyzae sp. Lam.; Baccharidis sp. Pers.

Eriothrix Regel 1842. Linnaea XVI. p. 64: sect. Hypochaeridis. (H. arachnoidea DC., non Poir.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 688.
Synon. Arachnites DC.

Eriothymus Benth. 1834. Labiat. p. 410; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 246: sect. Keithiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 788. — Endl. 1838. Gen. n. 3620 *a*. p. 619; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4119. 1. — Walp. 1845. Rep. III. p. 742.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189: g. Melissear.
Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 171: g. Satureinear.

Eriotis DC. 1830. Prodr. IV. p. 149: sect. Libanotidis. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 312. — Endl. 1839. Gen. n. 4432 *a*. p. 775; 1841. Ench. p. 378. — Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5424. 1. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 278.

Eriotrichium Lemaire vid. *Eritrichium Gaud.*

Eriotrix Cassini 1817. Bull. soc. philom. Févr. p. 32; 1819. Dict. v. 15. p. 200: nov. g. Senecionear. (Conyza lycopodioides Lam.)
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 447. 452; 1830. v. 60. p. 583: g. Doronicear.
= Eriothrix Rchb.

Erioxantha Rafin. 1832 in Loud. Gard. Mag. VIII (Linnaea VIII. Litt. p. 71): novum nomen pro *Eria Lindl.* propositum.

*) συναφή, commissura.

Eriphia*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 270: nov. g. Didynam. Angiosperm.
Juss. 1789. Gen. p. 419 inter genera incertae sedis.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 343: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 370.
A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 18; 1815. Mém. Mus. II. p. 52: g. Solanear.?
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 21. 337. n. 521: g. Scrophulariis aff.
Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 201: g. Scrophularineis aff.?
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3240: g. Gesnerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 175: g. Gesneriear.
= Besleria Plum.

Eriphilema „Herb." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 161: g. Iridacear.

Eriphorum Giseke vid. *Eriophorum Linn.*

Erisma**) Rudge 1805. Pl. guian. I. p. 7. t. 1.
Mart. & Zucc. 1824. Nov. gen. I. p. 136. t. 82: g. Vochysiacear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6073. p. 1179; 1841. Ench. p. 630.
DC. 1828. Pr. III. p. 29: g. Vochysiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4513; 1841. Nom. p. 171. n. 6593. — Bartl. 1830. Ord. p. 321. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 671. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 328. — Meisn. 1838. Gen. p. 119 (85). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 21. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 405.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: g. Erismacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 380: g. Vochyacear.?
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 262: g. Erismear.
Synon. Debraea Röm. & Schult.; Ditmaria Spreng.

Erismaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: trib. Vochysiacear. Gen.: Erisma.

Erismeae A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 262: trib. Vochysiacear. Gen.: Erisma.

Erithalis***) P. Browne 1756. Jamaic. p. 165: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 930. 1364. n. 1123; 1762. Sp. ed. II. p. 251; 1764. Gen. ed. VI. p. 95. n. 238; 1767. Syst. ed. XII. p. 167. n. 237. — Jacq. 1763. Amer. p. 72. t. 83. — Murr. 1774. Syst. p. 181; 1784. Syst. p. 218. — Reich. 1778. Gen. p. 97. n. 255. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 130. n. 324. — Gmel. 1791. Syst. p. 376. — Pers. 1797. Syst. p. 227. — Willd. 1797. Sp. I. p. 996. n. 368.
Gled. 1764. Syst. p. 203. n. 844: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 145: g. Opulinar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 129. t. 26. f. 7 (fruticosa).

Erithalis P. Browne cont.
Juss. 1789. Gen. p. 206; 1820. Mém. Mus. VI. p. 396: g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 585. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 446. — Pers. 1805. Ench. I. p. 200. n. 446. — Hedw. 1806. Gen. p. 149. n. 640. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 202. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XX. 268. n. 931. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 765. n. 831; 1830. Gen. I. p. 175. n. 882.
Neck. 1790. El. I. p. 141. n. 244: g. Sphanidophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 235 (*Erythalis*): g. Guettardear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 615. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2100; 1841. Nom. p. 76. n. 2857. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 212. — DC. 1830. Pr. IV. p. 465. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 557. — Meisn. 1838. Gen. p. 166 (117). — Brongn. 1843. En. genr. p. 49.
Cram. 1803. Disp. p. 109: in Decandr. Monogyn.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84: g. Lygistidiae.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 213: g. Guettardacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375.
Endl. 1838. Gen. n. 3207. p. 543; 1841. Ench. p. 273: g. Euguettardear. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 35.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.
Synon. Herrera Adans.

Erithalis Forst. 1786. Prodr. n. 101.
= Timonius Rumph.

Eritheis Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 464: nov. g. Corymbiferar. (Inula crithmoides L.) *Cf. Erithia Wittst.*
= Limbarda DC.

Erithia „Gray" Wittst. Etym. Handw. p. 335 (Compos.): err. pro *praecedente?*

Erithrea Neck. vid. *Erythraea Renealm.*

Erithroxylum Juss. vid. *Erythroxylum Adans.*

Eritrichium Gaudin 1828. Fl. Helv. II. p. 4. 57: g. Asperifoliar.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 345: g. Borraginear.
Koch 1837. Syn. p. 506. Ed. II. p. 582: g. Lithospermear.
Endl. 1839. Gen. n. 3770. p. 649; 1841. Ench. p. 321: g. Anchusear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 406 (rectius *Eriotrichium*).
Meisn. 1840. Gen. p. 297 (187): g. Cynoglossear. — Par. DC. 1846. Pr. X. p. 122. Sect.: Oreocharis, Eueritrichium, Coloboma, Endogonia, Amblynotus, Pseudomyosotis, Cryptantha, Rutidocaryum. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 149. Sect. ex DC. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 534.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31: g. Asperifoliear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 100: sect. Myosotidis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.
= Eritrichum Schrad.

---

*) Nomen ex Plinio. ἐρίφη, capra junior. (?).
**) ἔρισμα, objectum litis. (?) ἔρεισμα, fulcrum.
***) „ἐριθαλὸς quod vere floret."

Eritrichum Schrader 1820. Comment. Gotting. IV. p. 186: nov. g. Boraginear. (Myosotis nana Vill.)
Rchb. 1841. Nom. p. 111. n. 4332: g. Borraginear.
Synon. Eritrichium Auct.; Eriotrichium Lemr.

Eriudaphos Wittst. vid. *seq.*

Eriudaphus*) Nees 1836 in Eckl. & Zeyh. En. pl. Afr. austr. II. p. 271: nov. g. Homalinear., Myriantheiae aff. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 73 (52). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 286 (*Eriodaphus*). — Endl. 1839. Gen. n. 5089. p. 923; 1841. Ench. p. 481. — Walp. 1842. Rep. I. p. 548.
Rchb. 1841. Nom. p. 177. n. 6869: g. Acomear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 743: g. Homaliacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 406.
Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 364; 1857. ibid. VIII. p. 241: g. Laetiear.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 335 (*Eriudaphos*): g. Amygdalacear.
= Phoberos Lour.

Eriura Lindl. . . . . Journ. Proc. Linn. soc. III. p. 55: sect. Eriae. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 663.

Erlangea Schultz Bip. 1853. Flora I. p. 34: nov. g. (Vernoniacear.) Erlangear.

Erlangeae Schultz Bip. 1853. Flora I. p. 33: subdiv. Euvernoniear. Gen.: Erlangea.

Ermannia Chamisso 1831. Linnaea VI. p. 533.
= Leiospora Meyer?

Ermellinus Caesalp. 1583. De plant. lib. 3. (Linn. 1747. Class. pl. p. 7.)
= Diospyros Dalech.

Erndelia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 235. n. 979: nov. g. Eredophytor., a Passiflora L. sejunctum.

Erndlia**) Giseke 1792. Prael. p. 199. 209. 229: nov. g. Scitaminear. (Amomum Zerumbet Kön.)
= Curcumae Linn. sp.

Ernestia***) DC. 1828. Prodr. III. p. 121: nov. g. Rhexiear. (Rhexia tenella Bonpl.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4584; 1841. Nom. p. 173. n. 6707. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 746. — Meisn. 1838. Gen. p. 115 (82). — Endl. 1840. Gen. n. 6199. p. 1211; 1841. Ench. p. 646. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 406.
Bartl. 1830. Ord. p. 329: g. Melastomear.
Cham. 1834. Linnaea IX. p. 400.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 30: g. Lasiandralium.

---

*) ἔριον, lana; ἔδαφος, sedes.
**) Dicat. Chr. H. Erndl.
***) Dicat. Ernesto Meyer.

Ernodea*) Swartz 1788. Prodr. p. 2. 29; 1797. Fl. Ind. occ. I. p. 223. t. 4: nov. g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 788. n. 1718. — Gmel. 1791. Syst. p. 244. — Willd. 1797. Sp. I. p. 611. n. 196. — Pers. 1805. Ench. I. p. 131. n. 253. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 342.
Vahl 1791. Symb. II. p. 28.
Gis. 1792. Prael. p. 520: g. Stellatar.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 94. t. 196.
Hedw. 1806. Gen. p. 61. 371: g. Rubiacear. — Par. Röm. & Schult. 1828. Syst. III. p. 10. 185. n. 461. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 208. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 323. — Link 1821. En. I. p. 138. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 406. n. 397; 1830. Gen. I. p. 89. n. 441. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 454.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 601: g. Coffeacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2003.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 86: g. Coffeariae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Pavettear.
Bartl. 1830. Ord. p. 210: g. Spermacocear. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 210. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 156: g. Putoriear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 575. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 633. — Endl. 1838. Gen. n. 3115. p. 526; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 172 (119). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 30. — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2763. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 406.
Lindl. 1841. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
Synon. Knoxia P. Browne.

Ernstingia**) Scopoli 1777. Introd. p. 322. n. 1477: g. Disciferar.
Neck. 1790. El. II. p. 231. n. 974: g. Eredophytor.
= Matayba Aubl.

Erobathos Spach vid. *seq.*

Erobatos DC. 1824. Prodr. I. p. 49: sect. Nigellae. (N. damascena.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 48. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 750. — Endl. 1839. Gen. n. 4794 c. p. 849; 1841. Ench. p. 435. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 55.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7248: g. Nigellear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 301 (corr. *Erobathos*): g. Nigellinear.
Synon. Nigella Mönch.

Erochloa Steud. vid. *seq.*

Erochloe Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. p. 221: nov. g. Graminear. (Poa spectabilis.) (*Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 85 et Steud. Glum. I. p. 373 (*Erochloa*).
= Eragrostis Palis.

---

*) ἐρνώδης, ramosus.
**) Dicat. A. Conr. Ernsting, medico Brunsvic.

Erodendrum Salisb. (1806?) Parad. 67. 70. 108. (*Erodendron* ex Wittst. Etym. Handw. p. 335).
= Protea Linn.

Erodieae Rchb. 1828. Consp. p. 203 (1832. Fl. exc. p. 776): subdiv. Geraniear. Gen.: Pelargonium, Erodium, Geranium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 290: sect. Geraniear. genuinar. Gen.: Erodium, Geranium.

Erodium*) L'Herit. 1787. Geraniol. t. 1—6.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 172: g. Geranioidear. — Par. Link 1822. En. II. p. 184.
Willd. 1800. Sp. III. p. 625. n. 1263; 1809. En. p. 698: g. Monadelph. Pentandr. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 154. — Hoffm. 1804. Bot. Taschenb. p. 60. — Pers. 1807. Ench. II. p. 223. n. 1600.
Batsch 1802. Tab. p. 16: g. Gruinalium.
Rebent. 1804. Neom. p. 120: g. Pentandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 51: g. Geraniacear. — Par. Lois. 1819. Dict. v. 15. p. 211. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 228. — Kunth 1824. Syn. III. p. 224; 1838. Berol. I. p. 78. — DC. 1824. Pr. I. p. 644. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 96. t. 19. — Presl 1826. Sicul. I. p. 207. — Bartl. 1830. Ord. p. 349. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 721. — Link 1831. Hdb. II. p. 330. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 303. — Koch 1836. Syn. p. 141. Ed. II. p. 155. — Webb 1836. Canar. I. p. 22. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 207. — Endl. 1840. Gen. n. 6045. p. 1166; 1841. Ench. p. 620. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 474. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 119. Sect.: Gruinum, Euerodium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 82. — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 161. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 494. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 307. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 407. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 392.
DC. 1805. Franç. IV. p. 838; 1815. V. p. 627: g. Geraniear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 624. (verar). — Spreng. 1826. Syst. III. p. 32. n. 2354; 1831. Gen. II. p. 436. n. 2630. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 221. — Meisn. 1837. Gen. p. 57 (41).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 794: g. Geranior.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: g. Geranidiar.
Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5279; 1832. Fl. exc. p. 776; 1837. Hdb. p. 290: g. Erodiear.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 394: sect. Geranii.
Synon. Scolopacium Eckl. & Zeyh.; Herodium Rchb.

Eromitra Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Morchelleor., antea *Mitrophora Lév.*, non *Neck.*

*) ἐρωδιός, ardea.

Erophaca Boissier Voy. Espagne p. 176: nov. g. ex typo Phacae baeticae L. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 243.
= Euphaca Endl.?

Eropheron Tausch 1823. Hort. Canal. fasc. I: sect. Saxifragae. (S. crassifolia.) *Cf. Erophoroh Wittst.*
= Bergenia Mönch.

Erophila*) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 234; 1821. Syst. II. p. 356; 1824. Prodr. I. p. 172: nov. g. Alyssinear. (Draba verna L.) — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 60. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 187. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 56. — Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11). — Kunth 1838. Berol. I. p. 48. — Endl. 1839. Gen. n. 4881. p. 869; 1841. Ench. p. 449.
Link 1822. En. II. p. 151: g. Tetradynam. Siliculos.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1127 (*Eriophila*); 1828. Consp. p. 183. n. 4761 *a*; 1832. Fl. exc. p. 665: sect. Drabae. — Par. Koch 1836. Syn. p. 65. Ed. II. p. 70. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 109. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 155. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 267. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 125.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Lunariear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Siliculosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 652.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6949: g. Drabear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 91: g. Allyssinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Alyssidar.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 408: g. Alyssear.
Synon. Gansblum Adans.

Erophoron Wittst. Etym. Handw. p. 335: err. pro *Eropheron Tausch.*

Eroprota**) Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 20: sect. Primulae. (P. veris L.)
= Primulastrum Duby.

Erosma Booth Catal. 113.
= Rhizocladus Endl.

Erosmia A. Juss. vid. *Evosmia Humb. & Bonpl.*

Eroteum „Soland. mss." Swartz 1788. Prodr. p. 5. 85: nov. g. Polyandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 807. n. 1757. — Gmel. 1791. Syst. p. 822. — Pers. 1807. Ench. II. p. 72. n. 1305.
Gis. 1792. Prael. p. 453: g. Columniferar.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 335 (*Erotium*): g. Ternströmiacear.
= Freziera Swartz.

Erotium „Sol." Endl. (in synon. Frezierae), Wittst. vid. *praeced.*

Erpenema Cassini 1820. Bull. soc. philom. Mai p. 77: nov. g. Hypoxylor. (Sphaeria reticulata DC.)

*) ἦρ, ver; φιλέω, amo.
**) ἦρ, ver; πρῶτος, primus.

Erpetina Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 299: nov. g. Dissochaetear. (E. radicans.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 879.

Erpetion*) „DC. mss." Sweet . . . . Fl. gard. I. p. 170.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 334: g. Violear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 517. — Meisn. 1837. Hdb. p. 20 (18). — Rchb. 1837. Hdb. p. 269. — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 434 *(Herpetium)*.
A. Cunn. 1840. Ann. nat. hist. IV. p. 110: g. Violariear.
= Violae Linn. sp.

Erpipomaea Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 444: sect. Ipomaeae.
Conf. seq.

Erpipomoea G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 265: sect. Ipomoeae. — Par. Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 349. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 601.

Erpodiaceae C. Müll. 1843. Bot. Zeit. p. 775: nova tribus Muscor. Gen.: Erpodium.

Erpodium Brid. 1827. Bryol. II. p. 167: sect. Anoectangii.
Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 547: g. Fontinaloideor.
C. Müll. 1843. Bot. Zeit. p. 774: g. Erpodiacear.
C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 179: sect. Pilotrichi.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 435 *(Herpodium)*: g. Bryoidear.

Erporchis Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 407: sect. Neottiae. (N. grandis, rubicunda, parviflora, etc.)

Ertela Adans. 1763. Fam. II. p. 358: g. Tithymalor.
= Monnieria Linn.

Ertelia Steud. Nomencl. I. p. 590: vid. *praeced.*

Eruca Tourn. 1700. Inst. p. 226. t. 111: g. pl. class. V. (Brassica Eruca L.)
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 74. Ed. Hall. 1745. p. 82: g. pl. class. IV.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 553: g. Tetrapetalar. cruciatar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 418: g. Erucarum.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 265. t. 61: g. Siliquosar. — Par. Gaud. 1829. Helv. IV. p. 192. 373. — Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 352. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 727.
Neck. 1790. El. III. p. 74. n. 1396: g. Styridophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 256: g. Thalamostemonis.
Pers. 1807. Ench. II. p. 207: sect. Brassicae.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 243: sect. Erucae.
DC. 1821. Syst. II. p. 636; 1824. Pr. I. p. 223: g. Brassicear. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 104. — Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4814; 1832. Fl. exc. p. 692. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 253. — Koch 1836. Syn. p. 57. Ed. II. p. 62. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4956. p. 884; 1841. Ench. p. 451. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 220. — Brongn. 1843. En. genr. p. 92. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 74. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 414. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 219.
Webb 1836. Canar. I. p. 78: g. Anarthrocarpear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 183. n. 7040: g. Sinapiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Brassicidar.
Synon. Euzomum Link.

*) ἑρπετός, serpens.

Eruca Gärtn., Meyer & Scherb. 1800. Fl. Wett. II. p. 416. 458: g. Tetradynam. Siliculos. (Brassica Erucastrum L.)
= Erucastrum DC.

Eruca „Cav." DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 243: g. Brassicear. Sect.: Hebesinapis, Leucosinapis, Eruca, Napus.

Erucaceae Vent. 1799. Tabl. III. p. 99: sect. Cruciferar. Gen.: Raphanus, Raphanistrum, Sinapis, Brassica.

Erucae Adans. 1763. Fam. II. p. 417: sect. 1 Cruciferar. Gen.: Rapa, Kibera, Sisymbrium, Roripa, Sophia, Norta, Brassica, Couringia, Eruca, Sinapi, Erysimum, Alliaria, Cheiri, Hesperis, Leucoium, Turritis, Cardamine, Dentaria.

Erucago Tourn. 1700. Inst. p. 232. t. 103: g. pl. class. V.
Adans. 1763. Fam. II. p. 423: g. Raphanor.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 194. (Bunias Erucago L.)
Mönch 1794. Meth. p. 278: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 114: g. Myagroidear.
Cram. 1803. Disp. p. 146: g. Tetradynam. Siliculos.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 510: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 474. — Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 168. — Lois. 1819. Dict. v. 15. p. 262.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 246; 1821. Syst. II. p. 670; 1824. Pr. I. p. 229: sect. Buniadis. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 263. — Koch 1836. Syn. p. 77. Ed. II. p. 82. — Endl. 1839. Gen. n. 4973 *a.* p. 887; 1841. Ench. p. 451. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 225.
Synon. Bunias Hall.

Erucaria Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 298. t. 143.
Raff.-Delile 1813. Fl. Aegypt. p. 30.
R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 122 (Verm. bot. Schr. V. p. 67): g. Cruciferar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 717; 1825. Syst. II. p. 915. n. 2328; 1831. Gen. II. p. 523. n. 2579: g. Siliquosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 728.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 246; 1821. Syst. II. p. 673; 1824. Pr. I. p. 230: g.

Erucaria Gärtn. cont.
unicum Erucariear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 264. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4974. p. 887; 1841. Ench. p. 451. Sect.: Agriogongyle, Eremogongyle. — Rchb. 1841. Nom. p. 179. n. 6911. Sect.: Erucaria, Eremogongyle. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 93. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 414.
Link 1822. En. II. p. 147: g. Tetradynam. Siliculos.
Rchb. 1828. Consp. p. 181. n. 4720: g. Buniadear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Erucaridar.
Synon. Cordylocarpus Smith; Pachila Rafin.

Erucariae DC. Prodr. I. p. 230: vid. *Erucarieae DC.*

Erucaridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Spirolobear. Gen.: Erucaria, Cycloptychis.

Erucarieae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 246; 1821. Syst. II. p. 154. 673; 1824. Prodr. I. p. 230 *(Erucariae)*; trib. Spirolobear. Gen.: Erucaria. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 264. Gen. id. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (14). Gen. id. et Morisia?, Schizopetalon? — Endl. 1839. Gen. p. 887; 1841. Ench. p. 451. Gen.: Erucaria.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI: subdiv. Lomentacear. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 179: subsect. Goldbachiear. Gen. id.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 93: trib. Cruciferar. Gen. id.

Erucastrum DC. 1821. Syst. II. p. 598; 1824. Prodr. I. p. 216: sect. Brassicae. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1184; 1828. Consp. p. 185. n. 4817 *b*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 246.
Link 1831. Hdb. II. p. 317: g. Siliquosar.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 693; 1841. Nom. p. 183. n. 7042. 1: sect. Erucastri. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4952 *a*. p. 883; 1841. Ench. p. 451. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 219.
Koch 1836. Syn. p. 56. Ed. II. p. 60: g. Brassicear.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 81: sect. Diplotaxidis.
Synon. Eruca GMS.

Erucastrum Presl 1826. Fl. sicul. I. p. 92: g. amplius definitum Brassicear. (Sinapis radicata Desf., oleracea et virgata Presl.) *Cf.* Schimp. & Spenn. 1829. Fl. Frib. III. p. 946. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 693. Sect.: Erucastrum, Güntheria. — Meisn. 1837. Gen. p. 15 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4952. p. 883; 1841. Ench. p. 451. Sect.: Erucastrum, Micropodium. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 219. Sect. caed. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 414. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 217.

Erucastrum Presl cont.
Webb 1836. Canar. I. p. 80: g. Anarthrocarpear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 183. n. 7042: g. Sinapiear. Sect. ut 1832.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323: g. Siliquosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Brassicidar.

Eruptoria Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 386 *a*: sect. Opegraphae.
= Leucogramma Meyer.

Ervatamia*) A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 373: sect. Tabernaemontanae. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 421.

Ervilia**) Link 1822. Enum. II. p. 240: g. Leguminosar. (Ervum Ervilia L.)
Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 366: sect. Ervi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3918 *b*; 1832. Fl. exc. p. 526. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 326. — Endl. 1840. Gen. n. 6580 *b*. p. 1279; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 662. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 218.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: g. Viciear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5770. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 475.
Link 1831. Hdb. II. p. 188: g. Lathyroidear.
Koch 1836. Syn. p. 191: sect. Viciae. — Par. Sond. 1851. Fl. Hamb. p. 396.

Ervoides (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 471: sect. Craccae. (Ervum monanthos L.)

Ervum Tourn. 1700. Inst. p. 398. t. 121: g. pl. class. X.
Linn. 1737. Gen. p. 217. n. 575; 1737. Cliff. p. 370; 1740. Syst. p. 27; 1753. Sp. II. p. 738; 1759. Syst. ed. X. p. 1166. n. 784; 1763. Sp. ed. II. p. 1039; 1764. Gen. ed. VI. p. 376. n. 874; 1767. Syst. ed. XII. p. 488: g. Diadelph. Decandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 67. — Murr. 1774. Syst. p. 554; 1784. Syst. p. 665. — Reich. 1778. Gen. p. 376. n. 948. — Lour. 1790. Coch. II. p. 461. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 498. n. 1188. — Gmel. 1791. Syst. p. 1112. — Pers. 1797. Syst. p. 702; 1807. Ench. II. p. 308. n. 1718. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1112. n. 1357; 1809. En. p. 766. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 323.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 602: g. Leguminosar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 12. — Scop. 1777. Intr. p. 310. — Juss. 1789. Gen. p. 360. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 419. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 235. — DC. 1805. Franç. IV. p. 598. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 753; 1826. Syst. III. p. 269. n. 2574; 1831. Gen. II. p. 589. n. 2897. — Lois. 1822. Dict. v. 25. p. 454 *(Lentille)*. — Link 1822. En. II. p. 240. (Distinguitur Ervilia.) — Gaud. 1828.

*) ***Nandi-Ervatam***, nomen vernaculum.
**) Ervilia Plinii = Lathyrus Cicera.

Ervum Tourn. cont.
Helv. IV. p. 431. 519. — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 352.
Hall. 1745 in Rupp. fl. jen. p. 258: g. pl. class. XI.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127 (sph. *Croum);* 1764. Syst. p. 135. n. 565: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 146.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 403. — Gis. 1792. Prael. p. 415. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 458. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 286 *(Lentille).*
Adans. 1763. Fam. II. p. 331: g. Viciar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 293: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 489: g. Papilionatar.
Neck. 1790. El. III. p. 38. n. 1351: g. Cyteophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 328. t. 151.
Rebent. 1804. Neom. p. 192: g. Decandr. Monogyn.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 614: sect. Viciae. (E. tetraspermum et hirsutum.) — Par. Webb 1846. Canar. II. p. 99.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Viciear. — Par. Ser. 1825 in DC. Pr. II. p. 366. Sect.: Lens, Ervilia. — Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3918 (sect. eaed.); 1831. Fl. exc. p. 525 (sect. eaed. et Ervum); 1841. Nom. p. 148. n. 5769 (sect.: Lens, Ervum). — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 325. Sect. ut Ser. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 304. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 235. — Koch 1836. Syn. p. 198. Ed. II. p. 218. — Meisn. 1837. Gen. p. 92 (65). — Torr. & Gray . . . . North-Am. I. p. 273. — Endl. 1840. Gen. n. 6580. p. 1279; 1841. Ench. p. 670. Sect. ut Ser. et Lenticula. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 662. Sect. eaed. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 83. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 474. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 283. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 528.
Link 1831. Hdb. II. p. 189: g. Lathyroidear.

Erxlebia Medic. 1790. Act. Theod. Pal. Phys. VI. p. 494; 1791. Phil. Bot. II. p. 95: nov. g. ex typo Commelinae tuberosae L.
= Commelinae Plum. pars.

Eryaleium Rchb. vid. *Ergaleium DC.*

Erycibe Roxb. 1798. Pl. Corom. II. p. 31. t. 159; 1824. Fl. Ind. ed. Wall. II. p. 284; ed. 1832. II. p. 585: nov. g. Pentandr. Monogyn. (E. paniculata.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 250. n. 574.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 464; 1825. Syst. I. p. 661. n. 716; 1830. Gen. I. p. 128. n. 638: g. Convolvulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3003; 1841. Nom. p. 114. n. 4437. (genuinar.) — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 95.

Erycibe Roxb. cont.
Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 177 *(Ericibe):* g. Convolvulacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIV. 489. n. 788. — Bartl. 1830. Ord. p. 192 (dubium). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 615.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1046: g. Apocyneis et Convolvulaceis aff.
Choisy 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 222: g. Cordiacear. Char. emend.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 374. 392 *(Erysibe):* g. Erimataliear.
Endl. 1839. Gen. n. 3815. p. 655; 1841. Ench. p. 325: g. Erycibear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 278 (185). — DC. 1845. Pr. IX. p. 464. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1032.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 596: g. Ebenacear.
Synon. Catonia Vahl; Erimatalia Röm. & Schult.

Erycibeae Endl. 1839. Gen. p. 655; 1841. Ench. p. 325: fam. Tubiflorar., Convolvulaceis aff. Gen.: Erycibe.
Meisn. 1840. Gen. p. 278 (185): ordo Tubiflorar. (ex DC. mss.) Gen. id.
DC. 1845. Pr. IX. p. 463: ordo (138). Corolliflorar. Gen. id.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 416. Gen. id.
Synon. Erimatalieae G. Don.

Erycine Lindl. 1853. Fol. Orchid. Fasc. II. (10 Jan.): nov. g. Orchidear. (Oncidium echinatum Kth.)

Eryngieae Rchb. 1828. Consp. p. 144: sect. Panacear. Gen.: Eryngium, Alepidea, Eriocalia, Astrantia, Arctopus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: trib. unica Acnospermar. Gen.: Eryngium, Alepida, Sanicula.
Tausch 1834. Flora I. p. 356: subtrib. Apleurospermar. Gen.: Alepidea, Eryngium, Sanicula.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 753: trib. Umbelliferar. Gen.: Eryngium, Sanicula.

Eryngineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: fam. Fructunguliae.

Eryngium*) Tourn. 1700. Inst. p. 327. t. 173: g. pl. class. VII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 262. Ed. Hall. 1745. p. 275: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 69. n. 199; 1737. Cliff. p. 87; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 57; 1753. Sp. I. p. 232; 1759. Syst. ed. X. p. 952. n. 287; 1762. Sp. ed. II. p. 336; 1764. Gen. ed. VI. p. 127. n. 324; 1767. Syst. ed. XII. p. 201. n. 321: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 223; 1784. Syst. p. 270. — Reich. 1778. Gen. p. 131. n. 354. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 177. n. 456. — Gmel. 1791. Syst. p. 466. — Pers. 1797. Syst. p. 286. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1356. n. 518; 1809. En. p. 297.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 455: g. Umbelliferar. — Par. Gmel. 1747. Sibir.

*) ἠρύγγιον Veterum.

Eryngium Tourn. cont.
I. p. 185. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Crantz 1767. Cl. Umb. p. 116 (deliquesc.); 1769. Stirp. Austr. p. 229. — Scop. 1772. Carn. I. p. 184; 1777. Intr. p. 116. — Juss. 1789. Gen. p. 226. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 35. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 480. (anomalar.) — DC. 1805. Franç. IV. p. 354; 1815. V. p. 515. (anomalar.) — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 645; 1820 in Schult. Syst. VI. p. xxx. 316; 1825. Syst. I. p. 868. n. 1026; 1830. Gen. I. p. 219. n. 1126. (descisc.) — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 105. (Divis. 2.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 527. — Link 1821. En. I. p. 259. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 29. — Kunth 1824. Syn. III. p. 106. — Lois. 1825. Dict. v. 37. p. 336 (*Panicaut*). — Bartl. 1830. Ord. p. 237. (descisc.) — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 641. — Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 293. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 85.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 51. n. 198: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 103.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 299. n. 668. — Hedw. 1806. Gen. p. 190. n. 781. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 175. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 164. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 14. 294.
Adans. 1763. Fam. II. p. 97: g. Cicutar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 82: g. Aggregatar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 77. t. 20. f. 1 (campestre).
Neck. 1790. El. I. p. 182. n. 307: g. Scadiophytor.
La Roche 1808. Hist. Eryng. (Paris. fol.) *Cf.* Schrad. n. Journ. IV. p. 90.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 139; 1836. Syn. p. 281. Ed. II. p. 309: g. Saniculear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 411. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 369; 1845. Ross. II. p. 237. — DC. 1830. Pr. IV. p. 87. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 433; 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5535. Sect. (1841): Eryngium, Lessonia? — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 266. Subgen.: Lessonia. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103). — Endl. 1839. Gen. n. 4386. p. 768; 1841. Ench. p. 378. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 936. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 603. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 339. — Brongn. 1843. En. genr. p. 110. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 443 (*Panicaut*). — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 64.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3750: g. Eryngiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34. — Tausch 1834. Flora I. p. 356. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 753.
Link 1829. Hdb. I. p. 311: g. Capitatar.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 222: g. Apleurospermear.

Eryngium Tourn. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Saniculidar.
Gay 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 150. Char. emend.
Synon. Lessonia Bert.; Strebanthus Rafin.

Eryostylis Röm. & Schult. vid. *Eriostylis R. Brown.*

Erysibe*) „Theophr." Wallroth . . . . in Verh. nat. Fr. Berl. I. 1. p. 11.
Nees 1816. Syst. p. 148; 1817. Ueberbl. p. 38: stirps Sclerotii.
Mart. 1817. Erlang. p. 392: g. Fungor. (aëreor. et hypogaeor.)
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 15: g. Sclerotior.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 589: g. Sclerotidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 48: g. Gasteromycetum.
Ehrenb. 1821. Nov. Act. Leop. X. p. 211. Char. emend.
Link 1824. Spec. I. p. 100: g. Hyphomycetum.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Byssacear.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1041: g. Pulveraceor.
Rchb. 1828. Consp. p. 8. n. 149: g. Perisporior. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 277. p. 23; 1841. Ench. p. 16. Sect.: Aerisma, Podosphaeria, Alphitomorpha. — Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 310. Sect. eaed. (Erysibe loco Aerismae.) — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 230.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 97: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 193: g. Sporomycetum hyposporor.
Synon. Erysiphe Hedw.; Erysyphe Brongn.

Erysibe G. Don vid. *Erycibe Roxb.*

Erysimastrum DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 239; 1821. Syst. II. p. 494; 1824. Prodr. I. p. 197: sect. Erysimi. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 77. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 210. — Koch 1836. Syn. p. 50. Ed. II. p. 54. — Endl. 1839. Gen. n. 4908 *d.* p. 875; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 189. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 258. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 88.
C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 156: subg. Erysimi.

Erysimeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: trib. Siliquosar. Gen.: Hesperis, Alliaria, Erysimum, Barbaraea, Cheirinia, Cheiranthus, Conringia, Notoceras.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260: sect. Sisymbrear. Gen.: Braya, Taphrospermum, Smelowskia, Dontostemon, Erysimum, Syrenia, Stanleya.
Rchb. 1841. Nom. p. 182: sect. Sisymbriear. Gen. 5 prima ut 1837, Tetracme, Conringia, Thelypodium; *Stanleyeae.*

*) ἐρυσίβη, rubigo. — Vox Erysibe neque in Murr. opere (*Conf. Erysiphe Murr.*), neque in Rebentisch Fl. Neom. p. 360, ut erronee citatum invenimus, occurrit.

Erysimum Tourn. 1700. Inst. p. 228. t. 111: g. pl. class. V.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 75. Ed. Hall. 1745. p. 82: g. pl. class. IV.
Adans. 1763. Fam. II. p. 418: g. Erucar. = Sisymbrium Linn.

Erysimum*) Linn. 1737. Gen. p. 198. n. 845; 1737. Cliff. p. 337; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 192; 1753. Sp. II. p. 660; 1759. Syst. ed. X. p. 1133. n. 729; 1763. Sp. ed. II. p. 922; 1764. Gen. ed. VI. p. 339. n. 814; 1767. Syst. ed. XII. p. 441: g. Tetradynam. Siliquos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 499; 1784. Syst. p. 596. — Reich. 1778. Gen. p. 339. n. 878. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 442. n. 1090. — Gmel. 1791. Syst. p. 983. — Pers. 1797. Syst. p. 634. — Willd. 1800. Sp. III. p. 509. n. 1239; 1809. En. p. 679. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 68.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 65. n. 268: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 254.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 27. — Hill 1769. Ht. kew. p. 172[18]. — Scop. 1772. Carn. II. p. 27; 1777. Intr. p. 318. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 491. — Pers. 1807. Ench. II. p. 199. n. 1569. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 716; 1825. Syst. II. p. 905. n. 2322; 1831. Gen. II. p. 522. n. 2573. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 362. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 422. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 191. 355. — Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 258. Sect.: Erysimastrum, Cheiropsis, Cuspidaria. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 711.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 239. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 503. — DC. 1805. Franç. IV. p. 657. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 115. (Verm. bot. Schr. V. p. 57.) Sejungitur Barbarea. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 681. — D. Don 1825. Nepal. p. 202.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 334. (E. Alliaria.)
Neck. 1790. El. III. p. 77. n. 1401: g. Styridophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 297. t. 143.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 103: g. Cheiranthoidear.
Rebent. 1804. Neom. p. 153: g. Hexandr. Monogyn.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 238; 1821. Syst. II. p. 490; 1824. Pr. I. p. 196: g. Sisymbrear. Sect.: Stylonema, Cuspidaria, Erysimastrum, Coringia. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 75. Sect. eaed. exclusa Coringia. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1104. 1169 (sect.: Syrenia, Cheirinia); 1828. Consp. p. 185. n. 4813 (sect. eaed. et Cuspidaria); 1832. Fl. exc. p. 686. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 209. Sect. ut DC. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 147. (ampliat.) Subgen.: Agonolobus, Cheiropsis, Erysimastrum. — Koch 1836. Syn. p. 50. Ed. II. p. 54. Sect.: Erysimastrum, Coringia. — Meisn. 1837. Gen. p. 13 (12). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 94. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 210.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Erysimear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 182. n. 7026. Sect.: Cheirinia, Erysimum, Cuspidaria.
Kunth 1838. Berol. I. p. 52: g. Sisymbriear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4908. p. 875; 1841. Ench. p. 450. Sect.: Agonolobus, Cuspidaria, Cheiropsis, Erysimastrum, Conringia. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 285. Sect. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 91. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 449.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 87: g. Cheiranthear. Sect.: Cheiropsis, Erysimastrum, Conringia.

*) ἐρύω, conservo, salvum praesto.

Erysimum Link 1822. Enum. II. p. 168: g. Tetradynam. Siliquos.
Lois. 1828. Dict. v. 57. p. 214 (*Vélar*): g. Cruciferar.
Link 1831. Hdb. II. p. 313: g. Siliquosar. = Velarum DC.

Erysiphe Murray 1770. Prodr. design. stirp. Gotting. p. 25. (Nomen). *)
„Hedw. f. ined.“ DC. 1805. Fl. franç. II. p. 272; 1815. V. p. 104: g. Angiocarpor. (Sclerotium erysiphe Pers.) *Cf.* Leman 1819. Dict. v. 15. p. 266.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 206; 1818. II. p. 366: g. Sphaerioideor. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 761. n. 3882.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 583 (*Erysyphe*): g. Sphaeriacear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 160: g. Perisporior.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 234: g. Perisporiar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Sclerotidear.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 28: g. Pyrenomycetum. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 84.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 29; 1842. Mycol. p. 122: g. Alphitomorphear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Perisporiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Erysipheor.

*) Legimus: Euphorbiam Cyparissiam, *Erysiphe* ibidem saepius conspurcatam. — Nomen Linnaeanum: Mucor Erysiphe verosimiliter errore pro Erysibe.

Erysiphe Murray cont.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 5: g. Asterineor.
Lév. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 134. 161: g. Erysiphear. (restrict.)
Math. 1853. Belg. II. p. 403: g. Sclerotiear.
Conf. Erysibe Theophr.

Erysipheae Léveillé 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 135. Gen.: Podosphaera, Sphaerotheca, Phyllactinia, Uncinula, Calocladia, Erysiphe.

Erysiphei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: sect. Angiosarcor. Gen.: Erysiphe, Lasiobotrys.

Erysyphe Brongn. vid. *Erysiphe Murr.*

Erythaea Gray vid. *Erythraea Ren.*

Erythalia Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 334. 336: g. Gentianar. verar.
Bunge 1829. Mém. Mosc. VII. (1824) p. 207. 237: sect. Gentianae.
= Eurythaleia Ren.

Erythalis Batsch vid. *Erithalis P. Browne.*

Erytheremia Endl. vid. *Erythremia Nutt.*

Erythracanthus*) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 75. 80; 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 285; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 78: nov. g. Nelsoniear. (Ruellia racemosa Roxb.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4035. p. 698; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 293 (202). — Spach 1840. Vég. phan. IV. p. 144.— Rchb. 1841. Nom. p. 110. n. 4301. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 368. 584.
Rchb. 1837. Hdb. p. 190 (*Elytracanthus*): g. Elytrariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 579: g. Nelsonear.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 775: sect. Ebermayerae.

Erythraea Renealm. 1611. Spec. p. 77. t. 76.
Neck. 1790. El. II. p. 10. n. 619 (*Erithrea*): g. Darinyphytor.
Borckh. 1796 in Römer Arch. I. 1. p. 28: g. pro Gentiana Centaurio L. adoptat.
Pers. 1805. Ench. I. p. 283. n. 633: g. Gentianear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 105. n. 469. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 451. Ed. Nees p. 307. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 472; 1825. Syst. I. p. 579. n. 619; 1830. Gen. I. p. 143. n. 714. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 177. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XV. 166. n. 661. — Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 346. — Link 1821. En. I. p. 208; 1829. Hdb. I. p. 418. — Kunth 1823. Syn. II. p. 268; 1838. Berol. II. p. 18. (legitimar.) — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 150. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 219. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 34; 1844. Rumel. II. p. 61. Sect. (1844): Euerythraea, Spicaria, Xanthaea. — D. Don 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 529. — Koch 1837. Syn. p. 492. Ed. II. p. 566. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 646. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614. — Webb . . . . Canar. III. p. 19. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 483.
Willd. 1809. Enum. p. 247: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gaud. 1828. Helv. II. p. 7. 135.
Schrank 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 78. Char. emend.
Lois. 1817. Dict. v. 8. p. 596: sect. Chironiae.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 337 (p. 334 *Erythaea*): g. Gentianar. verar.
G. L. E. Schmidt 1828. Diss. de Erythraea. (Berol. 8.)
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3496; 1831. Fl. exc. p. 421: g. Chironiear. Sect. (1831): Xanthaea, Erythraea. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3543. p. 602; 1841. Ench. p. 302. Sect.: Erythraea, Xanthea. — Brongn. 1843. En. genr. p. 54. — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 363. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 419.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 203: g. Chironiar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 132. n. 5089: g. Erythraeariar.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 136; 1845 in DC. Pr. IX. p. 57: g. Erythraeacear. Sect.: Euerythraea, Trichostylus, Spicaria, Xanthaea. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 11. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 49.
Synon. Πικριον Ren.; Centaurium minus Tourn.; Centaureum Rupp.; Centaurion Adans.; Gentiana Medic.; Centaurium Mönch; Hippocentaurea Schult.

Erythraea Rchb. 1831. Fl. exc. p. 422: sect. Erythraeae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3543 *a.* p. 603; 1841. Ench. p. 302.
= Euerythraea Griseb. etc.

Erythraeaceae Griseb. 1839. Gent. gen. et spec. p. 69. 135. trib. Gentianear. Gen.: Erythraea, Zygostigma, Orthostemon, Canscora, Cicendia, Schübleria, Apophragma, Sebaea. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169). Gen. ead. et Lagenias, Belmontia.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5: sect. Gentianear. verar. Gen. ead.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 54: div. Chlorear. Gen.: Belmontia, Exochaenium, Schubleria, Apophragma, Erythraea, Cicendia, Microcala, Orthostemon, Pladera, Canscora, Slevogtia, Enicostema, Coutoubea, Schultesia, Ixanthus, Chlora.

Erythraeariae Rchb. 1837. Handb. p. 210: sect. Chironiear. Gen.: Erythraea, Canscora, Orthostemon; Sabbatia, Chlora, Dejanira, Schultesia, Lisianthus, Irlbachia, Helia, Coutoubea, Prepusa; Centaurella; Cicendia, Voyra, Exacum, Slevogtia, Chironia; Agathodes, Fraseria, Halenia; Crawfordia, Tachia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 132. Gen. ut antea et Xanthaea, Zygostigma, Urananthus, Leianthus, Omphalostigma, Tachiadenus, Leiothamnus, Hippion, Henicostema?, Plocandra, Orphium, Tripterospermum?

*) ἐρυθρός, ruber.

Erythranthe Spach 1840. Hist. vég. phan. IX. p. 312: nov. g. Gratiolear. (Mimulus cardinalis Benth.)
= Mimulus Linn.

Erythranthe Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 490: sect. Mercurialis. (M. alternifolia Lam.)

Erythranthus „Oersted mss." Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 209: nov. g. Hypocyrtear. (E. coriaceus.)

Erythremia Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 445: nov. g. Hieraciear. (E. grandiflora.)
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 485: sect. Lygodesmiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 693.
Endl. 1842. Spl. II. p. 50. n. 3005 $b/_1$ (*Erytheremia*): sect. Prenanthis.

Erythrina*) Linn. 1737. Gen. p. 216. n. 571; 1737. Cliff. p. 354; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 207; 1753. Sp. II. p. 706; 1759. Syst. ed. X. p. 1155. n. 762; 1763. Sp. ed. II. p. 992; 1764. Gen. ed. VI. p. 366. n. 855; 1767. Syst. ed. XII. p. 473: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 534; 1784. Syst. p. 642. — Reich. 1778. Gen. p. 366. n. 926. — Lour. 1790. Coch. II. p. 427. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 486. n. 1163. — Gmel. 1791. Syst. p. 1087. — Pers. 1797. Syst. p. 680; 1807. Ench. II. p. 279. n. 1677. — Willd. 1800. Sp. III. p. 912. n. 1322; 1809. En. p. 742. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 92. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 14. t. 219. 220; 1832. Ind. III. p. 249. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 190.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 130. n. 536: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 433. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 96.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 309. — Juss. 1789. Gen. p. 356. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 403; 1807. Mém. Inst. I. p. 17. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 225. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 751; 1826. Syst. III. p. 243. n. 2553; 1831. Gen. II. p. 582. n. 2856. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 269. — Link 1822. En. II. p. 221.
Hill 1769. Ht. kew. p. 284: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 35. n. 1346: g. Cyteophytor.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 410. — Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3956. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — Link 1831. Hdb. II. p. 178. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 370. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 354. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 149. — Meisn. 1837. Gen. p. 93 (66). —

*) ἐρυθρός, ruber. (Ἐρυθρῖνος Veterum est piscis.)

Erythrina Linn. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 131. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 449.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 260: g. Euphaseolear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 281.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Erythrinear. — Par. Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 532. — Endl. 1841. Gen. n. 6667. p. 1295; 1841. Ench. p. 672. Sect.: Xiphanthus, Corallodendron. — Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5823. Sect.: Erythrina, Corallodendron. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 420. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 206. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 557.
Synon. Corallodendron Tourn.; Coral Dill.; Mouricou Adans.; Xyphanthus Rafin.

Erythrineae Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: subtrib. Phaseolear. Gen.: Butea, Erythrina, Mucuna. — Par. Endl. 1841. Gen. p. 1294; 1841. Ench. p. 671. Gen. ead. et Wenderothia, Strongylodon, Rudolphia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. Gen. ead. (exclusa Wenderothia.) — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 271. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 149: sect. Glycinear. Gen. ut Endl.

Erythrobalanos Spach 1842. Hist. vég. phan. XI. p. 160: sect. Quercus. (Q. Phellos, aquatica, etc.)
Endl. 1847. Spl. IV. p. 24. n. 1845 *A III* (*Erythrobalanus*): sect. Esculi. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 381.

Erythrobalanus Endl. vid. *praeced.*

Erythroblepharum „Steud." Schlechtend. vid. *Elytroblepharum Steud.*

Erythrobulbus Plukenett 1700. Mant. 70.
= Wachendorfia Burm. (Vahl Enum. II. p. 163.)

Erythrocarpus Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 604: nov. g. Crotonear.
= Gelonium Roxb.

Erythrocarpus Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 133. 204: nov. g. Modeccear. (Modecca populifolia Bl.)
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 703: subg. Modeccae.
= Modeccae Lam. pars.

Erythrochaete Sieb. & Zuccar. 1846. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. IV. 3. p. 188: nov. g. Compositar. (Arnica japonica Thunb.) *Cf.* Flora 1847. II. p. 727.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 425: g. Eusenecionear.

Erythrochilus Reinw. 1823. Cat. hort. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Dioeciae.
Reinw. 1823. Isis p. 317; 1825. Syll. Ratisb. II. p. 6 (*Erythrochylus*): g. Tricoccar.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 614 (*Erytrochilus*): g. Crotonear.
= Claoxylon A. Juss.

Erythrochiton Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 165: nov. g. Fraxinellar.

DC. 1824. Pr. I. p. 732: g. Cuspariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5143; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 197. n. 7529. — Bartl. 1830. Ord. p. 389. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 359. — Endl. 1840. Gen. n. 5992. p. 1152; 1841. Ench. p. 611. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 421. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 410.

A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 425: g. Diosmear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 62 (45). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 83.

Planch. 1853. Ann. sc. nat. 3e sér. XIX. p. 75. Char. emend.

Erythrochiton Griff. 1846. Proc. Linn. soc. Febr.; 1846. Gardn. Chron. Nr. 6: nov. g. Ternströmiacear. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 656 et Duchartre Rev. bot. II. p. 330.

Hook. f. 1846. Ann. and Mag. XVII.

Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 122: g. Ternströmiaceis aff.

Erythrochylus Reinw. vid. *Erythrochilus Reinw.*

Erythrocistus Dunal 1824 in DC. Prodr. I. p. 264: sect. Cisti. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 114. — Rchb. 1828. Consp. p. 190. n. 4916 *b.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 298. — Koch 1836. Syn. p. 79. Ed. II. p. 85. — Endl. 1839. Gen. n. 5028 *d.* p. 904; 1841. Ench. p. 467. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 238. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 230. — Gren (& Godr.) 1848. France I. p. 162.

Synon. Cistus Spach.

Erythroclathrus Liebm. 1837 in Kröyer's Nat. Tidskr. II. 2. p. 173: nov. g. Algar.

= Cruoria Fries et Hildenbrandtiae sp. (Kütz. Sp. Alg.)

Erythroclonium Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 691: nov. g. Chondriear. (E. Mülleri et angustatum.)

Erythrococca Benth. 1849. Niger-Fl. p. 506: nov. g. Acalyphear. (Adelia anomala Poir.)

Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 369: g. Crotonear.

Baill. 1858. Euphorb. p. 437: g. Dysopsidear.

Erythrodanum Petit-Thouars . . . . Fl. Trist. d'Ac. p. 41. t. 10. f. 11.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 86: g. Coffeariae.

= Nertera Banks.

Erythrodes Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 410: nov. g. Orchidear.

Endl. 1837. Gen. p. 214. n. 1563: g. Neottiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2130.

= Physurus Rich.

Erythrodrosum Schott 1851. Oestr. Prim. p. 11: subsect. Auriculastri. (Primula villosa Wulf., etc.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 464.

Erythrogalium DC. 1830. Prodr. IV. p. 603: subsect. Eugalii.

Endl. 1838. Gen. n. 3100 *i.* p. 523; 1841. Ench. p. 271: sect. Galii. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 457.

Erythrogyne Visiani 1845 in Gasparr. Ricerche p. 86: nov. g. a Ficu distinctum. (F. lutescens Desf.)

Endl. 1847. Spl. IV. p. 35. n. 1859 *C:* sect. Ficus. — Simil. Miq. 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 453. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 723.

Erythrolaena Sweet . . . . Brit. fl. gard. II. t. 134.

DC. 1837. Pr. VI. p. 657: g. Carduinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2888. p. 478; 1841. Ench. p. 247. — Meisn. 1839. Gen. p. 225 (140). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 36. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.

Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3904: g. Cirsiear.

Erythronium*) Linn. 1737. Gen. p. 91. n. 262; 1737. Cliff. p. 119; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 82; 1753. Sp. I. p. 305; 1759. Syst. ed. X. p. 980. n. 375; 1762. Sp. ed. II. p. 437; 1764. Gen. ed. VI. p. 165. n. 414; 1767. Syst. ed. XII. p. 241. n. 410: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 241. — Murr. 1774. Syst. p. 269; 1784. Syst. p. 325. — Reich. 1778. Gen. p. 167. n. 447. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 220. n. 562. — Gmel. 1791. Syst. p. 546. — Pers. 1797. Syst. p. 346; 1805. Ench. I. p. 360. n. 796. — Willd. 1799. Sp. II. p. 96. n. 632; 1809. En. p. 365. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 223. — MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 263. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 468. 501.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 290: g. Liliacear. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28. — Scop. 1777. Intr. p. 83. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 119. — Hedw. 1806. Gen. p. 244. n. 991. — DC. 1815. Franç. V. p. 313. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 232; 1825. Syst. II. p. 64. n. 1211; 1830. Gen. I. p. 269. n. 1400. — Lois. 1819. Dict. v. 15. p. 277. — Link 1821. En. I. p. 323. — Juss. 1823. Dict. v. 26. p. 414. — Lindl. 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1786. — Endl. 1837. Gen. n. 1090. p. 139; 1841. Ench. p. 82. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1156.

Gmel. 1747. Sibir. I. p. 39: g. Lilior. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 45.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 72. n. 302: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 106.

---

*) Nomen ex Dioscoride et Plinio: *ἐρυθρόνιον*, s. *ἐρυθραικόν*.

Erythronium Linn. cont.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294.
Hill 1769. Ht. kew. p. 355: g. Hexapetalar. incompletar.
Neck. 1790. El. III. p. 177. n. 1528: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 167: g. Gloriosar.
Batsch 1802. Tab. p. 141: g. Tulipacear. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XXX. 372. — Link 1829. Hdb. I. p. 179. — Bernh. 1835. Flora II. p. 597. — Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1753. — Meisn. 1842. Gen. p. 401 (305). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 20. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 381. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 133.
DC. 1805. Franç. III. p. 197: g. Colchicacear.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 231: g. Uvularear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 166: g. Coronariar. — Par. Ledeb. 1830. Alt. II. p. 37.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1350; 1830. Fl. exc. p. 102: g. Methonicear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Liliear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 129.
Bartl. 1830. Ord. p. 51: g. Colchicaceis aff.
Koch 1837. Syn. p. 709. Ed. II. p. 818: g. Asphodelear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 216: g. Tulipear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 257. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 204.
Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 213: g. Hyacinthear.
Synon. Dens canis Tourn.; Mithridatium Adans.

Erythropaleae Hasskarl 1848. Pl. jav. rar. p. 193: subordo Cucurbitacear. Gen.: Erythropalum.
Planch. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 260. Gen. id.

Erythropalla Hasskarl vid. *seq.*

Erythropalum Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 921; 1828. Fl. jav. Praef. p. VII *(Erythroropalum)*: nov. g. Cucurbitacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 274. — Endl. 1839. Gen. n. 5148. p. 940; 1841. Ench. p. 491 (penitus dubium). — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 291 *(Erythropalla)*. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 21. 110. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
DC. 1828. Pr. III. p. 303: g. Cucurbitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2751; 1841. Nom. p. 101. n. 3968. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 29. — Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 187.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 531. n. 2621: g. Monadelph. Pentandr.
Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 193: g. Erythropalear. — Par. Planch. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 260. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 704.
Synon. Mackaya Arnott; Balingayum Blanco? (Planch.)

Erythrophila „E. Meyer mss." Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 258: nov. g. Flacourtianear.? (E. undulata.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 85. n. 5598/$_1$: g. Sapindear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 411. — Meisn. 1843. Comm. p. 346. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.

Erythrophlaeum „R. Br." Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4163 *b:* sect. Gagnebinae.
Endl. 1841. Gen. n. 6818. p. 1323; 1841. Ench. p. 682: g. Parkiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6120.
Walp. 1842. Rep. I. p. 925: g. Acaciear. = seq.

Erythrophleum*) „Afz." R. Brown 1818. Tuckey's Congo p. 430 (Verm. bot. Schr. I. p. 194): g. Caesalpinear.
R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 235 (Verm. bot. Schr. IV. p. 53): g. Mimosear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 417. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 423. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 49. — Meisn. 1837. Gen. p. 96 (69).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Parkiear.
Synon. Erythrophlaeum Rchb.

Erythropogon DC. 1837. Prodr. VI. p. 254: nov. g. Helichrysear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2754. p. 449; 1841. Ench. p. 243. — Meisn. 1839. Gen. p. 219 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3483. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27: g. Gnaphaliear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 38.
Synon. Metalasiae, Xeranthemi, Argyrocomae sp. Auct.

Erythropsis Lindl. . . . Bot. Regist. n. 1239.
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 33: g. Sterculiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 31 (25).
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 517: g. Sterculiacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Brachychitonear.
Endl. 1840. Gen. n. 5320 *l.* p. 994; 1841. Ench. p. 516: sect. Sterculiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7699. II.
R. Brown 1844 in Horsf. pl. jav. rar. pt. 3. p. 235: sect. Firmianae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 104. — Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. 5321/$_2$ *b.*

Erythrorchis Blume 1835. Rumphia I. p. 200: nov. g. Vanillear. (Cyrtosia altissima Bl.) — Par. Lindl. 1840. Orchid. p. 438. — Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2187. — Meisn. 1842. Gen. p. 384 (287).
Endl. 1841. Spl. I. n. 1612/$_1$. p. 1368; 1841. Ench. p. 114: g. Arethusear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 720.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Vanillidar.

*) φλοιός, cortex (?); φλέω, fluo·

Erythrorhiza Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 34. t. 36: nov. g. (Ericaceum) Monadelph. Pentandr. (Galax aphylla L.) *Cf.* Steud. Nom. I. p. 597 *(Erythrorrhiza).*

Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 150. t. 210.

Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 279: g. Ericinear.

Galax Linn.

Erythroropalum*) Blume vid. *Erythropalum Blume.*

Erythrorrhiza Steud. vid. *Erythrorhiza Michx.*

Erythrospermeae DC. 1824. Prodr. I. p. 257: trib. Flacourtianear. Gen. unicum: Erythrospermum. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 293. Gen. id. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). Gen. id. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 133. Gen. id.

Rchb. 1828. Consp. p. 190: div. Bixacear. Gen.: Melicytus, Erythrospermum. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 273; 1841. Nom. p. 189. Gen.: Erythrospermum.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50: trib. Flacurtiacear. Gen. id.

Bartl. 1830. Ord. p. 280: div. Flacourtianear. Gen. id.

Endl. 1839. Gen. p. 922; 1841. Ench. p. 479: trib. Bixacear. (ampliata.) Gen.: Kigellaria, Erythrospermum, Tachibota?

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: trib. Flacourtiacear. Gen. ead.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 640: div. Flacourtiacear. Gen. ead.

Erythrospermum Lamarck 1791. Illustr. t. 274.

Pet.-Thouars 1807. Vég. îl. Afr. IV. p. 65. t. 21: g. Passiflorae aff. — Par. R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 439. (Verm. bot. Schr. I. p. 217.)

Poir. 1811. Dict. Suppl. II. p. 584.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 823: g. Hermanniear.

Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 280: g. Berberideis aff.?

DC. 1824. Pr. I. p. 257: g. Erythrospermear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 190. n. 4918; 1837. Hdb. p. 273; 1841. Nom. p. 189. n. 7197. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 280. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 293. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 137. — Endl. 1839. Gen. n. 5083. p. 922; 1841. Ench. p. 479. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 167. n. 1395; 1830. Gen. I. p. 295. n. 1523: g. Flacourtiear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1224. 1225.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX: g. Flacourtianear.

Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 364; 1857. ibid. VIII. p. 253: g. Laetiear.?

Erythrostemon Klotzsch in Link, Kl. &. O. Ic. pl. rar. h. Berol. II. t. 39.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555: g. Eucaesalpiniear.

= Poincianae Linn. sp. (Walp. Rep. I. p. 810.)

Erythrostictus Schlechtend. 1826. Linnaea I. p. 90: nov. g. Melanthiacear. (Melanthium punctatum Cav.)

Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1302: g. Heloniear.

Bartl. 1830. Ord. p. 52: g. Colchicacear.

Schult. 1830. Syst. VII. p. XCVII. 1524: g. Melanthacear.

Endl. 1837. Gen. n. 1070. p. 135; 1841. Ench. p. 79: g. Veratrear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 404 (308). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 235. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199.

Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1702: g. Melanthear.

Kunth 1843. Enum. IV. p. 154: g. Melanthiear.

Erythrostigma Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 45: nov. g. Cassuviear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 349.

Endl. 1843. Spl. III. p. 100. n. $5915/_1$: g. Anacardiacear. — Par. Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 246. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.

Walp. 1846. Rep. V. p. 415: g. Anacardiear.

Erythrotrichia Aresch. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 132; 1850. Nov. Act. Ups. XIV. p. 435: nov. g. Confervear. (Conferva ceramicola Lyngb.)

= Goniotrichum Kütz.

Erythroxylaceae A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 254. Gen.: Erythroxylum.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 391: ordo Sapindalium. Gen.: Erythroxylon.

Erythroxyleae HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 175: ordo novus a Malpighiaceis segregatus. Gen.: Erythroxylum, Sethia. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 189. *Cf.* Isis 1825. p. 894.

DC. 1824. Pr. I. p. 573: ordo (38) Thalamiflorar. Gen. ead. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 630. Gen. ead.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 589: ordo Trihilatar.

Rchb. 1828. Consp. p. 189; 1832. Fl. exc. p. 704: subdiv. Sauvagesear. Gen. ut Kunth.

Bartl. 1830. Ord. p. 361: ordo (211) Malpighinar. Gen. ead. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40). Gen. ead.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 48: fam. Sapindariear. Gen. ead.

Link 1831. Hdb. II. p. 339: ordo 18 Allostemonum. Gen.: Erythroxylon.

Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo ad Malpighiaceas accedens.

Spach 1834. Vég. phan. III. p. 73: fam. (36) Malpighinear. Gen. ut Kunth.

---

*) ῥόπαλον, clava.

Erythroxyleae HBK. cont.
Mart. 1835. Consp. p. 51; 1843. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. III. p. 319: fam. Malpighinar. Gen. ut Link.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 422.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298; 1841. Nom. p. 206: div. Caryophyllacear. Gen. ut Kunth.
Endl. 1840. Gen. p. 1065; 1841. Ench. p. 559: ordo Acerum. Gen. unicum: Erythroxylum.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 86: fam. Hesperidear. Gen. id.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 422. Gen. id.

Erythroxylon Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1035. 1369. n. 1137; 1762. Sp. ed. II. p. 612; 1764. Gen. ed. VI. p. 228. n. 575; 1767. Syst. ed. XII. p. 315. n. 571: g. Decandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 357; 1784. Syst. p. 427. — Reich. 1778. Gen. p. 234. n. 625. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 307. n. 783. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 61. t. 88. — Pers. 1797. Syst. p. 458; 1805. Ench. I. p. 508. n. 1130. — Willd. 1799. Sp. II. p. 746. n. 906. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 390. n. 1710.
Gled. 1764. Syst. p. 139. n. 585: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 285: g. Columniferar.
Cavan. 1789. Diss. VIII. p. 399. t. 225—233. Injunguntur Roëlana et Venelia Comm.
Neck. 1790. El. II. p. 430. n. 1257: g. Comizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
Cram. 1803. Disp. p. 159 in Monadelph. Decandr.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 671: g. Berberidear.
Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 282: g. Malpighiacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 377. n. 1900: g. Erythroxylear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 340. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1584. — Mart. 1843. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. III. p. 283.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 391: g. Erythroxylacear.
Synon. Erythroxylum P. Browne, Adans., etc.

Erythroxylon Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4906b; 1837. Hdb. p. 298; 1841. Nom. p. 206. n. 7838: g. Erythroxylear. restrict. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 630. — Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40).
Endl. 1840. Gen. n. 5597 *a*. p. 1066; 1841. Ench. p. 559: sect. Erythroxyli.
= Erythroxylum Kunth.

Erythroxylum P. Browne 1756. Jamaic. p. 278: g. Monadelph. sect. 3.
Adans. 1763. Fam. II. p. 166: g. Vaccinior.
Jacq. 1763. Amer. p. 134. t. 87: g. Decandr. Trigyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 725. — Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 861. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 449.
Juss. 1789. Gen. p. 253: g. Malpighiis aff.

Erythroxylum P. Browne cont.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 140: g. Malpighiaceis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 21. — Hedw. 1806. Gen. p. 332. n. 1310. — Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 482 (*Erithroxylum*).
St. Hil. 1829. Fl. Bras. II. p. 92: g. Erythroxylear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5597. p. 1066; 1841. Ench. p. 559. Sect.: Erythroxylon, Sethia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 86.
A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 254: g. Erythroxylacear.
= Erythroxylon Linn.

Erythroxylum HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 176: g. Erythroxylear., disjuncta Sethia restrict. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 190. — DC. 1824. Pr. I. p. 573. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 362. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 74.
Synon. Venelia Comm.; Roelana Comm.; Steudelia Spreng.; Erythroxylon Rchb., etc.

Erythrus Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 526: sect. Erythracanthi. (Spec. amer.)

Erytrochilus Blume vid. *Erythrochilus Reinw.*

Erytrochiton „Griff." Bot. Zeit. 1846. p. 656: vid. *Erythrochiton Griff.*

Escalloneae R. Brown 1823. Narr. journ. Franklin p. 766 (Verm. bot. Schr. I. p. 545): ordo plant. Gen.: Escallonia, Anopterus.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 192: ordo (119) Calyciflorar. Gen. Escalloniear. DC.
= Escallonieae Agdh.

Escallonia*) „Mutis" Linn. f. 1781. Suppl. p. 21. n. 1372: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 242. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 152. n. 386. — Gmel. 1791. Syst. p. 418. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1149. n. 439. — Pers. 1797. Syst. p. 253; 1805. Ench. I. p. 234. n. 522.
Juss. 1789. Gen. p. 321: g. Onagrar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 77. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 706. (descisc.)
Neck. 1790. El. II. p. 144. n. 836: g. Coryphophytor.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 16. t. 182.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 156: g. Onagrariar., Myrteis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 155. n. 665: g. Ericear.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 234: g. Ericear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXV. 325. n. 956. — Kunth 1823. Syn. II. p. 335. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 793. n. 882.
Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 286: g. Ericinear.
R. Brown 1823. Narr. journ. Frankl. p. 766: g. Escallonear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 364. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 192.

*) Dicat. detectori Escallon, Hispano.

Escallonia Mutis cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4249; 1837. Hdb. p. 233; 1841. Nom. p. 160. n. 6250: g. Escalloniear. (genuinar.) — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 189. n. 958. — Bartl. 1830. Ord. p. 426. — DC. 1830. Pr. IV. p. 2. — Presl 1831. Rel. Hänk. II. 1. p. 47. Sect.: Escallonia, Stereoxylum. — A. St. Hil. 1833. Fl. Bras. III. p. 85. t. 181. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 29. — Meisn. 1838. Gen. p. 137 (101). — Endl. 1839. Gen. n. 4674. p. 822; 1841. Ench. p. 410. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 835. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 108. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 32.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37: g. Escalloniacear. — Par. Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 27; 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1900; 1847. Veg. kd. p. 752.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 8. t. 13. 14.
Synon. Stereoxylon Ruiz & Pav.; Vigiera Fl. Flum.

Escalloniaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35. 37: fam. Saxifragariear. Gen.: Escallonia, Anopterus, Itea.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 27; 1847. Veg. kd. p. 752: ordo Grossalium. Gen.: Escallonia, Quintinia, Choristylis, Forgesia, Anopterus, Itea, Carpodetus.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 424. Gen. ead. (Polyosma loco Carpodeti.)
Conf. Escallonieae Agdh.

Escallonieae Agardh 1825. Class. plant. p. 19; 1826. Isis p. 592: ordo Calycanthemar.
Rchb. 1828. Consp. p. 161: div. Ribesiacear. Gen.: Aristotelia, Escallonia, Anopterus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. Subdivis: *genuinae* (gen. ut Endl. 1841), Argophylleae, Rousseaceae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (44) Calyciflorar. syncarpar.
Bartl. 1830. Ord. p. 425: ordo (255) incertae sedis. Gen.: Escallonia, Anopterus.
DC. 1830. Pr. IV. p. 2: trib. Saxifragacear. Gen.: Escallonia, Quintinia, Forgesia, Anopterus, Itea. — Par. Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 47. Gen.: Escallonia. — A. DC. Mon. Camp. p. 92. Gen. ut DC. — Meisn. 1838. Gen. p. 137 (101). Gen. ead.
Lindl. 1833. Nix. p. 14: ordo Grossalium.
Mart. 1835. Consp. p. 47: ordo 222.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 5. 29: trib. Cunoniacear. Gen. ut DC. et Cyrilla. *Cf.* Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 258.
Rchb. 1837. Hdb. p. 233: div. Cactear. Gen. ut DC.
Endl. 1839. Gen. p. 822; 1841. Spl. I. p. 1417; 1841. Ench. p. 410: subordo Saxifragacear. Gen. ut DC. Accedunt 1841 (l. c.) Polyosma et 1843 (Spl. III. p. 84) Choristylis. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 590. Gen.: Itea.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 108: trib. Saxifragear. Gen.: Escallonia, Itea.
Synon. Escalloneae R. Brown; Escalloniaceae Lindl.

Eschara Tourn. 1700. Inst. p. 577: g. pl. class. XVII.
= ?

Eschenbachia*) Mönch 1794. Meth. p. 573: nov. g. Petalostemonis. (Erigeron aegyptiacum L.)
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2543: g. Erigerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 139: g. Asterear.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 206: sect. Erigerontis.
= Dimorphanthes Cass. pt.

Eschholtzia „Cham." Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4848: g. Bocconiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 261: g. Papaveracear.
= Eschscholzia Cham.

Eschholzia Spreng. vid. *Eschscholzia Cham.*

Escholtzia Dumort., Brongn. vid. *praeced.*

Eschscholtzia Bernhardi 1838. Linnaea VIII. p. 464: g. Hunnemanniear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4827. p. 857; 1841. Ench. p. 443. — Walp. 1842. Rep. I. p. 116. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 455. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 175.
Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 34: g. Papaveracear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 285. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 431.
Rchb. 1837. Hdb. p. 264: g. Chelidoniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 184. n. 7071: g. Eschscholtziear.
= Eschscholzia Cham.

Eschscholtzieae Rchb. 1841. Nom. p. 184: sect. Chelidoniear. Gen.: Eschscholtzia, Hunnemannia, Dendromecon.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 455: trib. Papaveracear. Divis.: Hunnemannieae, Platystemoneae.

Eschscholzia**) Chamisso 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 73. t. 15; 1826. Linnaea I. p. 553: nov. g. Papaveracear. *Cf.* Flora 1821. II. p. 518 et Spreng. N. Entd. II. p. 309 (*Eschholzia*). — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 137. — Meisn. 1837. Gen. p. 7 (9). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 94 (*Escholtzia*).
DC. 1828. Pr. III. p. 344 (sph. *Eschsholzia*): g. Loasear.?
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 52 (*Escholtzia*): g. Cheliodoniear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 451. n. 2226: g. Papaverear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 47: g. Hunnemanniear.
Cf. Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 63. 664: *Chryseis.*
Synon. Eschholtzia Rchb.; Eschscholtzia Bernh.; Chryseis Lindl.

Eschsholzia DC. vid. *praeced.*

Eschweilera***) „Martius mss." DC. 1828. Prodr. III. p. 293: nov. g. Lecythidear. (An potius Lecythidis sectio?) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 175. n. 4650. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — Bartl.

*) Dicat. J. Fr. Eschenbach, botanico Lipsiensi.
**) Dicat. itineris socio Doctori Eschscholz.
***) Dicat. Fr. G. Eschweiler, prof. Ratisbon.

Eschweilera Mart. cont.
1830. Ord. p. 332. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 874. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 106. — Meisn. 1838. Gen. p. 109 (78). — Endl. 1841. Ench. p. 651. n. 6332/1. (*Cf.* Endl. Gen. p. 1235 ad n. 6332.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 740: g. Lecythidacear.

Escobedia*) Ruiz & Pavon 1794. Prodr. p. 91. t. 18: nov. g. Didynam. Angiosperm. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 152. n. 1459.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 371. t. 174: g. Scrophularinar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 128.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 892: g. Personatar. anomalar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 808. n. 2185; 1831. Gen. II. p. 493. n. 2430: g. Scrofularinar.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 321: g. Rhinanthear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 172.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3186: g. Antirrhinear.
Schltd. 1830. Linnaea V. p. 108; 1833. VIII. p. 246.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5; 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 202: g. Gerardiear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 561. — Endl. 1839. Gen. n. 3990. p. 690; 1841. Ench. p. 340. — Meisn. 1840. Gen. p. 308 (219). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4527. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 362. 535. — Walp. 1845. Rep. III. p. 377. 969.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111: g. Buchnerear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Digitalear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 336; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Escobediear.
Synon. Silvia Vell.

Escobedieae Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 336; 1847 in Lindl. Veg. kingd. p. 684: trib. Antirrhinidear. Gen.: Escobedia, Physocalyx, Melasma, Alectra. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 458. Gen. ead.

Esculus**) Linn. 1737. Gen. p. 109. n. 310; 1737. Ht. Cliff. p. 142; 1742. Gen. ed. II. p. 157. n. 367; 1748. Upsal. p. 92: g. Heptandr. Monogyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126: g. Thalamostemonum.
Aesculus Boerh.

Esculus Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 24. n. 1845 *A**: subsect. Lepidobalani. Sect.: Robur, Elaeobalanus, Erythrobalanus, Cerris, Gallifera. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 380.

Esenbeckia***) HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 246. t. 655: nov. g. Diosmear. (E. pilocarpoides.) — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 251. — A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 486. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 80. t. 232—234. — Meisn. 1837. Gen. p. 63 (45). Sect.: Polembryum, Colythrum.
Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5152; 1841. Nom. p. 196. n. 7498: g. Pilocarpear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 388. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 343. — Endl. 1840. Gen. n. 5997. p. 1153; 1841. Ench. p. 612. — Walp. 1842. Rep. I. p. 501. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 42. t. 128: g. Rutacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 831.
Schott 1834. Fragm. bot. Rutac. p. 9. t. 5. Disjungitur Colythrum.
Synon. Evodia St. Hil.; Colythrum Schott; Polembryum A. Juss.?

Esenbeckia Blume 1825. Bijdr. Nr. 3. p. 118: nov. g. Tiliacear. *Cf.* Linnaea I. p. 659. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 556.
Meisn. 1837. Gen. p. 36: g. Tiliear. (serius *Cotylephora.*)
Neesia Blume.

Esenbeckia Brid. 1827. Bryol. II. p. 753: nov. g. Pleurocarpor. peristomor. (p. XLVI g. Brachypodum).
Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 549: g. Fontinaloideor.
= Cyrtopus Brid.

Èsera Necker 1790. Elem. bot. II. p. 160. n. 859: nov. g. Catotaphytor., a Drosera L. sejunctum.
Ergaleium DC.?

Esexuales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 36: class. V. plant. Nixus: Filicales, Lycopodales, Muscales, Charales, Fungales.

Esmarchia*) Rchb. 1832. Fl. exc. p. 793: g. Stellarinar. (Sagina cerastoides Sm.)
Spach 1846. Vég. phan. V. p. 205 (*Esmarckia*): g. Alsinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Saginear.
Rchb. 1841. Icon. fl. germ. V; 1841. Nom. p. 205. n. 7802: g. Cerastiear.
. Orthodontis Ser. pars.

Esmarckia Spach vid. *praeced.*

*Esmatacanthae***) Rchb. 1841. Nomencl. p. 109: sect. Acanthear. Divis.: Acantheae genuinae, Hygrophileae, Ruellieae, Barlerieae, Justicieae, Dicliptereae, Andrographideae.
= Echmatacanthi Nees.

Esopon Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 146.
= Nabalus Cass.

Espadaea A. Rich. . . . . Pl. vasc. Cub. XI. p. 147: nov. g. Verbenacear. (E. amoena.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 704.

Espejoa***) DC. 1836. Prodr. V. p. 660: nov. g. Euheleniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2595. p. 422; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 206 (133).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18: g. Heleniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3188. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

*) Dicat. G. Escobedo, botanico hispano.
**) Nomen a Veteribus desumtum.
***) Dicat. fratribus Nees ab Esenbeck.

*) Dicat. H. P. Ch. Esmarch, auctori florae Sleswic.
**) *ἴσμα*, petiolus.
***) Dicat. navigatori Ant. de Espejo.

Espeletia „Mutis mss.“ Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 10. t. 70—72: nov. g. Corymbiferar.
Cass. 1819. Dict. v. 15. p. 327; 1825. v. 38. p. 17: g. Coreopsidear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2608.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 280: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 504. — Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 624. n. 2868; 1831. Gen. II. p. 643. n. 3226: g. Radiatar.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 319: g. Silphiear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 516. — Endl. 1838. Gen. n. 2476. p. 402; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 197 (129). — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3024. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21: g. Milleriear.
Synon. Espletia Steud.

Espeletia Nuttall 1834. Journ. Ac. Philad. VII. p. 39.
= Artorhiza Nutt.

Espera*) Willd. 1801. Schr. nat. Fr. Berl. III. p. 449: nov. g. Polyandr. Monogyn.
DC. 1824. Pr. I. p. 517: g. Tiliacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 603. n. 1943; 1830. Gen. I. p. 436. n. 2160. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 557. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4. (?) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 211. 262.
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5454: g. Tiliear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 37 (28).
Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Tiliariar. genuinar.
= Berrya Roxb.

Espera Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 111 (*cf.* Flora 1845. p. 102): nov. g. Corallinear. (Zoosporear.)
Endl. 1843. Spl. III. p. 18. n. 51: g. Enhalymedear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19: g. Halymedidar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 506. n. 321: g. Codiear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Halimedear.

Espinosa Lagasca 1816. Gen. et spec. p. 14: nov. g. Polygonear. (E. verticillata.) — Par. Juss. 1826. Dict. v. 42. p. 346.
= Eriogonum Rich.

Espletia Steud. Nomencl. ed. I.
= Espeletia Mut.

Esterhazia Bartl. 1830. Ord. p. 186: g. Bignoniacear.
Cham. 1833. Linnaea VIII. p. 25: g. Scrofularinear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 560: g. Gerardiear.
= seq.

*) Dicat. Eug. Joh. Chr. Esper, prof. Erlang.

Esterhazya*) Mikan 1820. Delect. fl. Bras. t. 5.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3209: g. Caprariacear.
Benth. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 203: g. Gerardiear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3993. p. 690; 1841. Ench. p. 340. — Meisn. 1840. Gen. p. 308 (219). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4524. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 362. 536. — Walp. 1845. Rep. III. p. 379. 970. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 514; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685.
DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123: g. Bignoniear. minus notum.
Synon. Esterhazia Bartl.; Dargeria Cham.; Lasiostemon Schott; Virgulariae sp. Mart.

Esula**) „Rivin.“ Rupp. 1718. Fl. jen. p. 259. Ed. Hall. 1745. p. 271: g. pl. class. XI.
Pers. 1807. Ench. II. p. 14: sect. Euphorbiae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 630. Ed. II. p. 727. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 138. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 725. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 569. — (Gren. &) Godr. 1855. France III. p. 85. — Baill. 1858. Euphorb. p. 284.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 153. Ed. Schrank 1819. p. 168: g. Dodecandr. Monogyn.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 257: g. Euphorbiacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7329. 2 *b:* subsect. Tithymali.
= Euphorbiae Linn. pars.

Etaballia***) Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 99: nov. g. Bauhiniear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 853; 1846. V. p. 572. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Endl. 1842. Spl. II. p. 98. n. $6788/_1$: g. Caesalpiniear.
Meisn. 1843. Comm. p. 353: g. Cassiear.

Etaeranthis Cassini 1827. Dict. v. 51. p. 62: sect. Stoebes.

Etaeria Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 409: nov. g. Orchidear.
Synon. Platylepis A. Rich.; Aetheria Endl. *Cf. Hetaeria Blume.*

Etericius Desvaux 1825 in Hamilt. Prodr. fl. Ind. occ. p. 28: nov. g. Pentandr. Monogyn. (E. parasiticus.) *Cf.* Steud. Nom. I. p. 599 (*Eteriscus*).
Meisn. 1838. Comm. p. 112: g. Rubiacear.? anomalum.

Eteriscus Steud. Nom. vid. *praeced.*

Ethanium Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 281: nov. g. Zingiberear. (Alpinia racemosa Sw.)
= Alpinia Linn.

Etheiranthus Kostel. 1844. Ind. pl. ht. Prag. p. . . : nov. g. a Muscari Tourn. disjunctum.

Ethionema Brongn. vid. *Aethionema R. Brown.*

*) Dicat. principi Esterhazy.
**) *εὔζωλα* Veterum. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 86.
***) *Etabally* Guianensium.

Ethulia Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1171; 1764. Gen. ed. VI. p. 413. n. 934; 1767. Syst. ed. XII. p. 536: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 612; 1784. Syst. p. 734. — Reich. 1778. Gen. p. 411. n. 1014. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 545. n. 1271. — Gmel. 1791. Syst. p. 1197. — Pers. 1797. Syst. p. 775; 1807. Ench. II. p. 397. n. 1818. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1740. n. 1451; 1809. En. p. 851. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 413.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539.

Gled. 1764. Syst. p. 247. n. 1018: g. Petalostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 128: g. Flosculosar.

Juss. 1789. Gen. p. 184: g. Corymbiferar. (praeced. B. Juss. in Ht. Trian.) — Par. Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 406. — Pet.-Th. 1809. Gen. Madag. n. 39 in Römer Collect. bot. p. 204. — Link 1822. En. II. p. 310.

Neck. 1790. El. I. p. 95. n. 174: g. Siphoniphytor.

Cram. 1803. Disp. p. 173 in Syngenes. Polygam. Necessar.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 548; 1826. Syst. III. p. 458. n. 2717; 1831. Gen. II. p. 617. n. 3062: g. Eupatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2187.

Cass. 1819. Dict. v. 15. p. 487: g. Vernoniear. (emend.) — Par. Less. 1829. Linnaea IV. p. 336; 1832. Syn. p. 148. — Bartl. 1830. Ord. p. 135. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 47. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 8.

Cass. 1819. Dict. v. 15. p. 488; 1828. v. 57. p. 340; 1830. v. 60. p. 586: g. Ethuliear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 12. — Endl. 1838. Gen. n. 2200. p. 357; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 175 (122). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3851. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.

D. Don 1825. Nepal. p. 182: g. Anthemidear.

Synon. Pirarda Adans.; Leighia Scop.; Kahiria Forsk.

Ethulia Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 389. t. 164: g. Tubulosar. (divaricata).

= Epaltes Cass.

Ethulieae Cassini 1819. Dict. v. 15. p. 488; 1828. v. 57. p. 340; 1830. v. 60. p. 586: subdiv. Vernoniear. (Archetypar.) Gen.: Ethulia, Sparganophorus, Xanthocephalum?; Stokesia, Isonema, Piptocoma, Oliganthes et 1830 Herderia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 98. Gen. ut DC.

DC. 1836. Pr. V. p. 10: subdiv. Euvernoniear. Gen.: Adenocyclus, Odontoloma, Oiospermum, Sparganophorus, Ethulia, Herderia. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 356; 1841. Ench. p. 232. Gen. ead. Accedit 1843 (Spl. III. p. 66) Xiphochaeta. — Meisn. 1838. Gen. p. 175 (122). Gen. ut DC.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709: subtrib. Vernoniacear. Gen. ut DC.

Ethusa Linn. 1737. Gen. p. 78. n. 224; 1740. Syst. p. 20; 1742. Gen. ed. II. p. 118. n. 271; 1745. Fl. suec. p. 84: g. Pentandr. Digyn.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 433: g. Umbelliferar.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Umbellatar.

= Aethusa Linn.

Etlingera*) Giseke 1792. Prael. p. 199. 209. 229: nov. g. Scitaminear. (Amomum litorale Kön.)

= Amomi Linn. pars.

Ettlingera Steud. Nomencl. I. p. 599: vid. *praeced.*

Etymocyperus**) Webb 1850. Phytogr. Canar. III. p. 361: sect. Cyperi.

= Eucyperus Gris.

Etymolotus Webb 1846. Phytogr. Canar. II. p. 81: sect. Loti. (L. arenarius Brot., etc.)

= Euloti Ser. pars.

Etymovicia Webb 1846. Phytogr. Canar. II. p. 106: sect. Viciae. (V. sativa L.)

= Euvicia Endl.

Euacacia***) Endl. 1841. Ench. p. 683. n. 6834 *b*: sect. Acaciae.

Synon. Stachychrysum Boj.; Acaciae verae.

Euacaena DC. 1825. Prodr. II. p. 592: sect. Acaenae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 592 (*Eucaena*). — Endl. 1840. Gen. n. 6372 *a*. p. 1244; 1841. Ench. p. 659.

Synon. Acaena Linn.

Euaceras Rchb. f. 1853 in Walp.-Ann. bot. III. p. 581: sect. Aceratis. (A. anthropophora.)

Euachimeneae Oersted 1858. Gesn. centroam. p. 9: div. Achimenear. Gen. Achimenear. Hanst. et Diastemella.

Euaconiopteris Fée 1852. Gen. Fil. p. 52: sect. Aconiopteridis. (A. subdiaphana Presl.)

Eu-Aconitum C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Fl. Alt. II. p. 281: sect. Aconiti. (A. volubile, villosum, ambiguum, Napellus. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 68.

Euacrocentron DC. 1837. Prodr. VI. p. 588: subsect. Acrocentri. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *a* ,*x*. p. 474; 1841. Ench. p. 246.

Euactinostemon Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 532: sect. Actinostemonis.

= Actinostemon Klotzsch.

Euactis Kütz. (1836. Actien) 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 240; 1845. Phycol. germ. p. 189; 1849. Sp. Alg. p. 339. n. 233: nov. g. Rivulariear.

Cf. Brébiss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 475.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 92: sect. Rivulariae.

Synon. Zonotrichia Agdh.

---

*) Dicat. A. E. Etlinger.

**) ἔτυμος, verus, genuinus.

***) εὖ in compositis, bene, genuine.

Euadriania Baillon 1858. Et. Euphorb. p. 406: sect. Adrianiae. (A. tomentosa Gaudich.)

Euaeschynomene Vogel 1838. Linnaea XII. p. 81: sect. Aeschynomenes. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6605 *a.* p. 1283; 1841. Ench. p. 676. — Walp. 1842. Rep. I. p. 732.

Euageratum DC. 1836. Prodr. V. p. 108: sect. Agerati. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2259 *a.* p. 367; 1841. Ench. p. 233.

Euagnus Schauer 1847 in DC. Prodr. XI. p. 683; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 295: sect. Viticis.

Synon. Agnus castus Endl.

Euagrostis Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 436: sect. Agrostidis. (A. alba, vulgaris.) — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 480.

Euaira Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 424: sect. Airae. (A. caryophyllea, praecox, etc.)

= Aspris Adans.

Eualarçonia Endl. 1838. Gen. n. 2495 *a.* p. 406; 1841. Ench. p. 238: sect. Alarçoniae.

Eu-Albizzia Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 18: sect. Albizziae.

Eualchornea Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 446: sect. Alchorneae. (A. latifolia Sw., etc.)

Eualisma Seubert 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 105: sect. Alismae.

Eualopecurus Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 465; 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 461: sect. Alopecuri. — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 381. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 450.

Synon. Alopecurus Palis.

Eualsineae Fenzl 1840 in Endl. Gen. p. 964; 1841. Ench. p. 505: subtrib. Sabulinear. Gen.: Buffonia, Queria, Alsine, Triplateia, Honkeneja, Lepyrodiclis. — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 248. Gen.: Buffonia, Alsine, Honkeneja.

Eualsophila Hook. 1844. Spec. Fil. I. p. 36: subg. Alsophilae.

Synon. Alsophila Presl.

Eualyssum Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 274: sect. Alyssi. — Par. Boiss. 1845. Diagn. pl. or. I. Nr. 6. p. 15.

Euamanoa Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 580: sect. Amanoae.

Euamarantus Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 255: sect. Amaranti. — Par. Ledeb. 1851. Ross. III. p. 855. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1030.

Synon. Amarantus Lam.

Euamarantus Gren. (& Godr.) 1855. Fl. France III. p. 4: subg. Amaranti.

= Amarantus Moq.

Euambrosia Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 290: sect. Ambrosiae. (A. trifida, artemisiaefolia, etc.)

Euamelleae DC. 1836. Prodr. V. p. 213: subdiv. Amellear. Gen.: Amellus, Corethrogyne, Chiliotrichum. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 371; 1841. Ench. p. 233. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125). Gen. ead.

Euamelleae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 954: div. Amellear. Subdivis.: Amelleae legitimae, Cervaneae, Heterothalameae, Achyrobacchariddeae.

Euammannia Endl. 1840. Gen. n. 6146 *a.* p. 1200; 1841. Ench. p. 643: sect. Ammanniae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 101.

Synon. Tritheca et Diplostemon Wight & Arn.

Euamphiroa Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 123: sect. Amphiroae. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 49. n. $122/_{73}$ *a.* — Sond. 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 187. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 700.

Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 85: subg. Amphiroae.

Euamphiscopia Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 356: sect. Amphiscopiae.

Euamygdalus Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 114: sect. Amygdali. (A. communis L.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 908. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 4. 8.

Euanagallis Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 7: sect. Anagallidis. (A. arvensis L.)

Synon. Anagallis Schmidt.

Euanchusa Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 96: sect. Anchusae. — Par. DC. 1846. Pr. X. p. 42. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 117. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 512. *(Euanchusa et Buglossum Griseb.)*

Synon. Anchusa Tausch.

Euandersonia Sonder 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 330: sect. Andersoniae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 432.

Euandira Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 108: sect. Andirae. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6726 *c.* p. 1306; 1841. Ench. p. 673. — Walp. 1842. Rep. I. p. 804.

Euandra Bartl. vid. *Evandra R. Brown.*

Euandryala DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 244: sect. Andryalae. *(Synon. Andryala Roth.)* — Par. Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 411.

= Andryala Linn.

Euaneimia Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 341: sect. Aneimiae. — Par. Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 115.

Euangelica DC. 1830. Prodr. IV. p. 167: sect. Angelicae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 322. — Endl. 1839. Gen. n. 4456 *a.* p. 778; 1841. Ench. p. 379.

Euangiopteris Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 279: sect. Angiopteridis.

Euangströmia C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 426: sect. Angströmiae.

Euanguillaria Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 44: sect. Anguillariae. (A. dioica et monantha.)

Euanguria Schlechtend. 1851. Linnaea XXIV. p. 758: sect. Anguriae.

Euanoplon Endl. 1839. Gen. n. 4189 *a.* p. 727; 1841. Ench. p. 353: sect. Anoplanthi. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 480. — Reut. 1847 in DC. Pr. XI. p. 41.

Euanthe Rchb. vid. *Evanthe Salisb.*

Euanthemideae DC. 1837. Prodr. VI. p. 1: div. Anthemidear. Gen.: Oederia, Eumorphia, Aganippea, Epallage, Anthemis, Maruta, Lugoa, Lyonnetia, Anacyclus, Cyrtolepis, Ormenis, Cladanthus, Lepidophorum, Ptarmica, Achillea, Diotis, Santolina, Nablonium, Lasiospermum. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 429; 1841. Spl. I. p. 1384; 1841. Ench. p. 240. Gen. ead. et (1841) Heliogenes. — Meisn. 1837. Gen. p. 208 (134). Gen. ut DC. et Arrowsmithia?

Synon. Ptarmiceae Rchb.

Euanthemis DC. 1837. Prodr. VI. p. 7: sect. Anthemidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2639 *b.* p. 429; 1841. Ench. p. 241. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 206. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 520.

Synon. Anthemis Cass.

Euanthoceros Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 459 *a.* p. 1337; 1841. Ench. p. 25: sect. Anthocerotis. — Par. Nees 1846. Syn. Hepat. p. 583.

Euantrophyum Endl. 1841. Ench. p. 36. n. 605 *a:* sect. Antrophyi.

Synon. Antrophyum (sect.) Blume.

Euaparine DC. 1830. Prodr. IV. p. 607: subsect. Aparines.

Endl. 1838. Gen. n. 3100 *b.* p. 523; 1841. Ench. p. 271: sect. Galii. — Par. Walp. Rep. II. p. 454. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 419.

Euapinagia Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 97: sect. Apinagiae. (Podostemum ruppioides Kth, etc.)

Euapium DC. 1830. Prodr. IV. p. 101: sect. Apii. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 277.

Synon. Celeri Adans.; Celleri Endl.; Gymnosciadium Hochst.

Euaplopappus DC. 1836. Prodr. V. p. 347: sect. Aplopappi.

Endl. 1838. Gen. n. 2381 *c.* p. 386 (sph. *Euaploppus);* 1841. Ench. p. 235: sect. Haplopappi.

Euaploppus Endl. vid. *praeced.*

Euapocyneae Endl. 1838. Gen. p. 581; 1841. Ench. p. 294: subordo Apocynacear. Tribus: Plumerieae, Alstonieae, Echiteae, Wrightieae, Gelsemieae.

Eu-Arabis C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 18: sect. Arabidis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4854 *c.* p. 864; 1841. Ench. p. 448. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 246. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 103.

Euarctotis DC. 1837. Prodr. VI. p. 485: sect. Arctotidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2830 *a.* p. 464; 1841. Ench. p. 245.

Euardisia Endl. 1839. Gen. n. 4222 *a.* p. 736; 1841. Ench. p. 359: sect. Ardisiae. (*Ardisiae verae A. DC.* 1834.) Subsect.: Pyrgus, Bladhia. — Par. A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 95; 1844. Pr. VIII. p. 124. — Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 285; 1857. Ind. bat. II. p. 1016.

Euardisieae Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 65: sect. Ardisiear. Gen.: Wallenia, Conomorpha, Weigeltia, Cybianthus, Monoporus, Stylogyne, Myrsine, Pimelandra, Pleiomeris, Ardisia, Oncostemum, Amblyanthus, Antistrophe, Hymenandra.

Euarethuseae Lindl. 1840. Gen. Orchid. p. 385: div. Arethusear. Gen.: Macdonaldia, Chiloglottis, Pterostylis, Lyperanthus, Corysanthes, Microtis, Acianthus, Cyrtostylis, Limodorum, Chloraea, Bipinnula, Asarca, Cleistes, Codonorchis, Haplostellis, Cephalanthera, Pogonia, Leptoceras, Caladenia, Glossodia, Calopogon, Crybe, Anthogonium, Arethusa, Eriochilus, Spiculaea, Drakaea, Caleana.

Meisn. 1842. Gen. p. 382 (286): subtrib. Arethusear. Gen. ead. et Thelychiton, Acronia.

Euargyreia Endl. 1839. Gen. n. 3810 *b.* p. 655; 1841. Ench. p. 324: sect. Argyreiae. — Par. Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 332. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 590.

Synon. Schizanthus Don.

Euaroideae Schott 1832. Melet. bot. p. 16: subtrib. Dracunculinar. Gen.: Biarum, Arum, Typhonium, Sauromatum. — Par. Blume 1835. Rumphia I. p. 111. Gen. ead. et Dracunculus, Theriophonum. — Endl. 1837. Gen. p. 235; 1841. Ench. p. 128. Gen. ut Blume (1841. Spl. I. p. 1370 Theriophonum). — Kunth 1841. Enum. III. p. 21. Gen. ead. — Meisn. 1842. Gen. p. 362 (270). Gen. ead.

Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 38: sect. Dracunculinear. Gen. ead. (excepto Dracunculo.)

Euartemisia (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 126: sect. Artemisiae. (A. Absinthium, vulgaris, etc.)

Euarthrocarpus Endl. vid. *Enarthrocarpus.*

Euartocarpeae Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 108: trib. Artocarpear. Gen.: Treculia, Artocarpus, Cudrania. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 638.

Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 121: subtrib. Artocarpear. propriar. Gen.: Artocarpus.

Euasclepieae Endl. 1838. Gen. p. 593; 1841. Ench. p. 299: sect. Cynanchear. Gen.: Pentatropis, Iphisia, Oxystelma, Brachylepis, Enslenia, Gomphocarpus, Lagarinthus, Pachycarpus, Xysmalobium, Acerates, Podostigma, Asclepias, Otaria, Pentarrhinum, Aspidoglossum. Accedunt 1843 (Spl. III. p. 75) Pentagonium, Haplostemma, Rhinolobium.

Meisn. 1840. Gen. p. 269 (176): subtrib. Cynanchear. Gen. ut Endl. 1838 et Diploglossum.

Eu-Aseroë Schlechtend. 1847. Diss. de Aseroës gen. (Flora 1849. I. p. 221): sect. Aseroës.

Euaspidium Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 640 *f.* p. 1349; 1841. Ench. p. 37: sect. Aspidii. Subsect.: Aspidium (Presl), Bathmium.

Euasplenium Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 630 *a β.* p. 1348; 1841. Ench. p. 36: subsect. Asplenii. — Simil. Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 71.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 350: sect. Asplenii. — Par. Fée 1852. Gen. Fil. p. 190.
Synon. Onopteris Neck.; Belvisia Mirb. pt.

Euastereae DC. 1836. Prodr. V. p. 217: subdiv. Asterear. Gen.: Mairia, Felicia, Munychia, Agathaea, Bellidiastrum, Aster, Tripolium, Galatella, Turczaninovia, Calimeris, Eurybiopsis, Podocoma, Asteropsis, Arctogeron, Sericocarpus, Machaeranthera, Tetramolopium, Henricia, Döllingeria, Heleastrum, Biotia, Eurybia. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 372. Gen. ead. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1380 et Ench. p. 233) Townsendia, 1842 (Spl. II. p. 38) Xylorrhiza, Eucephalus. — Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125). Gen. ut DC. (Sericopappus loco Sericocarpi) et Spongotrichum. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952 (restricta). Gen.: Aster, Galatella, Podocoma, Arctogeron, Dieteria, Seriocarpus, Machaeranthera, Döllingeria, Biotia, Xylorrhiza, Townsendia, Eucephalus, Woodwillea, Linosyris, Pteronia, Karelinia, Parastrephia, Bradburia.

Euasteriscium Fenzl 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 2. n. 4370 *b:* sect. Asteriscii.

Euastrum Ehrenb. 1831. Infus. p. 162; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 208: g. Bacillarior.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 83; 1843. Phyc. gener. p. 162; 1845. Phyc. germ. p. 133; 1849. Sp. Alg. p. 171. n. 127: g. Desmidiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 53. — Math. 1853. Belg. II. p. 527 (*Evastrum*).
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Micrasteriear.
Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 112: g. Desmidiacear. Sect.: Tetracanthium, Cosmarium, Eucosmium, Euastrum, Micrasterias.
Conf. Holocystis Hass., Colpotella Raf., Eutomia Harv., Dysphinctium, Eucosmium et Tetracanthium Näg.; Strephocystis Cujusn.?

Euathrixia DC. 1837. Prodr. VI. p. 276: sect. Athrixiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2770 *a.* p. 452; 1841. Ench. p. 243.
Synon. Athrixia Less.

Euatraphaxis Jaub. & Spach 1846. Ill. pl. Or. II. p. 11. t. 110: subg. Atraphaxidis. *Cf.* Flora 1847. I. p. 290.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 54. n. 1995 *a:* sect. Atraphaxidis. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 554. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 75.

Euatriplex C. A. Meyer 1833 in Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 305: sect. Atriplicis. — Par. Koch 1837. Syn. p. 610. Ed. II. p. 701. — Endl. 1837. Gen. n. 1912 *a.* p. 293; 1841. Ench. p. 181. — Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. . . . — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 308.
= Dichospermum Dumort.

Euaurantiae Oersted 1857. Nat. For. Tid. Medd. p. 188: div. Aurantiacear.

Euavena Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 452: sect. Avenae. (A. pilosa, hirsuta.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 392. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 510.

Euazara Endl. 1839. Gen. n. 5075 *a.* p. 920; 1841. Ench. p. 479: sect. Azarae.

Eubaccharideae Endl. 1838. Gen. p. 390; 1841. Ench. p. 236: div. (err. subdiv. IV) Baccharidear. Gen.: Polypappus, Baccharis.

Eubacillaricae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 97: sect. Bacillariear. Gen.: Campylodiscus, Surirella, Doryphora, Bacillaria, Synedra.

Eubactris Oersted 1858. Palm. Centroam. p. 41: subg. Bactridis. (B. horrida et fusca.)

Eubalsamorhiza Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 349: sect. Balsamorhizae. (Heliopsis balsamorhiza Hook.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 610.

Eubanalia Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 278: sect. Banaliae.

Eubanisteria Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 45: sect. Banisteriae.

Eubanksia Endl. 1841. Ench. p. 216. n. 2157 *a:* sect. Banksiae. — Par. Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 581; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 452.

Eubarbula C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 623: sect. Barbulae.

Eubarnadesia Endl. 1838. Gen. n. 2901 *a.* p. 481; 1841. Ench. p. 247: sect. Barnadesiae.
Synon. Diacanthoides DC.

Eubartramia C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 449: sect. Bartramiae.
Synon. Cryptoseta Hook.; Cryptopodium Brid.; Glyphocarpa R. Brown; Glyphocarpus Brid.

Eubartsia G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 612: sect. Bartsiae. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 340. n. 4013 *a.*
Synon. Stähelinia Hall.; Bartschia Endl.

Eubasis Salisb. 1796. Prodr. p. 68.
= Aucuba Thunb.

Eubassia A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 197: sect. Bassiae.

Eubeaufortia Schauer 1843. Diss. grat. p. 13; 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 148: sect. Beaufortiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 928.

Eubegonia Walp. 1843. Repert. II. p. 206: sect. Begoniae.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 277: subg. Begoniae.
= Begonia Klotzsch, etc.

Eubelium Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 92: grex Philodendri. (Ph. grandifolium, etc.)

Euberberis Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 38: sect. Berberidis. (B. sibirica, vulgaris, etc.)

Eubergia Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 71. n. 5476 *b:* sect. Bergiae. Subsect. Elatinoides, Bergiotypus.

Euberkheya DC. 1837. Prodr. VI. p. 506: sect. Berkheyae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2844 *d.* p. 466; 1841. Ench. p. 245.
Synon. Berkheya Less.

Eubeslerieae Oersted 1858. Gesn. centroam. (Müll. Ann. bot. V. p. 432): subtrib. Besleriear. Divis.: Drymonieae, Nematantheae, Hypocyrteae.

Eubiarum Boissier 1853. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 13. p. 5: sect. Biari.

Eubiddulphieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 96: sect. Biddulphiear. Gen.: Isthmia, Denticella, Biddulphia, Zygoceros.

Eubignonia Endl. 1841. Ench. p. 346. n. 4124 *a:* sect. Bignoniae. Subsect.: Temnocydia, Alsocydia, Batocydia. — Par. Miq. 1844. Linnaea XVIII. p. 259.

Eubignonia Mart. mss. in herb. teste DC. in Meisn. Comm. p. 208.
= Distictis Mart.

Eubignonieae DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 122 (Revis. Bign. p. 6); 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 284: subtrib. Bignoniear. Gen.: Bignonia, Stereospermum, Cuspidaria, Arrabidaea, Astianthus, Calosanthes, Amphilophium, Millingtonia, Argylia, Lundia, Mansoa, Delostoma et 1839 Haplolophium. — Par. A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 571. Gen. ead. et Oroxylum, Stenolobium. — DC. 1845. Pr. IX. p. 143. Gen. (*1. Monostictides*): Bignonia, Pachyptera, Fridericia, Astianthus, Calosanthes, Cuspidaria, Macfadyena, Lundia, Mansoa, Millingtonia, Arrabidaea, Anemopaegma, Distictis, Haplolophium. (*2. Pleostictides*): Amphilophium, Pithecoctenium, Delostoma, Cybistax, Adenocalymna.
Endl. 1839. Gen. p. 712: trib. Bignoniear. Gen.: Calosanthes, Haplolophium, Amphilophium, Delostoma, Astianthus, Bignonia, Millingtonia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1406 et Ench. p. 346) Lundia, Mansoa, Arrabidaea, Nouletia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 299 (207). Gen. *1. Monostictides:* Oxera?, Schrebera, Sickingia?, Calosanthes, Ferdinandusa, Wightia, Millingtonia, Bignonia, Pachyptera, Cuspidaria, Arrabidaea, Astianthus, Psilogyne?, Mansoa, Lundia, Aplolophium, Peltospermum? *2. Pleostictides:* Amphilophium, Delostoma, Pithecoctenium, Cybistax, Anemopaegmia, Distictis, Adenocalymna.

Eublechnopsis Presl 1850. Epimel. bot. p. 475: sect. Blechnopsidis. (Blechnum brasiliense Desv., etc.)

Eublechnum Fée 1852. Gen. Fil. p. 73: sect. Blechni. (Bl. lanceola, etc.)

Eublechnum Oersted 1855. Centralam. Acanth. p. 55: subg. Blechi. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 665.

Eublepharis Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 359: sect. Coreopsidis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 614.

Eublitum Moquin-Tand. 1840. Chenop. enum. p. 47: sect. Bliti. — Par. Bernh. 1847. Allg. thür. Gartenz. Nr. 1. 2.
: Morocarpos Rupp.

Eublossevillea Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 30. n. $122/_5$ *b:* sect. Blossevilleae.
= Blossevillea Decne.

Euböhmeria Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 37. n. 1884 *a:* sect. Böhmeriae.
Synon. Böhmeria et Duretia Gaudich.

Euböhmerieae Weddell 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 175: subtrib. Böhmeriear. Gen.: Cypholophus, Böhmeria, Margarocarpus, Pouzolzia, Chamabainia, Didymogyne. — Par. Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 371. Gen.: Böhmeria, Chamabainia, Pouzolzia, Memorialis.

Eubolivaria Scheele 1852. Linnaea XXV. p. 254: sect. Bolivariae.

Euborrago Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 102: sect. Borraginis. — Simil. DC. 1846. Pr. X. p. 34.

Eubostrychia Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 55: subg. Bostrychiae.

Eubotrys Nuttall 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 269: nov. g. Andromedear. (Andromeda racemosa L.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1115.
= Zenobia Don.

Eubouvardia Schlechtend. 1853. Linnaea. XXVI. p. 58: sect. Bouvardiae. (B. angustifolia, leiantha, etc.)

Eubrachion Hook. f. 1846. Antarct. Fl. p. 291: nov. g. Loranthacear. (Viscum ambiguum Hook.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 361. — Endl. 1850. Spl. V. p. 18. n. $4581/_1$.

Eubrachychiton Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 61. n. 5320 *a:* sect. Brachychitonis.
Synon. Brachychiton Schott & Endl.

Eubrachyrhynchos DC. 1837. Prodr. VI. p. 437: sect. Brachyrhynchi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2812 *a.* p. 460; 1841. Ench. p. 245. — Steud. 1840. Nom. I. p. 599 (*Eubrachyrhynchus*). — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 340 (*Eubrachyrrhynchus*).

Eubrachyris DC. 1836. Prodr. V. p. 312: sect. Brachyridis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2361 *a.* p. 383; 1841. Ench. p. 235.

Eubrachyrrhynchus Wittst. vid. *Eubrachyrhynchos DC.*

Eubragantia Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 95. n. 2163 *a:* sect. Bragantiae.

Eubrassia Lindl. 1853. Fol. Orchid. 1 Dec.: sect. Brassiae.

Eubrazoria Engelm. & Gray 1847. Bost. journ. V. p. 256: sect. Brazoriae.

Eubrickellia Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 287: sect. Brickelliae. (B. cordifolia.)

Eubromeae Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 347: subdiv. Bromear. Gen.: Catapodium, Scleropoa, etc.

Eubromeliae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 7. 15. 16: div. Phylanthear. Gen.: Encholirium, Bromelia, Agallostachys.

Eubromus (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 582: sect. Bromi.

Eubruchia C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 20: sect. Bruchiae.

Eubrunia Endl. 1841. Ench. p. 402. n. 4597 *a:* sect. Bruniae.
Synon. Nebelia Neck.

Eubrychis DC. 1825. Prodr. II. p. 344: sect. Onobrychidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4004 *a.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 302. — Endl. 1841. Gen. n. 6619 *a.* p. 1286; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 708. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 65.

Eubryonieae Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 10. 33: subtrib. Bryoniear. Gen.: Solena, Bryonia, Trianosperma, Karivia, Mukia, Schizostigma, Juchia, Tripodanthera, Perianthopodus, Cayaponia, Dermophylla.

Eubryum C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 252: sect. Bryi. (B. bimum Schreb.)

Eubuchnereae Endl. 1839. Gen. p. 685; 1841. Ench. p. 339: subtrib. Buchnerear. Gen.: Striga, Buchnera, Doratanthera, Ramphicarpa, Cycnium. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 314 (224). Gen. ead.

Eubuellia Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 225: sect. Buelliae.

Eubuphthalmeae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 955: div. Buphthalmear. Subdiv.: Cylindroclineae, Evaceae. — Par. Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 227. Gen.: Evax, Asteriscus, Odontospermum.

Euburdachia Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. Fasc. XXI. p. 23: sect. Burdachiae. (Burdachiae „Mart.“ sect. A. Juss.)

Euburmannia Seubert 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 55: sect. Burmanniae.

Euburtonia Endl. 1840. Gen. n. 6433 *a.* p. 1257; 1841. Ench. p. 667: sect. Burtoniae.

Eubyblis Planchon 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 305: sect. Byblidis. (B. liniflora Salisb.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 78.

Eubylobium Walp. vid. *Eurylobium.*

Eubystropogon Endl. 1841. Ench. p. 307. n. 3604 *a:* sect. Bystropogonis.
Synon. Bystropogon Benth.

Eucacalia DC. 1837. Prodr. VI. p. 327: sect. Cacaliae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2806 *a.* p. 457; 1841. Ench. p. 244. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 434. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 626.

Eucachrys DC. 1830. Prodr. IV. p. 236: sect. Cachrydis. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 372. — Endl. 1839. Gen. n. 4525 *a.* p. 789; 1841. Ench. p. 380. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 356.
Synon. Cachrys Koch.

Eucadaba Endl. 1839. Gen. n. 4993 *a.* p. 892; 1841. Ench. p. 456: sect. Cadabae.

Eucaena G. Don vid. *Euacaena DC.*

Eucaesalpinieae Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 72; 1841. ibid. III. p. 133: trib. Caesalpiniear. Gen.: Gymnocladus, Guilandina, Poinciana, Coulteria, Caesalpinia, Peltophorum, Schizolobium, Mezoneurum, Pterolobium, Colvillea, Cladotrichum, Hoffmannseggia, Pomaria, Melanosticta. *Aff.:* Moldenhawera. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. Gen. ead. et Cercidium, Parkinsonia, Erythrostemon, Burkia.

Eucaladenia Endl. 1837. Gen. n. 1593 *a.* p. 217; 1841. Ench. p. 114; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 7: sect. Caladeniae. — Simil. Lindl. 1839. Swan-River p. LI; 1840. Orchid. p. 417.

Eucalais DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 85: sect. Calaidis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2978/$_1$ *a.* p. 1387; 1841. Ench. p. 249. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 471.

Eucalamintha (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 662: sect. Calaminthae. (C. officinalis Mönch, etc.)

Eucalanthe Lindl. 1854. Fol. Orchid. 1 Nov.: sect. Calanthes.

Eucalceolaria Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 207: sect. Calceolariae.

Eucalia Räusch. 1797. Nom. 251 ex DC. Prodr. V. p. 567.
= Encelia Adans.?

Eucalicium Th. Fries 1856. Oefvers. K. Vet. Ak. Förh. XIII. (Flora 1857. p. 633): sect. Calicii.

Eucalligonum Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 50. n. 1989 *a:* sect. Calligoni.
Synon. Polygonoides Tourn.; Calligonum Endl.

Eucallirrhoë A. Gray 1849. Pl. Fendl. p. 16: sect. Callirrhoës. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 150.

Eucallistemon Endl. 1840. Gen. n. 6302 *a.* p. 1229; 1841. Ench. p. 650: sect. Callistemonis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 165.

Eucallitris Miquel 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 643: sect. Callitridis.

Eucalochortus „Hook. in Beech. voy. Bot. t. 94“ Endl. 1841. Spl. I. p. 1358. n. 1095 *a:* sect. Calochorti.

Eucalotis Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 469: sect. Calotidis. (C. cuneifolia R. Br., etc.)

Eucalycadenia Torrey & Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 401: sect. Calycadeniae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 184.

Eucalydermos DC. 1836. Prodr. V. p. 669: sect. Calydermi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2613 *a.* p. 425; 1841. Ench. p. 240.
Synon. Calydermos Cass.

Eucalymma Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 110: sect. Hypocalymmae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 737.

Eucalymperes C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 526: sect. Calymperis.

Eucalypta Dumort., Hüb. vid. *Encalypta Schreb.*

Eucalypteae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: subtrib. Leptospermear. Gen.: Eucalyptus, Callistemon, Metrosideros, Leptospermum, Fabricia, Bäckea.

Eucalyptus*) L'Herit. 1788. Sert. angl. 18.

Juss. 1789. Gen. p. 451: g. Myrtor.

Gmel. 1791. Syst. p. 790: g. Polyandr. Monogyn.

Willd. 1799. Sp. II. p. 976. n. 975; 1809. En. p. 515: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Roxb. 1832. Ind. II. p. 498.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 320: g. Myrtoidear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 13.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 162: g. Myrtear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 852; 1825. Syst. II. p. 500. n. 1847; 1830. Gen. I. p. 411. n. 2053. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 507. — Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 80. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 121.

Pers. 1807. Ench. II. p. 32. n. 1211: g. Myrtacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 29; 1831. Hdb. II. p. 65. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1101.

DC. 1828. Pr. III. p. 216: g. Euleptospermear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 818. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 126. — Meisn. 1837. Gen. p. 108 (76).

Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4675: g. Leptospermear. (1841 in Nomencl. omissum.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 331. — Endl. 1840. Gen. n. 6300. p. 1229; 1841. Ench. p. 650. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 123. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 737. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 83. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 398.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Eucalyptear.

Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 127: g. Callistemonear.

Synon. Aromadendrum Andr.

Eucamarea Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 105: sect. Camareae. (Camarea sect. A. Juss.)

Eucampia Ehrenb. 1839. Kreidethierch.; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 210: g. Bacillarior.

Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 141; 1849. Sp. Alg. p. 191. n. 143: g. Desmidiear.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Pediastrear.

Eucamptodon Montagne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 119: sect. Weissiae (W. perichaetialis), ibid. p. 366. t. 14. f. 4 genus Muscor.

C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 345: g. Dicranacear.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.

Eucanavalia Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 135: sect. Canavaliae. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6663 *b.* p. 1291; 1841. Ench. p. 671. Subsect.: Monodon, Malocchia. — Walp. 1842. Rep. I. p. 766.

*) καλυπτός, tectus.

Eucannavalia Steud. Nomencl. I. p. 600: vid. *praeced.*

Eucanscora Griseb. 1845 in DC. Prodr. IX. p. 64: sect. Canscorae.

Synon. Pladera Griseb.

Eucanthium DC. 1830. Prodr. IV. p. 473: sect. Canthii. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 562. — Endl. 1838. Gen. n. 3175 *a.* p. 537; 1841. Ench. p. 272.

Synon. Kraussia Harv.

Eucaperonia Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 300: sect. Caperoniae. (Caperonia St. Hil.)

Eucapnos Bernhardi 1833. Linnaea VIII. p. 468: nov. g. Dicentrear. (Fumaria formosa Andr. et eximia Ker.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 184. n. 7064.

Meisn. 1837. Gen. p. 8 (10): g. Fumariacear.

Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 67: g. Dielytrinear.

Endl. 1839. Gen. n. 4836 *a.* p. 859; 1841. Ench. p. 443: sect. Dicentrae. — Par. Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 341 (*Eucapnus*). — Pfeiff. 1857. Bot. Zeit. p. 649.

Planch. 1853. Fl. d. serr. VIII. p. 193: subg. Capnorchidis.

Eucapnos Sieb. & Zuccar. 1843. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. III. p. 721: nov. g. Papaveracear. (Fumaria spectabilis L.)

Endl. 1843. Spl. III. p. 86. n. $4836/_1$: g. Dicentrear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 23.

= Capnorchis Bernh.

Eucapnus Wittst. vid. *Eucapnos Bernh.*

Eucapparis DC. 1824. Prodr. I. p. 245: sect. Capparidis. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 278. — Endl. 1839. Gen. n. 5000 *b.* p. 893; 1841. Ench. p. 456.

Synon. Capparis Plum.; Volkameria Burm.

Eucaprifolium Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 334: sect. Caprifolii. (Lonicera Periclymenum L., etrusca Savi, Caprifolium L.)

Walp. 1843. Rep. II. p. 447: subsect. Caprifolii.

Synon. Caprifolium Tourn.

Eucardamine (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 106: sect. Cardamines. (C. pratensis, etc.)

Eucardiochlaena Fée 1852. Gen. Filic. p. 315: subg. Cardiochlaenae.

Eucarduineae Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 331; . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 371: subdiv. Carduinear. Sect.: Carduineae legitimae, Cirsieae. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 430.

Eucarduus Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 333: sect. Homochroospermi. (Carduus nutans, acanthoides, etc.)

Eucarex Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 411: sect. Caricis. (C. acuta, pilulifera, digitata, sylvatica, etc.)

Eucarica Miquel 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 32: subsect. Caricae. (Ficus Carica, hirsuta, palmata, etc.)

Eucarissa A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 332: sect. Carissae.
Synon. Carissa Linn.
Eucarisseae A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 324: subtrib. Carissear. Gen.: Maycockia, Hancornia, Winchia, Vahea, Ambelania, Carpodinus?, Melodinus, Bicorona, Leuconotis, Carissa, Toxicophlaea?, Rauwolfia, Ophioxylon.
Eucarlina Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 325: sect. Carlinae. (C. vulgaris, lanata, etc.) — Par. (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 275.
= Carlinae DC. pars.
Eucarlineae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 343: div. Carlinear. Gen.: Carlina, Atractylis.
Eucarpha*) R. Brown 1830. Suppl. p. 32 (Verm. bot. Schr. V. p. 108): sect. Knightiae. (Embothrium strobilinum Labill.) — Par. Endl. 1841. Ench. n. 2151 *b.* p. 216; 1847. Spl. IV. p. 88. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 443.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Grevillear.
Eucarya „Mitch." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 788: g. Santalacear.
Eucascaria Endl. 1841. Ench. p. 477. n. 5060 *a:* sect. Caseariae. Subsect.: Hexanthera, Anavinga, Pitumba, Piparea.
Eucassinieae Fenzl 1839. Flora II. p. 729: subdiv. Cassiniear. Gen.: Cassinia, Rhynea.
Eucastalia Planchon 1853. Ann. sc. nat. 3e sér. XIX. p. 52: subsect. Castaliae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 162.
Eucastelnavia Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 108: sect. Castelnaviae. (C. princeps et fimbriata.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 441.
Eucastilleja G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 614: sect. Castillejae. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 393.
Eucasuarina Miquel 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 639: sect. Casuarinae.
Eucaulerpa Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 16. n. 42 *a:* sect. Caulerpae. — Par. Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 149.
= Caulerpa Lamx.
Eucaulotretus Endl. 1841. Gen. n. 6789 *a.* p. 1317; 1841. Ench. p. 674: sect. Caulotreti. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 851.
Euceanothus DC. 1825. Prodr. II. p. 31: sect. Ceanothi.
= Ceanothus Linn.
Eucelastrus Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 138: sect. Celastri.
= Celastrus Kunth.
Eucelmisia Hook. f. 1845 in Voy. of Terr. and Ereb. p. 33: sect. Celmisiae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 117.
Euceltis Planchon 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 263. 283: subg. Celtidis. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 394.
Eucentrus Endl. vid. *Encentrus Presl.*

*) χάρφη, palea.

Eucephalophora DC. 1836. Prodr. V. p. 662: sect. Cephalophorae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2599 *a.* p. 423; 1841. Ench. p. 240.
Cephalophora Cavan.
Eucephalostigma Endl. 1838. Gen. n. 3073 *a.* p. 515; 1841. Ench. p. 266: sect. Cephalostigmatis.
Eucephalus Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 298: nov. g. Asterinear. Subg.: Lagatea.
Endl. 1842. Spl. II. p. 38. n. $2310/_1$: g. Euasterear. Sect.: Eucephalus, Lagatea. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952.
Walp. 1843. Rep. II. p. 572: subsect. Orthomeridis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709: g. Asterear.
Euceraea*) Martius 1829. Nov. gen. III. p. 90. t. 238: nov. g. Sapindacear. (E. nitida.)
Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38): g. Dodonaeacear.
Endl. 1841. Spl. I. n. $5060/_1$. p. 1420; 1841. Ench. p. 477: g. Samydear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 189. n. 7196. — Meisn. 1843. Comm. p. 349. — Walp. 1846. Rep. V. p. 407.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 331: g. Samydacear.
Euceramophora Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 57. n. 2052 *c* α: subsect. Ceramophorae. (Ceramophorae genuinae Nees.)
Eucerasus Torrey & Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 409: sect. Cerasi.
= Cerasophora Neck.
Euceratandra Lindl. 1838. Gen. Orchid. p. 364: sect. Ceratandrae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $1537/_7$ *a.* p. 1366; 1841. Ench. p. 112.
Synon. Hippopodium Harv.
Euceratopetalum Endl. 1839. Gen. n. 4651 *b.* p. 818; 1841. Ench. p. 409: sect. Ceratopetali.
Eucereus Miquel 1839. Bull. Néerl. 2e livr. p. 112: subg. Cerei. — Simil. Engelm. 1856. Syn. Cact. p. 286. (Emory Cact. p. 40.) — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 46 (sphalm. *Eucerus*).
Endl. 1839. Gen. n. 5157 *b.* p. 944: sect. Cerei. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 325.
= Cereus Haw.
Eucerinthe Endl. 1841. Ench. p. 320. n. 3753 *b:* sect. Cerinthes. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 79.
Eucerus Müll. vid. *Eucereus Miq.*
Eucespedezia Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 99. n. 5959 *a:* sect. Cespedeziae.
Eucestrum Schlechtend. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 263: sect. Cestri. — Par. Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 603.
Euchabraea Rémy 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 181: sect. Chabraeae.

*) εὖ et κεραία, ob elegantem formam stigmatis ceranoidei.

Euchaenactis Torrey & Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 370: sect. Chaenactidis. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 177.

Euchaenanthera Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 238: subsect. Chaenantherae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 741.

Euchaerophyllum DC. 1830. Prodr. IV. p. 225: sect. Chaerophylli. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 366. — Endl. 1839. Gen. n. 4506 *c.* p. 787; 1841. Ench. p. 380; 1850. Spl. V. p. 13. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 350.

Synon. Rhynchostylis Tausch?

Euchaetanthera Hook. & Arn. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 104: sect. Chaetantherae. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 30. — Endl. 1838. Gen. n. 2921 *c.* p. 485; 1841. Ench. p. 248.

Synon. Chaetanthera et Proselia Don.

Euchaetis*) Bartl. & Wendl. 1824. Diosm. p. 12. 15: nov. g. Diosmear. (Diosma glomerata G. F. W. Meyer.) *Cf.* Flora 1827. II. p. 414. — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 472. — Bartl. 1830. Ord. p. 388. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 785. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 322. — Meisn. 1837. Gen. p. 61 (45). — Rchb. 1837. Hdb. p. 282.

Dietr. 1839. Syn. I. p. 829: sect. Diosmae.

Endl. 1840. Gen. n. 6018. p. 1158; 1841. Ench. p. 612: g. Eudiosmear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 508. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.

Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7508: g. Agathosmear.

Euchaetophoreae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 102: subtrib. Chaetophorear. Gen.: Cruoria, Chaetophora.

Euchamaecrista Endl. 1841. Gen. n. 6781 *g γ bb.* p. 1316; 1841. Ench. p. 674: subsect. Chamaecristae.

Synon. Grimaldia Schrank; Chamaecristae genuinae Vogel.

Euchamaecyparis Endl. 1847. Syn. Conif. p. 61; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 4. n. 1799 *a:* sect. Chamaecyparidis. (Cupressus thyoides L.)

Euchamaedorea Oersted 1855. Palm. Centroam. p. 11: subg. Chamaedoreae. (Borassus pinnatifrons Jacq., etc.)

Euchamaefistula Endl. 1841. Gen. n. 6781 *b β.* p. 1316; 1841. Ench. p. 674: subsect. Chamaefistulae. (*Chamaefistulae genuinae Vog.*) — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 813.

Euchamaelaucieae Schauer 1841. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. II. p. 175: subtrib. Chamaelauciear. Gen.: Actinodium, Genetyllis, Darwinia, Homoranthus, Chamaelaucium, Verticordia, Pileanthus, Thryptomene, Lhotskya, Calycothrix.

Euchamissoa Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 250: sect. Chamissoae.

Euchara Braun 1858. Monatsber. Berl. Ak. p. 359: sect. Charae.

Eucharidium Fisch. & Meyer 1835. Ind. sec. sem. h. Petrop. p. 36; nov. g. Onagrariar., Clarkiae proximum. *Cf.* Ann. sc. nat. 1836. 2e sér. V. p. 184, Hook. Bot. Mag. Comp. II. p. 7 et Linnaea 1837. Litt. p. 105.

Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1962: g. Onagracear.

Meisn. 1837. Gen. p. 120 (86): g. Onagrear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6569.

Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 516: g. Oenotherear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 117.

Endl. 1840. Gen. n. 6120. p. 1192; 1841. Ench. p. 637: g. Epilobiear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 90.

Lilja 1841. Linnaea XV. p. 260: g. Clarkiear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Epilobear.

Eucharis*) Planchon 1852 in Lind. Catal.; 1852. Fl. d. serr. VIII. p. 107. t. 788: nov. g. Pancratiear. *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 57.

Euchartolepis Jaub. & Spach 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 270: subg. Chartolepidis.

Euchauvinia Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 137: subg. Chauviniae. (Ch. paspaloides, phleoides Bory, etc.)

Euchavica Miquel 1843. Syst. Piperac. p. 224: sect. Chavicae. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 16. n. 1823/$_1$ *a.*

Eucheilantheae Fée 1852. Gen. Filic. p. 36. 148: subtrib. Cheilanthear. Gen.: Myriopteris, Plecosorus, Eriosorus, Aleuritopteris, Cheilanthes, Nothochlaena; Cincinalis.

Euchenopodium Gren. (& Godr.) 1855. Fl. France III. p. 17: subg. Chenopodii. Sect.: Botryoides, Chenopodiastrum. Chenopodium Moq.

Eucheuma J. Agardh 1847. Oefvers. k. Vet. Ak. Förh. IV. p. 5; 1848. Flora II. p. 415: nov. g. Sphaerococcoidear.

Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 118: g. Soleriear.

Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 348: g. Floridear.

Euchidium „Jack" Endl. gen. Suppl. V. p. 92: vid. *Enchidium Jack.*

Euchilos Spreng. vid. *seq.*

Euchilus R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 17 (Verm. bot. Schr. II. p. 469): nov. g. Leguminosar. (E. obcordatus.) — Par. Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 516 (*Euchylus*). — Spreng. 1825. Syst. II. p. 350. n. 1653; 1830. Gen. I. p. 366. n. 1850 (*Euchilos*). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380 (*Euchilos*). 1807.

Bronn 1822. Diss. p. 131 (*Euchylus*): g. Sophorear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 110. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4062. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 122. — Spach 1834. Vég.

*) *εὐχαίτης*, pulchre crinitus.

*) *εὔχαρις*, amoenus, amabilis.

Euchilus R. Brown cont.
phan. I. p. 179. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (58).
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 35; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 80: g. Pultenaear. — Par. Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 72.
Endl. 1840. Gen. n. 6444. p. 1258; 1841. Ench. p. 667: g. Pultenear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 353.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5938: g. Pultenaeear.

Euchilus A. DC. 1847. Prodr. XI. p. 714: sect. Stenochili. (An sphalm. pro *Eustenochilus?*)

Euchirita Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 727: sect. Chiritae.

Euchironia Endl. 1838. Gen. p. 601. n. 3536 *b:* sect. Chironiae.
= Ixochiron Griseb. pt.

Euchiton Cassini 1828. Dict. v. 56. p. 214 *(Uchite);* 1830. v. 60. p. 579: nov. g. Luciliear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 235: sect. Gnaphalii. — Par. Endl. 1838 Gen. n. 2746 *b.* p. 447; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3479. 2. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 92.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.

Euchlaena Schrad. 1832. Ind. sem. h. Gotting.: nov. g. Olyrear. (E. mexicana.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 25 *(Euchlaene).*
Meisn. 1843. Gen. p. 417 (319): g. Panicear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Steud. 1854. Glum. I. p. 37.

Euchlora Ecklon & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. austr. II. p. 171 (non Zoolog.): nov. g. Genistear. (Ononis hirsuta Thunb.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59). — Endl. 1840. Gen. n. 6484. p. 1264; 1841. Ench. p. 668. — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 458. 470.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553: g. Borboniear.
= Microtropis E. Meyer.

Euchloris D. Don 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 548: nov. g. Compositar. (Gnaphalium nudifolium L.)
= Lepicline Cass.

Euchloris Kunth ap. Humb. & Bonpl. t. 49.
Endl. 1837. Gen. n. 839 *b.* p. 93; 1841. Ench. p. 58: sect. Chloridis.

Euchnoa*) Fenzl 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 33. n. $1964/_1$ *b* (sphalm. *Euchroa);* 1843. Linnaea XVII. p. 323: sect. Sericocomae. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 307.

Euchoiromyces Tulasne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 349: sect. Choiromycetis.
Synon. Rhizopogon Corda.

Euchondrilla Endl. 1838. Gen. n. 3009 *a.* p. 499; 1841. Ench. p. 250: sect. Chondrillae.

*) χνόη, axis (?).

Euchondrus Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 39. n. $122/_{39}$ *a:* sect. Chondri.
Chondrus Lamx.

Euchordarieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 103: subdiv. Chordariear. Gen.: Mesogloea, Liebmannia, Chordaria, Nereia.

Euchorozema Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 71: sect. Chorozematis. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6431 *a.* p. 1256; 1841. Ench. p. 667. — Walp. 1842. Rep. I. p. 567.

Euchresta*) Bennett 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 148. t. 31: nov. g. Dalbergieis aff. (Andira Horsfieldii Lesch.)
Endl. 1841. Gen. n. 6727. p. 1306; 1841. Ench. p. 673: g. Dalbergiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6019. — Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 126.

Euchresta Gardn. 1842. Lond. journ. bot. I. p. 239; 1846. ibid. V. p. 236: sect. Chrestae. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 66. n. 2225 *a.* — Walp. 1843. Rep. II. p. 542.

Euchroa Endl. vid. *Euchnoa Fenzl.*

Euchroma**) Nuttall 1818. Gen. Amer. II. p. 54: nov. g. Didynam. Angiosperm. (Bartsia coccinea L.) — Par. Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 132.
Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 516: g. Pedicularium.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 321 *(Eucroma):* g. Rhinanthear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 172. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3085: g. Pedicularinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Melampyracear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 615: sect. Castillejae. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 394. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 529.

Euchroma „Agdh" Bot. Zeit. 1848. p. 501: err. pro *Eucheuma Agdh.*

Euchrysanthemeae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 244: subdiv. Chrysanthemear. Gen.: Myconia, Chrysanthemum, Preauxia, Monoptera, Stigmatotheca, Argyranthemum, Ismelia.

Euchrysodium Metten. 1856. Fil. hort. Lips. p. 21: sect. Chrysodii. (Acrostichum crinitum, aureum, etc.)
Synon. Chrysodium Fée.

Euchrysoplenium Walp. vid. *Euchrysosplenium Turcz.*

Euchrysopsis Torrey & Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 254: sect. Chrysopsidis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 959.

Euchrysosplenium Turczan. 1844. Bull. Mosc. XVII. 2. p. 272: sect. Chrysosplenii. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 828. — Endl. 1850. Spl. V. p. 22. n. 4638 *a.*

*) εὔχρηστος, utilis, commodus.
**) χρῶμα, color.

Euchrysymenia Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 42. n. $122/_{50}$ *a:* sect. Chrysymeniae.
= Halarachnion Kütz.

Euchyla Link 1822. Enum. II. p. 82: sect. Aconiti.

Euchylaena Spreng., Dictr. vid. *Enchylaena R. Brown*

Euchylodeon Rchb. 1828. Consp. p. 192 in synon. Napelli.
= Napelli Riv. pars.

Euchylus Poir., Bronn vid. *Euchilus R. Brown.*

Euchysia Rchb. vid. *Enchysia Presl.*

Eucicca Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 618: sect. Ciccae.

Eucichorium DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 84: sect. Cichorii.
= Cichorium Less.

Eucinchoneae Endl. 1838. Gen. p. 554: subtrib. Cinchonear. Gen.: Calycophyllum, Pinkneya, Bouvardia, Manettia, Danais, Alseis, Exostemma, Hymenodictyon, Luculia, Lasionema, Remijia, Cinchona, Cosmibuena, Hymenopogon, Hillia, Coutarea, Stevensia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1393 et Ench. p. 274) Ferdinandusa, Crossopteryx; Sulipa? — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 61. Accedunt Ladenbergia, Rustia, Voigtia, Schönleinia.

Eucistus Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 368; 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 87: sect. Cisti.
Erythrocisti Dun. pars.

Eucithareloma Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 37. n. $4902/_1$ *a:* sect. Citharelomae.

Eucladia Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 43. n. $122/_{51}$ *b:* sect. Lomentariae.
= Gasterocolonium Kütz.

Eucladium Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: g. Weisiacear. (Weisia verticillata Brid.) — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 130 (*Encladium*).
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.
Bayrh. 1849. Taun. p. 7: g. Weissiacear.

Eucladon Hook. & Wils. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 538: nov. g. Muscor. imperfecte cognitum. *Cf.* Müll. Syn. Musc. I. p. 190.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.
Conf. Calomnion Hook. & Wils.

Eucladonia Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 36: sect. Cladoniae. (C. rangiferina.)

Euclarionea Endl. 1838. Gen. n. 2962 *a α* p. 492; 1841. Ench. p. 249: subsect. Clarioneae.
Synon. Clarionella DC.

Euclaytonia Walp. 1843. Rep. II. p. 237: sect. Claytoniae. — Par. Ledeb. 1844. Ross. II. p. 146 (sphalm. *Enclaytonia*).

Euclea*) „Burm. afric. 4. 84. f. 2" Linn. 1774 in Murr. Syst. p. 746: g. Dioec. Dodecandr. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 525. n. 1236. — Linn. f. 1781. Spl. p. 67. n. 1348. — Thunb. 1784. Nov. gen. V. p. 84. — Murr. 1784. Syst. p. 892. — Lour. 1790. Coch. II. p. 629. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 699. n. 1542. — Pers. 1797. Syst. p. 933; 1807. Ench. II. p. 627. n. 2264. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 822. n. 1824; 1809. En. p. 1020. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 391.
Juss. 1789. Gen. p. 432: g. incertae sedis.
Neck. 1790. El. III. p. 365. n. 1798: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 756: g. Dodecandr. Digyn. — Par. Thunb. 1800. Prodr. II. p. 85. 191. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 397. n. 1992. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 27.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 903; 1825. Syst. II. p. 462. n. 1789: g. Rhamnear.?
Link 1822. En. II. p. 431: g. Euphorbiaceis aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3645: g. Mimusopear.?
Cham. 1831. Linnaea VI. p. 350: g. Ebenacear. (?) — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 215. 672. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 596.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 215.
Meisn. 1839. Comm. p. 158: g. Styracinar.?
Endl. 1841. Spl. I. n. $4254/_1$. p. 1410; 1841. Ench. p. 363: g. dubium Ebenaceis aff.
Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5278: g. Styracear. genuinar.
Synon. Kellaua A. DC.?, Diplonema Don; Rymia Endl.

*) *εὔκλεια*, fama.

Euclerodendron Schauer 1847 in DC. Prodr. XI. p. 658: sect. Clerodendri. — Par. Miq 1857. Ind. bat. II. p. 868.

Eucletbra DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 588: sect. Clethrae.

Eucliandra Steud. Nomencl. I. 1840. p. 600 pro *Encliandra Zuccar.*

Euclibadium DC. 1836. Prodr. V. p. 505: sect. Clibadii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2462 *a.* p. 400; 1841. Ench. p. 237.
Synon. Clibadium Linn.

Euclidemia Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 340: sect. Clidemiae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 755.

Euclididae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 354: trib. Pleurorhizear. Gen.: Euclidium, Ochthodium.

Euclidieae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 236; 1821. Syst. II. p. 149. 420; 1824. Prodr. I. p. 184: trib. Pleurorhizear. Gen.: Euclidium, Ochthodium, Pugionium. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 198. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 12 (12). Gen. ead. — Endl. 1839. Gen. p. 872; 1841. Ench. p. 449. Gen. ead.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV; 1841. Nom. p. 178: subdiv. Nucamentacear. Gen. ead. et (1841) Anastaticeae.
Koch 1836. Syn. p. 75. Ed. II. p. 81: trib. Nucamentacear. Gen.: Euclidium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 258: subdiv. Synclistar. Gen. ut DC. et Anastatica, Morettia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 91: trib. Cruciferar. Gen. ex DC.

Euclidium*) R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 74 (Verm. bot. Schr. V. p. 7): nov. g. Cruciferar. (Bunias syriaca W.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 724: g. Siliculosar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 678.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 236; 1821. Syst. II. p. 421; 1824. Pr. I. p. 184: g. Euclidiear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV; 1837. Hdb. p. 258; 1841. Nom. p. 178. n. 6885. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 198. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 102. — Koch 1836. Syn. p. 75. Ed. II. p. 81. — Meisn. 1837. Gen. p. 12 (12). — Endl. 1839. Gen. n. 4896. p. 872; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 167. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 91.
Link 1822. En. II. p. 150: g. Tetradynam. Siliculos.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 858. n. 2280; 1831. Gen. II. p. 514. n. 2524: g. Synclistar.
Rchb. 1828. Consp. p. 181. n. 4710; 1832. Fl. exc. p. 654: g. Cakilear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Link 1831. Hdb. II. p. 285: g. Buniadear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 326: g. Carcerulosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Euclididar.
Synon. Soria Adans.; Hierochontis Medic.; Ornithorynchium Röhl. (Steud.)

Euclinia DC. 1830. Prodr. IV. p. 388: sect. Randiae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 502. — Endl. 1838. Gen. n. 3304 *b.* p. 562; 1841. Ench. p. 275. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2691. 2. — Benth. 1849. Niger Fl. p. 383. — Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 795.

Euclisia Endl. 1839. Gen. n. 4852 *b.* p. 864; 1841. Ench. p. 448: sect. Streptanthi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 181. n. 7001. 1. — Walp. 1842. Rep. I. p. 129.
= Euklisia Nutt.

Euclissa Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 73. n. 2116/$_1$ *a:* sect. Brachysiphonis. — Par. A. DC. 1856. Pr. XIV. 1. p. 487.

Euclitoria DC. 1825. Prodr. II. p. 234: sect. Clitoriae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3974 *b.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 215. — Endl. 1841. Gen. n. 6635 *b.* p. 1289; 1841. Ench. p. 671.

Eucloranthus Endl. vid. *Euloranthus DC.*

Eucnemia**) Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 53. n. 2032: g. Vandear.
= Eucnemis Lindl.

Eucnemis Brid. mss.
= Dicnemon Schwägr.

Eucnemis Lindl. 1833. Gen. Orchid. p. 161: nov. g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1426. p. 199; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177. — A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 483.
Synon. Eucnemia Rchb.

*) *κλειδίον*, claustrum parvum. (?)
**) Nomen Lindleyanum mutatum ob genus Coleopterorum.

Eucneorum Kalenicz. 1849. Bull. soc. Mosc. Nr. 1: sect. Daphnes.

Eucnide*) Zuccar. 1844. Del. sem. h. Monac. (Linnaea XVIII. p. 508); 1845. Abh. Münchn. Ak. IV. 2. p. 3: nov. g. Loacear., Bartoniae aff. (E. bartonioides.) — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 49. n. 5111/$_1$.
= Microsperma Hook. (Walp. in Otto's Gartenz. 1846. Nr. 19. p. 145. *(q. cf.)*

Eucobum Salisb. . . .
Gloxinia L'Herit.? *(Juss. 1819. Dict. v. 15. p. 520.)*

Eucoccoloba Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 34. n. 1990 *a:* sect. Coccolobae.
= Coccoloba Jacq.

Eucochlospermum Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 306: subg. Cochlospermi. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 115. — Simil. Endl. 1850. Spl. V. p. 65. n. 5405 *a.*

Eucodon A. DC. 1830. Mon. Camp. p. 214; 1839. Prodr. VII. 2. p. 466: sect. Campanulae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 755. — Endl. 1838. Gen. n. 3085 *b.* p. 517; 1841. Ench. p. 267. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 880. — Boiss. 1849. Diagn. pl. nov. II. Nr. 11. p. 76. Subsect.: Podanthum Don. — Webb . . . . Canar. III. p. 8.
Synon. Campanula Tourn.; Roucela Dumort.; Roncela Rchb.; Erinia Noul.; Erinus Spreng.; Erinoides Link.

Eucodon Schwägr. (?) Hornsch. 1840 in Endl. & Mart. Fl. Bras. Fasc. I. *Cf.* Linnaea XIV. p. 523.

Eucodonia**) Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 201; 1856. ibid. XXVII. p. 698. 737: nov. g. Achimenear. (E. Ehrenbergii.)
Oersted 1858. Gesn. centroam. p. 9: g. Euachimenear.

Eucoilostigma Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 708: sect. Coilostigmatis. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 369. n. 4298 *a.*
Synon. Coilostigma Klotzsch.

Eucolchicum Endl. 1841. Ench. p. 79. n. 1086 *a:* sect. Colchici.

Eucoldenia Endl. 1841. Ench. p. 320. n. 3749 *a:* sect. Coldeniae. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 558.
Synon. Coldenia Pers.

Eucollomia Benth. 1845 in DC. Prodr. IX. p. 307: sect. Collomiae.

Eucolocasia Schott 1832. Melet. bot. p. 18: sect. Colocasiae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1683 *a.* p. 236; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 37.
Synon. Colocasia Neck.

Eucolpodium Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 384: sect. Colpodii. (C. bulbosum.)

Eucomandra A. DC. 1857. Prodr. XIV. 2. p. 636: sect. Comandrae.

Eucombretum G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 662: sect. Combreti.
= Combretum Löfl.

*) *κνίδη*, Urtica.
**) *εὖ*; *κώδων*, campanula.

Eucomesperma Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 295: sect. Comespermae. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 82. — Endl. 1850. Spl. V. p. 81. n. 5649 *a*.

Eucomis*) L'Herit. 1788. Sert. angl. p. 17: nov. g. ex typo Fritillariae regiae L.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 798. n. 1743: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1798. Nov. gen. IX. p. 128; 1800. Pr. II. p. 184; 1818. Fl. cap. II. p. 294. — Willd. 1799. Sp. II. p. 92. n. 629; 1809. En. p. 364. — Pers. 1805. Ench. I. p. 359. n. 793.
Gis. 1792. Prael. p. 283: g. Coronariar.
Mönch 1794. Meth. p. 643: g. Petalostemonis.
Batsch 1802. Tab. p. 141: g. Tulipacear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 236; 1825. Syst. II. p. 75. n. 1226: g. Liliacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 323. — Eckl. 1827. Verz. p. 2.
Agdh. 1823. Aphor. p. 163: g. Asphodelear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXIX. 622. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 259. n. 1350. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1111.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1360; 1841. Nom. p. 49. n. 1783: g. Scillear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 50. — Meisn. 1842. Gen. p. 400 (303). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Link 1829. Hdb. I. p. 171: g. Hyacinthinar.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Endl. 1837. Gen. n. 1128. p. 145; 1841. Ench. p. 84: g. Hyacinthear. — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 301. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 303.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 19: g. Hyacinthinear.
Synon. Corona Regalis Dill.; Basilaea Juss.

Euconferveae Trevisan 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 466): subtrib. Confervear. Gen.: Draparnaudia, Myxonema, Bolbochaete, Chantransia, Conferva, Aphanizomenon, Nodularia, Protonema.

Euconocarpus DC. 1828. Prodr. III. p. 16: sect. Conocarpi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4538 *c*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 661.
= Conocarpus Gärtn.

Euconomorpha Miquel 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 305: sect. Conomorphae.

Euconospermum Endl. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 207; 1838. Gen. n. 2132 *a*. p. 339; 1841. Ench. p. 215: sect. Conospermi. — Par. Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 518; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 316.

Euconostegia DC. 1828. Prodr. III. p. 174: sect. Conostegiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4634 *b*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 785. — Endl. 1840. Gen. n. 6248 *b*. p. 1219; 1841. Ench. p. 647.

*) εὔκομης, pulchre comatus.

Euconvolvulus Spach 1840. Hist. vég. phan. IX. p. 98: subg. Convolvuli. (C. arvensis, tricolor.)
= Convolvulus Choisy.

Euconyzeae DC. 1836. Prodr. V. p. 375: subdiv. Conyzear. Gen.: Thespis, Karelinia, Berthelotia, Laennecia, Conyza, Phagnalon, Chionolaena, Elachothamnos. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 389; 1841. Ench. p. 235. Accedit 1842 (Spl. II. p. 41) Parastrephia. — Meisn. 1839. Gen. p. 190 (128). Gen. ead.

Euconyzeae Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 953: div. Conyzear. Subdivis.: Conyzeae legitimae, Döllieae, Iphioneae, Brachylaeneae.

Euconyzella Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 208: subsect. Conyzellae. (Conyza ambigua DC.)

Eucora Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 113: sect. Corae.

Eucoreopsis Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 357: sect. Coreopsidis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 613.

Eucoreopsis Torrey & Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 338: sect. Coreopsidis dilatata. Subsect.: Diodonta, Silphidium, Chrysostemma, Gyrophyllum, Leachia.

Eucoreta Endl. 1840. Gen. n. 5371 *b α*. p. 1008; 1841. Ench. p. 522: subsect. Coretae.
Synon. Coreta DC.; Maerlensia Fl. Flum.

Eucormos Endl. 1836. Gen. n. 316 *d*. p. 27; 1841. Ench. p. 17: sect. Physari.

Eucosia Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 415: nov. g. Orchidear.
Endl. 1837. Gen. p. 214. n. 1556: g. Neottiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2123. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 495; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Physuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1573. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 730.
Meisn. 1842. Gen. p. 386 (289): g. Physuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 21.

Eucosmanthus A. DC. 1845. Prodr. IX. p. 297: sect. Cosmanthi.
Synon. Cosmanthus Nutt.

Eucosmium Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 120: sect. Euastri.

Eucotula C. Koch 1843. Bot. Zeit. p. 39: sect. Cotulae. (C. coronopifolia L.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 991.

Eucouepia Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 212: sect. Couepiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 6.
Endl. 1842. Spl. II. p. 95. n. 6410 *b α*: subsect. Couepiae.

Eucouratari Berg 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 2. p. 507; 1858. Linnaea XXIX. p. 264: sect. Couratari.

Eucracca (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 468: sect. Craceae. (Vicia, Cracca L., etc.)

Eucraspedaria Fée 1852. Gen. Filic. p. 264: sect. Craspedariae.

Eucrassuleae Endl. 1839. Gen. p. 809; 1841. Ench. p. 405: sect. Crassulear. isostemonum. Gen.: Tillaea, Dasystemon, Septas, Crassula, Globulea. Accedit 1843 (Spl. III. p. 84) Telmissa.

Eucrepis Endl. 1838. Gen. n. 3022 *A*. p. 501; 1841. Ench. p. 251: sect. Crepidis. Subsect.: Intybus, Aetheorhiza, Berinia. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 161. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 161. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 821.
Synon. Crepidium Nutt.

Eucrinum „Nutt." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 204: g. Tulipear.

Eucrinum Römer 1847. Fam. nat. syn. IV. p. 11. 72: sect. Crini. (C. mauritianum Lodd., etc.)

Eucriphia Pers., Poir. vid. *Eucryphia Cavan.*

Eucroma Juss. vid. *Euchroma Nutt.*

Eucrosia*) Ker 1817. Bot. Regist. t. 207: nov. g. Liliacear. *Cf.* Spreng. n. Entd. I. p. 328.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 56. n. 1200; 1830. Gen. I. p. 274. n. 1424: g. Spathacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1175.
Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 182: g. Narcissear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1283. p. 178; 1841. Ench. p. 103. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1616. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (297). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 405. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158.
Herb. 1825. Bot. Mag. App. p. II; 1837. Amaryll. p. 75. 200: g. Amaryllidear. (Pancratiformium.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LV. 902.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1242: g. Amaryllear.
Römer 1847. France IV. p. 14. 154: g. Narcissinear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 504: g. Hippeastrear.
Synon. Callipsyche Herb.?

Eucrotalaria Benth. 1839. Ann. nat. hist. III. p. 429: sect. Crotalariae. — Simil. Endl. 1840. Gen. n. 6472 *a*. p. 1262; 1841. Ench. p. 668.

Eucroton Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 354: sect. Crotonis. Species typicae.

Eucrotoneae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 340 (353): subtrib. Crotonear. Gen.: Crotonopsis, Codiaeum, Croton, Julocroton, Crozophora, Chiropetalum, Ditaxis, Monotaxis?, Caperonia, Argythamnia.

Eucryphaea C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 165: subsect. Cryphaeae.
Synon. Moritzia Hampe.

Eucryphia**) Cavan. 1797. Icon. IV. p. 48. t. 372: nov. g. Polyandr. Polygyn. (E. cordifolia.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 92. n. 1342 (*Eucriphia*). — Spreng. 1825. Syst. II. p. 634. n. 2019; 1831. Gen. II. p. 803. n. 4156.

Eucryphia Cavan. cont.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 24: g. Hypericear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 522 (*Eucriphia*). — Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 345. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 870: g. Rosaceis aff.
Choisy 1821. Prodr. Hyper. p. 62; 1824 in DC. Pr. I. p. 556: g. Hypericinear. anomalar.
Rchb. 1828. Consp. p. 210. n. 5465: g. Eucryphiear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 613. — Endl. 1840. Gen. n. 5403. p. 1016; 1841. Ench. p. 528. Sect.: Carpodontos, Eucryphia. — Planch. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 261.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Carpodontear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 294. — Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33). — Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8010.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 344 adnot. (Injungitur Carpodontos.)
Gay 1846. Hist. Chil. Bot. I. p. 348: g. Eucryphiaceear. *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 130.
Synon. Carpodontos Labill.; Pellinia Molin. (Steud.)

Eucryphiaceae Gay 1846. Hist. Chil. Bot. I. p. 348 (Bot. Zeit. 1848. p. 130): ordo plant. Gen.: Eucryphia.

Eucryphieae Rchb. 1828. Consp. p. 210: subdiv. Hypericear. Gen.: Eucryphia, Carpodontos.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 613: trib. Hypericinear. Gen. ead. et Eliea, Cratoxylum, Haronga.
Endl. 1840. Gen. p. 1016; 1841. Ench. p. 528: fam. Guttiferar. Gen.: Eucryphia.
Planch. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 261: fam. Cunoniaceis proxima.

Eucryptandra Reissek 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 285: subg. Cryptandrae. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 268. — Simil. Endl. 1850. Spl. V. p. 85. n. 5742 *a*.

Eucryptocarya Endl. 1837. Gen. n. 2036 *a*. p. 318; 1841. Ench. p. 197: sect. Cryptocaryae.

Euctenodeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Gigartinear. Gen.: Euctenodus, Phacelocarpus.

Euctenodonteae Montagne 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: trib. Floridear. Gen.: Euctenodus, Phacelocarpus.

Euctenodus Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 5; 1849. Sp. Alg. p. 769. n. 514: g. Gelidiear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106: g. Euctenodear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Euctenodontear.
Synon. Ctenodus Kütz. olim, non Zoolog.

Eucurcas Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 314: sect. Curcadis. (Jatropha Curcas L.)

Eucuscuta Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 76: sect. Cuscutae. (C. europaea, Epithymum, planiflora.)

---

*) χροσσός, fimbria. (?)
**) „εὖ, κρύφια, bene tecta."

Eucyathea Presl 1836. Pterid. p. 55: sect. Cyatheae.
= Schizocaena Smith. (Endl.)
Eucyathea Hook. 1844. Spec. Filic. I. p. 16: subg. Cyatheae.
Eucyatheae Fée 1852. Gen. Filic. p. 39. 345. 351: subtrib. Cyathear. Gen.: Cyathea, Schizocaena.
Eucyathocoma Fenzl 1841 in Endl. Gen. Suppl. I. n. 968/$_1$ *a*. p. 1355; 1841. Ench. p. 63: sect. Cyathocomae.
Eucybianthus Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 65. n. 4220 *a:* sect. Cybianthi. — Par. Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 292.
Eucycla Nuttall 1848. Plant. Gambel.: nov. g. Polygonear.
Eucyclopia Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 67; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 432 (sphalm. *Encyclopia):* sect. Cyclopiae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6422 *a*. p. 1255; 1841. Ench. p. 667. — Walp. 1842. Rep. I. p. 564.
Eucymba Endl. 1839. Gen. n. 4009 *b*. p. 693; 1841. Ench. p. 340: sect. Cymbariae. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 399.
Eucymbelleae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 96: subtrib. Cymbellear. Gen.: Cymbella, Cocconema.
Eucymbidium Lindl. 1833. Gen. Orchid. p. 161: sect. Cymbidii. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1427 *a*. p. 199; 1841. Ench. p. 111.
Eucymopterus Torrey & Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 623: sect. Cymopteri. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4491 *a*. p. 1414; 1841. Ench. p. 379. — Walp. 1843. Rep. II. p. 417.
Eucynanchum Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 68: sect. Cynanchi. (C. acutum.)
Synon. Scammonea Koch.
Eucynareae Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 336; . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 371: subdiv. Carduinear. Gen.: Cynara, Silybum. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 430.
Eucynosurus (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 562: sect. Cynosuri.
= Cynosurus Linn.
Eucynthia DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 89: sect. Cynthiae. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Amer. II. p. 469.
Eucyperus Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 420: sect. Cyperi. (C. fuscus, longus, etc.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 621. — Liebm. 1850. Mexico's Halvgräs.
Synon. Etymocyperus Webb.
Eucyphia Presl 1837 in E. Meyer Comm. pl. Afr. II. p. 293: sect. Cyphiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3041 *a*. p. 507; 1841. Ench. p. 261.
Eucyrtandreae Endl. 1839. Gen. p. 718: trib. Cyrtandrear. Gen.: Cyrtandra, Whitia, Rhynchothecum, Fieldia; Centronia. *Dubia:* Platystemma, Stauranthera, Corysanthera, Pieria. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 349. Gen.: Fieldia, Rhynchothechum, Gasparinia, Cyrtandra, Whitia; Pieria.
Eucyrtanthus Römer 1847. Fam. nat. syn. IV. p. 9. 47: sect. Cyrtanthi.
Kunth 1850. Enum. V. p. 534: subsect. Cyrtanthi.
Eucytineae Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 551: trib. Cytinear. Gen.: Cytinus, Hydnora.
Eucytisus Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 7: sect. Cytisi. (C. supinus, hirsutus, etc.)
Eudacinus Rafin. 1814. Somiol. n. 64. p. 51 (ex Endl. Gen. p. 28). *Cf. Endacinus.*
= Polysaccum DC.
Eudalbergia Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 264: sect. Dalbergiae.
Dalbergia Benth.
Eudanaea Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 294: sect. Danaeae.
Eudaphne Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 441: sect. Daphnes. (D. sericea et odora.)
= Eudaphnes Endl. pars.
Eudaphne C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 358: sect. Daphnes. (D. Laureola, etc.)
= Daphnanthes Endl.
Eudaphne Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 67. n. 2106/$_7$ *b:* sect. Daphnes. Subsect.: Laureola, Daphnanthes.
Synon. Daphne Meyer; Thymelaea, Eudaphne et Laureola Spach.
Eudaphneae Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 59: subdiv. Thymelear. Gen.: Dirca, Daphne, Hargasseria, Lasiadenia, Eriosolena, Wikströmia.
Eudavallia Endl. 1841. Ench. p. 37. n. 643 *c:* sect. Davalliae. Subsect.: Humata, Pachypleuria, Colposoria, Odontosoria.
Synon. Davallia Presl.
Eudavallia Hook. 1844. Spec. Filic. I. p. 161: subg. Davalliae restrictum. (D. canariensis Sm., etc.)
Eudavya Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 135: sect. Davyae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 789.
Eudecaloba Endl. 1839. Gen. n. 5098 *c α*. p. 926; 1841. Ench. p. 483: subsect. Decalobae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 789.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 131. 152: sect. Decalobae.
Synon. Decaloba DC.
Eudema*) Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 133. t. 123. 124: nov. g. Cruciferar. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 522.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 79: g. Siliculosar. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 139. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 673.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 240; 1821. Syst. II. p. 518; 1824. Pr. I. p. 202: g. Camelinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4779; 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 181. n. 6977. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 215. — Meisn. 1837. Gen.

*) Dicat. Eudemio Rhodio, Aristotelis discipulo.

Eudema Humb. & Bonpl. cont. p. 13 (13). — Endl. 1839. Gen. n. 4921. p. 877; 1841. Ench. p. 450.
Planch. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 619. t. 22. Char. emend.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Camelinidar.

Eudendrobium Lindl. . . . . in Paxt. Fl. gard. I. sub t. 27: sect. Dendrobii. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 637.

Eudendrophthoë Endl. 1839. Gen. n. 4586 *a β.* p. 802; 1841. Ench. p. 399: subsect. Dendrophthoës.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 818: sect. Dendrophthoës.

Euderminus Fries 1836. Epicr. p. 209: sect. Crepidoti.

Eudeschampsia (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 507: sect. Deschampsiae. (Aira caespitosa L.)

Eudesma Rchb. vid. *seq.*

Eudesmia R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 599 (Verm. bot. Schr. I. p. 141): nov. g. Myrtacear. *Cf.* Bull. soc. philom. 1815. p. 137. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 524.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 852; 1826. Syst. III. p. 338. n. 2623; 1831. Gen. II. p. 598. n. 2949: g. Myrtear. — Par. Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 80.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV (*Eudesma*): g. Calothamnear.
DC. 1828. Pr. III. p. 216: g. Melaleucear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 817. — Meisn. 1837. Gen. p. 107 (76). — Schauer 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 5.
Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4667: g. Chamaelauciear.
Bartl. 1830. Ord. p. 331: g. Leptospermear. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 105. — Endl. 1840. Gen. n. 6299. p. 1228; 1841. Ench. p. 650. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 737.
Rchb. 1837. Hdb. p. 253; 1841. Nom. p. 176. n. 6834: g. Bäkeear.

Eudesmodium DC. 1825. Prodr. II. p. 325: sect. Desmodii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4000 *a.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 288. — Endl. 1841. Gen. n. 6615 *a.* p. 1285; 1841. Ench. p. 670.
Synon. Dendrolobium Wight & Arn.

Eudiandra Dumort. vid. *Endiandra R. Brown.*

Eudianthe Rchb. 1832. Fl. exc. p. 824: sect. Lychnidis. — Par. A. Braun 1839. Flora p. 319.
Endl. 1840. Gen. n. 5249 *b.* p. 973; 1841. Ench. p. 506: sect. Viscariae.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7833: g. Lychnidear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 78. n. $5248/_2$. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 291.
A. Braun 1843. Flora p. 373 (*Eudyanthe*): sect. Silenes.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498: g. Silenear.
Synon. Coronaria Fries; Pontinia Fries.

Eudianthus Willkomm . . . . Ic. pl. nov. Hisp. p. 25: subg. Dianthi. Sect.: Armeriastrum, Caryophyllum. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 265.

Eudiarthron C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 359: sect. Diarthri. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 63. n. 2099 *A.*

Eudiatomeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 94: subtrib. Diatomear. Sect.: Meridieae, Fragilarieae.

Eudichelyma C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 143: subsect. Dichelymae.

Eudicksonia Fée 1852. Gen. Filic. p. 335: subg. Dicksoniae.

Eudicksonieae Hook. 1844. Spec. Filic. I. p. 64: subtrib. Dicksoniear. Gen.: Thyrsopteris, Dicksonia, Cibotium, Deparia, Loxsoma, Hymenophyllum, Trichomanes.

Eudicoma DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 36: sect. Dicomae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2930 *a.* p. 1386; 1841. Ench. p. 248.
Synon. Dicoma Cass.; Leucophyton Less.; Xeropappus Wall.; Schaffnera Schultz.

Eudicraea Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 100; 1852. Arch. Mus. VI. p. 115: sect. Dicraeae. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 436. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 782.
Synon. Dicraeia Pet.-Thouars.

Eudictya „Ehrenb." Kütz. Sp. Alg. p. 126 in synon. Coscinodisci: vid. *Endictya Ehrenb.*

Eudictyota Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 451: subg. Dictyotae.
Dictyota Kütz.

Eudictyoteae Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 450: subtrib. Dictyotear. Gen.: Dictyota, Dictyopteris, Orthosorus, Aglaozonia, Zonaria.

Eudidymocarpeae „DC. mss." Meisn. 1840. Gen. p. 302 (211): subtrib. Didymocarpear. Gen.: Didymocarpus, Streptocarpus, Chirita, Platystemma, Dorcoceras. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 264. Gen.: Didymocarpus, Chirita, Streptocarpus, Baea.

Eudidymoglossum Presl 1843. Hymenophyll. p. 115: sect. Didymoglossi. (Trichomanes reptans Sw.)

Eudieteria Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 39. n. $2365/_1$ *a:* sect. Dieteriae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 586.
Synon. Dieteria Torr. & Gray.

Eudigitalis Lemaire 1849 in Orb. Dict. V. p. 13: sect. Digitalis.
Synon. Digitalis Lindl. sect.

Eudillenia Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 69: sect. Dilleniae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 34.
Synon. Dillenia DC.

Eudimeria Lemaire 1849 in Orb. Dict. V. p. 18: sect. Dimeriae.

Eudimorphandra Tulasne 1844. Arch. Mus. IV. p. 183: sect. Dimorphandrae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 574.

Eudioclea Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 133: sect. Diocleae. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6662 *b.* p. 1294; 1841. Ench. p. 671. — Walp. 1842. Rep. I. p. 765.

E u d i o d i a DC. 1830. Prodr. IV. p. 561: sect. Diodiae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 624. — Endl. 1838. Gen. n. 3123 *a.* p. 527; 1841. Ench. p. 271.

E u d i o s m a DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 140; 1824. Prodr. I. p. 716: sect. Diosmae. *(Diosma Wendl.* et *Willd.)* — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 824.
= Diosma Berg.

Eudiosmeae Endl. 1840. Gen. p. 1156; 1841. Ench. p. 612: trib. Diosmear. Gen.: Calodendron, Adenandra, Coleonema, Diosma, Euchaetis, Acmadenia, Barosma, Agathosma, Macrostylis, Empleurum. Accedunt 1850 (Spl. V. p. 103) Gymnonychium, Empleurosma.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471: trib. Rutacear. Gen. ut Endl. 1841 et Pachystigma, Gymnonychium.

E u d i o s p y r o s A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 224: sect. Diospyri. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1045.
Synon. Ebenus et Embryopteris Endl.

E u d i p l a c i u m Endl. vid. *Eudiplazium.*

E u d i p l a d e n i a A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 481: sect. Dipladeniae.

E u d i p l a z i u m Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 636 *a.* p. 1349; 1841. Ench. p. 36 *(Eudiplacium):* sect. Diplazii.
Diplazium Presl, Fée.

E u d i p l a z i u m Fée 1852. Gen. Filic. p. 213: sect. Diplazii restricti.

E u d i p l o s t e p h i u m DC. 1836. Prodr. V. p. 272: sect. Diplostephii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2319 *a.* p. 376; 1841. Ench. p. 234.
= Triplopappus Torr. & Gray.

E u d i s a Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 1537 *a.* p. 1365; 1841. Ench. p. 112: sect. Disae.

E u d i s c o p l e a Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 95: subg. Discopleae.
Synon. Discoplea Ehrenb.

E u d i s s o c h a e t a Endl. 1840. Gen. n. 6246 *a.* p. 1219; 1841. Ench. p. 647: sect. Dissochaetae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 144.

E u d o d e c a Spach vid. *Endodaca Raf.*

E u - D o d o n a e a Miquel 1844. Linnaea XVIII. p. 94: sect. Dodonaeae.

E u d o l i c h o s DC. 1825. Prodr. II. p. 397: sect. Dolichi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3940 *a.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 357.
Dolichos Linn.

E u d o m b e y a Planchon . . . . Fl. d. serr. VI. p. 225: sect. Dombeyae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 326.

E u d o n a x Fries 1843. Bot. Notiser p. 131: g. pro Arundinis L. speciebus (?) propositum. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 381.

Eudontospermeae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 955: subdiv. Dontospermear. Gen.: Rhanterium, Telekia (sphl. *Telek*), Dontospermum.

E u d o r i n a Ehrenb. 1831. Monatsber. Berl. Ak. p. 78. 152.
Cohn 1856 in Ann. sc. nat. 4e sér. V. p. 323: g. Volvocinear.

E u d o r o n i c u m DC. 1837. Prodr. VI. p. 320: sect. Doronici. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2802 *a.* p. 457; 1841. Ench. p. 224. — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 330; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 253.
Synon. Pardalianches Tausch.

E u d o r s t e n i a Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 35. n. 1860 *b:* sect. Dorsteniae.

E u d o r u s Cassini 1818. Bull. soc. philom. Nov. p. 165; 1819. Dict. v. 15. p. 525; 1827. v. 48. p. 448. 458; 1830. v. 60. p. 583: nov. g. Senecionear. (1827 Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2507. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32. (verar.)
= Senecionis Linn. pars.

E u d o r y o p t e r i s Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 342: sect. Doryopteridis.
Doryopteris Smith, Fée.

E u d o x i a*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 174. 202: nov. g. Contoubear. (E. formosissima.)
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 120: g. Swertiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614: g. Gentianear.

E u d r a b a (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 122: sect. Drabae.
Draba DC.

E u d r a c o p h y l l u m Endl. 1839. Gen. n. 4292 *b.* p. 750; 1841. Ench. p. 368: sect. Dracophylli.
Synon. Epacris Forst.

E u d r i m y s DC. 1824. Prodr. I. p. 78 *(Eudrymis):* sect. Drimydis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4968 *a (Eudrymis).* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 79.

Eudryadeae Torrey & Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 419: subtrib. Dryadear. Gen.: Dryas, Geum, Waldsteinia.
Endl. 1840. Gen. p. 1245; 1841. Ench. p. 659: sect. Dryadear. Gen. ead. et Comaropsis, Sieversia, Fallugia, Cowania, Coluria.

E u d r y a n d r a Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 589; 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 467: sect. Dryandrae. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 89. n. 2158 *a.*

E u d r y m i s DC., Rchb. vid. *Eudrimys.*

E u d r y m o g l o s s u m Fée 1852. Gen. Filic. p. 94: sect. Drymoglossi.
Synon. Drymoglossum Presl.

E u d r y n a r i a Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 615 *k γ bb.* p. 1347; 1841. Ench. p. 36: subsect. Drynariae.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 270: sect. Drynariae.
Synon. Drynaria Bory; Drymaria Rchb.

E u d r y o p t e r i s Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 639 *c α.* p. 1349; 1841. Ench. p. 37: subsect. Dryopteridis.

E u d u d r e s n a y a Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 105: subg. Dudresnayae. (Dudresnaya Crouan.)

*) δόξα, gloria.

Eududresnayeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 104: subtrib. Dudresnayear. Gen.: Dudresnaya, Gymnophlaea, Galaxaura, Actinotrichia.

Eudunbaria Benth. 1852. Pl. Jungh. Fasc. II. p. 242 adnot.: sect. Dunbariae.

Eudyanthe A. Braun vid. *Eudianthe Rchb.*

Eudysodia DC. 1836. Prodr. V. p. 639: sect. Dysodiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2577 *a.* p. 419; 1841. Ench. p. 239.

Eueccremocarpus DC. 1845. Prodr. IX. p. 238: sect. Eccremocarpi.
Synon. Eccremocarpus Don.

Euechites Endl. 1841. Ench. p. 294. n. 3409 *a:* sect. Echitis.
— Echites G. Don.

Euechites A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 447: sect. Echitis restrict.

Euechium Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 82: sect. Echii. — Par. DC. 1846. Pr. X. p. 16.
Synon. Echium Buek.

Eueclipta DC. 1836. Prodr. V. p. 490: sect. Ecliptae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2446 *a.* p. 397; 1841. Ench. p. 236.
Synon. Eupatoriophalacron Vaill.; Micrelium Forsk.

Eueclopes DC. 1837. Prodr. VI. p. 288: sect. Eclopis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2782 *a.* p. 454; 1841. Ench. p. 244.
Synon. Eclopes Less.

Euegenolfia Fée 1852. Gen. Filic. p. 48: sect. Egenolfiae. (E. Hamiltoniana Schott.)

Euehretia DC. 1845. Prodr. IX. p. 502: sect. Ehretiae.
Synon. Ehretia P. Browne.

Euelaea DC. 1844. Prodr. VIII. p. 284: sect. Oleae.
Synon. Oleaster Endl.

Euelephantopus Endl. 1838. Gen. n. 2231 *a.* p. 362; 1841. Ench. p. 232: sect. Elephantopodis. — Par. Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 514. — Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 390.
Synon. Elephantopus Less.

Euelettaria Miquel 1858. Fl. Ind. bat. III. p. 600: sect. Elettariae.

Euelsholtzia Endl. 1841. Ench. p. 306. n. 3588 *c:* sect. Elsholtziae.
Synon. Elsholtzia Willd.; Elsholzia Mönch.

Euelvasia Planchon 1846. Lond. journ. bot. V. p. 648: subg. Elvasiae. — Simil. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 179. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99. n. 5961 *a.*

Euembelia A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 81; 1844. Prodr. VIII. p. 83: sect. Embeliae.

Euepidendrum Lindl. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 81; 1853. Fol. Orchid. (10 Jan.) p. 75: subg. Epidendri. *Cf.* Endl. 1842. Spl. II. p. 16. n. 1371 *k.*
Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 137: subsect. Acranthii.

Euepigaea DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 591: sect. Epigaeae.
Synon. Epigaea Linn.; Memaecylon Mitch.

Euepipactis Irmisch 1842. Linnaea XVI. p. 450; 1846. ibid. XIX. p. 113: sect. Epipactidis. (E. latifolia.)

Euepistylium Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 647: sect. Epistylii.

Eueranthemum Endl. 1841. Ench. p. 344. n. 4087 *a:* sect. Eranthemi.

Euerica Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 654: subg. Ericae. Sect.: Eurystegia, Trigemma, Oxyloma, Pseuderemia, Pachysa, Anaclasis, Hermes, Loxomeria, Eremocallis, Pyronium, Gypsocallis, Ceramia, Ephebus, Orophanes, Leptodendron, Heliophanes, Lophandra, Melastemon, Eurystoma, Polycodon, Elytrostegia, Arsace, Chlorocodon. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d.* p. 1412; 1841. Ench. p. 370. Sect. eaed.

Euericeae Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 612: subtrib. Ericear. Gen.: Macnabia, Calluna, Pentapera, Erica, Bruckenthalia, Philippia, Ericinella, Blaeria. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 753; 1841. Ench. p. 369. Gen. ead.

Euerigeron DC. 1836. Prodr. V. p. 283: sect. Erigerontis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2332 *a.* p. 378; 1841. Ench. p. 234. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 167. (inclusa Trimorphaea DC.)
Synon. Erigeron Cass.; Leptostelma Don; Terranea Colla.

Eueriocaulon Körnicke 1856. Linnaea XXVII. p. 599: sect. Eriocaulonis.

Eueritrichium A. DC. 1846. Prodr. X. p. 124: sect. Eritrichii. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 149.

Euernia Link vid. *Evernia Achar.*

Euerodium Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 121: sect. Erodii. (E. moschatum, cicutarium, etc.)

Euerythracanthus Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 526: sect. Erythracanthi. (Spec. genuinae s. indicae.)

Euerythraea Griseb. 1839. Gen. et sp. Gent. p. 136; 1844. Rumel. II. p. 61; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 57: sect. Erythraeae.

Euevax DC. 1836. Prodr. V. p. 458: sect. Evacis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2420 *a.* p. 392; 1841. Ench. p. 236.

Euexocarpos A. DC. 1857. Prodr. XIV. 2. p. 689: sect. Exocarpi.

Eufabronia C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 31: sect. Fabroniae.

Eufagraea Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 11. p. 169: sect. Fagraeae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 76. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 367.

Eufaramea DC. 1830. Prodr. IV. p. 496: sect. Farameae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 578. — Endl. 1838. Gen. n. 3154 *a.* p. 534; 1841. Ench. p. 272. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 448.
Synon. Faramea Aubl.; Famarea Vitm.

Euferulago Fenzl 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 8. n. $4458/_1$ *a:* sect. Ferulaginis.
Synon. Ferulago Koch; Steganotaenia Hochst.?

Eufestuca Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 432; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 350: sect. Festucae. (F. ovina, elatior, etc.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 412. (restrict.)
Synon. Festuca Palis.

Eufirmiana Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 61. n. $5321/_2$ *a:* sect. Firmianae.
Synon. Firmiana Schott & Endl.

Eufissidens C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 50: sect. Fissidentis. — Par. Id. 1851. ibid. II. p. 529. Sejungitur Sciarodium.

Euflagellaria Hook. f. 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 200: subg. Flagellariae.

Eufluggea Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 592: sect. Fluggeae.

Eufragia Caesalp. 1583. De plant. lib. 8. (Linn. 1747. Cl. pl. p. 17 = Euphrasia.)
Columm. 1616. Ecphras. II. p. 68. (ex Koch Syn. p. 629.)
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 13: g. Rhinanthear. (Euphrasia latifolia L.)
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 542: g. Bartsiear. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 258.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Euphrasiear.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 611: g. Scrophulariacear.
Synon. Euphrasiae, Bartsiae et Trixaginis sp. Auct.

Eugärtnera Endl. 1841. Ench. p. 289. n. 3370 *a:* sect. Gärtnerae.
Synon. Andersonia Willd.

Eugahnia Endl. 1837. Gen. n. 982 *b.* p. 115; 1841. Ench. p. 64: sect. Gahniae.

Eugaillardieae DC. 1836. Prodr. V. p. 651: subdiv. Gaillardiear. Gen.: Gaillardia, Balduina, Leptopoda. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 420; 1841. Spl. I. p. 1383; 1841. Ench. p. 239. Gen. ead. et (1841) Achyrachaena. — Meisn. 1839. Gen. p. 205 (132). Gen. ead.

Eugalatella (Rchb. Ic. fl. Germ. XVI. p. 7) Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 174: sect. Galatellae.

Eugalaxaura Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 115: sect. Galaxaurae. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 22. n. 76 *b.* — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 530.

Eugalenia Fenzl 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 288: subg. Galeniae. — Simil. Endl. 1839. Gen. n. 5166 *b.* p. 948; 1841. Ench. p. 500. — Walp. 1843. Rep. II. p. 232.
Synon. Sialodes Eckl. & Zeyh.: Aizoi sp. Eorund.

Eugalinsogeae DC. 1836. Prodr. V. p. 668: subdiv. Galinsogear. Gen.: Lemmatium, Calydermos, Meyeria, Callilepis, Calea, Allocarpus, Vargasia, Galinsoga, Sogalgina, Ptilostephium, Tridax, Layia (DC. Pr. VII. p. 294), Blepharipappus, Marshallia, Dubautia. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 425; 1841. Ench. p. 240. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 207 (133). Gen. ut DC. (Urostylis loco Layiae) et Galeana?, Dimerostemma?

Eugalium DC. 1830. Prodr. IV. p. 593: sect. Galii. Subsect.: Leiogalium, Platygalium, Trichogalium, Coccogalium, Erythrogalium, Xanthogalium, Ericogalium, Maschaligalium. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. III. p. 647. Subsect. eaed. — Webb . . . . Canar. II. p. 185.

Eugalium Tausch 1835. Flora I. p. 338: sect. Galii. Subsect.: Staurogalion, Asterogalion, Aparine, Cruciata.

Eugalium Koch 1836. Syn. p. 332. Ed. II. p. 364: sect. Galii restricta. — Simil. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 158. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 18. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 465.
Eugalii DC. pars.

Eugamelia Flor. mexic. ic. ined.
= Elvira DC.

Eugardenia Endl. 1841. Ench. p. 275. n. 3305 *a:* sect. Gardeniae.
Synon. Gardenia Ell.

Eugardenieae Endl. 1838. Gen. p. 558: subtrib. Gardeniear. Gen.: Catesbaea, Hoffmannia, Higginsia, Petunga, Fernelia, Coccocypselum, Petesia, Stylocoryne, Pouchetia, Bertiera, Pomatium, Hippotis, Helospora, Menestoria, Heinsia, Chapelieria, Griffithia, Hyptianthera, Randia, Gardenia, Genipa, Oxyanthus, Posoqueria, Tocoyena, Gynopachys, Cassupa, Kutchubaea, Mussaenda, Amaioua, Burchellia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1394 et Ench. p. 274) Argostemma, Neurocalyx, Alberta, Acranthera, 1842 (Spl. II. p. 54) Aspidanthera, Conosiphon, Sphinctanthus et 1843 (Spl. III. p. 73) Lasiostemon.

Eugastrodia Miquel 1858. Fl. Ind. bat. III. p. 717: sect. Gastrodiae.

Eugastrolepis Schultz Bip. 1847 in Walp. Rep. VI. p. 196: subsect. Gastrolepidis.

Eugastrostylum Schultz Bip. 1847 in Walp. Rep. VI. p. 195: sect. Gastrostyli.

Eugeissona Griff. . . . . Calcutta journ. V. p. 101.
Mart. . . . . Gen. Palm. III. p. 212: g. Lepidocaryinar. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 492.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Calamear.
Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 77: g. Lepidocaryinear.

Eugenia*) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 226. t. 108: g. pl. class. XXI.
Linn. 1737. Gen. p. 139. n. 391; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 470; 1759. Syst. ed. X. p. 1055. n. 542; 1762. Sp. ed. II. p. 672; 1764. Gen. ed. VI. p. 247. n. 616; 1767. Syst. ed. XII. p. 340: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 384; 1784. Syst. p. 461. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 495. t. 195—202. — Reich. 1778. Gen. p. 253. n. 671. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 333. n. 842. — Lour. 1790. Coch. I. p. 306. — Pers. 1797. Syst. p. 494. — Willd. 1799. Sp. II. p. 959. n. 972; 1809. En. p. 514. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 43. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 482.

*) Dicat. Eugenio, principi Sabaudiae.

Eugenia Micheli cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 274. n. 1125: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Arbustivor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 324.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Hesperidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 346.
Scop. 1777. Intr. p. 217: g. Calycanthemar.
Gmel. 1791. Syst. p. 787: g. Polyandr. Monogyn.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 326: g. Myrtoidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 163: g. Myrtear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 849; 1830. Gen. I. p. 404. n. 2022. — Poir. 1819. Dict. v. 15. p. 528. — Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 80. — DC. 1826. Dict. class. XI. p. . . . ; 1828. Pr. III. p. 262. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV; 1828. Consp. p. 176. n. 4681. — St. Hil. 1829. Fl. Bras. II. p. 334. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — Bartl. 1830. Ord. p. 332. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 851. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 174. — Meisn. 1838. Gen. p. 109 (77). — Endl. 1840. Gen. n. 6323. p. 1233; 1841. Ench. p. 651. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 123. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 582. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 86. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 440.
Pers. 1807. Ench. II. p. 27. n. 1206: g. Myrtacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 28; 1831. Hdb. II. p. 68. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 330. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 36. 56. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 71.
Rchb. 1837. Hdb. p. 253; 1841. Nom. p. 177. n. 6852: g. Eugeniear.
Berg 1855. Linnaea XXVII. p. 140; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 214: g. Eugenioidear. (Sp. 289.)
Synon. Plinia Linn.; Guapurium Juss.; Greggia Gärtn.; Rugenia Neck.; Olynthia Lindl.; Calophylloides Smeathm.; Suarda Nocca. (Steud.)

Eugenieae Rchb. 1837. Handb. p. 253: sect. Myrtear. genuinar. Gen.: Calyptranthes, Myrcia, Syzygium, Caryophyllus, Acmena, Crossostylis, Eugenia, Jambosa; Catinga? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 177. Gen.: Myrcia, Marlierea, Calyptranthes, Syzygium, Caryophyllus, Acmena, Eugenia, Jambosa.

Eugenioideae Berg 1855. Linnaea XXVII. p. 135; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 213 (Bot. Zeit. 1857. p. 677): subtrib. Myrtear. Gen.: Caryophyllus, Acca, Eugenia, Phyllocalyx, Stenocalyx, Myrcianthes, Mitranthes, Calycorectes, Schizocalyx, Myrciaria, Syzygium, Jambosa, Siphoneugena, Hexachlamys, Aulacocarpus.

Eugenioides Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 192. n. 409: g. Icosandr. obscurum. (*Bobu Herm.*)
= Bobua DC.

Eugeniopsis Berg 1855. Linnaea XXVII. p. 80; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 143: nov. g. Myrcioidear. (Eugenia sylvatica Gardn., etc.)

Eugeniosporum Endl. 1841. Ench. p. 306. n. 3570 *a*: sect. Geniospori.
Synon. Geniosporum Benth.

Eugenista (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 351: sect. Genistae.

Eugentianeae Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 232: trib. Gentianear. Gen. afr.: Sebaea, Chironia.

Eugeranium (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 297: sect. Geranii.

Eugerardia Benth. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 206: sect. Gerardiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 557. — Endl. 1839. Gen. n. 3996 *d*. p. 691; 1841. Ench. p. 340. — Walp. 1843. Rep. II. p. 382.
Synon. Virgularia Ruiz & Pav.; Gerardia Benth. in DC. Pr. X. p. 514.

Eugerbera DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 15: sect. Gerberae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2929/4 *a*. p. 1386; 1841. Ench. p. 248. — Schultz Bip. 1847 in Walp. Rep. VI. p. 315.
Synon. Gerbera Less.

Eugesnera Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 4155 *a*. p. 1408; 1841. Ench. p. 349. n. 4165 *a*: sect. Gesnerae.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 203: subg. Gesnerae restrict. (G. macrostachya et cochlearis.)

Eugesnereae Endl. 1839. Gen. p. 721: trib. Gesnerear. Gen.: Gesnera, Trevirana, Gloxinia, Rhytidophyllum, Conradia; Bellonia? Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1408 et Ench. p. 349) Solenophora et 1842 (Spl. II. p. 106) Niphaea.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 199: subtrib. Gesnerear. Gen.: Rechsteineria, Gesnera, Dircaea.
Oersted 1858. Gesn. centroam. p. 9: div. Gesnerear. Gen. ut Hanst.

Eugesneria DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 527: sect. Gesneriae.

Eugeum Torrey & Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 420: sect. Gei.
Synon. Caryophyllastrum et Calligeum Fisch. & Mey.; Dryados Tausch.

Eugigartina Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 174: sect. Gigartinae.

Eugigartineae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Gigartinear. (*Gigartineae Kütz.* 1843.)
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 160: trib. Gigartinear. Gen.: Gigartina, Iridaea, Chondrus.

Eugilia Benth. 1833. Bot. Regist. n. 1622 (*cf.* Linnaea X. Litt. p. 24); 1845 in DC. Prodr. IX. p. 311: sect. Giliae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 245. — Endl. 1839. Gen. n. 3821 *g*. p. 657; 1841. Ench. p. 327. — Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179). — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 346 (*Eugillia*).
Synon. Courtoisia Rchb.?

Eugillia Wittst. vid. *praeced.*

Eugleichenia Hook. 1844. Spec. Filic. I. p. 2: subg. Gleicheniae. (G. speluncae R. Br., etc.) — Simil. Hook. f. 1853. N. Zeal. II. p. 5.

Euglinus Endl. 1840. Gen. n. 5185 *a.* p. 952; 1841. Ench. p. 501: sect. Glini.
Synon. Rolofa Adans.; Physa Pet.-Th.; Plenckia Raf.; Doosera Roxb.; Paulo-Wilhelmia Hochst.

Euglossodia Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 1594 *a.* p. 1367; 1841. Ench. p. 114: sect. Glossodiae.

Euglossophyllum C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 231: subsect. Glossophylli.

Eugloxinia G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 649: sect. Gloxiniae. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 533. — Endl. 1841. Ench. p. 349. n. 4167 *a.*
Synon. Paliavana Vell.; Gloxinia Lindl.

Euglyceria Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 390: sect. Glyceriae. (G. fluitans.) — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 531.
Synon. Festucaria Fabr.

Eugnaphalieae Fenzl 1839. Flora II. p. 727: subdiv. Helichrysear. Gen.: Rytidosis, Quinetia, Podotheca, Leptorhynchus, Rhodanthe, Millotia, Ixiolaena, Panetia, Swammerdamia, Ozothamnus, Eriosphaera, Leontonyx, Helichrysum, Helipterum, Phaenocoma, Aphelexis, Stenocline, Achyrocline, Anaxeton, Anaphalis, Gnaphalium, Antennaria, Leontopodium, Cladochaeta, Pteropogon, Lasiopogon, Metalasia, Erythropogon, Pterothrix, Pachyrhynchus, Elytropappus.

Eugnaphalium DC. 1837. Prodr. VI. p. 222: sect. Gnaphalii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2476 *a.* p. 447; 1841. Ench. p. 243. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 426. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 196. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 608. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 91.
Synon. Gnaphalium Cass.; Gnaphalion Koch.

Eugnaphalium Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 312: sect. Gnaphalii ampliati.
Gnaphalium DC.

Eugnidia Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 64. n. 2102 *a:* sect. Gnidiae. — Par. Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 580.

Eugochnatia Endl. 1838. Gen. n. 2915 *a.* p. 484; 1841. Ench. p. 248: sect. Gochnatiae.
Synon. Gochnatia Less.; Vernonioides DC.

Eugodoya Planchon 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 260; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 598: subg. Godoyae. — Simil. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 122. — Endl. 1850. Spl. V. p. 98. n. 5957 *a.*

Eugomphia Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 4: sect. Gomphiae. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 182. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99. n. 5961/2 *b.*

Eugomphocarpus Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 557: sect. Gomphocarpi.

Eugomphrena Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 43. n. 1958 *d:* sect. Gomphrenae.
Synon. Gomphrena Mart.; Schultesia Schrad.; Bragantia Vand.; Wadapus et Ninanga Raf.

Eugoniophlebium Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 393: subsect. Goniophlebii. (Goniophlebium sect. Smith.)

Eugonospermum Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 290; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 210: sect. Gonospermi.
= Gonospermum DC.

Eugouania Endl. 1841. Ench. p. 581. n. 5746 *a:* sect. Gouaniae.

Eugrammitis Presl 1836. Pterid. p. 209: sect. Grammitidis.
Endl. 1841. Spl. I. n. 607 *a α.* p. 1346; 1841. Ench. p. 36: subsect. Grammitidis.

Eugratioleae Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 341. 367 *(Gratioleae verae);* 1847 in Lindl. Veg. kingd. p. 684: subtrib. Gratiolear. Gen. §. 1: Diplacus, Mimulus, Eunanus, Melosperma, Mazus, Dodartia. §. 2: Lindenbergia, Beyrichia, Tetraulacium, Pterostigma, Stemodia, Morgania, Limnophila. §. 3: Conobea, Lafuentea, Schistophragma, Herpestis, Bacopa, Geochorda, Ildefonsia, §. 4: Gratiola, Dopatrium.

Eugrevillea Meisn. 1856 in DC. Prodr. XIV. 1. p. 349: subg. Grevilleae. Sect.: Plagiopoda, Aphanoptera, Cycloptera.

Eugrimmia C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 783: sect. Grimmiae.

Eugrisebachia Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 700: sect. Grisebachiae.
Synon. Grisebachia Klotzsch.

Eugümbelia C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 650: sect. Gümbeliae.

Euguettardeae Endl. 1838. Gen. p. 539; 1841. Ench. p. 272: subtrib. Guettardear. Gen.: Myrmecodia, Hydnophytum, Hypobathrum, Nertera, Mitchella, Baumannia, Mephitidia, Vangueria, Guettarda, Malanea, Antirhoea, Stenostomum, Sacconia, Timonius, Eupyrena, Santia, Psathyra, Hamiltonia, Leptodermis, Myonima, Pyrostria, Octavia, Lithosanthes, Erithalis, Retiniphyllum, Nonatelia, Gynochtodes, Coelospermum, Ancylanthus, Hylacium, Phallaria, Cuviera, Dondisia, Stigmanthus, Strumpfia, Epithinia. Accedit 1843 (Spl. III. p. 73) Pachystigma.

Eugymna Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 322: sect. Macronemae. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 236. — Endl. 1842. Spl. II. p. 40. n. 2381/2 *b.* — Walp. 1843. Rep. II. p. 593.

Eugymnema Endl. 1838. Gen. n. 3498 *a.* p. 595; 1841. Ench. p. 299: sect. Gymnemae. — Par. Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 10. p. 149.
Gymnema R. Brown.

Eugymnopteris Endl. 1841. Ench. p. 35. n. 603 *b αα:* subsect. Gymnopteridis.

Eugynandropsis Endl. 1839. Gen. n. 4984 *b.* p. 890; 1841. Ench. p. 456: sect. Gynandropsidis.

Eugypsophila Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 183: sect. Gypsophilae. (*Gypsophila Fenzl.*)

Eugypsophila (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 228: sect. Gypsophilae. = Gypsophila Linn.

Eugyzostoma „Gray" Endl. Ench. p. 20 in synon. Valsae: vid. *Engizostoma Gray.*

Euhalogeton Fenzl 1851 in Ledeb. Fl. Ross. III. p. 832: sect. Halogetonis. (*Halogeton Moq.-Tand.* pt.)

Euhalus Spach vid. *Enhalus Rich.*

Euhalymedeae Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 17: subtrib. Halymedear. Gen.: Halymeda, Penicillus, Espera.

Euhalymenieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 105: subtrib. Halymeniear. Gen.: Halymenia, Schimmelmannia, Euhymenia, Ptilophora.

Euhamameleae Endl. 1839. Gen. p. 803; 1841. Ench. p. 401: subtrib. Hamamelear. Gen.: Dicoryphe, Corylopsis, Trichocladus, Hamamelis. — Par. Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 323. Gen. §. 1: Eustigma, Hamamelis, Loropetalum. §. 2: Corylopsis, Dicorypha. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 274. Gen. ead.

Euhamamelis Endl. 1841. Ench. p. 401. n. 4591 *a:* sect. Hamamelidis.
Synon. Trilopus Mitch.; Hamamelis R. Brown.

Euhaplophyllum Spach 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 176: subg. Haplophylli. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 251.

Euharpalium DC. 1836. Prodr. V. p. 583: sect. Harpalii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2536 *a.* p. 412; 1841. Ench. p. 238.

Euharrisonia Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 100. n. 5967 *a:* sect. Harrisoniae.
Synon. Harrisonia Benn.

Euhedeoma Endl. 1841. Ench. p. 307. n. 3615 *b:* sect. Hedeomae.
Synon. Hedeoma Benth.

Euhediotis Steud. Nom. I. p. 605: vid. *Euhedyotis Wight & A.*

Euhedisareae DC. Prodr. II. p. 313: vid. *Euhedsyareae DC.*

Euhedyotis Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 411: sect. Hedyotidis. — Par. Meisn. 1838. Comm. p. 114. — Endl. 1838. Gen. n. 3240 *e.* p. 549; 1841. Ench. p. 273. — Walp. 1843. Rep. II. p. 497. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 181.
Meisn. 1838. Gen. p. 160: g. Hedyotear. = Hedyotis Linn.

Euhedysareae DC. 1825. Prodr. II. p. 313: subtrib. Hedysarear. Gen.: Diphaca, Pictetia, Ormocarpum, Amicia, Poiretia, Myriadenus, Zornia, Stylosanthes, Adesmia, Aeschynomene, Smithia, Lourea, Uraria, Nicolsonia, Desmodium, Dicerma, Taverniera, Hedysarum, Onobrychis, Eleiotis, Lespedeza, Ebenus, Flemingia. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 100. 277. Gen. ead. et Planarium. — Koch 1836. Syn. p. 190. Ed. II. p. 210. Gen.: Hedysarum, Onobrychis. — Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). Gen. ut Don et Geissaspis, Sömmeringia, Rathkea, Campylotropis. — Endl. 1841. Gen. p. 1281; 1841. Ench. p. 670 (*Hedysareae*). Gen. ut Meisn. et Brya, Phylacium, Arachis, Chapmannia, Kotschya, Mecopus, Anarthrosyne, Dollinera, Oxydium. Excluditur Flemingia et accedit 1842 (Spl. II. p. 96) Eversmannia.

Euhelenieae DC. 1836. Prodr. V. p. 653: subdiv. Gaillardiear. Gen.: Gutierrezia, Achyropappus, Schkuhria, Florestina, Actinolepis, Bahia, Hymenopappus, Chaenactis, Polypteris, Espejoa, Cercostylos, Hopkirkia, Hymenoxys, Cephalophora, Jaumea, Burrielia, Lasthemia, Picradenia, Hecubaea, Helenium, Amblyolepis, Argyroxiphium, Rosilla. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 421. Gen. ead. et Baeria, Callichroa, Rancagua. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1383 et Ench. p. 239) Trinchinettia, 1842 (Spl. II. p. 41) Amblyopappus, Oxylepis, Macrocarphus, Stylesia, Ptilomeris, Dichaeta et 1843 (Spl. III. p. 69) Richteria, Cancrinia. — Meisn. Gen. p. 205 (132). Gen. ut DC. et Hologymne, Schomburgkia.

Euheliantheae Torrey & Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 305: div. Helianthear. Gen.: Echinacea, Rudbeckia, Lepachys, Dracopis, Gymnopsis, Encelia, Viguiera, Helianthus, Helianthella, Actinomeris.
Rudbeckieae et Coreopsidear. pars DC.

Euhelianthemum Dunal 1824 in DC. Prodr. I. p. 278: sect. Helianthemi. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 127. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 310. — Koch 1836. Syn. p. 81. Ed. II. p. 86. — Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 361; 1838. Vég. phan. VI. p. 25. — Bernh. 1838. Flora II. p. 686. — Endl. 1839. Gen. n. 5029 *c.* p. 905; 1841. Ench. p. 467. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 241. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 232. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 168.

Euhelichrysum DC. 1837. Prodr. VI. p. 169: sect. Helichrysi. Series: Argyraea, Chrysolepidea. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2741 *a.* p. 446; 1841. Ench. p. 243. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 605.
Synon. Elychrysum Tourn.; Helichrysum, Anaxeton et Argyrocome Gärtn.; Trichandrum Neck.; Billya Cass.

Euhelictereae Schott 1832. Melet. bot. p. 30: sect. Helicterear. Gen.: Methorium, Helicteres, Isora, Alicteres, Orthothecium. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 992; 1841. Ench. p. 515. Gen. 2 prima.
Meisn. 1837. Gen. p. 29 (25): trib. Helicterear. Gen. ut Schott.

Euhelicteres Endl. 1840. Gen. n. 5316 *a.* p. 992; 1841. Ench. p. 515: sect. Helicteris. Subsect.: Orthocarpaea, Spirocarpaea. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 332.
Synon. Helicteres Schott & Endl.

Euheliophytum DC. 1845. Prodr. IX. p. 552: sect. Heliophyti.
Synon. Heliophytum Cham.

Euheliopsis DC. 1836. Prodr. V. p. 550: sect. Heliopsidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2506 *a.* p. 407; 1841. Ench. p. 238.
Synon. Heliopsis Cass.

Euheliotropium Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 3751 *b.* p. 1402; 1841. Ench. p. 320: sect. Heliotropii. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 78. — DC. 1845. Pr. IX. p. 534. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 99. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 923.
Synon. Gyrostachys G. Don; Odontotropium Griseb.

Euhelminthia DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 132: sect. Helminthiae.
Synon. Helminthia Juss.

Euhelonias A. Gray . . . . sect. Heloniadis. (H. bullata L.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1066 *a.* p. 1357; 1841. Ench. p. 79.
Synon. Abalum Adans.

Euhemistegia Fée 1852. Gen. Filic. p. 351: sect. Hemistegiae.

Euhemitelia Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 651 *a.* p. 1350; 1841. Ench. p. 37: sect. Hemiteliae.
— Hemitelia Presl.

Euhemitelia Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 350: subg. Hemiteliae. Distinguitur Notophoria.

Euhemitelia Fée 1852. Gen. Filic. p. 349: sect. Hemiteliae.
Synon. Cyatheae sp. Auct.

Euheracleum DC. 1830. Prodr. IV. p. 191: sect. Heraclei. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 341. — Koch 1836. Syn. p. 307. Ed. II. p. 338. — Endl. 1839. Gen. n. 4477 *b.* p. 782; 1841. Ench. p. 379. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 320. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 695. — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 347 (*Euheraclium*).

Euheraclium Wittst. vid. *praeced.*

Euherpestis Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 394: sect. Herpestidis.
Synon. Mella Vand.; Caconapea, Ranaria et Herpestidis sp. Cham. & Schltd.; Caconobea Walp.

Euheterolaena Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 60. n. 2092 *b a:* subsect. Heterolaenae.

Euheteropteris Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 67: sect. Heteropteridis.

Euheteropterys Endl. 1840. Gen. n. 5575 *b.* p. 1061; 1841. Ench. p. 557: sect. Heteropterydis.
Synon. Chrysoheteropterys, Stenotorus et Stenophyllarion Griseb.

Euheuchera Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 577: sect. Heucherae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4639 *a.* p. 1416; 1841. Ench. p. 409; 1850. Spl. V. p. 22. — Walp. 1843. Rep. II. p. 369.

Euhieracium Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 475: sect. Hieracii.
— Hieracium Tourn.

Euhippomarathrum Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 14. n. 4525/1 *a:* sect. Hippomarathri.
Synon. Aegomarathrum Koch.

Euhiraea Endl. 1841. Ench. p. 557. n. 5568 *a:* sect. Hiraeae. — Par. Griseb. 1849. Linnaea XXII. p. 25.

Euhoheria Hook. f. 1853. Fl. New-Zeal. I. p. 30: sect. Hoheriae.

Euholarrhena A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 413: sect. Holarrhenae.

Euhomopappus Walp. 1843. Rep. II. p. 591: sect. Homopappi.

Euhookeria C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 187: sect. Hookeriae.

Euhosackia Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 322: sect. Hosackiae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6517 *a.* p. 1269; 1841. Ench. p. 669. — Walp. 1842. Rep. I. p. 648.

Euhoya Endl. 1841. Ench. p. 299. n. 3501 *a:* sect. Hoyae. (Hoyae verae Endl.) — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 516.

Euhydrobryum Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 104; 1852. Arch. Mus. VI. p. 141: sect. Hydrobryi. (Podostemon Griffithii Wall.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 439. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 785.

Euhydrocotyle DC. 1830. Prodr. IV. p. 59: sect. Hydrocotyles. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 248. — Endl. 1839. Gen. n. 4355 *a.* p. 763; 1841. Ench. p. 377; 1850. Spl. V. p. 1.
Synon. Hydrocotyle Linn.; Chondrocarpus et Glyceria Nutt.; Trisanthus Lour.?

Euhydrureae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 16. 74: subtrib. Hydrurear. Gen.: Hydrurus, Palmodictyon.

Euhymenia Kütz. 1843. Phycol. gener. p. 400; 1849. Sp. Alg. p. 741. n. 492: g. Gigartinear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: g. Euhalymeniear.
Synon. Kallymenia J. Agdh.; Callymenia Kütz.; Cryptonemia J. Agdh.; Lomation Targ.

Euhymenogastrei Bail 1858. Syst. Pilz. p. 9: div. Hymenogastreor. Gen.: Hymenogaster, Hydnangium, Octaviania, Hysterangium, Rhizopogon.

Euhymenophyllum Presl 1843. Hymenoph. p. 123: sect. Hymenophylli.

Euhymenoxis Endl. vid. *seq.*

Euhymenoxys DC. 1836. Prodr. V. p. 661: sect. Hymenoxydis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2598 *a.* p. 423; 1841. Ench. p. 240 (*Euhymenoxis*).
Synon. Hymenoxys Cass.

Euhyoscyamus Ledeb. 1849. Fl. Ross. III. p. 183: sect. Hyoscyami.
Hyoscyamidium Walp.

Euhypericum (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 314: sect. Hyperici.

Euhypnella C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 211: subsect. Hypnellae.
Synon. Chaetomitrium Dozy & Molk.; Holoblepharum Dozy & Molk.

Euhypochaeris Duby 1828. Bot. gall. I. p. 306: sect. Hypochaeridis. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 90. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 259. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 775.

Euhypochoeris Koch 1837. Syn. p. 426: sect. Hypochoeridis.
Synon. Achyrophorus Tausch

Euhypopterygium C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 3: sect. Hypopterygii.

Euillicium Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 443: sect. Illicii. (I. floridanum Ell.)

Euinga Endl. 1841. Gen. n. 6837 *b.* p. 1326; 1841. Ench. p. 683: sect. Ingae. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 928.
= Inga Mart., Benth.

Euinga Benth. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 606: sect. Ingae. (restrict.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 636.

Euinuleae DC. 1836. Prodr. V. p. 463: div. Inulear. Gen.: Rhantherium, Inula, Schizogyne, Varthemia, Vicoa, Pentanema, Francoeuria, Iphiona, Jasonia, Pulicaria, Strabonia, Pegolettia, Geigeria. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 393. Gen. ead. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1380 et Ench. p. 236) Asteridea, Minyrothamnus, Cypselodontia, Hochstetteria et 1843 (Spl. III. p. 68) Codonocephalum. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128). Gen. ut DC. et Minurothamnus?, Amblyocarpum, Cypselodontia?, Anisopappus, Piptocarpha?, Hochstetteria. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 953. Subdivis.: Inuleae legitimae, Pulicarieae.

Euiris D. Don 1840. Linn. Trans. XVIII. 3. p. 310: sect. Iridis. (Pleraeque species europaeae, etc.) — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 239.

Euismelia Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 271; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 202: sect. Ismeliae.

Euisotoma DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 412: sect. Isotomae.

Euivira Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 60. n. 5319 *c α*: subsect. Ivirae.

Euixos Endl. 1841. Ench. p. 399. n. 4584 *a:* sect. Visci.

Eujacksonia Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 74: sect. Jacksoniae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6434 *a.* p. 1257; 1841. Ench. p. 667.

Eujasonia DC. 1836. Prodr. V. p. 476: sect. Jasoniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2433 *b.* p. 395; 1841. Ench. p. 236.
Synon. Jasonia Cass.

Eujasonieae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 954: subsect. Jasoniear. Gen.: Allagopappus, Pieraea, Jasonia.

Eujuanulloa Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 528: sect. Juanulloae.
Synon. Juanulloa Miers.

Eujuglandites Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 95. n. $5892/_2$ *b:* sect. Juglanditis.

Euketmia Endl. 1841. Ench. p. 512. n. 5277 *b β*: subsect. Ketmiae.
Synon. Ketmia DC.

Eukirganelia Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 614: sect. Kirganeliae.

Euklastaxon*) Steud. 1850. Flora I. p. 229: nov. g. Andropoginear. (Nomen.)
Steud. 1854. Glum. I. p. 412: g. Andropogonear. (E. tenuifolius.)

Euklisia „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1838. Fl. North-Amer. I. p. 77: sect. Streptanthi.
Synon. Euclisia Endl.

Euknightia Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 88. n. 2151 *a:* sect. Knightiae. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 442.
Synon. Caloknightia Endl.

Eukochia Gren. (& Godr.) 1855. Fl. France III. p. 24: subg. Kochiae.
Kochia Moq.

Eukrigia Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 468: sect. Krigiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 685. — Scheele 1852. Linnaea XXV. p. 258.

Eukylista Benth 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 230: nov. g. Cinchonear. (E. Spruceana.)
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 124: g. Eucinchonear.

Eulachanodes Endl. 1838. Gen. n. 2818 *a.* p. 461; 1841. Ench. p. 245: sect. Lachanodis.

Eulacideae Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 93; 1852. Arch. Mus. VI. p. 128; 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIII. p. 235: sect. Lacidear. Gen.: Mourera, Lacis, Marathrum, Rhyncholacis, Oenone, Ligea, Apinagia, Lophogyne, Dicraea. Accedunt 1852 Monostylis et 1855 Lonchostephus. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 773. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 432. Gen. ead.

Eulactucaceae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phytogr. Canar. II. p. 418: div. Lactucacear. Gen.: Lactuca, Taraxacum.

Eulalia Kunth 1830. Gram. p. 160. t. 93: nov. g. Andropoginear. (Erianthus aureus Palis.)
Brongn. 1829 (?) in Duperr. voy. Bot. p. 91. t. 19: g. Graminear.
Kunth 1833. Agrost. p. 479: g. Andropogonear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 943. p. 107; 1841. Ench. p. 60. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1345. — Meisn. 1843. Gen. p. 428 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 167. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Steud. 1854. Glum. I. p. 412.
Trin. 1833. Mém. Ac. Petersb. 6e sér. II. p. 332: g. Andropogineor.
Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 184: g. Saccharinar.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 517: g. Eusaccharear.
Synon. Psilopogon Hochst. 1846.

Eulaminarieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 103: subtrib. Laminariear. Gen.: Phloeorhiza, Laminaria, Hafgygia, Pinnaria, Capea, Saccorhiza, Orgya, Costaria.

---

*) εὔκλαστός, fractu facilis; ἄξων, axis.

Eulampsana Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phytogr. Canar. II. p. 419: sect. Lampsanae.
= Lampsana Tourn.

Eulappeae Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 328; sect. Lappear. Gen.: Lappa, Cousinia. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 429.

Eulardizabaleae Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 26: trib. Lardizabalear. Gen.: Lardizabala, Boquila; Henschelia?

Eulasiopus Schultz Bip. 1844. Flora II. p. 780; 1847 in Walp. Repert. VI. p. 315: subsect. Lasiopodis.

Eulasiospermum DC. 1837. Prodr. VI. p. 38: sect. Lasiospermi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2653 *a*. p. 432; 1841. Ench. p. 241.
Synon. Lasiospermum Lag.

Eulathyrus DC. 1825. Prodr. II. p. 369: sect. Lathyri. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 331. — Endl. 1840. Gen. n. 6582 *e*. p. 1279; 1841. Ench. p. 670. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 221. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 70. — (Gren. &) Godr. 1848. France. I. p. 482 (exclusa Cicercula).
Synon. Lathyrus Tourn.; Cicercula Medic.; Astrophia Nutt.?

Eulebeckia Benth. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 357: sect. Lebeckiae. (Spartium sepiarium L.)

Eulecideinae Trevisan 1856. Linnaea XXVIII. p. 296: subtrib. Lecideinar. Gen.: Lecidea, Sporastatia, Psora, Scoliciosporum, Raphiospora, Sagiolechia, Rhizocarpon.

Eulecythis Berg 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 2. p. 480: sect. Lecythidis.

Eulemna „Coss. & Germ. fl. paris. 576" Gren. (& Godr.) 1856. Fl. France III. p. 327: sect. Lemnae. (L. trisulca et minor.)
= Lemna Schleid.

Eulepidadenia Miquel 1857. Fl. Ind. bat. I. p. 933: sect. Lepidadeniae.

Eulepis Bongard 1831. Mém. Ac. Pét. 6e sér. I. p. 635: sect. Eriocaulonis. (E. Prescottianum, etc.)
= Xeractis Mart.

Euleptolobium Vogel 1837. Linnaea XI. p. 388: sect. Leptolobii. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6751 *b*. p. 1310; 1841. Ench. p. 673. — Walp. 1843. Rep. II. p. 808.

Euleptopoda Walp. 1843. Repert. II. p. 988: sect. Leptopodae.

Euleptospermeae DC. 1828. Prodr. III. p. 216: subtrib. Leptospermear. Gen.: Eucalyptus, Angophora, Callistemon, Metrosideros, Leptospermum, Fabricia, Bäckea. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 810. 818. Gen. ead. et Billotia. — Meisn. 1837. Gen. p. 108 (76). Gen. ut Don et Pentagonaster. — Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 116 (1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 5). Gen.: Agonis, Homalospermum, Pericalymma, Leptospermum.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 126: sect. Leptospermear. Gen. ut DC. et Bartlingia?

Euleptospermum DC. 1828. Prodr. III. p. 227: sect. Leptospermi.
= Leptospermum Forst.

Euleptostemonum Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 183: subsect. Leptostemoni. Sect.: Graciliflora, Juripeba, Acanthophora.

Eulespedeza Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 366: sect. Lespedezae. — Simil. Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 227 adnot.

Euleucanthemum (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 140: sect. Leucanthemi.
= Leucanthemum DC.

Euleuceria DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 56: sect. Leuceriae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2956 *a*. p. 1386; 1841. Ench. p. 249.

Euleucodon C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 107: subsect. Leucodontis.
Synon. Antitrichia Brid.; Anomodon Hook.

Euleucothoë DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 601: sect. Leucothoës.
Endl. 1841. Spl. I. n. 4318. *e a*. p. 1412; 1841. Ench. p. 370: subsect. Leucothoës.
Synon. Leucothoë Don.

Euleuzeae Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 330: sect. Leuzear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 430.

Euliabeae Schultz Bip. 1853. Flora I. p. 33: div. Liabear. Gen: Cacosmia, Alibum, Kastnera, Liabum, Sinclairea.

Euliatris DC. 1836. Prodr. V. p. 128: sect. Liatridis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2270 *a*. p. 368; 1841. Ench. p. 233. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 68. (inclusa Supragine DC.)
Synon. Liatris Cass.

Eulibanotis DC. 1830. Prodr. IV. p. 150: sect. Libanotidis. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 312. — Endl. 1839. Gen. n. 4432 *b*. p. 775; 1841. Ench. p. 378. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 279.
Synon. Dela Adans.

Eulicania Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 212: sect. Licaniae. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 95. n. 6409 *d*. — Walp. 1843. Rep. II. p. 5.

Eulindsaea Hook. 1844. Spec. Fil. I. p. 203: subg. Lindsaeae. (*Lindsaea* et *Isoloma Smith.*)

Eulineae Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 593; 1848. ibid. VII. p. 165; sect. Linear. Gen.: Radiola, Linum, Reinwardtia. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 94.

Eulinostoma Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 71: sect. Linostomatis.
= Linostoma Wall.

Eulinum Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 116: sect. Lini. (L. hirsutum, austriacum, usitatissimum, tenuifolium, etc.) — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 280.
Planch. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 597; 1848. VII. p. 165: subg. Lini. Series: Protolinum, Adenolinum. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 94; 1851. II. p. 113. Ser. eaed. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 295

Eulipocarpha Miquel 1856. Fl. Ind. bat. III. p. 331: sect. Lipocarphae.

Euliquiritia C. A. Meyer 1841. Ind. sem. h. Petrop. p. 43: subg. Glycyrrhizae. — Simil. Endl. 1843. Spl. III. p. 103. n. 6532 *a.*

Eulirion Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1355 *b.* sect. Lilii. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1098 *d.* p. 141; 1841. Ench. p. 83. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 264. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 386. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 278. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 151.

Eulithospermum Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 85: sect. Lithospermi. (L. purpureocoeruleum et officinale.) — Simil. DC. 1846. Pr. X. p. 76. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 130. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 639.

Synon. Lithospermum Gray; Leiocaryi §. 2 Don.

Eulitobrochia Fée 1852. Gen. Filic. p. 135: sect. Litobrochiae.

Synon. Litobrochia Presl.

Eulobeliaceae Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1031: subordo Lobeliacear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 389.

Eulobus „Nuttall" Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 514: nov. g. Oenotherear. (E. californicus.)

Endl. 1841. Spl. I. n 6118/$_1$. p. 1426; 1841. Ench. p. 637: g. Epilobiear.

Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6566: g. Onagrear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Epilobear.

Euloganía Endl. 1841. Ench. p. 289. n. 3364 *a:* sect. Loganiae. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 25.

Synon. Loganiae verae R. Brown.

Euloganieae Endl. 1838. Gen. p. 576; 1841. Ench. p. 289: trib. Loganiear. Gen.: Logania, Geniostoma. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167). Gen. ead. et Haemospermum. — DC. 1845. Pr. IX. p. 24. Gen. ut Endl.

Eulomaria Fée 1852. Gen. Filic. p. 68: sect. Lomariae.

Synon. Spicanta, Orthogramma et Lomaridium Presl.

Eulomatia Endl. 1838. Gen. n. 2155 *a.* p. 342; 1841. Ench. p. 216: sect. Lomatiae. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 447.

Synon. Tricondylus Knight & Sal.; Embothrii sp. Labill.

Eulophia*) Agardh 1822. Aphor. p. 109: g. Muscor., pro *Chaetephora Brid.* propositum.

Eulophia R. Brown & Lindl. 1823. Bot. Regist. VIII. n. 686 (Verm. bot Schr. II. p. 432): g. Orchidear. (E. guineensis et gracilis.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 720. n. 2986; 1831. Gen. II. p. 665. n. 3354.

Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 180: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n.

*) εὔλοφος, pulchre cristatus.

Eulophia R. Brown cont.

1528; 1841. Nom. p. 53. n. 2045. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1440. p. 200; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (280). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 691.

Bartl. 1830. Ord. p. 57: g. Epidendrear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Synon. Eulophus R. Brown.

Eulophoclinium Endl. 1843. Bot. Zeit. p. 457; 1843. Gen. Spl. III. p. 66. n. 2267/$_1$ *a:* sect. Lophoclinii. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 552.

Eulophus R. Brown 1821. Bot. Regist. n. 573 not. ad Lissochilum (Verm. bot. Schr. II. p. 430): nov. g. Orchidear., non descriptum.

= Eulophia R. Brown.

Eulophus „Nuttall mss. 1825" DC. 1829. Coll. Mém. V. p. 69. (Non Zoolog.)

DC. 1830. Pr. IV. p. 248: g. Smyrnear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 381.

Tausch 1834. Flora I. p. 354: g. Amminear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138.

Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 640: g. Smyrniear.

= Perideridia Rchb.

Euloranthus DC. 1830. Prodr. IV. p. 286: sect. Loranthi. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 381. — Simil. Endl. 1839. Gen. n. 4586 *a.* p. 801; 1841. Ench. p. 399; 1850. Spl. V. p. 19 (sph. *Eucloranthus*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 439.

Synon. Loranthus Mart.; Baratranthus Korth.; Glutago Comm.?

Eulotus Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 210: sect. Loti. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3874 *c.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 196. — Koch 1836. Syn. p. 177. Ed. II. p. 196. — Endl. 1840. Gen. n. 6514 *c.* p. 1269; 1841. Ench. p. 669. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 560.

Eulotus (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 430: sect. Loti.

= Lotus Ser.

Eulucilia DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 46: sect. Luciliae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2940 *a.* p. 1386; 1841. Ench. p. 248.

Eulucuma A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 169: sect. Lucumae.

Euludwigia Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 522: sect. Ludwigiae. (Isnardia alternifolia, hirtella et virgata.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 74.

= Ludwigiaria DC.

Eulychnia Philippi „Fl. Atacam. ined." 1857. Bot. Zeit. p. 681: nov. g. Cactear. (Nomen. *Cf.* descriptionem in Fl. Atacam. 1860. p. 23. t. 2 f. A: breviflora.)

Eulychnis DC. 1824. Prodr. I. p. 385: sect. Lychnidis. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 156. — Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5362 *d.*
A. Braun 1839. Flora p. 318: subg. Lychnidis.
Synon. Hedona Lour.; Coccyganthe Rchb.

Eulychnis Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5250 *c.* p. 974; 1841. Ench. p. 506: sect. Lychnidis arctius definita. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 330.

Eulychnophora DC. 1836. Prodr. V. p. 79: sect. Lychnophorae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2223 *a.* p. 361; 1841. Ench. p. 232. — Gardn. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 230.
Synon. Lychnophora (genus) Less.

Eulycianthes Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 161: subsect. Meiomeridis.

Eulycium G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 458: sect. Lycii. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3863 *a.* p. 667; 1841. Ench. p. 332. — Walp. 1845. Rep. III. p. 106. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 509.

Eulygodesmia Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 484: sect. Lygodesmiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 692.

Eulygodium Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 361: sect. Lygodii.

Eulysigonieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 95: subtrib. Lysigoniear. Gen.: Cycloplea, Discoplea, Pyxidicula, Goniothecium, Rhizosolenia, Pododiscus, Podosira, Lysigonium, Pleurosira.

Eulysigonium Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 96: subg. Lysigonii. (Gallionellae sp. Kütz.)

Eulysipoma DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 349: sect. Lysipomatis.
Synon. Lysipomia Presl.

Eulythrarieae Endl. 1840. Gen. p. 1198: trib. Lythrariear. Gen.: Cryptotheca, Suffrenia, Rotala, Peplis, Ameletia, Ammannia, Nesaea, Pemphis, Lythrum, Pleurophora, Cuphea, Acisanthera, Crenea, Dodecas, Ginoria, Grislea, Adenaria, Antherylium, Lawsonia, Abatia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1427 et Ench. p. 643) Hypobrichia et 1842 (Spl. II. p. 94) Quartinia.

Eumacdonaldia Endl. 1841. Ench. p. 114. n. 1587 *a:* sect. Macdonaldiae. (Macdonaldiae verae Lindl.)

Eumachia*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 478: nov. g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 566. — Endl. 1838. Gen. n. 3170. p. 536; 1841. Ench. p. 272.
Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118): g. Psychotriacear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376: g. Coffeacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2820: g. Psychotriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Synon. Petesia Gärtn.

*) Dicat. Eumacho, rhizotomo a Theophrasto citato.

Eumaclura Blume 1853. Mus. bot. Lugd. II. p. 82: sect. Maclurae.

Eumacrochiton Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 104: sect. Macrochitonis.
= Macrocheton Blume.

Eumacromitrium C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 723: sect. Macromitrii.

Eumacronema Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 40. n. 2381/2 *a:* sect. Macronemae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 592.

Eumalacothrix Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 485: sect. Malacothricis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 690.

Eumamillaria Engelm. 1856. Syn. Cact. p. 260 (Emory Cact. p. 3): subg. Mamillariae. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 33 (*Eumammillaria*).

Eumammillaria Müll. vid. *praeced.*

Eumappa Rchb. & Zoll. 1856. Linnaea XXVIII. p. 306: sect. Mappae. (Ricinus mappa L.) — Par. Baill. 1858. Euphorb. p. 429.

Eumappia Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. IX. p. 394: sect. Mappiae.

Eumarathrum Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 94: sect. Marathri. (M. foeniculaceum, etc.)

Eumarrubium Endl. 1841. Ench. p. 308. n. 3657 *b:* sect. Marrubii.
Synon. Marrubium Benth.

Eumarsdenia Endl. 1841. Ench. p. 299. n. 3507 *a:* sect. Marsdeniae. (Marsdeniae verae R. Brown.)

Eumascagnia Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 95: sect. Mascagniae.

Eumatricaria Schultz Bip. 1844. Ueb. Tanac. p. 24: sect. Matricariae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 194.

Eumauria Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 99. n. 5903 *b:* sect. Mauriae.

Eumaxillaria Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. n. 1549; 1833. Gen. Orchid. p. 142: sect. Maxillariae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1407 *c.* p. 197; 1841. Ench. p. 110.

Eumelampodium DC. 1836. Prodr. V. p. 518: sect. Melampodii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2478 *a.* p. 402; 1841. Ench. p. 237.

Eumelandrium A. Braun 1843. Flora p. 371: sect. Melandrii.

Eumelichrus Endl. 1839. Gen. n. 4270 *a.* p. 747; 1841. Ench. p. 367: sect. Melichri.
Synon. Ventenatia Cav. pt.

Eumeliosma Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 79. n. 5639 *a:* sect. Meliosmae.

Eumelobesia Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 126: sect. Melobesiae. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 49. n. 122/1 *a.* — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 129.
Melobesia Kütz.

Eumelodorum Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 116: sect. Melodori. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 58. — Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 317.

Eumelongena Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 355: subsect. Melongenae.
Synon. Melongena Tourn.

Eumentha Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 105: sect. Menthae. — Par. (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 648.
Synon. Mentha (sect.) Gaud.

Eumentzelia Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 532: sect. Mentzeliae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 223.
Oligosperma Endl.

Eumeriania Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 125: sect. Merianiae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 786.

Eumeridion Kütz. 1844. Bacill. p. 42; 1845. Phycol. germ. p. 61; 1849. Spec. Alg. p. 11. n. 5: g. Meridiear.

Eumertensia Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 338: sect. Mertensiae.

Eumetrosideros Endl. 1840. Gen. n. 6303 *a.* p. 1229; 1841. Ench. p. 650: sect. Metrosideri.
Synon. Nani Adans.

Eumezereum Kalenicz. 1849. Bull. soc. Mosc. Nr. 1: sect. Daphnes.

Eumiconia DC. 1828. Prodr. III. p. 183: sect. Miconiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4639 *c.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 792. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 264. — Endl. 1840. Gen. n. 6258 *c.* p. 1221; 1841. Ench. p. 647. — Crüg. 1847. Linnaea XX. p. 110. — Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 128. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 710.

Eumicrasterieae Trevisan 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): subtrib. Micrasteriear. Gen.: Micrasterias, Cosmarium, Xanthidium, Staurastrum.

Eumicrocodon A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 421: sect. Microcodonis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3078 *a.* p. 1392; 1841. Ench. p. 266.

Eumicropeae Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: subdiv. Micropear. Gen.: (Micropus), Epaltes, Calymmandra, Filaginopsis.

Eumicrosorium Fée 1852. Gen. Filic. p. 268: sect. Microsorii.

Eumilium Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 444: sect. Milii. (M. effusum, vernale.)

Eumillina DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 109: sect. Millinae.
= Millina Cass.

Eumimetes Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 78. n. 2125 *a:* sect. Mimetis. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 262.

Eumimosa DC. 1825. Prodr. II. p. 425 (Lég. mém. XII): sect. Mimosae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 382. — Endl. 1841. Gen. n. 6831 *a.* p. 1325; 1841. Ench. p. 682. — Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 359.
Synon. Mimosa Mönch; Agne Rchb.

Eumimoseae Benth. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 133; 1842. ibid. IV. p. 331: trib. Mimosear. Subtribus (1842): Adenantherae, Gymnantherae. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. Gen. Adenantherar. Benth. (excepta Piptadenia) et Gymnantherar. Benth.

Eumirbelia Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 84: sect. Mirbeliae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6448 *a.* p. 1259; 1841. Ench. p. 667.

Eumitella Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 585: sect. Mitellae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 371.
Mitella Tourn.

Eumitodendron Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 361: sect. Mitodendri.
Eumyzodendron Hook. f.

Eumitrarieae Oersted 1858. Gesn. centroam. p. . . . : div. Mitrariear. Gen.: Mitraria.

Eumniopsis Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 105; 1852. Arch. Mus. VI. p. 143: sect. Mniopsidis. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 439. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 786.

Eumnium C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 155: sect. Mnii.
Synon. Polla Adans.; Mnium Hüb.

Eumonarda Benth. 1835. Labiat. p. 726; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 361: sect. Monardae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 758. — Endl. 1838. Gen. n. 3600 *a.* p. 615; 1841. Ench. p. 307. — Walp. 1845. Rep. III. p. 681.

Eumonoceras Endl. 1840. Gen. n. 5385 *a.* p. 1011; 1841. Ench. p. 523: sect. Monocerae.

Eu-Monolopia Meyer 1843. Ind. non. sem. h. Petrop.; 1844. Linnaea XVIII. p. 189: sect. Monolopiae. (M. major DC.)

Eumonopsis Endl. 1838. Gen. n. 3057 *a.* p. 511; 1841. Ench. p. 263: sect. Monopsidis.
Synon. Specularia Soland.

Eumonosis DC. 1836. Prodr. V. p. 77: sect. Monosidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2220 *a.* p. 360; 1841. Ench. p. 232.

Eumonstera C. Koch 1847. Berl. Gartenz. p. 220: sect. Monsterae.

Eumoquilea Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 92: subg. Moquileae. (Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 643.)
Synon. Moquilea Aubl.

Eumorinda Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 242: sect. Morindae.

Eumoringa Endl. 1841. Ench. p. 680. n. 6811 *b:* sect. Moringae.

Eumorpha*) Ecklon & Zeyh. 1835. Enum. pl. Afr. austr. p. 77: nov. g. Pelargoniear. *(Calliopsis Sweet.)*
Walp. 1842. Rep. I. p. 458: sect. Pelargonii.
= Isopetaloides Endl.

Eumorpha Endl. 1836. Gen. n. 316 *b.* p. 27; 1841. Ench. p. 17: sect. Physari. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 363. 2.

---

*) εὔμορφος, pulcher.

Eumorphia*) DC. 1837. Prodr. VI. p. 2: nov. g. Euanthemidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2636. p. 429; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 208 (134).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24: g. Anthemidear. (verar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3060: g. Ptarmicear.

Eumorphoides DC. 1837. Prodr. VI. p. 49: sect. Adenachaenae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2668 *b*. p. 434; 1841. Ench. p. 241.
Synon. Adeneumorphia Rchb.

Eumorphophallus Miquel 1856. Fl. Ind. bat. III. p. 199: sect. Conophalli. (C. spectabilis.)

Eumourera Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 19. n. 1833 *c* (sphalm. *Eumurera*): sect. Mourerae.

Eumühlenbeckia Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 51. n. 1990/₁ *b*: sect. Mühlenbeckiae. — Par. Wedd. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XIII. p. 255. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 148.

Eumulgedium C. 1838. Prodr. VII. 1. p. 248: sect. Mulgedii. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 497.

Eumundia Endl. 1840. Gen. n. 5651 *a*. p. 1079; 1841. Ench. p. 568: sect. Mundiae. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 244.

Eumurera Endl. vid. *Eumourera*.

Eumusenium Walp. 1843. Repert. II. p. 427: sect. Musenii.

Eumutisia Endl. 1838. Gen. n. 2917 *a*. p. 484; 1841. Ench. p. 248: sect. Mutisiae.
Synon. Mutisia subg. Less.

Eumutisieae DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 4: div. Mutisiear. Gen.: Mutisia, Chuquiraga, Nardophyllum, Flotovia, Oldenburgia, Printzia, Ainsliaea, Chionoptera, Carmelita, Gerbera, Oreoseris, Berniera, Lasiopus, Seris, Amblysperma, Trichocline, Lycoseris, Diazeuxis, Moquinia, Gochnatia, Leucomeris, Anastraphia, Stiftia, Proustia, Calopappus, Hyalis, Cyclolepis, Chaetanthera, Tylloma, Pachylaena, Brachyclados, Isotypus, Onoseris, Dicoma, Myripnois, Perdicium, Anandria. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 482. Gen.: Flotovia, Seris, Lycoseris, Centroclinium, Catachaeta, Chuquiraga, Spadonia, Gochnatia, Augusta, Mutisia, Proustia, Hyalis, Brachyclados, Chaetanthera, Pachylaena, Trichocline, Amblysperma, Onoseris, Isotypus, Oldenburgia, Leucomeris, Myripnois, Dicoma, Printzia, Perdicium, Anandria. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1385 et Ench. p. 247) Moquinia (loco Spadoniae), Nardophyllum, Calopappus, Ainsliaea, Chionoptera, Carmelita, Gerbera, Oreoseris, Berniera et 1843 (Spl. III. p. 71) Orinstrum. — Meisn. 1839. Gen. p. 228 (141). Gen. ut DC. et Elachia?, Plazia?, Atractylodes?

*) Nomen ad formam elegantem fruticis alludens.

Eumyosotis Turczan. 1840. Bull. soc. Mosc. p. 257 (*cf.* Flora 1842. Lit. p. 48): sect. Myosotidis. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 78. n. 3772 *a α*. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 98. — A. DC. 1846. Pr. X. p. 105. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 143.

Eumyriopteris Fée 1852. Gen. Filic. p. 149: sect. Myriopteridis.

Eumyristica Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 162: sect. Myristicae. — Par. A. DC. 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 29; 1856. Pr. XIV. 1. p. 189.

Eumyrodia DC. 1824. Prodr. I. p. 477: sect. Myrodiae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 508. — Endl. 1840. Gen. n. 5313 *a*. p. 992; 1841. Ench. p. 515.
Synon. Lexarza La Llave?

Eumyrsineaceae A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 82: subordo Myrsineacear. Tribus: Embelieae, Ardisieae.

Eumyrsineae Miquel 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 281: subordo Myrsinear. Tribus: Embelieae, Ardisieae.

Eumyrtus Endl. 1840. Gen. n. 6316 *a γ*. p. 1232; 1841. Ench. p. 651: subsect. Leucomyrti.
Walp. 1843. Rep. II. p. 172: sect. Myrti.

Eumyzodendron Hook. f. 1846. Antarct. Fl. p. 289 (Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 221): sect. Myzodendri. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 18. n. 4581 *b*.
Synon. Eumitodendron Walp.

Eunanus Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 374; 1847 in Lindl. Veg. kingd. p. 684: nov. g. Eugratiolear. (Mimulus nanus Hook. & Arn.)

Eunaviculeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 97: subtrib. Naviculear. Sect: Stauroneideae, Schizonemeae.

Euneckera C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 41: sect. Neckerae. Subsect.: Leiophyllum, Rhystophyllum.
Synon. Distichia Brid.; Cryptopodia Röhl.; Cyrtopodia Rchb.

Euneottia Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 595: sect. Neottiae. (N. nidus avis.)

Eunephrodium Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 639 *a*. p. 1394; 1841. Ench. p. 37: sect. Nephrodii.
Synon. Nephrodium Presl.

Eunesaea Endl. 1841. Ench. p. 643. n. 6147 *c*: sect. Nesaeae.
Synon. Trotula Comm.; Tolypeuma E. Meyer.

Eunigella Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 307: sect. Nigellae. (N. hispanica, sativa.)
— Nigellariae DC. pars.

Eunitella Braun 1858. Monatsber. Berl. Ak. p. 354: sect. Nitellae.

Eunolana „Miers" Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 9: sect. Nolanae.

Eunomia*) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 241; 1821. Syst. II. p. 555; 1824. Prodr. I. p. 208: nov. g. Lepidinear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 222. — Meisn. 1837. Gen. p. 14 (13). — Endl. 1839.

*) εὔνομος, bene constitutus.

Eunomia DC. cont.
Gen. n. 4930. p. 879; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 200. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 212. (Subg.: Pseudonomia.)
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 183. n. 4753; 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6933: g. Lepidiear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Biscutellear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Siliculosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 670.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 281: g. Angustiseptar.
Lindl. 1847. Vég. kd. p. 354: g. Lepididar.
Eunostoceae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 100: subtrib. Nostocear. Gen. Nostoc, Hormosiphon.
Eunotia*) Ehrenb. 1840. Ber. Ak. Berl. p. 209: g. Bacillarior.
„Ehrenb. Amer. p. 125 ex parte" Kütz. 1844. Bacill. p. 36; 1845. Phyc. germ. p. 59; 1849. Sp. Alg. p. 4. n. 2: g. Eunotiear. *Cf.* Bréb. 1849 in Orb. Dict. V. p. 498. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 18. — Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 94. — Math. 1853. Belg. II. p. 546.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.
Rabenh. 1853. Süssw. Diatom.: g. Eunotiacear.
Eunotiaceae Rabenh. 1853. Süssw. Diatom.: fam. Diatomacear. arcuatar. Gen. Eunotiear. Kütz.
Eunotieae Kütz. 1844. Kies. Bacill. p. 32; 1845. Phycol. germ. p. 57; 1849. Sp. Alg. p. 1: fam. Diatomear. Gen.: Epithemia, Eunotia, Himantidium.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 18: sect. Diatomacear. Gen: Eunotia, Himantidum.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 94: trib. Amphiphractar. Gen. ut Rabenh. et Himantosoma.
Math. 1853. Belg. II. p. 546: trib. 41 Algar. Gen: Eunotia, Epithemia.
Eunotothylas Gottsche 1858. Bot. Zeit. Ueberbl. Hepat. p. 20: sect. Notothylatis.
Eunuchoglossum DC. 1837. Prodr. VI. p. 48: sect. Leucanthemi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2667 *c.* p. 434 (*Enuchoglossum*); 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3067. 3.
Eunychia DC. 1828. Prodr. III. p. 370: sect. Paronychiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4265 *b.* — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 88. — Simil. Fenzl 1839 in Endl. Gen. n. 5202 *c.* p. 958; 1841. Ench. p. 504.
Eunymphaeeae Planchon 1853. Ann. sc. nat. 3e sér. XIX. p. 30: subtrib. Nymphaeear. Gen.: Nymphaea.
Euodia**) Forst. 1776. Char. gen. p. 13. t. 7: nov. g. Tetrandr. Monogyn.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 250: g. Rutacear.
Synon. Evodia Auct.; Evodea R. Brown.

Euodontites Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 550: sect. Odontitis. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 261.
Euodontoglossum Lindl. 1852. Fol. Orchid. 14 Oct.: sect. Odontoglossi.
Euoederia DC. 1837. Prodr. VI. p. 2: sect. Oederiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2635 *a.* p. 429; 1841. Ench. p. 240.
Euoenothera Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 492: sect. Oenotherae. Subsect.: Onagra, Anogra, Oenotherium, Lavauxia, Pachylophis, Megapterium.
Euoldenburgia DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 12: sect. Oldenburgiae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2927 *a.* p. 1385; 1841. Ench. p. 248.
Euoliganthes Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 502: subg. Oliganthis. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 384.
Synon. Oliganthes Cass.; Pollalesta HBK.; Trianthaea DC.
Euomalia C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 243: subsect. Omaliae.
Synon. Platyhypnum Schimp.
Euomphalea Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 529: sect. Omphaleae.
Euomphalodes A. DC. 1846. Prodr. X. p. 161: sect. Omphalodis.
Euoncidium Lindl. 1833. Orchid. gen. p. 196: sect. Oncidii.
Euoncoba Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 296: sect. Oncobae.
Synon. Lundia Thonn.
Euononis DC. 1825. Prodr. II. p. 158 (Lég. mém. VI): sect. Ononidis. Subsect.: Natrix, Natridium, Bugrana, Bugranoides, Pterononis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4027 *b.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 158. Subsect. ut DC.
Euonoseris DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 34: sect. Onoseridis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2925 *a.* p. 1385; 1841. Ench. p. 248.
Synon. Onoseris Cass.
Euonosma A. DC. 1846. Prodr. X. p. 57: sect. Onosmae. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 123.
Euonymeae G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 1. 3: trib. Celastrinear. Gen.: Euonymus, Celastrus, Catha, Plectronia, Maytenus, Alzatea, Crypteronia, Polycardia, Elaeodendron, Actegeton, Ptelidium, Tralliana.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 257: trib. Celastracear. Gen.: Celastrus, Euonymus, Oreophila. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588. Gen. Evonymear. Endl.
Euonymoides Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 204. n. 437: g. dubium. (Arbor foliis crassis subrotundis capsula Euonymi: Herm. zeyl. 25.)
?
Euonymus*) Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 38; 1742. Gen. ed. II. p. 48. n. 111: g. Tetrandr. Monogyn.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 423: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Dumosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 499.

---

*) εὔνωτος, dorso forti praeditus.
**) εὐώδης, suaveolens.

*) εὐώνυμος, celeber, boni ominis.

Euonymus Linn. cont.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 154: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 402; ed. 1832. I. p. 627. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 225.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXVI. 464. n. 1002: g. Rhamnear.
D. Don 1825. Nepal. p. 191: g. Celastrinar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI: g. Celastrinear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 160. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 229.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 3: g. Euonymear. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 119. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 257.
Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 130. t. 28. (E. javanicus.)
= Evonymus Tourn.

Eu-Oogaster „Corda 1846" Zobel 1854 in Corda Icon. Fung. VI. p. 70. t. 15. 16: sect. Oogasteris. (Tuber nitidum Vitt., etc.)

Euophelia Griseb. 1839. Gen. et sp. Gent. p. 313; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 123: sect. Opheliae.
Synon. Ophelia Don.

Euophioglossum Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 120: sect. Ophioglossi. (O. reticulatum, vulgatum, pediculosum.)

Euopis Bartl. vid. *Evopis Cass.*

Euopoponax Fenzl 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 10. n. 4472/₁ *a:* sect. Opoponacis.

Euopus Griff. . . . . in Calcutta journ. V. p. 463: sect. Arecae.
= Oncosperma Blume. (Miq.)

Euorchis Gren. (& Godr.) 1856. Fl. France III. p. 284: sect. Orchidis. Subsect.: Herorchis, Androrchis.
= Orchis Lindl.

Eu-Origanum Vogel 1841. Linnaea XV. p. 79: sect. Origani. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 114.
= Origanum Benth.

Euorites Endl. 1841. Ench. p. 215. n. 2147 *a:* sect. Oritis. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 423.

Euornithogalum Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 391: sect. Ornithogali. (O. comosum, umbellatum, etc.)

Euorobancheae Meisn. 1810. Gen. pl. vasc. p. 314 (225): trib. Orobanchear. Gen.: Conopholis, Phelipaea, Anoplanthus, Anblatum, Orobanche, Lathraea, Clandestina, Boschniakia, Epiphegus.

Euorobus Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 75: sect. Orobi. (O. tuberosus, etc.)

Euorthosorus Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 458: subg. Orthosori.
Synon. Stypopodii et Phycopteridis sp. Kütz.

Euorthotrichum C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 694: sect. Orthotrichi. (O. anomalum, etc.)
Synon. Nania Borkh.; Brachytrichum Röhl.; Callistomium Schimp.

Euosanthes Cunn. mss. ex Endl.: vid. *Enosanthes Cunn.*

Euosiris A. DC. vid. *Euosyris.*

Euosma*) Andr. . . . . Bot. Repos. t. 520.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 456. Ed. Nees p. 312: sect. Loganiae. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 200. — Poir. 1823. Dict. v. 27. p. 116 *(Evosma)*. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 165. — Endl. 1838. Gen. n. 3364 *b.* p. 576; 1841. Ench. p. 289. — Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5136. 2.

Euosma „Willd. mss." Schult. 1827. Mant. III. p. 8. 128: g. Tetrandr. Monogyn.
= Evosmia Humb. & Bonpl.

Euosmia HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 418: g. Hameliacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 66.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2919: g. Hameliear.
Evosmia Humb. & Bonpl.

Euosmites DC. 1837. Prodr. VI. p. 290: sect. Osmitis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2784 *a.* p. 454; 1841. Ench. p. 244.
Synon. Osmites Less.

Euosmunda Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 322: sect. Osmundae.

Euosmus Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 258: subg. Lauri.
Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1908 *(Evosmus)*: g. Laurear.
Bartl. 1830. Ord. p. 112: g. Laurinear.
= Sassafras et Benzoin Nees.

Euosyris A. DC. 1857. Prodr. XIV. 2. p. 633 *(Euosiris)*: sect. Osyridis.
Synon. Osyris Auct.

Euota Endl., Rchb. vid. *Evota Lindl.*

Euothonaea Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 772: nov. g. Orchidear., a Diothonea Lindl. sejunctum.

Euothonna Endl. 1838. Gen. n. 2828 *b.* p. 463; 1841. Ench. p. 245: sect. Othonnae.
Synon. Othonna Less.

Euourisia Endl. 1841. Ench. p. 340. n. 3986 *a:* sect. Ourisiae.
Synon. Riousia Walp.

Euoxypetalum Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 581: sect. Oxypetali.

Euozothamnus DC. 1837. Prodr. VI. p. 165: sect. Ozothamni. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2738 *c.* p. 446; 1841. Ench. p. 243.
Synon. Ozothamnus Cass.

Eupalafoxia Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 368: sect. Palafoxiae. (P. texana.)

Eupanargyrum DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 54: sect. Panargyri. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 2948 *c.* p. 1386; 1841. Ench. p. 248.
Synon. Panargyrus Lag.

Eupanax Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 617: sect. Panacis. (P. quinquefolium.)

Eupandaneae Endl. 1841. Ench. p. 133: subordo Pandanear. Gen.: Pandanus, Freycinetia. Accedit 1843 (Spl. III. p. 63) Marquartia. — Par. Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 436. Gen. ead.

*) *εὔοσμος*, suaveolens.

Eupaniceae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. III. p. 363: cohors Paspalear. Gen.: Digitaria, Urochloa, Eriochloa, Orthopogon, Holosetum, Panicum, Hymenachne, Isachne, Echinochloa, Setaria, Pennisetum, Gymnotrix, Penicillaria, Cenchrus, Trachys, Lappago, Thouarea, Spinifex.

Eupanicum (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 459: sect. Panici. (P. capillare, repens, miliaceum.)
Synon. Milium Mönch; Panicum Nees.

Euparacaryum Boissier 1849. Diagn. pl. nov. or. II. Nr. 11. p. 129: sect. Paracaryi. (Omphalodes papillosa DC., etc.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 142.

Euparaea Steud. vid. *Euparea Banks.*

Euparatropia Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 753: subg. Paratropiae.

Euparea*) „Banks" Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 230. t. 50. f. 5: nov. g. plant. (E. amoena.)
Schreb. 1789. Gen. I. p. 156. n. 397: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 332. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1183. n. 454. — Pers. 1805. Ench. I. p. 249. n. 563. — Hedw. 1806. Gen. p. 154. n. 658.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXIV. 324. n. 951: g. Lysimachiar. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 606 *(Euparaea).*
Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 1: g. Primulacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 166. — Endl. 1841. Spl. I. n. $4215/_1$. p. 1409; 1841. Ench. p. 357 (dubium).
Spreng. 1825. Syst. I. p. 793. n. 881; 1830. Gen. I. p. 194. n. 980: g. Primulear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 850. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 68.
Rchb. 1828. Consp. p. 127. n. 3323: g. Anagallidear. — Par. Meisn. 1839. Gen. n. 254 (164).
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 343: g. Primulaceis aff.?
Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 4851: g. Samolear.?
Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 345: g. Anagalleidar. Sect.: Euparella, Stenygra.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 646: g. Anagallidar.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 466: g. Lysimachiear.

Euparella Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 345: sect. Eupareae. (Euparea Banks et Jiraseckia Schm.)

Euparietaria Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 328: sect. Parietariae.
Synon. Parietaria Gaudich.

Euparinarium Blume 1855. Mél. bot. II; 1858. Flora p. 255: sect. Parinarii. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 644.
Synon. Parinari Aubl.; Dugortia Scop.; Petrocarya Schreb.; Balantium Desv.; Lepidocarpa Korth.?

*) εὐπάρειος, genis pulchris praeditus.

Euparonychieae Fenzl 1839 in Endl. Gen. p. 957; 1841. Ench. p. 504: subtrib. Illecebrear. Gen.: Herniaria, Illecebrum, Cardionema, Pentacaena, Paronychia, Gymnocarpus. Accedit 1850 (Spl. V. p. 54) Sclerocephalus.

Euparsonsia Endl. 1841. Ench. p. 295. n. 3417 *b:* sect. Parsonsiae.
Parsonsia R. Brown.

Eupaspaleae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. III. p. 362: cohors Paspalear. Gen.: Paspalum, Helopus.

Eupastinaca Fenzl 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 10. n. 4473 *a:* sect. Pastinacae.
Siser Griseb.

Eupatoreae HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 104: sect. Compositar. Gen.: Kuhnia, Eupatorium, Mikania, Stevia, Ageratum, Coelestina, Alomia, Piqueria. *Cf.* Spreng. n. Entd. III. p. 197.

Eupatoriaceae Link 1829. Handb. I. p. 729: ordo Anthodiatar. Gen.: Eupatorium.
Less. 1832. Syn. p. 154: trib. 5 Synantherear. Subtrib.: Alomieae, Agerateae, Eupatorieae, Tussilagineae
DC. 1836. Pr. V. p. 103: trib. 2 Tubuliflorar. Subtrib.: Eupatorieae, Tussilagineae. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 365; 1841. Ench. p. 233. Subtrib. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 179 (124). Subtrib. eaed. — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 284. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. Subtrib.: Alomieae, Agerateae, Adenostyleae, Petasiteae, Eutussilagineae.
Koch 1843. Syn. ed. II. p. 381: trib. Corymbiferar. Subtrib. ut DC.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 46: trib. Compositar. Subtrib. ut DC.
C. H. Schultz 1850. Flora p. 419. Divis.: Adenostemmeae, Ooclinieae, Eupatorieae, Kuhnieae.

Eupatorieae Cassini 1815. Bull. soc. philom. p. 173: trib. 16 Synantherear. — Par. Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 9; 1821. v. 20. p. 383; 1823. v. 26. p. 227; 1830. v. 60. p. 585. Divis. (1823): Agerateae, *Archetypae* (gen.: Arnoglossum?, Mikania, Batschia, Gyptis et 1840 Praxelis), Liatrideae. — Less 1830. Linnaea V. p. 136. Gen.: Eupatorium, Ageratum, Stevia, Coelestina, Piqueria, Isocarpha. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 36. 280. Sect. ut Cass.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Eupatorinear. Gen.: Eupatorium, Mikania, Batschia, Stevia, Piqueria, Adenostemma, Sclerolepis, Coelestina, Ageratum.
Less. 1832. Syn. p. 156: subtrib. Eupatoriacear. Gen.: Shawia?, Kuhnia, Eupatorium, Mikania, Adenostyles, Liatris, Carphephorus. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 104. Divis.: Alomieae, Agerateae, Adenostyleae. — Endl. 1838. Gen. p. 366; 1841. Ench. p. 233. Divis. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 179 (124). Divis. eaed. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 46. Gen. ex

Eupatorieae Cassini cont.
Endl. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 381. Gen.: Eupatorium, Adenostyles.
Koch 1837. Syn. p. 348: trib. Corymbiferar. Gen.: Eupatorium, Adenostyles.
Rchb. 1841. Nom. p. 97: div. Homoianthar. Subdivis.: Agerateae, Adenostyleae, Athanasieae.
C. H. Schultz 1850. Flora Nr. 27. p. 420: div. Eupatoriacear. Novum gen.: Fleischmannia.

Eupatorinae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 542: ordo 2 Compositar. Gen.: Eupatorium, Mikania, Chrysocoma, Cacalia, Sergilus, Kuhnia, Liatris, Vernonia, Pteronia, Podosperma, Calea, Kleinia, Richea, Bidens, Spilanthes, Lavenia, Marshallia, Ageratum, Stevia, Cephalophora, Athanasia, Stylonceras, Humea, Caesulia, Ixodia, Santolina, Neesia, Balsamita, Sparganophorus, Ethulia, Piqueria, Tarchonanthus, Noccaea, Tetranthus, Elephantopus, Lagascea, Tanacetum, Hippia, Artemisia, Gnaphalium, Elichrysum, Xeranthemum, Baccharis, Carpesium, Tussilago, Anacyclus, Cotula, Micropus, Gymnostyles, Calycera, Lapeyrousia, Brotera, Flaveria, Corymbium, Stoebe, Shawia, Turpinia.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 355; 1831. Gen. II. p. 609: trib. 2 Syngenesiae. Gen. (1826) §. 1: Eupatorium, Mikania, Chrysocoma, Cassinia, Seris, Ampherephis, Cacalia, Culcitium, Liatris, Wikströmia, Albertinia, Vernonia, Kleinia, Nevrochlaena; Kuhnia, Pteronia, Podosperma, Craspedia, Stoebe; Calea, Hopkirkia, Spilanthes, Melananthera, Petrobium, Lavenia, Marshallia, Thymophylla, Platypteris, Coelestina, Ageratum, Stevia, Güntheria, Palafoxia, Hymenopappus, Longchampia, Athanasia, Stylonceras, Bidens, Elephantopus; Santolina, Lasiospermum, Tarchonanthus, Lachnospermum, Otanthus, Podanthus, Calydermos, Ixodia, Balsamita, Sparganophorus, Ethulia, Lagascea, Tetranthus, Piqueria, Humea. §. 2: Baccharis, Tussilago, Gnaphalium, Gyneteria; Elichrysum; Xeranthemum; Tanacetum, Hippia, Artemisia, Selloa, Carpesium, Anacyclus, Cotula, Micropus, Gymnostyles, Flaveria, Lapeyrousia. (Gen. 1831 fere ead.)
Rchb. 1828. Consp. p. 98 (1831. Fl. exc. p. 278): div. Homoianthar. Gen.: Corymbium; Achyrocoma, Vernonia, Ascaricida, Ethulia, Sparganophorus, Voigtia, Odontoloma, Cacosmia, Centrapalus, Centratherum, Distreptus, Distephanus, Dialesta, Pollalesta, Ampherephis, Wickströmia?, Pacourina, Pacourinopsis, Stokesia, Oligocarpha, Arrhenachne, Tarchonanthus, Tessaria, Monarrhenus, Phalacromesus, Monenteles, Chlaenobolus, Pluchea, Gymnanthemum, Heterocoma, Hololepis, Isonema, Lepidaploa, Liabum, Lychnophora, Munnozia?, Oligactis, Oliganthes, Piptocoma, Shawia?, Struchium, Xanthocephalum?; Albertinia?; *Archetypae:* (Eupatorium, Mikania, Ageratum, Batschia, Coelestina, Alomia, Gyptis, Piqueria, Adenostemma, Sclerolepis, Stevia, Kuhnia, Trilisa, Liatris, Acilepis?, Leucomeris?, Güntheria?), Adenostyleae, Tussilagineae.
Bartl. 1830. Ord. p. 136: div. Synantherear. Gen.: Stevia, Ageratum, Coelestina, Alomia, Sclerolepis, Adenostemma, Piqueria, Arnoglossum?, Mikania, Batschia, Gyptis, Eupatorium, Coleosanthus, Kuhnia, Stephananthus, Carphephorus, Trilisa, Suprago, Liatris; Acilepis?, Leucomeris, Güntheria.

Eupatorineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: trib. unica Adenostigmear. Subtrib.: Liatrideae, Eupatorieae, Adenostyleae, Tussilagineae.

Eupatoriophalacron Vaillant 1720. Act. Ac. Par. p. 324: nov. g. Corymbiferar.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 95. t. 42.
Adans. 1763. Fam. II. p. 130: g. Bidentum. = Eueclipta DC.

Eupatorium*) Tourn. 1700. Inst. p. 455. t. 259: g. pl. class. XII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 181. Ed. Hall. 1745. p. 191: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1719. Act. Ac. Par. p. 302: g. Corymbiferar. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 704. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1772. Carn. II. p. 155. — Juss. 1789. Gen. p. 178. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 510. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 393. — DC. 1805. Franç. IV. p. 129. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 473. — Link 1822. En. II. p. 306. — Math. 1853. Belg. I. p. 265.
Linn. 1737. Gen. p. 247. n. 638; 1737. Cliff. p. 396; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 253; 1753. Sp. II. p. 836; 1759. Syst. ed. X. p. 1204. n. 842; 1763. Sp. ed. II. p. 1171; 1764. Gen. ed. VI. p. 413. n. 935; 1767. Syst. ed. XII. p. 536: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 612; 1784. Syst. p. 735. — Aubl. 1775. Guian. II. p. 795. t. 314. 315. — Lour. 1790. Coch. II. p. 487. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 546. n. 1272. — Gmel. 1791. Syst. p. 1197. — Pers. 1797. Syst. p. 775; 1807. Ench. II. p. 398. n. 1821. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1748. n. 1454; 1809. En. p. 852. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 135. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 51. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 414.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 247. n. 1017: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 573.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Oppositifolior.
Adans. 1763. Fam. II. p. 123: g. Conysar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 187. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 507. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 7. 217.
Hill 1769. Ht. kew. p. 34: g. Tubulatar.
Scop. 1777. Intr. p. 129: g. Flosculosar. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 885.

*) Dictum ab Eupatore, Ponti rege.

Eupatorium Tourn. cont.
Neck. 1790. El. I. p. 81. n. 145: g. Siphoniphytor. Disjunguntur Kyrstenia et Willugbaeya.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 401. t. 166: g. Tubulosar.
Rebent. 1804. Neom. p. 102: g. Pentandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 544; 1826. Syst. III. p. 410. n. 2668; 1831. Gen. II. p. 609. n. 3006: g. Eupatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2227; 1831. Fl. exc. p. 278. — Bartl. 1830. Ord. p. 136.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 105: g. Eupatorear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 409. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 902.
Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 2; 1823. v. 26. p. 228; 1830. v. 60. p. 585: g. Eupatoriear. (1823 Archetypar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Less. 1830. Linnaea V. p. 136 (includens Mikaniam); 1832. Syn. p. 157. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 304. — Koch 1837. Syn. p. 348. Ed. II. p. 381. — Kunth 1838. Berol. I. p. 326. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 287. (verar.) Disjunguntur Ageratina et Ayapana. — Brongn. 1843. En. genr. p. 46. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 184. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 26.
D. Don 1825. Nepal. p. 170: g. Carduacear.
Link 1829. Hdb. I. p. 729: g. Eupatoriacear. — Par. Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 286.
DC. 1836. Pr. V. p. 141: g. Adenostylear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2280. p. 370; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1839. Gen. p. 181 (124). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 81. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3826. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 465. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 85.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 54.
Synon. Kyrstenia et Willugbaeya Neck.; Batschia Mönch, Cass.; Tragantha Wallr.; Ageratina et Ayapana Spach.; Bustamenta Alaman.

Eupatrinia Ledeb. 1845. Fl. Ross. II. p. 426: sect. Patriniae.

Eupecopteris Sternb. 1838. Vers. II. p. 146: sect. Pecopteridis.

Eupectideae DC. 1836. Prodr. V. p. 98: div. Pectidear. Gen.: Pectidopsis, Pectidium, Pectis, Lorentea. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 365; 1841. Ench. p. 233. Gen. ead. — Meisn. 1838. Gen. p. 179 (124). Gen. ead.
Synon. Pectideae Less.

Eupectis A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 83: sect. Pectidis. *Cf.* Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 147.

Eupedicularis Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 15: sect. Pedicularis. (P. verticillata, orthantha, Friderici Augusti, comosa, leucodon.)

Eupelexia Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 481: sect. Pelexiae.

Eupenaea Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 73. n. 2116 *a*: sect. Penaeae.
Synon. Penaea A. Juss.

Eupennantia Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. IX. p. 490: sect. Pennantiae.

Eupentachondra DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 759: sect. Pentachondrae.

Eupentstemon Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 327: sect. Pentstemonis.

Eupeplis (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 597: sect. Peplidis.
Peplis Linn.

Eupera Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 434: sect. Perae. (*Pera*, *Spixia* et *Peridium Klotzsch.*)

Euperezia Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 2962 *a* γ. p. 1387; 1841. Ench. p. 249: subsect. Clarioneae.
Synon. Perezia DC.

Eupetalacte DC. 1837. Prodr. VI. p. 267: sect. Petalactes. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2765 *a*. p. 451; 1841. Ench. p. 243.

Eupetalostemon Endl. 1840. Gen. n. 6522 *a*. p. 1270; 1841. Ench. p. 669: sect. Petalostemonis.

Eupetalum Lindl. 1836. Introd. ed. II. p. 57; 1836. Bot. Regist. XXI. 1757; 1847. Veg. kingd. p. 319: nov. g. Begoniacear. — Par. Klotzsch 1855. Begon. p. 139. (Begonia petalodes Lindl., etc.)
Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6315. 2: sect. Begoniae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 215.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 286: subg. Begoniae.

Eupetasites (Grenier &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 89: sect. Petasitis. (Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 148.)
= Petasites Tourn.

Eupeucedanum DC. 1830. Prodr. IV. p. 176: sect. Peucedani. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 330. — Endl. 1839. Gen. n. 4462 *b*. p. 779; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 8. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 308. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 687.
Synon. Peucedanum Gärtn.; Peucedana legitima Koch; Elaeochytris Fenzl; Polycyrtus Schltd.

Euphaca Endl. 1840. Gen. n. 6571 *a*. p. 1277; 1841. Ench. p. 669: sect. Phacae. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 684.
Synon. Erophaca Boiss.?

Euphalaris (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 438: sect. Phalaridis.
= Phalaris Mönch.

Euphania DC. 1836. Prodr. V. p. 114: sect. Phaniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2263 *a*. p. 367; 1841. Ench. p. 233.

Euphaseoleae Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 236: div. Phaseolear. Gen.: Nomismia, Rhynchosia, Flemingia, Phaseolus, Soja, Dolichos, Lablab, Pachyrrhizus, Parochetus?, Psophocarpus, Canavalia, Mucuna, Cantharospermum, Cajanus, Atylosia, Dunbaria, Cylista, Cyanospermum, Erythrina.

Euphaseoleae Wight & Arn. cont.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: subtrib. Phaseolear. Gen.: Phaseolus, Vigna, Dolichos, Lablab, Sphenostylis, Pachyrhizus?, Psophocarpus, Diesingia, Dunbaria?, Taeniocarpum. — Par. Endl. 1841. Gen. p. 1296; 1841. Ench. p. 672. Gen. ead. et Voandzeia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. Gen. ead. et Otoptera, Plectrotropis, Apios, Cystotropis.

Euphaseolus DC. 1825. Prodr. II. p. 390: sect. Phaseoli. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 349. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 243. — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 137. — Endl. 1841. Gen. n. 6674 *b.* p. 1296; 1841. Ench. p. 672. Subsect.: Caracallae, Brachypodii. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 195.

Euphilippia Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 695: sect. Philippiae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4311 *a.* p. 754; 1841. Ench. p. 369.
Synon. Philippia Klotzsch.

Euphilodendron Schott 1832. Melet. bot. p. 19: sect. Philodendri. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1690 *a.* p. 237; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 47.

Euphlebodium Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 402 (sph. *Euphlepodium)*: sect. Polypodii. (Phlebodia vera Sm.)
= Chrysopteris Link. (Fée.)

Euphleum Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 457: sect. Phlei. — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 446.
Synon. Phleum Palis.

Euphlomis Benth. 1834. Labiat. p. 622; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 537: sect. Phlomidis. Subsect.: Lychnitis, Gymnophlomis, Dendrophlomis, Oxyphlomis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 851. Subsect. eaed. — Endl. 1838. Gen. n. 3664 *a.* p. 629; 1841. Ench. p. 308. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 146. — Walp. 1845. Rep. III. p. 879. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 435.

Euphocarpus Anders. mss. ex Steud. Nomencl. I. p. 422. 609.
Correa Smith.

Euphoebe Miquel 1857. Fl. Ind. bat. I. p. 906: sect. Phoebes.

Euphorbia*) Linn. 1737. Gen. p. 152. n. 429; 1737. Ht. Cliff. p. 196; 1742. Gen. ed. II. p. 237. n. 517; 1748. Upsal. p. 138: g. Polyandr. Monogyn.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 226: g. Tricoccar. — Par. Linn. 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 246. — Gis. 1792. Prael. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 168. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 301. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 786. n. 3076; 1831. Gen. II. p. 684. n. 3451.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 106. n. 437: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Tricoccor.

*) Dicat. a rege Juba medico suo Euphorbo. Conf. Linn. Ht. Cliff. p. 297.

Euphorbia Linn. cont.
Linn. 1752. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 100: g. medium inter Cambogiam et Dalechampiam.
Linn. 1753. Sp. I. p. 450; 1759. Syst. ed. X. p. 1047. n. 536; 1762. Sp. ed. II. p. 646; 1764. Gen. ed. VI. p. 243. n. 609; 1767. Syst. ed. XII. p. 330: g. Dodecandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 373; 1784. Syst. p. 449. — Reich. 1778. Gen. p. 249. n. 665. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 196. — Roth 1788. Germ. I. p. 204; 1789. II. 1. p. 523. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 326. n. 832. — Lour. 1790. Coch. I. p. 298. — Gmel. 1791. Syst. p. 759. — Pers. 1797. Syst. p. 481; 1807. Ench. II. p. 10. n. 1190. — Willd. 1799. Sp. II. p. 881. n. 959; 1809. En. p. 500. — GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 129. 139. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 261. 271. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 465.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Euphorbiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 385.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172²: g. Tetrapetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 493: g. Tithymalear. — Par. Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58. — Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5012 (sect: Euphorbia, Keraselma, Athymalus, Tithymalus); 1832. Fl. exc. p. 755 (sect.: Chamaesyce, Tithymalus); 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 193. n. 7329 (sect.: Chamaesyce, Tithymalus, Crepidaria, Medusaea, Dactylanthes, Treisia, Euphorbia).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 243. (E. Ipecacuanha.) *Cf. Tithymalus.*
Vent. 1799. Tabl. III. p. 486: g. Tithymaloidear.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 209: g. Monoec. Monadelph. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 226.
Cram. 1803. Disp. p. 17 in Diandr. Trigyn. (E. hypericifolia, etc.), p. 65 in Pentandr. Trigyn. (E. antiquorum, etc.) et p. 207 in Polygam. Monoec. (E. canariensis.)
Rebent. 1804. Neom. p. 221: g. Polyandr. Trigyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 277: g. Euphorbiacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 329; 1815. V. p. 357. — R. Brown 1814 in Flind. voy. II. p. 555. (Verm. bot. Schr. I. p. 55.) — Mirb. 1815. Élém. II. p. 903. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 51. — Lois. 1820. Dict. v. 16. p. 11. — Kunth 1822. Syn. I. p. 383; 1838. Berol. II. p. 178. — Link 1822. En. II. p. 9; 1831. Hdb. II. p. 427. — Agdh. 1823. Aphor. p. 193. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 57. — D. Don 1825. Nepal. p. 61. — C. A. Meyer 1833 in Ledeb. Alt. IV. p. 178. — Endl. 1833. Norf. p. 85. — Koch 1837. Syn. p. 626. Ed. II. p. 722. Sect.: Anisophyllum, Tithymalus, Esula. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 134. Sect.: Anisophyllum, Galarrhoeus, Esula. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 227. — (Gren. &) Godr. 1855. France III. p. 75. Sect.: Anisophyllum, Helioscopia, Esula, Lathyris.

Euphorbia Linn. cont.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 363: g. Euphorbiear. — Par. Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 632. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — Bartl. 1830. Ord. p. 372. — A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 28. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 530. — Endl. 1840. Gen. n. 5766. p. 1108; 1841. Ench. p. 587. — Meisn. 1841. Gen. p. 337 (250). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 79. — Klotzsch 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 174. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 721. Sect. ut Koch 1837. — Webb . . . . Canar. III. p. 236. Sect.: Anisophyllum, Tithymalus, Aphyllis, Balsamis, Cereis. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 557. Sect. ut Koch.

Röper 1824. Enum. Euphorb. p. 11: g. Monoec. Monandr. *Cf.* Isis 1825. p. 561 et Flora 1825. I. p. 305.

Baill. 1858. Ét. Euphorb. p. 281: g. Euphorbiidear. Sect.: Treisia, Crepidaria, Medusaea, Tithymalus, Esula, Galarhaeus, Alectoroctonum, Poinsettia, Anisophyllum.

Synon. Tithymalus Tourn.; Euphorbium Isn.; Esula Riv., Rupp.; Euphorbio-Tithymalus Burm.; Keraselma et Athymalus Neck.; Treisia, Dactylanthes, Medusea, Crepidaria, Galarhoeus, Esula, Anisophyllum Haw.

Euphorbia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 352. n. 1153: g. Cyrtosiphytor., sejunctis Keraselmate, Athymalo, Pedilantho et Tithymalo restrict.

Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5012 *a*: sect. Euphorbiae.

Euphorbia Haworth 1812. Syn. succ. p. 126. Ed. Schrank 1819. p. 138: g. Dodecandr. Trigyn., emissis Treisia, Dactylanthe, Medusea, Crepidaria, Tithymalo, Galarhoeo, Esula, Anisophyllo arcte circumscriptum.

Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7329. 7: sect. Euphorbiae.

Euphorbiaceae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. II. p. 276. t. 108: fam. plant. Gen. Euphorbiar. Juss. 1789, accedentibus in §. 1: Phyllaurea, Tridesmide, Triphaca, in §. 2: Loureira.

DC. 1805. Franç. III. p. 327: fam. (27) Dicotyledonum. Gen.: Mercurialis, Euphorbia, Buxus, Ricinus, Croton. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 903. Typi sectionum: Mercurialis, Euphorbia.

Pers. 1807. Ench. II. p. 580: ordo pl. Gen.: Plukenetia, Dalechampia, Acalypha, Croton, Aleurites, Jatropha, Ricinus, Siphonia, Agyneja, Omphalea, Epistylium, Hecatea, Hura, Hippomane, Vernicia, Sapium, Stillingia, Phyllanthus.

R. Brown 1814. Flind. voy. II. p. 555 (Verm. bot. Schr. I. p. 55): ordo Dicotyledonum. (*Cf.* Juss. 1820. Dict. v. 16. p. 25.)

DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Monochlamydear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 626. Ed. II. p. 721. Gen.: Buxus, Euphorbia, Mercurialis et (1844) Andrachne.

Euphorbiaceae St. Hil. cont.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 255: fam. Monochlamydear. Gen.: Galarhoeus, Esula, Characias, Chamaesyce, Mercurialis, Buxus.

Agdh. 1823. Aphor. p. 192; 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: ordo Micranthar. Gen. §. 1 (*Polystylae*): Callitriche; Mercurialis, Hermesia, Hisingera, Euphorbia, Pedilanthus, Argythamnia, Cicca, Cliffortia, Phyllanthus, Xylophylla, Kirganelia, Cometes, Nymphanthus, Kiggelaria, Clutia, Bridelia, Andrachne, Agyneja, Buxus, Tricera, Didymandra, Securinega, Adelia, Mabea, Ricinus, Trewia, Jatropha, Siphonia, Perula, Gelonia, Rottlera, Hyaenanche, Acidoton, Bivonia, Griselinia, Pachysandra, Dryandra, Aleurites, Breynia, Pennantia, Flüggea, Croton, Savia, Acalypha, Tridesmis, Triphaca, Caturus, Excoecaria; Commia, Coriaria. §. 2 (*Monostylae*): Richeria, Tragia, Stillingia, Sapium, Loureira, Amirola, Hippomane, Hecatea, Sebastiania, Aegopricon, Alchornea, Hura, Gyrostemon, Bradleja, Epistylium, Tricarium, Omphalea, Gussonia, Plukenetia, Dalechampia; Garcia, Crinodendron, Commiphora.

A. Juss. (1823. Mém. Mus. X. p. 317) 1824. Fam. Euphorb. (Paris.) Gen. §. 1: Drypetes, Thecacoris, Pachysandra, Buxus, Securinega, Savia, Amanoa, Richeria, Fluggea. §. 2: Epistylium, Gynoon, Glochidion, Anisonema, Leptonema, Cicca, Emblica, Kirganelia, Phyllanthus, Xylophylla, Menarda, Micranthea, Agyneia, Andrachne, Cluytia, Briedelia. §. 3: Argythamnia, Ditaxis, Crozophora, Croton, Crotonopsis, Adelia, Acidoton, Rottlera, Codiaeum, Gelonium, Hisingera, Mozinna, Amperea, Ricinocarpos, Ricinus, Janipha, Jatropha, Elaeococca, Aleurites, Anda, Siphonia, Mabea, Hyaenanche, Garcia. §. 4: Alchornea, Conceveibum, Claoxylon, Macaranga, Mappa, Caturus, Acalypha, Mercurialis, Anabaena, Pluknetia, Tragia. §. 5: Microstachys, Sapium, Stillingia, Triadica, Omalanthus, Hippomane, Hura, Sebastiania, Excoecaria, Commia, Styloceras, Maprounea, Omphalea. §. 6: Dalechampia, Anthostema, Euphorbia, Pedilanthus. Gen. minus cognita: Margaritaria, Suregada, Hexadica, Homonoia, Cladodes, Echinus, Colliguaja, Lascadium, Synzyganthera. *Cf.* Desf. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 136 et Flora 1825. I. p. 353.

Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 578. Sect.: Phyllantheae, Crotoneae, Euphorbieae.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXVIII: fam. Foliosar. Divis.: Pipereae, Tithymaleae, Hippomaneae, Acalypheae, Ricineae, Phyllantheae, Buxeae.

Rchb. 1828. Consp. p. 194: divis. Rutacear. Subdivis. ut 1827 (exclusis Pipereis). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 193. Subdivis.: Euphorbieae, Crotoneae, Buxeae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42. 45: fam. Rutariear. Trib.: Euphorbieae, Huraceae, Acalypheae, Crotonieae, Phylantheae, Buxineae.

Euphorbiaceae St. Hil. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 369: ordo (217) Tricoccar. Divis.: Buxeae, Phyllantheae, Ricineae, Acalypheae, Hippomaneae, Euphorbieae. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1107; 1841. Ench. p. 586. Trib. ut Bartl. (Crotoneae loco Ricinear.) et 1842 (Spl. II. p. 86) Prosopidoclineae. — Meisn. 1841. Gen. p. 336 (249). Trib. ut Endl.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (88) Apetalar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 427. Gen.: Euphorbia, Mercurialis, Emblica, Xylophylla, Clutia, Andrachne, Buxus, Ricinus, Mandioca, Siphonia, Croton, Aleuritis, Crossophora, Hippomane, Hura, Pachysandra.
Lindl. 1833. Nix. p. 21; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 112; 1847. Veg. kd. p. 274: ordo Euphorbialium. Trib. ut Endl.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 484: fam. (30) Tricoccar. Trib. ut Bartl.
Mart. 1835. Consp. p. 54: ordo 264.
Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 175. Trib. ut Endl. 1840 et Prosopidoclineae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 79: fam. Crotoninear. Trib. ut Endl.
Zoll. 1846. Obs. phyt. II. p. 16 ex Hasskarl 1847. Flora II. p. 662. Subordines: Monosporeae, Disporeae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 503. Trib.: Euphorbieae, Stillingieae, Acalypheae, Crotoneae, Phyllantheae, Buxeae.
Zoll. 1856. Act. soc. sc. Indo-Neerl. I. Subordines: *Monospermae* (trib.: Euphorbieae, Acalypheae), *Dispermae* (trib.: Phyllantheae, Buxeae). *Cf.* Hassk. 1858. Hort. Bogor. p. 26.
Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 246: ordo Malvaceis aff. Divis. (*A. Uniovulatae*): Euphorbiideae, Ricinideae, Jatrophideae, Crotonideae, Perideae, Dysopsideae, Stillingiideae, Hurideae, Anthostemideae; (*B. Biovulatae*): Colmeiroideae, Stachystemoneae, Wielandiideae, Phyllanthideae, Callitrichideae.
Synon. Euphorbiac Juss.; Tithymaloideae Vent.; Ricinaceae Nor.; Euphorbieae Spreng.

Euphorbiacites Sternb. 1838. Vers. II. p. 205: ordo plant. foss. Gen.: Tithymalites.

Euphorbiae B. Juss. 1759 in Hort. Trian.: ordo 62 plantar. Gen.: Mercurialis, Acalypha, Tragia, Euphorbia, Buxus, Phyllanthus, Andrachne, Clutia, Ricinus, Jatropha, Croton, Dalechampia, Plukenetia, Hura, Hippomane, Sterculia, Carica.
Juss. 1789. Gen. p. 384: ordo 1 class. XV. Gen. §. 1: Mercurialis, Euphorbia, Argythamnia, Cicca, Phyllanthus, Xylophylla, Kirganelia, Kiggelaria, Clutia, Andrachne, Agyneja, Buxus, Securinega, Adelia, Mabea, Ricinus, Jatropha, Dryandra, Aleurites, Croton, Acalypha, Caturus, Excaecaria. §. 2: Tragia, Stillingia, Sapium, Hippomane, Maprounea, Sechium, Hura, Omphalea, Plukenetia, Dalechampia.
Cassel 1810. Nat. Fam. p. 110.
= Euphorbiaceae St. Hil.

Euphorbiales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 21: nixus Syncarpar. Ordines: Euphorbiaceae, Stackhousieae, Fouquieraceae, Celastrinae, Malpighiaceae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 273: nixus Exogenar. diclinar. Ord.: Euphorbiaceae, Scepaceae, Callitrichaceae, Empetraceae, Nepenthaceae.

Euphorbieae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 363: ordo Tricoccar. Gen.: Euphorbia, Pedilanthus, Acalypha, Galurus, Croton, Jatropha, Ricinus, Bernardia, Excoecaria, Clutia, Hevea, Pera, Gelonium, Rottlera, Toxicodendron, Tricera, Acidoton, Griselinia, Pachysandra, Argothamnia, Phyllanthus, Xylophylla, Andrachne, Epistylium, Omphalea, Aegopricon, Sapium, Stillingia, Tragia, Mabea, Richeria, Buxus.
A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 27: trib. Euphorbiacear. Gen.: Microstachys, Stillingia, Omalanthus, Pachystemon, Hippomane, Hura, Commia, Styloceras?, Excoecaria, Colliguaya, Adenopeltis, Mapronnea, Anthostema, Euphorbia, Pedilanthus.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 753: div. Rutacear. Subdivis.: Callitrichinae, Tithymaleae, Hippomaneae, Acalypheae, Ricineae, Phyllantheae, Buxeae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 280. Subdivis.: *genuinae* (sect.: Callitrichineae, Tithymaleae, Ricineae), Crotoneae, Buxeae.
Rchb. 1841. Nom. p. 193: subdiv. Euphorbiacear. Sect. ut 1837.

Euphorbieae Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 631: sect. Euphorbiacear. Gen. jav.: Dalechampia, Euphorbia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: trib. Euphorbiacear. Gen. ead. et Pedilanthus. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 488. 530. Gen. ut Bartl. — Endl. 1840. Gen. p. 1108; 1841. Ench. p. 587. Gen. ead. exclusa Hendecandra. — Meisn. 1841. Gen. p. 337 (250). Gen. ead. et Monotaxis? — Brongn. 1843. Én. genr. p. 79. Gen. ex Bartl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. Gen. ut Endl. et Lopadocalyx, Poinsettia. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 504. Gen.: Pedilanthus, Euphorbia, Anthostema.
Bartl. 1830. Ord. p. 372: div. Euphorbiacear. Gen.: Dalechampia, Anthostema, Hendecandra, Euphorbia, Pedilanthus.
Zoll. 1846. Obs. phyt. II. p. 16 ex Hasskarl 1847. Flora II. p. 662: trib. Monosporear.
Synon. Euphorbiacear. §. 6 A. Juss.; Tithymaleae Rchb. 1828; Euphorbiideae Baill.

Euphorbiideae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 281: div. Euphorbiacear. uniovulatar. Gen.: Euphorbia, Pedilanthus.
= Euphorbiear. Blume pars.

Euphorbio-Tithymalus Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 95: nov. g. plant. (Tithymalus zeylanicus, spinosus, arborescens. Par. Bat. Pr.)
= Euphorbiae L. pars.

Euphorbites Martius 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. . . . : nov. g. pl. foss. *Cf.* Flora 1823. I. p. 325. — Par. Artis 1825. Antedil. Phyt. t. 15.
= Sigillaria Brongn.

Euphorbium Danty d'Isnard 1720. Mém. Ac. Paris. p. 384. t. 10. 11: g. plant. flore incompleto, monopetalo, regulari, androgyno.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 96.
= Euphorbia Linn.

Euphoria*) „Comm. mss." Juss. 1789. Gen. p. 247: nov. g. Sapindor.
Gmel. 1791. Syst. p. 611: g. Octandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 413. n. 929. — Blanco 1837. Filipin. p. 285.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 129: g. Saponacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 11. — Hedw. 1806. Gen. p. 263. n. 1059.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 476: g. Sapindacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1280.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 699; 1825. Syst. II. p. 222. n. 1458; 1830. Gen. I. p. 312. n. 1595: g. Sapindear. — Par. Poir. 1823. Dict. v. 27. p. 57 *(Litchi)*. Sect.: Euphoria, Nephelium, Pometia. — DC. 1824. Pr. I. p. 611. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 364.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5216: g. Cupaniear.
= Nephelium Linn.

Euphorona „Arrab." Steud. 1840. Nomencl. I. p. 616: g. Decandr. Monogyn. (E. ternata.) Quid?

Euphotinia Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. n. 1956: sect. Photiniae. (Ph. serrulata.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6350 *a*. p. 1238; 1841. Ench. p. 656. — Walp. 1843. Rep. II. p. 56. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 100. 110.
Synon. Aronia Medic.

Euphrasia**) Tourn. 1700. Inst. p. 174. t. 78: g. pl. class. III.
Linn. 1737. Gen. p. 184. n. 512; 1737. Cliff. p. 325; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 604; 1759. Syst. ed. X. p. 1107. n. 659; 1763. Sp. ed. II. p. 841; 1764. Gen. ed. VI. p. 304. n. 741; 1767. Syst. ed. XII. p. 405: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 435. — Murr. 1774. Syst. p. 460; 1784. Syst. p. 549. — Reich. 1778. Gen. p. 307. n. 799. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 401. n. 998. — Gmel. 1791. Syst. p. 923. — Pers. 1797. Syst. p. 586. — Willd. 1800. Sp. III. p. 192. n. 1132; 1809. En. p. 635. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 56.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 174. n. 711: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 211. — Scop. 1777. Intr. p. 176. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 7. 109.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.

Euphrasia Tourn. cont.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 298: g. Angiospermar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 263: g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 257. t. 54. f. 8 (officinalis et Odontites).
Juss. 1789. Gen. p. 100: g. Pedicularium.
Neck. 1790. El. I. p. 349. n. 545: g. Chasmatophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 299: g. Rhinanthoidear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 149. n. 1454.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 385: g. Capsuliferar.
Rebent. 1804. Neom. p. 67: g. Tetrandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 132: g. Rhinanthacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 472; 1815. V. p. 390. — Link 1822. En. II. p. 135; 1829. Hdb. I. p. 514. — Koch 1837. Syn. p. 545. Ed. II. p. 627. Sect.: Euphrasium, Odontites.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 436. Ed. Nees p. 292: g. Scrophularinar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 392; 1825. Syst. II. p. 775. n. 2157; 1831. Gen. II. p. 485. n. 2396: g. Rhinanthear. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 333. — Lois. 1819. Dict. v. 15. p. 526. — Kunth 1823. Syn. II. p. 102; 1838. Berol. II. p. 80. Sect. 1838 ut Koch. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 321.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 382: g. Rhinanthinar.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 112: g. Euphrasiear.
Math. 1853. Belg. I. p. 389: g. Pediculariear.
= Euphrasia et Odontites Rupp.

Euphrasia Rupp. 1718. Fl. jen. p. 235. Ed. Hall. 1745. p. 240: g. pl. class. IX, disjuncta Odontite emendat.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 628: g. Dymeizonum.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 212: g. Ringentium.
Mönch 1794. Meth. p. 438: g. Petalostemonis.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 309: g. Rhinanthacear.
Steven 1823. Mém. soc. Mosc. VI. p. 4: g. Personatar.
D. Don 1825. Nepal. p. 95: g. Pediculariear.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3080; 1831. Fl. exc. p. 358; 1841. Nom. p. 115. n. 4456: g. Pedicularinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Melampyracear.
Bartl. 1830. Ord. p. 172; 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 343: g. Rhinanthear. — Par. Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 422. — Benth. 1835. Scroph. rev. p. 6. — Endl. 1839. Gen. n. 4011. p. 693; 1841. Ench. p. 340. — Meisn. 1840. Gen. p. 313 (223). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 330. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 363. 544. — Brongn. 1843. En. genr. p. 61. — Griseb.

---

*) *εὐφορία*, fertilitas, abundantia.
**) *εὐφρασία*, laetitia.

Euphrasia Rupp. cont.
1844. Rumel. II. p. 14. — Walp. Rep. III. p. 401.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 609: g. Bartsiear. — Par. Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 552. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 262.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Euphrasiear.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 604: g. Scrophulariacear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 198: g. Scrophularinear.
Synon. Parentucellia Viv.; Euphrasium Koch.

Euphrasieae D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 112: trib. Scrophularinear. Gen.: Euphrasia, Bartsia, Lamourouxia, Castilleja. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 609. Subtrib.: Bartsieae, Castillejieae.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 526; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: trib. Rhinanthidear. Sect.: Castillejeae, Schwalbeae, Bartsieae, Rhinantheae, Melampyreae (1847 gen. ead. omissis sectionibus) — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 460. Gen. ead.

Euphrasioides Endl. 1839. Gen. p. 685. n. 3959 *b:* sect. Strigae. (Buchnera asiatica Vahl.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4631. 2 *(Euphrasiopsis)*. — Walp. 1845. Rep. III. p. 299.

Euphrasioides Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 539: sect. Lamourouxiae.

Euphrasiopsis Rchb. vid. *Euphrasioides Endl.*

Euphrasium Koch 1837. Syn. p. 545. Ed. II. p. 627: sect. Euphrasiae. — Par. Kunth 1838. Berol. II. p. 81.
= Euphrasia Rupp.

Euphrobosces „Griff." Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 17. t. 1732: nov. g. Orchidear. anomal. (in tab. Euphroboscidear.) *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 922 *(Euproboscis)*.
= Thelasis Blume.

Euphroboscideae Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. t. 1732. Gen.: Euphrobosces.

Euphronia*) Martius 1824. Nov. gen. I. p. 121. t. 73: nov. g. Spiraeacear.? (E. hirtelloides.) *Cf.* Flora 1825. I. p. 32.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 246; 1831. Gen. II. p. 537. n. 2632: g. Monadelph. Pentandr.
Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4459: g. Spiraeear.?
Meisn. 1837. Gen. p. 103 (72): g. Quillajear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6400. p. 1249; 1841. Ench. p. 660. — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6520. — Walp. 1846. Rep. V. p. 659. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565.

Euphrosine Allem. 1770. Nov. Act. Nat. Cur. I. p. 93: nov. g. plantar.

Euphrosine Endl. vid. *seq.*

Euphrosinia Rchb. vid. *seq.*

*) Nomen ab Euphronio, antiquo de re rustica scriptore.

Euphrosyne*) DC. 1836. Prodr. V. p. 530: nov. g. Ivear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2486. p. 404; 1841. Spl. I. p. 1381 *(Euphrosine)*; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3918 *(Euphrosinia ob genus animalium)*. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22: g. Ambrosiear.

Euphyllanthus Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 624: sect. Phyllanthi. (Phyllanthus sect. Endl.)

Euphymatodes Presl 1836. Pterid. p. 196: sect. Phymatodis.
Endl. 1841. Spl. I. n. 615 *k α.* p. 1347; 1841. Ench. p. 36: subsect. Phymatodis.
Conf. Chrysopteris Link.

Euphymatopsideae Trevisan 1856. Linnaea XXVIII. p. 296: div. Phymatopsidear. Gen.: Scutula, Sarcogyne, Phymatopsis, Monerolechia, Lecozonia.

Euphysalis Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 662: subg. Physalidis. (Physalis Dunal 1852.) Sect.: Eurystorhiza, Epeteiorhiza.

Euphytolacca Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 31: sect. Phytolaccae.

Eupicrideae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 463: div. Picridear. Subdivis.: Picrideae verae, Helminthieae.

Eupicris DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 128: sect. Picridis. — Par. Ledeb. 1846. Ross. II. p. 798.
Synon. Medicusia Mönch; Choeroseris Link.

Eupilotrichum C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 177: sect. Pilotrichi.
Synon. Callicosta Müll.; Scleroneuron Hampe.

Eupimelea Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 60. n. 2092 *a:* sect. Pimeleae. (Pimelea Meyer.) — Par. Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 497. Subsect.: Heterolaena, Phyllolaena, Imbricatae, Dasyphyllae, Micranthae, Epallage, Malistachys, Choristachys.

Eupimpinella Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 369: sect. Pimpinellae. (P. Leschenaultii DC.)
= Tragium Spreng.

Eupiptadenia Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 335: sect. Piptadeniae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 578.

Eupiqueria DC. 1836. Prodr. V. p. 104: sect. Piqueriae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2253 *a.* p. 366; 1841. Ench. p. 233. — Gardn. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 430. (includens Orsiniam DC.) — Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 393.

Eupitis Godr. vid. *Eupitys Spach.*

Eupittosporum Putterlick 1839. Syn. Pittosp. p. 6; 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 189; sect. Pittospori. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 250. — Simil. Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 11. p. 159.

*) Nomen ex formulis nudis, alludens ad nuditatem Gratiarum.

Eupitys Spach 1842. Hist. vég. phan. XI. p. 374: sect. Pinus. (P. Pinea, sylvestris, Banksiana, Laricio, etc.) — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 194. — (Gren. &) Godr. 1855. France III. p. 152 (*Eupitis*).

Euplassa Salisb. . . . . (g. a Spreng. 1830. Gen. I. p. 107 ad Roupalam Aubl. relatum.)
Adenostephanus Klotzsch. (Meisn. in DC. Pr. XIV. 1. p. 436.)

Euplatycentrum Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 693: sect. Platycentri.
= Platycentrum Klotzsch.

Euplatyzoma Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 660 *a*. p. 1351; 1841. Ench. p. 40: sect. Platyzomae.
Synon. Platyzoma Presl.

Eupleiogyne C. Koch 1843. Bot. Zeit. p. 40: sect. Pleiogynes. (Cotula nudicaulis Thunb.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 992.

Euploca*) Nuttall . . . . Amer. phil. trans. n. ser. V. p. 189.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 365: g. Heliotropear. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 559. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653.
= Tournefortia R. Brown?

Eupoa Griseb. 1853 in Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 370: sect. Poae. (P. alpina, bulbosa, etc.)

Eupodalyrieae Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 27; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 65 (1843. Lond. journ. bot. II. p. 429): subtrib. Podalyriear. Gen.: Anagyris, Thermopsis, Baptisia, Cyclopia, Podalyria, Dalhousiea, Delaria, Brachysema, Callistachya, Oxylobium, Podolobium, Isotropis, Chorozema, Gompholobium. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1254; 1841. Ench. p. 667. Gen. ead. et Pickeringia, Orthotropis. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553. Gen. ut Endl. et Piptanthus.

Eupodisceae Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 134: fam. Diatomear. Gen.: Eupodiscus.
Synon. Tripodisceae Kütz.

Eupodiscus Ehrenb. 1844. Ber. Ak. Berl. p. 73: g. Naviculaceor., junctis Tripodisco, Tetrapodisco et Pentapodisco Ehrenb. formatum.
Kütz. 1844. Bacill. p. 136.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 134. n. 90: g. Eupodiscear. Sect.: Eupodiscus, Aulacodiscus.
Synon. Podiscus Bail.

Eupodium J. Smith 1843. Lond. journ. bot. II. p. 392: nov. g. Marattiacear. (Marattia alata Kaulf.) — Par. Corda 1845. Fl. Vorw. p. 92.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 82: g. Danaeacear.
Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 276: g. Marattiear.

Eupodocarpus Endl. 1847. Syn. Conif. p. 208; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 9. n. 1810 *b*: sect. Podocarpi. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1072.

*) εὔπλοκός, bene plexus.

Eupodospermum Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 470: subg. Podospermi. (P. resedaefolium).

Eupodostemeae Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 92; 1852. Arch. Mus. VI. p. 128: trib. Podostemacear. Subtrib.: Lacideae, Tristicheae. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 432. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 775.

Eupogodon Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 312; 1849. Spec. Alg. p. 801. n. 543: g. Dasyear.
= Dasyopsis Zanard.

Eupogonia Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. 2. p. 31: sect. Pogoniae.

Eupogonium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 104; 1843. Phycol. gener. p. 415; 1845. Phycol. germ. p. 311; 1849. Sp. Alg. p. 797. n. 541: g. Dasyear. *Cf.* Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 59 adnot.
Synon. Compsoteia Harv.

Eupolanisia Endl. 1839. Gen. n. 4988 *c*. p. 891; 1841. Ench. p. 456: sect. Polanisiae. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 195.
Synon. Polanisia R. Brown; Stylaria DC.; Macrostylium Rchb.

Eupolyalthia Blume 1829. Fl. Javan. Anon. p. 68: sect. Polyalthiae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4713 *a*. p. 831; 1841. Ench. p. 422.

Eupolybotrya Fée 1844. Acrost. p. 13. 72: subg. Polybotryae. — Simil. Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 429.
= Polybotrya Fée 1852.

Eupolychaetia DC. 1837. Prodr. VI. p. 285: sect. Polychaetiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2780 *b*. p. 453; 1841. Ench. p. 244.

Eupolygoneae C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 145: trib. Polygonacear. verar. Gen.: Könfigia, Polygonum, Fagopyrum, Ceratogonum.
Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 5; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 82: subtrib. Apterocarpar. Gen.: Könfigia, Polygonum, Fagopyrum.

Eupolygonella Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 54. n. $1993/_1$ *a*: sect. Polygonellae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 292. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 80.
Synon. Polygonella Meyer.

Eupolymnia Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 273: sect. Polymniae. (P. canadensis.)
= Alymnia Neck.

Eupolypodium Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 615 *a*. p. 1346; 1841. Ench. p. 36: sect. Polypodii. Subsect.: Ctenopteris, Dicranopteris, Phegopteris. — Par. Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 373.
Synon. Polypodium Presl.

Eupolyporus Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 47: subg. Polypori. Stirpes: ovini, lenti, spongiosi, melanopodis, petaloidis, frondosi, lobati, imbricati, mollis, dichroi, hispidi, suberosi, lignescentis.

Eupolytrichum C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 217: sect. Polytrichi.
Synon. Polytrichum Palis.; Adianta Wallr.

Eupomatia R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 597 (Verm. bot. Schr. I. p. 138): nov. g. Annonacear.? (E. laurina.) *Cf.* Bull. soc. philom. 1815. p. 136.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 680; 1825. Syst. II. p. 546. n. 1873: g. Anonear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 33.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 419. n. 2088: g. Icosandr. Polygyn.
Bartl. 1830. Ord. p. 245: g. Myristicear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 91: g. Monodorear.
Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6): g. Anonacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 497 (anomalum).
Endl. 1839. Gen. n. 4730. p. 835; 1841. Ench. p. 425: g. Eupomatiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 177. n. 6860. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 77.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 41. 206: g. Calycanthear.

Eupomatieae Endl. 1839. Gen. p. 835; 1841. Ench. p. 425: fam. Anonaceis aff. Gen. unicum: Eupomatia.
Rchb. 1841. Nom. p. 177: subsect. Psidiear. Gen. id.

Euporana Endl. 1839. Gen. n. 3797 *b.* p. 653; 1841. Ench. p. 324: sect. Poranae.

Euporophyllum DC. 1836. Prodr. V. p. 648: sect. Porophylli. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2582 *a.* p. 420; 1841. Ench. p. 239. Subsect.: Tsinoma, Hunteria.

Eupotentilla Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 436: sect. Potentillae. (Potentillastrum et Fragariastrum Ser.)

Eupothos Schott 1854. Oestr. bot. Woch. p. 18: sect. Pothois. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 909. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 177.

Eupottia C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 550: sect. Pottiae.
Synon. Holomitria Wallr.

Eupozoa Fenzl 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 3. n. 4377 *a:* sect. Pozoae.
= Zopoa Walp.

Euprangos Fenzl 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 14. n. 4526 *a:* sect. Prangos.
Synon. Prangos DC.

Eupratia Endl. 1838. Gen. p. 512. n. 3063 *b:* sect. Pratiae.
= Pratia Gaudich.

Euprenanthes Endl. 1838. Gen. n. 3005 *a.* p. 498; 1841. Ench. p. 250: sect. Prenanthis. — Simil. Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 420. (P. purpurea.)
= Hylethale Link.

Euprepia Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 106: sect. Astragali. (Spec. nova.)

Euprestinaria Schultz Bip. 1847 in Walp. Repert. VI. p. 163: sect. Prestinariae.

Euprimula Schott 1851. Oestr. Prim. p. 10: subsect. Primulastri.
= Primulastrum Duby.

Euprivа Schauer 1847 in DC. Prodr. XI. p. 533: sect. Privae.

Euproboscis „Griff." Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 922: vid. *Euphrobosces Griff.*

Euprotococceae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 16. 21: subtrib. Protococcear. Gen.: Protococcus, Protosphaeria, Pleurococcus, Botryocystis, Anacystis, Embryosphaera.

Euproustia DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 27: sect. Proustiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2918 *a.* p. 484; 1841. Spl. I. p. 1385; 1841. Ench. p. 248.

Eupsaronius Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 289: sect. Psaronii.

Eupsidium Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 469: sect. Psidii.

Eupsittacanthus Endl. 1839. Gen. n. 4586 *h α.* p. 802; 1841. Ench. p. 399: subsect. Psittacanthi.

Eupsychotria Benth. & Oerst. 1852. Centr. Am. Rubiac. p. 8: sect. Psychotriae. — Par. Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 229.

Euptatorium Swartz Prodr. p. 111: sphalm. pro *Eupatorium.*

Euptelea Sieb. & Zuccar. 1835. Fl. japon. p. 133. t. 72: nov. g. Ulmacear. (E. polyandra.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 29. n. $1850/_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 370.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 580: g. Ulmear.

Eupterandra Endl. 1841. Ench. p. 557. n. 5589 *a:* sect. Pterandrae.
Synon. Ecphymacalyx Pohl; Pterandra (sect.) A. Juss.

Eupteris Agardh 1839. Rec. spec. Pterid. p. 1: sect. Pteridis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 622 *f.* p. 1348; 1841. Ench. p. 36. — Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 340. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 125. (Pt. aquilinam excludens.) — Hook. 1858. Sp. Fil. II. p. 157.
Newman 1845. The Phytologist II.; 1851. Brit. ferns p. 3: g. ex typo Pteridis aquilinae.

Eupterolophus DC. 1837. Prodr. VI. p. 572: subsect. Pterolophi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *g α.* p. 473; 1841. Ench. p. 246.
Synon. Pterolophus Cass.

Eupteron Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 762: nov. g. Araliacear. (Aralia nodosa Bl.)

Eupteropogon F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 414: sect. Pteropogonis.
Synon. Pteropogon DC.

Euptilomeris Walpers 1843. Repert. II. p. 628: sect. Ptilomeridis.

Euptilota Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 36: sect. Rhodocallidis.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 671. n. 442: g. Callithamnear.

Euptilotus Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 281: sect. Ptiloti.

Euptychotis DC. 1830. Prodr. IV. p. 108: sect. Ptychotidis. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 284. — Endl. 1839. Gen. n. 4400 *a.* p. 770; 1841. Ench. p. 378.

Eupulicarieae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 954: sect. Pulicariear. Gen.: Francoeuria, Pulicaria.

Eu-Pulsatilla C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Fl. Alt. II. p. 368: sect. Pulsatillae.
Synon. Campanaria Endl.

Eupyrena Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 422: nov. g. Guettardear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 167 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2848. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3198. p. 541; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 487.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Guettardidar.
Synon. Pyrostria Roxb., nec Comm.

Eupyrenastrum Eschweiler 1833 .... sect. Pyrenastri.

Eupyrrhocoma Walp. vid. *seq.*

Eupyrrocoma DC. 1836. Prodr. V. p. 350: sect. Pyrrocomae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2382 *a.* p. 386; 1841. Ench. p. 235. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 243. — Walp. 1843. Rep. II. p. 969 (*Eupyrrhocoma*).

Eurafnia Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 465: sect. Rafniae. — Simil. Walp. 1843. Rep. II. p. 833.
Synon. Rafnia Meyer.

Euranthemum Wittst. Etym. Handw. p. 352: sphalm. pro *Eueranthemum.*

Euranunculus Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 309: sect. Ranunculi. (R. flammula, auricomus, acris, etc.) — Simil. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 29.

Euraphis Trinius 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 92: sect. Pappophori.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Pappophorear.
= Eurhaphis Kunth.

Eureimaria Schlechtend. 1852. Bot. Zeit. p. 15: sect. Reimariae.

Euremia Rach vid. *Eremia Don.*

Eurenanthera Rchb. 1856. Xen. Orchid. I. p. 86: sect. Renantherae. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 744.

Eurhamnus Griseb. 1843. Spic fl. Rumel. I. p. 149: sect. Rhamni. (R. Alaternus, infectoria, etc.)

Eurhaphe Endl. 1838. Gen. n. 3240 *d γ.* p. 549; 1841. Ench. p. 273: subsect. Anotidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2874. 4 *c.* — Walp. 1843. Rep. II. p. 494.

Eurhaphis Kunth 1833. Agrost. p. 256: sect. Pappophori. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 830 *c.* p. 92; 1841. Ench. p. 58. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1304. 3.
Synon. Corethrum Vahl; Euraphis Trin.

Eurhaponticum DC. 1837. Prodr. VI. p. 664: sect. Rhapontici. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2894 *b.* p. 479; 1841. Ench. p. 247. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 751. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 239.
Synon. Rhapontica Hill; Rhaponticum Cass.

Eurhexia Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 477: sect. Rhexiae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 6200 *a.* p. 1427; 1841. Ench. p. 646. — Walp. 1843. Rep. II. p. 126.

Eurhodium Nuttall 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 359: sect. Rhododendri. (R. Hookerii et Shepherdii.)

Eurhododendron DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 721: sect. Rhododendri. — Par. Koch 1844. Syn. ed. II. p. 549. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 919. — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 499 (*Eurhododendrum*). — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1057.

Eurhododendron Endl. 1839. Gen. n. 4341 *c.* p. 759; 1841. Ench. p. 371: sect. Rhododendri.
Synon. Loiseleria Rchb.; Beverinckia Salisb.; Vireya Blume; Brachycalyx Sweet; Ponticum, Lepipherum et Pogonanthum Don.

Eurhododendrum Turcz. vid. *Eurhododendron DC.*

Eurhodognaphalium Schultz Bip. 1855 in Seem. Bot. Harald p. 310: sect. Rhodognaphalii. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 284.

Eurhodomeleae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 107: subtrib. Rhodomelear. (*Chondrieae Kütz.* 1843.)

Eurhotia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 207. n. 348: g. Phyllastrophytor.
= Carapichea Aubl.

Eurhynchium Bruch, Schimp. & Gümb. 1853. Bryol. eur. V: nov. g. Hypnear. (Hypnum longirostre, praelongum, etc.) Sect.: Eurhynchium, Oxyrrhynchium.

Eurhynchosia Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 238: subg. Rhynchosiae. — Simil. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 284 (*Eurhyncosia* — R. caribaea).
Conf. Copisma Meyer.

Eurhynchosia Endl. 1841. Gen. n. 6692 *f.* p. 1300; 1841. Ench. p. 672: sect. Rhynchosiae dubia.
Synon. Rhynchosia Lour.

Eurhynchospora Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 272: sect. Rhynchosporae.
= Rhynchospora Vahl.

Eurhyncosia Torrey & Gray vid. *Eurhynchosia Wight & Arn.*

Euria Cambess., Hassk. vid. *Eurya Thunb.*

Euriandra Scopoli vid. *Euryandra Forst.*

Euriccieae Bory & Mont. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 235: sect. Ricciear. Gen.: Riccia. — Par. Nees 1846. Syn. Hepat. p. 598. Gen. id.

Euridice Hedwig vid. *Eurydice Pers.*

Eurila Endl. vid. *Enrila Blanco.*

Euriosma Desvaux 1826. Ann. sc. nat. IX. p. 421: nov. g. Phaseolear. (Rhynchosia sessiliflora DC.) *Cf.* Linnaea II. p. 512. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 102.
= Eriosema DC.

Eurivularieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 100: subtrib. Rivulariear. (*Rivularieae Kütz.*)

Eurostorhiza*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 448: sect. Physalidis. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 23 (*Eurysthorhiza*). — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 434 (*Eurysthorhiza*).
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 663 (*Eurystorhiza*): sect. Euphysalidis.

Eurothia „Neck." DC., Endl. etc. in synon. Carapicheae: vid. *Eurhotia Neck.*

Eurotia**) Adans. 1763. Fam. II. p. 260: nov. g. Blitor.
C. A. Meyer 1833 in Ledeb. Alt. IV. p. 238: g. Chenopodear. — Par. Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 126.
Endl. 1837. Gen. n. 1911. p. 293; 1841. Ench. p. 181; 1842. Spl. II. p. 31: g. Atriplicear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6361. — Meisn. 1841. Gen. p. 319 (232). — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 700.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 80: g. Spinaciear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 101: g. Cyclolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 120: g. Eurotiear. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 737.
Synon. Güldenstädtia Neck.

Eurotiaceae Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 55: sect. Physarcor. Gen.: Myriococcum, Dichosporium, Perichaena.

Eurotieae Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 119: subtrib. Spinaciear. Gen.: Grayia, Eurotia, Ceratocarpus, Pugionium.

Eurotium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 31. f. 44: nov. g. Gastromycor. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 16. p. 41.
Nees 1816. Syst. p. 96; 1817. Ueberbl. p. 25: g. Aërogasterum.
Mart. 1817. Erlang. p. 368: g. Sporomestor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 566: g. Spumaridear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 83: g. Gasteromycetum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 81: g. Mucorear. — Par. Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 533. — Math. 1853. Belg. II. p. 452.
Link 1824. Spec. I. p. 79: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 331. (entosporor.) — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 305.
Fries 1825. Pl. homon. p. 177: g. Mucoreor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 137.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Byssacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 525. n. 3507: g. Dermatogasterum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Mucorinear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 90: g. Spondylomycetum.

Eurotium Link cont.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 773. n. 3971: g. Atrichor.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 331: g. Mucorinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 243. p. 21; 1841. Ench. p. 15. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 36; 1842. V. p. 9; 1842. Mycol. p. 75: g. Physareor. — Par. Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 78.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 233: g. Mucoroideor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 133: g. Mucoroidear.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 408: g. Perisporiaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 220: g. Alphitomorpheor.
Synon. Pyrobolus Weinm.

Eurottlera Zolling. 1856. Linnaea XXVIII. p. 314: sect. Rottlerae. — Par. Baill. 1858. Euphorb. p. 422.

Eurudbeckia Walp. 1843. Repert. II. p. 977: sect. Rudbeckiae.
Synon. Rudbeckia (sect.) Torr. & Gray.

Eurulingia Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 351: sect. Rulingiae.

Euruprechtia Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. Polygon. p. 54: sect. Ruprechtiae. *Cf.* Meisn. in DC. Pr. XIV. 1. p. 179.

Eurya*) Thunb. 1783. Diss. nov. gen. III. p. 67; 1784. Fl. jap. p. 11: nov. g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 444. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 321. n. 820. — Gmel. 1791. Syst. p. 750. — Pers. 1797. Syst. p. 476; 1807. Ench. II. p. 5. n. 1173. — Willd. 1799. Sp. II. p. 856. n. 945. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 369. — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 42.
Juss. 1789. Gen. p. 432: g. incertae sedis.
Neck. 1790. El. III. p. 363. n. 1795: g. Catizophytor.
R. Brown 1818. Descr. pl. Abel. p. 7 (Verm. bot. Schr. I. p. 568 (*Euria*): g. Ternströmiacear. — Par. Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 377. 405 (*Euria*). — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 86. — Meisn. 1837. Gen. p. 41 (31). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 21. — Hassk. 1844. Catal. Bogor. alt. p. 209 (*Euria*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.
DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 416; 1824. Pr. I. p. 525: g. Freziercar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 336. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 66.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 450. n. 1755; 1830. Gen. I. p. 392. n. 1970: g. Ternströmiear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 208. n. 5416. — Endl. 1840. Gen. n. 5410. p. 1019; 1841. Ench. p. 531. — Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 104. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 342.

*) εὐρωστος, validus.
**) εὐρώς, mucor. (?)

*) εὐρύς, latus, amplus.

Eurya Thunb. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Ternstromiear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 566: g. Euryear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 302: g. Reinwardtear.
Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7914: g. Cleyerear.
Korth. . . . . Verh. nat. Geschied. p. 110.
Synon. Geeria Blume.

Euryale*) Salisbury 1806 in Konig Ann. of bot. II. p. 73: nov. g. Nymphaeear. (E. ferox.) — Par. DC. 1821. Syst. II. p. 48; 1824. Prodr. I. p. 114. — Agdh. 1822. Aphor. p. 129. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 124. — Meisn. 1837. Gen. p. 6 (9). — Hook. f. & Thoms. 1855. Ind. I. p. 244.
Roxb. 1819. Corom. III. p. 39. t. 244: g. Polyandr. Monogyn.
Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 43: g. Nymphaeacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53. — Bartl. 1830. Ord. p. 89. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 166. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 211. 265.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 605. n. 1951; 1830. Gen. I. p. 439. n. 2173: g. Nymphaear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 112.
Endl. 1839. Gen. n. 5018. p. 899; 1841. Ench. p. 461: g. Euryalear. — Par. Planch. 1853. Ann. sc. nat. 3e sér. XIX. p. 28. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 151. 153.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 411: g. Euryalidar.
Synon. Anneslea Andr.; Aneslea Rchb.

Euryaleae Endl. 1839. Gen. p. 899; 1841. Ench. p. 461: trib. Nymphaeacear. Gen.: Euryale, Victoria. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 703. Gen. ead.
Planch. 1853. Ann. sc. nat. 3e sér. XIX. p. 22: subtrib. Nymphaeear. Gen. ead.

Euryalidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 411: trib. Nymphaeacear. Gen.: Euryale, Victoria.

Euryandra**) Forst. 1776. Char. gen. p. 81. t. 41: nov. g. Polyandr. Trigyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 367. n. 926. — Gmel. 1791. Syst. p. 835.
Scop. 1777. Intr. p. 252 (*Euriandra*): g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 280: g. Magnoliar.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 69: g. Tulipiferar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 74: g. Magnoliacear.
= Tetracera Linn.

Euryanthae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 74: series prior Graminear. Fam. (scand.): Hordeaceae, Festucaceae, Avenaceae, Agrostideae, Oryzeae. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 636.

Euryanthe Schlechtend. & Cham. 1830. Linnaea V. p. 224: nov. g. Geraniaceis aff. (E. Schiedeana.)
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 505: g. Malvacear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 269.
Meisn. 1837. Gen. p. 57 (41): g. Geranioidear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5431. p. 1023; 1841. Ench. p. 532: g. dubium Ternströmiaceis aff. — Simil. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.
Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7967: g. Tiliear. genuinar.?
= Amoreuxia Moç. & Sess.

Eurybasis Brid. 1826. Bryol. I. p. 284 in adnot.: aliud nomen pro *Oreade Brid.* propositum.
= Oreas Brid.

Eurybia Cassini 1818. Bull. soc. philom. Nov. p. 166: subg. Asteris.
Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 46; 1825. v. 37. p. 462; 1830. v. 60. p. 582: g. Asterear. (1825 Archetypar. verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 130. — Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1532; 1847. Veg. kd. p. 709. — Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 14. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.) — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3304. (genuinar). Sect. ut DC. (Eurybia loco Brachyglossae.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 45.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2552: g. Asterinar.
Nees 1833. Aster. p. 136: g. Asterum genuinor.
DC. 1836. Pr. V. p. 265: g. Euasterear. Sect.: Brachyglossa, Argophyllaea, Spongotrichum. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2317. p. 376; 1841. Ench. p. 234. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (126). — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 417. Sect. eaed. — Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 455. Sect. eaed. et Aglossa.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951: g. Erigerear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 116: g. Compositar.
Synon. Spongotrichum Nees.

Eurybia Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 464: g. Corymbiferar. (Aster Tripolium L.)
= Tripolium Nees.

Eurybiopsis DC. 1836. Prodr. V. p. 260: nov. g. Euasterear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2306. p. 374; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (126).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Asterear. (verar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3293. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951: g. Erigerear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 124: g. Compositar.

Eurychanes*) Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 52; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 208: nov. g. Ruelliear.

---

*) „Nomen poëticum Gorgonis, herba tota aculeis pungentibus horrida."
**) εὐρύς, latus; ἀνήρ, masculus.

*) εὐρυχανής, late hians.

Eurychiton Nimmo 1839 in Grah. Cat. Bomb. p. ult. (teste Lindl.)
= Statice Willd.

Eurycles Salisb. 1812 in Hortic. Trans. I. p. 337: nov. g. Narcissear. (Crinum nervosum L'Her.) *Cf.* Bot. Mag. 1835. n. 3399. (Ann. sc. nat. 1836. 2e sér. V. p. 309.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1286. p. 179; 1841. Ench. p. 103. — Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1619. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (297). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 428. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 582.
Schult. 1830. Syst. VII. p. LVI. 909: g. Amaryllidear. — Par. Lindl. 1832. Bot. Regist. XVIII. t. 1506. — Herb. 1837. Amaryll. p. 76. 227. (Pancratiformium). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 21.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1173: sect. Pancratii.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 15. 155: g. Narcissinear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 689: g. Pancratiear.
Synon. Proiphys Herb.

Eurycoma Jack 1824 in Roxb. Fl. ind. ed. Wall. II. p. 307; 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 151: nov. g. Connaracear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 86. — Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3828. — Bartl. 1830. Ord. p. 395. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 91. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 228. — Endl. 1840. Gen. n. 5952. p. 1140; 1841. Ench. p. 604. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 468. (?)
Spreng. 1827. Cur. post. p. 53: g. Terebinthacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 590; II. p. 1034.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 237. n. 1251: g. Terebinthear. (Pentandr. Pentagyn.)
Arnott 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 152: g. Ailanthear.? — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 65 (47) [et ibid. p. 76 (55) Spondiacear.?]
Rchb. 1837. Hdb. p. 224; 1841. Nom. p. 145. n. 5625: g. Connarear. minus cognitum.
Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 583: g. Spathelicar. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 174. — Endl. 1850. Spl. V. p. 100. n. $5967/_8$.

Eurydice Pers. 1805. Ench. I. p. 48: sect. Ixiae. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 26 (*Euridice*).
= Ixiae Linn. sp.

Euryeae G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 565: trib. Ternströmiacear. Gen.: Anneslea, Geeria, Eurya.

Eurygania*) Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 26: nov. g. Vaccinicar. (Thibaudia angustifolia Hook., etc.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1083.

*) Eurygania uxor Oedipi.

Eurylepis D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 154: nov. g. Ericear. normalium. (Erica Halicacaba L.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 807.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 623: subsect. Syringodeae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *b* 11. p. 1411; 1841. Ench. p. 370. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4887 2 *a*.

Eurylobium Hochstett. 1842. Flora I. p. 228: nov. g. Stilbinear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 368. — Endl. 1843. Spl. III. p. 77. n. $3723/_1$. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 173 (sphalm. *Eubylobium*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 608: g. Stilbacear. — Par. A. DC. 1848. Pr. XII. p. 607.

Euryloma*) D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 155: nov. g. Ericear. normalium. (Erica Aitoni W.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 816.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 642: subsect. Stellanthes. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *c* 21. p. 1411; 1841. Ench. p. 370.

Eurynema Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 93. n 6037: g. Zygophyllear. pro *Trichanthera Ehr.* propositum. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479.

Eurynoma Steud. Nomencl. I. p. 618: vid. *seq.*

Eurynome DC. 1830. Prodr. IV. p. 475: nov. g. Coffeear., pro Canthio quadrifido Labill. indicatum.
= Marquisia A. Rich.

Euryodes A. Gray 1854. Un. St. expl. exp. p. 211: subg. Euryae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 348.

Euryomyrtus Schauer 1843. Linnaea XVII. p. 239: nov. g. Bäckear. (Bäckea thymifolia Hook., etc.)
Walp. 1843. Rep. II. p. 921; 1846. V. p. 735: g. Bäckeear.

Euryops Cassini 1818. Bull. soc. philom. Sept. p. 140: subg. Othonnae. (O. pectinata L., etc.)
Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 49: g. Senecionear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1832. Syn. p. 393. — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3376. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 38. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 449: g. Othonnear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2514. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 33.
DC. 1837. Pr. VI. p. 443: g. Eusenecionear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2819. p. 461; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 215 (136).
Synon. Hertia Neck.?; Enantiotrichum E. Meyer; Crassulae sp. Mill.

Euryosma Walp. Rep. I. p. 785: vid. *Euriosma Desv.*

Euryptera „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 629: nov. g. Peucedanear. (E. lucida.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $4462/_1$. p. 1413; 1841.

*) λῶμα, margo.

Euryptera Nuttall cont.
Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 9. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5460. — Meisn. 1843. Comm. p. 358.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Euryspermum Salisb. . . . . Parad. t. 75. Endl. 1847. Gen. Spl. IV. p. 74. n. 2120 *c:* sect. Leucadendri.

Eurystegia*) D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 154: nov. g. Ericear. normalium. (Erica glauca Andr.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 809.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 654: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d* 27. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4 *a.*

Eurysthorhiza Walp., Dunal vid. *Eurostorhiza Don.*

Eurystoma Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 685: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d* 45. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4 *t.*

Eurystomum Wilson 1855 in Hook. f. Fl. New-Zeal. II. p. 92: sect. Hedwigiae. (H. repens Hook.)

Eurystorhiza Miquel vid. *Eurostorhiza Don.*

Eurystylus Bouché 1844. Linnaea XVIII. p. 485: nov. g. a Canna sejunctum. (Canna flaccida Salisb. et Reevesii Lindl.)

Eurytaenia Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 633: nov. g. Peucedanear. (E. texana.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $4479/_1$. p. 1414; 1841. Ench. p. 379. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5480. — Meisn. 1843. Comm. p. 358.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Eurythaleia (Εὐρυθάλεια) Renealm. 1611. Spec. hist. pl. p. 72. *Cf. Erythalia Gray* et *Eurythalia Rchb.*
= Amarellae Griseb. pars.

Eurythalia Rchb. 1831. Fl. exc. p. 423: subsect. Cyanaeae. (*Eyrythalia Borckh.*)
D. Don 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 515: g. Gentianear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 186.
Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5130. 1 *a:* subsect. Gentianellae.
= praeced.

Eurytidophylleae Oersted 1858. Gesn. centroam. p. 9: subtrib. Rytidophyllear. Gen.: Rytidophyllum, Codonoraphia, Duchartrea, Pantaraphia, Ophianthe, Conradia, Corisanthera.

Eurytion Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 125: sect. Amphiroae. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 354 (*Eurytium*). — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 49. n. $122/_7$, *c.* — Sond. 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 188. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 702.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Corallinear.

Eurytis D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 244: sect. Chaptaliae. (Onoseris heterophylla Spreng.?)
Trichoclines Cass. sp. (DC. Pr. VII. 1. p. 20.)

Eurytium Wittst. vid. *Eurytion Decne.*

Eusabbatia Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 120: sect. Sabbatiae.

Eusacchareae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. III. p. 366: cohors Sacchareae. Gen.: Saccharum, Imperata, Pogonatherum, Myriachaeta, Eulalia, Arundinella, Pollinia, Xerochloa.

Eusalaxis Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 711: sect. Salaxidis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4294 *a.* p. 751; 1841. Ench. p. 369.
Synon. Salaxis Klotzsch

Eusalicornia Gren. (& Godr.) 1855. Fl. France III. p. 27: subg. Salicorniae.
= Salicornia Moq.-Tand.

Eusalpichroa Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 325: sect. Salpichroae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 613.

Eusalpichroma Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 472: sect. Salpichromae.

Eusalsola Fenzl 1851 in Ledeb. Fl. Ross. III. 1. p. 804: sect. Salsolae. (S. crassa, etc.)
Synon. Salsolaria Moq.-Tand. pt.

Eusambucus Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 320: sect. Sambuci. (S. nigra L.)
Synon. Sambucus (sect.) Bernh.

Eusamyda DC. 1825. Prodr. II. p. 47: sect. Samydae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 50. — Endl. 1839. Gen. n. 5059 *a.* p. 916; 1841. Ench. p. 477.

Eusantalum A. DC. 1857. Prodr. XIV. 2. p. 682: sect. Santali.

Eusarcocolla Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 73. n. 2117 *a:* sect. Sarcocollae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 321.

Eusarcostemma Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 538: sect. Sarcostemmatis.

Eusargassum J. Agardh 1848. Spec. Fucoid. p. 303: sect. Sargassi. Tribus: Carpophyllum, Glandularia, Siliquosae, Biserrulae, Acanthocarpa, Acinaria, Ligularia, Cymosae.

Eusatureia Endl. 1841. Ench. p. 307. n. 3611 *a:* sect. Satureiae.

Eusaussurea Meyer mss.
Benedictia DC.

Eusavia Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 570: sect. Saviae. (Croton sessiliflorum Sw.)

Euscaphis Sieb. & Zuccar. 1835. Fl. japon. I. p. 122. t. 67: nov. g. Staphyleacear. (Sambucus japonica Thunb.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5672. p. 1084; 1841. Ench. p. 573. — Meisn. 1843. Comm. p. 348. — Walp. 1842. Rep. I. p. 529 (*Eutraphis*); 1843. II. p. 826. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 381.

Eusceps*) Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 296: nov. g. Algar. (Fucus viscidus Forsk.)
= Liagora Lamx.

---

*) στέγη, tectum.

*) σκέπη, tegumentum.

Euschizaea Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 334: sect. Schizaeae.

Euschizaeaceae Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 332: subordo Schizaeacear. Gen.: Actinostachys, Schizaea, Lophidium.

Euschrankia Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 415: sect. Schrankiae. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 884.

Euschwenkia Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 194: sect. Schwenkiae.

Euscirpus Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. I. p. 417: sect. Scirpi.
= Scirpus R. Brown.

Euscirpus C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 618: sect. Scirpi restricta. (S. lacustris, triqueter.)

Euscleranthеae Fenzl 1843. Bot. Zeit. p. 326: subtrib. Scleranthear. Gen.: Mniarum, Scleranthus, Guilleminea. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 91. Gen. ead.

Euscolopendrium Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 634 *a*. p. 1348; 1841. Ench. p. 36: sect. Scolopendrii.
Synon. Scolopendrium Presl.

Euscolymus DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 75: sect. Scolymi. — Par. Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 387.
Synon. Scolymus Cass.

Euscorzonera DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 117: sect. Scorzonerae. — Par. Ledeb. 1846. Ross. II. p. 790. — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 95.
Synon. Scorzonera Cass.

Euscrophularineae Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 23: series Scrophularinear. Gen.: Veronica, Gratiola, Digitalis, Scrophularia, Celsia, Janthe, Verbascum.

Euscytosiphon Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 430: subg. Scytosiphonis.
= Encoelium Agdh., Kütz.

Eusebaea Griseb. 1839. Gen. et sp. Gentian. p. 166; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 52: sect. Sebaeae.

Eusechium Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 19. 106: sect. Sechii.

Eusedum Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 325: sect. Sedi.
Synon. Sedum Tourn.; Aizoon Gray.

Euselago Endl. 1839. Gen. n. 3731 *a*. p. 641; 1841. Ench. p. 317: sect. Selaginis. — Par. Walp. 1845. Rep. IV. p. 150. — Choisy 1848 in DC. Pr. XII. p. 8.

Euseligeria C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 418: sect. Seligeriae.

Euselliguea Fée 1852. Gen. Filic. p. 176: subg. Selligueae. (Grammitis vulcanica Blume.)

Eusenecio (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 111: sect. Senecionis.
= Senecionis §. 1 DC.

Eusenecioneae DC. 1837. Prodr. VI. p. 298: div. Senecionear. Gen.: Gynura, Emilia, Brachystephium, Oligothrix, Mesogramma, Cineraria, Senecillis, Ligularia, Arnica, Aronicum, Doronicum, Werneria, Culcitium, Gynoxys, Cacalia, Psacalium, Lopholaena, Kleinia, Acleia, Senecio, Brachyrhynchos, Madaractis, Tetradymia, Railliarda, Bedfordia, Notonia, Lachanodes, Euryops. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 455; 1841. Spl. I. p. 1384; 1841. Ench. p. 244. Gen. ead. Emittitur Brachystephium et accedunt (1841) Asterosperma, Crocidium et 1842 (Spl. II. p. 47) Lagothamnus. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (136). Gen. fere ut DC.

Eusepale Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 347: subsect. Allagae. Subsect.: Lysinda, Diporea.

Euserapias Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 591: sect. Serapiadis.

Euseriphium DC. 1837. Prodr. VI. p. 262: sect. Seriphii. Subsect.: Pleurocephalum, Acrocephalum. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2761 *b*. p. 450; 1841. Ench. p. 243.
Synon. Pleurocephalum et Acrocephalum Cass.

Euserratula Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 327: sect. Serratulae.
Serratula DC.

Euserratuleae Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 326: subdiv. Serratulear. Gen.: Serratula, Arctium, Jurinea. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 429.

Eusesameae DC. 1845. Prodr. IX. p. 249: trib. Sesamear. Gen.: Sesamum, Sesamopteris, Ceratotheca, Sporledera.
Synon. Sesameae R. Brown.

Eusesamum Endl. 1839. Gen. n. 4105 *a*. p. 709; 1843. Spl. III. p. 79: sect. Sesami. — Par. Bernh. 1842. Linnaea XVI. p. 34.
Synon. Sesamum Bernh.

Euseseli DC. 1830. Prodr. IV. p. 145: sect. Seselios. (*Synon. Hippomarathrum Duby.*) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 309. — Koch 1836. Syn. p. 294. Ed. II. p. 324. — Endl. 1839. Gen. n. 4330 *c*. p. 775; 1841. Ench. p. 378. (*Synon. Marathrum, Adorium* et *Musineon Raf., Seselia vera Koch.*) — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 274. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 707.

Eusesleria C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 399: sect. Sesleriae. (Sesleriae genuinae Koch.)

Eusicyos Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 18. 102: sect. Sicyos. (S. angulatus L., etc.)

Eusideritis Benth. 1834. Labiat. p. 577; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 441: sect. Sideritidis. — Par. Koch 1837. Syn. p. 570. Ed. II. p. 655. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 838. — Endl. 1838. Gen. n. 3655 *c*. p. 627; 1841. Ench. p. 308. — Walp. 1845. Rep. III. p. 850.

Eusideroxylon A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 178: sect. Sideroxyli.

Eusilene Godron „1846. Obs. sur. l'intl. mém. soc. Nancy“ 1848 in Gren. & Godr. Fl. France I. p. 205: sect. Silenes.
Willk. . . . . Ic. pl. Hisp. p. 74: subg. Silenes. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 277.

Eusimocheilus Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 703: sect. Simocheili. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 369. n. 4302 *c*.
Synon. Simocheilus Klotzsch; Eusimochilus Endl.

Eusimochilus Endl. 1841. Gen. Suppl. I. p. 1411. n. 4302 *c*: sect. Simochili. praeced.

Eusiphocampylus DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 398: sect. Siphocampyli.

Eusisymbrium (Gren. &) Godr. 1848. Fl. France I. p. 95: sect. Sisymbrii. (S. Irio, strictissimum, etc.)
= Irio et Norta DC.

Eusium Endl. 1839. Gen. n. 4413 *a*. p. 772; 1841. Ench. p. 378: sect. Sii. — Par. Fisch. 1843. Suppl. ind. non. sem. Petrop.; 1844. Linnaea XVIII. p. 216. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 259.
Synon. Sium Tourn.; Sion Adans.; Sia genuina Koch.

Eusmyrneae Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 14: subtrib. Smyrnear. Gen.: Arctopus, Cachrys, Hippomarathrum, Prangos, Anisopleura, Lecockia, Eremodaucus, Magydaris, Diplolophium, Conium, Vicatia, Arracacha, Pentacrypta, Coelospermum, Pleurospermum, Hansenia, Malabaila, Eleutherospermum, Hymenolaena, Aulacospermum, Physospermum, Opoidia, Keramocarpus, Smyrnium, Smyrniopsis, Anosmia, Perideridia, Cynapium, Deweya, Musenium, Scaligeria.

Eusobralia Rchb. f. 1853 in Van Houtte Fl. d. serr. VIII. p. 247: sect. Sobraliae.

Eusolaneae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 635: trib. Solanear. Gen.: Lycopersicum, Solanum, Capsicum, Physalis.

Eusolorina De Notaris 1851. Mem. Ac. Torino Ser. II. Tom. XII: sect. Solorinae. (S. saccata Ach.)

Eusonchus DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 184: sect. Sonchi. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3003 *b*. p. 1388; 1841. Ench. p. 250. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 833.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. I. p. 426. 446: subg. Sonchi restrict. (S. laevis Cam., etc.)
Synon. Sonchus Don.

Eusonerila Endl. 1840. Gen. n. 6192 *a*. p. 1249; 1841. Ench. p. 646: sect. Sonerilae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 122.
Synon. Sonerila Blume.

Eusophora DC. 1825. Prodr. II. p. 95: sect. Sophorae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 109. — Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 87. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 389. — Endl. 1841. Gen. n. 6738 *b*. p. 1308; 1841. Ench. p. 673.
Synon. Broussonetia Ort.

Euspace G. Don vid. *Eusphace Benth.*

Euspananthe Fenzl 1850 in Endl. Gen. Suppl. V. p. 3. n. 4376 *b*: sect. Spananthes.
Synon. Spananthe Jacq.

Eusparton Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 2: sect. Genistae. (G. depressa, scariosa, tinctoria, etc.)

Euspathiostemon Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 293: sect. Spathiostemonis. (S. javensis Bl.)

Euspermacoceae DC. 1830. Prodr. IV. p. 540: subtrib. Spermacocear. Gen.: Democritea, Octodon, Borreria, Spermacoce, Hexasepalum, Diodia, Triodon, Crusea, Richardsonia, Knoxia, Psyllocarpus, Mitracarpum, Staelia, Tessiera, Gaillonia, Machaonia. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 611. Gen. ead. et Cruckshanksia. — Endl. 1838. Gen. p. 526; 1841. Ench. p. 271. Gen. ut Don et Perama, Otiophora, Deppea. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 52) Jaubertia et 1843 (Spl. III. p. 72) Pentanisia. — Meisn. 1838. Gen. p. 170 (119). Gen. ut Don et Otiophora.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180: sect. Spermacocear. Gen.: Spermacoce, etc.
Synon. Spermacoceae Kunth.

Eusphace Benth. 1833 in Hook. Bot. Miscell. III. p. 372; 1833. Labiat. p. 207; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 263: sect. Salviae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 554. Ed. II. p. 637. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 722 (*Euspace*). — Endl. 1838. Gen. n. 3597 *a*. p. 614; 1841. Ench. p. 307. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 108. — Walp. 1845. Rep. III. p. 599. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 358.

Eusphaeranthus DC. 1836. Prodr. V. p. 369: sect. Sphaeranthi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2395 *a*. p. 388; 1841. Ench. p. 235.

Eusphaerococceae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Sphaerococcear. (*Rhynchococceae Kütz.* 1843.)

Euspiraea Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 414: sect. Spiraeae. (Sp. betulaefolia, salicifolia, etc.)

Euspiranthes Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 464: sect. Spiranthis. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 19. n. 1559 *a*.
Synon. Aristotelea Lour.; Aristotelia Wittst.

Euspiros Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. it. p. 291: nov. g. Algar. (Fucus volubilis L.)
= Dictyomenia Grev. (Kütz.)

Eustachya Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 258: novum nomen pro *Leptandra Nutt.* propositum.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 97: g. Pederotiae.
= Paederotae Linn. pars.

Eustachys Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 69: nov. g. Graminear. (Chloris petraea Sw.) *Cf.* Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 53 et Isis 1823. p. 699. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 35. 613. n. 311.
Link 1821. En. I. p. 105: g. Graminum.
Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 866 *b*: sect. Chloridis.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 418: g. Chloridear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 88. t. 54; 1833. Agrost. p. 262. — Endl. 1837. Gen. n. 838. p. 93; 1841. Ench. p. 58. — Dietr.

Eustachys Desvaux cont. 1839. Syn. I. p. 136. 330. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1312. — Meisn. 1843. Gen. p. 422 (323). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 8. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Chlorear.
Synon. Schultesia Spreng.; Schultezia Juss.

Eustachys (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 688: sect. Stachydis. (St. sylvatica, arvensis, annua, etc.)

Eustachytarpheta Walpers 1845. Repert. IV. p. 4: sect. Stachytarphetae.
= Abena Neck.?

Eustaphidium Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 312: sect. Staphidii. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 748.

Eustathes Spreng. 1825. Syst. II. p. 219. n. 1448: g. Rhamnear.? (1830. Gen. I. p. 311 ad Melicoccam relatum.)
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3813: g. Frangulacear.? et ibid. p. 201. n. 5529 in Dodonaeaceis? (*Synon. Valentinia Räusch.)*
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 41 *(Eustathos):* inter genera Sapindacear. dubia. — Simil. Endl. 1840. Gen. n. 5633. p. 1074; 1841. Ench. p. 562. — Rchb. 1841. Nom. p. 199. n. 7605. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.
= Eystathes Lour.

Eustathos Spach vid. *praeced.*

Eustauranthera Miqnel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 735: sect. Staurantherae.

Eustega Fries 1819. Novit. fl. Suec. V. p. 80: novum nomen pro *Stegia Fr.* (nec DC.) propositum. *Cf. Eustegia Fries.*

Eustegia*) R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 51 (Verm. bot. Schr. II. p. 389): nov. g. Asclepiadear. (Apocynum hastatum Thunb.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 485; 1825. Syst. I. p. 854. n. 994; 1830. Gen. I. p. 212. n. 1090. (Pentandr. Digyn.) — Schult. 1820. Syst. VI. p. XIII. 119. — Bartl. 1830. Ord. p. 203. — E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 221. (verar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580. 907. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3448: g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 158: g. Asclepiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3455. p. 590; 1841. Ench. p. 298: g. Ditassear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 267 (174).
Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 5013: g. Eustegiear.
Dcne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 545: g. Eustegiar.

Eustegia Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 532; 1828. Elench. II. p. 112: g. Sphaeriaceor., antea *Stegia* tum *Eustega Fries.*
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 584: g. Sphaeriacear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 232.
Bonord. 1851. Hdb. p. 262: g. Hysteriaceor.
= Stegilla Rchb.

Eustegiae Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 544: div. Asclepiadear. verar. Gen.: Fockea, Eustegia, Peplonia, Decanema, Endotropis, Cynanchum.

Eustegieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 29: sect. Ditassear. Gen.: Eustegia.

Eustelechon Martius 1830. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 13: sect. Paepalanthi (etiam in Nasmythia et Eriocaulone admissa).
Steud. 1855. Glum. II. p. 273: subsect. Paepalanthi.

Eustellaria Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5240 *b.* p. 969; 1841. Ench. p. 505; 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 375; 1843 in Endl. Spl. III. p. 92: sect. Stellariae. — Simil. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 205.
Synon. Alsinella Benth.; Larbrea St. Hil.

Eustemonurus Endl. 1840. Gen. n. 5496 *a.* p. 1043; 1841. Ench. p. 546: sect. Stemonuri. — Par. Römer 1846. Fam. nat. 1. p. 24.
Synon. Stemonuri sect. 1 Blume.

Eustenochilus A. DC.? vid. *Euchilus A. DC.*

Eustenocline DC. 1837. Prodr. VI. p. 219: sect. Stenoclines. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2744 *b.* p. 447; 1841. Ench. p. 243.

Eustephia*) Cavan. 1794. Icon. III. p. 20. t. 238: nov. g. Hexandr. Monogyn. (E. coccinea.) *Cf.* Usteri n. Ann. XVIII. p. 64. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 48. n. 620. — Pers. 1805. Ench. I. p. 352. n. 784.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 182: g. Narcissoidear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 138: g. Amaryllidear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 230. n. 935. — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LIV. 901. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 21.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 249; 1825. Syst. II. p. 59. n. 1205; 1830. Gen. I. p. 234. n. 1423: g. Spathacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1175 *(Eustrephia).*
Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 53: g. Narcissear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 173. — Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 182. — Endl. 1837. Gen. n. 1282. p. 178; 1841. Ench. p. 103. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1614. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 405.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1261: g. Narcissoinar.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 14. 153: g. Narcissinear.
= Phycella Lindl.**)

*) εὐστεγής, bene tectus.

*) εὐστεφής, pulchre coronatus.

**) „Eustephia delenda utpote falso delineata diagnosi pessima, nunquam talis invenietur." (Herb. Amaryll. p. 71.)

Eusterculia Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 32: sect. Sterculiae. — Par. Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 60. n. 5319 *a.*
Endl. 1840. Gen. n. 5320 *a α.* p. 994; 1841. Ench. p. 516: subsect. Sterculiae.
Synon. Clompanus Rumph.

Eustereocaulon Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 11: sect. Stereocaulonis. — Simil. Th. Fries 1857. Nov. Act. Upsal. ser. tert. II. 2. p. 327.

Eustichia Brid. 1827. Bryol. II. p. 674: sect. Phyllogonii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 542 *b;* 1841. Nom. p. 27. n. 975. 2. — Endl. 1836. Gen. n. 597 *b.* p. 57; 1841. Ench. p. 32.

Eustichia C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 41: g. Distichiacear. emend.
Synon. Phyllogonium et Pterigynandrum Brid.; Diplostichum Mont.; Cymbaria Tayl.; Eustichium Br., Sch. & G.

Eustichium Bruch, Schimp. & Gümb. 1849. Bryol. eur. Fasc. XLII: g. Distichiacear. (Phyllogonium norvegicum Brid.)
= praeced.

Eustictis Endl. 1836. Gen. n. 423 *c.* p. 36; 1841. Ench. p. 20: sect. Stictidis.

Eustigma Gardn. & Champ. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 312. 323: nov. g. Euhamamelear. (E. oblongifolium.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 274.

Eustigmatotheca Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 255; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 199: sect. Stigmatothecae.

Eustilbe A. DC. 1848. Prodr. XII. p. 606: sect. Stilbes.

Eustillingia Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 187: subg. Stillingiae. — Simil. Endl. 1842. Gen. Spl. II. p. 88. n. 5780 *a.* — Baill. 1858. Euphorb. p. 510.

Eustilpnophytum DC. 1837. Prodr. VI. p. 92: sect. Stilpnophyti. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2693 *a.* p. 438; 1841. Ench. p. 242.

Eustipa Trin. & Rupr. 1842. Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. (1849) p. 54: sect. Stipae. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 733. — Steud. 1854. Glum. I. p. 129.
Synon. Podopogon Rafin.

Eustoebe Cassini 1827. Dict. v. 51. p. 60: sect. Stoebes. — Par. Less. 1832. Syn. p. 348. — DC. 1837. Pr. VI. p. 259. — Endl. 1838. Gen. n. 2760 *a.* p. 450; 1841. Ench. p. 243.

Eustoma Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Gentianear., inter Sabbatiam et Hippion collocatum. (Nomen.) An = seq.?

Eustoma G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 175. 210: nov. g. Lisianthear. (Lisianthus exaltatus Lam.)
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 51: g. Sabbatiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614: g. Gentianear.
Liebm. 1847. Ind. sem. h. Haun. p. 12.
Griseb. 1849. Linnaea XXII. p. 32: g. Chlorear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 78 *(Enstoma).*
Synon. Urananthus Griseb.; Arenbergia Mart. & Gal.; Lisianthus Hook.

Eustrepheae Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 36; 1850. Enum. V. p. 110: trib. Asparaginear. Gen.: Eustrephus, Geitonoplesium.

Eustrephia Dietr. n. 1591 vid. *Eustephia Cavan.*

Eustrephus R. Brown 1810. Prodr. I. p. 281. Ed. Nees p. 137: nov. g. Asphodelear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 229; 1825. Syst. II. p. 94. n. 1256; 1830. Gen. I. p. 262. n. 1362. (Hexandr. Monogyn.) — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXVI. 316. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1117.
Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 54: g. Asparaginear.
Link 1821. En. I. p. 340: g. Asparaginar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 162: g. Asparagear. (verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 53. — Endl. 1837. Gen. n. 1162. p. 150; 1841. Ench. p. 84. — Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Brongn. 1843. En. genr. p. 18. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1327: g. Smilacear. — Par. Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 115.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1821: g. Dracaenear.
Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 35; 1850. Enum. V. p. 110: g. Eustrephear. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 562.

Eustreptanthus Endl. 1839. Gen. n. 4852 *a.* p. 864; 1841. Ench. p. 448: sect. Streptanthi. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 128.

Eustriga Endl. 1839. Gen. p. 685. n. 3959 *c:* sect. Strigae. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 300.

Eustrobilanthes Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 84: sect. Strobilanthis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4053 *a.* p. 700; 1841. Ench. p. 343.

Eustrobilus Endl. 1838. Gen. n. 2122 *a.* p. 337; 1841. Ench. p. 215; 1847. Gen. Spl. IV. p. 76: sect. Isopogonis.

Eustrychneae Endl. 1838. Gen. p. 575; 1841. Ench. p. 288: trib. Strychnear. Gen.: Strychnos, Ignatia. Accedit 1843 (Spl. III. p. 74) Brehmia. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167). Gen. ut Endl. 1838. — A. DC. 1845. Pr. IX. p. 12. Gen. ut Endl. 1843 et Rouhamon, Pagamea.
Synon. Strychnaceae Link.

Eustylarieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 97: subtrib. Stylariear. Gen.: Podosphenia, Stylaria, Climacosphenia.

Eustylis Endl. 1836. Gen. n. 318 *b.* p. 27; 1841. Ench. p. 17: sect. Didermae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 365. 2.

Eustylis Engelm. & Gray 1847. Bost. journ. V. p. 236: g. . . . . . Char. emend.

Eustylis Hook. f. 1853. Fl. New-Zeal. I. p. 90: subg. Anisotomae. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 72.

Eustylopappus Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 51. n. $3018/_3$ *a:* sect. Stylopappi.
Walp. 1843. Rep. II. p. 696: subsect. Stylopappi.

Eustylosanthes Vogel 1838. Linnaea XII. p. 63: sect. Stylosanthis.

Eustyrax Endl. 1839. Gen. p. 743. n. 4252 *a;* 1841. Ench. p. 364. n. 4257 *a:* sect. Styracis.
Synon. Epigenia Fl. Flum.; Lithocarpus Blume; Benzoin Hayne.

Eusuaeda Gren. (& Godr.) 1855. Fl. France III. p. 29: subg. Suaedae.
= Suaeda Moq.-Tand.

Eusympieza Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 705: sect. Sympiezae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4301 *a.* p. 1411; 1841. Ench. p. 369.

Eusyndesmanthus Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 706: sect. Syndesmanthi. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4300 *a.* p. 1411; 1841. Ench. p. 369.
Synon. Syndesmanthus Klotzsch.

Eusyrrhopodon C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 540: sect. Syrrhopodontis.

Eusyzygium Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 447: sect. Syzygii.

Eutabellarieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 95: sect. Tabellariear. Gen.: Tetracyclus, Tabellaria, Grammatophora.

Eutacsonia DC. 1828. Prodr. III. p. 303: sect. Tacsoniae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3469 *d.* — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 57. — Endl. 1839. Gen. n. 5101 *a.* p. 927; 1841. Ench. p. 483. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 132. 192.

Eutacta*) Link 1841. Linnaea XV. p. 543: g. Abietinar. (Araucaria excelsa et Cunninghami.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 26. n. 1800 *b;* 1847. Syn. Conif. p. 186; 1847. Spl. IV. p. 6. n. 1804 *b:* sect. Araucariae.
Conf. Eutassa Salisb.

Eutanacetum DC. 1837. Prodr. VI. p. 128: sect. Tanaceti. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2696 *a.* p. 439; 1841. Ench. p. 242. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 414. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 601. — Schultz Bip. 1847 in Walp. Rep. VI. p. 220.
Synon. Tanacetum Neck.; Tanacetioides Less.

Eutarchonantheae DC. 1836. Prodr. V. p. 429: div. Tarchonanthear. Gen.: Brachylaena, Tarchonanthus. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 391; 1841. Ench. p. 236. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128). Gen. ead.

Eutarchonanthus DC. 1836. Prodr. V. p. 431: sect. Tarchonanthi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2412 *a.* p. 391; 1841. Ench. p. 236.

Eutassa Salisb. 1807. Linn. Trans. VIII. p. 315.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 213: g. Pinear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 361: g. Araucariear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 136: g. Abietinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Abietear.
Synon. Eutacta Link.

*) εὔτακτος, bene ordinatus.

Eutaxia*) R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 16 (Verm. bot. Schr. II. p. 467): nov. g. Leguminosar. (Dillwynia myrtifolia Sm.) — Par. Link 1821. En. I. p. 403. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 352. n. 1657; 1830. Gen. I. p. 367. n. 1854. (Decandr. Monogyn.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1511.
DC. 1825. Pr. II. p. 109: g. Sophorear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4065. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 121. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 178. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (58).
Link 1831. Hdb. II. p. 143: g. Sophoracear.
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 34; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 79: g. Pultenaear. — Par. Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 63.
Endl. 1840. Gen. n. 6442. p. 1258; 1841. Ench. p. 667: g. Pultenear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5936: g. Pultenaeear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 127: g. Podalyriear.

Eutecoma Endl. 1839. Gen. n. 4114 *b.* p. 711; 1841. Ench. p. 346: sect. Tecomae. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 216 (inclusa Tecomaria).

Eutelia R. Brown mss.
= Rotala Linn.

Euterpe**) Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 24. t. 9. f. 3 (1791. Fr. II. p. 269. t. 139): nov. g. Palmar. (Pinanga sylvestris globosa Rumph. Amboin. I. p. 38. t. 5. f. 1 A.) — Par. Gis. 1792. Prael. p. 43. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 140. n. 1347; 1830. Gen. I. p. 285. n. 1475. (Hexandr. Trigyn.) — Link 1829. Hdb. I. p. 258. — Bartl. 1830. Ord. p. 65.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 201: g. Phoenicear.
Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1644: g. Arecacear.
= Areca Linn.

Euterpe Martius 1824. Gen. Palm. bras. fasc. II. p. 28. t. 28—32; 1824. Palm. fam. p. 16; . . . . Palm. p. 165: g. Arecinar. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1725. p. 246; 1841. Ench. p. 135. — Kunth 1841. Enum. III. p. 177. — Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2253. — Meisn. 1842. Gen. p. 355 (265).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Arecinear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 15. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 64.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1204: g. Palmar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.
Synon. Aiphanes Willd.

Eutetradymia Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 447: sect. Tetradymiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 664.

*) εὐταξία, ordo.
**) Nomen Musae.

Eutetrapteris Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 76: sect. Tetrapteridis.

Eutetrapterys Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 84. n. 5574 *a:* sect. Tetrapterydis.
Synon. Tetrapterys sect. A. Juss.

Eutetratheca Steetz 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 211: sect. Tetrathecae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 68.

Euthales*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 579. Ed. Nees p. 435: nov. g. Goodenoviar. (Velleja trinervia Labill.) — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. v. 33. n. 869.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 6; 1823. Dict. v. 27. p. 98: g. Lobeliacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 526: g. Lobeliear.
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2777: g. Goodenoviear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 148.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: g. Goodeniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 726. — Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 103. n. 4012. — Endl. 1838. Gen. n. 3046. p. 508; 1841. Ench. p. 261. — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (147). — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 517. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 584. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 32. — Vriese 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 414; 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 169. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 386. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 695.

Euthales Dietr. ex Steud. (1840. Nom. I. p. 619 = Marialvea fructipendula.)
= Beauharnoisia fructipendula. (DC. Prodr. VII. 2. p. 517 adnot.)

Euthalia „Fenzl" Endl. 1840. Gen. n. 5234 *b.* p. 967; 1841. Ench. p. 505; 1843. Spl. III. p. 92: sect. Arenariae. — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 257.
Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 368: subg. Arenariae.
Synon. Alsinanthus Desv.; Plinthine Rchb.

Euthalictrum DC. 1824. Prodr. I. p. 12: sect. Thalictri. — Par. C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 344. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 11. — Koch 1836. Syn. p. 3. Ed. II. p. 3. — Endl. 1839. Gen. n. 4772 *c.* p. 845; 1841. Ench. p. 434. Subsect.: Thalictroides, Syndesmon. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 6. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 300. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 5.

Euthamia Nuttall 1818. Gen. am. II. p. 162: sect. Solidaginis. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 341. — Endl. 1838. Gen. n. 2376 *b.* p. 385; 1841. Ench. p. 235. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 226. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3330. 2.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 459. 471: g. Solidaginear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2526. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29.
Bartl. 1830. Ord. p. 138: g. Asterear.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 325: g. Chrysocomear., Nidorellae et Brachyri aff.

Euthelaia Alefeld 1856. Linnaea XXVIII. p. 39: subg. Thelaiae. (Pyrola rotundifolia.)
= Orpheus Gray.

Euthemideae Planchon 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 255; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 593. 647: sect. Ochnacear. Gen. unicum: Euthemis. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 179. Gen. id.
Endl. 1850. Spl. V. p. 99: subordo Ochnacear. Gen. id.

Euthemis*) Jack 1822 Malay. Misc. ex Wall. in Roxb. Fl. Ind. II. p. 303; 1831 in Hook. Bot. Misc. II. p. 69: nov. g. Pentandr. Monogyn. (E. leucocarpa.) — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 51; 1830. Gen. I. p. 186. n. 939. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 830.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 c. n. 5551: inter genera vix cognita.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 558: g. Tiliacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 39 (29): g. Elaeocarpear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5961. p. 1143; 1841. Ench. p. 606: g. dubium Ochnacear. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7546.
Walp. 1842. Rep. I. p. 528: g. Ochnaceis aff.
Planch. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 255; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 647: g. Euthemidear. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 179. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99. n. 5960.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 475: g. Ochnear.

Euthermopsis Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 431: sect. Thermopsidis. (Spec. asiat.)

Euthesium Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 322: sect. Thesii. (Thesium sect. Rchb.) — Simil. A. DC. 1857. Esp. nouv. du genre Thes. p. 1; 1857. Pr. XIV. 2. p. 639. *Cf.* Sonder 1857. Flora p. 401.

Euthora**) J. Agardh 1847. Oefvers. k. Vet. Ak. Förh. IV. p. 5: nov. g. Algar., a Rhodomenia sejunctum. *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 501 et Flora 1848. II. p. 411.
Sond. 1852. Linnaea XXV. p. 682: g. Rhodymeniear.
Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 354: g. Floridear.

Euthrincia DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 99: sect. Thrinciae.

Euthrixia***) D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 257: nov. g. Diazeuxear. (E. salsoloides.)
= Cherina Cass.

Euthuja „Don" Endl. 1841. Ench. p. 139. n. 1790 *a:* sect. Thujae.
= Thuja Linn.

Euthymelaea Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 66. n. 2105 *B b:* subsect. Chlamydanthi.
Synon. Thymelaea C. A. Meyer.

---

*) *εὐθαλής*, bene florens vel virens.

*) *εὐθήμων*, bene compositus.

**) *εὐθωρός*, recta linea motus.

***) *εὖ*, bene; *θρίξ*, capillus: bene comatus.

Euthymeleae Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 59: subdiv. Thymelear. Gen.: Lygia, Thymelaea, Dais, Edgeworthia, Diplomorpha; Lasiosiphon, Linostoma, Goodallia.

Euthystachys*) A. DC. 1848. Prodr. XII. p. 606: nov. g. Stilbacear.

Euthystemon Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 360: sect. Pionandrae. (Witheringia divaricata Mart.)

Eutiarella DC. 1830. Prodr. IV. p. 50: sect. Tiarellae. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 587. — Endl. 1841. Spl. I. n. 4643 *a.* p. 1416; 1841. Ench. p. 409.

Eutiaridium Endl. 1839. Gen. n. 3752 *b.* p. 646; 1841. Ench. p. 320: sect. Tiaridii.

Eutmon Rafin. 1832. Atlant. journ. VI. p. 23.
Meisn. 1838. Gen. p. 130 (95): g. Mollugìnear.?
Endl. 1839. Gen. n. 5178 *d.* p. 951; 1841. Ench. p. 501: sect. Talini? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6352. 4.

Eutoca**) R. Brown 1823. App. to Frankl. journ. p. 764 (Verm. bot. Schr. I. p. 541): nov. g. Hydrophyllear. (E. Franklinii.) — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 569. n. 607; 1830. Gen. I. p. 140. n. 699. — Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2979. — Bartl. 1830. Ord. p. 196. — Benth. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 276. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 395. — Hook. . . . . Fl. bor. am. II. p. 79. — Endl. 1839. Gen. n. 3830. p. 660; 1841. Ench. p. 328. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 639. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (181). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 50. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 57.
Rchb. 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 112. n. 4380: g. Nemophilear.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 293: g. Hydrophyllacear. Sect.: Ortheutoca, Conanthus? — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 639.
Synon. Heteryta Rafin.

Eutococa Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 89: sect. Tococae.

Eutofieldia „A. Gray" Endl. 1841. Ench. p. 79. n. 1062 *a:* sect. Tofieldiae.

Eutolpis Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 398: sect. Tolpidis.
= Tolpis Adans.

Eutomia Harvey 1841. Man. brit. Alg. p. 187: nov. g. Nostochinar. (Echinella rotata et oblonga Grev.)
= Micrasterias Agdh. et Euastrum Ehrenb.

Eutordylium DC. 1830. Prodr. IV. p. 197: sect. Tordylii. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 346. — Koch 1836. Syn. p. 309. Ed. II. p. 339. — Endl. 1839. Gen. n. 4482 *a.* p. 782; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 11. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 379.
Synon. Tordylium Hoffm.

*) *εὐθύς*, rectus. Nomen a spicis rectis.
**) *εὔτοκος*, fertilis.

Eutorilis DC. 1830. Prodr. IV. p. 218: sect. Torilidis. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 361. — Endl. 1839. Gen. n. 4503 *a.* p. 786; 1841. Ench. p. 380.

Eutragoceras DC. 1836. Prodr. V. p. 533: sect. Tragoceratis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2491 *a.* p. 405; 1841. Ench. p. 237.

Eutragopogoneae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 469: div. Tragopogonear. Gen.: Tragopogon.

Eutraphis Walp. vid. *Euscaphis Sieb. & Zucc.*

Eutrema R. Brown 1824. Parry's voy. App. XI. p. CCLXVII. (Verm. bot. Schr. I. p. 373): nov. g. Cruciferar. (E. Edwardsii.) *Cf.* Flora 1824. II. p. 73.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 880. n. 2303; 1831. Gen. II. p. 519. n. 2550: g. Siliculosar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 673.
Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4800: g Sisymbrear. — Par. C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 163. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 66.
Bartl. 1830. Ord. p. 265: g. Siliquosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 215: g. Camelinear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 13 (13). — Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 181. n. 6973. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 112. — Endl. 1839. Gen. n. 4924. p. 878; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 197.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Camelinidar.

Eutremandreae Schuchard 1853. Synops. Tremandr.: cohors Tremandrear. Gen.: Tremandra.

Eutriana*) Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 161: nov. g. Triandr. Digyn. (latissime circumscriptum, a sequentibus emendatum.)
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 678): g. Chlorideor. Sect.: Triathera, Actinochloa, Atheropogon.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 413: g. Chloridear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 95; 1833. Agrost. p. 280. — Endl. 1837. Gen. n. 847. p. 94; 1841. Ench. p. 58. Sect.: Atheropogon, Aristidium, Heterostega, Triplathera. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 136. 335 (*Eutriania*). — Meisn. 1843. Gen. p. 422 (322). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Steud. 1854. Glum. I. p. 215.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Chlorear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 383: g. Gymnopogonear.
Synon. Heterostega Desv.; Enteropogon Nees; Atheropogon Rchb.; Nestlera Willd. (Steud.)

Eutriania Dietr. vid. *praeced.*

Eutrichilia Endl. 1840. Gen. n. 5541 *a.* p. 1051; 1841. Ench. p. 551: sect. Trichiliae. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 432.
Synon. Trichilia Juss.; Elcaja Forsk.

*) *τρίαινα*, tridens.

Eutrichinium Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 283: sect. Trichinii.

Eutrichogyne DC. 1837. Prodr. VI. p. 265: sect. Trichogynes. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2763 *a*. p. 450; 1841. Ench. p. 243.

Eutricholepis Endl. 1838. Gen. n. 2868 *a*. p. 472; 1841. Ench. p. 246: sect. Tricholepidis.

Eutrichomanes Presl 1843. Hymenophyll. p. 108; 1850. Epimel. bot. p. 377: sect. Trichomanis. (T. digitatum Sw.)

Eutrichomanes Hook. 1844. Spec. Fil. I. p. 115: subg. Trichomanis.
= Trichómanes Presl.

Eutrichosanthes Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 350: subg. Trichosanthis.
Endl. 1839. Gen. n. 5140 *b*. p. 939; 1841. Ench. p. 491: sect. Trichosanthis. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 202. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 16. 94. (restrict.)
Synon. Trichosanthes Schrad.

Eutrichostomum C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 581: sect. Trichostomi.
Synon. Anacalypta Hüb.

Eutrifolium „Nutt." Walp. 1842. Rep. I. p. 642: sect. Trifolii.

Eutriphyllum Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 192: sect. Trifolii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3869 *c*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 181. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 403.
= Lagopus Koch pt.

Eutriplaris Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 55. n. 1997 *a*: sect. Triplaridis.
Synon. Triplaris Meyer; Blochmannia Rchb.

Eutriptilion Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 2947 *a*. p. 1386; 1841. Ench. p. 248: sect. Triptilii.
= Triptilion Ruiz & Pav.

Eutristicheae Tulasne 1852. Arch. Mus. VI. p. 179: sect. Tristichear. Gen.: Tristicha, Terniola.

Eutriticum (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 599: sect. Tritici. (T. vulgare, Spelta, etc.)

Eutrixis DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 67: sect. Trixidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2960 *b*. p. 492; 1841. Ench. p. 249. Subsect.: Oligophyllon, Polyphyllon, Prionanthus, Alcithoë?

Eutropia Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 196: nov. g. Crotonear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 90. n. 5828/$_4$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Meisn. 1843. Comm. p. 370: g. Eucrotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 357: sect. Crotonis.

Eutropis*) Falconer 1839. Ann. nat. hist. III. p. 192: nov. g. Asclepiadear. non descriptum. (DC. Pr. VIII. p. 665.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)

Eutrymalium Reissek 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 279: subg. Trymalii. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 270.

*) εὔτροπις, bene carinatus.

Eutupa A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 391: sect. Tupae.

Eutussilagineae DC. 1836. Prodr. V. p. 207: div. Tussilaginear. Gen.: Tussilago, Celmisia, Alciope, Brachyglottis. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 371; 1841. Ench. p. 233. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 181 (125). Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709: subtrib. Eupatoriacear. Gen. ead. (omissa Celmisia.)

Eutyphonium Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 18: sect. Typhonii.

Euvaccinium A. Gray 1846. Mem. Amer. Ac. n. ser. III. (Chlor. Bor. Am. I. p. 53): subg. Vaccinii. — Par. Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 58. — Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1098. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1062.
Synon. Myrtillus Koch.

Euvalantia C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 474: sect. Valantiae.
= Valantia Tourn.

Euvanda Lindl. 1853. Fol. Orchid. (20 Apr.): sect. Vandae. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 678.

Euvanguericae Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 248: subtrib. Vangueriear. Gen.: Vangueria, Canthium, Canthopsis, Lachnastoma.

Euvateria Arnott 1839. Ann. nat. hist. III. p. 155: sect. Vateriae. (V. indica.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5394 *a*. p. 1014; 1841. Ench. p. 525. — Walp. 1846. Rep. V. p. 126.
Synon. Paenoe Rheede. (Walp.)

Euvellosia Seubert 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 73: sect. Vellosiae.

Euveratrum Endl. 1841. Ench. p. 79. n. 1067 *b*: sect. Veratri.
Synon. Veratrum A. Gray.

Euverbena Endl. 1841. Ench. p. 312. n. 3685 *d*: sect. Verbenae.
Synon. Glandularia Gmel.; Billardiera Mönch; Aubletia Jacq.; Verbenae verae Endl.

Euverbeneae Ledeb. 1849. Fl. Ross. III. p. 329: subtrib. Verbenear. Gen.: Verbena, Lippia. — Par. Schauer 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 177. Gen.: Priva, Verbena, Bouchea, Stachytarpha, Lippia.

Euvernoniaceae Schultz Bip. 1847. Linnaea XX. p. 499: div. Vernoniacear. Subdivis.: Sparganophoreae, Oligantheae, Vernonieae.

Euvernonieae DC. 1836. Prodr. V. p. 10: div. Vernoniear. Subdivis.: Ethulieae, Heterocomeae, Albertinieae. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 356; 1841. Ench. p. 232. Subdiv. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 175 (122). Subdivis. eaed. — Schultz Bip. 1853. Flora p. 33. Subdivis. eaed. et Erlangeae.

Euveronica Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 27: sect. Veronicae. (V. serpyllifolia, bellidioides, gentianoides.)
= Veronicastri Benth. pars.

Euverrucaria Fée: sect. Verrucariae. — Simil. Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 346.
= Verrucariae Wigg. pars.

Euverticordia Schauer 1841. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. II. p. 199 (Monogr. p. 47): subg. Verticordiae.
Endl. 1840. Gen. n. 6279 *a.* p. 1225; 1841. Ench. p. 650: sect. Verticordiae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 154. — Meisn. 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 19. (Injungitur Chrysoma Schauer.)

Euvicia Endl. 1840. Gen. n. 6581 *b α.* p. 1279; 1841. Ench. p. 670: subsect. Viciae.

Euvigna Endl. 1841. Gen. n. 6675 *a.* p. 1279; 1841. Ench. p. 672: sect. Vignae.

Euviguiera Gardn. 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 397: sect. Viguierae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 860.
= Viguiera DC.

Euviorna Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 269: sect. Viornae. (Clematis Viorna L.)

Euviticeae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 858: subtrib. Viticear. Gen.: Vitex, Gmelina, Clerodendron, Callicarpa, Premna, Tectona.

Euvittaria Fée 1852. Gen. Filic. p. 86: sect. Vittariae.

Euweisia C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 651: sect. Weisiae.

Euwibelia Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 457: sect. Wibeliae. (Crepis rubra et foetida.)

Euwickströmia C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 357: sect. Wickströmiae.

Euwikströmia Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 69. n. 2106/$_{11}$ *b*: sect. Wikströmiae. Par. Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 543.
Conf. praeced.

Euwoodwardia Fée 1852. Gen. Filic. p. 207: sect. Woodwardiae. (W. radicans et japonica Sw.)

Euwormia Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 67: sect. Wormiae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 34.

Euxanthium DC. 1836. Prodr. V. p. 523: sect. Xanthii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2480 *a.* p. 403; 1841. Ench. p. 237. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 294. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 514. — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 241.
Synon. Anoplia Wallr.

Euxanthosia DC. 1830. Prodr. IV. p. 74: sect. Xanthosiae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 258. — Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 291.
Synon. Xanthosia Rudge.

Euxenia*) Chamisso 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 75: nov. g. Eupatorinar. (Ogiera triplinervis Cass.)
Link 1822. En. II. p. 367: g. Syngenesiae.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17: g. Millericar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2707.

Euxenia Chamisso cont.
Cass. 1827. Dict. v. 50. p. 472; 1830. v. 60. p. 576: g. Rudbeckiear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20.
Bartl. 1830. Ord. p. 141: g. Helianthear.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 155: g. Melampodiear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 43.
Less. 1832. Syn. p. 216: g. Euxeniear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 501. — Endl. 1838. Gen. n. 2454. p. 398; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 196 (129). — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3448. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Synon. Podanthus Lag.; Ogiera Spreng.

Euxenieae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 216: div. Melampodiear. Gen.: Euxenia, Phaethusa, Astemma.
DC. 1836. Pr. V. p. 501: div. Melampodinear. Gen.: Euxenia, Petrobium, Astemma. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 398; 1841. Ench. p. 237. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 196 (129). Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 88: subdiv. Cotulear. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Senecionidear. Gen. ead.

Euxeranthemum DC. 1837. Prodr. VI. p. 528: sect. Xeranthemi.
Synon. Xeranthemum Cass.

Euxerocarpaea Endl. 1841. Gen. Suppl. I. p. 1391. n. 3038 *b β*: subsect. Xerocarpaeae.
Synon. Xerocarpaea DC.

Euxolus Rafin. 1836. Fl. Tell. p. 42. n. 556.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 272: g. Aervear. Sect.: Berlasia, Pentrius. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1034. Sect. eaed.
Synon. Albersia Kunth; Blitopsis Dumort.; Blitum Pers.; Bliton Adans. pt.

Euxyris Endl. 1837. Gen. n. 1025 *a.* p. 124; 1841. Ench. p. 69; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 55: sect. Xyridis. — Simil. Kunth 1843. Enum. IV. p. 9. — Steud. 1855. Glum. II. p. 285. — Seub. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XV. p. 219.

Euyphes „Targ." Endl. Gen. p. 9 in synon. Dictyotae: vid. *Evyphes Targ.*

Euzanthoxylon Endl. vid. *seq.*

Euzanthoxylum Endl. 1840. Gen. n. 5792 *a.* p. 1146; 1841. Ench. p. 609 *(Euzanthoxylon)*; 1850. Spl. V. p. 101: sect. Zanthoxyli.
Synon. Fagara Adans.; Zanthoxylum Cold.

Euzeuxine Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 485: sect. Zeuxines. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 20. n. 1565 *a.*

Euzinnia Endl. 1838. Gen. n. 2493 *a.* p. 405; 1841. Ench. p. 238: sect. Zinniae.
Synon. Lepia Hill; Lejica Hill?; Crassina Scop.

Euzizia Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 614: sect. Ziziae. (Z. aurea Koch.)

*) εὔξενος, hospitalis.

Euzomodendron Cosson 1852. Not. pl. Espagne p. 144: nov. g. Brassicear.
Webb 1853. Otia hispan. Nr. 43. (E. Bourgaeanum.)

Euzomum*) Link 1822. Enum. II. p. 175: g. Tetradynam. Siliquos. (Brassica Eruca L.)
Link 1831. Hdb. II. p. 319: g. Siliquosar.
= Eruca Tourn.

Euzomum Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 380: nov. g. Siliquosar. (Sinapis erucoides L.)
= Diplotaxidis sp. DC.

Euzygodon C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 671: sect. Zygodontis.

Euzygogonium Itzigs. 1854 in Rabenh. Alg. Sachs. Dec. 39. 40. n. 398: nov. g. a Zygogonio Kütz. separatum. *Cf.* Flora 1854. II. p. 714.

Euzygopetalum Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 668: sect. Zygopetali.

Euzygophylleae Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 46: trib. Zygophyllear. Gen.: Tribulus, Zygophyllum, Seezenia.

Evaceae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 955: subdiv. Eubuphtalmear. Gen.: Diaperia, Psilocarphus, Stylocline, Evax.

Evaginulati Brid. 1822. Meth. musc. p. XII. 1: sect. Muscor. frondosor. Gen. unicum: Sphagnum.
Nees & Hornsch. 1823. Bryol. germ. I. p. 1: fam. Muscor. Gen. id.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 1: class. prima Muscor. olocarpor. Gen. id. — Par. Brid. 1827. Bryol. II. p. XLII. Fam. unica: Sphagnoidei.
Synon. Cladocarpi Brid.

Evallaria Necker 1790. Elem. bot. III. p. 189. n. 1551: nov. g. Gonoophytor., a Convallaria L. sejunctum.
= Maianthemum Wigg.

Evandra R. Brown 1810. Prodr. I. p. 239. Ed. Nees p. 95: nov. g. Cyperacear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 56. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 608. n. 1969.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 134: g. Sclerinar.
Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 23): g. Cyperear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1105. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 443. n. 2195. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 119.
Bartl. 1830. Ord. p. 34 *(Euandra)*: g. Cyperinar.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 301; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 89: g. Cladiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 984. p. 115; 1841. Ench. p. 64. — Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1466.
Kunth 1837. Cyper. p. 367: g. Sclerinear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 182.
Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316): g. Scleriear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Cladear.

*) εὔζωμος, bonum jus praebens.

Evansia Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 303: nov. g. Iridear. *(Iris fimbriata DC.)*
Synon. Crossiris Spach; Lophiris Tausch pt.

Evanthe „Salisb." Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 628: subsect. Syringodeae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *b* 14. p. 1411; 1841. Ench. p. 370. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 2 *d (Euanthe)*.

Evanthistiria Anderss. 1856. Nov. Act. Ups. ser. tert. II. 1. p. 234 *(cf.* Flora 1857. I. p. 39): sect. Anthistiriae.

Evastrum Mathieu vid. *Euastrum Ehrenb.*

Evax Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 393. t. 165: nov. g. Tubulosar. *Cf.* Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 59.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 516: g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 395.
Pers. 1807. Ench. II. p. 422. n. 1842: g. Syngenes. Superfl.
Link 1822. En. II. p. 365: g. Discoidear.
Schrank 1824. Denkschr. Ak. Münch. VIII. p. 147: g. Filaginoidear.
DC. 1836. Pr. V. p. 458: g. Plucheinear. Sect.: Euevax, Pseudevax. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2420. p. 392; 1841. Ench. p. 236. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 191 (128). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 499. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3555: g. Plucheinar. Sect.: Evax, Pseudevax.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955: g. Evacear.
Koch 1843. Syn. ed. II. p. 390: g. Tarchonanthear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 44. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 195.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 195: g. Inulear.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 227: g. Eubuphthalmear.
Synon. Gnaphalium Vaill.; Filago Willd.

Evea*) Aublet 1775. Guian. I. p. 100. t. 39: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (E. guianensis). — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 231. — Pers. 1805. Ench. I. p. 122. n. 231. — Hedw. 1806. Gen. p. 62. 372. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 19. — Schult. 1827. Mant. III. p. 15.
Scop. 1777. Intr. p. 119: g. Compositar.
Juss. 1789. Gen. p. 208; 1820. Mém. Mus. VI. p. 401: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 499. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 21. 337. n. 524. — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 59.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 86: g. Cephelidiae?
Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2118; 1841. Nom. p. 75. n. 2790: g. Cephaëlidear. — Par. Cham. 1834. Linnaea IX. p. 237. — Meisn. 1838. Gen. p. 170 (119).
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 197: g. Coffeacear.
= Cephaëlidis Swartz pars.

Eveleyna Steud. Nomencl. vid. *seq.*

*) Nomen caribaeum *Evé.*

Evelyna*) Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 32. t. 56—58: nov. g. Orchidear., Octomeriae proximum. (E. capitata, etc.)
Endl. 1837. Gen. n. 1323. p. 187; 1841. Ench. p. 109: g. Pleurothallear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1910. — Meisn. 1842. Gen. p. 369 (277). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.
Steud. 1840. Nom. I. p. 620 *(Eveleyna)*: g. Malaxidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Bletidar.

Evernia**) Achar. 1810. Lichen. p. 84. 441; 1814. Syn. Lich. p. 244: nov. g. Discoideor. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 16. p. 61.
Mart. 1817. Erlang. p. 228: g. Lichenum scutellator.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 425: g. Evernidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 93: g. Ramalinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71. — Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 115. — Körb. 1846. Lich. eur. sp. p. 3; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 41. — Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 12. (Flora 1854. p. 234.)
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 23: g. Usneacear. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 236 (sect.: Thamnium, Physcia, Cornicularia, Alectoria); 1831. Lich. eur. p. 1. 19 (sect.: Corniculariae, Dufoureae, Physciae). — Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 409 (sect. ut Fries 1825); 1841. Nom. p. 16. n. 564. — Endl. 1836. Gen. n. 178. p. 16; 1841. Ench. p. 11.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 187 *(Euernia)*: g. Hymenocarpor.
Genth 1836. Nass. I. p. 325: g. Parmeliacear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 94; 1849 in Orb. Dict V. p. 538. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 102. Sect.: Alectoria, (Thamnolia, Cerucliis), Evernia.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 235: g. Parmeliear. — Par. Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 210.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Usneidar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349: g. Usneear.
Bayrh. 1849. Taun. p. 60: g. Peltopsorar.
Math. 1853. Belg. II. p. 106: sect. Physciae.
Arnold 1858. Flora I. p. 102: g. Everniear.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 352: g. Usnear.
Synon. Borreria Achar.; Alectoria Achar.; Bryopogon Link; Thamnium Rchb.; Neuropogon Nees?

Evernideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 409. 425: div. Cenothalamear. Gen.: Evernia.

Everniear Arnold 1858. Flora I. p. 102: trib. Usneacear. Gen.: Evernia, Cetraria, Ramalina.

Eversmannia***) Bunge 1828 in Göbels Reise p. 267: nov. g. ex typo Hedysari subspinosi Fisch.
Meyer . . . . Fl. Sais. Nor. t. 9.

Eversmannia Bunge cont.
Endl. 1842. Spl. II. p. 96. n. $6618/_1$: g. Euhedysarear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 746. — Meisn. 1843. Comm. p. 351. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Ledeb. 1842. Ross. I. p. 567: g. Galegear.

Evhalus Agardh, Ritgen vid. *Enhalus Rich.*

Evia „Comm." Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 15. p. 233: g. Spondiacear.
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 287: g. Anacardiear.
Synon. Cytheraea DC.

Evodea R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 33): g. Diosmear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 327 in adnot.
= seq.

Evodia Scopoli 1777. Introd. p. 250: g. Polycarpiar.
Neck. 1790. El. II. p. 224. n. 960: g. Eredophytor.
Pers. 1807. Ench. II. p. 1. n. 1154: g. Dodecandr. Monogyn.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 186: g. Xanthoxylear.
A. St. Hil. 1823. Mém. Mus. X. p. 362: g. Rutacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 442. n. 464; 1830. Gen. I. p. 98. n. 488 (in Tetrandr. Monogyn.) — Endl. 1833. Norf. p. 86. — A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 61. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 498.
DC. 1824. Pr. I. p. 724: g. Diosmear. — Par. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 484. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 795. — Meisn. 1837. Gen. p. 62 (45).
Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5153; 1841. Nom. p. 196. n. 7497: g. Pilocarpear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 388. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 322. — Endl. 1840. Gen. n. 5996. p. 1152; 1841. Ench. p. 611. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Rchb. 1837. Hdb. p. 283: g. Boroniear.
= Euodia Forst.

Evodia Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 101. 103. f. 2. (Ravensara aromatica Sonn.)
Agdh. 1825. Aphor. p. 228: g. Laurinar.
= Agathophyllum Juss.

Evodia St. Hilaire 1824. Pl. remarq. Brés. p. 149; 1825. Fl. Bras. I. p. 79 (Plant. us. t. 4): g. Rutacear. (E. febrifuga.)
Esenbeckia Kunth.

Evodianthus Oersted 1857. Nat. For. Vid. Medd. p. 193: nov. g. Cyclanthear. (E. angustifolius.) — *Cf.* Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 860.

Evolvolus Swartz 1788. Prodr. p. 55: g. Pentandr. Trigyn.
Swartz 1791. Obs. bot. p. 118; 1797. Ind. occ. I. p. 576: g. Pentandr. Tetragyn.
= Evolvulus Linn.

Evolvulus*) Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 391; 1764. Gen. ed. VI. p. 152. n. 385; 1767. Syst. ed. XII. p. 222. n. 382: g. Pentandr. Tetragyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p.

*) Dicat. Joanni Evelyn, Anglo.
**) εὐερνής, ramosus, s. pulchrem habens stipitem.
***) Dicat. Ed. Eversmann, prof. Kasan.

*) Convolvulis similis; e praefixum analogum a privativo Graecorum. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 87.

Evolvulus Linn. cont.
247; 1784. Syst. p. 299. — Reich. 1778. Gen. p. 155. n. 416. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 204. n. 524. — Gmel. 1791. Syst. p. 508. — Pers. 1797. Syst. p. 317. — Willd. 1797. Sp. I. p. 516. n. 586; 1809. En. p. 332.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Campanacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 393.
Gled. 1764. Syst. p. 209. n. 873: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 181: g. Luridar.
Juss. 1789. Gen. p. 134 (praeced. B. Juss. in Ht. Trian.): g. Convolvulor.
Neck. 1790. El. II. p. 23. n. 643: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 396: g. Convolvulacear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 288. n. 638. — Hedw. 1806. Gen. p. 182. n. 751. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 489. Ed. Nees p. 345. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 115. — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 62. — Link 1821. En. I. p. 294. — Kunth 1823. Syn. II. p. 227. — Poir. 1827. Dict. v. 27. p. 28 *(Liserolle)*. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 724. — Bartl. 1830. Ord. p. 192. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 919.
Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 29. t. 252. 253: g. Pentandr. Trigyn. (reform.) — Par. Cram. 1803. Disp. p. 64. (E. nummularius.) — Roxb. 1832. Ind. II. p. 105.
Cram. 1803. Disp. p. 61 in Pentandr. Digyn. (E. sericeus.) — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 174.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 309: g. Convolvulear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 463; 1825. Syst. I. p. 862. n. 1004; 1830. Gen. I. p. 214. n. 1102. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XVIII. 193. — Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 80. — Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2995; 1841. Nom. p. 114. n. 4426. (genuinar.) — Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 496 *(cf.* Flora Lit. V. p. 137); . . . . ibid. VIII. p. 69; 1845 in DC. Pr. IX. p. 441. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 300. — Endl. 1839. Gen. n. 3791. p. 652; 1841. Ench. p. 323. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (181). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 94. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 55. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Convolvulinear.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 628: g. Convolvulinar.
Synon. Vistnu Adans.: Camdenia Scop.; Evolvolus Swartz; Cladostyles Humb. & Bonpl.; Cladostylis Poir.; Meriana Fl. Flum.

Evonimus Neck., Medic. vid. *Evonymus Tourn.*

Evonymadaphne Wittst. vid. *Evonymodaphne Nees.*

Evonymeae DC. 1825. Prodr. II. p. 3: trib. Celastrinear. Gen.: Evonymus, Celastrus, Maytenus, Alzatea, Polycardia, Elaeodendron, Ptelidium, Tralliana. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. Gen.: Elaeodendron, Maytenus, Celastrus, Evonymus. — Meisn. 1837. Gen. p. 67 (48). Gen.: Perrottetia?, Dulongia?, Kurrimia?, Rhaptostylum?, Polycardia, Jodina, Evonymus, Celastrus, Microtropis, Cyrilla, Pterocelastrus, Alzatea, Crypteronia?, Maytenus, Wimmeria, Ptelidium, Tralliana, Actegeton?, Schäfferia?, Fraunhofera, Scytophyllum, Mystroxylon, Pleurostylia, Schrebera, Elaeodendron, Lauridia, Hartogia, Myginda, Crocoxylon, Byronia? — Endl. 1840. Gen. p. 1085; 1841. Ench. p. 574. Gen.: Putterlickia, Lophopetalum, Evonymus, Polycardia, Catha, Celastrus, Maytenus, Microtropis, Pterocelastrus. Accedunt 1850 (Spl. V. p. 82) Eucentrus, Polyacanthus, Piptocelus. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. III. p. 252. Gen. ut Endl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 301: subdiv. Celastrear. Gen. ut DC. (exclusa Alzatea.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 207. Sect.: *genuinae* (gen. ut Endl.), Alzateeae, Ochrantheae.

Evonymodaphne*) Nees 1836. Syst. Laurin. p. 263: nov. g. Acrodiclidior. (Laurus armeniaca Pöpp.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 359 *(Evonymadaphne)*. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 2041. p. 319; 1841. Ench. p. 197. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1332. 1345. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 471.
Meisn. 1841. Gen. p. 326 (238): g. Acrodiclidiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 71. n. 2669.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.

Evonymoides „Isnard" Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 173. (Celastrus scandens L.)
Mönch 1794. Meth. p. 70: g. Thalamostemonis.
= Celastrus Kunth.

Evonymoides Soland. mss.
= Alectryon Gärtn.

Evonymus**) Tourn. 1700. Inst. p. 617. t. 388: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 83. Ed. Hall. 1745. p. 93: g. pl. class. IV.
Linn. 1737. Gen. p. 29. n. 79; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 30: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 40.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 35. n. 132: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 70.
Linn. 1753. Sp. I. p. 197; 1759. Syst. ed. X. p. 939. n. 240; 1762. Sp. ed. II. p. 286; 1764. Gen. ed. VI. p. 107. n. 271; 1767. Syst. ed. XII. p. 181. n. 270: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 165. — Murr. 1774. Syst. p. 198; 1784. Syst. p. 238. — Reich. 1778. Gen. p. 110. n. 291. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 148. n. 373. — Lour. 1790. Coch. I. p. 156. — Gmel. 1791. Syst. p. 407. — Pers. 1797. Syst. p. 249; 1805.

*) Nomen a similitudine inflorescentiae cum Evonymo.
**) εὐώνυμος, arbor fausti nominis. (Ex Tournefort ironice sumptum, quod animalibus nocere existimetur.)

Evonymus Tourn. cont.
Ench. I. p. 242. n. 539. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1130. n. 424; 1809. En. p. 255.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rhamnor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 377. — Batsch 1802. Tab. p. 70.
Adans. 1763. Fam. II. p. 304: g. Zizyphor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Dumosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 208. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 143.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 116: g. Oligantherar.
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 490 *(Evonimus)*: g. Jujubinear.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 320 *(Evonimus)*; 1789. Phil. Bot. I. p. 174.
Neck. 1790. El. II. p. 11. n. 779: g. Plyrontophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 149. t. 113.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 463: g. Rhamnoidear. — Par. Link 1821. En. I. p. 234.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 265: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 153. n. 653. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 902. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 663; 1825. Syst. I. p. 788. n. 867; 1830. Gen. I. p. 183. n. 925. — Lois. 1820. Dict. v. 17. p. 531 *(Fusain)*. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1146. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 819.
DC. 1805. Franç. IV. p. 620: g. Frangulacear.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 620: g. Celastrinar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 116. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 827.
DC. 1825. Pr. II. p. 3: g. Evonymear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Koch 1836. Syn. p. 147. Ed. II. p. 161. — Meisn. 1837. Gen. p. 68 (48). — Rchb. 1837. Hdb. p. 301; 1841. Nom. p. 207. n. 7879. (genuinar.) — Endl. 1840. Gen. n. 5676. p. 1086; 1841. Ench. p. 574. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 497. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 426.
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5389: g. Celastrear.
Bartl. 1830. Ord. p. 379: g. Celastrinear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 404. — Kunth 1838. Berol. I. p. 255. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 152. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 88. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 331.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588: g. Euonymear.
Synon. Euonymus Linn., Hall. etc.

Evopis Cassini 1818. Bull. soc. philom. Févr. p. 32; 1820. Dict. v. 16. p. 65: nov. g. Arctotidear. (Rohria cynaroides Vahl.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143 *(Euopis)*.
Cass. 1821. Dict. v. 19. p. 234; 1823. v. 29. p. 449; 1830. v. 60. p. 573: g. Gorteriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2684. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14.
Less. 1832. Syn. p. 69: subg. Berkheyae.
DC. 1837. Pr. VI. p. 504: sect. Berkheyae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2844 *a.* p. 466; 1841. Ench. p. 245. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3645. 1.

Evosma Poir. vid. *Euosma Andr.*

Evosmia*) Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 165. t. 134: nov. g. Rubiacear. — Par. Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 398. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 417. n. 421; 1830. Gen. I. p. 95. n. 472. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 486.
Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2108: g. Hameliacear. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 232.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Vanguerierear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 438: g. Hameliear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 538. — Endl. 1838. Gen. n. 3222. p. 545; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 254 (sph. *Erosmia*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hamelidar.
Synon. Euosma Willd.; Euosmia HBK.

Evosmus Rchb. vid. *Euosmus Nutt.*

Evota Lindl. 1838. Orchid. gen. p. 365; 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Ceratandrae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1537/$_7$ *b.* p. 1366 *(Euota)*; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1889. 2 *(Euota)*.
Synon. Calota Harv.

Evrardia Adans. 1763. Fam. II. p. 342: g. Pistaciar.
Scop. 1777. Intr. p. 323: g. Disciferar.
= Pistacia Linn.?

Evyphes Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 315: nov. g. Algar. (Dictyota dichotoma Lamx.)
= Dictyota Lamx.

Ewaldia**) Klotzsch 1855. Begon. p. 173: nov. g. Begoniacear. (E. ferruginea et lobata Kl.)

Ewyckia***) Blume 1831. Flora II. p. 524; 1835. Rumphia I. p. 23. t. 8; 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 5: nov. g. Charianthear. (Melastoma azureum Zipp. mss.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 802. — Meisn. 1838. Gen. p. 111 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6266. p. 1222; 1841. Ench. p. 647. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1470. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6775. — Walp. 1846. Rep. V. p. 724. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1837. Hdb. p. 248: g. Melastomear.
Decne 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 313: g. Astroniear.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 260: g. Kibessiear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 568. Sect.: Ewyckia, Rectomitra. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 798.
Synon. Pternandra Jack?

Exaciceae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 175. 211: trib. Gentianear. Gen.: Sebaea, Exacum, Microcale.

Exacon Adans. vid. *seq.*

*) εὔοσμος, bene olens.
**) Dicat. Dr. J. W. Ewald.
***) Dicat. J. van Ewyck van Oostbroek.

Exacum*) Linn. 1747. Amoen. ac. I. Ed. 1749. I. p. 116: nov. g. plantar.

Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 25. n. 61 (Nov. gen. zeyl. p. 5. n. 1040); 1753. Sp. I. p. 112; 1759. Syst. ed. X. p. 895. n. 132; 1762. Sp. ed. II. p. 163; 1764. Gen. ed. VI. p. 57. n. 141; 1767. Syst. ed. XII. p. 122: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 131; 1784. Syst. p. 155. — Reich. 1778. Gen. p. 58. n. 147. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 77. n. 185. — Gmel. 1791. Syst. p. 250. — Pers. 1797. Syst. p. 160; 1805. Ench. I. p. 136. n. 282. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 101. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 413; ed. 1832. I. p. 397. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 19.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Rotacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 346.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Gentianar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 142.

Adans. 1763. Fam. II. p. 503 *(Exacon)*: g. Apocynor.

Gled. 1764. Syst. p. 169. n. 692: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 161.

Scop. 1777. Intr. p. 189: g. Speciosar.

Neck. 1790. El. II. p. 10. n. 618: g. Darinyphytor.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 416: g. Gentianear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 199. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 323. — Hedw. 1806. Gen. p. 58. 369. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 475; 1825. Syst. I. p. 425. n. 442; 1830. Gen. I. p. 83. n. 410. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 6. 156. n. 437. — Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 346 et Lois. ibid. *(Gentianelle)*. — Link 1821. En. I. p. 125; 1829. Hdb. I. p. 419. — D. Don 1825. Nepal. p. 128; 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 531. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 33. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 439. — Arnott 1839. Ann. nat. hist. III. p. 88. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.

Cram. 1803. Disp. p. 52 in Pentandr. Monogyn.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 212: g. Exaciear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 132. n. 5112: g. Erythraeariar.

Endl. 1838. Gen. n. 3539. p. 602; 1841. Ench. p. 602: g. Chironiear. — Par. Griseb. 1839. Gen. Gentian. p. 107; 1845 in DC. Pr. IX. p. 44. Sect.: Pseudochironia, Pseudosebaea. — Meisn. 1839. Gen. p. 260 (168). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 4. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 556.

Synon. Floyeria Neck.

Exacum Vahl 1794. Symb. III. p. 17.
= Coutoubea Aubl.

Exacum Willd. 1797. Sp. I. p. 634. n. 221; 1809. En. p. 159: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. GMS. 1799. Fl. Wett. I. p. 172. 196.

*) Nomen ex Plinio.

Exacum Willd. cont.

Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 798: g. Gentianear. — Par. Hook. & Arn. 1831. Beech. voy. Bot. Pt. I. p. 34.

Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3477: g. Chironiear.
= Cicendia Adans.

Exacum DC. 1805. Fl. franç. III. p. 663: g. Gentianear. (E. filiforme et pusillum.)
= Cicendia Adans. et Hippocentaurea Rchb.

Exadenus Griseb. 1836. Obs. Gentian. p. 36: nov. g. Gentianear. (Swertia brevicornis Kunth.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.

Rchb. 1837. Hdb. p. 208; 1841. Nom. p. 133. n. 5128: g. Sebaeariar.

Endl. 1838. Gen. n. 3561. p. 605; 1841. Ench. p. 303: g. Sebaeear.

Griseb. 1839. Gent. gen. p. 322; 1845 in DC. Pr. IX. p. 127: g. Swertiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 261 (170). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 6.

Exarrhena*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 495. Ed. Nees p. 351: nov. g. Boraginear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2972; 1837. Hdb. p. 192. — A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 78.

Lehm. 1818. Asperif. I. p. 76: g. Asperifoliar. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XII. 111. n. 646. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 559. n. 594; 1830. Gen. I. p. 125. n. 624. — Bartl. 1830. Ord. p. 198. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 605.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Anchusear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 348. — Endl. 1839. Gen. n. 3773. p. 649; 1841. Ench. p. 321. — Meisn. 1840. Gen. p. 280 (188).

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31: g. Asperifoliear.

Rchb. 1841. Nom. p. 111. n. 4333: g. Borraginear.

DC. 1846. Pr. X. p. 111: sect. Myosotidis. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 202.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Anchusidar.

Exastoma Hedwig vid. *Exostema Pers.*

Excaecaria Juss. 1789. Gen. p. 390: g. Euphorbiar.

Gmel. 1791. Syst. p. 203: g. Triandr. Trigyn.

Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 631: g. Crotonear.

Blanco 1837. Filipin. p. 786: g. Dioec. Triandr.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.

Baill. 1858. Euphorb. p. 517: sect. Stillingiae.
= Excoecaria Linn.

Excipula Fries 1823. Syst. myc. II. p. 189: trib. Cenangii. — Simil. Math. 1853. Belg. II. p. 272.

Fries 1823. Syst. myc. II. p. 596; 1828. Elench. II. p. 146: g. Phacidiaceor.

*) ἔξω, extus, foris; ἄῤῥην, mas.

Excipula Fries cont.
Fries 1825. Pl. homon. p. 117: g. Phacidieor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 250; 1841. Nom. p. 7. n. 271. — Endl. 1836. Gen. n. 369. p. 32; 1841. Ench. p. 19.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Sclerotiacear.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 24: g. Alphitomorphaear. (1839. ibid. III. p. 29: g. Pyrenomycetum.)
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 35; 1842. Mycol. p. 148: g. Excipulear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 151: g. Hysteriaceor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Phragmotrichaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 403: g. Gibbereor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Excipuleor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 225: g. Excipulinor. (*Synon. Sphinctrina Fries.*)
Synon. Phlyctidium Wallr.

Excipuleae Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 35; 1842. Anl. Mycol. p. 148: sect. Phragmotrichiacear. Gen.: Pilidium, Excipula.

Excipulei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: sect. Sarcopsideor. Gen.: Excipula, Dinemasporium, Polynema, Chaetostroma.

Excipulini Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 225: fam. Sphaeronemeor. Gen.: Excipula, Labrella, Pilidium, Chaetomium, Stephanoma.

Excipulites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 262: g. Fungor. foss. — Par. Unger 1845. Syn. p. 18; 1846. Chlor. prot. p. XXIX.

Excoecaria*) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1288; 1763. Sp. ed. II. p. 1451; 1764. Gen. ed. VI. p. 515. n. 1102; 1767. Syst. ed. XII. p. 650: g. Dioec. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 738; 1784. Syst. p. 882. — Reich. 1778. Gen. p. 512. n. 1205. — Lour. 1790. Coch. II. p. 612. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 677. n. 1498. — Pers. 1797. Syst. p. 925. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 756.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 169. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 24. n. 2345; 1831. Gen. I. p. 530. n. 2602.
Gled. 1764. Syst. p. 23. n. 92: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 350: g. Amentacear.
Neck. 1790. El. II. p. 350. n. 1149: g. Cyrtosiphytor.
Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 1119: g. Monadelph. Triandr.
Cram. 1803. Disp. p. 186 in Monoec. Monadelph. (E. lucida, glandulosa.)
Cram. 1803. Disp. p. 204 in Dioec. Monadelph. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 864. n. 1846. — Pers. 1807. Ench. II. p. 634. n. 2293.

*) Arbor Rumphio dicta excoecans.

Excoecaria Linn. cont.
Duchesne 1804. Dict. v. 1. p. 276 (*Agalloche*): g. Euphorbiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 286. — Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 52. — Endl. 1833. Norf. p. 82.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 366: g. Euphorbiear. — Par. A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 27.
Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5021; 1837. Hdb. p. 281: g. Hippomanear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 526. — Meisn. 1841. Gen. p. 338 (251). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. — Didrichs. 1857. Nat. For. Vid. Medd. . . . . Subgen.: Protaxanthes
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45 (*Exoecaria*): g. Huracear.
Endl. 1840. Gen. n. 5772 *b.* p. 1109; 1841. Ench. p. 587: sect. Excoecariae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7336. 2.
Synon. Excaecaria Juss.

Excoecaria Endl 1840. Gen. n. 5772. p. 1109; 1841. Ench. p. 587: g. Hippomanear. latius definitum. Sect.: Gymnanthes, Excoecaria. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7336. Sect. eaed.

Excremis „Willd. mss." Schult. 1829. Syst. VII. p. 354 in adnot. (Char.)
= Dianella Lam.

Exembryonatae Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt 1811. p. 53: div. 1 plantar.
= Cryptogamae.

Exidia*) Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 220; 1828. Elench. II. p. 33; 1838. Epicr. p. 590: g. Tremellinar. Tribus: Auriculae, Glandulosae (1838 Auriculariae, Spiculariae). — Par. Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 35; 1842. V. p. 40; 1842. Mycol. p. 168. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 78; 1842. Pl. cell. Cub. p. 364.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 570: g. Tremellinear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 266.
Fries 1825. Pl. homon. p. 93: g. Cupularium. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 289. — Endl. 1836. Gen. n. 404. p. 35; 1841. Ench. p. 20. Sect. Spicularia, Mugomyces.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Tremellacear.
Spreng. 1831. Gen. IV. p. 768. n. 3932: g. Tremellinor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42. — Bail 1858. Syst. p. 17.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 557: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 422: g. Exidieor. Sect. Spicularia, Exidia. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 312.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 340: g. Tremellineor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 467: g. Tremelleor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 153: g. Hymeniophoror.

Exidiei Rchb. 1841. Nomencl. p. 10: subdiv. Tremellinor. Gen.: Exidia, Lemalis, Hirneola. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 312. Gen.: Exidia.

*) Ἐξιδίω, exsudo.

Exilaria Greville 1830. Syn. p. 38; . . . . Scot. cr. V. t. 298: nov. g. Diatomear. pedicellatar. *Cf.* Brébiss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 541.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 559: g. Diatomacear. liberar. (*Synon. Psygmatella Kütz.* in litt.)
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 203: g. Fragilariear. = Synedra Ehrenb., etc.

Exitelia*) Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VII.: g. Büttneriacear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 559. n. 2731: g. Büttnerear.
Endl. 1840. Gen. n. 5357. p. 1004; 1841. Ench. p. 520: g. Eriolaenear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7693. — Walp. 1842. Rep. I. p. 351 (dubium). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364. (?) — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 617.
Blume 1855. Mél. bot.; 1858. Flora p. 255: sect. Parinarii. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 645.
Synon. Maranthes Blume; Maranthus Rchb.; Sarcostegia Benth.

Exoacantha**) Labill. 1791. Pl. syr. dec. I. p. 10. t. 2: nov. g. Pentandr. Digyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 1378. n. 524.
Batsch 1802. Tab. p. 41: g. Umbellatar. — Par. Pers. 1825. Ench. I. p. 301. n. 670.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 480: g. Umbelliferar. (anomalar.) — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 196. n. 805. (anomalar.) — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 645; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXX. 338; 1825. Syst. I. p. 873. n. 1027; 1830. Gen. I. p. 219. n. 1127. (descisc.) — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 74. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 106. (Divis. 3.) — Bartl. 1830. Ord. p. 237. (descisc.)
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3703: g. Coriandrear.?
DC. 1830. Pr. IV. p. 235: g. Smyrnear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 371. — Endl. 1839. Gen. n. 4523. p. 789; 1841. Ench. p. 380.
Tausch 1834. Flora I. p. 357: g. Echinophorear.? — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 150 (108). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 140. — Endl. 1850. Spl. V. p. 14.
Rchb. 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5341: g. Smyrniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.

Exocarpeae Arnott 1832. Encycl. brit. ed. VII. p. 128: fam. plantar. Gen.: Anthobolus, Exocarpus.
Rchb. 1837. Hdb. p. 167: subdiv. Santalear. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 62: subdiv. Osyridear. Gen.: Anthobolus, Exocarpus.

Exocarpos Labill. 1798. Voy. I. p. 115. Ed. germ. (1801) I. p. 127; 1806. Nov. Holl. II. p. 123: nov. g. Terebinthacear., juxta Anacardium collocandum.

Exocarpos Labill. cont.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 356. Ed. Nees p. 212: g. Santalaceis aff. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. LI. 588. n. 1064.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Anthobolear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 113. — Meisn. 1841. Gen. p. 329 (240). — A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 687. Sect.: Sarcocalyx, Euexocarpos, Phyllodanthos.
Synon. Exocarpus Auct.; Xylophyllos Rumph.; Sarcocalyx Zipp.

Exocarpus Pers. 1807. Ench. II. p. 561. n. 2073: g. Monoec. Pentandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 218: g. Taxear.
Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 75: g. Coniferar.
Agdh. 1825. Aphor. p. 230: g. Santalacear. — Par. Endl. 1833. Norf. p. 46. — Miq. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 618; 1855. Ind. bat. I. p. 781. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 223.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 826. n. 944; 1830. Gen. I. p. 203. n. 1035: g. Santalear. (in Pentandr. Monogyn.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 873.
Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1707: g. Osyridear.
Arnott 1832. Encycl. brit. ed. VII. p. 128: g. Exocarpear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 167; 1841. Nom. p. 62. n. 2363.
Endl. 1838. Gen. n. 2088. p. 328; 1841. Ench. p. 208: g. Anthobolear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 461. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 12. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear. = Exocarpos Labill.

Exochaenium Griseb. 1845 in DC. Prodr. IX. p. 55: nov. g. Erythraeacear. (Belmontia grandis Meyer.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614: g. Gentianear.

Exococcaceae Nägeli 1847. Neuere Alg. Syst. p. 169: ordo 10 Algar. Gen.: Exococcus.

Exococcus Nägeli 1847. Neuere Alg. Syst. p. 169: nov. g. Exococcacear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 210. n. 164: g. Palmellear.

Exoecaria Dumort. vid. *Excoecaria Linn.*

Exogenae DC. 1818. Syst. I. p. 123; 1824. Prodr. I. p. 1: class. prima plantar. (= *Dicotyledoneae DC.*)
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I: subclass. Vascularium. Tribus: Angiospermae, Gymnospermae.
Lindl. 1833. Nix. pl. Ed. germ. p. 12: class. I. plant. Subclasses: Polypetalae, Incompletae, Monopetalae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 235: class. VII. plant. Subclass.: Diclinae, Hypogynae, Perigynae, Epigynae.

Exogeneae Link 1829. Handb. I. p. 290: class. II. plantar. Subclasses: Vaginales, Vaginantes, Perigoniatae, Xeranthae, Hypanthae, Epanthae, Anthodiatae, Perigynae, Leguminosae, Catastemones, Anastemones, Allostemones, Apetalae, Hydrophytae, Catadytae, Amentaceae.

Exogenites Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 209. 210. 298: g. Vegetabilium foss. class. I. (= Ligna dicotyledonea fossilia.)

---

*) ἐξίτηλος, caducus, fugax.
**) ἔξω in compos.: foris, externe.

Exogonium Moç. & Sessé mss.
= Quamoclit Tourn.

Exogonium*) Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 443 (*cf.* Flora Lit. V. p. 128); .... ibid. VIII. p. 49; 1845 in DC. Pr. IX. p. 346: nov. g. Convolvulear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 264. — Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4413. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.
Endl. 1839. Gen. n. 3803 *d.* p. 654; 1841. Ench. p. 324: sect. Convolvuli. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 275 (182).

Exomis Moquin-Tand. 1840. Chenop. en. p. 49; 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 89: nov. g. Atriplicear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 31. n. $1911/_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 368.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.

Exorhizae Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt (1811.) p. 59. 95: subdiv. Embryonatar.

Exormatostoma Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 521: nov. g. Spheridear. (Sphaeria tiliae, tessellata, nebulosa Pers., etc.)
= Sphaeriae Hall. pars.

Exosporei Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: div. Epiphytor. Gen.: Sporidesmium, Exosporium, Coryneum, Seiridium.

Exospori Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 233: subclass. I. Hymenomycetum. Ordines: Tetrasporidei, Monosporidei.

Exosporia Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: div. Sarcopodior. Gen.: Sarcopodium, Stereum, Exosporium, Dacryomyces, Podisoma, Gymnosporangium, Coryneum, Prosthemium.

Exosporium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 9: nov. g. Epiphytar.
Nees 1816. Syst. p. 33; 1817. Ueberbl. p. 8: g. Sphaeromycor. concretor.
Mart. 1817. Erlang. p. 329: g. Coniomycetum. (suffultor.) — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 79. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 563. n. 3581; 1831. Gen. II. p. 784. n. 4061. (suffultor.)
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Exosporior.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 527: g. Stilbosporear.
Link 1825. Spec. II. p. 120: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 191: g. Sporodesmior. ambiguum.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Exosporeor.
Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 34: g. Entophytor. ambiguor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Spondylomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 231: g Sporomycetum hyposporor.
Endl. 1836. Gen. n. 236 *b.* p. 20; 1841. Ench. p. 15: sect. Helminthosporii.

*) Nomen sic dictum ob stamina exserta.

Exosporium Link cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 31: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 33.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 39; 1842. Mycol. p. 165: g. Coryneacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Dematieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 475: g. Coryneaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 131: g. Tubercularinor.
Math. 1853. Belg. II. p. 420: g. Sporidesmiear.
Synon. Corynodesmium Wallr.?; Cephalaeodium Kunze?; Conopleae sp. Pers.

Exostema Pers. 1805. Ench. I. p. 196: sect. Cinchonae. *Cf.* Hedw. 1806. Gen. p. 138 (*Exastoma*).
Rich. 1808 in Humb. & Bonpl. Pl. aequin. I. p. 131. t. 38: g. Rubiacear. (*Cf.* Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 80.) — Par. Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 387. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 165. n. 828.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 403: g. Cinchonear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 608. — Kunth 1824. Syn. III. p. 54.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.
D. Don 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 142. Char. emend.
= Exostemma DC.

Exostemma DC. 1806. Diss.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. III. 17. n. 862: g. Rubiacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 224; 1829. Hdb. I. p. 661. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 705. n. 771. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 722.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 369: sect. Cinchonae.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2067: g. Cinchonear. — Par. Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 178. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — Bartl. 1830. Ord. p. 211. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 280. — DC. 1830. Pr. IV. p. 358. Sect.: Pitonia, Brachyanthum, Pseudostemma. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 480. Sect. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 158 (113). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 394. Subgen. ut DC. — Brongn. 1843. En. genr. p. 51.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 77. n. 2905: g. Quinquinear. Sect. (1841): Exostemma, Brachyanthemum.
Endl. 1838. Gen. n. 3269. p. 555; 1841. Ench. p. 274: g. Eucinchonear. Sect.: Pitonia, Brachyanthemum. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 36. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 128.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 31. t. 237.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.
Synon. Exostema Pers.

Exostyles „Schott" Spreng. 1827. Syst. Cur. post. App. p. 406: g. Decandriae.
Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4092: g. Sophorear.?

Exostyles Schott cont.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 352. n. 1778: g. Leguminosar. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1426 *(Exostylis)*.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 106. 454 *(Exostylis)*: g. Cassiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70).
Endl. 1834. Atakt. p. 26. t. 25.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Amherstiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 845. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Endl. 1841. Gen. n. 6758. p. 1311; 1841. Ench. p. 674: g. Caesalpiniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6060.
Exostylis G. Don, Dietr. vid. *praeced.*
Exothea Macfadyen 1837. Fl. Jamaic. I. p. 232.
Endl. 1840. Gen. n. 5922. p. 1134; 1841. Ench. p. 599: g. dubium Anacardiacear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 557.
Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5676: g. Spondiear.?
Meisn. 1843. Comm. p. 349: g. Cassuviear.?
= Hypelate P. Browne.
Exotheca Anderss. 1856. Nov. Act. Ups. ser. tert. II. 1. p. 253 (*cf.* Bot. Zeit. 1857. p. 206): nov. g. Anthistiriear. (Anthistiria abyssinica Hochst.)
Exothostemon*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 82: nov. g. Echitiear. (Echites bracteata Kunth.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 3409 *d.* p. 1396; 1841. Ench. p. 294: sect. Echitis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5164. 4.
= Echites A. DC.
Exoxylae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 53: div. 2 plantar. (Cohortes: Triadanthae, Cryptanthae.) Subdivis.: Tepalanthae, Chlamydanthae, Spathanthae, Cryptanthae.
Extinctorium Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Gymnostomear. (Nomen. — An Eucalyptae species?)
Exydra Endl. 1830. Fl. Poson. p. 119.
= Hydrochloa Link.
Exytelma Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Cynanchear., inter Asclepiadem et Aceratem collocatum. (Nomen.) An pro *Oxystelma R. Brown?*

Eydisanthema Necker 1790. Elem. bot. III. p. 133. n. 1475: nov. g. Synarmophytor., ab Epidendro L. sejunctum.
Eyrea Champ. & Benth. 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 331: nov. g. Staphyleacear. (Staphylea simplicifolia Gardn.)
Eyrea*) F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 403: nov. g. Conyzear., Phagnalo aff. (E. rubelliflora.)
Eyrythalia „Ren." Borckh. 1796 in Römer Arch. I. 1. p. 28: g. ex typo Gentianae campestris L. admissum. (*Synon. Opsantha Ren.)*
= Eurythaleia Renealm.
Eyselia**) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 199. n. 333: nov. g. Phyllastrophytor., Valantiae et Galii L. species complectens.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85 *(Eysselia)*: g. Astrophyllae.
Eyselia Rchb. . . . . Ic. exot. t. 252.
= Egletes Cass.
Eysenhardtia***) HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 489. t. 592: nov. g. Papilionacear. (E. amorphoides.) — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 120.
DC. 1825. Pr. II. p. 257: g. Galegear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3894; 1841. Nom. p. 147. n. 5718. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 234. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 89 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6525. p. 1270; 1841. Ench. p. 669. — Brongn. 1843. En. genr. p. 128.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Psoraliear.
Eysselia Rafin. vid. *Eyselia Neck.*
Eystathes†) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 234. Ed. Willd. p. 289: nov. g. Octandr. Monogyn. (E. sylvestris. — „An Valentiniae species?" Willd. in adnot.)
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 477: g. Sapindaceis aff. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 618 (minus notum). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 675.
Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 93: g. Sapindear.
Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38): g. Dodonaeacear.?
Synon. Eustathes Auct.; Eustathos Spach.

F.

Faba Tourn. 1700. Inst. p. 391. t. 212: g. pl. class. X.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 253. Ed. Hall. 1745. p. 263: g. pl. class. XI.
Adans. 1763. Fam. II. p. 331: g. Viciar.
Juss. 1789. Gen. p. 360: g. Leguminosar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 419. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 235. — DC. 1805. Franç. IV. p. 598. — Lois. 1820. Dict. v. 16. p. 492 *(Fève)*. — Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 210. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 430. 518.
Mönch 1794. Meth. p. 150: g. Thalamostemonis.

Faba Tourn. cont.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 617: sect. Viciae. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1278; 1832. Fl. exc. p. 531. — Endl. 1840. Gen. n. 6581 *a.* p. 1279; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 664. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 283.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Viciear. — Par. Ser. 1825 in DC. Pr. II. p. 354. — Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3920; 1841. Nom. p. 148. n. 5772. — Dumort. 1829.

*) *ἐξώθω*, protrudo.

*) Dicat. J. Eyre, coloniae Novo-Zeelandiae vicegubernatori.
**) Dicat. J. Phil. Eysel, prof. Erford.
***) Dicat. Dr. Car. Guil. Eysenhardt, prof. Regiomont.
†) *εὐσταθής*, stabilis: ab arboris ligno duratione firmo et stabili.

Faba Tourn. cont.
Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 312. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 156.
Link 1831. Hdb. II. p. 193: g. Lathyroidear.

Fabaceae Rchb. 1828. Consp. p. 149; 1832. Fl. exc. p. 525: div. Papilionacear. Subdivis.: Vicieae, Phaseoleae, Glycineae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 226; 1841. Nom. p. 148: subdiv. Lotear. Sect. ut antea (1841 err. Galegeae loco Glycinear.)

Fabaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 544: ordo Rosalium. Subord.: Papilionaceae, Caesalpinieae, Mimoseae.
= Leguminosae Juss.

Fabago Tourn. 1700. Inst. p. 258. t. 135: g. pl. class. VI.
Hall. 1745 in Rupp. fl. jen. p. 127: g. pl. class. V.
Adans. 1763. Fam. II. p. 507: g. Zizyphor.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 172. (Zygophyllum Fabago L.)
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 90: g. Thalamostemonis.
= Zygophyllum Linn.

Fabago Endl. 1840. Gen. n. 6036 *a*. p. 1164; 1841. Ench. p. 616: sect. Zygophylli.

Fabaria Rupp. 1718. Fl. jen. p. 115. Ed. Hall. 1745. p. 128: g. pl. class. V.
= Sedi Linn. pars.

Fabera Schultz Bip. 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 129: nov. g. Achyrophorear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 337: g. Hypochoeridear.
= Metabasis DC.

Fabiana*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 22. t. 34; 1799. Fl. Peruv. II. p. 12. t. 122: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 176. n. 410. — Hedw. 1806. Gen. p. 87. n. 395.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXIII. 307. n. 696: g. Solanear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 100. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 58.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 615. n. 649; 1830. Gen. I. p. 150. n. 753: g Convolvulear. — Par Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 663.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 296: g. Cestrinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 487.
Endl. 1839. Gen. n. 3838. p. 662; 1841. Ench. p. 331: g. Nicotianear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 276 (183). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 58. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 567. (Char. emend.)
Lindl. 1839. Bot. Regist. n. ser. XII. t. 59: g. Solanacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4736: g. Salpiglossidear.
Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148. 162; 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Fabianear. — Par. Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 589.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 621: g. Rectembryar.

*) Dicat. Franc. Fabiano.

Fabianeae Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148; 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: trib. Solanacear. Gen. (1846 Nierembergia, Fabiana) 1849: Fabiana, Vestia, Schwenkia?
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 582: subtrib. Solanear. Gen. ut Miers 1846 et Bouchetia.

Faboidea Bowerbank 1840. Foss. fruits I. p. 404.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 251; 1846. Chlor. prot. p. LXXXVII: g. incertae sedis.

Fabria E. Meyer 1837. Cat. pl. Dreg.
Meisn. 1840. Comm. p. 202. 367: g. Acanthacear. (non descriptum). — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 113: g. Ruelliear.

Fabricia Adans. 1763. Fam. II. p. 188: g. Labiatar.
= Lavandula Linn.

Fabricia Scopoli 1777. Introd. p. 307. n. 1407: g. Leguminosar.
= Alysicarpus Neck.

Fabricia Thunb. . . . . in Fabric. It. Norveg. p. 29.
= Curculigo Gärtn.

Fabricia Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 175. t. 35. f. 4: nov. g. pro Philadelpho myrtifolia Sol. mss. propositum.
Gmel. 1791. Syst. p. 789: g. Polyandr. Monogyn.
Smith . . . . Linn. Trans. III. p. 265.
Willd. 1799. Sp. II. p. 951. n. 969; 1809. En. p. 512: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Roxb. 1832. Ind. II. p. 476.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 323: g. Myrtoidear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 13.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 161: g. Myrtear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 851; 1825. Syst. II. p. 493. n. 1833; 1830. Gen. I. p. 406. n. 2033. — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 101. — Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 80. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV.
Pers. 1807. Ench. II. p. 25. n. 1201: g. Myrtacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 26. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 37. 81.
DC. 1828. Pr. III. p. 229: g. Euleptospermear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 827. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 146. — Meisn. 1837. Gen. p. 108 (76).
Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4672; 1837. Hdb. p. 253; 1841. Nom. p. 176. n. 6838: g. Leptospermear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 332. — Endl. 1840. Gen. n. 6310. p. 1230; 1841. Ench. p. 650. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 123. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 548. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 405.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Eucalyptear.

Fabritia Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 70: g. ex typo Lavandulae multifidae L. admissum.
Fabricia Adans.

Fabronia*) Raddi 1811. Atti acad. Sien. IX. p. 230: nov. g. Muscor. (*Cf.* Leman 1820. Dict. v. 16. p. 102. — Par. Schwägr. 1816. Suppl. I. 2. p. 337. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 219. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 150. n. 3302; 1831. Gen. II. p. 729. n. 3698. (frondosor.)

Brid. 1822. Meth. musc. p. 124: g. Peristomor. pleurocarpor.

Brid. 1827. Bryol. II. p. 168: g. Pleurocarpor. peristomor. (ibid. p. XLV Leskiear.)

Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 287: g. Hypnoidear. — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60.

Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 571: g. Leskeaceor.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: g. Hypnear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.

Hüb. 1833. Musc. germ. p. 544: g. Pleurocarpor. haploperistomor. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 549.

Endl. 1836. Gen. n. 567. p. 55; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 49.

Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 945: g. Calyptrobryor.

Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 118: g. Fabroniear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400.

Hampe 1847. Linnaea XX. p. 89: g. Fabroniacear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 247. — Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 292. — Bruch, Schimp. .... Bryol. eur. V. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 98.

C. Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 31: g. Neckeracear. Sect.: Eufabronia, Anacamptodon, Campylodontium.

Synon. Sterophyllum Brid.

Fabroniaceae Hampe 1847. Linnaea XX. p. 89: fam. Pleurocarpor. Gen.: Fabronia.

Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 246: subdiv. Pleurocarpor. Gen.: Fabronia, Anacamptodon.

Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 292: trib. Pleurocarpor. Gen.: Fabronia.

Bruch, Schimp. .... Bryol. eur. V: fam. Muscor. Gen. ut Rabenh. et Anisodon.

Fabronieae Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 118: trib. Hypnacear. Gen.: Fabronia.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: trib. Pleurocarpor. Gen. id.

Facchinia Rchb. 1841. Icon. fl. germ. V. p. 29; 1841. Nomencl. gen. p. 204. n. 7765: nov. g. Cherleriear.

Griseb. 1843. Rumel. I. p. 202: sect. Alsines.

= Alsines Wahlenb. pars.

Facelideae Lessing 1830. Linnaea V. p. 361; 1832. Syn. Compos. p. 123: subtrib. Mutisiacear. Gen.: Lucilia, Schizogyne, Oligandra, Facelis. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 45. Gen. ead. exclusa Schizogyne. — Endl. 1838. Gen. p. 488; 1841. Ench. p. 248. Gen. ut DC. — Meisn. 1839. Gen. p. 231 (142). Gen. ead. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. Gen. ead.

Rchb. 1841. Nom. p. 88: div. Labiatiflorar. Gen. ut DC. et Plazia?, Atractylia?

Rémy 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 180: Gnaphalieis injungit.

Facelioides A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 267: sect. Pteropogonis. (P. pygmaeus DC.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 287.

Facelis Cassini 1819. Bull. soc. philom. Juin p. 94; 1820. Dict. v. 16. p. 104; 1822. v. 23. p. 561: nov. g. Gnaphaliear. (Gnaphalium retusum Lam.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2413. — Rémy 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 190. Char. emend.

Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 223; 1830. v. 60. p. 579: g. Luciliear.

Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.

Less. 1830. Linnaea V. p. 364; 1832. Syn. p. 125: g. Facelidear. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 47. — Endl. 1838. Gen. n. 2942. p. 489; 1841. Ench. p. 248. — Meisn. 1839. Gen. p. 231 (142). — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3414. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.

Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 549: g. Nassauviear.

Synon. Leptalea Don.

Fadgenia Lindl. Veg. kingd. p. 80: vid. *Fadyenia Hook.*

Fadgenia Lindl. Veg. kingd. p. 295: vid. *Fadyenia Endl.*

Fadyenia*) Hook. 1839. Gen. Fil. t. 53 B.

J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 187: g. Aspidiear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 317.

Meisn. 1843. Gen. p. 433 (334): sect. Aspidii.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80 (*Fadgenia*): g. Polypodear.

Fadyenia Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 30 in adnot. ad Garryam; 1847. Suppl. IV. p. 38. n. $1899/_1$: nov. g. Garryacear. (Garrya Fadyenii Hook.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 295 (*Fadgenia*).

Faeniculum Hill, Harv. vid. *Foeniculum Tourn.*

Faetidia „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 325: nov. g. Myrtor. (*Bois puant* Brasiliensium.)

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 165: g. Myrtear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 466. — Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 80.

DC. 1828. Pr. III. p. 595: g. Myrtacear. dubium.

Conf. Foetidia Auct.

Faetsia „Medic." Meisn. Comm. p. 307 in synon. Dracaenae: sphalm. pro *Taetsia.*

*) Dicat. Angelo Fabroni, Pisano.

*) Dicat. Jam. Macfadyen, florae jamaic. auctori.

Fagara*) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 897. 1362. n. 1115; 1762. Sp. ed. II. p. 172; 1764. Gen. ed. VI. p. 60. n. 150; 1767. Syst. ed. XII. p. 125: g. Tetrandr. Monogyn. *Cf. Fagaras Burm.* — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 21. t. 14. — Murr. 1774. Syst. p. 134; 1784. Syst. p. 160. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 78. t. 30. — Reich. 1778. Gen. p. 61. n. 57. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 80. n. 196. — Lour. 1790. Coch. I. p. 80. — Gmel. 1791. Syst. p. 258. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 28; 1818. Fl. cap. I. p. 516. — Pers. 1797. Syst. p. 165; 1805. Ench. I. p. 144. n. 300. — Willd. 1797. Sp. I. p. 666. n. 231; 1809. En. p. 165. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 436; ed. 1832. I. p. 415. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 21.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Terebintor.

Adans. 1763. Fam. II. p. 364: g. Anonar.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Dumosar.? — Par. Gis. 1792. Prael. p. 499.

Gled. 1764. Syst. p. 25. n. 97: g. Thalamostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 323: g. Disciferar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 334. t. 68. f. 9 (piperita).

Juss. 1789. Gen. p. 374: g. Terebintaceis aff. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 453. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 258. — Hedw. 1806. Gen. p. 68. 375.

Neck. 1790. El. II. p. 223. n. 959 (*Fagarat*): g. Eredophytor.

Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.

Cram. 1803. Disp. p. 91 in Octandr. Monogyn. et p. 192 in Dioec. Pentandr.

R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 33): g. Diosmear. — Par. DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 141. — Kunth 1824. Syn. III. p. 327 adnot.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 655: g. Terebinthacear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 17. 295. n. 501. — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 106. — Link 1821. En. I. p. 145.

Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 185: g. Xanthoxylear.

G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 802. 803: sect. Zanthoxyli.

= Zanthoxyli Kunth pars.

Fagara Lamarck 1786. Diss. II. p. 686. (Ill. t. 84.)

Endl. 1840. Gen. n. 5972 *c.* p. 1146; 1841. Ench. p. 609: sect. Zanthoxyli.

Rchb. 1841. Nom. p. 196 n. 7476. 3: sect. Xanthoxyli.

Synon. Tobinia Desv.

Fagaras (Avicennae) Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 97.

= Fagara Linn.

Fagarastrum**) G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 87: nov. g. Burseriacear. (Fagara capensis Thunb.)

Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56): g. Burseraceer. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5940. p. 1138;

*) Nomen ex Avicenna et Clusio.

**) Fagarae simile.

Fagarastrum G. Don cont.

1841. Ench. p. 602 (vix notum). — Walp. 1842. Rep. I. p. 559. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 550.

Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5647: g. Burserear.? vix notum.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 460: g. Burseridar.? = Claucena Burm.

Fagarat Necker vid. *Fagara Linn.*

Fagaroides DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 141 adnot.: sect. Zanthoxyli (numero ternario partium distincta).

Fagelia Schwenck. 1774. Act. Roterod. I. p. 473. t. 13.

Gmel. 1791. Syst. p. 40: g. Diandr. Monogyn. (F. flavicans.)

= Calceolaria Feuill. (Steud.)

Fagelia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 41. n. 1357: nov. g. Cyteophytor., a Glycine L. disjunctum.

= seq.? (negante E. Meyer.)

Fagelia DC. 1825. Prodr. II. p. 389 (Lég. mém. IX): g. Phaseolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3935. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 348. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 156. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 138. — Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. austr. II. p. 257. — Meisn. 1837. Gen. p. 94 (67). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 131.

Spreng. 1831. Gen. syst. II. p. 587. n. 2884: g. Leguminosar.

Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 113: g. Cajanear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6685. p. 1299; 1841. Ench. p. 672. — Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5830. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 550.

Fagineae Rchb. 1828. Consp. p. 83; 1831. Fl. exc. p. 175; 1837. Hdb. p. 172: div. Amentacear. Gen.: Corylus, Fagus, Castanea, Quercus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 66: Subdivis.: *genuinae* (gen.: Carpinus, Ostrya, Corylus, Quercus, Lithocarpus, Synaedrys?, Fagus, Castanea), Henslowieae, Lacistemeae, Stilagineae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11. 12: fam. Corylariear. Gen.: Fagus, Castanea.

Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257): trib. Cupuliferar. Gen. ut Dumort.

Döll 1842. Flora II. p. 725: ordo Cupuliferar. Gen. ead. et Quercus.

Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 185: sect. Cupuliferar. verar. Gen. ut Dumort.

Fagites Göppert (Nov. Act. Leop XIX. 2. p. 372: *Fagus*) 1844. Uebers. p. 219: g. Cupuliferar. foss. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 30. n. 1848/$_2$.

Synon. Fagus Unger.

Fagoides Banks herbar.

= Alseuosmia A. Cunn.

Fagonia*) Tourn. 1700. Inst. p. 265. t. 141: g. pl. class. XI.

Linn. 1737. Gen. p. 128. n. 359; 1737. Cliff. p. 160; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p.

*) Dicat. Guidoni Crescentio Fagono.

Fagonia Tourn. cont.
103; 1753. Sp. I. p. 386; 1759. Syst. ed. X. p. 1021. n. 475; 1762. Sp. ed. II. p. 553; 1764. Gen. ed. VI. p. 212. n. 531; 1767. Syst. ed. XII. p. 295. n. 526: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 334; 1784. Syst. p. 401. — Reich. 1778. Gen. p. 219. n. 579. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 289. n. 731. — Gmel. 1791. Syst. p. 683. — Pers. 1797. Syst. p. 428. — Willd. 1799. Sp. II. p. 565. n. 847; 1809. En. p. 448. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 102. Ed. Schrank p. 111.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 128: g. pl. class. V.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 99. n. 410: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 82.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Succulentar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rutar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 507: g. Zizyphor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Gruinalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 320.
Scop. 1777. Intr. p. 254: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 296: g. Rutacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 225. — Batsch 1802. Tab. p. 55. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 103. — Pers. 1805. Ench. I. p. 463. n. 1037. — Hedw. 1806. Gen. p. 308. n. 1218. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 675; 1825. Syst. II. p. 324. n. 1588; 1830. Gen. I. p. 350. n. 1766. — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 110. — Link 1821. En. I. p. 399. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1422.
Neck. 1790. El. II. p. 299. n. 1072: g. Synathrophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 153. t. 113.
DC. 1824. Pr. I. p. 704: g. Zygophyllear. (verar.) — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 453. — Presl 1826. Sicul. I. p. 213. — Bartl. 1830. Ord. p. 392. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 770. — Link 1831. Hdb. II. p. 228. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 145. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 306. (genuinar.) — Webb 1836. Canar. I. p. 16. — Meisn. 1837. Gen. p. 59 (43). — Endl. 1840. Gen. n. 6034. p. 1163; 1841. Ench. p. 616. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 82. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 550. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 404.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5194; 1841. Nom. p. 198. n. 7549: g. Guajacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Fagoniear.

Fagonieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: trib. Zygophyllear. Gen.: Fagonia, Zygophyllum, Guaiacum.

Fagopyrinae Bartl. 1830. Ord. nat. p. 106: class. (25) Gymnoblastor. Ordines: Polygoneae, Nyctagineae.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 512: class. (37) Dicotyledonum apetalar. Familiae eaed.

Fagopyrum Sloane 1696. Jamaic. t. 90. f. 1 (scandens) ex Meisn. Comm. p. 234.
= Anredera Juss.

Fagopyrum*) Tourn. 1700. Inst. p. 511. t. 290: g. pl. class. XV. *Cf.* Juss. 1820. Dict. v. 16. p. 111.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 88. Ed. Hall. 1745. p. 98: g. pl. class. V.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 172: g. ordinis 3 class. III.
Mönch 1794. Meth. p. 290: g. Thalamostemonis.
DC. 1805. Franç. III. p. 369: sect. Polygoni. — Par. Link 1821. En. I. p. 385; 1829. Hdb. I. p. 298. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 510. — Meisn. 1826. Polygon. p. 61. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 46. — Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4291 *g*; 1832. Fl. exc. p. 574. — Mert. & Koch 1831. Deutschl. Fl. III. p. 62. — Koch 1837. Syn. p. 619. Ed. II. p. 713. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 55.
Campd. 1819. Mon. Rum. p. 18: g. Polygonear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 271. — Agdh. 1825. Aphor. p. 222. — Bartl. 1830. Ord. p. 109. — Meisn. 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 63; 1841. Gen. p. 317 (229). — Endl. 1837. Gen. n. 1987. p. 307; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 49. (*verar.*) — Kunth 1838. Berol. II. p. 164. — Babingt. 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 117. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 538. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 85 (*Fagopyrus*). — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 51. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 364 (*Sarrasin*).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Persicariear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 163. n. 6327: g. Coccolobear.
C. A. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845) Bot. p. 146: g. Eupolygonear. — Par. Ledeb. 1851. Ross. III. p. 517. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 143.
Synon. Fagotriticum J. Bauh.; Frumentum Matth.

Fagopyrus Hassk. vid. *Fagopyrum Tourn.*

Fagotriticum J. Bauh. 1650. Hist. II. p. 993. *Cf.* Linn. 1744. Act. Holm. p. 117. t. 4.
= Fagopyrum Tourn.

Fagraea**) Thunb. 1782. Vet. Ac. n. Handl. p. 125; 1782. Nov. gen. II. p. 34: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 198. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 112. n. 276. — Gmel. 1791. Syst. p. 336. — Pers. 1797. Syst. p. 204. — Willd. 1797. Syst. I. p. 830. n. 311. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 31; ed. 1832. I. p. 461.
Juss. 1789. Gen. p. 150: g. Apocineis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 338. — Hedw. 1806. Gen. p. 122. n. 538.
Neck. 1790. El. I. p. 268. n. 428: g. Campylophytor.

*) Fagus; πυρός, triticum.
**) Dicat. Joh. Theod. Fagraeo.

Fagraea Thunb. cont.

Gis. 1792. Prael. p. 402: g. Contortar.

Pers. 1805. Ench. I. p. 265. n. 603: g. Apocynear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LII. 546. n. 820.

R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 564 (Verm. bot. Schr. I. p. 75): g. Loganear. (?) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 496: g. Carissear.

Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 112: g. Rubiacear.

Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1020: g. Strychneacear.

Mart. 1827. Nov. gen. II. p. 91: g. Potaliear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 133. n. 5139. — Endl. 1838. Gen. n. 3367. p. 576; 1841. Ench. p. 289. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 555.

Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3509: g. Loganiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 206. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 483. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Potaliacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 68.

Meisn. 1839. Gen. p. 259 (167): g. Fagraeacear. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 28. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 11. p. 163. (ampliat.) Sect.: verae, Eufagraea, Cyrtophyllum.

Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 75: g. Loganiacear. Sect. ut Blume.

Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 366: g. Fagraeear. Subgen.: Eufagraea, Cyrtophyllum.

Synon. Kuhlia Reinw.; Cyrtophyllum Reinw.; Utania Don; Kentia Steud.; Picrophloeus Blume.

Fagraeaceae Meisn. 1839. Gen. pl. vasc. p. 259 (167): trib. Loganiear. Gen.: Fagraea, Cyrtophyllum, Picrophloeus. — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 28. Gen. ead.

Fagraeeae Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 366: trib. Loganiacear. Gen.: Fagraea, Strychnos.

Fagus*) Tourn. 1700. Inst. p. 584. t. 351: g. pl. class. XIX.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 310: g. pl. class. XIV.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 160: g. Juliferar. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 463. — Rabenh. 1837. Linnaea XI. p. 242.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 182. t. 37. f. 2 (sylvatica).

Neck. 1790. El. III. p. 258. n. 1650: g. Axonophytor.

Mönch 1794. Meth. p. 334: g. Thalamostemonis.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 568: g. Amentacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 322. — DC. 1805. Franç. III. p. 305. — Pers. 1807. Ench. II. p. 571. n. 2103. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 348; 1826.

*) Graeco *φηγός*; a *φάγειν*, quod fructus edulis est.

Fagus Tourn. cont.

Syst. III. p. 856; 1831. Gen. II. p. 694. n. 3504. — Lois. 1821. Dict. v. 21. p. 132 (*Hêtre*). — Link 1822. En. II. p. 400. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 626.

GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 281. 360: g. Monoec. Polyandr. — Par. Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 194. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 459. n. 1694; 1809. En. p. 979. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 216. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 6. 166.

Rebent. 1804. Neom. p. 220: g. Polyandr. Trigyn.

Mirb. 1815. Élém. II. p. 906: g. Corylacear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 209. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 299.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 248: g. Corylidear.

Rchb. 1828. Consp. p. 83. n. 1796; 1831. Fl. exc. p. 176; 1841. Nom. p. 66. n. 2473: g. Faginear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12. — Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 194. — Döll 1842. Flora II. p. 725. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 592.

Bartl. 1830. Ord. p. 100: g. Cupuliferar. — Par. Koch 1837. Syn. p. 638. Ed. II. p. 736. — Endl. 1837. Gen. n. 1847. p. 275; 1841. Ench. p. 160; 1847. Spl. IV. p. 29. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 339. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 609 (*Hêtre*). — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 229.

Kunth 1838. Berol. II. p. 195: g. Quercinear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 134. — Math. 1853. Belg. I. p. 491.

Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 68. t. 194—198.

Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 20. p. 306: g. Cupuliferear. — Par. Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 114.

Synon. Calucechinus et Calusparassus Jacquem. & Hombr.; Betuloides, Cliffortioides et Myrtilloides Banks & Sol.; Fagi sp. Linn.

Fagus Linn. 1737. Gen. p. 292. n. 728; 1737. Cliff. p. 447; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 287; 1753. Sp. II. p. 997; 1759. Syst. ed. X. p. 1272. n. 951; 1763. Sp. ed. II. p. 1416; 1764. Gen. ed. VI. p. 496. n. 1072; 1767. Syst. ed. XII. p. 630: g. Monoec. Polyandr., injuncta Castanea auctum. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 717; 1784. Syst. p. 859. — Reich. 1788. Gen. p. 493. n. 1170. — Lour. 1790. Coch. II. p. 570. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 647. n. 1480. — Pers. 1797. Syst. p. 904.

Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 126. n. 521: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Amentacear. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 351. — Juss. 1789. Gen. p. 409. — Gis. 1792. Prael. p. 578. — Batsch 1802. Tab. p. 163.

Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 492: g. Castanear.

Fagus Linn. cont.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 195: g. Dodecandr. Trigyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 757.
Blanco 1837. Filipin. p. 728: g. Monoec. Dodecandr.
Fagus et Castanea Tourn.
Fagus Unger 1844. Chlor. protog. p. 101. t. 27. 28 (1846. p. LXXIX); 1845. Syn. pl. foss. p. 218: g. foss. Cupuliferar.
= Fagites Göpp.
Falcago Rchb. 1831. Fl. exc. p. 504; 1841. Nom. p. 147. n. 5699. 2: sect. Medicaginis. (M. procumbens, falcata, glutinosa, sativa, etc.) — Par. Koch 1839. Deutschl. Fl. V. p. 315; 1843. Syn. ed. II. p. 175. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 18. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 383.
Falcaria Rivin. 1699. Pentapet. N. 48.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 266. Ed. Hall. 1745. p. 279: g. pl. class. XII.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 98. t. 3.
Host 1797. Fl. Austr. I. p. 381.
DC. 1830. Pr. IV. p. 109: g. Amminear. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 475; 1837. Hdb. p. 219. (genuinar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 285. — Koch 1836. Syn. p. 284. Ed. II. p. 313. — Meisn. 1838. Gen. p. 143 (104). — Kunth 1838. Berol. I. p. 264. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 943. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138. — Brongn. 1843. En. genr. p. 111. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 245. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 733.
C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 356: g Ammear.
Synon. Prionitis Adans.; Critamus Bess.; Crithamus Wittst.; Drepanophyllum Koch; Sium Blume; Hladnikia Rchb.; Hladnickia Meisn.
Falcata „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 254. Ed. Hall. 1745. p. 264: g. pl. class. XI.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 130: g. herbae flore papilionaceo.
= Medicago Linn.
Falcata Gmel. 1791. Syst. p. 1131: g. Diadelph. Decandr. (*Anonymos Walt.* Carol. p. 188. n. 294.)
= Amphicarpaea DC.
Falcatella Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: g. Naviculacear.
Falcatula Brotero 1801. Phytogr. Lus. p. 160.
Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 184: sect. Trigonellae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3872 *d*; 1841. Nom. p. 147. n. 5698. 1. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 176. — Koch 1836. Syn. p. 166. Ed. II. p. 182. — Endl. 1840. Gen. n. 6508 *d*. p. 1267; 1841. Ench. p. 668. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 534 (*Falculata*). — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 40.
Synon. Triphyllum Medic.; Buceratis sp. Mönch.
Falckia*) Thunb. „Act. Lund." 1781. Nov. gen. I. p. 17: nov. g. Hexandr. Digyn.
Gis. 1792. Prael. p. 393: g. Campanacear.
Conf. Falkia Linn. f.

*) Dicat. Joh. Petro Falck, prof. Petrop.

Falconera Wight vid. *seq.*
Falconeria*) Royle 1839. Himal. p. 364. t. 98: nov. g. Stilaginear. (F. insignis.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2480.
Endl. 1841. Spl. I. n. $1892/_1$. p. 1376; 1841. Ench. p. 173: g. Antidesmear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 347 (258).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 259: g. Stilaginacear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 556: g. Antidesmacear.
Tulasne 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 255: g. Euphorbiacear. genuinar., Sapio aff.
Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 20. t. 1866 (*Falconera*): g. Hippomanear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 527: g. Stillingiidear.
Synon. Gymnobothrys Wall.
Falcularia Ledeb. 1842. Fl. Ross. I. p. 523: sect. Medicaginis. (M. cretacea, falcata, etc.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 847.
Falculata Ledeb. vid. *Falcatula Ser.*
Faldermannia „Bunge" Rchb. 1841. Nomencl. p. 104. n. 4068: g. Monardear. *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 150. 160. (An *Fladermannia?* ex Endl.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Rosmarinidar.
Zizyphora Linn.
Falimiria „Bess." Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1021: g. Poacear. (*Synon. Arthrostachya Link.*)
Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Bromear.
Falkea König mss. ex Steud. Nomencl. I. p. 194. 625.
= Begonia tenera Dryand.
Falkia Linn. f. 1781. Suppl. p. 30. n. 1385: g. Hexandr. Digyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 345. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 237. n. 611. — Gmel. 1791. Syst. p. 580. — Pers. 1797. Syst. p. 368. — Willd. 1799. Sp. II. p. 247. n. 697; 1809. En. p. 396.
Juss. 1789. Gen. p. 132: g. Borragineis aff. Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 304. — Hedw. 1806. Gen. p. 181. n. 746.
Pers. 1805. Ench. I. p. 287. n. 637: g. Convolvulacear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. XX. 209. — Link 1821. En. I. p. 346. — Bartl. 1830. Ord. p. 192. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 921.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 464; 1825. Syst. I. p. 864. n. 1009; 1830. Gen. I. p. 215. n. 1108: g. Convolvulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 2993. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 557.
Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 170: g. inter Borragineas et Convolvulaceas intermedium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Dichondracear.
Choisy 1833. Mém. Genèv. VI. p. 497 (*cf.* Flora Lit. V. p. 138); 1845 in DC. Pr. IX. p. 451: g. Dichondrear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 303. — Endl. 1839. Gen. n. 3789. p. 652; 1841. Ench. p. 323. — Meisn. 1840. Gen. p. 275 (182).

*) Dicat. Falconer, peregrinatori in India.

Falkia Linn. cont.
— Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 94. — Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4405. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 55. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 632.
= Falckia Thunb.

Fallopia Adans. 1763. Fam. II. p. 277: g. Persicariar.
= Brunnichia Banks.

Fallopia*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 335. Ed. Willd. p. 409: nov. g. Polyandr. Monogyn. (F. nervosa.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 375. — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 171.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 729: g. Paraverear.
= ?

Fallugia**) Endl. 1840. Gen. n. 6385. p. 1246; 1841. Ench. p. 659: nov. g. Eudryadear. (Sieversia paradoxa Don.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 46. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 557.
Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6503: g. Dryadear. (genuinar). — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 354.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Potentillidar.

Falona Adans. 1763. Fam. II. p. 496: nov. g. Poarum. (Cynosurus echinatus L.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63 (*Phalona*): g. Cynosurear.
= Cynosuri Palis. sp.

Falopia Wittst. Etym. Handw. p. 362: err. pro *Fallopia Lour.*

Famarea Vitman 1790. Summ. pl. I. p. 357.
= Eufaramea DC..

Faramea Aubl. 1775. Guian. I. p. 102. t. 40: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (F. corymbosa, sessiliflora.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 279. — Schult. 1827. Mant. III. p. 7.
Lam. 1786. Dict. II. p. 460. (Ill. t. 63.)
Juss. 1789. Gen. p. 209; 1820. Mém. Mus. VI. p. 374: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 451. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 9. 177. n. 453. — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 179.
Hedw. 1806. Gen. p. 372: g. Rubiaceis aff.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 86 (sph. *Taramea*): g. Coffeariae.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2008: g. Coffeacear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 175: sect. Farameae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2804. 1.
= Eufaramea DC.

Faramea A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 175: g. emend. Coffeacear. Sect.: Faramea, Tetramerium. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 447. Sect.: Eufaramea, Tetramerium.
DC. 1830. Pr. IV. p. 496: g. Coffeear. Sect.: Eufaramea, Tetramerium, Farameoides. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 578. Sect. eaed. — Endl. 1838. Gen. n. 3154. p. 533; 1841. Ench. p. 272. Sect. eaed. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 559.

*) Dicat. Gabr. Fallopio.
**) Dicat. Virg. Fallugio, Florentino.

Faramea A. Rich. cont.
Cham. 1834. Linnaea IX. p. 221: g. Psychotriacear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 168 (118).
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2804: g. Psychotriear. Sect. ut A. Rich. et Faraminia.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 28. t. 234.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.

Farameoides DC. 1830. Prodr. IV. p. 498: sect. Farameae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 579. — Endl. 1838. Gen. n. 3154 *c.* p. 534; 1841. Ench. p. 272. — Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2804. 3 (*Faraminia*).

Faraminia Rchb. vid. *praeced.*

Farcinhetia „Rchb. & Zoll. Linnaea XXVIII. p. 598" Baill. 1858. Euphorb. p. 652: inter Euphorbiaceas incertae sedis.

Farfara*) DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 157: sect. Tussilaginis. (T. Farfara L.) — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 351. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1469.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: g. Tussilaginear.
= Tussilaginis Tourn. pars.

Farinaria Sowerby . . . . t. 360. f. 1. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 16. p. 181.
= Oidium Link.

Farnesia Gaspar. 1839. Descriz. nuov. gen.: nov. g. Leguminosar. (Acacia Farnesiana L.) *Cf.* Linnaea 1839. Litt. p. 134 et Ann. nat. hist. 1840. V. p. 43.
Vachellia Wight & Arn.

Farobaea Schrank . . . . in Colla Hort. Ripul. App. IV. p. 19.
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3365. 4: sect. Senecionis.
Senecionis Less. pars.

Farquharia Hilsenb. & Boj. mss.
= Crataeva Linn.

Farsetia**) Turra 1765. Farsetia novum genus. (c. ic.) *Cf.* R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. App. p. 216. (Verm. bot. Schr. IV. p. 18.)
Scop. 1777. Intr. p. 319. n. 1459: g. Siliculosar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 717; 1825. Syst. II. p. 870. n. 2295; 1831. Gen. II. p. 517. n. 2539. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 629. 636.
Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 173: g. Cruciferar.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 232; 1821. Syst. II. p. 286; 1824. Pr. I. p. 157: g. Alyssinear. Sect.: Farsetia (1824 Farsetiana), Cyclocarpaea, Fibigia. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 54. — Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4770. (ampliat.) Sect. ut DC. et Berteroa. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 174. Sect. ut DC. — Endl. 1839. Gen. n. 4865. p. 867; 1841. Ench. p. 448.

*) „Tussilago Hetruscis vulgo dicitur *farfara* et *farfarella*." (Matth. Conf. Bockmann Lex. bot. p. 89.)
**) Dicat. Ph. Farseti, botanico veneto.

Farsetia Turra cont.
Sect. eaed. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 134. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 113. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 559. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 195.
Link 1822. En. II. p. 157: g. Tetradynam. Siliculos.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Lunariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 181. n. 6963.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259: g. Alyssear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 269: g. Latiseptar.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 90: g. Allyssinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Alyssidar.

Farsetia Pers. 1807. Ench. II. p. 202: sect. Cheiranthi.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 232; 1821. Syst. II. p. 286: sect. Farsetiae.
Link 1831. Hdb. II. p. 293: g. Alyssinear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11).
Farsetiana DC.

Farsetia R. Brown 1812 in Ait. hort. kew. ed. sec. IV. p. 96 (Verm. bot. Schr. V. p. 34): g. Cruciferar.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 345: g. Siliculosar.
Koch 1836. Syn. p. 60. Ed. II. p. 65: g. Alyssinear.
= Farsetia, Aubrietia et Berteroa DC.

Farsetiana DC. 1824. Prodr. I. p. 157: sect. Farsetiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4770 *d*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 174. — Endl. 1839. Gen. n. 4865 *a*. p. 867; 1841. Ench. p. 448. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 752.
Synon. Farsetia Pers.

Fartinia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 72: stirps Fluidaciae. Ordo: Fartinia. Fam.: Laminidiae, Chordaceae, Ulvaceae.

Fartis Adans. 1763. Fam. II. p. 37: g. Oryzar.
= Zizania Linn.

Fascia Gray Arr. brit. pl. I. p. 319: vid. *seq.*

Fasciata Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 383 (*Fascia* p. 319): nov. g. Fucoidear. (Ulva plantaginea Roth et Fucus fascia Fl. dan.)
= Phyllolapathi et Phyllitidis sp. Kütz.

Fasciculites Cotta 1832. Dendrol. p. 48: nov. g. pl. foss. *Cf.* Flora Lit. II. p. 138.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 185; 1846. Chlor. prot. p. LXXI: g. Palmar.
Synon. Endogenites Spreng.; Perfossus Cotta.

Fasciola Dumort. 1822. Comm. bot. p. 114: nov. g. Jungermanniacear. Lemniscear. (Jung. furcata, pubescens.)
= Metzgeria Raddi.

Fastigiaria Stackh. 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 59. 90; 1816. Nereis brit. ed. alt.: nov. g. Fucorum. (F. fastigiatus L.) *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 16. p. 205 et Spreng. 1820. Neue Entd. I. p. 94.
Furcellaria Lamx.

Faterna Noronh. mss.
= Vahea Lam.

Fatioa*) DC. 1828. Mém. sur le genre Fatioa; 1828. Prodr. III. p. 88; 1829. Mém soc. helv. I. p. 97: nov. g. Salicariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4561. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 717. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 419. — Meisn. 1838. Gen. p. 118 (84).
Endl. 1840. Gen. n. 6166. p. 1204; 1841. Ench. p. 643: g. Lagerströmiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6669. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 561.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lagerstromear.

Fatoua Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 509: nov. g. Morear. (Urtica japonica Thunb.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2526. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 37. — Meisn. 1842. Gen. p. 350 (261). — Endl. 1847. Spl. IV. p. 34. n. 1856/1 (sph. *Fatuoa*). — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 562.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 268: g. Moracear.?

Fatraea**) Petit-Thouars . . . . Obs. pl. Afr. p. 19.
Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 223 (*Fatrea*); 1820. Dict. v. 16. p. 206: g. Myrobalanear.
= Myrobalanus Gärtn.

Fatrea Juss. vid. *praeced.*

Fatsia Decaisne & Planch. 1854. Revue hortic. 4e sér. III. p. . . : nov. g. Araliacear.

Fatuoa Endl. vid. *Fatoua Gaudich.*

Fauchea Montagne 1846. Fl. Alg. p. 64: nov. g. Phycear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 787. n. 524: g. Sphaerococcear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Rhizophyllinear.
Rupr. 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 38: g. Rhodophycear.
Synon. Cypellon Zanard.

Fauciflorae Rchb. 1837. Handb. p. 177; 1841. Nomencl. p. 104: ordo Synpetalar. Formationes: Tubiferae, Limbatae.

Fauciflorae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 39: class. Calyciflorar. Fam.: Cucurbitaceae, Ribesiae, Saxifrageae, Crassulaceae, Lythrarieae, Onagrarieae, Halorrhageae.

Faujasia**) Cassini 1819. Bull. soc. philom. Mai p. 80; 1820. Dict. v. 16. p. 247; 1827. v. 48. p. 448. 457; 1830. v. 60. p. 583: nov. g. Senecionear. (Conyza pinifolia Bory.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2503. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32. (verar.)
Less. 1832. Syn. p. 394: g. Cacaliear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 293: g. Erechtitear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2787. p. 455; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (135). — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3546. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 572.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713: g. Neurolaenear.

---

*) Dicat. Nicol. Fatio de Duillers.
**) *Fatre,* nomen barbarum.
***) Dicat. Barth. Faujas de Saint-Fond.

Faurea*) Harvey 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 373: nov. g. Proteacear. (F. saligna.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 590.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 82. n. 2139/$_1$: g. Persooniear. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 344.

Faustula Cassini 1818. Bull. soc. philom. Sept. p. 140; 1820. Dict. v. 16. p. 251; 1822. v. 23. p. 561: nov. g. Gnaphaliear. (Chrysocoma reticulata Labill.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2416. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 223; 1830. v. 60. p. 579: g. Faustulear.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 164: sect. Ozothamni. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2738 *a*. p. 446; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3493. 1.

Faustuleae Cassini 1827. Dict. v. 49. p. 223; 1800. v. 60. p. 579: subdiv. Gnaphaliear. Gen. 1827: Syncarpha, Faustula. Accedunt 1830 Quinetia, Millotia.

Favillea Fries 1849. Kongl. Vet. Ak. Handl.; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 244 (Flora 1850. I): nov. g. Sclerodermeor.

Favolus Palis. 1805. Fl. Owar. p. 12. t. 1: nov. g. Fungor. (F. hirtus.) *Cf.* Schrad. n. Journ. II. 1. 1806. p. 67 et Leman 1820. Dict. v. 16. p. 294. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 11.
= Platyporus Pers.

Favolus Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 342: subg. Polypori.
Fries 1825. Pl. homon. p. 76: g. Agaricinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 345. — Endl. 1836. Gen. n. 452. p. 40; 1841. Ench. p. 21.
Fries 1828. Elench. I. p. 44 (1830. Linnaea V. p. 511. t. 11. f. 1): g. Pileator. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 763. n. 3895.
Klotzsch 1833. Linnaea VIII. p. 316.
Fries 1838. Epicr. p. 298; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 136; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 325; 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 103: g. Polyporeor. — Par Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 477. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 43; 1842. Mycol. p. 181. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 377. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 171. — Bail 1858. Syst. p. 26. t. 30.
Math. 1853. Belg. II. p. 342: sect. Polypori.

Favonium Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 431. t. 174: nov. g. Radiatar. (Polymnia speciosa L.)
Cram. 1803. Disp. p. 173: g. Syngenes. Polygam. Frustran.
Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 295; 1821. v. 19. p. 234; 1823. v. 29. p. 448: g. Gorteriear. (1823 restrict.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2681.
Bartl. 1830. Ord. p. 148: g. Arctotidear.
= Choristea Thunb.

Favrodina Reyn. . . . . Mém. de Lausanne II. p. 261 (*Favrodine*) ex Reuss Rep. comm. II. p. 127. Quid?

Favularia Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XIII: nov. g. Filicum foss. (Clathraria? Brongn., Palmacites Schloth., Cactites Mart.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 338.
= Sigillaria Brongn.

Faxus Rich. in Ann. Mus. XVI. p. 297: vid. *Taxus Tourn.*

Faya Necker 1790. Elem. bot. II. p. 102. n. 770: g. Sarcodiphytor.
= Crenea Aubl.

Faya Webb . . . . Phytogr. Canar. III. p. 272. t. 216: nov. g. Myricear. (Myrica Faya Ait.)

Feaea*) Spreng. 1826. Syst. III. p. 362. 581. n. 2805; 1831. Gen. II. p. 633. n. 3155: nov. g. Radiatar. (Selloa plantaginea Kunth.)
= Selloa HBK.

Fedia Adans. 1763. Fam. II. p. 152: g. Scabiosar.
Scop. 1777. Intr. p. 137: g: Polypremor.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 426: g. Dipsacear.
= Patrinia Juss.

Fedia Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 36. t. 86. (F. Cornucopiae, olitoria et sibirica.)
Vent. 1799. Tabl. II. p. 561: g. Dipsacear.
Vahl 1806. Enum. II. p. 18. n. 75: g. Triandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 23. 352. — Willd. 1809. En. p. 51.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 339. 360. n. 120: g. Valerianear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 590; 1825. Syst. I. p. 143. n. 140; 1830. Gen. I. p. 35. n. 151. — Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1947. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 168.
Woods 1836. Linn. Trans. XVII. 3. p. 421.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 50: g. Valerianacear. Sect.: Siphonella, Valerianella.
= Valerianella Tourn., Fedia Mönch et Patrinia Juss.

Fedia Mönch 1794. Meth. p. 486: g. Petalostemonis, ad typum Valerianae cornucopiae L. restrictum.
Cram. 1803. Disp. p. 9: g. Diandr. Monogyn.
Pers. 1805. Ench. I. p. 38: sect. Valerianae.
DC. 1805. Franç. IV. p. 239; 1830. Pr. IV. p. 630: g. Valerianear. — Par Juss. 1807. Ann. Mus. X. p. 311. — Dufr. 1811. Valer. p. 54. — Lois. 1820. Dict. v. 16. p. 312. — Link 1829. Hdb. I. p. 671. — Bartl. 1830. Ord. p. 132. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 671. — Endl. 1838. Gen. n. 2183. p. 351; 1841. Ench. p. 227. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (121). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 304. — Brongn. 1843. En. genr. p. 47. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 170.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 88: g. Fediaceae.
Link 1821. En. I. p. 35: g. Aggregatar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Fediear.

---

*) Dicat. W. C. Faure.

*) Dicat. A. L. A. Fée, botanico Argentorat

Fedia Mönch cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 178; 1841. Nom. p. 73. n. 2703: g. Valerianellear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 698: g. Valerianacear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 583.
Synon. Mitrophora Neck.

Fedia Gärtn., Meyer & Scherb. 1799. Fl. Wett. I. p. 38. 52: g. Triandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1805. Bad. I. p. 72. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 94. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 20. — Elliott 1821. Sketch I. p. 42. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 396. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 46. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 48. 58. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 63. 82.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 19: g. Aggregatar.
Kunth 1838. Berol. I. p. 312: g. Valerianear.
= Valerianella Tourn.

Fedia Kunth 1818 in HBK. Nov. gen. III. p. 334; 1824. Syn. III. p. 8: g. Valerianear. (F. chaerophylloides.)
= Astrephia Dufr.

Fediacea Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 88: subfam. Gitonanthiae. Gen.: Fedia, Mitrophora, Odontocarpa, Gytonanthus, Axiana, Muffetta.

Fedieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: trib. Valerianacear. Gen.: Valerianella, Fedia, Nardostachys, Patrinia, Astrephia.

Feea Bory 1824. Dict. class. VI. p. 446: nov. g. Filicum, a Trichomane sejunctum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 231.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262: g. Hymenophyllear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Rchb. 1828. Consp. p. 37. n. 675 *a:* sect. Trichomanis.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Trichomanear. — Par. Presl 1843. Hymenoph. p. 102.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 114: subg. Trichomanis.

Fegatella*) Raddi 1818. Opusc. scient. Bol. II. p. 356; 1820. Mem. soc. Moden. XVIII. p. 17: nov. g. Hepaticar. (Marchantia conica.)
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 528 *c*: sect. Marchantiae.
Corda 1829 in Opiz Beitr. I. p. 649; 1830 in Sturm Jungerm. p. 5: g. Marchantiacear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 76. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 465. p. 1337; 1841. Ench. p. 27.
Tayl. 1836. Linn. Trans. XVII. 3. p. 382: g. Marchantiear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 93. — Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 845. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 9. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 583.
Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 414; 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXX. 179;

Fegatella Raddi cont.
1846. Syn. Hepat. p. 546: g. Jecorariarum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 58: g. Marchantear.
Conocephalus Hill.

Fegonium Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 101. n. 2 (*Phegonium*): g. lignor. foss. (Juliferar.)
Ung. 1845. Chlor. prot. p. 103. t. 27 (1846. p. LXXIX); 1845. Syn. pl. foss. p. 219: g. foss. Cupuliferar. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 30. n. 1848/5.

Feijoa*) Berg 1858. Linnaea XXIX. p. 258; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 2. p. 615: g. Feijoidear.
Synon. Orthostemon Berg (nec R. Brown.)

Feijoideae Berg 1858. Linnaea XXIX. p. 258; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 2. p. 615: subtrib. Myrtear. (antea *Orthostemonoideae.*) Gen.: Feijoa.

Felicia Cassini 1818. Bull. soc. philom. Nov. p. 165; 1820. Dict. v. 16. p. 314; 1822. v. 25. p. 97: nov. g. Asterear. (Aster tenellus L.) — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 45.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 464; 1830. v. 60. p. 582: g. Bellidear. (spuriar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 263.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1483: sect. Asteris.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2560: g. Amelloidear.
Nees 1833. Aster. p. 207: g. Asterum tenellor.
Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 3290. 1: sect. Feliciae.
= Hebecarpaea DC.

Felicia Lessing 1832. Syn. Compos. p. 181: subg. Asteris.
= Munychia Cass.

Felicia DC. 1836. Prodr. V. p. 218: g. emendat. Euasterear. Sect.: Hebecarpaea, Anhebecarpaea. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2297. p. 372; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (125).
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3290: g. Asterear. (genuinar.) Sect.: Felicia, Anhebecarpaea. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 584.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951: g. Erigerear.
Synon. Felicia et Polyarrhena Cass.; Polylepis Less.; Cullumia Sieb.

Feliciana Wittst. vid. *seq.*

Felicianea**) Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 375. t. 157: nov. g. Myrtear. (F. rubriflora.) — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 184.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 363 (*Feliciana*): g. Lythrariar.
= Myrrhinium Schott.

Femsjonia***) Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 341: nov. g. Tremellineor.

*) Nomen barbarum ex italo.

*) Dicat. Joam da Silva Feijo.
**) Dicat. José Feliciano Fernandes Pinhero.
***) Nomen a localitate Femsjö.

Fendlera Engelm. & Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 77. t. 5: nov. g. Saxifragacear., Deutziae aff.

Fendleria Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 419: nov. g. Panicear. (F. rhynchelytroides.)

Fentzlia Rchb., Spach vid. *Fenzlia Benth.*

Fenugraecum Adans. 1763. Fam. II. p. 322: g. Genistar.
= Foenum graecum Tourn.

Fenzlia*) Benth. 1833. Bot. Regist. XIX. n. 1622: nov g. Polemoniacear. (F. dianthiflora.) *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 22 et Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 86. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 244.
Rchb. 1837. Hdb. p. 194 *(Fentzlia)*: g. Giliear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 108 *(Fentzlia)*.
= Giliae sect. Diacanthoides.

Fenzlia Endl. 1834. Atakt. p. 19. t. 17. 18.
Arnott mss. 1837 (*cf.* Meisn. Comm. p. 354): g. Oliniear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6274. p. 1223; 1841. Ench. p. 647. — Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6676. — Walp. 1843. Rep. II. p. 150. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 591.
Meisn. 1843. Comm. p. 354: g. Myrtear.

Ferberia Scopoli 1777. Introd. p. 281. n. 1274: nov. g. Columniferar. (*Althaea Ludw., A. Murr.*)
= Althaeastrum DC.

Ferdinanda**) Lagasca 1816. Nov. gen. et spec. p. 31. t. 2: nov. g. Corymbiferar., inter Anthemidem et Anacyclum. (F. augusta et eminens.)
Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 429: g. Helianthear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 42.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17: g. Rudbeckiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2653. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 580. n. 2802; 1831. Gen. II. p. 630. n. 3137: g. Radiatar.
Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 398. 404; 1830. v. 60. p. 577: g. Heliopsidear. (?) — Par. Less. 1832. Syn. p. 224. — DC. 1836. Pr. V. p. 552. — Endl. 1838. Gen. n. 2509. p. 408; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 200 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3141. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Synon. Podachaenium Benth.; Cosmophyllum Koch; Dicalymna Lemaire. (*Cf.* Koch et Fintelm. 1859. Wochenschr. p. 169.)

Ferdinandea***) Pohl 1827. Flora I. p. 153: nov. g. Rubiacear.
Ferdinandusa Pohl.

Ferdinandusa Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 8. t. 106—108: g. Bignoniaccar. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 714. n. 4128 (dubium).

Ferdinandusa Pohl cont.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 227: g. Bignoniear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 131. (?) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 566.
Meisn. 1840. Gen. p. 299 (207): g. Eubignoniear.
Fenzl 1841 in Endl. Spl. I. n. 3277/1. p. 1393; 1841. Ench. p. 274: g. Eucinchonear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 510. — Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 512.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2914: g. Quinquinear.
Meisn. 1843. Comm. p. 360: g. Cinchonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 77. Injunguntur Aspidanthera Benth. et Gomphosia Wedd. *Cf.* Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 131.
Synon. Ferdinandea Pohl.

Fereira Rchb. vid. *seq.*

Fereiria*) Vandell. 1788. Dicc.; 1796 in Röm. Script. p. 98. t. 6. f. 8: nov. g. Hexandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 431.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3510 *(Fereira)*: g. Loganiear.?
Schult. 1829. Syst. VII. p. XIV. 83: g. Asclepiadeis vel Fagraeae aff. „ergo non conjungendum cum Hillia, ut in Willd. aliisque."
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 364 (corr. *Ferreiria*): g. Rubiacear.
= Hillia Jacq.

Feretia**) Raff.-Delile 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 92. t. 1. f. 4: nov. g. Rubiacear. (F. apodanthera.)
Hochst. 1844. Flora I. p. 98: g. Coffeacear. (Pavetta elliptica Hochst.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Walp. 1847. Rep. II. p. 43: g. Coffeear.

Fernandesia Pers. 1807. Ench. II. p. 517. n. 1996: g. Orchidear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 451. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 744. n. 3041.
seq.

Fernandezia***) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 123. t. 27; 1798. Syst. p. 239: nov. g. Gynandr. Diandr.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 207; 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1806: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1532; 1841. Nom. p. 54. n. 2066. — Endl. 1837. Gen. n. 1461. p. 203; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 376 (282). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Brassidar.
(Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 767: genus varia complectens rejicit. *Vid. Lockhartia Hook.*)
Synon. Fernandesia Pers.; Lockhartia Hook.

*) Dicat E. Fenzl, botanico Vindob.
**) Dicat. Ferdinando VII., Hispaniae regi.
***) Dicat. Archiduci Ferdinando.

*) Dicat. Ferreira, directori horti Lisbonensis.
**) Dicat. peregrinatori Feret.
***) Dicat. G. Garc. Fernandez, botanico hispano.

Fernandezia Barnéoud 1845. Mon. Plantag. p. . . .: sect. Plantaginis.

Fernelia*) „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 199; 1820. Mém. Mus. VI. p. 393: nov. g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 435. — Hedw. 1806. Gen. p. 61. 372. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 11. 187. n. 465. — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 452. — Link 1821. En. I. p. 139.
Gmel. 1791. Syst. p. 244: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Schult. 1827. Mant. III. p. 9.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 607. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2092.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 61. t. 191.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Gardeniacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 210: g. Hedyotidear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 257: g. Gardeniar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 398: g. Gardeniear. Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 509. — Meisn. 1838. Gen. p. 163 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2947. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 50. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 603.
Endl. 1838. Gen. n. 3290. p. 559; 1841. Ench. p. 274: g. Eugardeniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 218: g. Randiear.

Ferolia „Barr. Franc. équin. p. 51" Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 7. t. 372: nov. g. flore incognito. (F. guianensis.) *Cf.* Steud. Nom. I. p. 627 et Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 603.
Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 453: g. Rosacear.?
= Petrocarya Schreb. (= Parinarium Juss.)? ex Spreng.

Feronia**) Correa 1800 (?) Linn. Trans. V. p. 222; 1805. Ann. Mus. VI. p. 384: nov. g. Aurantior. (Crataeva Balangas L.) — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 790; 1825. Syst. II. p. 313. n. 1565; 1830. Gen. I. p. 344. n. 1742. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1372. 1408.
Roxb. 1798. Corom. II. p. 21. t. 141; 1832. Ind. II. p. 411: g. Decandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 466. n. 1051.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 973. n. 1882: g. Polygam. Monoec.
Hedw. 1806. Gen. p. 310. n. 1228: g. Hesperidear.
Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 454: g. Aurantiacear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 538. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 3. p. 139. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVIII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 393. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 587. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 254. — Wight & Arn. 1834. Prodr.

*) Dicat. J. Franç. Fernel, archiatro Henrici II.
**) Nomen mythologicum.

Feronia Correa cont.
I. p. 96. — Brongn. 1843. En. genr. p. 85. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 458.
Rchb. 1828. Consp. p. 212. n. 5531: g. Aurantiear.
Meisn. 1837. Gen. p. 46 (34): g. Clausenear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 314: g. Atalantiear.
Endl. 1840. Gen. n. 5512. p. 1046; 1841. Ench. p. 548: g. Citrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 213. n. 8110. — Walp. 1842. Rep. I. p. 382 (sph. *Teconia*). — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 34. 50. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 603.

Ferrandia Gaudich. ex Steud. Nomencl. I. p. 391. 627.
= Cocculus Ferrandianus.

Ferraria*) Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1353; 1764. Gen. ed. VI. p. 465. n. 1018; 1767. Syst. ed. XII. p. 597: g. Gynandr. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 682; 1784. Syst. p. 820. — Reich. 1778. Gen. p. 459. n. 1104. — Pers. 1797. Syst. p. 864.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170. — Batsch 1802. Tab. p. 143. — Gawl. 1805 in Konig Ann. of bot. I. p. 241.
Gled. 1764. Syst. p. 10. n. 32: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 87: g. Liliacear.
Medic. 1787. Malv. p. 79: g. Monadelph. Triandr. — Par. Cavan. 1788. Diss. VI. p. 342. t. 189. *Cf.* Römer & Usteri 1790. Mag. Bot. XI. p. 153. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 451. n. 1102. — Willd. 1800. Sp. III. p. 580. n. 1252; 1809. En. p. 691. — Cram. 1803. Disp. p. 148.
Juss. 1789. Gen. p. 57: g. Iridum.
Neck. 1790. El. III. p. 169. n. 1522: g. Ymnodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 119: g. Triandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 50. n. 106.
Vent. 1799. Tabl. I. p. 191: g. Iridear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 144. — Hedw. 1806. Gen. p. 27. 355. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 345. 495. n. 145. — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 455. — Link 1822. En. II. p. 178. — Agdh. 1823. Aphor. p. 172. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 169. n. 176; 1831. Gen. II. p. 527. n. 2590. — Eckl. 1827. Verz. p. 18. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Endl. 1837. Gen. n. 1230. p. 166; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 151. — Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1569. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 22.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 250: g. Spathacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1182: g. Ferrariear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 4.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.

*) Dicat. Giov. Batt. Ferrari, Sienensi.

Ferrarieae Rchb. 1828. Consp. p. 59 (1830. Fl. exc. p. 80); 1837. Handb. p. 150: div. Iridear. Gen.: Cipura, Sisyrinchium, Bobartia, Libertia, Tigridia, Cypella, Ferraria, Witsenia, Patersonia, Moraea, Vieusseuxia, Iris.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57: trib. Iridear. Gen.: Ferraria, Tigrida, Vieusseuxia, Patersonia, Sisyrinchium, Galaxia. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 3. Gen.: Ferraria, Tigridia, Rigidella, Hydrotaenia, Cypella, Alophia, Patersonia, Galaxia, Vieusseuxia, Sisyrinchium, Homeria.

Ferreira Allem. 1846 ex Hook. Lond. journ. bot. V. p. 267: nov. g. Sophorear., Bowdichiae aff.

Ferreiria Wittst. vid. *Fereiria Vand.*

Ferreola König 1795 in Roxb. Pl. Corom. I. p. 35. t. 45: nov. g. Dioec. Hexandr. (Ehretia ferrea Willd.) — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 798. n. 1804. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 790 (*Ferriola*).
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 348: g. Ebenacear.
Correa 1806. Ann. Mus. VIII. p. 399. t. 6. f. 2 (buxifolia): g. Diospyro et Royenae aff.
= Maba Forsk.

Ferriola Roxb. vid. *praeced.*

Ferrula Roxb. vid. *Ferula Tourn.*

Ferrum equinum Tourn. 1700. Inst. p. 400. t. 225: g. pl. class. X.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 256. Ed. Hall. 1745. p. 266: g. pl. class. XI.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 573: g. Leguminosar.
Medic. (Vorles. II. p. 370) 1789. Vorles. IV. 1. p. 351; 1789. Phil. Bot. I. p. 209.
Mönch 1794. Meth. p. 119: g. Thalamostemonis.
= Hippocrepis Linn.

Ferula*) „Moris., Herm." Tourn. 1700. Inst. p. 321. t. 170: g. pl. class. VII.
Linn. 1737. Gen. p. 75. n. 215; 1737. Cliff. p. 95; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 61; 1753. Sp. I. p. 246; 1759. Syst. ed. X. p. 957. n. 305; 1762. Sp. ed. II. p. 355; 1764. Gen. ed. VI. p. 136. n. 343; 1767. Syst. ed. XII. p. 209. n. 340: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 231; 1784. Syst. p. 281. — Reich. 1778. Gen. p. 139. n. 373. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 186. n. 475. — Gmel. 1791. Syst. p. 478. — Pers. 1797. Syst. p. 297. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1411. n. 539; 1809. En. p. 309. — MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 218. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 90 (*Ferrula*).
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 55. n. 220: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 96. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 311. n. 692. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 182.

*) Nomen ex Plinio.

Ferula Tourn. cont.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Umbelliferar. — Par. Crantz 1767. Cl. Umbell. p. 70. — Scop. 1772. Carn. I. p. 204; 1777. Intr. p. 113. — Juss. 1789. Gen. p. 222. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 24. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 473. — DC. 1805. Franç. IV. p. 343; 1815. V. p. 514. — Hedw. 1806. Gen. p. 198. n. 815. — Lois. 1820. Dict. v. 16. p. 460. — Link 1821. En. I. p. 271. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 91. (Divis. I.) — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 12. — Kunth 1824. Syn. III. p. 95.
Adans. 1763. Fam. II. p. 100: g. Pastinacar.
Neck. 1790. El. I. p. 170. n. 282: g. Scadiophytor.
Spreng. 1813. Prodr. Umbell. p. 13.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 642; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLVIII. 588; 1825. Syst. I. p. 913. n. 1085; 1830. Gen. I. p. 227. n. 1186: g. Selinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: g. Peucedanear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 171. Sect.: Ferulago, Ferularia. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 460; 1841. Nom. p. 141. n. 5450. Sect.: Ferulago, Ferula. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 325. Sect. ut DC. — Tausch 1834. Flora I. p. 346. — Meisn. 1838. Gen. p. 146 (106). — Endl. 1839. Gen. n. 4459. p. 779; 1841. Ench. p. 379. Sect. ut DC. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 963. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 299. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 691. Sect. ut DC.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
= Ferula et Ferulago Koch.

Ferula Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 96: g. Selinear. restrict. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 361.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3678; 1837. Hdb. p. 220: g. Peucedanear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 161. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 112. — Parlat. . . . . in Webb Canar. II. p. 160. — Endl. 1850. Spl. V. p. 8. n. 4459. Sect.: Ferularia, Palimbia. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 73.
Bartl. 1830. Ord. p. 235: g. Umbelliferar.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 460; 1841. Nom. p. 141. n. 5450. 2: sect. Ferulae.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 373: g. Diclidospermar.
Synon. Ferularia DC.; Lomatium Rafin.?; Cogswellia Schult; Narthecium Dalech.?

Ferulago*) Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 97: nov. g. Selinear., a Ferula Tourn. disjunctum. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 361.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3679: g. Peucedanear. — Par. Koch 1836. Syn. p. 302. Ed. II. p. 332. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 298. — Walp. 1846. Rep. V. p.

*) Nomen e Caelio Aureliano.

Ferulago Koch cont.
874. — Endl. 1850. Spl. V. p. 8. n. 4458/$_1$. Sect.: Euferulago, Uloptera, Lophosciadium.
Bartl. 1830. Ord. p. 235: g. Umbelliferar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 171: sect. Ferulae. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 460; 1841. Nom. p. 141. n. 5050. 1. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 325. — Endl. 1839. Gen. n. 4459 *a*. p. 779; 1841. Ench. p. 379. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 692.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 510: g. Diclidospermar.

Ferularia DC. 1830. Prodr. IV. p. 172: sect. Ferulae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 325. — Endl. 1839. Gen. n. 4459 *b*. p. 779; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 8. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 691.
= Ferula Koch.

Fessonia Fl. mex. ic. ined. ex DC. Prodr. II. p. 66.
= Picramnia Swartz.

Festivae Batsch 1802. Tab. affin. p. 20: fam. Columnariarum. Gen.: Theobroma, Bubroma, Abroma, Pentapetes, Pterospermum, Dombeya, Assonia, Büttneria.

Festuca*) Dillen. 1719. Nov. gen. p. 90. t. 3: nov. g. Graminis paniculati.
Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 35: g. pl. class. XIV a (non descriptum).
= seq.?

Festuca Linn. 1737. Gen. p. 15. n. 41; 1740. Syst. p. 17; 1753. Sp. I. p. 73; 1759. Syst. ed. X. p. 876. n. 82; 1762. Sp. ed. II. p. 108; 1764. Gen. ed. VI. p. 36. n. 88; 1767. Syst. ed. XII. p. 96: g. Triandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 101; 1784. Syst. p. 118. — Reich. 1778. Gen. p. 38. n. 94. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 50. n. 119. — Gmel. 1791. Syst. p. 185. — Pers. 1797. Syst. p. 121; 1805. Ench. I. p. 92. n. 171. — Willd. 1797. Sp. I. p. 418. n. 139; 1809. En. p. 113. — Hoffm. 1800. Bot. Tasch. III. 1. p. 49; III. 2. t. 8. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 318. — Thunb. 1818. Fl. cap. I. p. 426. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 72. — Trin. 1820. Fund. p. 144. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 635.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 209: g. Graminum. — Par. Gmel. 1747. Sibir. I. p. 113. — Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 74. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Host 1802. Gram. Austr. II. p. 55. t. 77—93; 1805. ibid. III. p. 13. t. 18—21. — Link 1821. En. I. p. 90. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 61. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 69. 272. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 107.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 19. n. 77: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 189.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 403. —

*) Nomen ex Plinio.

Festuca Linn. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 32. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 108. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 85. — DC. 1805. Franç. III. p. 45; 1815. V. p. 263. — Hedw. 1806. Gen. p. 45. 364. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 43. 713. n. 344. — Lois. 1820. Dict. v. 16. p. 467 (*Fetuque*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 352. n. 352; 1830. Gen. I. p. 74. n. 361. — Link 1829. Hdb. I. p. 54. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 308.
Adans. 1763. Fam. II. p. 34: g. Poarum.
Scop. 1772. Carn. I. p. 76: sect. Bromi.
Neck. 1790. El. III. p. 221. n. 1599: g. Achyrophytor.
Panz. 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 293. Revisio critica.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 120. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Endl. 1837. Gen. n. 899. p. 101; 1841. Ench. p. 59. Sect.: Sclerochloa, Catapodium, Vulpia, Festuca. — Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1413. (restrict.) — Meisn. 1843. Gen. p. 424 (324). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 213.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 153: g. Festucacear. (verar.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 163. — Kunth 1822. Syn. I. p. 216; 1830. Gram. p. 128; 1833. Agrost. p. 391; 1838. Berol. II. p. 395. Sect. (1833): Sclerochloa, Brachypodium, Mygalurus, Festucae legitimae. — Agdh. 1823. Aphor. p. 150. — Link 1827. Hort. I. p. 137. — Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1001; 1830. Fl. exc. p. 37. — Koch 1837. Syn. p. 809. Ed. II. p. 955. Sect.: Nardurus, Sclerochloa, Vulpia, Festuca, Schenodorus. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 42. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 139. 372. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 9. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 198 (sect.: Festuca, Schoenodorus); 1850 in Webb Canar. III. p. 416. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 409. Sect.: Vulpia, Pseudopoa, Hydrochloa, Ovina, Eu-Festuca. — Steud. 1854. Glum. I. p. 301. Sect.: Nardurus, Sclerochloa, Vulpia, Festuca, Brachypodium. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 569. (restrict.)
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 472: g. Festucear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 431. Sect.: Vulpia, Eufestuca, Phaeochloa, Hydrochloa. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 75. — Math. 1853. Belg. I. p. 619.
Rupr. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 236: g. Poacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116.: g. Bromidar.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 349: g. Eubromear. Sect.: Vulpia, Eufestuca.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 396: g. Festucinear.

Synon. Chloamnia Raf.?; Dasiola Raf.? *Conf.* Vulpia Gmel., Mygalurus Link, Schedonorus Palis., etc.

Festuca Palis. 1812. Agrost. p. 99: g. Graminear. valde restrictum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Bromear.
Koch 1837. Syn. p. 811. Ed. II. p. 937: sect. Festucae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 899 *d.* p. 101; 1841. Ench. p. 59. — Steud. 1854. Glum. I. p. 305.
Synon. Drymonaetes Ehrh.; Schedonorus Palis.; Schoenodorus Auct.
= Eufestuca Griseb.

Festucaceae HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 143 (Kunth 1822. Syn. I. p. 208): sect. Graminear. Subsect.: Avenaceae, Arundinaceae, *verae* (gen.: Bromus, Festuca, Triodia, Poa, Melica).
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 456: fam. 8 Graminear. Sect.: Avenaceae, Arundinaceae, Festuceae.

Festucaceae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 163: ordo 4 Graminum. Gen.: Festuca, Triodia, Schedonorus, Köleria, Glyceria, Ceratochloa, Electra, Bromus, Poa, Sessleria, Chrysurus, Uniola, Briza, Coelachne, Chascolytrum, Calotheca, Melica.
Agdh. 1823. Aphor. p. 150: trib. Graminear. Gen.: Festuca, Dactylis, Triodia, Tricuspis, Triplasia, Köleria, Bromus, Poa, Sesleria, Chrysurus, Uniola, Briza, Coelachne, Melica. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 110; 1833. Agrost. p. 321. Gen.: Sesleria, Poa, Centotheca, Glyceria, Pleuropogon, Reboulea, Catabrosa, Coelachne, Briza, Chascolytrum, Calotheca, Melica, Molinia, Köleria, Schismus, Wangenheimia, Dactylis, Lasiochloa, Cynosurus, Lamarckia, Ectrosia, Lophatherum, Elytrophorus, Festuca, Bromus, Orthoclada, Uniola, Diarrhena, Arundinaria, Streptogyna, Chusquea, Platonia, Merostachys, Nastus, Bambusa, Guadua, Beesha, Schizostachyum. — Endl. 1837. Gen. p. 98; 1841. Ench. p. 59. Subtrib.: Bromeae, Bambuseae. — Koch 1837. Syn. p. 799. Ed. II. p. 924. Gen.: Briza, Eragrostis, Poa, Glyceria, Molinia, Dactylis, Cynosurus, Festuca, Brachypodium, Bromus. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 446. Gen. fere ead. ac Kunth. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 39. Gen. europ.: Koeleria, Schismus, Melica, Molinia, Catabrosa, Sesleria, Oreochloa, Poa, Eragrostis, Glyceria, Sclerochloa, Briza, Cynosurus, Dactylis, Festuca, Bromus. — Meisn. 1843. Gen. p. 424 (324). Subtrib. ut Endl. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 130. Gen.: Köleria, Lamarkia, Cynosurus, Poa, Glyceria, Catabrosa, Eragrostis, Briza, Serrafalcus, Bromus, Vulpia, Festuca, Dactylis, Ampelodesmos, Schlerochloa, Brachypodium, etc. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161. 204. Sect. ut Endl. — Steud. 1854. Glum. I. p. 249. Gen.: Poa, Dissanthelium, Eragrostis, Leucopoa, Phalaridium, Uniola, Brizopyrum, Briza, Coelachne, Glyceria, Porroteranthe, Disakisperma, Reboulea, Lophochlaena, Chondrachyrum, Poidium, Melica, Anthochloa, Pleuropogon, Molinia, Koeleria, Schismus, Sesleria, Wangenheimia, Dactylis, Dinebra, Tetrachne, Urochlaena, Cynosurus, Lamarckia, Harpachne, Ectrosia, Lophatherum, Elythrophorus, Tripogon, Festuca, Diarrhena, Nephelochloa, Hemibromus, Bromus, Triniusa, Rögneria, Zenkeria, Amphibromus.
Link 1827. Hort. I. p. 137: fam. Graminear. Gen.: Festuca, Vulpia, Sclerochloa, Arthrostachya, Dactylis, Diplachne, Ceratochloa, Libertia, Calotheca, Uniola, Diarrhena, Chasmanthium, Brizopyrum.
Rchb. 1828. Consp. p. 53 (1830. Fl. exc. p. 35): div. Graminear. Gen.: Echinaria, Rostraria, Trichaeta, Psilathera, Sesleria, Chrysurus, Sclerochloa, Dactylis; Vulpia, Festuca, Diplachne, Ceratochloa, Michelaria, Triplasis, Centotheca, Calotheca, Uniola, Corycarpus, Chasmanthium, Orthoclada?
Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. . . .: subtrib. Bromear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 9: trib. Graminum. Gen. ex Endl.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 75: div. Euryanthar. Subdivis.: Festuceae, Poëae.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 408: div. Loxanthar. Gen.: Scleropoa, Festuca, Rögneria, Molinia, Briza.

Festucaceae Rchb. 1837. Handb. p. 146: div. Graminear. Subdivis.: Triticeae, Festuceae, Bambuseae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 38; 1844. Fl. sax. p. 24. Subdivis.: Triticeae, Poaceae, Festuceae.

Festucaria Fabric. ex Steud. Nomencl. I. p. 633. 690. (F. Heisteri.)
= Glyceria fluitans.

Festucaria Link 1843. Linnaea XVII. p. 398: nov. g. Triticear. (Festuca tenuicula Kunth et tenuiflora Koch.)

Festucaria (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 586: sect. Bromi. (B. asper, erectus et inermis.)
= Bromi festucacei Koch.

Festuceae Nees 1829. Agrost. Bras. p. 466: sect. Festucacear. Gen.: Cynosurus, Bromus, Festuca, Tridens, Calotheca, Briza, Melica, Uniola, Poa, Eragrostis.
Nees 1836 in Lindl. Syst. ed. II. p. 382; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 137. 161; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 104: trib. Graminear. Subtrib.: Poëae, Bromeae. — Par. Math. 1853. Belg. I. p. 610. Gen.: Phragmites, Poa, Catabrosa, Glyceria, Enodium, Briza, Cynosurus, Dactylis, Festuca, Bromus, Michelaria.
Rchb. 1837. Hdb. p. 146; 1841. Nom. p. 39: subdiv. Festucacear. Sect.: Seslerieae, Cynosureae, Bromeae. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 75. Gen.: Cynosurus, Dactylis, Festuca, Schedonorus, Bromus.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 430: subtrib. Poacear. Gen.: Catapodium, Scleropoa, Festuca, Molinia, Arundo, Glyceria, Catabrosa, Poa, Eragrostis, Briza, Sesleria, Sclerochloa, Echinaria, Lamarckia, Cynosurus, Dactylis, Köleria, Melica, Bromus, Triodia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: trib. Graminacear. Subtrib.: Bromidae, Bambusidae.

Festucineae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. III. p. 358: subtrib. Poacear. Gen.: Eragrostis, Poa, Festuca, Briza, Bromus, Centotheca, Coelachne, Elytrophorus, Lophatherum.

Feuillaea Gleditsch 1764. Syst. p. 263. n. 1090; g. Calycostemonum.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 594: g. Cucurbitacear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 45. n. 2362; 1831. Gen. II. p. 534. n. 2620; g. Passiflorear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315; g. Nhandirobear.
= Fevillea Linn.

Feuillea Gleditsch 1749. Mém. Ac. Berl. V. p. 132: g. Calycostemonis.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1292. n. 991; g. Dioec. Pentandr. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 519. n. 1223. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 690. n. 1525. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 377. — Pers. 1797. Syst. p. 929; 1807. Ench. II. p. 618. n. 2232. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 770. n. 1797.
Gmel. 1791. Syst. p. 500; g. Pentandr. Trigyn.
Batsch 1802. Tab. p. 221; g. Cucurbitacear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 500. — Bartl. 1830. Ord. p. 275.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 3; g. Nhandirobear. — Par. Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 272. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 113. 114. Sect.: Feuillea, Javilla.
Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3972; g. Zaroniear.
= Fevillea Linn.

Fevillaea Necker vid. *seq.*

Fevillea*) Linn. 1737. Gen. p. 362. n. 905: nov. g. ex *Nhandiroba Plum.* constitutum.
Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 469. n. 890; 1753. Sp. II. p. 1013: g. Monoec. Syngenes.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Cucurbitacear. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 397 (dubium). — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 298. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 123. — Kunth 1822. Syn. I. p. 429.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 374: g. Dioec.
Linn. 1764. Syst. ed. VI. p. 523. n. 1118; 1767. Syst. ed. XII. p. 654: g. Dioec. Pentandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 742; 1784. Syst. p. 886.
Neck. 1790. El. I. p. 244. n. 396 *(Fevillaea)*: g. Sygolliphytor.
A. St. Hil. 1822. Mém. Mus. IX. p. 218: g. Nandhirobear.
Seringe 1825. Mém. Genèv. III. 1. p. 25: g. Cucurbitaceis aff.
Seringe 1828 in DC. Pr. III. p. 297: g. Nhandirobear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2711. — Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 188. — Endl. 1839. Gen. n. 5121. p. 934; 1841. Ench. p. 489.

Fevillea Linn. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: g. Zanoniacear.
Synon. Ghandiroba Marcgr.; Nhandiroba Plum.; Feuillea et Feuillaea Gled.; Fewillea Linn.

Fewillea Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1457: g. Dioec. Pentandr. — Par. Aubl. 1775. Guian. II. p. 897.
Scop. 1777. Intr. p. 151: g. Cucurbitacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 439.
= Fevillea Linn.

Fibichia Köler 1802. Gram. p. 308 (ex Palis. et Trin. An *Fibigia* ex Endl.?)
= Cynodon Rich.

Fibigia*) Medic. 1792. Pflanzengatt. I. p. 90; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 47: nov. g. Cruciflorar. *(Kreuzblüthen*: Alyssum clypeatum L.*)*
Mönch 1794. Meth. p. 261: g. Thalamostemonis.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 232; 1821. Syst. II. p. 288; 1824. Pr. I. p. 157: sect. Farsetiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4770 *b*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 174. — Endl. 1839. Gen. n. 4865 *c*. p. 867; 1841. Ench. p. 448. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 752. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 270.
Synon. Alysson Adans.

Fibraurea**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 626. Ed. Willd. p. 769: nov. g. Dioec. Hexandr. (F. tinctoria = Abuta rufescens et amara Aubl.) *Cf.* Juss. 1820. Dict. v. 16. p. 503.
Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1876 (sphalm. *Fieraurea)*: g. Menispermear.
Miers 1851. Ann. and. Mag. 2d. ser. VII. p. 35: g. Heteroclinear.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 203: g. Pachygonear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 133.
= Cocculi Linn. pars?

Fibrillaria Roussel 1806. Fl. du Calvad.
= Himantia Pers. *(*Desv. Journ. bot. III. p. 143.*)*

Fibrillaria Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 52: nov. g. Byssor. fibrilliformium. *(*Clavaria felina DC.) *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 16. p. 504.
Link 1824. Spec. I. p. 140: g. Hyphomycetum.
Rchb. 1828. Consp. p. 15: g. Fungor. spurior.
Endl. 1836. Gen. p. 21; 1841. Ench. p. 15: sect. Mycinematis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 82. 2.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 1; 1842. Mycol. p. 3: g. Byssacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 61: g. Byssaceor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.
Synon. Rhizomorphae sp. Auct.

---

*) Dicat. L. Feuillé, franciscano.

*) Dicat. J. Fibig, botanico.
**) Nomen a fibris lignosis aureis plantae.

Fibrina Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 111: trib. Lachneae.
Endl. 1836. Gen. n. 430 *B e.* p. 37; 1841. Ench p. 21: subsect. Lachni. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 2 *a.* — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 354.

Ficaria Rupp. 1718. Fl. jen. p. 145. Ed. Hall. 1745. p. 159: g. pl. class. VII.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 108. t. 5: g. a Ranunculo et Hepatica distinctum.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 321: g. Gymnopolyspermar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 509: g. Ranunculor.
Roth 1788. Germ. I. p. 241; 1789. II. p. 622: g. Polyandr. Polygyn. — Par. GM. S. 1800. Fl. Wett. II. p. 263. — Rebent. 1804. Neom. p. 238. — Pers. 1807. Ench. II. p. 102. n. 1362.
Juss. 1789. Gen. p. 233: g. Ranunculacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 58. — DC. 1805. Franç. IV. p. 886. — Lois. 1820. Dict. v. 16. p. 513. — Link 1822. En. II. p. 97. — Presl 1826. Sicul. I. p. 20. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 422. n. 558. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 330.
Mönch 1794. Meth. p. 215: g. Thalamostemonis.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 489: g. Ranunculear. — Par. DC. 1818. Syst. I. p. 304; 1824. Pr. I. p. 44. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 715. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 740. — Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4940; 1832. Fl. exc. p. 718. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 253. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 43. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Kunth 1838. Berol. I. p. 22. — Endl. 1839. Gen. n. 4785. p. 847; 1841. Ench. p. 434. — Brongn. 1843. En. genr. p. 97. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 39.
Link 1831. Hdb. II. p. 388: g. Anemonidear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 276; 1841. Nom. p. 190. n. 7218: g. Ficariear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 196: g. Ranunculinear.
Fries 1842. Botan. Notiser: genus adoptat.
Synon. Scotanum Adans.; Ranunculi sp. Linn., etc., Meisn.

Ficarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15: ordo Torosepalar. Fam.: Ficineae.

Ficarieae Rchb. 1837. Handb. p. 276; 1841. Nomencl. p. 190: sect. Ranunculear. genuinar. Gen.: Ficaria, Casalea.

Ficeae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 510: div. Urticear. Gen.: Ficus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16: trib. Ficinear. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 67: subdiv. Dorstenicar. Gen. id.
Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 137: trib. Artocarpear. Gen. id. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 798. Gen. id.
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 46: subordo Artocarpear.
Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 83: subtrib. Artocarpear. propriar. Gen.: Pharmacosycea, Urostigma, Ficus.

Fichtea*) Schultz Bip. 1835. Linnaea X. p. 255: nov. g. Fichtiear. (Hyoseris tenella Pöpp.)
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 87: g. Hyoseridear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 234 (144). — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3682.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7: g. Hieraciear.
= Microseris Don?

Fichtelites Unger 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 101. n. 8; 1845. Syn. pl. foss. p. 268; 1846. Chlor. protog. p. XC: g. lignorum foss. (Leguminosar.?)

Fichtieae Schultz Bip. 1835. Linnaea X. p. 257: div. Krigiear. Gen.: Fichtea.

Ficinea Wittst. vid. *Ficinia Schrad.*

Ficineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 16: fam. unica Ficariear. Trib.: Ficeae, Dorstenicae, Anthiarideae.

Ficinia**) Schrad. 1832. Comment. Gotting. VII. p. 143. t. 2. f. 3: nov. g. Cyperear. (Scirpus truncatus Thunb.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 365 *(Ficinea).*
Endl. 1833. Norf. p. 23: g. Cyperacear.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 292: g. Scrirpear. — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 251. — Meisn. 1843. Gen. p. 411 (314). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144. — Steud. 1855. Glum. II. p. 121.
Endl. 1837. Gen. n. 997. p. 117; 1841. Ench. p. 64: g. Ficiniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1491: g. Fuirenear. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Ficinidar.
Synon. Schoenidium Nees.

Ficinidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 119: trib. Fuirenear. Gen. Ficiniear. Endl. et Oxycaryum, Blepharolepis, Oncostylis.

Ficinieae „Fenzl mss." Endl. 1837. Gen. p. 117; 1841. Ench. p. 64: subtrib. Fuirenear. Gen.: Fuirena, Vauthiera, Ficinia, Fimbristylis.
Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 71: trib. Cyperacear. Gen.: Abildgaardia, Fimbristylis, Trichelostylis, Oncostylis, Isolepis, Androcoma, Oxycaryum, Blepharolepis.

Ficoïdae Briss.-Mirb. 1815. Élém. phys. vég. II. p. 898: fam. Dicotyledonum polypetalar. Typi sectionum: Glinus, Mesembryanthemum.
DC. 1819. Théor. élém. p. 245 *(Ficoïdes)*: ordo Calyciflorar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: fam. Calicunguliae. Gen.: Mesembryanthemum.

Ficoidales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 22: nixus Apocarpar. Ordo: Ficoideae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 523: nixus Exogenar. perigynar. Ord.: Basellaceae, Mesembryaceae, Tetragoniaceae, Scleranthaceae.

Ficoidea Nissole 1711. Mém. Ac. Paris. p. 322. t. 13: nov. g. plantar.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 159. t. 12; 1732. Ht. Eltham. t. 117. f. 143.
Aizoon Linn.

*) Dicat. Dr. J. H. Fichte.
**) Dicat. D. H. Ficino, de flora Dresdensi optime merito.

Ficoideae Juss. 1789. Gen. p. 315: ordo 5 class. XIV. Gen. §. 1: Reaumuria, Nitraria, Sesuvium, Aizoon, Glinus, Orygia. §. 2: Mesembryanthemum, Tetragonia. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 266. Gen. ead.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 143. t. 97. Gen. ut Juss.
DC. 1815. Franç. V. p. 528: fam. Dicotyledonum. Gen.: Mesembryanthemum.
Juss. 1820. Dict. v. 16. p. 528: ordo Peripetalear.
DC. 1828. Pr. III. p. 415: ordo (88) Calyciflorar. Tribus: *genuinae* (gen.: Mesembryanthemum, Tetragonia, Sesuvium, Aizoon, Miltus, Glinus, Orygia), *spuriae* (gen.: Reaumuria, Nitraria). — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 125. Gen. Ficoidear. genuinar. DC.
Bartl. 1830. Ord. p. 308: ordo (177) Succulentar. Gen.: Ficoidear. genuinar. DC. et Trianthema.
Lindl. 1833. Nix. p. 22: ordo unicus Ficoidalium.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 108: fam. (70) Succulentar. Gen. ut Bartl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 240: subdiv. Aizoidear. genuinar. Sect.: Tetragonieae, *genuinae* (gen.: Aizoon), Mesembrianthemeae.
Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93): ordo 90 plant. (p. 440 Corniculatar.) Gen.: Mesembryanthemum, Sphenoclea?, Tetragonia, Kolleria, Sialodes, Acrosanthes, Aizoon, Miltus?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 106: trib. Mesembryanthemear. Gen.: Glinus Mesembryanthemum.

Ficoides Tourn. 1705. Mém. Ac. Paris. p. 238: nov. g. plant.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 151. Ed. Hall. 1745. p. 164: g. pl. class. VII.
= Mesembryanthemum Linn.

Ficoidites Artis 1825. Antedil. Phyt. t. 3: nov. g. pl. foss. *Cf.* Flora 1827. I. p. 135.
= Stigmaria Brongn.

Fictoderma Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 729: nov. g. Physareor. (F. minus.)

Ficus Tourn. 1700. Inst. p. 662. t. 420. Append.
Linn. 1737. Gen. p. 321. n. 776; 1737. Cliff. p. 471; 1740. Syst. p. 32; 1742. Gen. ed. II. p. 502. n. 936; 1748. Ups. p. 305: g. Cryptogamiae sect. 1 (Plantae).
Linn. 1744. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 213.
Gled. 1749. Berl. V. p. 134: g. unicum class. V.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Scabridar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 593. — Batsch 1802. Tab. p. 178.
Linn. 1753. Sp. II. p. 1059; 1759. Syst. ed. X. p. 1315. n. 1032; 1763. Sp. ed. II. p. 1513: g. Polygam. Polyoec. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 282.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Amentaceis aff.
Adans. 1763. Fam. II. p. 377: g. Castanear.

Ficus Tourn. cont.
Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 555. n. 1168; 1767. Syst. ed. XII. p. 681: g. Polygam. Trioec. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 774; 1784. Syst. p. 921. — Aubl. 1775. Guian. II. p. 951. — Reich. 1778. Gen. p. 551. n. 1283. — Lour. 1790. Coch. II. p. 664. Ed. Willd. p. 816. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 746. n. 1613. — Pers. 1797. Syst. p. 962. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 13. t. 123—125. — MBieb. 1808. Taur. cauc. II. p. 452.
Gled. 1764. Syst. p. 24. n. 93: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 346.
Scop. 1777. Intr. p. 339: g. Defloratar.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 32; 1794. Prodr. I. p. 12; 1818. Fl. cap. I. p. 146: g. Triandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 96. — Vahl 1806. Enum. II. p. 181. n. 110.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 328; 1789. Phil. Bot. I. p. 184.
Juss. 1789. Gen. p. 400: g. Urticar.
Neck. 1790. El. II. p. 217. n. 955: g. Sysellophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 66. t. 91.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 525: g. Urticear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 302. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 905. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 45. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 345. 498. n. 148. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 357. — Lois. 1820. Dict. v. 16. p. 533 *(Figuier)*. — Kunth 1822. Syn. I. p. 379. — D. Don 1825. Nepal. p. 61. — A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 44.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 1131. n. 1931; 1809. En. p. 1062: g. Polygam. Dioec. — Par. Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 62. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 310. 333.
DC. 1805. Franç. III. p. 318: g. Artocarpear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 204. — Bartl. 1830. Ord. p. 105. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 178. — Koch 1837. Syn. p. 636. Ed. II. p. 734.
Pers. 1807. Ench. II. p. 608. n. 2193: g. Dioec. Triandr.
Link 1822. En. II. p. 448: g. Caricar.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 9. p. 436: g. Pholeosanthear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 778. n. 3075; 1831. Gen. II. p. 684. n. 3450: g. Urticeis aff. (in Monoec. Androgyn.)
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 510: g. Ficear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16. — Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2523. — Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 137. — Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 106.
Rchb. 1828. Consp. p. 84. n. 1812: g. Dorstenicar. — Par. Webb . . . . Canar. III. p. 257.
Link 1829. Hdb. I. p. 292: g. Sycoidear.
Roxb. 1832. Ind. III. p. 528: g. Monoec. Monandr.
Blanco 1837. Filipin. p. 672: g. Monoec. Triandr.

Ficus Tourn. cont.
Endl. 1837. Gen. n. 1859. p. 278; 1841. Ench. p. 165: g. Morear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 350 (261). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 37. 54. — Brongn. 1843. En. genr. p. 99. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 331. — Unger 1845. Syn. p. 221; 1846. Chlor. prot. p. LXXX. — Endl. 1847. Spl. IV. p. 34. Sect.: Sycomorphe, Rhizocladus, Erythrogyne, Galoglychia, Cystogyne, Stilpnophyllum, Urostigma, Carica. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 644. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 103.
Miquel 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 31. Sect.: Carica, Sycocarpus.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 268: g. Moracear.

Ficus Gasparr. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 340; 1845. Ricerche Caprif. p....: g. Ficuum restrictissimum. (Ficus carica foeminea L.)

Ficus Miquel 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 525; 1848. ibid. VII. p. 221: g. restrictum Ficuum. (*Synon. Ficus, Caprificus, Tenorea Gasp., Erythrogyne Vis., Plagiostigma Zucc.*) Sect. (1848): Caricoides, Caprificus, genuinae, Sycidium, Plagiostigma, Podosycea, Trematosycea, Kissosycea, Erythrogyne, Thamnosycea, Leiosycea, Didymophora, Eriosycea.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 706: g. Morear. Sect. eaed.
Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 52: g. Ficear.

Ficus Miquel 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 514: fam. plant. Gen.: Urostigma, Pharmacosycea, Pogonotrophe, Sycomorus, Ficus, Covellia, Synoecia.

Fidelia Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 478. 481; 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. p. 302: nov. g. Fideliear., a Meisn. (Comm. p. 144) ad Apargiam Less. relatum.
= Asterothrix Cass.?

Fidelieae Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 478: div. Leontodontear. Gen.: Fidelia, Thrincia, Streckera, Kalbfussia.

Fiedleria*) Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 206. n. 7821 (Icon. Cent. XV. p. 42): nov. g. Tunicear.
= Pseudotunica Fenzl.

Fiedleria Rabenh. 1848. Flora I. p. 252; 1848. Krypt. II. 3. p. 96: nov. g. Pottiacear. (Gymnostomum subsessile Schwägr.) *Synon.* Schistidium C. Müll.; Anoectangium Röhl.

Fieldia**) A. Cunningh. 1825 in Field's Mem. N. S. W. p. 364: nov. g. Bignoniacear. *Cf.* Linnaea II. p. 143. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3247: g. Gesnerear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 663: g. Cyrtandrear. — Par. R. Brown 1838 in Horsf. pl. jav. rar. p. 122. (*Cf.* Flora 1842. p. 219.) — Meisn. 1840. Gen. p. 303 (293). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257. —

*) Dicat. K. G. Fiedler, peregrinatori per totam Graeciam.
**) Dicat. baroni Field, Port Jackson.

Fieldia A. Cunningh. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4718. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 367. 581.
Endl. 1839. Gen. n. 4149. p. 719; 1841. Ench. p. 349: g. Eucyrtandrear.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 131: g. Bignoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Cyrtandridar.

Fieldia Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 424. t. 36: nov. g. Orchidear. (Lissochilus fieldianus olim.) — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 798. n. 4137.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 63: sect. Vandae. — Par. Lindl. 1853. Fol. Orchid. (20 Apr.) p. 2. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 680.
= Vandae R. Brown pars.

Fieraurea Rchb. vid. *Fibraurea Lour.*

Figalonopsis Wittst. vid. *Filaginopsis Torr. & Gray.*

Figaraea Vivian. 1831. Pl. aegypt. Dec. quatuor p. 12. (F. aegyptiaca.)
= Neurada Linn. (Walp. Rep. II. p. 52.)

Filagineae Cassini 1822. Dict. v. 23. p. 571; 1827. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: div. Inulear. Archetypar. Gen.: Filago, Gifola, Logfia, Micropus, Oglifa.
Fenzl 1839. Flora II. p. 729: subdiv. Cassiniear. Gen.: Filago, Ifloga, Trichogyne.

Filaginoideae Schrank 1824. Denkschr. Ak. Münch. VIII. p. 146: div. Gnaphaloidear. Gen.: Filago, Achyrocome, Evax.

Filaginopsis Torrey & A. Gray 1841. Fl. North.-Amer. II. p. 363: nov. g. Tarchonanthear. (Evax multicaulis DC.) *Cf.* Walp. 1843. Rep. II. p. 972 (err. *Philaginopsis*) et Wittst. Etym. Handw. p. 365 (*Figalonopsis*).
Endl. 1843. Spl. III. p. 68. n. 2420*: g. Plucheinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 139.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Eumicropear.

Filago Tourn. 1700. Inst. p. 454. t. 259: g. pl. class. XII. *Cf.* Cass. 1819. Bull. soc. philom. p. 141.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 185. Ed. Hall. 1745. p. 194: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1719. Act. Ac. Paris. p. 296: g. Corymbiferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 179. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 513. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 395. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 460.
Linn. 1753. Sp. II. p. 927; 1759. Syst. ed. X. p. 1235. n. 891; 1763. Sp. ed. II. p. 1311; 1764. Gen. ed. VI. p. 450. n. 995; 1767. Syst. ed. XII. p. 580: g. Syngenes. Polygam. Necessar. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 662; 1784. Syst. p. 795. — Reich. 1778. Gen. p. 446. n. 1079. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 587. n. 1345. — Gmel. 1791. Syst. p. 1278. — Pers. 1797. Syst. p. 837.

Filago Tourn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 122: g. Conysar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Nucamentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 541.
Gled. 1764. Syst. p. 250. n. 1035: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 576.
Scop. 1777. Intr. p. 129: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 76. n. 135: g. Siphoniphytor.
! Gärtn. 1791. Fr. II. p. 404. t. 166: g. Tubulosar.
GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 193: g. Discoidear. — Par. Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 538. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 9. 252.
Hoffm. 1804. Bot. Tasch. III. 2. p. 139: sect. Gnaphalii. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 133. — Schlechtend. 1823. Fl. Berol. I.
Pers. 1807. Ench. II. p. 422. n. 1841: g. Syngenes. Superfl.
Presl 1822. Delic. Prag. I. p. . . .: g. Inulacear.
Schrank 1824. Denkschr. Ak. Münch. VIII. p. 146: g. Filaginoidear.
Link 1829. Hdb. I. p. 720: g. Elichrysear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 219: g. Gnaphalinar.
DC. 1837. Pr. VI. p. 247: g. Helichrysear. Sect.: Gifola, Oglifa. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2752. p. 448; 1841. Ench. p. 243. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3472. Sect.: Filago, Gifola. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 307 (sphalm. *Tilago*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 245.
Koch 1837. Syn. p. 362: g. Inulear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27. (verar.) — Griseb. 1842. Rumel. II. p. 194. Sect. ut DC.
Kunth 1838. Berol. I. p. 353: g. Gnaphaliear. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 432. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 38. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 397. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 190. Sect. ut DC.
Fenzl 1839. Flora II. p. 729. 745: g. Filaginear. Sect. ut DC. — Par. Ledeb. 1845. Ross. II. p. 615. Sect. eaed. — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 304.
Coss. & Germ. 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 283. Sect: Gifola, Pseudo-Evax, Oglifa.
Synon. Impia Dodon.; Gifola et Oglifa Cass.; Achariterium Bluff & Fing.

Filago Willd. 1803. Spec. III. 3. p. 2387. n. 1569; 1809. En. p. 940: g. Syngenes. Necessar. restrictum.
Cass. 1819. Bull. soc. philom. p. 141*); 1820. Dict. v. 17. p. 2: g. Gnaphaliear. (F. pygmaea L.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31.

*) Ex Cassinii demonstratione *Filago pygmaea* verus generis Linnaeani typus esse videtur, quare praecedente Willdenowio genus *Evax Gärtn.* rejiciendum et huic nomen Linnaeanum restituendum foret.

Filago Willd. cont.
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 564; 1827. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Filaginear.
Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2451: g. Inulear. genuinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 140.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 620. n. 3080: g. Eupatorinar.
Less. 1832. Syn. p. 205: g. Epaltidear.
Evax Gärtn.

Filago „Gärtn.“ Gaudin 1829. Fl. Helv. V. p. 238: sect. Gnaphalii. (G. Stoechas, luteo-album, supinum, pusillum, sylvaticum, uliginosum.)
Eugnaphalii DC. sp., Omalotheca Cass. etc.

Filamentosae Scopoli 1777. Introd. p. 61: gens Incompletar. Gen.: Byssus, Conferva.

Filaspora Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 718: nov. g. Melanconiacear. (F. umbonata, etc.)

Filetia*) Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 822: nov. g. Gendarussear. (F. costulata.)

Filicaceae Presl 1836. Pterid. p. 13: ordo Filicinear. Subord.: Helicogyratae, Cathetogyratae.
Rupr. 1845. Pfl. russ. Reichs Lief. III. Novum gen.: Homopteris.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 330: subclass. Filicinear. Divis. ut antea et Pleurogyratae.

Filicaceites Sternb. 1838. Vers. II. p. 114: ordo plant. foss. Trib.: Gleicheniacites, Cyatheacites, Aspidiacites, Aspleniacites, Adiantaceites, Polypodiacites, Filicites.

Filicales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 36: nixus Esexualium. Ordines: Polypodiaceae, Gleichenieae, Osmundaceae, Danaeaceae, Ophioglosseae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 74: nixus Acrogenar. Ord.: Ophioglossaceae, Polypodiaceae, Danaeaceae.

Filicarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: ordo Dermogynar. Fam.: Ophioglossineae, Filices.

Filicastrum Amman (1732. Pl. Ruthen. n. 252. ex Hall.) 1747. Comm. Ac. Petrop. pro 1738. p. 278: nov. g. Filicum.
= Lomaria Willd.

Filiceae Necker 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 455: ordo plantar. Gen.: Equisetum, Acrosticum, etc.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68: fam. Arcaniae. Gen.: Pteris, etc.
Conf. Filices Linn.

Filiceae „Brid.“ Mont. 1840 in Webb Phytogr. Canar. IV. p. 22: trib. Muscor. Gen.: Fissidens.
Conf. Filicoidei Brid.

Filices Linn. 1737. Gen. p. 322: ordo II. Cryptogamiae. Gen.: Equisetum, Osmunda, Ophioglossum, Pteris, Lonchitis, Adiantum, Asplenium, Polypodium. — Simil. Linn. in operibus sequentibus, nec non

*) Dicat. G. F. Filet, pharmaceutae.

Filices Linn. cont.
editores operum Linnaeanorum. — Roth 1800. Germ. III. p. 27. Divis.: *Exannulatae* (Osmunda, Ophioglossum), *Annulatae* (Onoclea, Polypodium, Pteris, Blechnum, Scolopendrium, Asplenium, Athyrium, Polystichum, Cyathea).
Gled. 1749. Berl. V. p. 134: ordo 1 class. VI. Gen. ut Linn. 1737 et Thelypteris, Phyllitis, Hemionitis, Trichomanes, Acrosticum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35: ordo 64 plant. Gen.: Ophioglossum, Osmunda, Pteris, Trichomanes, Adiantum, Lonchitis, Asplenium, Hemionitis, Polypodium, Acrostichum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 16: fam. 5 plant. Gen. §. 1: Thelypteris, Adiantum, Scolopendrium, Ceterac, Filix, Dryopteris, Polypodium, Hemionitis, Blechnum. §. 2: Osmunda, Angiopteris, Ophioglossum, Palmafilix, Pilularia, Lemma.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 55 plant. Gen. ut 1751 et Onoclea, Blechnum, Marsilea, Pilularia, Isoëtes. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 594. Gen. ead. et Marattia; Cycas, Zamia; Caenopteris, Dicksonia.
Hill 1769. Ht. kew. p. 426: class. 39 herbar.
Juss. 1789. Gen. p. 14: ordo (5) Acotyledonum. Gen. §. 1: Ophioglossum, Onoclea, Osmunda. §. 2: Acrostichum, Polypodium, Asplenium, Hemionitis, Blechnum, Lonchitis, Pteris, Myriotheca, Adiantum, Darea, Trichomanes. §. 3: Zamia, Cycas. §. 4: Pilularia, Lemma. §. 5: Salvinia, Isoëtes, Equisetum. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 54. Gen. ead. (§. 5: Salvinia, Equisetum, Chara.) — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 42. t. 6—8. Sect. ut Vent., accedentibus generibus nonnullis. — Sternb. 1825. Vers. I. p. X. Trib.: *verae* (gen.: Lepidodendron, Lepidofloyos, Favularia, Glossopteris, Sphaenopteris, Neuropteris, Pecopteris, Odontopteris, Alethopteris, Aspleniopteris, Hymenopteris), *anomalae* (gen.: Walchia, Rhytidolepis, Syringodendron, Catenaria).
Mönch 1794. Meth. p. 721: ordo Cryptostemonis.
Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 291; 1800 ibid. II. p. 121. Divis.: Gyratae, Agyratae.
Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 3. Divis.: *Annulatae* (gen.: Acrostichum, Meniscium, Hemionitis, Grammitis, Polypodium, Aspidium, Asplenium, Caenopteris, Scolopendrium, Diplazium, Lonchitis, Pteris, Vittaria, Onoclea, Blechnum, Woodwardia, Lindsaea, Adiantum, Davallia, Dicksonia, Cyathea, Trichomanes, Hymenophyllum, Schizaea), *Exannulatae* (gen.: Osmunda, Lygodium, Gleichenia, Angiopteris, Danaea, Marattia). *Affines:* Psilotum, Botrychium, Ophioglossum, Lycopodium.
Willd. 1802. Bemerk. üb. selt. Farrenkr.: ordo 2 Cryptogamar. Sect. ut Swartz 1800.

Filices Linn. cont.
Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. II. p. 261: ordo Cryptogamiae. Gen. §. 1: Vittaria, Pteris, Adiantum. §. 2: Woodwardia, Blechnum, Asplenium, Nephrodium, Polypodium, Acrostichum, Onoclea. §. 3: Osmunda, Botrypus, Cteisium, Ophioglossum.
DC. 1805. Franç II. p. 546: fam. Monocotyledonum cryptogamar. Gen.: Hymenophyllum, Adianthum, Pteris, Blechnum, Scolopendrium, Asplenium, Athyrium, Aspidium, Polystichum, Acrostichum, Ceterach, Osmunda, Botrychium, Ophioglossum.
Palis. 1805. Prodr. Aethéog p. I: fam. 7 Aetheogamiae.
Swartz 1806. Syn. Fil. p. 1. Divis.: Gyratae, Rimatae s. Spurie gyratae, Agyratae.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 4. Subord.: Gyratae verae, Pseudogyratae, Agyratae.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 145. Ed. Nees p. 1: ordo Monocotyledonum. Trib.: Gyratae (Polypodiaceae), Gleicheneae, Osmundaceae, Ophioglosseae.
Willd. 1810. Sp. V. p. 99: ordo 5 (restrictus) Cryptogamiae. Gen.: Polybotrya, Acrostichum, Hemionitis, Meniscium, Taenitis, Ceterach, Grammitis, Polypodium, Pleopeltis, Aspidium, Onoclea, Struthiopteris, Lomaria, Darea, Asplenium, Scolopendrium, Diplazium, Pteris, Vittaria, Blechnum, Woodwardia, Lindsaea, Adiantum, Cheilanthes, Lonchitis, Davallia, Dicksonia, Caenopteris, Cyathea, Trichomanes, Hymenophyllum.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 865: fam. 6 Acotyledonum.
Mass. 1818. Dict. v. 12. p. 107: div. Cryptogamar.
DC. 1819. Théor. élém. p. 249: ordo Endogenar. cryptogamar.
Raddi 1820. Filic. Bras.
Juss. 1820. Dict. v. 17. p. 278 *(Fougères):* fam. Cryptogamar. Gen. §. 1: Polybotria, Acrostichum, Meniscium, Hemionitis, Gymnogramme, Grammitis, Ceterach, Notholaena, Cyclophorus, Pyrrhosia, Taenitis, Polypodium, Pleopeltis, Aspidium, Asplenium, Caenopteris, Scolopendrium, Diplazium, Lonchitis, Pteris, Vittaria, Monogramma, Onoclea, Lomaria, Blechnum, Woodwardia, Doodia, Lindsea, Adiantum, Cheilanthes, Davallia, Didymochlaena, Dicksonia, Cyathea, Woodsia, Trichomanes, Hymenophyllum. §. 2: Schizea, Lygodium, Mohria, Anemia, Osmunda, Todea, Mertensia, Gleichenia?, Angiopteris. §. 3: Marattia, Danaea, Botrychium, Ophioglossum.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 2: fam. plantar. endogenar. cryptogamar. Divis.: Osmundaceae, Polypodiaceae, Aspidiaceae, Aspleniaceae, Scolopendriae, Blechnideae, Pterideae, Cyatheae, Botrychiae, Ophioglossae.
Agdh. 1822. Aphor. p. 114; 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 583: class. III. Pseudocotyledonear. Ord.: Osmundaceae, Po-

Filices Linn. cont.
lypodiaceae, Danaeaceae. (Excluduntur Ophioglosseae.) — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 103. Ord.: Hizospermae, Rhizospermae, Rachiospermae.
Kaulf. 1824. Enum. Filic. (Lips.) Ordines: Equisetaceae, Lycopodineae, Ophioglosseae, Marattiaceae, Gleicheneae, Osmundaceae, Polypodiaceae, Marsileaceae.
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 231. Classes: Equisetaceae, Lycopodiaceae, Ophioglosseae, Marattiaceae, Gleicheniaceae, Osmundaceae, Gyrateae, Marsileaceae.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 666. 667: ordo 1 Cryptogamiae. Divis.: dorsiferae, spicatae, Filicoideae.
Hook. & Grev. 1827—30. Icones Filic.
Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 171. Divis.: Marsileaceae, Lycopodiaceae, Osmundaceae, Marattiae, Filices.
Rchb. 1828. Consp. p. 37 (1832. Fl. exc. p. L); 1837. Hdb. p. 135; 1841. Nom. p. 27: ordo Chlorophytor. Formationes: Thryptopterides, Anoegopterides.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: fam. Filicariear. Trib.: Osmundaceae, Marattiaceae, Gleichenieae, Polypodieae, Trichomaneae. (Excluduntur Ophioglossineae.)
Blume 1829. Fl. Jav. fasc. III. IV. p. 3. Trib.: Polypodiaceae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (264) Filicoidear. — Par. Kunth 1838. Berol. II. p. 413.
Bartl. 1830. Crd. p. 16: class. Vegetabilium vascularium cryptogamor. Ord.: Polypodiaceae, Osmundaceae, Ophioglosseae.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 2: class. I. Agamor. Ord.: Rhizopterides, Conopterides, Phyllopterides, Cnemipterides, Stachyopterides.
Schott 1835. Gen. Filic.
Endl. 1836. Gen. p. 58; 1841. Ench. p. 35: class. Acrobryor. protophytor. Ord.: Polypodiaceae, Hymenophylleae, Gleicheniaceae, Schizaeaceae, Osmundaceae, Marattiaceae, Ophioglosseae, Caulopterides, Psaronieae.
Göpp. 1836. Syst. Fil. foss. (Nov. Act. Leop. XVII. Suppl.) p. 170. Divis.: *Desciscentes* (gen.: Bockschia, Pachypteris, Anomopteris), Danaeaceae, Gleichenieae, Neuropterides, Sphenopterides, Pecopterides.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 1: class. III. Vegetabilium. Divis.: Rhizospermae, Peltispermae, Epiphyllospermae, Thecaspermae, Maschalospermae.
Meisn. 1843. Gen. p. 430 (329): ordo Acotyledonear. vascularium. Subord. ut Bartl. et Marattiaceae.
Brongn. 1843. En. genr. p. 4: fam. Filicinear. Trib.: Polypodiaceae, Cyatheaceae, Hymenophylleae, Parkerieae, Lygodieae, Osmundeae, Marattieae, Ophioglosseae.
Schleid. 1843. Grundz. II. p. 83: div. Agamar.
Hook. 1844. Spec. Fil. I. p. 1: ordo plant. Subord.: Gleicheniaceae, Polypodiaceae (etc. in voluminibus posterioribus).

Filices Linn. cont.
Koch 1845. Syn. ed. II. P. 3. p. 972: ordo Endogenear. cryptogamar. Trib. ut Bartl.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 35. Ordines fossilium: Danaeaceae, Gleicheniaceae, Neuropterides, Splenopterides, Pecopterides. Genera e caudicibus constituta: Protopteris, Tubicaulis, Caulopteris, Karstenia, Cottaea, Porosus.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 82: class. Heteronemear. Fam.: Polypodiaceae, Ophioglosseae, Marsileaceae, Lycopodiaceae.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 308: subordo Filicoidear. Fam.: Hymenophylleae, Polypodiaceae, Osmundaceae, Ophioglosseae.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 689 (*Fougères*). Trib.: Polypodiaceae, Cyatheaceae, Hymenophylleae, Ceratopterideae, Gleichenieae, Osmundeae, Schizaeaceae, Marattieae, Ophioglosseae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 212: fam. (166) Filicinar.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 7. Fam.: Hymenophyllaceae, Polypodiaceae, Gleicheniaceae, Osmundaceae, Schizaeaceae, Lygodiaceae, Angiopterideae, Marattiaceae, Danaeaceae, Ophioglossaceae.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 12. 17: fam. Cryptogamar. vascularium. Ord.: Polypodiaceae, Cyatheaceae, Hymenophylleae, Gleicheniaceae, Schizaeaceae, Osmundaceae, Marattiaceae, Ophioglosseae.

Filices Wiggers 1780. Fl. Holsat. p. 73: ordo 1 Cryptogamiae, distinctis Epiphyllospermis restrictus. Gen.: Ophioglossum, Osmunda.

Filices desciscentes Spreng. 1827. Syst. IV. p. 128; 1831. Gen. II. p. 726: fam. Cryptogamiae sectionis 1. Gen.: Trichomanes, Hymenophyllum.

Filices verae Spreng. 1827. Syst. IV. p. 33; 1831. Gen. II. p. 720: fam. Cryptogamiae sectionis 1. Gen. (1827): Polybotrya, Acrostichum, Hemionitis, Gymnogramme, Meniscium, Grammitis, Taenitis, Nothochlaena, Xiphopteris, Niphobolus, Polypodium, Onoclea, Lomaria, Struthiopteris, Allosorus, Onychium, Hymenolepis, Monogramma, Leptochilos, Vittaria, Antrophyum, Diplazium, Scolopendrium, Didymochlaena, Pteris, Lonchitis, Lindsaea, Asplenium, Caenopteris, Blechnum, Woodwardia, Doodia, Sadleria, Allantodia, Aspidium, Pleopeltis, Adiantum, Cheilanthes, Cassebeeria, Davallia, Dicksonia, Chnoophora, Trichopteris, Alsophila, Woodsia, Hemitelia, Cyathea, Cibotium, Peranema. Accedunt 1831 Selliguea, Marginaria, Matonia.
= Polypodiaceae R. Brown.

Filicina Batsch 1802. Tab. affin. p. 262: fam. Chlorophyllor. Gen.: Osmunda, Acrostichum, Asplenium, Blechnum, Meniscium, Lonchitis, Hemionitis, Polypodium, Pteris, Adiantum.

Filicinae Gleditsch 1764. Syst. pl. p. 287: class. V. plant. Gen. Filicum Linn. 1737

Filicinae Gleditsch cont.
et Trichomanes, Blechnum, Hemionitis, Cincinalis, Acrostichum, Pyxidaria, Marsilea, Pilularia, Isoëtes.
Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): class. III. plant. Ord.: Diclidopterides, Epiphyllospermae, Thylacopterides.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 212: ordo (56) Cryptogamar. vascularium. Fam.: Lycopodiaceae, Filices.

Filicineae Presl 1836. Pterid. p. 10: class. plant. Ordines: Filicaceae, Hymenophyllaceae, Marattiaceae, Osmundaceae, Ophioglossaceae. *Cf.* Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. V. p. 330.
Brongn. 1843. En. genr. p. XIII. 4: class. Acrogenar. Fam.: Filices, Marsileaceae, Lycopodiaceae, Equisetaceae, Characeae.

Filicites Martius 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. . . .: g. foss. plant. *Cf.* Flora 1823. I. p. 318 et Isis 1823. p. 858.
= . . .?

Filicites „Schloth." Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 209. 232. 305: g. Vegetabilium foss. class. III. Sect.: Glossopteris, Sphenopteris, Nevropteris, Pecopteris, Odontopteris.
Brongn. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 207: g. Filicum foss. Sect.: Dictyopteris.
= Zamites Brongn., etc.

Filicites Sternb. 1838. Vers. II. p. 54: ordo plant. foss. Gen.: Pachypteris, Sphenopteris, Cyclopteris, Glossopteris, Neuropteris, Odontopteris.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 126: trib. Filicaceitum. Gen.: Sphenopteris, Dictyophyllum, Cyclopteris, Neuropteris, Odontopteris, Taeniopteris, Alethopteris, Pecopteris, Ctenis, Phlebopteris, Glossopteris, Sagenopteris, Lonchopteris, Linopteris, Camptopteris, Clathropteris, Protopteris, Caulopteris, Psaronius.

Filicoideae Wahlenb. 1826. Fl. suec. II. p. 667: div. Filicum. Gen.: 1. *muscosae* (Lycopodium, Isoëtes, Pilularia), 2. *verticillatae* (Equisetum, Chara).

Filicoideae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I: div. Cellularium. Ordines: Equisetaceae, Filices, Lycopodiaceae, Marsileaceae.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 310.
Genth 1836. Nass. I. p. 1: fam. prima Cryptogamar. Ord.: Equisetinae, Lycopodiaceae, Ophioglosseae, Osmundaceae, Polypodiaceae, Rhizocarpeae, Characeae.
Kunth 1838. Berol. II. p. 412: ordo Cryptogamar. Fam.: Filices, Lycopodiaceae, Equisetaceae, Hydropterides.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 308: ordo 3 Chlorophytor. Subord.: Filices, Lycopodiaceae, Equisetaceae.

Filicoidei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLVI. fam. unica Entophyllocarpor. Gen.: Schistostega, Drepanophyllum, Phyllogonium, Eustichia; Octodiceras, Fissidens.

Filicula Tourn. 1700. Inst. p. 541: g. pl. class. XVI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 324. Ed. Hall. 1745. p. 345: g. Epiphyllospermar.
= Cystopteris Bernh., etc.

Filipendula*) Tourn. 1700. Inst. p. 293. t. 150: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 147. Ed. Hall. 1745. p. 161: g. pl. class. VII.
Linn. 1737. Gen. p. 145. n. 410; 1737. Fl. lapp. p. 158. Ed. Smith p. 166; 1737. Cliff. p. 191; 1740. Syst. p. 24; 1742. Gen. ed. II. p. 219. n. 483; 1745. Fl. suec. p. 147; 1748. Ups. p. 131: g. Icosandr. Pentagyn. (serius Spiraeae insertum.)
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 306: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132: g. Calycostemonis. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 663.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Comosar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 295: g. Rosar.
Neck. 1790. El. II. p. 89. n. 749: g. Sarcodiphytor.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 588: sect. Spiraeae. (Sp. Filipendula L.) — Par Rchb. 1832. Fl. exc. p. 626; 1841. Nom. p. 168. n. 6310. 2.
= Spiraeae Linn. pars.

Filix**) Tourn. 1700. Inst. p. 536. t. 310. 313: g. pl. class. XVI.
Adans. 1763. Fam. II. p. 20: g. Filicum.
= Aspidium Swartz.

Filix Rupp. 1718. Fl. jen. p. 323. Ed. Hall. 1745. p. 343: g. Epiphyllospermar.
= Polypodium Linn., etc.

Filix Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 132: g. Epiphyllospermar.
Scop. 1777. Intr. p. 62: g. Dorsiferar.
= Pteris Linn.

Fillaea Guillem. & Perr. 1833. Fl. Seneg. I. p. 242. t. 55: nov. g. Mimosear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 96 (69).
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1425: g. Leguminosar.
Endl. 1841. Gen. n. 6825. p. 1324; 1841. Ench. p. 682: g. Acaciear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6123.
Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 327: g. Parkiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 857; 1846. V. p. 576. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.

Filum Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 60. 94: nov. g. Fucor. (F. chordoides, glomeratum.)
Chorda Stackh.

Fimbraria Nees 1820. Hor. phys. Berol. p. 44; 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 410: nov. g. Hepaticar., a Marchantia L. sejunctum. *Cf.* Flora 1821. II. p. 514.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 116; 1829. Anal. fam. p. 69; 1831. Syll. Jungerm. p. 7: g. Cephalotheceor.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 235. n. 3351; 1831. Gen. II. p. 739. n. 3744: g. Muscor. hepaticor.
Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 5: g. Marchantiacear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 75.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Dysbryor.
Tayl. 1836. Linn. Trans. XVII. 3. p. 385: g. Marchantiear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 93.

*) Dicta ob radices tuberosas e filo quasi pendentes.
**) Nomen ex Virgilio.

Fimbraria Nees cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 849: g. Grimaldiear.
Synon. Fimbriaria Rchb.; Hypenantron et Dictyochiton Corda.

Fimbria Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 92: g. Leptomycetum. (Mucor Fimbria Nees.)
= Mucoris Mich. pars.

Fimbriaria Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 95. 96: nov. g. Fucor. (F. dentata, Reidii.)
= Odonthalia Lyngb.

Fimbriaria Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 527: g. Epiphyllinor.
Lindenb. 1829. Syn. Hepat. p. 108: g. Hepaticar.
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 6: g. Marchantiacear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 464. p. 44; 1841. Ench. p. 27.
Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 971. 979: g. Marchantiear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 61; 1842. Pl. cell. Cub. p. 488; 1849 in Orb. Dict. V. p. 633.
Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXXI. 259; 1846. Syn. Hepat. p. 555: g. Jecorariar. Subgen.: Fimbriaria, Brachyblepharis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 58: g. Marchantear.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 8: g. Grimaldiear.
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 169: g. Marchantiar.
= Fimbraria Nees.

Fimbriaria A. Juss. 1833 in St. Hil. Fl. Bras. III. p. 63. t. 173: nov. g. Malpighiacear. (F. elegans.) — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 155.
Meisn. 1837. Gen. p. 54 (39): g. Hiptagear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 299. — Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 188.
A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 250: g. Gaudichaudiear.
Conf. Schwannia Endl.

Fimbriatae Batsch 1802. Tab. affin. p. 38: fam. Difformariarum. Gen.: Cactus, Mesembrianthemum, Reaumuria, Aizoon, Tetragonia, Gisekia.

Fimbrilia Pers. 1828. Mycol. eur. III. p. 229: sect. Agarici. (*Calodontes* *Fries* syst. I.)

Fimbrillaria Cassini 1818. Bull. soc. philom. Févr. p. 31; 1820. Dict. v. 17. p. 54: nov. g. Asterear. (Baccharis ivaefolia L.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 461; 1830. v. 60. p. 582: g. Baccharidear. (verar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2542: g. Baccharear.
DC. 1836. Pr. V. p. 387: sect. Conyzae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2405 d. p. 390; 1841. Ench. p. 236. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3582. 4.
Synon. Marsea Adans.

Fimbristemma Turczan. 1852. Bull. soc. Mosc. Nr. 2 (Flora 1853. p. 723): nov. g. Asclepiadear., Gonolobo proximum.

Fimbristilis Ritg. vid. *Fimbristylis Vahl.*

Fimbristyleae Rchb. 1828. Consp. p. 87 (1830. Fl. exc. p. 75); 1837. Handb. p. 147: subdiv. Scirpinar. Gen.: Fimbristyles, Echinolytrum, Dichromena; Trichelostylis, Isolepis.

Fimbristyles Schult., Rchb. vid. *seq.*

Fimbristylis Vahl 1806. Enum. II. p. 285. n. 119: nov. g. Triandr. Monogyn. (Scirpus dichotomus L.) — Par. Nutt. 1818. Gen I. p. 33.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 225. Ed. Nees p. 81: g. Cyperacear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 2. 91. n. 175. — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 57. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 198. n. 221. — D. Don 1825. Nepal. p. 41. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 14. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129 (*Fimbrystylis*). 197. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 416. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 272.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153; 1837. Cyper. p. 220: g. Scirpear. — Par. Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 24 et Schult. Mant. II. p. 2: *Fimbristyles*). — Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Presl fr. 1828. Rel. Hänk. I. p. . . . — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 181; 1843. Én. genr. p. 12. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120 (*Fimbristilis*). — Nees 1834. Linnaea IX. p. 290; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 75. — Koch 1837. Syn. p. 744. Ed. II. p. 859. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 258. — Steud. 1855. Glum. II. p. 106. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 382. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 314.
Link 1821. En. I. p. 42: sect. Scirpi. — Par. Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 84.) — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 270.
Link 1827. Hort. I. p. 287; 1829. Hdb. I. p. 102: g. Cyperoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1113 (*Fimbristyles*); 1830. Fl. exc. p. 75: g. Fimbristylear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 49. n. 230: g. Cyperear.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Endl. 1837. Gen. n. 998. p. 117; 1841. Ench. p. 64: g. Ficiniear. — Par. Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 73.
Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1492: g. Fuirenear. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Ficinidar.
Synon. Trichelostylis Lestib.?; Dichostylis Lestib.?; Echinolytrum Desv.; Echinolitrum Steud.; Aplostemon Raf. pt.

Fimbrystylis Dietr. vid. *praeced.*

Finckea*) Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 237: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153). —

*) Dicat. dom. Fincke, botanico Silesiaco.

Finckea Klotzsch cont.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4894. (genuinar.)
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 701: sect. Grisebachiae.
Endl. 1839. Gen. n. 4305. p. 753; 1841. Ench. p. 369: g. Sympiezear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.

Findlaya Bowdich 1825. Madeir. p. 395. *Cf.* Endl. Gen. p. 734.
Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5552: inter genera vix cognita.
Meisn. 1840. Comm. p. 163: g. Primulacear. (?) — Par. Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 74. (non satis notum.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 646.
Rchb. 1841. Nom. p. 124. n. 4849: g. Primulear. vix notum.

Fingalia*) Schrank 1824. Syll. Ratisb. I. p. 87: nov. g. Syngenes. Polygam. Aequal. (F. hexagona.)
. . . ?

Fingerhuthia**) Nees 1835. Del. sem. h. Hamb. (*cf.* Linnaea X. Litt. p. 112): nov. g. Phleoidear. *(*F. africana.*)*
Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 448; 1841. Gram. cap. p. 135.
Endl. 1837. Gen. n. 751. p. 81; 1841. Ench. p. 56: g. Phalaridear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1230. — Meisn. 1843. Gen. p. 416 (318). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Steud. 1854. Glum. I. p. 12.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.
Synon. Lasiotrichos Lehm.

Finlaysonia***) Wallich 1831. Pl. As. rar. II. p. 48. t. 162: nov. g. Periplocear. (F. obovata.) *Cf.* Isis 1834. p. 976. — Par. Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 65. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 162. — Endl. 1838. Gen. n. 3432. p. 588; 1841. Ench. p. 298. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 538. — Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). — Dcne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212; 1844 in DC. Pr. VIII. p. 494. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 464.
Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5065: g. Gymnantherear.
Synon. Guroa (an Gurua? Hamilt.

Fintelmannia†) Kunth 1837. Cyperogr. p. 362: nov. g. Sclerinear. (F. restioides.)
Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316): g. Sclericar. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146.
Trilepis Nees.

Fiorinia Parlatore 1850. Fl. Ital. I. p. 232: nov. g. Graminear. (Aira Tenorii Guss.)

Firensia Scopoli 1777. Introd. p. 157. n. 691: nov. g. Asperifoliar. (Cordia flavescens Aubl.)
Neck 1790. El. I. p. 276. n. 435: g. Trachytophytor.
Cordiae R. Brown pars.

Firmiana*) Marsigl. . . . . Act. Patav. I. p. 116. t. 1. 2.
R. Brown 1844 in Horsf. Pl. jav. rar. Pt. 3. p. 235: g. Sterculiear. Sect.: Firmiana, Erythropsis. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 104. Sect. eaed. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 321.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 362: g. Sterculear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 616: g. Sterculiacear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. 5321/2. Sect.: Eufirmiana, Erythropsis.

Firmiana Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 33: g. Sterculiear. restrict. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 31 (25).
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 516: g. Sterculiacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Brachychitonear.
Endl. 1840. Gen. n. 5320 *k*. p. 994; 1841. Ench. p. 516: sect. Sterculiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7699. 10.
R. Brown 1844 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 235: sect. Firmianae. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 104.
= Eufirmiana Endl.

Fischera Spreng. 1813. Umbell. prodr. p. 27.
Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 93: g. Umbelliferar. divis. 1.
= Trachymene Rudge.

Fischera**) Swartz 1817. Mém. soc. Mosc. V. p. 14. *Cf.* Spreng. n. Entd. III. p. 221.
Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3402: g. Rhodoracear.
Bartl. 1830. Ord. p. 155: g. Ericear.
= Leiophyllum Pers.

Fischera***) Schwabe 1837. Linnaea XI. p. 124. t. 2: nov. g. Algar. (F. thermalis.)
Synon. Fischeria Kütz.

Fischera „DC." Wittst. Etym. Handw. p. 366: vid. *seq.*

Fischeria†) DC. 1813. Catal. h. Monsp. p. 112: nov. g. Apocinear., intermedium inter Microstemma et Hoyam. *Cf.* Bull. soc. philom. 1813. Mai p. 279.
Schult. 1820. Syst. VI. p. VII. 50: g. Asclepiadear.
Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 68: g. Apocynear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 125: g. Stapeliear.
Endl. 1838. Gen. n. 3515. p. 597; 1841. Ench. p. 299: g. Ceropegiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 271 (178). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5031.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: g. Pergulariear.
Dcne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Gonolobear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.
Dcne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 600: g. Gonolobar.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 68. t. 276.

*) Dicat. regi Fingal.
**) Dicat. K. Ant. Fingerhuth.
***) Dicat. Georgio Finlayson, botanico anglico.
†) Dicat. Ferd. Fintelmann, de re hortulana meritissimo.

*) Dicat. Car. Jos., comiti de Firmian.
**) Dicat. Gotth. Fischer, Mosc.
***) Dicat. amico Fischer, phycologo.
†) Dicat. Fr. E. L. de Fischer, Petropolit.

Fischeria Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phycol. gener. p. 273; 1845. Phycol. germ. p. 221; 1849. Sp. Alg. p. 425. n. 265: g. Confervear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 16. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 115. (genuinar.) — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 635; 1849. ibid. X. p. 53.
= Fischera Schwabe.

Fissenia „R. Brown mss." Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 76. n. 5118/$_3$: g. Loaseis aff.
Meisn. 1843. Comm. p. 356: g. Loasear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 745: g. Gronoviear.
Synon. Cnidone E. Meyer.

Fissidens Hedwig 1782. Fund. II. p. 91; .... Musc. frond. III. p. 26; 1801. Sp. Musc. p. 152: nov. g. Muscor. (frondosor.) *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 17. p. 70. — Par. Roth 1788. German. I. p. 459. — Mönch 1794. Meth. p. 731. — Michx. 1803. Fl. bor. Am. II. p. 299. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 34. — Schwägr. 1816. Suppl. I. 2. p. 4. — Mart. 1817. Erlang. p. 108. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Math. 1853. Belg. II. p. 52.
Brid. 1797. Musc. rec. I. p. 162; II. 1. p. 139; 1806. Suppl. I. p. 163: g. Aploperistomator.
Rebent. 1804. Neom. p. 256: sect. Dicrani. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 478. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 72. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 733. — Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 252. — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 154.
Palis. 1805. Pr. Aeth. p. 17; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 439: g. Ectopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 218.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 187; 1827. Bryol. II. p. 679: g. Entophyllocarpor. — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60. — Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 91.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 718: g. Hypnoideor.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLVI: g. Filicoideor.
Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 543: g. Entophyllocarpior.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 218: g. Aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 599. p. 57; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Genth 1836. Nass. I. p. 179: g. Bryoideor.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 82; 1839. XIII. p. 45: g. Drepanophyllear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 22; 1842. Pl. cell. Cub. p. 519: g. Filicear.
Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 976: g. Calyptrobryor.
Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. XVII: g. Fissidentear. — Par. Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 96. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 304. — C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 43. Sect.: Hydrofissidens, Pachyfissidens, Areofissidens, Eufissidens. — Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 635. — Bayrh. 1849. Taun. p. 16. — C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 528. (restrict.) Sect.: Pachyfissidens, Eufissidens. — Wils. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 60.
Synon. Skitophyllum Lapyl.; Schistophyllum Palis.; Fuscina Schrank; Luida Adans. pt.

Fissidenteae Bruch & Schimp. 1843. Bryol. eur. Fasc. XVII: trib. Muscor. Gen.: Fissidens, Octodiceras.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 96: div. Bryacear. Gen.: Fissidens.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 94: fam. Entophyllocarpor.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 43: trib. Acrocarpor. Gen.: Fissidens.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 303: subdiv. Entophyllocarpor. Gen. id. et Conomitrium.
Bayrh. 1849. Taun. p. 16: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Fissidens.

Fissiflorae Rchb. 1828. Consp. p. 91; 1831. Fl. exc. p. 187. 189: ordo Synblastar. Formationes: Aggregatae, Campanaceae.

Fissilia*) „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 260: nov. g. Aurantior. spurior.
Pers. 1797. Syst. p. 93; 1805. Ench. I. p. 41. n. 94: g. Triandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 194. n. 91.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 34. — Hedw. 1806. Gen. p. 31. 359.
Mirb. 1813. Bull. soc. philom. Déc. p. 377: g. Olacinear. — Par. Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 439. — DC. 1824. Pr. I. p. 532. — Bartl. 1830. Ord. p. 423. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 581. — Meisn. 1837. Gen. p. 45 (33). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 180.
Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 74: g. Ardisiacear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1828. Consp. p. 136. n. 3612: g. Olacinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Fissiliear.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 11. 19: g. Olacear.
= Olax Linn.?

Fissilieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: trib. Olacinear. Gen.: Olax, Spermaxyrum, Fissilia.

Fissistylae Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 140: subtrib. Rhynchosporear. Gen.: Rhynchospora, Ptilochaeta, Hygrocharis, Nemochloa.

Fissulineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68. 77: fam. Urnuliniae. Gen.: Monoclea, Targionia, Blandovia?

Fissurina Fée 1823. Crypt. écorç. p. 59. t. 13; 1825. Meth. p. 20.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 744. n. 3769: g. Hymenocarpor.
Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 543. 8: sect. Opegraphae.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 170; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350: g. Graphidear.
= Graphis Eschw.?

---

*) Nomen a corolla fissili.

Fistula DC. 1816 in Collad. Mon. p. 83; 1825. Prodr. II. p. 489: sect. Cassiae. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 52. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 360. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 114. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 285. — Endl. 1841. Gen. n. 6781 *a*. p. 1315; 1841. Ench. p. 674. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 491. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 89.
= Cathartocarpus Pers.

Fistularia Stackhouse 1816. Nereis brit. Ed. alt. *Cf.* Spreng. N. Entd. I. p. 94.
Grev. 1824. Fl. Edin. p. 300.
= Enteromorpha Link.

Fistulina Bulliard 1791. Champ. p. 314: nov. g. Fungor. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 10. — Link 1809. Berl. Mag. III. p. 29 (primaeseriei). — Grev. 1823. Mem. Wern. Soc. IV. 2. p. 373.
Pers. 1797. Tent. p. 29: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XVII. 549: sect. Boleti. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 113.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 648: g. Suillidear.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 396; 1828. Elench. I. p. 128: g. Pileator. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 763. n. 3900.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83. (*Fistulinia*): g. Hymenacear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 80; 1838. Epicr. p. 504: g. Hydneor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 443. p. 39; 1841. Ench. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 474. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 334: g. Radularior.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: g. Boletear.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 42; 1842. Mycol. p. 179: g. Polyporeor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 171. — Bail 1858. Syst. p. 25. t. 29.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 325: g. Hydnaceor.
Synon. Hypodrys Pers.; Buglossus Wahlenb.

Fistulinia Dumort. vid. *praeced.*

Fitchia*) Hook. f. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 640. t. 23. 24: nov. g. Cichoracear., Reae aff. (F. nutans.)

Fitchia Meisn. 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 75: nov g. Proteacear., pro Grevillea? cynanchicarpa Meisn. propositum.
= Molloya Meisn.

Fitzroya Hook. f. 1852 in Paxt. Fl. gard. II. Glean. p. 387: nov. g. Coniferar., Thuiopsidi aff. (F. patagonica). *Cf.* Hook. 1851. Bot. Mag. t. 4616. (Müll. Ann. bot. V. p. 794.)
Koch 1857. Berl. Gartenz. p. 227: g. Cupressinear. genuinar.

Fiva Steud. Nomencl. I. p. 642: vid. *Fiwa Gmel.*

Fivaldia Walp. vid. *Frivaldia Endl.*

*) Dicat. Walt. Fitch.

Fiwa Gmel. 1791. Syst. p. 745: g. Dodecandr. Monogyn. (Tomex japonica Thunb.)
= Tetranthera Jacq.

Flabellaria*) Cavan. 1790. Diss. IX. p. 436. t. 264: nov. g. Monadelph. (F. paniculata.)
Gis. 1792. Prael. p. 357: g. Trihilatar.
= Triaspis Burch.

Flabellaria Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 274: nov. g. Dictyotear. (Conferva flabelliformis Desf. — g. Polyporum ibid. p. 299.) *Cf.* Mont. 1849 in Orb. Dict. V. p. 639.
Leman 1816. Dict. v. 1. spl. p. 118: g. Ulvacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Dictyotacear.
Menegh. 1838. Cenni p. 35: g. Siphonear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 128: g. Codiacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Spongodiear.
Math. 1853. Belg. II. p. 499: g. Codiear.
= Udotea et Halymeda Lamx.

Flabellaria Sternb. 1820. Vers. I. p. 32: g. plantar. primordialium.
Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXXIV: g. Palmar. foss. *Cf.* Flora 1827. I. p. 344. — Par. Brongn. 1828. Prodr. p. 120; 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 128. — Endl. 1837. Gen. n. 1779. p. 257; 1841. Ench. p. 136. — Göpp. 1842. Nov. Act. Leop. XIX. 2. p. 120. — Unger 1842. Chlor. prot. p. 41. t. 12—14 (1846. p. LXX); 1845. Syn. pl. foss. p. 182.
Corda 1845. Fl. Vorw. p. 44: g. unicum Flabellariacear.

Flabellaria Chevall. 1826. Fl. Paris. I. p. 239.
= Cladoporus Pers. (Endl.)

Flabellaria Phillips 1829 (?) Geol. Yorksh.
= Solenites Lindl.? (Unger.)

Flabellaria C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 497: subsect. Hypnodendri. (Hypnum myurum Poll.)

Flabellariaceae Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 44: fam. plant. foss. Gen.: Flabellaria.

Flabellarieae Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab.: trib. Gonidiophycear.

Flabellia Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 19. n. 675: g. Vaucheriear. (Flabellariae Lamx. pars.)

Flacourteae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 328: trib. Flacourtiacear. Gen. Flacourtianear. Endl. 1842 et Lunania.

Flacourtia**) „Comm." L'Herit. 1784. Stirp. p. 95.
Roxb. 1795. Corom. I. p. 48. t. 68. 69; 1832. Ind. III. p. 832: g. Dioec. Polyandr.
Pers. 1807. Ench. II. p. 628. n. 2227: g. Dioec. Icosandr. — Par. Roxb. 1819. Corom. III. p. 16. t. 222.

*) „Nomen ab alae forma in flagelli minimi figuram composita."
**) Dicat. Et. de Flacourt, gubernatori Madagasc.

Flacourtia Comm. cont.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 817: g. Tiliacear.
DC. 1824. Pr. I. p. 256: g. Flacourtiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4881; 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 186. n. 7133. Sect. (1841): Flacourtia, Craepaloprumnon. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 440. n. 2179. — Bartl. 1830. Ord. p. 279. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 291. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 133. — Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 363; 1857. ibid. VIII. p. 212.
HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 237: g. Bixinar. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 243.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX: g. Flacourtianear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 29. — Endl. 1839. Gen. n. 5079. p. 921; 1841. Ench. p. 479. Sect.: Ramontchi, Craepaloprumnon. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 228.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 75: g. Bixinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: g. Flacourtear.
Synon. Flacurtia (Comm.?) Juss.

Flacourtiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 49 (*Flacurtiaceae*): fam. Cistariar. Trib.: Patrisieae, Kiggelarieae, Flacourtieae, Erythrospermeae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (12) Thalamiflorar. syncarpar.
Lindl. 1833. Nix. p. 18: ordo Passionalium.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 70) 1847. Veg. kd. p. 327: ordo Violalium. Trib.: Bixeae, Prockeae, Flacourteae, Erythrospermeae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 640. Divis.: Flacourtianeae, Erythrospermeae.
Conf. Bixaceae Endl.

Flacourtianae Agardh 1825. Class. plant. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Valvisporar.

Flacourtianeae DC. 1819. Théor. élém. p. 244; 1824. Prodr. I. p. 255: ordo (13) Thalamiflorar. Trib.: Patrisieae, Flacourtieae, Kiggelarieae, Erythrospermeae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 390. Trib. eaed.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX: div. Samydear. Gen.: Ryania, Patrisia; Flacourtia, Roumea; Kiggelaria, Melicytus, Hydnocarpus; Erythrospermum.
Bartl. 1830. Ord. p. 278: ordo (158) Cistiflorar. Divis. ut DC.
A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 46. Novum genus: Leucocarpum?
Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16): ordo 15 plant. Tribus Candolleanae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 186: div. Capparidear. Subdivis.: Melicyteae, Flacourtieae, Kiggelarieae.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 131: fam. (89) Cistiflorar. Trib. ut DC.
Endl. 1839. Gen. p. 921: trib. Bixacear. Gen.: Flacourtia, Roumea, Melicytus. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1421 et Ench. p. 479) Xylosma, 1842 (Spl. II. p. 75)

Flacourtianeae DC. cont.
Hisingera et 1850 (Spl. V. p. 47) Lunania, Aberia. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 438.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 640: div. Flacourtiacear. Gen. ut Endl. 1839.
Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 362; 1857. ibid. VIII. p. 209. Trib.: Flacourtieae, Azareae, Laetieae, Bixeae, Pangieae.
Conf. Flacurtianae Rich., Flacourtianae Agdh.

Flacourtiae Clos in Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 211: vid. *Flacourtieae.*

Flacourtieae DC. 1824. Prodr. I. p. 256: trib. Flacourtianear. Gen.: Flacourtia, Roumea, Stigmarota. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 291. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). Gen. ead. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 132. Gen. ead. — Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 363; 1857. ibid. VIII. p. 211 (*Flacourtiae*). Gen.: Flacourtia, Hisingera, Xylosma, Aberia, Dovyalis.
Rchb. 1828. Consp. p. 188; 1832. Fl. exc. p. 703 (*Flacurtieae*): div. Capparidear. Gen.: Ochradenus, Rhamnopsis, Roumea, Flacourtia, Stigmarota; Kiggelaria, Hydnocarpus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50: trib. Flacurtiacear. Gen.: Flacourtia, Roumea.
Bartl. 1830. Ord. p. 278: div. Flacourtianear. Gen. ut DC. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 267. Gen. ead. — Rchb. 1841. Nom. p. 186. Gen.: Xylosma, Flacourtia, Roumea.

Flacurtia Juss. 1789. Gen. p. 291: g. Tiliacear. (verar.) — Par. Batsch 1802. Tab. p. 62. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 94.
= Flacourtia Comm.

Flacurtiaceae Dumort. vid. *Flacourtiaceae.*

Flacurtianae Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 366: fam. Exorhizar.
= Flacourtianeae DC.

Flacurtianeae A. Rich. Pl. vasc. Cub. p. 81: vid. *Flacourtianeae.*

Flacurtieae Rchb. vid. *Flacourtieae DC.*

Fladermannia „Bunge Bull. Ac. Pet. VI. Nr. 11. 12" (Nonne potius *Faldermannia?* ex Rchb., q. conf.) Endl. 1841. Spl. I. n. $3602/_1$. p. 1400; 1841. Ench. p. 307: g. Rosmarinear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 366. — Walp. 1845. Rep. III. p. 686.
= Zizyphora Linn. (Benth. in DC. Pr. XII. p. 364.)

Flagellaria Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 122: nov. g. plant.
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 55. n. 133 (Nov. gen. zeyl. p. 8. n. 1048): g. Hexandr. Monogyn.
Linn. 1753. Sp. I. p. 333; 1759. Syst. ed. X. p. 989. n. 406; 1762. Sp. ed. II. p. 475; 1764. Gen. ed. VI. p. 177. n. 450; 1767. Syst. ed. XII. p. 254. n. 445: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 286; 1784. Syst. p. 348. — Reich. 1778. Gen. p. 180. n. 486. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 239. n. 614. — Gmel.

Flagellaria Linn. cont.
1791. Syst. p. 586. — Pers. 1797. Syst. p. 370; 1805. Ench. I. p. 396. n. 877. — Willd. 1799. Sp. II. p. 263. n. 700.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tripetaloidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 167.
Gled. 1764. Syst. p. 75. n. 316: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 85: g. Liliacear. — Par. Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 16.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 61. t. 16. f. 9 (indica).
Juss. 1789. Gen. p. 41: g. Asparagor.
Lour. 1790. Coch. I. p. 211: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Roxb. 1832. Ind. II. p. 154.
Neck. 1790. El. III. p. 196. n. 1564: g. Gonoophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 128: g. Palmar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 102: g. Smilacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 254. n. 1030.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 264. Ed. Nees p. 120: g. Junceis aff., dubiae affinitatis.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 224: g. Ruscinar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 157: g. Juncear.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1163: g. Xiphidiear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Flagelliariear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1054. p. 131; 1841. Ench. p. 76. — Kunth 1841. Enum. III. p. 369. — Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1679. — Meisn. 1842. Gen. p. 406 (310). — Steud. 1855. Glum. II. p. 313. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 249.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 290. n. 1499: g. Sarmentacear. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. XCIV. 1492. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1212.
Bartl. 1830. Ord. p. 40: g. Commelinacear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 13: g. Juncacear.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 134: g. Juncaceis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 188: g. Commelynacear.
Hook. f. 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 198. Subgen.: Euflagellaria, Chortodes.

Flagellaria Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 59. 92; 1816. Nereis brit. ed. alt. (*cf.* Spreng. n. Entd. I. p. 95): nov. g. Fucor. (Fucus confervoides L., etc.)
= Desmarestia Lamx.

Flagellariaceae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 59. 60: fam. Liliariear. Trib.: Flagellarieae, Methoniceae.

Flagellarieae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 60: trib. Flagellariacear. Gen.: Flagellaria.
Endl. 1837. Gen. p. 131; 1841. Ench. p. 76: fam. Junceaceis aff. Gen. id. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 369. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 46: subdiv. Juncear. Gen. id.

Flagellarieae Dumort. cont.
Meisn. 1842. Gen. p. 406 (310): subordo Juncacear. Gen. id.
Steud. 1855. Glum. II. p. 313: fam. Juncear. Gen. id.

Flammella Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *D e;* 1841. Nom. p. 12. n. 502. 3 *d:* subsect. Dermini.
Synon. Flammula Fries.

Flammula Rupp. 1718. Fl. jen. p. 61. Ed. Hall. 1745. p. 68: g. pl. class. IV.
DC. 1818. Syst. I. p. 133; 1824. Pr. I. p. 2: sect. Clematidis. — Par. Link 1822. En. II. p. 90. — Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4946 *a.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 3. — Koch 1836. Syn. p. 2. Ed. II. p. 2. — Endl. 1839. Gen. n. 4768 *b.* p. 844; 1841. Ench. p. 434. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 279. (restrict.) — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 1. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 296. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 3.
Synon. Clematitis Mönch; Stylurus Raf.; Trigula Nor.; Clematopsis Boj.

Flammula Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 250; 1825. Pl. homon. p. 73; 1828. Elench. I. p. 31: trib. Dermini.
Fries 1836. Epicr. p. 182; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 291: subg. Dermini. — Par. Bail 1858. Syst. p. 37. t. 36.
Endl. 1836. Gen. n. 453 *IV f.* p. 40; 1841. Ench. p. 22: subsect. Dermini. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 477. — Math. 1853. Belg. II. p. 358.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.
= Flammella Rchb.

Flammula Webb & Berth. 1836. Phytogr. Canar. I. p. 7: sect. Chrysobatrachii. (Ranunculus ophioglossifolius Vill.)
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 208: subg. Ranunculi. (R. flammula, lingua.)
= Euranunculi Gren. §. 1.

Flaveria Juss. 1789. Gen. p. 186: nov. g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 411.
Gmel. 1791. Syst. p. 1269: g. Syngenes. Necessar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 489. n. 1933.
Willd. 1809. En. p. 941: g. Syngenes. Segregat. — Par. Link 1822. En. II. p. 366.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 553; 1826. Syst. III. p. 500. n. 2737; 1831. Gen. II. p. 620. n. 3078: g. Eupatorinar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 285: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 507. — Bartl. 1830. Ord. p. 141.
Cass. 1820. Dict. p. 17. p. 127; 1825. v. 38: g. Milleriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2708. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 236; 1830. v. 60. p. 577: g. Sigesbeckiear.
Less. 1832. Syn. p. 235: g. Flaveriear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 635. — Endl. 1838. Gen. n. 2571. p. 418; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (132).

Flaveria Juss. cont.
— Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 360. — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3013. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Synon. Vermifuga Ruiz & Pav.

Flaverieae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 233: subtrib. Senecionidear. Gen.: Flaveria, Nauenburgia, Meyera. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 634. Gen.: Flaveria, Broteroa, Clairvillea, Enhydra. — Endl. 1838. Gen. p. 418; 1841. Ench. p. 239. Gen. ead. (1841 exclusa Clairvillea.) — Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132). Gen. ut Endl. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41. Gen.: Broteroa, Flaveria. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. Gen. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 79: div. Calendulariar. Gen. ut Endl. 1841.

Flaviflorae Nees 1833. Progr. p. 17: div. Laurear. Gen.: Sassafras, Benzoin.
Nees 1836. Laurin. p. 484: trib. Laurinar. Gen. ead.
Endl. 1838. Gen. p. 322; 1841. Ench. p. 198: trib. Laurinear. Gen. ead. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 473. Gen. ead.
Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239): trib. Laurear. Gen. ead.
= Benzoineae Rchb.

Fleischeria*) Steud. & Hochst. mss.
= Lasiospora Cass.? (Endl. Gen. p. 497.)

Fleischeria Steud. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 236: nov. g. Büttneriacear. (F. pubens.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 110: g. Lasiopetalear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.
Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 365: g. Malvacear., Lawrenciae proximum. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 140.

Fleischmannia Rchb. 1841. Nomencl. p. 236: novum nomen pro *Hartmannia Spach* propositum.

Fleischmannia**) Schultz Bip. 1850. Flora p. 417: nov. g. Eupatoriear. (F. rhodostyla.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 907: g. Adenostylear.

Flemingia***) Roxb. 1819. (?) Pl. Corom. III. p. 44. t. 248. 249; 1832. Fl. Ind. III. p. 337: nov. g. Diadelph. Decandr. (F. stricta, semialata.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 761; 1826. Syst. III. p. 194; 1831. Gen. II. p. 575. n. 2809: g. Leguminosar. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 131. — Link 1822. En. II. p. 249.
Bronn 1822. Diss. p. 133 (*Flemmingia*): g. Coronillear.
D. Don 1825. Nepal. p. 242: g. Papilionacear.
DC. 1825. Pr. II. p. 351: g. Euhedysarear. Sect.: Flemingiastrum, Ostryodium. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 309. Sect. eaed.

*) Dicat. Franc. Fleischer, botanico, collectori.
**) Dicat. Dr. Gothofr. Fleischmann, prof. Erlangensi.
***) Dicat. Dr. John Fleming, medico Bengal.

Flemingia Roxb. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 3996: g. Onobrychear. Sect. ut DC. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 156.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 241: g. Euphaseolear.
Meisn. 1837. Gen. p. 94 (66): g. Phaseolear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 131.
Endl. 1841. Gen. n. 6697. p. 1301; 1841. Ench. p. 672: g. Rhynchosiear. Sect. ut DC. et Chalaria. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5847 (*Flemmingia*). Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 161. Sect. eaed. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 568.
Synon. Millingtonia Roxb.

Flemingia Roxb. herb. ex Steud. Nomencl. I. p. 643. (Fl. decussata et virgata.)
= Canscora Lam.

Flemingiastrum DC. 1825. Prodr. II. p. 351: sect. Flemingiae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 3996 *a*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 309. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 241. — Endl. 1841. Gen. n. 6697 *a*. p. 1301; 1841. Ench. p. 672. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 163.

Flemmingia Ham. . . .
= Thunbergia Retz.

Flemmingia Bronn, Rchb. vid. *Flemingia Roxb.*

Flessera Adans. 1763. Fam. II. p. 192: g. Labiatar. (*Betonica Pluk.* t. 150. f. 3; *Nepeta Barrel.* ic. 1131.)
Lophanthus Adans.?

Fleura Steud. Nomencl. I. p. 643: lege *Fleurya Gaudich.*

Fleurotia Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 90. n. 3516: g. Xeranthemear. (*Siebera Gay*, non Schrad.)
= Siebera Gay.

Fleurya*) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 497: nov. g. Urerear. (Urtica divaricata L.) — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24. — Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 182 (*cf.* Flora 1855. p. 517); 1857. ibid. VII. p. 353.
Endl. 1837. Gen. n. 1879 *d*. p. 283; 1841. Ench. p. 170: sect. Urticae.
Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259): g. Urticacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262. — Wedd. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 204.
Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2485: g. Urticear. (genuinar.) — Par. Benth. 1849. Niger Fl. p. 517. — Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 195.
Synon. Schychowskya Endl.

Flexularia Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 105: nov. g. Graminear., intermedium inter Mühlenbergiam et Panicum. *Cf.* Schult. 1824. Mantissa II. p. 208 sub Mühlenbergia.

Flindersia**) R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 595 (Verm. bot. Schr. I. p. 135): nov. g. Cedrelear. *Cf.* Bull. soc.

*) Dicat. J. F. Fleury, botanico gallico.
**) Dicat. Math. Flinders, navarcho.

Flindersia R. Brown cont.
philom. 1815. p. 136. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXVI. 463. n. 1000. — DC. 1824. Pr. I. p. 625. — Rchb. 1828. Consp. p. 212. n. 5519; 1837. Hdb. p. 313; 1841. Nom. p. 213. n. 8090. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 357. — A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 253. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 172. — Meisn. 1837. Gen. p. 47 (35). — Endl. 1840. Gen. n. 5554. p. 1054; 1841. Ench. p. 553. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 130. 136. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 462.

Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 149: g. Meliaceis aff.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 794. n. 889: g. Meliacear.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 189. n. 959: g. Melieis aff. — Simil. Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 836.

G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 688: g. Cedreleacear.

Floccaria Greville . . . . Scot. t. 301.
= Penicillium Link. (Endl. Gen. p. 19.)

Flörkea*) Willd. 1801. N. Schr. nat. Fr. Berl. III. p. 448: nov. g. Hexandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 151. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 393. n. 868. — Hedw. 1806. Gen. p. 226. n. 919. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 228. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 135. n. 1325.

Rchb. 1828. Consp. p. 46. n. 1813; g. Hydrocharear.

Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. x. 53: g. Portulacear.? — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 246. n. 1285. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1038. 1052.

R. Brown 1833 in Lond. and Edinb. phil. mag. III. p. 71 (Verm. bot. Schr. V. p. 458 et Isis 1835. p. 574): g. Limnanthear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 290; 1841. Nom. p. 201. n. 7672. — Meisn. 1838. Gen. p. 135 (99). — Endl. 1840. Gen. n. 6065. p. 1176; 1841. Ench. p. 628. — Walp. 1842. Rep. I. p. 467. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 367.

Lindl. 1834 in Hook. journ. bot. I. p. 1: g. Sanguisorbear.

Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 210: g. Limnanthacear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 378.

Flörkea Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 523: nov. g. Campanulear. (Campanula marsupiiflora Fisch.)

Spreng. 1825. Syst. I. p. 735: sect. Campanulae.
= Adenophora Fisch.

Flörkeales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 16: nixus Gynobasicar. Ordo unicus: Lymnantheae.

Florestina Cassini 1815. Bull. soc. philom. p. 175; nov. g. pro Stevia pedata Cav. indicatum.

Cass. 1817. Bull. soc. philom. p. 11: g. Helianthear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 142.

*) Dicat. Gust. Henr. Flörke, Berolin.

Florestina Cassini cont.
Cass. 1820. Dict. v. 17. p. 155; 1821. v. 20. p. 348; 1825. v. 38. p. 16: g. Heleniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2585; 1841. Nom. p. 83. n. 3181. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18. — Brongn. 1843. En. genr. p. 41. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 266; 1830. v. 60. p. 575: g. Hymenopappear.

Less. 1832. Syn. p. 239; subg. Achyropappi.

DC. 1836. Pr. V. p. 655: g. Euheleniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2589. p. 421; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 206 (133).
Synon. Lepidopappus Fl. mexic.

Florestinaria Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 369: sect. Palafoxiae. (Florestina callosa DC.)

Floribundi Linn. 1747. Class. pl. p. 418: ordo 7 methodus calycinae. Gen.: Elaeagnus, Isnarda, etc.

Floridae Spreng. 1827. Syst. IV. p. 312: fam. Algar. Gen.: Claudea, Wormskioldia, Amansia, Bonnemaisonia, Halymenia, Grateloupia, Thamnophora, Sphaerococcus, Chondria, Rhodomela, Thaumasia, Ptilota, Polyides, Liagora, Amphiconium. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 749. Gen. ead. (omissis Halymenia, Thaumasia et Amphiconio) et Rhytiphloea, Alsidium.

Endl. 1836. Gen. p. 7; 1841. Ench. p. 6: ordo Algar. Gen.: Polyides, Digenea, Ptilota, Rhodomela, Chondria, Halymenia, Corallopsis, Sphaerococcus, Botryocarpa, Thamnophora, Grateloupia, Bonnemaisonia, Microcladia, Delesseria, Amansia, Claudea, Thaumasia.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 104: ordo 4 Algar. Subordines: Apolyothalamae, Centrothalamae, Gymnothalamae, Actinothalamae.
Conf. seq.

Florideae (Floridées) Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 115: ordo Thalassiophytor. non articulator. Gen.: Claudea, Delesseria, Chondrus; Gelidium, Laurencia, Hypnea, Acanthophora, Dumontia, Gigartina, Plocamium, Champia. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 17. p. 158.

Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XIII. 21: sect. Algar. Gen.: Lamourouxia, Delesseria, Sphaerococcus, Chondria, Champia, Ptilota, Halymenia.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 319. 362: div. Thalassiophytor. Gen.: Delesseria, Odonthalia, Sphaerococcus, Gigartina, Gastridium.

Agdh. 1821. Aphor. p. 99; 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 583: ordo Algar. Gen.: Liagora, Polyides, Chondria; Digenea; Halymenia, Rhodomela, Sphaerococcus, Thamnophora; Grateloupia, Ptilota, Bonnemaisonia, Delesseria, Oncillia. — Par. Agdh. 1822. Sp. Alg. I. 2. p. 169. Gen. ead. et Amansia. — Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXXIII. 193. Gen. ead. et Thaumasia, Dasia. — Bartl. 1830. Ord. p. 10.

Florideae Lamx. cont.
— Endl. 1843. Spl. III. p. 33. Trib. ut J. Agdh. 1842. (Lomentarieae loco Chondriear.) — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 8; 1846. Chl. prot. p. XXVI. Gen.: Münsteria, Baliostichus, Chondrites, Halymenites, Rhodomelites, Sphaerococcites, Delesserites.
Fries 1825. Pl. homon. p. 330: ordo Hydrophycar. Gen.: Oneillia, Delesseria, Halymenia, Amansia, Bonnemaisonia, Sphaerococcus, Thamnophora, Dasia, Chondria, Ptilota, Rhodomela, Rhytiphlaea, Champia, Griffitsia, Ceramium, Callithamnion; Digenea?
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 796: div. Algar. aquaticar. Gen.: Sphaerococcus.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 359: ordo Symphysistear. Gen.: Claudea, Delesseria, Odonthalia, Delisea, Dawsonia, Halymenia, Chondrus, Ptilota, Grateloupia, Gelidium, Laurencia, Plocamium, Acanthophora, Hypnea, Dumontia, Gigartina, Polyides, Sporochnus, Lomentaria, Bonnemaisonia.
Rchb. 1828. Consp. p. 27 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Ascophycar. Divis.: Ceramiaceae, Sphaerococceae, Halymeniaceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 136. Divis.: Cladostepheae, Polyideae, Rhodomeleae.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. Parenchymaphyllosporor. Sect.: Ceramiacea, Sphaerococcea, Halymeniacea.
Menegh. 1838. Cenni p. 37: fam. Algar. Gen.: Claudea, Amansia, Delesseria, Nitophyllum, Hymenema, Rhodomenia, Botryocarpa, Thamnophora, Plocamium, Microcladia, Odonthalia, Dictyomenia, Rhodomela, Alsidium, Bonnemaisonia, Laurencia, Chondria, Corallopsis, Acanthophora, Gracilaria, Chondrus, Phyllophora, Sphaerococcus, Bowiesia, Gelidium, Gigartina, Grateloupia, Hypnea, Ptilota, Liagora. — Par. J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 54. Trib.: Ceramieae, Cryptonemeae, Chondrieae, Rhodomeleae, Sphaerococcoideae, Delesserieae.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 398: trib. Rhodospermear. Gen.: Delesseria, Nitophyllum, Hymenena, Rhodomenia, Chondrus, Phyllophora, Grateloupia, Gelidium, Hypnea, Gigartina, Thamnophora, Plocamium, Chylocladia; Botryocarpa, Rhodomela, Polyzonia, Laurencia, Champia; Ptilota. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 6. 54. Gen. fere ead. et Microcladia, Odonthalia, Bonnemaisonia, Sphaerococcus.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 150; 1849 in Orb. Dict. V. p. 647: trib. Phycear. Gen.: Delesseria, Aglaophyllum, Rhodymenia, Plocamium, Rytiphloea, Rhodomela, Alsidium, Laurencia, Lomentaria, Chondrus, Gelidium, Gigartina, Hypnea, Ptilota.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 126: series Fucacear. Divis.: Sphaerococceae, Cryptocarpeae, Ceramieae.
Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 259: ordo Fucacear. Fam. ut Fries 1846 et Rhodomeleae.

Florideae Lamx. cont.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . fam. plantar. ab Algis distincta. Ord.: Ceramiaceae, Delesseriaceae, Rhodomeniaceae, Lomentariaceae, Phyllophoraceae. *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 768 et Flora 1848. p. 619.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: fam. II. Phycear. Trib.: Ceramieae, Haloplegmeae, Cryptonemeae, Chaetangieae, Euctenodonteae, Corallineae, Lomentarieae, Rhodomeleae, Polyphaceae, Anomalophylleae, Thuretieae, Plocarieae, Rhizophyllineae, Delesserieae.
Math. 1853. Belg. II. p. 478: trib. 1 Algar. Gen.: Plocamium, Delesseria, Lomentaria, Laurencia, Volubilaria, Bostrychia, Gigartina, Dumontia, Gelidium, Chondrus, Halymenia.
Conf. Floridae Spreng.

Floridei Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 148: ordo Hydrophytor. Fam.: Gigartineae, Halymeniae, Delesseriae, Ulvaceae.

Floridoites Sternb. 1838. Vers. II. p. 25: subordo 3 Algacitum. Gen.: Rhodomelites, Chondrites, Sphaerococcites, Halymenites, Baliostichus, Münsteria, Delesserites.

Florinda Noronha.
= Polycardia Juss. (Endl. Gen. p. 1086.)

Flos clitorius Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 100.
= Clitoria Linn.

Floscopa*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 192. Ed. Willd. p. 238: nov. g. Hexandr. Monogyn. (F. scandens.) *Cf.* Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 160. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 374. n. 824. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 126. n. 1304; 1830. Gen. I. p. 246. n. 1287. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1052.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 101: g. Smilacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 225. n. 918. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 877. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XII. 76.
Agdh. 1823. Aphor. p. 168: g. Commelinear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 129. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 542.
Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1341: g. Dioscorear.?
Endl. 1841. Gen. n. 6885. p. 1332; 1841. Ench. p. 685: inter genera dubiae sedis. *Cf.* Meisn. 1843. Comm. p. 373.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 116: g. Commelynear. dubium.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 122: g. Commelinacear.
Hassk. 1852. Pl. Jungh. II. p. 151 *(Floscopae)*: g. Commelynacear. (*Synon. Dithyrocarpus Kunth.)*

Flosculacia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 55: stirps Corticaliae. Ordines: Ligulacia, Tubulacia.

Flosculosae Tourn. (class. XII.) et Desfont. *Cf.* Cassini 1820. Dict. v. 17. p. 161.
Scop. 1777. Intr. p. 123: div. gentis II. Compositar. Gen. §. 1: Calcitrapa, Cirsium, Carduus, Attractilis, Rhaponticnm, Centau-

*) Nomen a spicis in formam scopae collectis.

Flosculosae Scop. cont.
rea, Cynara, Carthamus, Carlina, Arctium, Meisteria, Veltis, Mitina, Acosta, Polycephalos, Gundelia, Oedera, Kosaria, Sphaeranthus, Elephantopus, Echinops, Onopordon. §. 2: Ambrosia, Xanthium, Artemisia, Tarchonanthus, Pteronia, Stähelina, Xeranthemum, Calea, Athanasia, Ceruana, Micropus, Bidens, Spilanthus, Carpesium, Tanacetum, Ethulia, Santolina, Leighia, Ageratum, Kleinia, Adenostemma, Cacalia, Tussilago, Shawia, Kuhnia, Eupatorium, Filago, Perdicium, Chrysocoma, Conyza.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 885: sect. Synantherar. Typi subsectionum: Cynara, Centaurea, Echinops, Balsamita, Tanacetum, Gnaphalium, Eupatorium, Santolina.

Flosculosi Linn. 1747. Class. pl. p. 353: nomen class. XII. Tournefortianae. Gen.: Xanthium, Ambrosia, etc.

Flos-scopae Hassk. vid. *Floscopa Lour.*

Flotovia*) Spreng. 1826. Syst. III. p. 359. 506. n. 2754; 1831. Gen. II. p. 626. n. 3108: nov. g. Perdiciear. (Joannea brasiliensis Spr.)
Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2274: g. Mutisiear.? — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Less. 1830. Linnaea V. p. 248; 1832. Syn. p. 95.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 20. t. 32.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 10: g. Eumutisiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2908. p. 482; 1841. Ench. p. 247 *(Flotowia)*. — Meisn. 1839. Gen. p. 228 (141).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10: g. Stähelinear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3798: g. Chuquiragear. Sect.: Flotovia, Piptocarpidia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: g. Barnadesiear.
Synon. Erinesa Don; Piptocarpha Hook. & Arn.

Flotowia Endl. vid. *Flotovia Spreng.*

Flourensia**) DC. 1836. Prodr. V. p. 592: nov. g. Coreopsidear. (Helianthus thurifer Mol.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2539. p. 413; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 203 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3603. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20: g. Helianthear. verar.

Flourensia Cambess. .... in Jacquem. voy. Bot. t. 29.
= Thylacospermum Fenzl. (Endl. Gen. p. 967.)

Flox „Theophr." Adans. 1763. Fam. II. p. (22): g. Alsinium.
= Coronaria Adans.

Floyeria Necker 1790. Elem. bot. I. p. 386. n. 604: nov. g. Plasyrgophytor., species Exaci Aubl. continens.

*) Dicat. Jul. de Flotow, botanico silesiaco.
**) Dicat. P. Flourens, physiologo.

Flüggea*) Willd. 1805. Spec. IV. p. 757. n. 1784; 1809. Enum. p. 1013: nov. g. Dioec. Pentandr.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 888: g. Linozostear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 194: g. Euphorbiacear. — Par. A. Juss. 1824. Euphorb. p. 16.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 825. n. 939; 1830. Gen. I. p. 204. n. 1038: g. Tricoccar. (in Pentandr. Monogyn.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 578. 873.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5098; 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 195. n. 7438: g. Buxear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 370. — Endl. 1840. Gen. n. 5860. p. 1122; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 344 (255). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Synon. Fluggea Pers. et Alior.

Flüggea Rich. 1808 in Schrad. n. Journ. II. 1. p. 8. t. 1 A: nov. g. Liliacear. (Convallaria japonica L.)
Schult. 1829. Syst. VII. p. XXIV. 308: g. Sarmentacear.
Kunth 1844. Abh. Berl. Ak. f. 1842. p. 53; 1850. ibid. f. 1848. p. 44; 1850. Enum. V. p. 301: g. Ophiopogonear.
= Slateria Desv.

Fluggea Pers. 1807. Ench. II. p. 616. n. 2214: g. Dioec. Pentandr.
Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 164: g. inter Rhamneas et Euphorbiaceas intermedium.
Link 1822. En. II. p. 425: g. Terebinthacear.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 580: g. Phyllanthear.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486: g. Buxear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 81.
Baill. 1858. Euphorb. p. 590: g. Wielandiidear. Sect.: Eufluggea, Geblera, Gelfuga.
= Flüggea Willd.

Fluidacia Dumort 1822. Comm. bot. p. 70. 93: class. III. Vegetabilium. Stirpes: Soligrania, Cocculinia, Fartinia.

Fluminia Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 77: nov. g. Airear. (Festuca arundinacea Liljebl. = Festuca borealis Mert. & Koch.)

Fluviales Vent. 1799. Tabl. II. p. 80: ordo 1 class. II. Gen.: Potamogeton, Ruppia, Zanichellia, Zostera.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 50. t. 9. Gen.: Hippuris, Chara, Ceratophyllum, Naias, Saururus, Aponogeton, Potamogeton, Uvirandra, Ruppia, Zanichellia, Callitriche, Lenticula.
Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365: fam. Endorhizar. Gen.: Naïas, Zostera, Caulinia, Ruppia, Zanichellia, Potamogeton.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (258) Spadicear.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Homorganor. floriferor.
Lindl. 1833. Nix. pl. p. 35: nixus Imperfectar. Ordines: Fluviales, Juncagineae, Pistiaceae.

*) Dicat. J. Flugge, monogr. graminum auctori.

Fluviales Vent. cont.
Endl. 1837. Gen. p. 229; 1841. Ench. p. 124: class. Amphibryor. Ordines: Najadeae, Lemnaceae.
Kunth 1841. Enum. III. p. 111: ordo Monocotyledonum. Trib.: Najadeae, Zostereae, Posidonieae, Ruppieae, Zannichellieae, Potamogetoneae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. XVI. 29: class. Monocotyledonear. Fam.: Hydrocharideae, Butomeae, Alismaceae, Najadeae, Lemnaceae.
Fluvialis Vaillant 1719. Mém. Ac. Paris. p. 13: nov. g. plantar.
Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 11. t. 8: g. pl. class. I.
Adans. 1763. Fam. II. p. 472: g. Arorum. = Najas Willd.
Fluvialis Hoffm. 1804. Bot. Taschenb. p. 251: g. Monoec. Polyandr. (Najas minor.)
Pers. 1807. Ench. II. p. 530. n. 2017. g. Monoec. Monandr.
= Caulinia Willd.
Fluviatiles Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 31: fam. plant. endogenar. phanerogamar. Gen.: Zannichellia, Ruppia, Potamogiton, Zostera.
Foandseia Hassk. vid. *Voandzeia.*
Fockea*) Endl. 1839. Nov. stirp. I. p. 21: nov. g. Asclepiadear. (Cynanchum crispum Jacq.) — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626 (verar. — *Hockea).*
Endl. 1841. Spl. 1. n. 3504/1. p. 1399; 1841. Ench. p. 299: g. Tylophorear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (177). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5044.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 545: g. Eustegiar.
Synon. Chymocarpus Harv. (Endl. Spl. III. p. 76.)
Foenicula Adans 1763. Fam. II. p. 101: sect. 7 Umbellatar. Gen.: Foeniculum, Peucedanum, Lindera, Arduina, Ligusticum, Cachrys, Apium, Smyrnium, Bupleurum.
Foeniculum Tourn. 1700. Inst. p. 311. t. 164: g. pl. class. VII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 266. Ed. Hall. 1745. p. 278: g. pl. class. XII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 425: g. Umbelliferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 115. — Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 120. — Link 1821. En. I. p. 284. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 525. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 99. (Divis. 1.) — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Adans. 1763. Fam. II. p. 101: g. Foeniculor.
Hill 1769. Ht. kew. p. 103 *(Faeniculum)*: g. Umbellatar. — Par. Gaud. 1828. Helv. II. p. 20. 387.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 104. t. 23. f. 5 (vulgare).
Neck. 1790. El. I. p. 189. n. 321: g. Scadiophytor.
Mönch 1794. Meth. p. 87: g. Thalamostemonis.

Foeniculum Tourn. cont.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 112; 1836. Syn. p. 293. Ed. II. p. 323: g. Seselinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3704; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 140. n. 5417. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34. — DC. 1830. Pr. IV. p. 142. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 306. — Tausch 1834. Flora I. p. 355. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 370. — — Meisn. 1838. Gen. p. 145 (105). — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 137 *(Faeniculum).* — Endl. 1839. Gen. n. 4425. p. 774; 1841. Ench. p. 378. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 954. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 203. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 111. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 271. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 712. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 590 *(Fenouil).*
Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 386: g. Seselinar. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 465.
Link 1829. Hdb. I. p. 324: g. Pimpinellear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 357: g. Pleurospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.
Foenum graecum Tourn. 1700. Inst. p. 409. t. 230: g. pl. class. X.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 254. Ed. Hall. 1745. p. 263: g. pl. class. XI.
Medic. (Vorles. II. p. 383) 1789. Vorles. IV. 1. p. 354; 1789. Phil. Bot. I. p. 210. (Trigonella f. gr. L.)
Mönch. 1794. Meth. p. 142: g. Thalamostemonis.
Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 182: sect. Trigonellae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3872*b*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 174. — Koch 1836. Syn. p. 165. Ed. II. p. 181. — Endl. 1840. Gen. n. 6508*b*. p. 1267; 1841. Ench. p. 668. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 531. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 397.
Försteria Scopoli 1777. Introd. p. 98. n. 221: g. Disparium.
= Breynia Forst.
Foetidaria A. St. Hilaire 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. III. p. 191: nov. g. Fungor. — Par. Montagne 1837. ibid. VIII. p. 363. (inter Phallum et Clathrum intermedium.)
„Mont." Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Phalloideor.?
= Spadonia Fries?
Foetidia Gmel. 1791. Syst. p. 793: g. Polyandr. Monogyn.
Willd. 1799. Sp. II. p. 980. n. 978: g. Icosandr. Monogyn. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 501. n. 1848. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 498.
Batsch 1802. Tab. p. 13: g. Myrtoidear.
Pers. 1807. Ench. II. p. 33. n. 1214: g. Myrtacear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 871 (dubium). — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 106. — Endl. 1840. Gen. n. 6328. p. 1234; 1841. Ench. p. 651.

*) Dicat. G. W. Focke, medico Bremensi.

Foetidia Gmel. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4502: g. Gaurear.?
Spreng. 1830. Gen. I. p. 411. n. 2054: g. Myrtear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 109 (77)? — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 124.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 46: g. Barringtoniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 175. n. 6807.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 755: g. Barringtoniacear.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 143: g. Combretaceis aff.
= Faetidia Comm.

Foliosae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XXVI: series Venosar. Fam.: Aristolochieae, Euphorbiaceae, Laurinae.
Rchb. 1828. Consp. p. 85; 1831. Fl. exc. p. 145. 182: formatio Venosar. Fam.: Piperaceae, Aristolochieae, Laurineae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 161; 1841. Nom. p. 68. Fam.: Aristolochiaceae, Nyctagineae, Laurineae.

Folliculares Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 533: subordo Proteacear. Trib.: Grevillidae, Banksidae.

Folliculites Zenker 1833. Neues Jahrb. f. Miner. p. 177.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 251; 1846. Chlor. prot. p. LXXXVII: g. incertae sedis.

Fomes Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 47. 49. (*cf.* Flora 1852. p. 682): subg. Polypori. Trib.: Mesopodes, Pleuropodes, merismoidei, fomentarii, impoliti, laevigati.

Fonna Adans. 1763. Fam. II. p. 214: g. Personatar. (*Lychnidea Dill.* Elth. t. 166.)
= Phlox Linn.

Fontanesia*) Labill. 1791. Syr. Decad. I. 1. t. 1.
Willd. 1797. Sp. I. p. 52. n. 42; 1809. En. p. 14: g. Diandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 10. n. 44. — Vahl 1805. Enum. I. p. 37. n. 20.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 308: g. Lilacear.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 193.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 241: g. Jasminear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 9. 346. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 58. 265. n. 98. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 471; 1825. Syst. I. p. 36. n. 63; 1830. Gen. I. p. 28. n. 119. — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 220. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 29. 36.
Link 1821. En. I. p. 34: g. Oleinar.
Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 200: g. Oleinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 218.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: g. Callitrichear.
Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4489: g. Jussieuear.?
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Lilacinear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 286.

*) Dicat. René Louiche Desfontaines.

Fontanesia Labill. cont.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 51: g. Syringear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 73. — DC. 1844. Pr. VIII. p. 280.
Endl. 1838. Gen. n. 3354. p. 573; 1841. Ench. p. 287: g. Fraxinear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 256 (166). — Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5230. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 617.

Fontenella Walp. vid. *seq.*

Fontenellea*) St. Hilaire & Tulasne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 141: nov. g. Rutacear.
Walp. 1842. Rep. I. p. 524 (*Fontenella*): g. Zanthoxylear.
Meisn. 1843. Comm. p. 347: g. Zygophyllear.?
= Quillaja Molin.

Fontilapathum Lobel. 1591. Stirp. Ic. 286.
= Potamogeton Tourn.

Fontinalaceae Bruch, Schimp. . . . . Bryol. eur. V: fam. Muscor. Gen.: Fontinalis, Dichelyma.

Fontinaleae Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 45: fam. Muscor. Gen.: Fontinalis.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 244: subdiv. Clonocarpor. Gen. id.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: trib. Pleurocarpor. Gen. id. et Dichelyma.

Fontinalideae Bayrh. 1849. Taunus p. 25: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Fontinalis.

Fontinalis Linn. 1737. Gen. p. 323. n. 791; 1740. Syst. p. 32; 1751. Phil. bot. p. 35; 1753. Sp. II. p. 1107; 1759. Syst. ed. X. p. 1332. n. 1053; 1763. Sp. ed. II. p. 1571; 1764. Gen. ed. VI. p. 562. n. 1190; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 699: g. Muscor. — Par Dill. 1741. Hist. Musc. p. 254. t. 33. — Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 95. — Gled. 1749. Berl. V. p. 135. — Adans. 1763. Fam. II. p. 492. — Scop. 1772. Carn. II. p. 306. (calyptrator.) — Murr. 1774. Syst. p. 795; 1784. Syst. p. 945. — Reich. 1778. Gen. p. 558. n. 1306. — Hedw. 1782. Fund. II. p. 96; 1801. Spec. p. 298. (frondosor.) — Juss. 1789. Gen. p. 11. — Lour. 1790. Coch. II. p. 684. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 759. n. 1655. — Gmel. 1791. Syst. p. 1324. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Mönch 1794. Meth. p. 748. — Pers. 1797. Syst. p. 985. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 51. — Roth 1800. Germ. III. p. 260. — DC. 1805. Franç. II. p. 544; 1815. V. p. 236. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 74. — Mart. 1817. Erlang. p. 53. — Leman 1820. Dict. v. 17. p. 232. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 749. — Agdh. 1822. Aphor. p. 109. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 187. n. 3330; 1831. Gen. II. p. 734. n. 3723. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 204. (odontostomor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 31.
Gled. 1764. Syst. p. 294. n. 1190: g. Muscorar. (calyptratar.) — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 450.

*) Dicat. Bernard le Bovier de Fontenelle.

Fontinalis Linn. cont.
Neck. 1790. El. III. p. 332. n. 1743: g. Phryganophytor.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 79: g. Calyptrator.
Brid. 1797. Musc. rec. I. p. 177; II. 3. p. 157; 1817. Suppl. III. p. 107: g. Diploperistomator.
Batsch 1802. Tab. p. 264: g. Muscoideor.
Palis. 1805. Pr. Aeth. p. 30; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 468: g. Diplopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 223.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 38: g. Mitrocarpor.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 186: g. Peristomor. Pleurocarpor.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 319: g. Hypnoidear.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 654: g. Pleurocarpor. peristomor. (ibid. p. XLVI g. Brachypodum.)
Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 553: g. Fontinaloideor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: g. Hypnear.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Fontinaloidear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 86. — Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 700: g. Pleurocarpor. diploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 592. p. 57; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.
Genth 1836. Nass. I. p. 309: g. Hypnoideor.
Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 45: g. Fontinalear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 244. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400.
Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 970: g. Calyptrobryor.
Bayrh. 1849. Taun. p. 25: g. Fontinalidear.
Bruch. Schimp. . . . . Bryol. eur. V: g. Fontinalacear.

Fontinalis Savi 1824. Poll. Fl. Veron. III. p. 385. (*F. Juliana.*)
= Octodiceras Brid.

Fontinalis C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 148: sect. Pilotrichi.
Synon. Hydropogon Brid.; Cryptangium Müll.

Fontinaloidea Rchb. 1828. Consp. p. 32: subdiv. Maschalocarpior. Gen.: Hookeria, Distichia, Erpodium, Leptodon, Esenbeckia, Cryphaea, Pilotrichum, Lepidopilum, Fontinalis, Spiridens.

Fontinaloideae Fürnrohr 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: fam. 15 Muscor. Gen.: Anoectangium, Cinclidotus, Fontinalis.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92: div. Bryacear. Gen.: Fontinalis, Dichelyma.

Forbesia Ecklon 1827. Verz. p. 4: nov. g. Liliacear. (*Hypoxis plicata L.*)
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1652: g. Hypoxidear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 115.

Forbesia Ecklon cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 154: g. Hypoxidacear.
Curculigo Gärtn.

Forbicina Ponted. 1720. Dissert. (Linn. 1747. Class. pl. p. 530): g. Radiator.
Verbesina Linn.

Forchhammeria*) Liebm. 1853. Vetensk. Meddel. p. 93 (*Nov. pl. mex. gen. dec. nr. 3*): nov. g. Capparear. (*F. pallida.*) *Cf.* Müll. Ann. bot. VII. p. 192.

Forestiera**) Poir. 1811. Suppl. II. p. 66; 1820. Dict. v. 17. p. 238: nov. g. Jasminear.
Endl. 1837. Gen. n. 1896. p. 288; 1841. Ench. p. 174: g. Forestierear. — Par. Benth. 1840. Pl. Hartweg. p. 29. — Meisn. 1841. Gen. p. 347 (257). — Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2510. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 79.
Rchb. 1837. Hdb. p. 170: g. Daphnear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 283: g. Scepacear.
Tulasne 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 263: g. Oleacear.
Synon. Bigelowia Smith; Borya Willd.; Adelia Rich.

Forestiereae Endl. 1837. Gen. p. 288: fam. Antidesmeis aff. Gen.: Forestiera. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1376 et Ench. p. 174) Piptolepis.
Benth. 1840. Pl. Hartweg. p. 29: fam. affinitatis dubiae. (An forma depauperata Oleacear.?) Gen.: Forestiera, Piptolepis.
Meisn. 1841. Gen. p. 347 (257): ordo Juliflorar. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 67: subdiv. Urticear. Gen. ead.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 79: fam. Crotoninear. Gen.: Forestiera.

Forficaria Lindl. 1838. Orchid. gen. p. 362: nov. g. Ophrydear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $1537/_4$. p. 1366; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1886. — Meisn. 1842. Gen. p. 381 (286). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Disidar.

Forgerouxa Necker 1790. Elem. bot. II. p. 124. n. 804: nov. g. Plyroutophytor., a Rhamno L. disjunctum.
= . . .?

Forgesia***) „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 164: nov. g. Campanulacear. — Par. Poir. 1819. Dict. v. 13. p. 100.
Gmel. 1791. Syst. p. 353: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 194. n. 432. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 723. n. 786.
Batsch 1802. Tab. p. 29: g. Saxifragear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 167. n. 843. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 740.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 366: g. Campanulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 140. n. 602.

*) Memoriae Forchhammeri, prof. Hafn. dicatum.
**) Dicat. Charles Leforestier.
***) Dicat. Desforges.

Forgesia Comm. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4217: g. Cunoniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 313. (desciscentium?)
A. DC. 1830. Mon. Camp. p. 93: g. Escalloniear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 5. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 6. — Rchb. 1837. Hdb. p. 233; 1841. Nom. p. 160. n. 6252. (genuinar.) — Meisn. 1838. Gen. p. 137 (101). — Endl. 1839. Gen. n. 4676. p. 822; 1841. Ench. p. 410.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 195: g. Escallonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 752: g. Escalloniacear.
Synon. Defforgia Lam.; Desforgia Steud.

Fornasinia*) Bertol. 1849. Misc. bot. VIII. (Act. Bonon.): nov. g. Dalbergiear., Lonchocarpo et Neuroscaphae aff. *Cf.* Bot. Zeit. 1850. p. 709; Hook. Journ. bot. IV. p. 95 et Griseb. Jahresber. f. 1851. p. 390.
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 366: g. Galegear.
= Millettia Wight & Arn.?

Fornea Steud. Nomencl. I. p. 644: vid. *seq.*

Forneum Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.
= Andryala Linn.

Fornicaria Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 291: sect. Dendrocollae.
Lindl. 1833. Orchid. p. 241: sect. Aëridis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1493 *c.* p. 206; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2098. 3. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 697.

Fornicium Cassini 1819. Bull. soc. philom. Juin p. 93; 1820. Dict. v. 17. p. 249: nov. g. Carduinear. (F. rhaponticoides.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12.
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 310. 320; 1830. v. 60. p. 572: g. Rhaponticear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2313.
Bartl. 1830. Ord. p. 144: g. Carduacear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 665: sect. Leuzeae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2895 *b.* p. 480; 1841. Ench. p. 247. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3889. 2. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 752.
Synon. Halocharis Bieb.; Malacocephalus Tausch.

Forrestia**) Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 168: nov. g. Ceanotho aff.
= Ceanothus Linn.

Forrestia A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 1: nov. g. Asparaginear.
Endl. 1837. Gen. n. 1036. p. 126; 1841. Ench. p. 71: g. Commelynacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 188.
Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1539: g. Commelynear. (genuinar.) — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 116 (dubium).
Meisn. 1842. Gen. p. 407 (311): g. Tradescantiear.

*) Dicat. Fornasini.
**) Collegit Forrest.

Forrestia A. Rich. cont.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 122: g. Commelinacear.
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 547: g. Commelinear.

Forrestiereae Endl. vid. *Forestiereae.*

Forsgardia Flor. Flum. IV. t. 13: g. Octandr. Monogyn. (laevis) ex Steud. Nom. I. p. 644.
= Combretum Löfl.

Forshohlea Batsch vid. *Forskohlea.*

Forskaelea Scopoli vid. *praeced.*

Forskahlea Agardh 1825. Aphor. p. 204: g. Urticear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17. — Bartl. 1830. Ord. p. 106.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 210 (Flora 1855. p. 526): g. Forskahlear.
= Forskohlea Linn.

Forskahleae Spach 1842. Hist. vég. phan. XI. p. 25: sect. Urticear. verar. Gen.: Forskalea, Droguetia, Australina, Clibadium.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 176: trib. Urticacear. Gen. ead. excepto ultimo.

Forskalea Juss. 1789. Gen. p. 403: g. Urticar. (praeced. B. Juss. in Ht. Trian.: g. Sempervivar.)
Neck. 1790. El. II. p. 324. n. 1109: g. Acascophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 532: g. Urticear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 309. — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 250.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 505: g. Forskaliear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25: g. Forskahlear.
= Forskohlea Linn

Forskalieae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 504: div. Urticear. Gen.: Forskalea, Droguetia, Australina.

Forskoehlea Reich. vid. *seq.*

Forskoelea Brongn. vid. *seq.*

Forskohlea*) Linn. 1767. Mant. p. 11. n. 1262; 1767. Syst. ed. XII. p. 321: g. Decandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 363; 1784. Syst. p. 437. — Reich. 1778. Gen. p. 238. n. 639 (*Forskoehlea*). — Gmel. 1791. Syst. p. 738. — Pers. 1797. Syst. p. 469.
Scop. 1777. Intr. p. 251 (*Forskaelea*): g. Polycarpiar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 332. t. 68. f. 7 (tenacissima).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 180; 1789. Phil. Bot. I. p. 26.
Gis. 1792. Prael. p. 593: g. Scabridar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 178 (*Forshohlea*).
Mönch 1794. Meth. p. 689: g. Calycostemonis.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 99 (*Forskoelea*): g. Urticear.
Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 11. t. 1982 (*Forskolia*): g. Urticacear.

*) Dicat. Petro Forskal, prof. Hafniensi.

Forskohlea Linn. cont.
Wedd. 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 395: g. Euforskohlear.
Synon. Caidbeja Forsk.; Forskalea Juss.; Forskolea Schreb.; Forskahlea Agdh.

Forskohleae Weddell 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 394: trib. Urticacear. Subtrib.: Euforskohleae, Australineae.

Forskolea Schreb. 1789. Gen. I. p. 268. n. 687: g. Octandr. Tetragyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 474. n. 797. — Cram. 1803. Disp. p. 97.
Pers. 1807. Ench. II. p. 565. n. 2096: g. Monoec. Polyandr.
Willd. 1809. En. p. 950: g. Monoec. Monandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 355: g. Urticear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 84. n. 1808.
Link 1822. En. II. p. 375: g. Atriplicinar.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 777. n. 3072; 1831. Gen. II. p. 684. n. 3447: g. Urticeis aff.
Endl. 1837. Gen. n. 1887. p. 285; 1841. Ench. p. 170: g. Urticacear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 349 (260). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262.
Rchb. 1837. Hdb. p. 272: g. Cecropicar.
Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2504: g. Forskoleear.
= Forskohlea Linn.

Forskoleeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 67: subdiv. Urticear. Gen.: Forskolea, Droguetia, Australina, Clybates.

Forskolia Wight vid. *Forskohlea Linn.*

Forstera*) Linn. f. 1780. Nov. Act. Ups. III. p. 184. t. 9; 1781. Suppl. p. 59. n. 1424: g. Gynandr. Diandr. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 819. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 607. n. 1379. — Pers. 1797. Syst. p. 864. — Swartz 1799 in Schrad. Journ. II. p. 31; 1811. Berl. Mag. V. p. 90. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 147. n. 1615. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 383. — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 252.
Juss. 1789. Gen. p. 423: g. Nyctaginibus aff.
Neck. 1790. El. III. p. 134. n. 1477 (*Forsteria*): g. Synarmophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 70: g. Diandr. Monogyn.
Pers. 1807. Ench. II. p. 210. n. 1580: g. Monadelph. Diandr.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 12; 1827. Dict. v. 51. p. 178: g. Stylidiear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 91. n. 1920; 1841 Nom. p. 102. n. 4005. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 338. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 370. Sect.: Phyllachne, Helophyllum, Forstera. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 154. Sect.: Forstera, Helophyllum.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 300; 1826. Syst. III. p. 749. n. 3047: g. Stylideis aff.
Bartl. 1830. Ord. p. 149: g. Stylidear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 677. n. 3421. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 124. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 722. —

*) Dicat. J. R. Forster ejusque filio Joh. G. Adam.

Forstera Linn. f. cont.
Endl. 1838. Gen. n. 3095. p. 520; 1841. Ench. p. 269. Sect.: Phyllachne, Forstera. — Meisn. 1839. Gen. p. 238 (146). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 581.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 696: g. Stylidiacear.

Forstera Gärtn. 1788. Fruct. I. t. 28. f. 6: vid. *Athecia Gärtn.*

Forstera (Linn. f. Nov. Act. Ups. III. t. 9) Endl. 1838. Gen. n. 3095 *b.* p. 520; 1841. Ench. p. 269: sect. Forsterae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 371.

Forsteria Necker vid. *Forstera Linn. f.*

Forsteronia C. F. W. Meyer 1818. Essequeb. p. 133: nov. g. Borraginear. (Echites corymbosa W.) *Cf.* Bull. soc. philom. 1820. p. 7.
Endl. 1838. Gen. n. 3417 *a.* p. 584; 1841. Ench. p. 295: sect. Parsonsiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5157. 1.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 436: g. Echitear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Forsteropsis Sonder 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 393: nov. g. Stylidear. (F. Preissii.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 371: g. Stylidiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 696: g. Stylidiacear.

Forsythia Walt. 1788. Fl. Carolin. p. 29. 153: nov. g. Polyandr. Monogyn. (F. scandens.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 808.
= Decumaria Linn.

Forsythia*) Vahl 1805. Enum. I. p. 39. n. 25: nov. g. Diandr. Monogyn. (Syringa suspensa Thunb.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 338. — Hedw. 1806. Gen. p. 8. 345. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 52. 77. n. 56.
Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 253: g. Jasminear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 36. n. 62; 1830. Gen. I. p. 17. n. 62. — Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3548. — Bunge 1831. En. pl. Chin. bor. p. 42; 1835. Mém. étr. Ac. Pet. II. p. 116. — Sieb. & Zucc. 1835. Fl. jap. I. p. 11. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 29. 36.
Bartl. 1830. Ord. p. 218: g. Oleinear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 51: g. Syringear. — Par. DC. 1844. Pr. VIII. p. 281.
Rchb. 1837. Hdb. p. 213: g. Mogorinar.
Endl. 1838. Gen. n. 3356. p. 573; 1841. Ench. p. 287: g. Fraxinear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 256 (166). — Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5232. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 617.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 277: g. Lilacinear.
Synon. Rangium Juss.?

Fortunaea „Lindl. 1847. Journ. hort. soc. I. p. 150 c. ic." Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 201: g. Juglandear.
= Platycarya Sieb. & Zucc.

Fortuynia „Shuttl. mss." Boissier 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 379: nov. g. Cruciferar. (F. Aucheri.)

*) Dicat. Will. Forsyth, Kensington.

Fortuynia Shuttl. cont.
Boiss. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 177: g. Fortuyniear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 89. n. 4972/$_1$.
Walp. 1842. Rep. I. p. 183: g. Isatidear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Fortuynidar.

Fortuynidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Orthoplocear. Gen.: Fortuynia.

Fortuynieae Boissier 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 177: nova tribus Cruciferar. Gen.: Fortuynia.
Endl. 1843. Spl. III. p. 89: trib. Orthoplocear. Gen. id.

Foscarena Hedwig vid. *seq.*

Foscarenia Vandell. 1788. Dicc.; 1796 in Röm. Script. p. 78: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (F. spinosa.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 342. — Hedw. 1806. Gen. p. 368 (*Foscarena*). — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p 4. 99. n. 422.
= Gardenia Ellis? (Spreng. Gen. I. p. 176.)

Fosselina Medic. vid. *seq.*

Fosselinia Scopoli 1777. Introd. p. 318. n. 1457: g. Siliculosar. *Cf.* Juss. 1820. Dict. v. 17. p. 255.
Neck. 1790. El. III. p. 93. n. 1419: g. Brachytophytor.
Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 24; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 37 (*Fosselina*): g. Cruciferar.
= Jonthlaspi Tourn.

Fossombronia*) Raddi 1820. Atti soc. Ital. XVIII. p. 17. 40. Ed. Nees 1841. p. 3. 17. t. 5: nov. g. Mnscor. frondosor. (Jungermannia angulosa Dicks.) *Cf.* Leman 1823. Dict. v. 29. p. 357.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 532 *f*: sect. Jungermanniae.
Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 11: g. Lejeuniacear.
Nees 1838. Eur. Leberm. III. p. 317; 1838. IV. p. XXVII; 1845. Syn. Hepat. p. 467: g. Codoniear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 472/$_7$. p. 1340; 1841. Ench. p. 27. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 829. — Lehm. 1846. Pl. Preiss. II. p. 127. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 17. — Bayrh. 1849. Taun. p. 52.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 57: g. Jungermanniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 59: g. Codonidar.
Mitten 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 163: g. Hepaticar. frondosar.
Synon. Maurocenius Gray; Maurocenia Lem.; Codonia Dumort.

Foterghillia Dumort. vid. *seq.*

Fothergilla**) Linn. 1774 in Murr. Syst. p. 418: nov. g. Polyandr. Digyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 277. n. 934. — Linn. f. 1781. Suppl. p. 42. n. 1346. — Murr. 1784. Syst. p. 502. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 365. n. 922. — Gmel. 1791. Syst. p. 833. — Pers. 1797. Syst. p. 538; 1807. Ench. II. p. 81. n. 1323. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1224. n. 1057; 1809. En. p. 573. — Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 312. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 612. n. 1979.
Juss. 1789. Gen p. 408: g. Amentacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 552. — Batsch 1802. Tab. p. 163. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 315. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 353; 1830. Gen. I. p. 445. n. 2205 (*Fothergillia*). — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 270. — Link 1822. En. II. p. 78. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 271 (*Fothergillia*).
Mönch 1794. Meth. p. 342: g. Thalamostemonis.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 304: g. Icosandr. Digyn. — Par. Elliott 1821. Sketch I. p. 546.
R. Brown 1818. Descr. pl. chin. p. 3 (Verm. bot. Schr. I. p. 561): g. Hamamelidear. (distinctae sectionis.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1903. (?) — Dumort. 1829. Anal fam. p. 35 (*Foterghillia*). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 83.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L: g. Cunoniacear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 269: g. Fothergillear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 445. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 397. — Rchb. 1837. Hdb. p. 242; 1841. Nom. p. 167. n. 6485. (genuinar.) — Meisn. 1838. Gen. p. 153 (110). — Endl. 1839. Gen. n. 4593. p. 804; 1841. Ench. p. 401. — Torr. & Gray 1840. North-Amer. I. p. 597. — Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 322.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 784: g. Hamamelear.

Fothergilla Aublet 1775. Guian. I. p. 440. t. 175: nov. g. Decandr. Monogyn. (F. mirabilis.)
= Diplochiton Spreng.

Fothergilleae DC. 1830. Prodr. IV. p. 269: trib. Hamamelidear. Gen.: Fothergilla. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 397. Gen. id. — Meisn. 1838. Gen. p. 153 (110). Gen. id.
Link 1831. Hdb. II. p. 445: ordo 4 Amentacear. Gen. id.
Rchb. 1837. Hdb. p. 242: sect. Sanguisorbear. genuinar. Gen.: Cercocarpus, Fothergilla. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 167. Subsect.: Cercocarpeae, *genuinae* (gen.: Parrotia, Fothergilla, Sedgwickia), Bucklandieae.
Endl. 1839. Gen. p. 804; 1841. Ench. p. 401: subtrib. Hamamelear. Gen.: Parrotia, Fothergilla. Accedit 1842 (Spl. II. p. 70) Distylium. — Par. Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 322. Gen. unicum: Fothergilla. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 274.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 597: trib. Hamamelacear. Gen.: Fothergilla.

Fothergillia Spreng., Dietr. vid. *Fothergilla Linn.*

*) Dicat. comiti Vittorio Fossombroni.
**) Dicat. John Fothergill, medico Londin.

Fougeria Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 243: nov. g. Petalostemonis. *Cf. Fougerouxia.*
Cass. 1820. Dict. v. 17. p. 283; 1825. v. 38. p. 17: g. Rudbeckiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2654.
Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 399. 412; 1830. v. 60. p. 577: g. Baltimorear.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
= Baltimora Linn.?

Fougerouxia*) Cassini 1829. Dict. v. 54. p. 461: g. Baltimorear.
DC. 1836. Pr. V. p. 509: g. Milleriear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 197 (129).
Brongn. 1843. Én. genr. p. 43: g. Melampodiear.
= Fougeria Mönch.

Fouguiera Dietr. vid. *seq.*

Fouquiera Spreng. 1825. Syst. II. p. 568. n. 1879: g. Portulacear.?
DC. 1828. Pr. III. p. 349: g. Fouquieracear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 70. — Meisn. 1838. Gen. p. 129 (94). — Endl. 1839. Gen. n. 5054. p. 914; 1841. Ench. p. 475. — Engelm. 1848. Bot. Wisliz. Exp. p. 14 adnot. 98. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 828.
Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4239; 1837. Hdb. p. 232; 1841. Nom. p. 160. n. 6246: g. Fouquierear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 421. n. 2090: g. Portulaceis aff.
Bartl. 1830. Ord. p. 287: g. Tamariscinear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 207 *(Fouguiera)*. 217: g. Polyandr. Monogyn.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 795: g. monopetalum incertae sedis.
Torrey 1848 in Emory exped. p. 147: g. Polemoniacear. *Cf.* Griseb. in Arch. f. Naturg. 1849. II. p. 420.
= Fouquieria HBK.

Fouquieraceae DC. 1828. Prodr. III. p. 349: ordo (84) Calyciflorar. Gen.: Fouquiera, Bronnia. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 70. Gen. ut DC.
Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo Euphorbialium.
Meisn. 1838. Gen. p. 129 (94): subordo Tamariscinear. Gen. ead.
Endl. 1839. Gen. p. 914; 1841. Ench. p. 475: fam. Parietalium. Gen. ead.

Fouquiereae Rchb. 1828. Consp. p. 160; 1837. Handb. p. 232; 1841. Nomencl. p. 160: div. Loasacear. Gen.: Fouquiera, Bronnia.

Fouquieria**) HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 81: nov. g. Portulaceis aff. (F. formosa.) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 379.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Fouquieriacear.
Synon. Fouquiera Spreng.; Philetaeria Liebm.?

Fouquieriaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21. 27: fam. Ericariear. Gen.: Fouquieria, Bronnia.

*) Dicat. A. D. Fougeroux, Phycologo.
**) Dicat. P. Ed. Fouquier, prof. medic. Paris.

Fourcroea Haworth vid. *Furcraea Vent.*

Fourcroya*) (Vent. emend.) Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 238: g. Liliacear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 79: sect. Agaves. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 1284*b*. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1192.
Schult. 1829. Syst. VII. p. XLII. 730: g. Bromeliacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 130: g. Bromeliear.
Herb. 1837. Amaryll. p. 69. 126: g. Agavear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1298. p. 181 *(Furcroya)*; 1841. Ench. p. 105. — Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1641 *(Furcroya)*. — Meisn. 1842. Gen. p. 395 (298). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 21. 292. — Mart. 1855. Fl. Bras. fasc. XV. p. 187.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 21 *(Furcroya)*: g. Amaryllidear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 401 *(Furcroya)*: g. Bromeliaceis aff.
Conf. Furcraea Vent.; Fourcroea Haw.

Foveolaria**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 57. t. 9: nov. g. Decandr. Monogyn., a plerisque ad Strigiliam Cav. relatum.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 271: g. Pamphiliear. restrict. (F. ferruginea Rz. & P.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 593.

Foveolaria DC. 1824. Prodr. I. p. 516: sect. Sloaneae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 555.
Meisn. 1837. Gen. p. 36 (28): g. Tiliear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Sparmanniear.
= Dasynema Schott.

Foveolidia Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. p. 219: sect. Scleriae. (S. reticulata Michx. An novum genus?) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 83 et Steud. Glum. II. p. 167.
= Scleriae Berg. pars.

Foxia Parlat. 1854. Nuov. gen. monoc. p. 17: g. Hyacinthear. *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 116.
Synon. Strangweja Bertol.; Puschkiniae sp. Kunth.

Fracastora Adans. 1763. Fam. II. p. 505: g. Labiatar. *(Sideritis incana oleae folio Bocc.)*
= Sideritis Tourn.

Fracidia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 381 in adnot.: subg. Xylariae.

Fradelia Chauv. 1842. Rech. p. 124.
= Avrainvillea Decne.

Fraga Lapeyr. ex Steud. Nomencl. I. p. 644. (F. sterilis et Vaillantii.)
= Potentillae sp.

Fragaria***) Tourn. 1700. Inst. p. 295. t. 192: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 96. Ed. Hall. 1745. p. 108: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 147. n. 414; 1737. Cliff. p. 192; 1740. Syst. p. 24; 1748. Ups. p. 133; 1753. Sp. I. p. 494; 1759. Syst. ed. X. p. 1063. n. 558; 1762. Sp.

*) Dicat. Ant. Franç. de Fourcroy, chemico.
**) Nomen a foveolis in dorso foliorum, etc.
***) fraga, fragorum Latinorum.

Fragaria Tourn. cont.
ed. II. p. 708; 1764. Gen. ed. VI. p. 255. n. 633; 1767. Syst. ed. XII. p. 349: g. Icosandr. Polygyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 396; 1784. Syst. p. 476. — Reich. 1778. Gen. p. 259. n. 689. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 342. n. 865. — Lour. 1790. Coch. I. p. 325. — Pers. 1797. Syst. p. 511; 1807. Ench. II. p. 53. n. 1240. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1090. n. 999; 1809. En. p. 551. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 311. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 295. 367. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 520.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 343: g. Gymnopolyspermar.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Senticosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Batsch 1802. Tab. p. 10. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 320.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 188. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 900. — Lois. 1820. Dict. v. 17. p. 346 *(Fraisier)*. — Link 1822. En. II. p. 62. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1105. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 416. n. 2076. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 176.
Adans. 1763. Fam. II. p. 294: g. Rosar.
Gled. 1764. Syst. p. 277. n. 1142; g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 673.
Duchesne 1766. Hist. nat. d. Frais. (Paris 8.)
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 180: g. Calyciflorar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 216: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 221: g. Calycanthemar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 350. t. 73. f. 8 (vesca).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 327; 1789. Phil. Bot. I. p. 181.
Juss. 1789. Gen. p. 338: g. Potentillar. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 299. Sect. ut Seringe.
Neck. 1790. El. II. p. 92. n. 755: g. Sarcodiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 857: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 232.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 347: g. Dryadear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 468; 1815. V. p. 543. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 584. — Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 569. Sect.: Fragaria, Duchesnea. — Bartl. 1830. Ord. p. 402. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 232. — Link 1831. Hdb. II. p. 106. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 462. — Koch 1836. Syn. p. 211. Ed. II. p. 234. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73). — Brongn. 1843. En. genr. p. 125. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 102. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 535.
Rich. 1816 in Nestl. Potent. p. 17: g. Fragariacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 218: g. Potentillacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 466.

Fragaria Tourn. cont.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 533. n. 1863: g. Potentillear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII; 1828. Consp. p. 167. n. 4438 (sect. ut Seringe); 1832. Fl. exc. p. 596. — Webb 1836. Canar. I. p. 13. — Kunth 1838. Berol. I. p. 193.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 447: g. Fragariear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6361. p. 1241; 1841. Ench. p. 659. Sect. ut Ser. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 63.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 564: g. Potentillidar.
Synon. Dactylophylli Spenn. pars.

Fragaria Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 71: g. Calyciflorar., Potentillam, Fragariam et Comarum L. amplectens. *Cf. Dactylophyllum Spenn.*

Fragaria Smith in Rees Cyclop.: g. sejuncta Duchesnea restrict.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 864: g. Potentillear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 167. n. 6495. (genuinar.)
Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 569: sect. Fragariae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4438*a*. — Endl. 1840. Gen. n. 6361*a*. p. 1242; 1841. Ench. p. 659.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 542: g. Dryadear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 371.

Fragariaceae Rich. 1816 in Nestl. Potent. p. 14: fam. plantar. Gen. §. 1: Rubus, Rosa, Dalibarda, Comaropsis, Agrimonia, Dryas. §. 2: Geum, Waldsteinia, Amonia, Sibbaldia, Potentilla, Fragaria.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: trib. Rosacear. Gen.: Fragaria, Comarum, Potentilla, Sibbaldia, Waldsteinia, Geum, (Dryas p. 79), Comaropsis. — Par. A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 340.
= Dryadeae Vent.

Fragariastrum Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 583: sect. Potentillae. — Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 370. — Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4436*a*. — Koch 1836. Syn. p. 218. Ed. II. p. 243. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 102.
= Thermophyllum Wallr.

Fragarieae Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 435: subtrib. Dryadear. Gen.: Potentilla, Comarum, Fragaria. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1241; 1841. Gen. p. 659. Gen. ead. — Walp. 1843. Rep. IV. p. 25.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 208: trib. Dryadear. Gen. ead.

Fragariopsis „A. St. Hilaire Morphol. p. 426. 499" Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 497: g. Dysopsidear. Sect.: Botryanthe, Accia.

Frageria DC. mss.
= Lasiorrhiza Lag.

Fragifera Koch 1836. Syn. p. 171. Ed. II. p. 189: sect. Trifolii. — Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 230. — Endl. 1840. Gen. n. 6511*c*. p. 1268; 1841. Ench. p. 668. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 548. — Griseb.

Fragifera Koch cont.
1843. Rumel. I. p. 34. — Webb 1846. Canar. II. p. 77.
Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5694. 2 *a:* subsect. Vesicastri.
Synon. Vesicaria Crantz; Galearia Presl.

Fragilaria Lyngbye 1819. Tent. Hydroph. dan. p. 182: nov. g. Homalogonator. (Conferva striatula Engl. bot.?) *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 17. p. 338.
Agdh. 1821. Aphor. p. 98: g. Confervoidear.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 293: g. Diatomidear.
Agdh. 1824. Syst. p. XIV. 7: g. Diatomear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 757. n. 3862. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 21.
Fries 1825. Pl. homon. p. 354: g. Fragilarinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 451. — Agdh. 1832. Consp. Diat. p. 62.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 374. n. 3448: g. Amphibolar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 68. 586: g. Diatomacear. liberar.
Endl. 1836. Gen. n. 10. p. 2; 1841. Ench. p. 2: g. Frustuliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 640.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 406; 1841. Brit. Alg. p. 197: g. Fragilariear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 192. — Kütz. 1844. Bacill. p. 42; 1845. Phyc. germ. p. 63; 1849. Sp. Alg. p. 14. n. 9. — Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95. — Rabenh. 1853. Süssw. Diat.
Ehrenb. 1840. Berl. Ak. Berl. p. 210: g. Bacillarior.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.
Math. 1853. Belg. II. p. 544 *(Fragillaria):* g. Fragillariear.
Synon. Nematoplata Bory; Temachium Wallr.; Grammonema Agdh.

Fragilarieae Agardh 1831. Consp. Diatom. p. 43: div. Diatomacear. Seriellae: Diatomeae, Fragilarinae.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 406; 1841. Brit. Alg. p. 15. 197: trib. Diatomacear. Gen.: Fragilaria, Achnanthes, Diatoma, Isthmia, Frustulia et 1841 Striatella, Odontella, Exilaria.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 192: trib. Phycear. Gen.: Fragilaria, Striatella, Achnanthes, Diatoma, Frustulia.
Kütz. (1844. Bacill. p. 42) 1845. Phyc. germ. p. 62; 1849. Sp. Alg. p. 11: fam. Diatomear. Gen.: Denticula, Odontidium, Fragilaria, Diatoma et (1849) Sigmatella.
Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 95: sect. Eudiatomear. Gen.: Rhabdium, Odontidium, Syrinx, Diatoma, Lobarzewskya, Diatomosira, Fragilaria.
Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: fam. Diatomacear. ovoidear. Gen.: Denticula, Gomphogramma; Fragilaria, Odontidium; Diatoma.

Fragilarinae Fries 1825. Pl. homon. p. 354: trib. Diatomear. Gen.: Desmidium, Meloseira, Fragilaria, Diatoma.
Rchb. 1828. Consp. p. 26: div. Confervacear. Gen. ead.
= Fragilarieae Agdh.

Fragilarinae Agardh 1832. Consp. Diat. p. 58: seriella Fragilariear. Gen.: Achnanthes, Striatella, Fragilaria, Grammonema, Meloseira.

Fragillaria Math. vid. *Fragilaria Lyngb.*

Fragillarieae Bory 1822. Dict. class. I. p. . . . : trib. Arthrodiear. Gen.: Diatoma, Achnanthes, Nematoplata.
Math. 1853. Belg. II. p. 544: trib. 39 Algar. Gen.: Fragillaria, Sigmatella, Diatoma.
Diatomacear. Endl. pars.

Fragosa*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 43. t. 34; 1802. Fl. peruv. III. p. 26. t. 249. 250: g. Pentandr. Digyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 191. n. 785 *(Fragrosa):* g. Umbellatar.
Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 343: g. Umbelliferar. — Par. Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 93. (Divis. 1.) — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 26. — Kunth 1824. Syn. III. p. 104. — Bartl. 1830. Ord. p. 237. (desc.)
A. Rich. 1820. Ann. sc. phys. IV. p. 160.
Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3779; 1837. Hdb. p. 221: g. Hydrocotylear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 76. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 259. — Meisn. 1838. Gen. p. 140 (102). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 932.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34 *(Fragrosa):* g. Bolacinear.
= Azorellae Lam. pars.

Fragrosa Hedwig, Dumort. vid. *praeced.*

Franca**) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 23. t. 22: g. pl. class. VIII.
Guett. 1744. Mém. Ac. Paris. p. 239.
Adans. 1763. Fam. II. p. 255: g. Alsinium.
Webb 1836. Canar. I. p. 130: sect. Frankeniae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5053 *a.* p. 914; 1841. Ench. p. 474.

Franciscaria DC. 1828. Prodr. III. p. 486: sect. Rocheae. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98). — Endl. 1839. Gen. n. 4615 *b.* p. 810; 1841. Ench. p. 405.
Synon. Dietrichia Tratt.; Kalosanthes Haw.; Franciscea DC.

Franciscea***) Pohl 1827. Pl. bras. I. p. 1: nov. g. Scrophularinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3109: g. Buchnerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 171: g. Veronicear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 491. n. 2422: g. Scrofularinar.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 2: g. Salpiglossidear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3904. p. 676; 1841. Ench. p. 338. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Meisn. 1840. Gen. p. 307 (219). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 499. — Walp.

---

*) Dicat. Joanni Fragoso.
**) Dicat. Joh. Seb. Franchi.
***) Dicat. Francisco I, Austriae imperatori.

Franciscea Pohl cont.
1845. Rep. III. p. 237. 960. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 717.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 476: g. Franciscear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: g. Gratiolear.
Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4654: g. Brunsfelsiear. — Par. Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 166.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 58: g. Salpiglossear.
Miers . . . . Ill. South-Am. pl. II. p. 73. Char. reform. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 597.
= Brunfelsia Linn. (Don 1829 et Benth. 1846.)

Franciscea DC. 1828. Prodr. III. p. 393: sect. Rocheae.
= Franciscaria DC.

Francisceae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 476: trib. Solanacear. Gen.: Brunfelsia, Franciscea, Browallia.

Francisia Endl. 1840. Gen. n. 6286. p. 1226; 1841. Ench. p. 650: nov. g. Chamaelauciear. — Par. Schauer 1841. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. II. p. 269. — Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6827. (genuinar.) — Meisn. 1843. Comm. p. 354.
Lindl. 1847 Veg. kd. p. 721: g. Chamaelauciacear.?

Franckenia Gled. vid. *Frankenia Linn.*

Francoa*) Cavan. 1800. Anal. cienz. nat. IV. p. 237; 1801. Icon. VI. p. 76. t. 596: nov. g. Octandr. Tetragyn. (F. appendiculata.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 445. n. 987. — Hedw. 1806. Gen. p. 288 n. 1154. — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 358. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 325. n. 1656. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1329.
A. Juss. 1824. Ann. sc. nat. III. p. 192 (Isis 1831. p. 745): g. Crassulacear. — Par. Kunze 1831. Flora I. p. 372.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 262. n. 1519: g. Violear.?
D. Don 1828. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 51: g. Galacinar. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 135. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 204.
Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4192b (*Frankoa*): g. Sedear.?
A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 6. 10; 1833 in Guillem. Arch. bot. p. 66: g. Francoacear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 68. — Meisn. 1838. Gen. p. 135 (99). — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 777. — Endl. 1839. Gen. n. 4626. p. 812; 1841. Ench. p. 107. — Rchb. 1841. Nom. p. 157. n. 6149. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 107. — Walp. 1843. Rep. II. p. 264. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 451. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 717.
Rchb. 1837. Hdb. p. 230 (*Frankoa*): g. Galacinear.
Synon. Llaupanke Feuill.; Panke Mol.

*) Dicat. Francisco Franco.

Francoaceae A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 9; 1833 in Guillem. Arch. bot. p. 66: nova fam. plant. Gen.: Francoa, Tetilla.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 33; 1847. Veg. kd. p. 451: ordo Ericalium. Gen. ead.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 39. 68: trib. Saxifragear. Gen. ead.
Meisn. 1838. Gen. p. 135 (99): ordo 97 plant. (p. 440 Corniculatar.) Gen. ead. et Galax?
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 777: ordo (117) Calyciflorar. Gen. ut Juss.
Endl. 1839. Gen. p. 812; 1841. Ench. p. 406: fam. Corniculatar. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 157: sect. Saxifragear. Gen. ead.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 107: fam. Saxifraginear. Gen. ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 717. Gen. ead.

Francoeuria Cassini 1825. Dict. v. 34. p. 44: nomen pro *Duchesnia Cass.* propositum.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 375; 1827. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Inulear. (Archetypar.) — Par. Less. 1832. Syn. p. 198. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27. (verar.) — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3391. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 44. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 717.
DC. 1836. Pr. V. p. 475: g. Euinulear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2431. p. 394; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128). — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 222.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 954: g. Eupulicariear.
Synon. Duchesnia Cass.

Frangula Tourn. 1700. Inst. p. 612. t. 383: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 41. Ed. Hall. 1745. p. 44: g. pl. class. I.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 164: g. ord. 3 class. III.
Adans. 1763. Fam. II. p. 305: g. Zizyphor.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 153. (Rhamnus Frangula et saxatilis L.)
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 272: g. Petalostemonis.
Cram. 1803. Disp. p. 41: g. Tetrandr. Monogyn.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 621: sect. Rhamni. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 26. — Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 362. — Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3822 c. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 32. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 455. — Koch 1836. Syn. p. 149. Ed. II. p. 163. — Endl. 1840. Gen. n. 5722 b. p. 1097; 1841. Ench. p. 581. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 503. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 151. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 338.

Frangula Tourn. cont.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 488: g. Rhamnear. — Par. A. Gray 1849. Gen. bor. am. II. p. 177.
Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5587: g. Frangulear. genuinar.

Frangulaceae DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 619: fam. (74) Dicotyledonum. Gen.: Staphylea, Evonymus, Ilex, Rhamnus, Zizyphus, Paliurus.
DC. 1819. Théor. élém. p. 245: ordo Calyciflorar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Calicunguliae. Gen.: Rhamnus, etc.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. LXXII: div. Dumosar. Gen.: Rhamnus, Evonymus, Berberis?
Rchb. 1828. Consp. p. 146 (1832. Fl. exc. p. 486); 1837. Hdb. p. 223: div. Rhamnear. Gen.: Retanilla, Paliurus, Sageretia, Eustathes?, Olinia, Goupia, Carpodetus?, Zizyphus, Condalia, Berchemia, Ventilago, Dulongia, Rhamnus. Accedunt 1837 Neerija, Parilia.
Endl. 1840. Gen. p. 1081; 1841. Ench. p. 571: class. Acramphibryor. Dialypetalor. Ordines: Pittosporeae, Staphyleaceae, Celastrineae, Hippocrateaceae, Ilicineae, Cyrilleae, Nitrariaceae, Rhamneae, Chailletiaceae.
Meisn. 1843. Gen. p. 440: class. 19 Diplochlamydear. Ordines: Celastrineae, Rhamneae, Bruniaceae, Aquilarineae, Chailletiaceae.

Franguleae Reissek 1840 in Endl. Gen. p. 1095; 1841. Ench. p. 581: trib. Rhamnear. Gen.: Zizyphus, Condalia, Berchemia, Sageretia, Hovenia, Rhamnus, Karwinskia, Scutia, Noltea, Ceanothus, Cormonema, Colubrina, Alphitonia. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 144. Subdivis.: *genuinae* (gen. Endlicheriana et Frangula, Schäfferia), Paliureae, Colletieae. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 87. Gen. ut Endl.

Frankenia*) Linn. 1737. Gen. p. 129. n. 362; 1740. Syst. p. 23; 1742. Gen. ed. II. p. 187. n. 423: g. Decandr. Monogyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126 (*Franckenia*); 1764. Syst. p. 61. n. 247: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 62.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Caryophylleor.
Linn. 1753. Sp. I. p. 331; 1759. Syst. ed. X. p. 989. n. 401; 1762. Sp. ed. II. p. 473; 1764. Gen. ed. VI. p. 176. n. 445; 1767. Syst. ed. XII. p. 253. n. 441: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 283; 1784. Syst. p. 344. — Reich. 1778. Gen. p. 178. n. 481. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 234. n. 604. — Gmel. 1791. Syst. p. 577. — Pers. 1797. Syst. p. 367; 1805. Ench. I. p. 392. n. 867. — Willd. 1799. Sp. II. p. 241. n. 690; 1809. En. p. 395. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 250. — Lois. 1820. Dict. v. 17. p. 362.

*) Dicat. Joh. Frankenio, medico suecico.

Frankenia Linn. cont.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 330. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 249. — Batsch 1802. Tab. p. 34. — DC. 1805. Franç. IV. p. 765. — Hedw. 1806. Gen. p. 220. n. 896. — Link 1821. En. I. p. 345.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Calycanthemar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 332.
Hill 1769. Ht. kew. p. 192: g. Pentapetalar.
Juss. 1789. Gen. p. 303: g. Caryophylleis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 120.
Neck. 1790. El. II. p. 161. n. 860: g. Catotaphytor.
Cram. 1803. Disp. p. 56 in Pentandr. Monogyn.
A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 22; 1815. Mém. Mus. II. p. 122: g. Frankeniear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 134. n. 1322; 1830. Gen. I. p. 252. n. 1313. — Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4902; 1837. Hdb. p. 272; 1841. Nom. p. 188. n. 7183. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 53. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1040. 1069.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 828: g. Ionidior.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 663: g. Frankeniacear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 349. — Presl 1826. Sicul. I. p. 140. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX. — Schult. 1829. VII. p. XI. 63. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 291. — Link 1831. Hdb. II. p. 230. — Webb 1836. Canar. I. p. 128. Sect.: Franca, Nothria. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 466. — Meisn. 1837. Gen. p. 22 (20). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 168. — Endl. 1839. Gen. n. 3053. p. 914; 1841. Ench. p. 474. Sect.: Franca, Beatsonia? — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 267. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 89. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 235. — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 249. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 340. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 200. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 718. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 243.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 375: g. Frankeniar.
Synon. Franca Mich.; Nothria Berg.

Frankeniaceae DC. 1819. Théor. élém. p. 244; 1824. Prodr. I. p. 349: ordo (21) Thalamiflorar. Gen.: Frankenia, Beatsonia, Luxemburgia. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 375. (ampliat.) Sect.: Frankeniae, Sauvageae.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 663: fam. Thalamiflorar. Gen.: Frankenia.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Valvisporar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX: div. Cistinear. Gen.: Frankenia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 49: fam. Resedariear. Gen. ut DC.
Bartl. 1830. Ord. p. 290: ordo (166) Guttiferar. Gen.: Frankenia, Beatsonia.

Frankeniaceae DC. cont.
Link 1831. Hdb. II. p. 229: ordo 7 Anastemonum. Gen.: Frankenia.
Lindl. 1833. Nix. p. 18; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 67; 1847. Veg. kd. p. 340: ordo Violalium. Gen. ut Bartl. et Anisadenia, Wormskioldia.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 465: fam. (81) Guttiferar. Gen. ut DC. et Lancretia.
Meisn. 1837. Gen. p. 22 (20): ordo 20 plant. (p. 438 Parietalium.) Gen. ut Bartl. et Luxemburgia?
Webb 1836. Canar. I. p. 128: ordo restrictus. Gen.: Frankenia.
Endl. 1839. Gen. p. 913: ordo Parietalium. Gen.: Frankenia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1420 et Ench. p. 474) Anisadenia et 1850 (Spl. V. p. 45) Hypericopsis.
Brongn. 1843. En. genr. p. 89: fam. Violinear. Gen.: Frankenia.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 718. Gen. ut Bartl.
Frankeniae G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 375: sect. Frankeniacear. Gen.: Frankenia, Beatsonia.
Frankenieae A. St. Hilaire 1815. Bull. soc. philom. p. 22; 1815. Mém. Mus. II. p. 123 adnot.; 1824. Mém. Mus. XI. p. 42. 66: nova fam. plant., inter Cistos et Violaceas intermedia. Gen.: Frankenia, Sarothra.
Rchb. 1828. Consp. p. 189 (1832. Fl. exc. p. 704): subdiv. Sauvagesear. Gen.: Frankenia, Beatsonia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 272; 1841. Nom. p. 188: subdiv. Cistear. Gen. ead. et 1841 Anisadenia.
Frankia Bertero ex Steud. Nomencl. I. p. 361. 646. (F. ramiflora.)
= Cicca disticha L.
Frankia*) Steud. (in Schimp. herb. arab. n. 899) 1836. Medizin. Correspondenzbl.: nov. g. plant. (F. Schimperi.)
= Gymnarrhena Desfont. (Endl. Gen. p. 1380.)
Franklandia**) R. Brown 1809 in Linn. Trans. X. (1811.) p. 157 (Verm. bot. Schr. II. p. 249); 1810. Prodr. I. p. 370. Ed. Nees p. 216; 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 604 (Verm. bot. Schr. I. p. 149): nov. g. Proteacear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 24. 405. n. 543. — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 363. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 474. n. 514; 1830. Gen. I. p. 104. n. 524. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 525. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 530.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 333: g. Ceclismenar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1750: g. Persooniear.
Endl. 1838. Gen. n. 2143. p. 339; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 81: g.

Franklandia R. Brown cont.
Franklandiear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 401. — Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2410. — Meisn. 1841. Gen. p. 332 (244); 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 327. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 718.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Franklandidar.
Franklandidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 533: trib. Proteacear. Nucamentacear. Gen.: Franklandia.
Franklandieae Endl. 1838. Gen. p. 339; 1841. Ench. p. 215: trib. Proteacear. Gen. unicum: Franklandia. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 401. Gen. id. — Meisn. 1841. Gen. p. 332 (244); 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 327. Gen. id. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 64: subdiv. Persooniear. Gen. id.
Franklina Gmel. vid. *seq.*
Franklinia*) Marsh. 1785. Stirp. amer. p. 86.
Gmel. 1791. Syst. p. 810 (*Franklina*): g. Polyandr. Monogyn.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 223: sect. Gordoniae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5424 *b.* p. 1022; 1841. Ench. p. 531; 1843. Spl. III. p. 94. n. 5424 *d.* — Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7923. 2.
Synon. Lacathea Salisb.
Frankoa Rchb. vid. *Francoa Cavan.*
Franquevillea Zoll. . . . . Cat. p. 71.
= Hypoxis Linn. (Miq.)
Franquevillia „Salisb. mss." Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 338: nov. g. Gentianar. verar. (Gentiana filiformis L.)
: Cicendia Adans.
Franseria**) Cavan. 1793. Icon. II. p. 78. t. 200: nov. g. Pentandr. Monogyn. (F. ambrosioides.) *Cf.* Usteri n. Ann. XVII. p. 90.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 378. n. 1669; 1809. En. p. 968: g. Monoec. Pentandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 559. n. 2067.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 362: g. Urticear.
Cass. 1820. Dict. v. 17. p. 364; 1823. v. 29. p. 176; 1830. v. 60. p. 578: g. Ambrosiear. (1823 Archetypar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 141. — Less. 1832. Syn. p. 219. — DC. 1836. Pr. V. p. 524. Sect.: Xanthiopsis, Centrolaena (antea *Acantholaena*). — Endl. 1838. Gen. n. 2481. p. 403; 1841. Ench. p. 237. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 344. Subg.: Ambrosidium. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 292. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22. — Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3913. Sect.: Franseria, Acantholaena (p. 235 *Acanthostegia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

*) Dicat. Jos. Frank, medico.
**) Dicat. Baronet Thom. Frankland.

*) Dicat. Will. Franklin, peregrinatori in India.
**) Dicat. Ant. Franser.

Franseria Cavan. cont.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 89: g. Clibadiae.
Link 1822. En. II. p. 390: g. Compositis aff.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 852. n. 3114; 1831. Gen. II. p. 693. n. 3495: g. Urticeis aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2742: g. Ambrosiacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 43: g. Melampodiear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 718: g. Melampodinear.
Synon. Gärtneria Med.; Ambrosidium Nutt.

Frasera*) Walt. 1788. Fl. Carolin. p. 9. 87: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (F. caroliniensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 256. — Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 97. — Pers. 1805. Ench. I. p. 137. n. 285. — Hedw. 1806. Gen. p. 57. n. 269. — Elliott 1817. Sketch I. p. 205. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 102.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 474; 1825. Syst. I. p. 428. n. 449; 1830. Gen. I. p. 85. n. 420: g. Gentianear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 32. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 179. (verar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 443. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 7. 162. n. 439: g. Gentianeis aff. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 367.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3485: g. Chironiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3534. p. 601; 1841. Ench. p. 302. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 54. — Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 131. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 719.
Griseb. . . . . in Hook. Fl. bor. am. II. p. 66; 1839. Gent. gen. p. 328: g. Swertiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 261 (170). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 6.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 133. n. 5120: g. Erythraeariar.

Frauenhofera Endl. 1841. Ench. p. 575. n. 5685: g. Elaeodendrear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 536. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588.
= seq.

Fraunhofera**) Martius 1829. Nov. gen. III. p. 85. t. 235: nov. g. Celastrinear. (F. multiflora.)
Meisn. 1837. Gen. p. 69 (49): g. Evonymear.
Endl. 1840. Gen. p. 1088. n. 5685: g. Elaeodendrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7893. — Lemr. 1849 in Orb Dict. V. p. 719.
Synon. Frauenhofera Endl.

Fraxinaster DC. 1844. Prodr. VIII. p. 276: sect. Fraxini. — Par. Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 471.
Synon. Ornus Mich.; Fraxinus Neck.

Fraxineae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 392: fam. Corolliflorar. Gen.: Fraxinus.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII: div. Sapotear. Gen.: Fraxinus, Ornus, Chionanthus, Linociera.
Rchb. 1828. Consp. p. 135: subdiv. Styracear. Gen. ead.
Bartl. 1830. Ord. p. 218: div. Oleinear. Gen.: Fraxinus, Ornus.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 431: div. Sapotacear.
Mart. 1835. Consp. p. 44.
Endl. 1838. Gen. p. 573: subordo Oleacear. Gen: Fraxinus, Fontanesia, Syringa, Forsythia; Tetrapilus?; Myxopyrum? Accedit 1841 (Ench. p. 286) Schrebera.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 258. 288: sect. Oleacear. Gen. ut Bartl.
Meisn. 1839. Gen. p. 256 (166): trib. Oleacear. Gen.: Syringa, Forsythia, Fontanesia, Fraxinus. — Par. DC. 1844. Pr. VIII. p. 274. Gen.: Fraxinus. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 617. Gen. ut Meisn. et Ornus, Nathusia. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 81. Gen. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 135: subdiv. Jasminear. Gen.: Fraxinus, Meliopsis, Ornus, Fontanesia, Syringa, Forsythia, Chondrospermum.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 72: trib. Oleinear. Gen. ut Bartl.

Fraxinella Tourn. 1700. Inst. p. 430. t. 243: g. pl. class. XI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 276. Ed. Hall. 1745. p. 291: g. pl. class. XIII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 311: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 343: g. Pistaciar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 337. t. 69. f. 4 (alba).
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 98.
Mönch 1794. Meth. p. 68: g. Thalamostemonis.
= Dictamnus Linn.

Fraxinellae Nees & Martius 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 147: fam. nat. plant. Gen.: Sciuris, Conchocarpus, Monnieria, Erythrochiton, Bonplandia, Rauia, Diglottis, Lasiostemum, Aruba, Pilocarpus, Terpnanthus, Ticorea, Dictamnus, Calodendron, Jambolifera.

Fraxinieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 53 (Loud. Arb. II. p. 1198): trib. Oleinar. Gen.: Fraxinus, Ornus.
= Fraxineae Gray.

Fraxinoides Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 38: nov. g. ex typo Fraxini americanae L.

Fraxinus*) Tourn. 1700. Inst. p. 577. t. 343: g. pl. class. XVIII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 315: g. pl. class. XIV. (Ed. Hall. 1745. p. 334 in class. XVI.)

*) Dicat. Ch. Fraser, peregrinatori.
**) Dicat. Jos. Equiti de Fraunhofer.

*) Nomen ex Ovidio et Virgilio.

Fraxinus Tourn. cont.
Vaill. 1722. Act. Ac. Par. p. 205: g. Dipsacear.
Linn. 1737. Gen. p. 318. n. 773; 1737. Cliff. p. 469; 1740. Syst. p. 31; 1748. Ups. p. 304; 1753. Sp. II. p. 1057; 1759. Syst. ed. X. p. 1313. n. 1026; 1763. Sp. ed. II. p. 1509; 1764. Gen. ed. VI. p. 550. n. 1160; 1767. Syst. ed. XII. p. 679: g. Polygam. Dioec. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 281. — Murr. 1774. Syst. p. 771; 1784. Syst. p. 918. — Reich. 1778. Gen. p. 546. n. 1273. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 736. n. 1597. — Pers. 1797. Syst. p. 959. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 255. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 1098. n. 1908; 1809. En. p. 1059. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 150. Ed. 1832. p. 148. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 309. 329.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 167: g. ord. 3 class. III.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 4. n. 12: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 367.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Sepiariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 506. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 665.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Jasminear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 105. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 241. — DC. 1805. Franç. III. p. 495. Sect.: Fraxinus, Ornus. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 60. 277. n. 107. — Lois. 1820. Dict. v. 17. p. 374 *(Frêne)*. — D. Don 1825. Nepal. p. 106. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 30. n. 135. — Hook. 1834. Fl. bor. am. II. p. 50. — Kunth 1838. Berol. II. p. 24. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 107. (?) — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 72. Sect.: Ornus, Bumeliodes.
Adans. 1763. Fam. II. p. 445: g. Cistor.
Scop. 1777. Intr. p. 230: g. Nomadear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 222. t. 49. f. 1 (excelsior et canadensis).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 189; 1789. Phil. Bot. I. p. 34.
Gmel. 1791. Syst. p. 75: g. Diandr. Monogyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 7. — Vahl 1805. Enum. I. p. 48. n. 26. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 11.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 309: g. Lilacear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 482. Ed. II. p. 554.
Batsch 1802. Tab. p. 67: g. Terebinthinacear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 353; 1825. Syst. I. p. 95. n. 128: g. Amentacear.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 392: g. Fraxinear. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 433. Sect. ut DC. 1805. — Endl. 1838. Gen. n. 3353. p. 573; 1841. Ench. p. 286. Sect.: Bumelioides, Melioides, Ornus. — Meisn. 1839. Gen. p. 256 (166). — DC. 1844. Pr. VIII. p. 294. Sect.: Ornus, Fraxinaster. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 720 *(Frêne)*. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 36. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 471. Sect. ut DC. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 20. p. 310.

Fraxinus Tourn. cont.
Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 200: g. Oleinear.
Link 1829. Hdb. I. p. 445: g. Oleinar.
Coss. &. Dur. . . . . Bull. bot. Fr. II. p. 367. Nova sect.: Sciadanthus.
Synon. Fraxinus et Ornus Mich., Neck.
Fraxinus Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 225. t. 107: g. pl. class. XXI.
= Ornus Neck.
Fraxinus Necker 1790. Elem. bot. II. p. 375. n. 1181: g. Ypsoophytor. Distinguitur Ornus
DC. 1805. Franç. III. p. 495: sect. Fraxini. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 433.
Pers. 1807. Ench. II. p. 604. n. 2081: g. Dioec. Diandr. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 231.
Link 1822. En. II. p. 451: g. Oleinar. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 213.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 296: g. Diandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3580; 1841. Nom. p. 135. n. 5227: g. Fraxinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 218. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 291. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 72. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 617.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Lilacinear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 53: g. Fraxiniear.
= Fraxinaster DC.
Fredericia G. Don vid. *Fridericia Mart.*
Freemania Bojer mss. (*Freemannia* ex Steud. Nom. I. p. 647.)
= Aphelexis Boj.
Freesa Ecklon 1827. Verzeichn. p. 30: nov. g. Ixiacear. (Tritonia longiflora et crispa Ker.) *Cf.* Steud. Nom. I. p. 647 *(Freesea)*.
= Montbretia DC.
Freesea Steud. vid. *praeced.*.
Fregirardia*) Dunal 1849. Ind. sem. Monspel.: nov. g. Solanacear. (Lycium ovatum Hort.) *Cf.* Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 366.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 502: g. Lycinear.
Conf. Brachistus Miers.
Freirea Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 502: nov. g. Parietariear. (Parietaria lusitanica L.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2498. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24.
Endl. 1837. Gen. n. 1885 *b*. p. 285; 1841. Ench. p. 170: sect. Parietariae. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 228. — Webb 1850. Canar. III. p. 265. — Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 209. — Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 252.
Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 638: g. Urticacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262.
Fremontea Lindl. vid. *seq.*

*) Dicat. Fred. de Girard.

Fremontia Torrey 1845 in Frem. 2d. rep. p. 317: nov. g. Spirolobear. (Batis vermicularis Hook.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513 (*Fremontea*): g. Chenopodiacear.
Sarcobatus Nees.
Fremontia Torrey 1853. Pl. Fremont. in Smiths. Contr. VI. p. 5. t. 2: nov. g. Fremontiear., Cheirostemoni aff. *Cf.* Flora 1853. p. 704. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 319.
Fremontieae Torrey 1853. Pl. Fremont. p. 5: sect. Bombacear. Gen.: Cheirostemon, Fremontia. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 319.
Frenela Mirbel 1826. Mém. Mus. XIII. p. 30.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 345: g. Cupressinear.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 35; 1847. Spl. IV. p. 2. n. 1791: g. Actinostrobear.
Synon. Callitris Vent., exclusis spec. atlant.
Frenelites Endl. 1847. Syn. Conif. p. 273; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 12. n. $1816/_8$: g. Cupressinear. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 121.
Fresenia*) DC. 1836. Prodr. V. p. 328: nov. g. Chrysopsidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2374. p. 385; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 187 (127). — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3328. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 721.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Baccharidear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.
Fresiera Mirbel vid. *Freziera Sw.*
Freuchenia Ecklon 1827. Verz. p. 14: nov. g. Iridear., inter Vieusseuxiam et Moraeam medium. (F. bulbifera.)
= Vieusseuxia Roche?
Freycinetia**) Gaudich. 1824. Ann. sc. nat. III. p. 509; 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 431. t. 41—43: nov. g. Pandanear., jam a R. Brown (Prodr. p. 341. Ed. Nees p. 197) indicatum et absque nomine descriptum. (F. arborea.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 1272; 1841. Nom. p. 43. n. 1543. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66. — Bartl. 1830. Ord. p. 69. — Schott 1832. Melet. p. 16. — Hook. & Arn. 1832. Beech. voy. Bot. Pt. III. p. 97. — Endl. 1833. Norf. p. 24; 1837. Gen. n. 1712. p. 242; 1841. Spl. I. p. 1370. — Blume 1835. Rumphia I. p. 156. t. 39—43. — Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 31. t. 9. — Kunth 1841. Enum. III. p. 101. 585. — Meisn. 1842. Gen. p. 359 (268). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 23. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 132. — Miq. 1852. Pl. Jungh. II. p. 166; 1855. Ind. bat. III. p. 167. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 237.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 798. n. 4139: g. Dioec. Monandr.

*) Dicat. Fresenius, botan. Francofurt.
**) Dicat. Car. L. de Freycinet, navigatori.

Freycinetia Gaudich. cont.
Endl. 1841. Ench. p. 133: g. Eupandanear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 15: g. Freycinetiear.
Freycinetieae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 15: fam. Pandanoidear. Gen.: Freycinetia.
Freyera*) Rchb. 1837. Handb. p. 291: novum nomen pro *Biasolettia Koch* (nec Presl) propositum.
Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107): g. Scandicinear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133. — Walp. 1843. Rep. II. p. 423. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 721.
Endl. 1839. Gen. n. 4514. p. 788; 1841. Ench. p. 30; 1850. Spl. V. p. 13: g. Scandicinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5331.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 366: g. Pleurospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Scandicidar.
Boiss. 1856. Diagn. pl. nov. III. Ser. 2. Nr. 2. p. 101. Char. emend.
= Biasolettia Koch.
Freyeria Scopoli 1777. Introd. p. 208. n. 908: g. Dumosar.
= Mayepea Aubl.
Freylenia Brongn. vid. *seq.*
Freylinia Colla 1823. Hort. Ripul. p. 56.
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3205*c*: sect. Caprariae.
Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 55: g. Gratiolear. Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4628. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 3920. p. 678; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 509. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 60 (*Freylenia*). — Walp. 1845. Rep. III. p. 263. 962. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 722.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 617: g. Teediear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 333; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Chelonear.
Freylinia „Spreng." Spach 1840. Hist. vég. phan. IX. p. 57: g. Cestrinear. (Nomen.)
= praeced.?
Freziera**) Swartz 1800. Fl. Ind. occ. II. p. 971: nov. g. Polyandr. Monogyn. — Par. Willd. 1800. Sp. II. p. 1179. n. 1046.
Humb. & Bonpl. 1805. Pl. aequin. I. p. 22: g. Aurantior. Char. reform. *Cf.* Schrad. n. Journ. II. 1. p. 32. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 793.
Mirb. 1813. Bull. soc. philom. p. 381 (*Fresiera*): g. Ternströmiear. — Par. Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 442. — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 386. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 596. n. 1917; 1830. Gen. I. p. 430. n. 2132. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 208. n. 5418; 1837. Hdb. p. 302. — Endl. 1840. Gen.

*) Dicat. H. Freyer, botanico Labacensi.
**) Dicat. Frezier, peregrinatori.

Freziera Swartz cont.
n. 5412. p. 1019; 1841. Ench. p. 531. — Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 117. *(Synon. Lettsomia Rz. & Pav.)* — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 722.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 210: g. Ternströmiacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 211. — Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 377. 404. — Meisn. 1837. Gen. p. 41 (30). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 255. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.
DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 414; 1824. Pr. I. p. 524: g. Frezierear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 336. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 567. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 63.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Ternstromiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7917: g. Cleyerear.
Synon. Eroteum Sol.

Freziereae DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 412; 1824. Prodr. I. p. 524: trib. Ternströmiacear. Gen.: Cleyera, Freziera, Eurya, Lettsomia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 566. Gen. ead. exclusa Eurya. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 60. Gen. ut Bartl.
Bartl. 1830. Ord. p. 336: div. Ternströmiacear. Gen. ut DC. et Geeria.

Fridericia*) Martius 1827. Nov. Act. Leop. XIII. 2. p. VII. t. A. B.; 1829. Flora II. p. 413: nov. g. Bignoniacear. *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 44. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 186 *(Friedericia)*. — Cham. 1832. Linnaea VII. p. 558. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3258 *(Friedericia)*: g. Bignoniear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 227 *(Fredericia)*. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 566.
DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 123; 1840 in Meisn. Gen. p. 300 (209): g. Catalpear.
Endl. 1839. Gen. n. 4108. p. 710; 1841. Ench. p. 345: g. Eccremocarpear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130. — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4540. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 722.
DC. 1845. Pr. IX. p. 176: g. Eubignoniear.

Friederichsthalia A. DC. vid. *Friedrichsthalia Fenzl.*

Friedericia Rchb., Bartl. vid. *Fridericia Mart.*

Friedlandia**) Chamisso & Schltd. 1827. Linnaea II. p. 348: nov. g. Salicariear.
= Diplusodon Pohl.

Friedrichsthalia***) Fenzl 1839. Nov. stirp. dec. I. n. 61: nov. g. Myoporinear.
Meisn. 1840. Gen. p. 281 (190): g. Lithospermear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 3779/$_1$. p. 1403; 1841. Ench. p. 321: g. Cynoglossear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4356. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 722.

Friedrichsthalia Fenzl cont.
A. DC. 1846. Pr. X. p. 173 *(Friederichsthalia)*: sect. Trichodesmatis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Cynoglossidar.

Friesea Rchb. vid *Friesia DC.*

Friesia*) Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 885: g. Euphorbicar. *(Crotonopsis Michx.)*
Spreng. 1826. Syst. III. p. 760. 850. n. 3109; 1831. Gen. II. p. 692. n. 3490: g. Tricoccar.
= Crotonopsis Michx.

Friesia DC. 1824. Prodr. I. p. 520: nov. g. Elaeocarpear. (Elaeocarpus peduncularis Labill.) — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5425. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 340. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 560. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 48. — Meisn. 1837. Gen. p. 39 (29). — Endl. 1840. Gen. n. 5387. p. 1011; 1841. Ench. p. 523 (verar. dubium). — A. Cunn. 1840. Ann. nat. hist. IV. p. 23. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372.
Rchb. 1837. Hdb. p. 304; 1841. Nom. p. 209. n. 7944 *(Friesea)*: g. Friesiear.
Conf. Aristotelia L'Herit., Planch.

Friesieae Rchb. 1837. Handb. p. 304; 1841. Nomencl. p. 209: subdiv. Elaeocarpear. Gen.: Friesia, Dicera (1841 omissa), Acronodia.

Frisca Endl., Spach vid. *Frisea.*

Frisea Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1708*b*; 1841. Nom. p. 62. n. 2345. 3: sect. Thesii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2072*c*. p. 326. *(Frisca)*; 1841. Ench. p. 207. — A. DC. 1857. Esp. nouv. du g. Thesium p. 6; 1857. Pr. XIV. 2. p. 662.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 460 *(Frisca)*: g. Santalear.

Fritilaria Gled. vid. *seq.*

Fritillaria**) Tourn. 1700. Inst. p. 376. t. 201: g. pl. class. IX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 135. Ed. Hall. 1745. p. 149: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 92. n. 260; 1737. Cliff. p. 119: g. Hexandr. Monogyn. Par. (injuncto Petilio L.) Linn. 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 142. n. 330; 1748. Ups. p. 81; 1753. Sp. I. p. 303; 1759. Syst. ed. X. p. 980. n. 372; 1762. Sp. ed. II. p. 435; 1764. Gen. ed. VI. p. 164. n. 411; 1767. Syst. ed. XII. p. 240. n. 406. — Scop. 1772. Carn. I. p. 241. — Murr. 1774. Syst. p. 269; 1784. Syst. p. 324. — Reich. 1778. Gen. p. 166. n. 444. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 219. n. 559. — Lour. 1790. Coch. I. p. 206. — Gmel. 1791. Syst. p. 545. — Pers. 1797. Syst. p. 345; 1805. Ench. I. p. 359. n. 792. — Willd. 1799. Sp. II. p. 90. n. 628; 1809. En. p. 363. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 222. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 469. 498.

*) Dicat. Borussorum regi Friderico Guilielmo III.
**) Dicat. Matronae a Friedland.
***) Dicat. E. R. Friedrichsthal, peregrinatori.

*) Dicat. Eliae Fries, Lund.
**) Nomen a Noel Capperon inditum, quod ejus areolae versicolores fritillum quodammodo aemulentur. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 91.

Fritillaria Tourn. cont.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 290: g. Liliacear. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28. — Scop. 1777. Intr. p. 83 *(Frittillaria)*. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 120. — DC. 1805. Franç. III. p. 200. — Hedw. 1806. Gen. p. 244. n. 994. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 232; 1825. Syst. II. p. 63. n. 1210; 1830. Gen. I. p. 269. n. 1399. — Lois. 1820. Dict. v. 17. p. 404. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 174. — Link 1821. En. I. p. 322. — Juss. 1823. Dict. v. 26. p. 414 (disjuncta Imperiali). — D. Don 1825. Nepal. p. 51. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1154.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124 *(Fritilaria)*; 1764. Syst. p. 73. n. 304: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 304. Sejungitur Imperialis.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 48. — Juss. 1789. Gen. p. 48 (restrictum). — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 200.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283. — Agdh. 1823. Aphor. p. 165. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 34.
Hill 1769. Ht. kew. p. 354: g. Hexapetalar. incompletar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 63. t. 17. f. 1. (Fr. Corona imperialis.)
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 217; 1789. Phil. Bot. I. p. 65.
Neck. 1790. El. III. p. 178. n. 1530: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 169: g. Gloriosar. Distinguitur Imperialis.
Batsch 1802. Tab. p. 141: g. Tulipacear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 288. — Kunth 1822. Syn. I. p. 292. — Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1353; 1830. Fl. exc. p. 102; 1841. Nom. p. 48. n. 1758. — Link 1829. Hdb. I. p. 179. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXX. 385. — Bartl. 1830. Ord. p. 50. — Bernh. 1835. Flora II. p. 595. Sect.: Petilium, Fritillaria. — Endl. 1837. Gen. n. 1096. p. 140; 1841. Ench. p. 82. Sect. ut Bernh. — Meisn. 1842. Gen. p. 401 (305). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 20. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 383. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 724. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 144. Sect. ut Bernh.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 334: g. Lilear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Liliear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 129. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 246. Distinguitur Petilium. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 269.
Koch 1837. Syn. p. 707. Ed. II. p. 816: g. Tulipear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 204. — Math. 1853. Belg. I. p. 537.
Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 178: g. Discospermear.

Fritillaria Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. 554: sect. Ornithogali? (Anthericum serotinum L.)
= Lloydia Salisb.

Fritillaria Bernhardi 1835. Flora II. p. 595: sect. Fritillariae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1096*a*. p. 140; 1841. Ench. p. 82. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 145.

Fritschia Dietr., Walp. vid. *Fritzschia Cham.*

Frittillaria Scop. vid. *Fritillaria Tourn.*

Fritzschia*) Chamisso 1834. Linnaea IX. p. 397: nov. g. Rhexiear. — Par. Meisn. Gen. p. 115 (82). — Endl. 1840. Gen. n. 6198. p. 1210; 1841. Ench. p. 646. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1345 *(Fritschia)*. 143. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6706. — Walp. 1843. Rep. II. p. 126 *(Fritschia)*. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 724.
Naud. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 278: g. Lasiandralium.

Frivaldia**) Endl. 1838. Gen. n. 2369. p. 384; 1841. Ench. p. 235: g. Psiadiear., pro *Microglossa DC.* (ob nomen antea usitatum) substitutum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3324 *(Frivaldzkia)*. — Walp. 1843. Rep. II. p. 587 (sphalm. *Fivaldia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Frivaldzkia Rchb. vid. *praeced.*

Fröbelia***) Regel 1852. Flora p. 417; 1852. Gartenflora I. p. 416: nov. g. Stypheliear., Solenisciae aff. (F. fasciculiflora.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 457.

Fröhlichia Wulff. mss.
= Elyna Schrad.

Fröhlichia „Vahl" Endl., Dietr. vid. *Frölichia Vahl.*

Fröhlichia Endl. Ench. p. 185: vid. *Frölichia Mönch.*

Frölichia†) Mönch 1794. Meth. p. 50: g. Thalamostemonis. (Celosia procumbens Jacq.)
Cram. 1803. Disp. p. 150: g. Monadelph. Pentandr.
Endl. 1837. Gen. n. 1959. p. 302; 1841. Ench. p. 185 *(Fröhlichia)*: g. Gomphrenear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 318 (231). — Rchb. 1841. Nom p. 165. n. 6426. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 102. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511 *(Fröhlichia)*. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 419. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 724 *(Fröhlichia)*.
Synon. Oplotheca Nutt.; Aplotheca Cham.; Hoplotheca Spreng.; Ninanga Raf. pt.

Frölichia Vahl 1796. Eclog. Praef. p. 3.
Willd. 1797. Sp. I. p. 607. n. 191: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 130. n. 248.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 442: g. Rubiacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 60. 371. — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 409. — — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 10. 184. n. 458. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 376. — Spreng. 1825. Syst. I.

*) Dicat. Jul. Fritzsche.
**) Dicat. Emm. Frivaldsky de Frivald.
***) Dicat. Fröbel, Turiacensi.
†) Dicat. Jos. Al. Frölich.

Frölichia Vahl cont.
p. 406. n. 339; 1830. Gen. I. p. 90. n. 444. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 454 *(Fröhlichia)*.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 600: g. Coffeacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2020.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87: g. Lentaginiae.
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear.
= Coussarea Aubl.

Frolovia „Ledeb. mss.“ DC. 1837. Prodr. VI. p. 538: sect. Aplotaxidis.
Endl. 1838. Gen. n. 2854 *a*. p. 468; 1841. Ench. p. 246: sect. Haplotaxidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3894. 1. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 672 *(Frolowia)*.

Frolowia Ledeb. vid. *praeced.*

Frondosae Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 102: subtrib. Jungermanniear. Gen.: Codonia, Diplomitrium, Cordaea, Blasia, Pellia, Metzgeria, Echinomitrium. — Par. Nees 1838. ibid. IV. p. XXVI. Gradus: Codonieae, Diplolaeneae, Haplolaeneae, Aneureae, Metzgerieae. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549. Gen.: Fossombronia, Petalophyllum, Diplolaena, Noteroclada, Zoopsis, Pellia, Blasia, Symphyogyna, Aneura, Trichostylium? Metzgeria.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1338; 1841. Ench. p. 27: trib. Jungermanniacear. Subtrib.: Metzgerieae, Aneureae, Haplolaeneae, Diplomitrieae, Codonieae. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 23. Subdivis.: Codonieae, Diplomitrieae, Blasieae, Aneureae, Metzgereae.
Nees 1845. Syn. Hepat. p. 467: hemicyclum 2 Jungermanniear. Subtrib. ut 1838.

Froriepia*) C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 362: nov. g. Cuminear. (F. nuda.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 359. — Endl. 1843. Spl. III. p. 83. n. 4488/$_1$. — Walp. 1843. Rep. II. p. 417. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 334.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Cuminidar.

Frostia**) Bertero mss. 1829 in Herb. Steud. n. 1005: nov. g. Gynandr. Polyandr., Cytino aff.? *Cf.* Guillem. 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 19 in adnot.
Endl. 1836. Gen. n. 725. p. 76; 1841. Ench. p. 54: g. Rafflesiacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 264; 1841. Nom. p. 61. n. 2329: g. Rafflesiear.
Synon. Pilostyles Guillem.

Fructaulia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 65: ordo Unitegmiae. Fam.: Amaryllideae, Leucoideae, Irideae, Dioscorineae.

Fructesca***) „DC. mss.“ Meisn. 1839. Gen. p. 259 (168): nov. g. Gärtnerear. *Cf. Frutesca.*
Endl. 1841. Spl. I. n. 3370 *c*. p. 1395; 1841. Ench. p. 289: sect. Gärtnerae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5142. 3.

*) Dicat. Cl. de Froriep.
**) Dicat. J. Frost, botanico.
***) Fructus; esca.

Fructiflorae Gmel. 1768. Fl. Sibir. III. p. 120: class. X. plant. Gen.: Valeriana, Linnaea, Lonicera, Vaccinium, Sanguisorba, Agrimonia, Viburnum, Sambucus, Campanula, Cornus, Epilobium, Adoxa, Rubia, Asperula, Galium, Valantia.

Fructiflorae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 61: class. Monocotyledonear. Familiae: Orchideae, Irideae, Narcissineae, Hydrocharideae, Nayadeae.

Fructifloria Dumort. 1822. Comm. bot. p. 65: ordo Bitegmiae (4). Fam.: Musaceae, Drymyrhizeae, Orchideae.

Fructitegmia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 54: ordo Solitegmiae. Fam.: Begoniae, Aristolochiae, Osyrideae, Mirobolaneae, Elaeagneae, Scleranthineae.

Fructitubia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: ordo Bitegmiae (3). Fam.: Lorantheae, Viburnaceae, Caprifolia, Cephalanthidiae, Hediotideae, Rubiaceae, Operculinae, Valerianeae.

Fructungulia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: ordo Bitegmiae (3). Fam.: Eryngineae, Umbellateae, Araliaceae, Hederaceae.

Frugariae Batsch 1802. Tab. affin. p. 3: ordo Rosacear. Fam.: Drupiferae, Prockiae, Pomiferae, Spiraeae, Senticosae, Myrtoideae.

Frullania*) Raddi 1820. Mem. soc. ital. Moden. XVIII. p. 17. 20. Ed. Nees 1841. p. 3. 4. t. 2: nov. g. Muscor. frondosor. (Jungermannia dilatata et Tamarisci L.)
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 532 *c*: sect. Jungermanniae.
Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 12: g. Jubulear. — Par. Nees 1838. Eur. Leberm. III. p. 209; IV. p. XXVI. Subgen.: Jubula, Bryopteris. — Endl. 1841. Spl. I. n. 472/$_{10}$. p. 1340; 1841. Ench. p. 28. Sect. eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 824. Sect.: Frullania, Bryopteris. — Nees 1845. Syn. Hepat. p. 408 *(sejuncta Bryopteride)*. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 19. — Bayrh. 1849. Taun. p. 52.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 53; 1842. Pl. cell. Cub. p. 458: g. Jungermanniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 59: g. Jubulidar.
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 159: g. Hepaticar. foliosar.
Synon. Salviatus Gray; Jubula Dumort.; Mylia Lem.; Muscoides Mich. pt.

Frullanoides Raddi 1823. Crypt. bras. in Mem. soc. Moden. XIX. p. 37.
Frullaniae et Phragmicomae spec. (Nees.)

Frumentaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: subtrib. Triticear. Gen.: Secale, Triticum, Aegilops.

Frumentum *(saracenicum)* Matth.
Fagopyrum Tourn.

Frustulia Agardh 1824. Syst. Alg. p. XIII. 1; 1831. Consp. Diat. p. 43: nov. g. Diatomear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 758. n. 3866.

*) Dicat. dom. Leonardo Frullani.

Frustulia Agardh cont.

Fries 1825. Pl. homon. p. 355: g. Echinellear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 444.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78: g. Frustuliacear.

Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 535: g. Diatomacear. liberar. Subgen.: Cyclotella, Aplotella, Cymbella, Paltonella, Pandurella, Sigmatella, Sphenella.

Endl. 1836. Gen. n. 1. p. 2; 1841. Ench. p. 2: g. Frustuliear. Sect.: Cyclotella, Haplotella, Cymbella. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 631. Sect. eaed.

Ehrenb. 1838. Infus. p. 232; 1840. Ber. Ak. Berl. p. 211: g. Bacillarior.

Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 407; 1841. Brit. Alg. p. 204: g. Fragilariear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 193.

Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 98; 1849. Sp. Alg. p. 96. n. 51: g. Naviculear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 34.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Schizonemear. — Par. Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 418.

Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: g. Naviculacear.

Frustuliaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78: trib. Diatomacear. Gen.: Frustulia, Echinella.

Frustulieae Endl. 1836. Gen. p. 2; 1841. Ench. p. 2: trib. Diatomear. Gen.: Frustulia, Styllaria, Meridion, Licmophora, Gomphonema, Achnanthes, Isthmia, Diatoma, Odontella, Fragilaria, Lysigonium, Oncobyrsa. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 19. Gen. ead. excepto ultimo.

Frutesca DC. mss. ex A. DC. Prodr. IX. p. 32: vid. *Fructesca DC.*

Fucaceae Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 35; 1825. Dict. class. VII. p. 66 (Ann. sc. nat. VII.): ordo 1 Thalassiophytor. non articulator. Gen.: Fucus, Laminaria, Osmundaria, Desmarestia, Furcellaria, Chorda. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 17. p. 479.

Leman 1816. Dict. v. 1. spl. p. 117: sect. 2 Algar. Gen. §. 1: Chorda, Plocamium, Gigartina. §. 2: Gelidium, Laurencia, Osmundaria, Fucus, Furcellaria, Chondrus, Desmarestia, Hypnea, Acanthophora, Dumontia.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 72: fam. Uviniae. Gen.: Fucus.

Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXXVII: div. Fucoidear. Gen.: Polyphacum, Lichina, Furcellaria, Fucus, Cystoseira, Macrocystis, Sargassum.

Fries 1825. Pl. homon. p. 326: ordo Hydrophycar. Gen.: Fucus, Furcellaria, Polyphacum, Laminaria, Dictyota, Encoelium, Sporochnus, Scytosiphon, Sphacelaria, Cladostephus.

Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 114: fam. Fucor. Gen.: Turbinaria, Sargassum, Cystoseira, Moniliformia, Himanthalia.

Fucaceae Lamx. cont.

Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 355: ordo Symphysistear. Gen.: Fucus, Laminaria, Agarum, Durvillaea, Osmundaria, Sargassum, Halidrys, Cystoseira, Himanthalia, Desmarestia, Furcellaria.

Bartl. 1830. Ord. p. 10: ordo Algar. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 9. Gen.: Asperococcus, Zonaria, Dictyosiphon, Striaria, Laminaria, Eklonia, Macrocystis, Desmarestia, Scytosiphon, Chordaria, Furcellaria, Lichina, Scaberia, Polyphacum, Splachnidium, Fucus, Cystoseira, Sargassum; Fucoides. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1337 et Ench. p. 7) Phyllospora. — Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. *Cf.* Flora 1843. p. 465. — Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 101. Subordines: Gymnothalamae, Angiothalamae, Actinothalamae.

Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 132: trib. Phycear. Gen.: Sargassum, Cystoseira, Halidrys, Fucus.

Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 142: ordo Aplosporear. Gen.: Sargassum, Turbinaria, Cystoseira, Moniliformia, Blossevillea, Myriodesma, Durvillea, Splachnidium. — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330 (Flora 1843. p. 93): Gen.: Fucus, Myriadenia, Himanthalia, Durvillea, Splachnidium, Hormosira.

J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 45: trib. Fucoidear. Gen.: Cystoseira, Sargassum.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 2: fam. Aplosporear.

Endl. 1843. Spl. III. p. 29: subordo Phycear. Trib.: Lemaneae, Fucoideae, Cystoseireae. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 189. Sect.: Fuceae, Cystoseireae.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 123: fam. Algar. Series: Cyclosporeae, Episporeae, Florideae.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 20: ordo Algalium. Subord.: Vaucheriae, Halysereae, Fuceae.

Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 250: subclass. Phycear. Ordines ut Fries 1846.

J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 180: ordo Fucoidear. Gen.: Splachnidium, Durvillaea, Sarcophycus; Myriodesma, Carpoglossum; Himanthalia; Hormosira, Fucodium, Fucus, Carpodesmia, Cystoseira, Cystophyllum, Halidrys, Cystophora, Coccophora, Scaberia, Phyllospora; Marginaria, Scytothalia, Seirococcus, Carpophyllum, Turbinaria, Sargassum.

Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 49: ordo Melanospermear. Gen. amer.: Sargassum, Phyllospora, Halidrys, Cystoseira, Fucus, Himanthalia. Accedunt 1858 (ibid. III. p. 121) Turbinaria, Cystophyllum.

Math. 1853. Belg. II. p. 490: trib. 3 Algar. Gen.: Sargassum, Fucus, Cystoseira, Furcellaria.

Fucarieae Rafin. 1810. Caratt. . . .: div. Algar. Gen.: Amansia, Phlyctis, Phoracis, Phaxanthe. *Cf.* Leman 1826. Dict. v. 39. p. 312.

Fucarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: ordo Coccosporar. Fam.: Fucineae, Dictyotaceae.

Fucastrum DC. 1830. Bot. gall. II. p. 938. Endl. 1836. Gen. n. 119 *b*. p. 10; 1841. Ench. p. 8: sect. Fuci. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 491.
Synon. Virson Adans.; Cervina Gray.

Fuceae Rchb. 1828. Consp. p. 29: div. Fucoidear. Gen.: Furcellaria, Fucus, Sargassum.
Zanard. 1843. Classif. Fic. p. 10: trib. Endogymnosporear. Gen.: Fucus.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 350; 1845. Phyc. germ. p. 277: fam. Angiospermear. Gen.: Splachnidium, Durvillaea, Hormosira, Ecklonia, Himanthalia, Fucus, Carpoglossum, Physocaulon, Scytothalia, Phyllospora, Sirococcus. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 584. Gen. ead. (emissis Physocaulone et Sirococco) et Sarcophycus, Myriodesma, Ozothallia, Contarinia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: subordo Fucacear. Trib.: Lemanidae, Fucidae, Cystoseiridae.
Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 253: fam. Cyclosporear. Gen. scand.: Halicoccus, Fucus, Himanthalia.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 189: subsect. Fucacear. Gen.: Fucus, Himanthalia, Ozothallia.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : trib. Zonariacear. Gen.: Dictyota, etc.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 104: trib. Actinothalamar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56: trib. Phycoidear. Gen.: Fucus, Pelvetia?, Ozothalia?, Carpodesmia, Myriadena, Himanthalia, Platythalia, Xiphophora, Splachnidium, Durvillaea, Ecklonia, Hormosira, Scaberia, Carpoglossum, Contarinia.

Fuchseae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 725: trib. Onagracear. Gen.: Fuchsia, Skinnera.

Fuchsia*) Plumier 1703. Gen. p. 14. t. 14.
Linn. 1737. Gen. p. 27. n. 74; 1759. Syst. ed. X. p. 893. n. 1097; 1762. Sp. ed. II. p. 159; 1764. Gen. ed. VI. p. 53. n. 128; 1767. Syst. ed. XII. p. 119: g. Tetrandr. Monogyn.
Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 522. n. 1009; 1753. Sp. II. p. 1191: g. incertae sedis.
Adans. 1763. Fam. II. p. 147: g. Aparinium.
Gled. 1764. Syst. p. 166. n. 675: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 141: g. Opulinar.
Reich. 1778. Gen. p. 194. n. 518: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 361. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 255. n. 652. — Gmel. 1791. Syst. p. 617. — Pers. 1797. Syst. p. 386. — Willd. 1799. Sp. II. p. 339. n. 758; 1809. En. p. 412. — Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 86. t. 322 — 325. (reform.)
Juss. 1789. Gen. p. 320: g. Onagrar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 77. — Pers. 1805. Ench. I. p. 410. n. 922. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 703 (genuinar.); 1825. Syst. II. p. 234. n. 1473; 1830. Gen. I. p. 315. n. 1610. — Link 1821. En. I. p. 379. — Kunth 1824. Syn. III. p. 394. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1298.
Neck. 1790. El. I. p. 138. n. 239: g. Sphanidophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 315: g. Epilobianis et Myrtoideis aff.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 154: g. Onagrariar. (Myrteis aff.) — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 56.
Hedw. 1806. Gen. p. 273. n. 1100: g. Onagrear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 103.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: g. Fuchsidiar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: g. Combretacear.
DC. 1828. Pr. III. p. 36: g. Fuchsiear. Sect.: Quelusia, Skinnera. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 676. Sect. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 121 (87). — Endl. 1840. Gen. n. 6125. p. 1193; 1841. Ench. p. 638. Sect.: Encliandra, Fuchsia (Zucc.), Skinnera. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 748.
Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4494: g. Jussieuear. Sect. ut DC.
Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 272: g. Onagrariear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: g. Fuchsiacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 319: g. Oenotherear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 117.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Fuchsear.
Synon. Quelusia Vand.; Nahusia Schneev.; Dorvalia Comm.; Skinnera Forst.; Macrostemma Sweet. (Steud.)

Fuchsia Swartz Prodr. p. 62.
= Schradera Vahl. (Endl.)

Fuchsia Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 204: g. restrict. Fuchsiear. (F. decussata, gracilis, macrostemma, etc.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6576. — Lilja 1841. Linnaea XV. p. 262.
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 177: g. Fuchsinear.
Endl. 1840. Gen. n. 6125 *b* δ. p. 1193; 1841. Ench. p. 638: subsect. Fuchsiae.
Synon. Spachia Lilja; Ellobium Lilja.

Fuchsia „Zuccar. 1837 g. sejuncta Encliandra restrict." Endl. 1840. Gen. n. 6125 *b*. p. 1193; 1841. Ench. p. 638: sect. Fuchsiae. Subsect.: Kirschlegeria, Fuchsia (Sp.), Schufia.

Fuchsiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: trib. Onagracear. Gen.: Fuchsia.

Fuchsidiae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Caliciunguliae. Gen.: Fuchsia.

Fuchsieae DC. 1828. Prodr. III. p. 36: trib. Onagrariar. Gen.: Fuchsia. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 676. Gen.: Gongylocarpus, Fuchsia.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 339. 401: sect. Onagrear. Gen.: Brebissonia, Kierschlegeria, Fuchsia, Schufia, Skinnera.

*) Dicat. Leonardo Fuchs, med. Dr. Monachi, deinde Tubingae.

Fuchsieae DC. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170: subdiv. Oenotherear. Gen. ut Spach.
Meisn. 1838. Gen. p. 121 (87): subtrib. Epilobiacear. Gen.: Fuchsia.
Endl. 1840. Gen. p. 1193; 1841. Ench. p. 638: trib. Oenotherear. Gen. id.
Lilja 1841. Linnaea XV. p. 261: div. Onagrar. Gen.: Encliandra, Fuchsia, Skinnera, Ellobium.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 105: trib. Onagrariear. Gen.: Fuchsia.

Fuchsineae Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 175: sect. Onagrear. Gen.: Brebissonia, Lyciopsis, Kierschlegeria, Fuchsia, Schufia, Skinnera.

Fuci Adans. 1763. Fam. II. p. 12: fam. 3 plantar. Gen.: Splachnon, Nostoc, Padina, Phascon, Muda, Ceramion, Fucus, Virson, Baillouviana.
Hill 1769. Ht. kew. tab.: class. 42 herbar.
Scop. 1777. Intr. p. 61: gens Incompletar. Gen.: Ulva, Fucus.
Juss. 1789. Gen. p. 6: sect. Algar. Gen. ut Scop.
Stackh. 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 52: ordo quartus Cryptogamiae. Gen.: Halidrys, Saccharina, Polyschidéa, Musaefolia, Ascophylla, Siliquaria, Hydrolapatha, Palmaria, Ciliaria, Dilséa, Polymorpha, Mammillaria, Gigartina, Membranifolia, Papyracea, Prolifera, Kaliformis, Osmundéa, Ericaria, Abrotanifolia, Monilifera, Sedoidea, Cornea, Membranoptera, Coronopifolia, Nereidea, Plumaria, Capillaria, Hyalina, Amphibia, Herbacéa, Hippurina, Bifurcaria, Fastigiaria, Flagellaria, Fuscaria, Loréa, Filum, Pygmaea, Fimbriaria, Bifida, Clavatula, Polypodoidea.
Bory 1828. in Duperr. voy. Crypt. p. 62: ordo Hydrophytor. Fam.: Laminariae, Fucaceae, Cylindraceae.

Fucidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 22: trib. Fucear. Gen. Fucoidear. Endl. 1843 et Ozothalia, Pelvetia.

Fucigena Dochnahl 1855. Obstk. I. p. 247: g. Malor. (*Trossapfel.*)

Fucinae Rchb. 1837. Handb. p. 136: div. Fucoidear.

Fucineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: fam. Fucariear. Gen.: Fucus, Halidrys, Osmundaria, Sargassum, Furcellaria, Cystoseira.

Fucites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 32: g. foss. Fucoidar.
Endl. 1836. Gen. n. 122 *h* p. 11; 1841. Ench. p. 8: sect. Fucoidis.

Fucodium J. Agardh 1848. Spec. Alg. I. p. 200: nov. g. Fucacear. (*Pycnophycus, Physocaulon* et *Fucus* pt. *Kütz.; Cymaduse, Pelvetia* et *Ozothallia Decne & Thur.*) Sect.: Xiphophora, Pelvetia, Pycnophycus, Ozothallia.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 68: sect. Fuci.
Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 339: g. Fucear.

Fucoideae Agardh 1817. Syn. Alg. p. IX. 1: sect. Algar. Gen.: Fucus, Osmundaria, Lichina, Sporochnus, Furcellaria, Chordaria, Laminaria.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 319. 383: div. Thalassiophytar. Gen.: Fasciata, Laminaria, Phasgonon, Chorda, Chordaria; Sporochnus, Desmarestia, Lichina; Himanthalia, Cervina, Fucus, Halidrys, Mackaia, Baccalaria, Siliquaria; Furcellaria.
Agdh. 1821. Sp. Alg. p. 1; 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 583: ordo Algar. Divis.: *purae* (gen.: Sargassum, Macrocystis, Cystoseira, Fucus, Furcellaria), Florideo-Fucoideae, Ulvoideo-Fucoideae, Confervoideo-Fucoideae, Tremellino-Fucoideae. *Cf.* Flora 1822. II. p. 388. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 100. Gen.: Chordaria, Scytosiphon, Sporochnus, Encoelium, Haliseris, Zonaria, Laminaria; Polyphacum, Lichina; Furcellaria, Fucus, Cystoseira, Macrocystis, Sargassum. — Agdh. 1824. Syst. p. XXXV. 254. Divis.: Chordarieae, Laminarieae, Fucaceae.
Sternb. 1825. Vers. I. p. V: ordo primus Acotyledonum. Gen.: Fucoides.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 192: subordo Algar. Gen. nonnulla: Delesseria, Rhodomela, Sphaerococcus, Polyides, Furcellaria, Fucus, Cistoseira.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 796: div. Algar. aquaticar. Gen.: Fucus.
Rchb. 1828. Consp. p. 28 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Ascophycar. Divis.: Sporochneae, Dictyoteae, Laminariaceae, Fuceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 136. Divis.: Laminarinae, Fucinae, Sargasseae. — Rchb. 1841. Nom. p. 21. Divis.: Chordarieae, Laminarieae, *Fucoideae* (gen. Meneghiniana).
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. Parenchymaphyllosporar. Sect.: Sporochnea, Laminariacea, Dictyotea, Fucea.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 8. Novum gen.: Marginaria.
Menegh. 1838. Cenni p. 48: fam. Algar. Gen.: Sargassum, Turbinaria, Carpophyllum, Cystoseira, Halidrys, Carpodesmia, Seirococcus, Scytothalia, Coccophora, Fucus, Himanthalia, Hormosira, Splachnidium, Polyphacum, Scabeira.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 393: trib. Melanospermear. Gen.: Sargassum, Cystoseira, Fucus, Splancnidium, Chytraphora? — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 1. 17. Gen.: Sargassum, Cystoseira, Halydrys, Fucus, Himanthalia.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 24: div. Algar. Trib.: Ectocarpeae, Sphacellarieae, Chordarieae, Dictyoteae, Sporochnoideae, Laminarieae, Fucaceae. — Par. J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 1. Ordines iidem.
Endl. 1843. Spl. III. p. 29: trib. Fucacear. Gen.: Fucus, Carpodesmia, Myriodesma, Himanthalia, Xiphophora, Splachnidium, Durvillaea, Hormosira, Castraltia.

Fucoides Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 210. 237. 307: g. Vegetabilium foss. class. III. *Cf.* Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 748.

Fucoides Brongn. cont.
Sternb. 1825. Vers. I. p. v: g. Fucoidear. *(Algacites Schloth.)*
Endl. 1836. Gen. n. 122. p. 11; 1841. Ench. p. 8: g. Fucacear. foss. Sect.: Caulerpites, Amansites, Dictyotites, Delesserites, Gigartinites, Encoelites, Laminarites, Fucites, Sargassites.

Fucoides „Harlan 1835. Med. and phys. research. p. 392. 398" Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 16; 1846. Chlor. prot. p. XXVIII: g. Algar. foss. dubiae affinitatis.

Fucoidites Sternb. 1838. Vers. II. p. 33: subordo Algacitum. Gen.: Encoelites, Haliserites, Zonarites, Laminarites, Cystoseirites, Sargassites.

Fucus Tourn. 1700. Inst. p. 565: g. pl. class. XVII, ab auctoribus varia latitudine adoptatum.
Linn. 1737. Gen. p. 326. n. 802; 1737. Cliff. p. 478; 1740. Syst. p. 32; 1751. Phil. bot. p. 35; 1753. Sp. II. p. 1158; 1759. Syst. ed. X. p. 1344. n. 1068; 1763. Sp. ed. II. p. 1626; 1764. Gen. ed. VI. p. 567. n. 1205; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 714: g. Algar. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 135. — Scop. 1772. Carn. II. p. 403. — Murr. 1774. Syst. p. 811; 1784. Syst. p. 965. — Reich. 1778. Gen. p. 562. n. 1321. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 346. — Lour. 1790. Coch. II. p. 687. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 768. n. 1671. — Gmel. 1791. Syst. p. 1380. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Pers. 1797. Syst. p. 1004. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 30. — Roth 1800. Germ. III. p. 439. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 18. — DC. 1805. Franç. II. p. 17. — Orb. 1820. Mém. Mus. VI. p. 183. (marinar.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 13: g. Fucor. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 61. — Juss. 1789. Gen. p. 6.
Gled. 1764. Syst. p. 300. n. 1206: g. Algacear. vesicularium.
Neck. 1771. Meth. musc. p. 17. 244: g. Muscor. frondescentium.
Wigg. 1780. Holsat. p. 83: g. Sphaerospermar.
Neck. 1790. El. III. p. 347. n. 1764: g. Athrosophytor. Sejunguntur Ocidiophora et Chondrophyllum.
Batsch 1802. Tab. p. 267: g. Algoideor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 44: g. Hypepidermidocarpor.
Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 35: g. Fucacear. — Par. Leman 1820. Dict. v. 17. p. 479. 486. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 72. — Agdh. 1824. Syst. p. XXXVII. 275. — Fries 1825. Pl. homon. p. 326. Subgen.: Sargassum, Cystoseira, Halidrys, Himanthalia. — Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 356. — Endl. 1836. Gen. n. 119. p. 10; 1841. Ench. p. 8. Sect.: Himanthalia, Fucastrum. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 139. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. p. 93.) — J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 207. Sejungitur Fucodium. — Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 67. Sect: Fucodium, Fucus.

Fucus Tourn. cont.
— Math. 1853. Belg. II. p. 491. Sect. Halidrys, Fucastrum.
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. IX. 1; 1821. Sp. Alg. I. 1. p. 83 (Aphor. p. 101): g. Fucoidear. (restrict.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 320. 389. — Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 193. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 886. — Menegh. 1838. Cenni p. 44. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 393; 1841. Brit. Alg. p. 20. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 785. — Endl. 1843. Spl. III. p. 29. n. 116. *(Synon. Cervina Gray, Virson Adans., Halidrys et Bifurcaria Stackh.)* — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 157.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 3: g. Phycoidator.
Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 283. Sect.: Fucus (Lamx.), Delesseria, Gelidium, Gigartina, Dictyota, Dictyopteris, Alcyonidium.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 315. n. 3386; 1831. Gen. II. p. 748. n. 3786: g. Phycoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 29. n. 513: g. Fucear. Sect.: Himanthalia, Halidrys. — Par. Zanard. 1843. Classif. p. 10. — Kütz. 1843. Linnaea XIII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 351; 1845. Phyc. germ. p. 278; 1849. Sp. Alg. p. 589. n. 401. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 189. — Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 254. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Fucinear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 96: g. Chondrothamnior.
Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. . . . . . g. Laminariear.
Decne & Thur. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 13: g. restrict.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 122: g. Cyclosporear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Fucidar.
Synon. Virson Adans.; Halidrys, Bifurcaria et Carpobleptus Stackh.; Fucastrum DC.; Lombricaria Palis.?

Fucus Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 7: fam. Algar. Gen.: Codium, Chordaria, Palmaria, Sphaerococcus, Chondrus, Fucus s. Sargassus.

Fucus „Eichw." Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 16; 1846. Chlor. prot. p. XXVIII: g. Algar. foss. dubiae affinitatis.

Fūchselia*) Endl. 1847. Syn. Conif. p. 304; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 13. n. $1816/_{29}$: g. Abietinear. foss.

Fürnrohria**) C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 356: nov. g. Ammear. (F. setifolia.)
Meisn. 1843. Comm. p. 358: g. Amminear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 82. n. $4415/_1$. — Walp. 1843. Rep. II. p. 395. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 268.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778 *(Furnrohria)*: g. Amminidar.

*) Dicat. C. G. Füchsel, Ilmenaviensi.
**) Dicat. cl. Fürnrohr, Ratisbon.

Fugosia Juss. 1789. Gen. p. 274: g. Malvacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 189. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 65. — Pers. 1807. Ench. II. p. 240. n. 1619. — DC. 1824. Pr. I. p. 457. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 539. n. 2645. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 488.
St. Hil. 1827. Fl. Bras. I. p. 251: g. Malvear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 396.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: g. Hibiscear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 27 (23). — Endl. 1840. Gen. n. 5279. p. 983; 1841. Ench. p. 512. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 77. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 308.
Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 5270; 1841. Nom. p. 200. n. 7641: g. Ketmiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 286: g. Fugosiear.
= Cienfuegosia Cavan.

Fugosieae Rchb. 1837. Handb. p. 288: sect. Ketmiear. Gen.: Fugosia, Redoutea.

Fuirena*) Rottböll 1773. Gram. p. 70. t. 19.
Linn. f. 1779. Gram. gen. Ed. 1790. (Amoen. acad. X.) p. 25: g. Graminum amentaceor.
Linn. f. 1781. Suppl. p. 11. n. 1357: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 102. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 40. n. 90. — Gmel. 1791. Syst. p. 123. — Pers. 1797. Syst. p. 103; 1805. Ench. I. p. 70. n. 117. — Willd. 1797. Sp. I. p. 255. n. 108. — Vahl 1806. Enum. II. p. 383. n. 124. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 37. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 184; ed. 1832. I. p. 180.
Juss. 1789. Gen. p. 26: g. Cyperoidear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 504. — Link 1827. Hort. I. p. 327.
Neck. 1790. El. III. p. 236. n. 1626: g. Achyrophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 129: g. Calamariar.
Batsch 1802. Tab. p. 157: g. Scirpear. — Par. Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 219; 1822. Syn. I. p. 150; 1837. Cyper. p. 180. — Lestib. 1819. Ess. Cyper. (Flora 1821. I. p. 26 et Schult. Mant. II. p. 3.) — Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Meisn. 1843. Gen. p. 411 (313). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 12. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144. — Steud. 1855. Glum. II. p. 125. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 328. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 368.
Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 36: g. Cyperacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 65. — Hedw. 1806. Gen. p. 36. 361. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 220. Ed. Nees p. 76. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 5. 233. n. 186. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 236. n. 234. — Mart. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 1. p. 67. t. 4. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 130. 227.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 135: g. Scirpinar.

*) Dicat. Fuireno.

Fuirena Rottb. cont.
Presl 1828. Rel. Hänk. I. p. . . .: g. Hypolytrear. — Par. Nees 1834. Linnaea IX. p. 288; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 74.
Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1127; 1841. Nom. p. 41. n. 1489: g. Fuirenear. (genuinar.) — Par. Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 107.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 51. n. 243: g. Cyperear. — Par. Schrad. 1832. Comm. Gott. VII. p. 151.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Endl. 1837. Gen. n. 995. p. 117; 1841. Ench. p. 64: g. Ficiniear.
Schltd. 1845. Bot. Zeit. p. 849.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Ficinidar.
Synon. Vaginaria Rich.

Fuireneae Rchb. 1828. Consp. p. 57; 1837. Hdb. p. 147: subdiv. Scirpinar. Gen.: Beera, Diplasia; Fuirena, Lepidosperma, Oreobolus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. (ampliat.) Sect.: Melancranideae, Hemichlaeneae, *genuinae* (gen.: Fuirena, Vauthiera, Ficinia, Fimbristylis).
„Fenzl mss." Endl. 1837. Gen. p. 116; 1841. Ench. p. 64: trib. Cyperacear. Subtrib.: Melancranideae, Hemichlaeneae, Ficinieae. — Par. Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 107. Gen.: Fuirena.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: subordo Cyperacear. Trib.: Melanocranidae, Hemichlaenidae, Ficinidae.

Fulcaldea Poiret 1827. Suppl. V. p. 375.
Less. 1830. Linnaea V. p. 247; 1832. Syn. p. 95: g. Mutisiear. — Par. Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 750.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 4: g. Barnadesiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 228 (141). — Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3806. (genuinar.) — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Endl. 1838. Gen. n. 2904. p. 481; 1841. Ench. p. 247: g. Gerberear.
Synon. Turpinia Kunth; Voigtia Spreng.; Dolichostylis Cass.

Fulchironia „Lestib. in Desf. H. P. ed. 3. p. 29" Steud. Nomencl. I. p. 650; II. p. 323. (F. senegalensis.)
= Phoenix leonensis Lodd.

Fulgensia Massalongo .... Alc. gen. p. 10: nov. g. Lichenum.
= Psoroma Ach., Körb.

Fulgia Chevall. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 58: nov. g. Fungor.
= Coniocybe Achar.

Fuligineae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 550: trib. Lycoperdacear. Gen.: Trichoderma, Myrothecium, Dichosporium?, Amphisporium, Strongilium, Dermodium, Diphterium, Spumaria, Fuligo, Pittocarpium, Lycogala, Lignidium, Licea.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: fam. Fuliginum. Gen.: Trichoderma, Myrothecium, Aethalium, Lignydium, Lycogala, Diphtherium, Licea, Tubulina, Physarum, Cionium, Diderma, Didymium, Leocarpus, Leangium, Didyderma, Trichia,

Fuligineae Brongn. cont.
Arcyria, Stemonitis, Dictydium, Cribraria, Cupularia, Craterium; Myriococcum.
Math. 1853. Belg. II. p. 394: trib. Gasteromycetum. Gen.: Reticularia, Fuligo, Spumaria, Trichoderma, Hyphelia.

Fuligines Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 167: subordo Fungor. Unica fam.: Fuligineae.

Fuliginoidei Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLIX: sect. Trichospermor. Gen.: Pittocarpium, Aethalium, Lycogala, Spumaria.

Fuligo Hall. 1768. Helvet. III. p. 110. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 17. p. 510.
Wigg. 1780. Holsat. p. 112: g. Fungoidear.
Roth 1788. Germ. I. p. 560: g. Fungor. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1466. — Pers. 1796. Obs. myc. I. p. 92. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 21. 262.
Pers. 1797. Tent. p. 5: sect. Dermatocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. XIV. 159: g. Trichospermor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 346. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 48.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 80: g. Spumidear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 552: g. Fuliginear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 395.
= Aethalium Link.

Fullartonia*) DC. 1836. Pr. V. p. 281: nov. g. Erigerear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2328. p. 378; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 186 (126). — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Asterear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3269: g. Erigeronear.

Fumago „Turp.“ Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 9: g. Trichomycor. Sect.: Fumago, Polychaeton. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 17. p. 511; 1826. v. 42. p. 325.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeronaemeor. (restrict.)

Fumana Dunal 1824 in DC. Prodr. I. p. 274: sect. Helianthemi. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 124. — Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4915*c*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 307. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 240. — Griseb. 1842. Rumel. I. p. 233.
Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 359; 1838. Vég. phan. VI. p. 8: g. Fumaninear.
Bernh. 1838. Flora II. p. 682: g. Cistacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 350. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 752.
Endl. 1839. Gen. n. 5027. p. 904; 1841. Ench. p. 467: g. Cistinear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 75. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 173. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 230.
Rchb. 1841. Nom. p. 188. n. 7189: g. Cistear. genuinar.

*) Dicat. Fullarton, peregrinatori in India.

Fumanineae Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 359; 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 6: sect. Cistear. Gen.: Fumana.

Fumaria Tourn. 1700. Inst. p. 421. t. 237: g. pl. class. XI, ab auctoribus varia latitudine adoptatum. *Cf.* Bernh. 1833 in Linnaea VIII. p. 401 et Pfeiff. 1857. Bot. Zeit. p. 649.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 246. Ed. Hall. 1745. p. 253: g. pl. class. XI.
Linn. 1737. Gen. p. 213. n. 566; 1737. Cliff. p. 351; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 207; 1753. Sp. II. p. 699; 1759. Syst. ed. X. p. 1153. n. 760; 1763. Sp. ed. II. p. 933; 1764. Gen. ed. VI. p. 362. n. 849; 1767. Syst. ed. XII. p. 469: g. Diadelph. Hexandr. (dilatatum.) — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 46. — Murr. 1774. Syst. p. 529; 1784. Syst. p. 636. — Reich. 1778. Gen. p. 363. n. 920. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 481. n. 1154. — Gmel. 1791. Syst. p. 1079. — Pers. 1797. Syst. p. 674; 1807. Ench. II. p. 270. n. 1659. — Willd. 1800. Sp. III. p. 857. n. 1312; 1809. En. p. 741. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 86. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 179. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 427. 440. — Roxb. 1832. Ind. ed. Wall. III. p. 217.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 604: g. inter Papilionaceas et Didynamias medium.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 129. n. 530: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 51.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Corydalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 371.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Papaveracear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 237. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 94. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 497. — DC. 1805. Franç. IV. p. 658; 1815. V. p. 587. — Lois. 1820. Dict. v. 17. p. 513 (*Fumeterre*) sejuncta Corydalide. — Link 1822. En. II. p. 219.
Adans. 1763. Fam. II. p. 431: g. Papaverum. Typi: F. spectabilis, officinalis, spicata et capreolata L., sejunctis Capnoide, Cisticapno et Bikukulla.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 65: g. Leguminosar.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 435: g. Papilionacear. (deliquesc.)
Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Pal. II. p. 481: g. Rhaeadum.
Scop. 1777. Intr. p. 313: g. Anomalar., sejuncta Neckeria.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 185. 252. 263. 264; 1789. Phil. Bot. I. p. 89. *Cf.* *Corydalis Medic.*, *Capnoides Tourn.* et *Pseudo-fumaria Riv.*
Neck. 1790. El. III. p. 59. n. 1378: g. Amorphophytor., exclusis Neckeria et Corydalide.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 162. t. 115.
Borckh. 1797 in Römer Arch. I. 2. p. 44: g. restrictum. Typi: F. officinalis, nobilis,

Fumaria Tourn. cont.
etc. Distinguuntur Capnoides, Pseudofumaria, Cysticapnos, Diclytra, Capnorchis, Bicuculla.
Batsch 1802. Tab. p. 87: g. Rhoeadear. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 440.
Cram. 1803. Disp. p. 75: in Hexandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 725: g. Papaverear.
DC. 1821. Syst. II. p. 130; 1824. Pr. I. p. 129: g. Fumariacear. Sect.: Platycapnos, Sphaerocapnos. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 37. — St. Hil. 1829. Fl. Bras. II. p. 117. — Bartl. 1830. Ord. p. 260. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 144. Sect. ut DC. — Link 1831. Hdb. II. p. 276. — Koch 1836. Syn. p. 32. Ed. II. p. 35. — Webb 1836. Canar. I. p. 52. — Meisn. 1837. Gen. p. 8 (10). — Kunth 1838. Berol. I. p. 33. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 70. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 104. — Brongn. 1843. En. genr. p. 93. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 66. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 258.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 699: g. Fumaridear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 159. n. 2483; 1831. Gen. II. p. 568. n. 2766: g. Fumariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4827 (sect. ut DC.); 1832. Fl. exc. p. 697; 1837. Hdb. p. 264 (genuinar.); 1841. Nom. p. 184. n. 7054. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51. — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 239. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 289. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 753 (*Fumeterre*).
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 471: g. Monocentrear. restrictum. Distinguuntur Dactylicapnos, Dicentra, Eucapnos, Adlumia, Bulbocapnos, Corydalis, Capnoides, Sarcocapnos, Cysticapnos, Discocapnos, Platycapnos.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 85: g. Fumarinear.
Endl. 1839. Gen. n. 4843. p. 861; 1841. Ench. p. 444: g. Corydalidear. (*Synon. Sphaerocapnos DC.*) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 178.
Parlat. 1842. Mon. generis Fumariae.
Hammar 1857. Act. soc. Ups. ser. tert. II. 2. p. 257. (Monogr.) *Cf.* Bot. Zeit. 1857. p. 653 et Flora 1858. p. 13. Sect.: officinales, capreolatae, agrariae.

Fumaria Lühnem. vid. *Funaria Schreb.*

Fumariaceae DC. 1819. Théor. élém. p. 244; 1821. Syst. II. p. 105; 1824. Prodr. I. p. 125: ordo (10) Thalamiflorar. Gen.: Diclytra, Adlumia, Cysticapnos, Corydalis, Sarcocapnos, Fumaria. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 139. Gen. ut DC. et Dactylicapnos, Discocapnos.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 64: fam. Thalamunguliae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 587; ordo Brevistylar.

Fumariaceae DC. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: div. Papaveracear. Gen. ut DC.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44. 51: fam. Papaverariear. Trib.: Fumarieae, Corydalideae, Diclytreae.
Bartl. 1830. Ord. p. 259: ordo (146) Rhoeadear. Gen. ut DC. (Dielytra loco Diclytrae) et Discocapnos.
Link 1831. Hdb. II. p. 274: ordo 4 Allostemonum. Gen. ut. DC. (omissa Adlumia.)
Lindl. 1833. Nix. p. 14: ordo ad Papaveraceas accedens.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 465; 1838. ibid. XII. p. 661. Tribus: Hypecoëae, Fumarieae.
Meisn. 1837. Gen. p. 8 (9): ordo 11 plantar. (p. 437 Rhoeadear.) Gen.: Dactylicapnos, Dicentra, Eucapnos, Adlumia, Bulbocapnos, Corydalis, Capnoides, Cysticapnos, Sarcocapnos, Discocapnos, Platycapnos, Fumaria.
Endl. 1839. Gen. p. 858; 1841. Ench. p. 443: subordo Papaveracear. Tribus ut Bernh. — Par. Pfeiff. 1857. Bot. Zeit. p. 649. Trib. eaed. (*Cf.* Pfeiff. ibid. 1859. p. 158.)
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 55: fam. (101) Rhoeadear. Trib. ut Bernh.
Brongn. 1843. En. genr. p. 93: fam. Papaverinear. Gen. ut Bartl. et Hypecoum.
Krause 1846. Bot. Zeit. p. 121.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 435: ordo Berberalium. Trib. ut Bernh.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 752. Divis.: Corydaleae, Fumarieae.

Fumarideae Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 699: fam. Thalamiflorar. Gen.: Fumaria, Corydalis.

Fumarieae (Spreng. 1826.) Rchb. 1828. Consp. p. 186 (1832. Fl. exc. p. 697): div. Papaveracear. Gen.: Fumaria, Discocapnos, Sarcocapnos, Adlumia, Cysticapnos, Dielytra, Corydalis. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 264; 1841. Nom. p. 184. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Fumaria, Platycapnos, Discocapnos), Corydaleae, Dielytreae (1841 Dicentreae).
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 466; 1838. ibid. XII. p. 663: trib. Fumariacear. Subtribus: Dicentreae, Monocentreae. (Accedunt 1838 Macrocapnos et Phacocapnos.) — Par. Endl. 1839. Gen. p. 859; 1841. Ench. p. 443. Subtrib.: Dicentreae, Corydalideae. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 59. 64. Sect.: Dielytrineae, Corydalineae, Fumarineae. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436. Gen. Endlicheriana et Capnites, Leonticoides. — Pfeiff. 1857. Bot. Zeit. p. 649. Subtrib. ut Bernh.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 288: trib. Papaveracear. Gen.: Corydalis, Fumaria, Hypecoum.
Parlat. 1844. Monogr. delle Fumariee.

Fumarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: trib. Fumariacear. Gen.: Fumaria, Sarcocapnos.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 753: div. Fumariacear. Gen. ead. et Platycapnos, Discocapnos.

Fumarineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 61. 84: sect. Fumariear. Gen.: Fumaria, Platycapnos, Discocapnos.

Funaria Schreb. 1791. Gen. II. p. 760. n. 1650: g. Muscor. — Par. Mönch 1794. Meth. p. 746. — Willd. 1797 in Schrad. Journ. II. p. 14. (frondosor.) — Roth 1800. Germ. III. p. 225. — Hedw. 1801. Spec. p. 172. (frondosor.) — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 12. 95. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 303. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 35. — DC. 1805. Franç. II. p. 496. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 74. — Mart. 1817. Erlang. p. 74. — Leman 1820. Dict. v. 17. p. 516. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 744. — Agdh. 1822. Aphor. p. 108. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 216. n. 3344; 1831. Gen. II. p. 737. n. 3738. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 284. (odontostomor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 22.

Brid. 1803. Muscol. rec. II. 3. p. 118; 1817. Suppl. III. p. 65: g. Diploperistomator.

Palis. 1805. Pr. Aethéog. p. 24; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 450: g. Ectopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 220.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 37 (sphalm. *Fumaria*): g. Mitrocarpor.

Brid. 1822. Meth. musc. p. 123: g. Peristomor. acrocarpor.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 731: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 249.

Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 275: g. Bryoidear.

Brid. 1827. Bryol. II. p. 49: g. Acrocarpor. (peristomor. et ibid. p. XLV g. Funariar.) — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 518.

Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 662: g. Funariaceor.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Bryear.

Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Funarioidear.

Hüb. 1833. Musc. germ. p. 496: g. Acrocarpor. diploperistomor.

Endl. 1836. Gen. n. 556. p. 54; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 39.

Hampe 1837. Linnaea XI. p. 86: g. Funariear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 29; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400. — Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 89.

Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 934: g. Calyptrobryor.

Bruch & Schimp. . . . . Bryol. eur. Fasc. XI: g. Funariacear. — Par. C. Müll. 1843. Bot. Zeit. p. 505; 1844. Linnaea XVIII. p. 692; 1848. Syn. Musc. I. p. 106. — Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 113. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 89. — Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 370. — Bayrh. 1849. Taun. p. 18. — Wils. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 90.

Synon. Kölreutera Hedw.; Strephedium Palis.

Funariacea Rchb. 1828. Consp. p. 36: sect. Bartramiaceor. Gen.: Entosthodon, Funaria, Meesia, Diplocomium.

Funariaceae Bruch & Schimp. . . . . Bryol. eur. Fasc. XI: fam. Muscor. Gen.: Physcomitrium, Entosthodon, Funaria.

C. Müll. 1843. Bot. Zeit. p. 505: trib. Muscor. Gen.: Funaria, Physcomitrium, Entosthodon, Ephemerum, Discelium. — Par. C. Müll. 1844. Linnaea XVIII. p. 692. Familiae: Funaria, Physcomitrium.

C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 105: subtrib. Funarioidear. Gen.: Funaria, Pyramidium, Physcomitrium, Entosthodon, Amblyodon. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 86. Gen. ead. (excepto Amblyodonte.)

Bayrh. 1849. Taun. p. 17: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Physcomitrium, Funaria.

Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 370: trib. Acrocarpor. Gen. ut Müll. 1848. (Ephemerum loco Pyramidii.)

Funariae Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: div. Mnioideor. Gen: Entosthodon, Funaria.

Funarieae Hampe 1837. Linnaea XI. p. 80.

Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 89: div. Bryacear. Gen.: Funaria, Physcomitrium.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: trib. Acrocarpor. Gen. ead. et Entosthodon.

Funarioideae Fürnrohr 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: fam. 12 Muscor. Gen.: Physcomitrium, Entostodon, Bergia, Funaria.

Funarioideae C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 105: trib. Acrocarpor. Subtrib.: Funariaceae, Splachnaceae. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 86. Subtrib. eaed.

Funckia*) Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 19: nov. g. Liliacear. (Melanthium pumilum Forst.)

= Astelia Banks & Sol.

Funckia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 32: nov. g. plantar. (*Kara Kandel Rheede* VI. t. 37.)

= Lumnitzera Willd.

Funckia Dumort., Spreng. 1830, Bartl. vid. *Funkia Spreng.*

Fungadae Scopoli vid. *Fungoideae Scop.*

Fungales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 38: nixus Esexualium. Ordines: Fungi, Lichenes, Algae.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 29: nixus Thallogenar. Ord.: Hymenomycetes, Gasteromycetes, Coniomycetes, Hyphomycetes, Ascomycetes, Physomycetes.

Fungarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72: ordo Hymenosporar. Fam.: Agaricineae, Clavariaceae, Pezizaceae, Helvellaceae.

*) Dicat. pharmacopolae H. Chr. Funck.

Fungi M. de Juss. 1728. Mém. Ac. Par. p. 377: classis plantarum, Fungos et Lichenes Auctorum complectens.

Adans. 1763. Fam. II. p. 4: fam. 2 plant. Gen. §. 1: Martela, Manina, Clavaria, Ugola, Monka, Patila, Somion, Bidona, Terana. §. 2: Gonsala, Pezica, Cyata, Ceratospermon, Pissida, Trombetta, Gabura, Cladona, Usnea, Platisma, Placodion, Lichen, Kolman, Korkir. §. 3: Mucilago, Lycogala, Lycoperdon, Sufa, Carpobolus, Tuber, Clathroides, Clathroidastron, Puccinia. §. 4: Clathrus, Phallus, Boletus, Phallaboletus. §. 5: Hypoxylon, Valsa, Kordera, Mison, Agaricon, Poria, Polyporus, Suillus. §. 6: Striglia, Sesia, Serda, Graphis. §. 7: Petrona, Kuema, Gelona, Chanterel, Amanita, Fungus, Volva.

Fungi Linn. 1737. Gen. p. 327 (et in omnibus operibus systematicis): ordo 4 Cryptogamiae. Gen.: Agaricus, Boletus, Phallus, Elvela, Clathrus, Peziza, Clavaria, Lycoperdon, Mucor.

Gled. 1749 in Mém. Ac. Berl. V. (1751): p. 135: ordo 4 class. VI. Gen.: Byssus, Clavaria, Elvela, Phallus, Boletus, Agaricus, Clathrus, Peziza, Stemonitis, Lycoperdon, Buxbaumia, Mucor. *Cf.* Gled. 1753. Meth. fungor. (Berol. 8.)

Linn. 1751. Phil. bot. p. 35: ordo 67 plant. Gen. ut 1737 et Hydnum, Byssus.

Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 58 plant. Gen. ut 1751. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 618.

Juss. 1789. Gen. p. 3: ordo 1 Acotyledonum. Gen. §. 1: Mucor, Lycoperdon, Tuber, Clathrus. §. 2: Phallus, Boletus, Helvella, Peziza, Cantharellus, Amanita, Suillus, Hydnum. §. 3: Agaricus, Merulius, Auricularia, Hericius. §. 4: Clavaria. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 3. Gen. §. 1: Tuber, Reticularia, Mucor, Trichia, Sphaerocarpus, Lycoperdon, Nidularia, Hypoxylon, Variolaria, Clathrus. §. 2: Clavaria, Tremella. §. 3: Peziza, Phallus. §. 4: Auricularia, Helvella, Hydnum, Fistulina, Boletus, Agaricus.

Mönch 1794. Meth. p. 771: ordo Cryptostemonis.

Pers. (1796. Obs. mycol.) 1797. Tent. disp. p. 1. Classes: Angiothecium, Gymnothecium.

Pers. 1801. Syn. meth. p. XII. Class.: Angiocarpi, Gymnocarpi.

Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 1: fam. 2 Aetheogamiae.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 1. t. 1. Gen. ut Vent. et in §. 4: Favolus, Merulius, Cantharellus, Amanita.

DC. 1805. Franç. II. p. 65 (1819. Théor. élém. p. 250): fam. 2 Acotyledonum. Ordines ut Pers. 1801. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 863. — Leman 1817. Dict. v. 8. p. 101. Ordines iidem.

Kunze & Schmidt 1817. Mykol. Hefte.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 8: fam. 1 pl. Ordines: Coniomyci, Nematomyci, Goniomyci, Gastromyci, Fungi, Myelomyci.

Fungi Linn. cont.

Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. Cohortes: Pulverariae, Phragmidia, Hypodermia, Moniliae, Sporotricha, Botrytides, Parasporia, Dematia, Sarcopodia, Cephalotricha, Ascophorae, Cribrariae, Leiocarpi, Lycogalacta, Lycoperda, Sclerotia, Cytosporae, Tremellae, Phalli, Pisocarpia, Sphaeriae, Hysteria, Pezizae, Clavariae, Boleti, Agarici. *Cf.* Flora 1819. I. p. 193.

Mass. 1818. Dict. v. 12. p. 119: div. Cryptogamar.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 277: div. plantar. cellulosar. aphyllear. Fam.: Protomyceae, Nematomyceae, Gasteromyceae, Sarcotheceae, Hymenotheceae, Lytotheceae.

Fries 1821. Syst. myc. I. p. XXXVII. Classes: Coniomycetes, Hyphomycetes, Gasteromycetes, Hymenomycetes.

Agdh. 1821. Aphor. p. 77; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: class. Acotyledonear. Ord.: Coniomycetes, Mucedines, Byssaceae, Tremellinae, Pyrenomycetes, Gasteromycetes, Hymenomycetes, Hydnorinae.

Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 1. Ordines: Trichomyci, Sarcomyci, Pilomyci.

Link 1824. Spec. I. p. IV. Ordines: Hypho-, Gymno-, Gastero-, Sarco-, Scleromycetes.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 492 (*Mycologie*). Fam.: Uredineae, Mucedineae, Lycoperdaceae, Fungi (*Champignons* proprement dits), Hypoxyleae.

Fries 1825. Pl. homon. p. 40. 50: class. Homonemear. Subclass.: Ascomycetes, Sporomycetes.

Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 162: ordo Cryptophytor. Subord.: Mucedines, Fuligines, Mycetes.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 666. 918: ordo 4 Cryptogamiae. Divis.: Hymenomyci, Gasteromyci, Mucoroidei, Pulveracei.

Rchb. 1828. Consp. p. 1: class. I. plant. Ordines: Gymnomycetes, Dermatomycetes. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 129. Ord.: Blasto-, Hypho-, Dermatomycetes. — Rchb. 1841. Nomencl. p. XXVI. 1. Ordines: Coniomycetes, Hyphomycetes, Dermatomycetes.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (271) Aphyllar.

Bartl. 1830. Ord. p. 5: class. I. Vegetabilium cellularium. Ordines: Conio-, Gastero-, Pyreno-, Hymenomycetes.

Corda 1830 in Sturm. Jungerm. p. 4: class. Agamar.

Rchb. 1832. Fl. exc. p. L: class. Hemiphytor. Ordines ut 1828.

Lindl. 1833. Nix. p. 38: ordo Fungalium.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. XIII (*Fungi* s. *Mycetes*) et 122: class. VI. Agamor. Ord.: Asporo-, Sporo-, Hypho-, Myxo-, Hymeno-, Pyrenomycetes.

Fries 1836. Epicr. p. 1. Fam. ut 1821 et Discomycetes, Pyrenomycetes.

Endl. 1836. Gen. p. 16; 1841. Ench. p. 12: unica class. Hysterophytor. Ordines: Gymno-, Hypho-, Gastero-, Pyreno-, Hymenomycetes.

Fungi Linn. cont.
Corda 1842. Mycol. p. LII. Ordines: Coniomycetes, Hyphomycetes, Myelomycetes, Hymenomycetes.
Brongn. 1843. Én. genr. p. XII. 2: class. Amphigenar. Ordines: Hypho-, Gastero-, Hymeno-, Scleromycetes.
Schleid. 1843. Grundz. II. p. 32: div. Gymnosporar.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 1. Ordines: Conio-, Hypho-, Dermatomycetes.
Lév. 1846. Consid. mycol. p. . . .; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 486. Divis.: Basidiosporei, Thecasporei, Clinosporei, Cystosporei, Trichosporei, Arthrosporei.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 267: class. Heteronemear. Fam. Hymeno-, Disco-, Pyreno-, Gastero-, Gymno-, Haplomycetes.
Bonord. 1851. Hdb. Mykol. Ordines: Conio-, Crypto-, Hyphomycetes, Mucorini, Mycetini, Tremellini; Hymeno-, Discomycetes, Myxogasteres, Sphaeronemei, Gastero-, Pyrenomycetes.
Bail 1858. Syst. Pilz. p. 4. Series: Basidiosporeae, Thecasporeae.
Conf. Vegetabilia mycetoidea et fungosa Nees; Mycetes Spreng.; Pilophyta Ritg.

Fungi Link 1809. Berl. Mag. III. p. 35: ordo 4 (restrict.) Anandrar. Gen.: Amanita, Agaricus, Russula, Coprinus, Merulius, Cantharellus, Xylophagus, Daedalea, Boletus, Fistulina, Sistotrema, Hydnum, Thelephora, Stereum, Merisma; Geoglossum, Spatularia, Leotia, Helvella, Helotium, Morchella, Peziza, Ascobolus, Stictis.
Mart. 1817. Erlang. p. 390: ordo 13 Cryptogamiae. Sect.: Fungi aërei et hypogaei, Clavati, Pileati, Utrini, Myelomycetes. — Par. Link 1831 in Willd. Grdr. p. 236.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 567 (*Champignons*): fam. 4 Fungor. Trib.: Tremellineae, *Fungi* (divis.: Helvellaceae, Clavarieae, Agariceae), Clathraceae.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 377; 1831. Gen. II. p. 762: ordo 2 Mycetum. Divis.: Pileati, Mitrati, Clavati, Utrini et 1831: Pezizoidei, Tremellei, Trichodermeae.
Math. 1853. Belg. II. p. 159: fam. 5 Acotyledonear. Trib.: Tremellineae, Fungineae, Clathraceae.

Fungi aërei et hypogaei Nees 1817. Syst. Ueberbl. p. 39: regnum Vegetabilium fungosor. Circuli: Sarcoidei, Sphaeroidei.

Fungi calycini Nees Syst. p. 254; Ueberbl. p. 66: vid. *Fungi utrini*.

Fungi clavati et pileati Nees 1817. Ueberbl. p. 42: regnum Vegetabilium fungosor. Circuli: Clavariae, Fungi *pileati* (gen.: Agaricus, Boletus; Daedalea, Systotrema; Merulius, Hydnum, Thelephora).

Fungi pileati Nees Syst. p. 179; Ueberbl. p. 46: vid. *Fungi clavati et pileati Nees*.

Fungi pistillares Nees Syst. p. 249; Ueberbl. p. 64: vid. *Fungi utrini Nees*.

Fungi utrini Nees 1816. Syst. p. 243; 1817. Ueberbl. p. 64: regnum Fungor. Circuli: Fungi *pistillares* (gen.: Batarrea, Hymenophallus, Phallus, Clathrus), *calycini* (gen.: Peziza, Ascobolus).

Funginae Agardh 1824. Syst. Alg. p. XXI: div. Confervoidear. Gen.: Byssocladium, Syncollesia, Mycinema.

Funginae Lennis 1849. Schul-Naturg. II. p. 217: ordo (60) Cryptogamar. cellularium. Fam.: Hymenomycetes, Gasteromycetes, Hyphomycetes, Coniomycetes.

Fungineae Mathieu 1853. Fl. Belg. II. p. 267 (*Fonginées*): trib. Fungor. Subtrib.: Helvellaceae, Clavarieae, Agariceae.

Fungoidaster Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 200. t. 82. f. 5: g. pl. class. XVII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 58: g. pl. class. I.
= Cratarellus Pers.

Fungoidea Batsch 1802. Tab. affin. p. 269: fam. Aphyllor. Gen.: Agaricus, Boletus, Hydnum, Elvela; Phallus, Peziza; Cyathus; Clavaria; Clathrus, Lycoperdon, Tuber, Sphaeria.

Fungoideae Scopoli 1777. Introd. p. 360 (p. 58 *Fungadae*): tribus 36 plantar. Gentes: 1. *Fructificationibus expositis*. Gen.: Lichen, Valsa, Elvela, Agaricum, Clavaria, Merulius, Polyporus, Hydnum, Amanita, Boletus. 2. *Fructificationibus inclusis*. Gen.: Phallus, Clathrus, Peziza, Lycoperdon, Mucor, Botrytis, Mucilago, Tremella.
Wigg. 1780. Holsat. p. 97: appendix Cryptogamiae. Gen.: Agaricus, Merulius, Boletus, Hydnum, Phallus, Clathrus, Elvela, Peziza, Cyathus, Patella, Clavaria, Lycoperdon, Galeperdon, Tuber, Arcyria, Stemonitis, Embolus, Hydrogera, Mucor, Monilia, Mucilago, Fuligo.

Fungoides Tourn. 1700. Inst. p. 560: g. pl. class. XVII. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 17. p. 521.

Fungoides Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 204. t. 86: g. pl. class. XVII.
= Craterium Trent.

Fungosae Gleditsch 1764. Syst. p. 301: class. VIII. plantar. Gen.: Byssus, Clavaria, Helvella; Phallus, Boletus, Agaricus; Peziza; Poronia, Lycoperdon, Stemonitis, Clathrus, Mucor.
Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Palat. II. p. 447.

Fungus Tourn. 1700. Inst. p. 556. t. 327. 328: g. pl. class. XVII.

Fungus Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 133. t. 73—81: g. pl. class. XVII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 34: g. pl. class. I. (Agarici caulescentes L.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 12: g. Fungor.

Funifera „Leand. de Sacram. mss." C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 355: g. Daphnear. (Lagetta Funifera Mart.) — Par. Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 525. (diplostemonear.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelaceae.

Funifera Leand. cont.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 69. n. $2106/_{15}$: g. Daphnoidear. anomalar., antea Lagettae Juss. insertum.
Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 67: g. Thymelaeacear.
Synon. Lagetta Mart.; Neesia Mart.; Boscia Vell.?

Funkia „Willd." Auct. in synon. Asteliae: vid. *Funckia Willd.*

Funkia Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 246: g. Spathacear. (*Hosta Tratt.*) — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 40. n. 1190. (Hemerocallis japonica Thunb.)
Agdh. 1825. Aphor. p. 166: g. Hemerocallidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1376. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXI. 421. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60 (*Funckia*). — Bartl. 1830. Ord. p. 50 (*Funckia*). — Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 20.
Link 1829. Hdb. I. p. 172: g. Hyacinthinar.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 257. n. 1335 (*Funckia*): g. Liliacear. — Par. Lindl. 1839. Bot. Regist. n. ser. XII. t. 50. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1093.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128 (sph. *Junkia*): g. Ornithogalear.
Endl. 1837. Gen. n. 1100. p. 141; 1841. Ench. p. 83: g. Agapanthear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1827. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 753.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 590: g. Anthericear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 378.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Hemerocallear.
Synon. Hosta Tratt.; Bryocles Sal.; Niobe Sal.; Saussurea Sal.; Libertia Dumort.

Funkia Endl. Gen. p. 1182 in synon. Lumnitzerae: vid. *Funckia Dennst.*

Furcaria Desvaux 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 292: nov. g. Filicum. (Acrostichum thalictroides L.)
= Ceratopteris Brongn.

Furcaria DC. 1824. Prodr. I. p. 449: sect. Hibisci. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5273 *c*; 1841. Nom. p. 200. n. 7642. 3. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 478. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 48. — Endl. 1840. Gen. n. 5277 *a*. p. 982; 1841. Ench. p. 512. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 138. — Garcke 1849. Bot. Zeit. p. 813.

Furcaria „Boiv. mss." Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 356: sect. Crotonis. (F. Boiviniana.)

Furcellaria Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 45: nov. g. Fucacear. — Par. Leman 1820. Dict. v. 17. p. 525. — Agdh. 1824. Syst. p. XXXVII. 274. — Fries 1825. Pl. homon. p. 327. — Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 358. — Endl. 1836. Gen. n. 114. p. 10; 1841. Ench. p. 8. — Math. 1853. Belg. II. p. 492.
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XII. 10; 1821. Sp. Alg. I. 1. p. 101 (Aphor. p. 101): g.

Furcellaria Lamx. cont.
Fucoidear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 394. — Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 193.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 48: g. Phycoidator.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 315. n. 3385; 1831. Gen. II. p. 748. n. 3785: g. Phycoidear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.
Rchb. 1828. Consp. p. 29. n. 512: g. Fucear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Fucinear.
Grev. 1830. Alg. brit. p. 66: g. Spongiocarpear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 38. n. $122/_{34}$. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 146. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 96: g. Chondrothamnior.
Menegh. 1838. Cenni p. 40: g. Furcellariear. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 54. — Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 752. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360. (Flora 1843. p. 98.)
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phyc. gener. p. 402; 1849. Sp. Alg. p. 748. n. 497: g. Gigartinear. (injuncto Polyide Agdh.)
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 304: g. Spongocarpear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 127: g. Cryptocarpear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 309.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Spongiocarpidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Gracilariear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 195: g. Nemastomear.

Furcellarieae Meneghini 1838. Cenni org. Alghe p. 40: fam. Algar. Gen.: Furcellaria.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 6. 54: trib. Rhodospermear. Gen. id.
Rchb. 1841. Nomencl. p. 21: div. Sphaerococcear. Gen. id.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): ordo Choristosporear. Gen.: Furcellaria, Polyides.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106: trib. Centrothalamar.

Furcraea Vent. 1793. Bull. soc. philom. Nr. 28; 1796 in Usteri n. Ann. XIII. p. 54: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Haw. 1812. Syn. succ. p. 73 (ed. Schrank 1819. p. 79); 1819. Suppl. p. 42 (*Fourcroea*).
Vent. 1799. Tabl. II. p. 179: g. Narcissoidear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 125: g. Bromeliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 234. n. 951.
Pers. 1805. Ench. I. p. 380: sect. Agaves.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Agaveacear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 839: g. Agavear.
Vid. Fourcroya Spreng.

Furcroya Endl., Rchb. vid. *Fourcroya Spreng.*

Furera Adans. 1763. Fam. II. p. 193: g. Labiatar.
= Satureia Linn.

Furnrohria Lindl. vid. *Fürnrohria C. Koch.*

Fusanus Linn. 1774 in Murr. Syst. p. 765: nov. g. Polygam. Monoec. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 542. n. 1265.
Juss. 1789. Gen. p. 75: g. Elaeagnor. An Rhamneis affinior?
Batsch 1802. Tab. p. 183: g. Elaeagnear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 18. 323. n. 514. — Poir. 1820. Dict. v. 17. p. 523.
Pers. 1805. Ench. I. p. 144. n. 297: g. Tetrandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 176: g. Eleagnor. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 79. n. 367.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 355. Ed. Nees p. 211: g. Santalacear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 230. — Bartl. 1830. Ord. p. 113. — Endl. 1838. Gen. n. 2077. p. 326; 1841. Ench. p. 207. — Miq. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 617. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 788. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 755.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 321; 1825. Syst. I. p. 490. n. 539; 1830. Gen. I. p. 112. n. 567: g. Santalear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 549. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 460.
Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1704; 1841. Nom. p. 62. n. 2352: g. Osyridear.
Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240): g. Thesiear.
A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 681: ad Santalum L. revocat.
Synon. Lagenula Lour.

Fusarium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 10: nov. g. Epiphytar.
Nees 1816. Syst. p. 31; 1817. Ueberbl. p. 7: g. Sphaeromycor. evolutivor.
Mart. 1817. Erlang. p. 326: g. Coniomycetum. (suffultor.) — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 79. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 565. n. 3586; 1831. Gen. II. p. 785. n. 4070. (suffultor.)
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Tuberculariar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 546: g. Aegeritidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Sclerotacear.
Brongn. 1824. Dict. v. 38. p. 524: g. Fusidiear.
Link 1825. Spec. II. p. 104: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 173: g. Tubercularеor.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Tuberculariaceor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1040: g. Pulveraceor.
Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 36: g. Tubercularior.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Tuberculariacear. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 39. 80; 1842. Mycol. p. 163. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 148.

Fusarium Link cont.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 469: g. Tubercularinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 205. p. 18; 1841. Ench. p. 13. — Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 33. — Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 65. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 50. — Bonord. 1851. Hdb. p. 133.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 241: g. Sporomycetum perisporor.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 3; 1838. II. p. 3: g. Caeomacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Stilbaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 472: g. Hymenulaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.
Math. 1853. Belg. II. p. 418: g. Tuberculariear.

Fuscaria Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 59. 93: nov. g. Fucor. (F. variabilis.)
= Rhodomela Agdh.

Fuscina Schrank 1789. Fl. Bavar. II. p. 451: g. Muscor.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 156: sect. Dicrani.
= Dicrani, Leucodontis, Fissidentis etc. spec.

Fusicladium Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 80: nov. g. Acmosporiaceor. (*F.* virescens.)

Fusicoccum Corda 1829 in Sturm Flor. Fung. II. p. 111. t. 52: nov. g. Fungor. (F. Aesculi.) *Cf.* Flora Lit. II. p. 47.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 508: sect. Melanconii.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Melanconieor.
= Cryptosporium Kunze.

Fusicolla Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 150: nov. g. Myxonemeor. (Fusisporium Betae.)

Fusiconia Palis. 1822. Mém. soc. Linn. Par. t. 7. f. 5: g. Muscor. *Cf.* Leman 1824. Dict. v. 33. p. 187.
= Aulacomnion Schwägr.

Fusidicae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 522: trib. Uredinear. Gen.: Melanconium, Cryptosporium, Nemaspora, Achitonium, Fusidium, Cylindrosporium, Aegerita, Epicoccum, Dermosporium, Illosporium, Fusarium.

Fusidium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 8: g. Epiphytar. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 17. p. 543.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 31: g. Mucedinum. (entophytar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Nees 1816. Syst. p. 20; 1817. Ueberbl. p. 4: g. Coniomycor. liberor.
Mart. 1817. Erlang. p. 328: g. Coniomycetum (elementarium). — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 79. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 569. n. 3590; 1831. Gen. II. p. 785. n. 4077. (liberor.)

Fusidium Link cont.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: g. Pulverariar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 544: g. Stilbosporidear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 523: g. Fusidiear.
Link 1825. Spec. II. p. 96: g. Gymnomycetum.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Stilbosporeor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Tuberculariacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 93: g. Leptomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 177: g. Sporomycetum episporor.
= Fusisporium Link. (Endl.)

Fusidium „Link pro parte ?" Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 480: g. Stilbosporeor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 198. p. 18; 1841. Ench. p. 13. — Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 49. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 41.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 3; 1838. II. p. 1; 1839. III. p. 2; 1842. V. p. 3. 49; 1842. Mycol. p. 10: g. Caeomacear. — Par. Preuss 1848 in Sturm Fl. III. H. 25. 26. p. 3. t. 2; 1851. Linnaea XXIV. p. 101.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Sporotricheor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 43: g. Caeomaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 464: g. Botrydear.

Fusisporium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 19: nov. g. Mucedinum. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 338. — Agdh. 1821. Aphor. p. 79.
Nees 1816. Syst. p. 46; 1817. Überbl. p. 11: g. Sporomycor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Sporotrichor.
Link 1824. Spec. I. p. 30: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 283. (episporor.) — Mont. 1842. Pl. cell.

Fusisporium Link cont.
Cub. p. 299. — Caspary 1855. Monatsber. Berl. Ak. p. 314. (Flora 1855. p. 483.) Char. emend.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 537: g. Sporotrichear. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 82.
Fries 1825. Pl. homon. p. 186: g. Trichomycor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 109.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Byssacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Gonocladear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 781. n. 4033: g. Byssoideor.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 412: g. Sepedonieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 214. p. 18; 1841. Ench. p. 14. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 11; 1838. II. p. 10; 1840. IV. p. 26; 1842. V. p. 7; 1842. Mycol. p. 25: g. Sporotrichacear. — Par. Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 7.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 128: g. Sporotricheor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 473: g. Hymenulaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 96: g. Dendrinor.
Math. 1853. Belg. II. p. 462: g. Botrydear.
Synon. Fusidium Link. (Endl.)

Fusoma Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 7. t. 2. f. 109. 110; 1838. II. p. 5; 1842. V. p. 4; 1842. Mycol. p. 14: nov. g. Phragmidiacear. — Par. Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 73.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 20: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 28. — Bonord. 1851. Hdb. p. 47.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Melanconieor.?

Fycoideae Ritgen in Schr. Marb. Ges. II. p. 86: vid. *Phycoideae.*

G.

Gabertia Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 425: nov. g. Orchidear. (Epidendrum scriptum L.?)
= Grammatophyllum Blume.

Gabura Adans. 1763. Fam. II. p. 6: g. Fungor. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 18. p. 4.
= Collema Hoffm.

Gaerdtia*) Klotzsch 1855. Begon. p. 169: nov. g. Begoniacear. (Begonia macula Raddi.) — Par. Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 318.

Gärtnera**) Schreb. 1789. Gen. I. p. 290. n. 735: g. Decandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 685. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 19. t. 18; 1832. Ind. II. p. 368. — Willd. 1799. Sp. II. p. 550. n. 837. — Pers. 1805. Ench. I. p. 467. n. 1056.
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.

Gärtnera Schreb. cont.
Hedw. 1806. Gen. p. 304. n. 1204: g. Malpighiacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 396.
= Hiptage Gärtn.

Gärtnera Lamarck 1791. Illustr. p. 506. t. 167.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 58. t. 191.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. III. p. 564 (Verm. bot. Schr. I. p. 75): g. Loganear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 605: g. Coffeacear.
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 9: g. Rubiacear.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 404: g. Rubiaceis aff.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 669. n. 729: g. Pentandr. Monogyn.
Mart. 1827. Nov. gen. II. p. 133: g. Loganiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 133.

*) Dicat. H. Gaerdt, Berolin.
**) Dicat. Jos. Gärtner, scriptori botan.

Gärtnera Lamarck cont.
n. 3506; 1837. Hdb. p. 211. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 131. n. 654. — Bartl. 1830. Ord. p. 206. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 483. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 623. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 425.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Loganiacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 166.
Endl. 1838. Gen. n. 3370. p. 577; 1841. Ench. p. 289: g. Gärtnerear. Sect. (1841. Spl. I. p. 1395): Gärtnera (tandem Eugärtnera), Sykesia, Fructesca, Aetheonema? — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 259 (167). — Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5142. Sect. ut Endl. (exclusa Aetheonema.) — DC. 1845. Pr. IX. p. 32. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 11. p. 173. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 381.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604: g. Loganear.
Synon. Andersonia Willd.; Sykesia Arn.?; Fructesca DC.?

Gärtnera Retz. 1791. Observ. VI. p. 24.
= Pongatium Juss.

Gärtnereae Endl. 1838. Gen. p. 577: trib. Loganiear. Gen.: Gärtnera, Pagamea. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1395 et Ench. p. 289) genus dubium Codonanthus. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 259 (167). Gen.: Gärtnera, Sykesia, Fructesca, Pagamea. — DC. 1845. Pr. IX. p. 33. Gen.: Gärtnera, Sykesia.
Rchb. 1841. Nom. p. 133: sect. Loganiear. Gen. ut Endl. et Aetheonema?

Gärtneria Medic. 1789. Phil. bot. I. p. 45: nov. g. ex typo Ambrosiae fruticosae L. *Cf.* Medic. 1775. Act. Theod. Palat. III. Phys. p. 244 et 1789. Vorles. IV. 1. p. 198.
= Franseria Cavan.

Gärtneria Necker 1790. Elem. bot. II. p. 15. n. 628: nov. g. Darinyphytor., a Gentiana L. disjunctum, typis non indicatis.

Gagea*) Salisb. 1806 in Konig Ann. bot. II. p. 555: nov. g. ab Ornithogalo disjunctum. (O. luteum Sm., etc.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 180: g. Asphodelear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXVI. 536. — Koch 1837. Syn. p. 711. Ed. II. p. 823. — Kunth 1838. Berol. II. p. 260. — Math. 1853. Belg. I. p. 541.
Rchb. 1822. Flora II. p. 537; 1827 ap. Mössl. I. p. 555; 1828. Consp. p. 65. n. 1367 *a*: sect. Ornithogali. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1127.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 107: g. Scillear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 400 (303).
Bernh. 1835. Flora II. p. 596; 1840. Flora II. p. 393: g. Tulipacear. (sejunctis 1840 Hornungia et Orithyia.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1093. p. 140; 1841. Ench. p. 82. — Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1749. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 20. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 382. — C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 226. Sect.: Holobulbos,

*) Dicat. Sir Thomas Gage.

Gagea Salisb. cont.
Didymobulbos. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 137.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 233: g. Tulipear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 254. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 204.
Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 192: g. Hyacinthear.
Synon. Ornithoxanthum Link.

Gagea*) Raddi 1818. Opusc. scient. Bologn. II. p. 361. t. 16. f. 7: nov. g. Muscor. (G. compacta.)
= Zygodon Hook.

Gagnebina Necker 1790. Elem. bot. II. p. 458. n. 1296: nov. g. Chorisophytor., a Mimosa L. disjunctum.
DC. 1825. Pr. IV. p. 431: g. Mimosear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4163. Sect.: Parkia, Erythrophlaeum. — Bartl. 1830. Ord. p. 417. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 387. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 49. — Meisn. 1837. Gen. p. 96 (68). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 133.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX; 1841. Nom. p. 156. n. 6130: g. Acaciear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6833. p. 1325; 1841. Ench. p. 683.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 351. n. 1772 (*Gagnebinia*): g. Leguminosar. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1424.
Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 345: g. Adenantherar.
Walp. 1842. Rep. I. p. 861; 1846. V. p. 581: g. Adenantherear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 47.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556: g. Eumimosear.

Gagnebinia Spreng. vid. praeced.

Gaguedi Bruce 1790. Abyssin. V. p. 52.
= Protea Linn.

Gahnia**) Forst. 1776. Char. gen. p. 51. t. 26; 1780. Nov. Act. Ups. III. p. 178: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 235. n. 606. — Willd. 1799. Sp. II. p. 244. n. 692. — Cram. 1803. Disp. p. 77. — Labill. 1804. Nov. Holl. I. t. 115. 116. Char. emend. *Cf.* Schrad. n. Journ. III. 1. p. 130. — Pers. 1805. Ench. I. p. 393. n. 870.
Scop. 1777. Intr. p. 76 (sphalm. *Gavnia*): g. Graminum. (legitimor.) — Par. Linn. f. 1779. Gram. gen. Ed. 1790. (Amoen. ac. X.) p. 36. (paniculator.) — Spreng. 1825. Syst. II. p. 113. n. 1283.
Linn. f. 1781. Suppl. p. 31. n. 1386: g. Hexandr. Digyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 345. — Gmel. 1791. Syst. p. 578. — Pers. 1797. Syst. p. 368.
Juss. 1789. Gen. p. 27: g. Cyperoidear. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXXV. 1361.
Neck. 1790. El. III. p. 228. n. 1610: g. Achyrophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 129: g. Calamariar.
Batsch 1802. Tab. p. 157: g. Scirpear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 66: g. Cyperacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 248. n. 1006.

*) Dicat. cl. Thom. Gage Hiberno, botanico peritissimo.
**) Dicat. Henrico Gahn, botanico suecico.

Gahnia Forst. cont.
— R. Brown 1810. Prodr. I. p. 238. Ed. Nees p. 94. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 12. — A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 112. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 278.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153: g. Sclerinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 133.
Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 22 et Schult. Mant. II. p. 5): g. Cyperear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1101. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 246. n. 1283. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 113.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 301: g. Cladiear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 982. p. 115; 1841. Ench. p. 64. Sect.: Melanogahnia, Eugahnia. — Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1464. Sect.: Melanogahnia, Gahnia.
Kunth 1837. Cyper. p. 331: g. Rhynchosporear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 412 (315). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146. — Steud. 1855. Glum. II. p. 163. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 340.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Cladear.

Gahnia Labill., R. Brown (vid. supra.)
= Psittacoschoenus Nees.

Gaiadendron*) G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 431: nov. g. Loranthacear. terrestr. (Lor. eugenioides, Tagua, laurifolius, nitidus, Puracensis Kth.) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 234.

Gaidendron „Don" Endl. Ench. p. 399 in synon. Loranthi: vid. *Gaiadendron G. Don.*

Gaillardia**) Fougeroux de Bondaroy 1788. Hist. Ac. Paris. 1786. p. 5. t. 1. 2: nov. g. Syngenes. Polygam. Frustran.
Cass. 1820. Dict. v. 18. p. 17; 1821. v. 20. p. 348; 1825. v. 38. p. 16; 1828. v. 55. p. 264; 1830. v. 60. p. 575: g. Heleniear. (1828 verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2586. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 122. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 761.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 460. n. 3210: g. Radiatar.
Hook. 1833. Fl. bor. I. p. 314: g. Gaillardiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3631. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
DC. 1836. Pr. V. p. 651: g. Eugaillardiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2583. p. 421; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 205 (132). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 365.
Gay 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 56. (Tent. monogr.)
Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 34. (Rev. specierum.)
Synon. Galardia Lam.; Colonnea Buchoz; Virgilia L'Herit.; Galordia Räusch.

Gaillardieae Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 314: div. Heleniear. Gen.: Gaillardia. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 651. Subdivis.: Eugaillardieae, Euhelenieae. — Endl. 1838. Gen. p. 420; 1841. Ench. p. 239. Subdivis. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 205 (132). Subdivis. eaed.
Rchb. 1841. Nom. p. 42: subdiv. Helianthear. Gen. Eugaillardiear. Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711: subtrib. Senecionidear. Gen. ead.
Synon. Galardiae Nutt.; Galardieae et Rosilleae Less.; Helenieae verae Cass.

Gaillardotella Bory 1825. Dict. class. VII. p. 100.
= Rivularia Roth.

Gaillionia „Rud." Endl. Gen. p. 5 in synon. Ceramii: vid. *Gaillonia Rud.*

Gaillionia „Rich." Endl. 1838. Gen. n. 3132. p. 529; 1841. Ench. p. 271: g. Euspermacocear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 32. Sect.: Microstephus, Hymenostephus, Pterostephus, Ptilostephus. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 106.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
= Gaillonia Rich.

Gaillona*) Bonnemais. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 113: g. Epidermear. (Hutchinsiae et Ceramii spec.), antea *Grateloupia Bonn.*
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 395: g. Phlomidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 483c (*Gaillonia*): sect. Callithamnii.
= Dasya Agdh.

Gaillonella Bory 1825. Dict. class. IV. p. 393; 1825. ibid. VII. p. 101. *Cf. Gallionella Ehrenb.*
Bréb. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 734: g. Diatomear.
= Lysigonium Link.

Gaillonia A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 153. t. 15. f. 3: nov. g. Spermacocear. (G. Oliverii et Bruguierii.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2781. (genuinar.) — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 396. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 761.
DC. 1830. Pr. IV. p. 574: g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 632. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119).
Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 82. (Conspect. gen.) Subgen.: Microstephus, Hymenostephus, Pterostephus, Ptilostephus.
Synon. Gaillionia Endl.; Jaubertia Guill.?

Gaillonia Rchb. vide *Gaillona Bonnem.*

Gaillonia Rudolphi 1831. Linnaea VI. p. 178: nov. g. Algar. (G. Lehmanni.)
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 403: g. Ceramiear.
= Ceramii Agdh. sp.

Gaimarda Juss. vid. *seq.*

Gaimardia**) Gaudich. 1825. Ann. sc. nat. p. 100. t. 2. f. 1; 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 418. t. 30: nov. g. Restiacear. (G. australis.) — Par. Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 272 (*Gaimarda*). — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 267.

*) γαία, terra.
**) Dicat. Gaillard de Charentonneau.

*) Dicat. Benj. Gaillon, Dieppe.
**) Dicat. Gaimard, itineris Freycinetiani socio.

Gaimardia Gaudich. cont.
Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41: g. Xyridear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 787. n. 4081: g. Restiear.
Endl. 1837. Gen. n. 1007. p. 120; 1841. Ench. p. 66: g. Centrolepideis aff. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 490. — Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1515. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 761.
Meisn. 1842. Gen. p. 409 (313): g. inter Restieas et Centrolepideas subambiguum.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 140: g. Desvauxiear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 267.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 120: g. Desvauxiacear.

Gaiodendron „G. Don" Endl. Gen. p. 801 in synon. Loranthi: vid. *Gaiadendron G. Don.*

Gaissenia Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 168: nov. g. Trollio aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4962*a*: sect. Trollii.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7249: g. Trolliear.
= Trollius Linn.

Gajati Adans. 1763. Fam. II. p. 328: g. Coronillar.
= Aeschynomene Linn.

Galaceae DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 776: trib. Pyrolacear. Gen.: Galax.
Rchb. 1841. Nom. p. 125: sect. Pyrolear. genuinar. Gen. id.

Galacinae D. Don 1828. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 53: nova fam. plant. Gen.: Francoa, Galax. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 134.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (146) Calyciflorar. (syncarpar.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 203. Gen. ut D. Don et Tetilla.
Lindl. 1833. Nix. p. 22: ordo Crassalium.
= Galaceae DC. et Francoaceae Juss.

Galacineae Rchb. 1837. Handb. p. 230: sect. Saxifragear. Gen.: Galax, Frankoa.

Galactanthus Lemaire vid. *Galanthus Linn.*

Galactea Wight vid. *Galactia P. Browne.*

Galactia*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 298: nov. g. Diadelph. Decandr. — Par. Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 61. — Pers. 1807. Ench. II. p. 302. n. 1711. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 116.
Adans. 1763. Fam. II. p. 322: g. Genistar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 753; 1826. Syst. III. p. 257. n. 2569; 1831. Gen. II. p. 587. n. 2888: g. Leguminosar. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 32.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 131.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 428: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 94.
DC. 1825. Pr. II. p. 237: g. Clitoriar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 217. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 413.
Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3970; 1841. Nom. p. 149. n. 5809: g. Glycinear. —

*) γάλα lac, quia herba lactescens est.

Galactia P. Browne cont.
Par. Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 126. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 287. — Endl. 1841. Gen. n. 6653. p. 1292; 1841. Ench. p. 671. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 762. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 220. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 554.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: g. Clitoriear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 410. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 206. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 244. — Meisn. 1837. Gen. p. 86 (62).
Wight 1841. Ic. pl. Ind. II. 2. p. 5 (*Galactea*). t. 482: g. Lotear.
Synon. Bradburya Rafin.; Sweetia DC.; Odonia Bertol.; Grona Lour.; Campesia Wight & Arn. (Steud.)

Galactinophyta Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 84: class. I. Plethophytor. Ordines: Spondylydronemata, Platyydronemata, Orthydronemata.
= Algae Agdh.

Galactiteae Schultz Bip. in Webb Phyt. Canar. II. p. 371: vid. *Galactitideae Schultz.*

Galactites Mönch 1794. Meth. p. 558: nov. g. Petalostemonis. (Centaurea galactites L.)
DC. 1805. Franç IV. p. 110: g. Cynarocephalar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 488. n. 1930: g. Syngenes. Frustran.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 156. 195: g. Carduacear. — Par. Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 94. — Bartl. 1830. Ord. p. 144.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 540; 1826. Syst. III. p. 409. n. 2663; 1831. Gen. II. p. 609. n. 3001: g. Cynarear.
Cass. 1820. Dict. v. 18. p. 34; 1826. v. 41. p. 314. 334: g. Carduinear. (1826 Archetypar. verar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12.
Link 1822. En. II. p. 356; 1829. Hdb. I. p. 702: g. Acarnacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2336: g. Carduinar. genuinar.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 212: g. Centaurinar.
Less. 1832. Syn. p. 11: g. Silybear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 616. — Endl. 1838. Gen. n. 2879. p. 476; 1841. Ench. p. 247. — Meisn. 1839. Gen. p. 227 (141). — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3757. — Brongn. 1843. En. genr. p. 36. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 762. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 202.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 335: g. Galactitidear.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 380: g. Galactitear.
Synon. Lupsia Neck.?

Galactitideae Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 335; . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 371 (*Galactiteae*): subsect. Cirsiear. Gen.: Galactites.

Galactodendron Rchb. 1828. Consp. p. 83. n. 1805: g. Urticear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 272: g. Cecropiear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 99: g. Artocarpear.?
= seq.

Galactodendrum Humb. 1819. Relat. hist. II. p. 108: nov. g. Sapotear. *Cf.* ibid. p. 130, ubi Urticeis quoque affine dicitur.
HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 163: g. Urticear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 198.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 37. 64: g. Artocarpidear.
= Brosimum Swartz.

Galanga*) „Mus. Zeyl. p. 51" Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 102.
Rumph. 1747. Amboin. V. t. 63.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 281: g. Zingiberear. (Alpinia Galanga L.)
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: g. Alpiniear.
= Alpinia Linn.

Galanthaceae Fisch. & Mey. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 30. Gen.: Narcissus.

Galantheae Rchb. 1828. Consp. p. 61: subdiv. Amaryllidear. Diplochlamydear. Gen.: Galanthus, Leucoium.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: trib. Spathacear. Gen.: Pollia, Tulbaghia, Albuca, Massonia, Brodiaea, Rhipidodendron, Narcissus, Pancratium, Galanthus.
Herb. 1837. Amaryll. p. 80. 329: subordo Amaryllidacear. Gen.: Galanthus, Erinosma, Acis, Leucojum.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 5. 21: subordo Amaryllidear. Gen. ead. et Hessea, Imhofia, Strumaria, Lapiedra.
Kunth 1850. Enum. V. p. 469: trib. Amaryllidear. legitimar. Gen. ut Herb.

Galanthus**) Linn. 1737. Gen. p. 101. n. 288; 1737. Cliff. p. 134; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 73; 1753. Sp. I. p. 288; 1759. Syst. ed. X. p. 975. n. 362; 1762. Sp. ed. II. p. 413; 1764. Gen. ed. VI. p. 160. n. 401; 1767. Syst. ed. XII. p. 234. n. 397: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 233. — Murr. 1774. Syst. p. 261; 1784. Syst. p. 316. — Reich. 1778. Gen. p. 163. n. 433. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 215. n. 547. — Gmel. 1791. Syst. p. 534. — Pers. 1797. Syst. p. 335; 1805. Ench. I. p. 349. n. 776. — Willd. 1799. Sp. II. p. 29. n. 612; 1809. En. p. 349. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 467. 470.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Spathacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 274. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 247; 1825. Syst. II. p. 48. n. 1196; 1830. Gen. I. p. 273. n. 1420. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1174.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Musar.

Galanthus Linn. cont.
Gled. 1764. Syst. p. 70. n. 290: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 159: g. Tripetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 87: g. Liliacear.
Juss. 1789. Gen. p. 55: g. Narcissor. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 234.
Medic. 1790. Act. Theod. Palat. VI. Phys. p. 422.
Neck. 1790. El. III. p. 155. n. 1498: g. Ymnodiphytor.
Mönch 1794. Meth. p. 650: g. Parapetalostemonis.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 181: g. Narcissoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 147: g. Leucojacear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 139: g. Amaryllidear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 228. n. 929. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 193. — Link 1829. Hdb. I. p. 199. — Schult. 1830. Syst. VII. p. XLVII. 781. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 87; 1841. Nom. p. 44. n. 1593. — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Koch 1837. Syn. p. 703. Ed. II. p. 812. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 21. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 375. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 763 (corrig. *Galactanthus*).
Mirb. 1815. Élém. II. p. 870: g. Narcissear. — Par. Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 46 (*Galantine*). — Agdh. 1823. Aphor. p. 174. — Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 182.
Link 1821. En. I. p. 310: g. Narcissinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1259: g. Galanthear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 129. — Herb. 1837. Amaryll. p. 80. 329. (restrict.) — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 6. 21. — Kunth 1850. Enum. V. p. 469.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Leucoidear.
Endl. 1837. Gen. n. 1265. p. 174; 1841. Ench. p. 103: g. Amaryllear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 393 (295). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 406. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 113. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 250.
Synon. Acrocorion Adans.; Erangelia Ren.; Narcisso-Leucojum Tourn. pt.

Galapagoa Hook. f. 1846. Proc. Linn. soc. nr. 28. p. 277; 1846. Linn. Trans. XX. p. 196: nov. g. Ehretiacear., Coldeniae aff. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 565; 1849. Ann. bot. I. p. 524.

Galardia Lamarck Illustr. t. 708.
Juss. 1789. Gen. p. 189: g. Corymbiferar. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 532. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 418.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 573. n. 1323: g. Syngenes. Polygam. Frustran. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1259. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2245. n. 1534. — Michx. 1803. Fl. Am. II. p. 142. — Pers. 1807. Ench. II. p. 476. n. 1914.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar. — Par. Link 1822. En. II. p. 352.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 175: g. Galardiar.

---

*) Nomen ex Arabia petitum, Paulo Aeginetae et Aëtio *γαλάγγας* s. *γαλάγκας*.

**) *γάλα*, lac; *ἄνθος*, flos: cum flos lactis instar niveus sit.

Galardia Lamarck cont.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 570; 1826. Syst. III. p. 618. n. 2852: g. Radiatar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 79: g. Heleniear.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 519; 1832. Syn. p. 237: g. Galardiear.
= Gaillardia Foug.

Galardiae Nuttall 1818. Gen. Am. II. p. 177 in adnot.: div. Compositar. Gen.: Helenium, Leptopoda, Actinella, Galardia, Balduina. *Cf.* Cass. 1820. Dict. v. 18. p. 48.

Galardieae Lessing 1831. Linnaea VI. p. 516: subtrib. Senecionidear. Gen.: Galardia, Balduina, Leptopoda; Bahia, Trichophyllum, Hymenopappus, Schkuhria, Polypteris, Cephalophora, Helenium, Tetradus.
Less. 1832. Syn. p. 237: div. Heleniear. Gen.: Galardia, Balduina, Leptopoda, Bahia, Trichophyllum, Hymenopappus, Achyropappus, Schkuhria, Cercostylos, Cephalophora, Helenium, Tetrodus.

Galarhaeus Baillon vid. *seq.*

Galarhoeus*) Haworth 1812. Syn. succ. p. 143. Ed. Schrank 1819. p. 157: g. Dodecandr. Monogyn., ab Euphorbia L. disjunctum.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 256: g. Euphorbiacear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 755 (*Galarrhoeus*); 1841. Nom. p. 193. n. 7329. 2 *a:* subsect. Tithymali. (Euphorbia helioscopia, platyphyllos, dulcis, etc.)
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 135 (*Galarrhoeus*): sect. Euphorbiae. — Par. Baill. 1858. Euphorb. p. 284 (*Galarhaeus*).

Galarips Allam. . . .
= Allamanda Linn.

Galarrhoeus Rchb., Griseb. vid. *Galarhoeus Haw.*

Galasia Lessing 1832. Syn. Compos. p. 134: subg. Scorzonerae.
Koch 1837. Syn. p. 426. Ed. II. p. 490: g. Scorzonerear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2998. p. 497; 1841. Ench. p. 250. — Walp. 1843. Rep. II. p. 689. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
= Gelasia Cass.

Galatea Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. (1815.) p. 310: nov. g. Witsenear. (Moraea palmifolia Jacq.)
= Cipura Aubl.?

Galatea Cassini 1818. Bull. soc. philom. Nov. p. 165; 1820. Dict. v. 18. p. 56: subg. Asteris.
Less. 1832. Syn. p. 187: g. Asterear.
= Galatella Cass.

Galatella Cassini 1825. Dict v. 37. p. 463. 488; 1830. v. 60. p. 582: g. Asterear. (Archetypar. verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Hook. 1834. Fl. bor. am. II. p. 15. — Koch 1837. Syn. p. 352. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 256. (verar.) — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3284. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 45. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1483: sect. Asteris. — Par. (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 103.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2553: g. Asterinar.
Nees 1833. Aster. p. 158: g. Asterum genuinor.
DC. 1836. Pr. V. p. 254: g. Euasterear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2303. p. 374; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (125). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 96. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 478. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 764.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 303: g. Asterinear. — Par. Koch 1843. Syn. ed. II. p. 387.
Synon. Galatea Cassini olim; Eugalatella Rchb.

Galatella Rchb. . . . . Ic. fl. Germ. XVI. p. 7: g. injuncta Linosyride DC. ampliatum. Sect.: Eugalatella, Linosyris. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 173.

Galathea „Herbert Bot. Mag. n. 2113" Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 103: sect. Nerines. — Par. Kunth 1850. Enum. V. p. 615.

Galathea Salisb. mss. ex Steud. Nomencl. I. p. 654; II. p. 596. (G. vespertina.)
= Sisyrinchium Linn.

Galathea Liebm. 1855. Ind. sem. h. Haun. p. 26, 1856. Linnaea XXVIII. p. 361: nov. g. Iridear., Cypellae proximum. (G. speciosa.)

Galathenium*) Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 442: nov. g. Hieraciear. (Mulgedium macrophyllum DC.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 51. n. 3028/2. — Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
= Mulgedii et Lactucae sp. (Torr. & Gray.)

Galax**) Linn. 1753. Sp. I. p. 200; 1759. Syst. ed. X. p. 940. n. 244; 1762. Sp. ed. II. p. 289; 1764. Gen. ed. VI. p. 109. n. 276; 1767. Syst. ed. XII. p. 183. n. 274: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 200; 1784. Syst. p. 241. — Reich. 1778. Gen. p. 112. n. 296. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 151. n. 382. — Gmel. 1791. Syst. p. 415. — Pers. 1797. Syst. p. 252; 1805. Ench. I. p. 250. n. 570. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1146. n. 434. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 349. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 145.
Adans. 1763. Fam. II. p. 226: g. Jasminor.
Gled. 1764. Syst. p. 205. n. 850: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 185: g. Speciosar.

*) *ῥέω*, fluo.

*) *γαλαθηνός*, juvenis, tener.
**) *γάλα*, lac.

Galax Linn. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 420: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 94. n. 426. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXVIII. 373. n. 726.
Neck. 1790. El. II. p. 19. n. 635: g. Darinyphytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 516; 1825. Syst. I. p. 794. n. 883; 1830. Gen. I. p. 192. n. 973: g. Ericear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 848.
Link 1821. En. I. p. 242: g. Saxifragear.
Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3373: g. Pyrolear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 444.
D. Don 1828. Edinb. n. phil. journ. VI. Dec. p. 50: g. Galacinar. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 204.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Ericacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 230: g. Galacinear.
Meisn. 1838. Gen. p. 135 (99): g. Francoacear.? et p. 247 (156) Pyrolear.?
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 776: g. Galacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4873.
Endl. 1839. Gen. n. 4350. p. 761; 1841. Ench. p. 374: g. Pyrolacear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 72. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 450.
Synon. Viticella Mitch., Anonymos s. Belvedere Gron., Erythrorhiza Rich.; Blandfordia Andr.; Solenandria Palis.; Solanandra Pers.

Galaxaura Lamx. . . . . Expos. méth. p. 21.
Menegh. 1838. Cenni p. 33: g. Corallinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 680. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 114. (Aplosporear.) Sect.: Dichotomaria, Eugalaxaura, Microthoë. *Cf.* Flora 1843. p. 103.
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 128: g. Ectocarpear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 22. n. 76: g. Batrachospermear. Sect. ut Decne. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Batrachospermidar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: g. Eududresnaycar.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 529. n. 338: g. Lemaniear. Sect. eaed.
Synon. Alysium Agdh.; Halysium Kütz.

Galaxia Thunb. 1782. Nov. gen. II. p. 50: nov. g. Monadelph. Triandr. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 609. — Cavan. 1788. Diss. VI. p. 340. t. 189. *Cf.* Röm. & Ust. 1790. Mag. Bot. XI. p. 152. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 451. n. 1103. — Gmel. 1791. Syst. p. 1005. — Pers. 1797. Syst. p. 647. — Willd. 1800. Sp. III. p. 583. n. 1253.
Juss. 1789. Gen. p. 57: g. Iridum.
Neck. 1790. El. III. p. 162. n. 1510: g. Ymnodiphytor.
Gis. 1792. Prael. p. 170: g. Ensatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 143. — Gawl. 1805. Ann. of bot. I. p. 241.
Thunb. 1794. Prodr. I. p. 10; 1818. Fl. cap. I. p. 251: g. Triandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 41. n. 96.

Galaxia Thunb. cont
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 143: g. Iridear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 23. 353. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 345. 496. n. 146. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 63. — Schrank 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. . . . — Link 1822. En. II. p. 178. — Agdh. 1823. Aphor. p. 172. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 167. n. 171; 1831. Gen. II. p. 528. n. 2592. — Eckl. 1827. Verz. p. 17. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Endl. 1837. Gen. n. 1235. p. 167; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 150. — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 22. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 766 (Calletostemonum. *Cf.* Herb. gén. amat. 2e sér. II.)
Salisb. 1812. Hortic. trans. I. p. 314: g. Witsenear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 250: g. Spathacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1199: g. Ixiear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57: g. Ferrariear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 9.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1585: g. Gladiolear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.

Galbanon Adans. 1763. Fam. II. p. 499: g. Cicutar. (Bubon macedonicum et Galbanum L.)
= Athamanta et Bubon Koch.

Galbanophora Necker 1790. Elem. bot. I. p. 175. n. 292: g. Scadiophytor.
= Bubon Linn.

Galbanum Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: g. Peucedanear. (Nomen.)
D. Don 1831. Phil. Mag. IX. p. 46; 1833. Linn. Trans. XVI. p. 603: nov. g. Umbelliferar. (G. officinale.)
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 348: g. Silerinear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 220. — Meisn. 1838. Gen. p. 148 (107). — Walp. 1843. Rep. II. p. 417.
Endl. 1839. Gen. n. 4486. p. 783; 1841. Ench. p. 379: g. Silerinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 142. n. 5492.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Sileridar.

Galbuliferae Rich. 1808. Anal. d. fr. p. . . . Ed. Voigt 1811. p. 121: div. Coniferar. Gen.: Ephedra, Juniperus, Thuja, Taxodium, Cupressus *Cf. Cupressinae HBK.*

Galdicia Neraud 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 25: g. Frangulear. (Nomen.) *Cf.* Endl. Gen. p. 1104.
Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5615: g. Rhamneis aff.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.?

Gale*) Tourn. 1806. Act. Ac. Paris. p. 83. t. 1: nov. g. plant.
Vaill. 1727. Bot. Paris. p. 77.
Adans. 1763. Fam. II. p. 345: g. Pistaciar.

*) Nomen teste Linnaeo a voce germanica. *(Gagel?)*

Gale Tourn. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: g. Myricear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 258.
Endl. 1837. Gen. n. 1839 *b*. p. 272; 1841. Ench. p. 158: sect. Myricae.

Galeae HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 335: sect. Rubiacear. Gen.: Galium, Rubia. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 10.

Galeana La Llave & Lexarza 1824. Nov. veg. descr. I. p. 12: nov. g. Polygam. Superfl. (Helianthear. — G. hastata.)
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 257: g. Compositar. dubiae sedis. — Simil. Endl. 1838. Gen. p. 502. n. 4; 1841. Ench. p. 251.
Meisn. 1839. Gen. p. 196 (129): g. Milleriear.? et p. 207 (133) Eugalinsogear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3113: g. Galinsogear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715: g. Asteracear. minus notum.

Galeandra*) Lindl. 1833. Orchid. gen. p. 186 (Franc. Bauer Ill. Orch. t. 8): nov. g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1442. p. 201; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (280). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 768.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g Sarcanthidar.
Synon. Corydandra Rchb.

Galearia Presl 1830. Symb. I. p. 49: nov. g. a Trifolio disjunctum. (T. fragiferum, tomentosum, etc.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 12 et Ann. sc. nat. 2e. sér. I. p. 365.
Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 223: g. Trifoliear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 226: subg. Trifolii. — Simil. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 413.
= Fragifera Koch.

Galearia Moritzi 1846. Syst. Verz. p. 19: nov. g. Euphorbiacear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 633 (dubiae affinitatis). — Endl. 1850. Spl. V. p. 94. n. $5888/_5$ (dubium).
Synon. Bennettia R. Brown; Cremostachys Tul. (Planch. in Ann. sc. nat. 1854. II. p. 264.)

Galeata Wendland 1798. Bot. Beob. p. 36: nov. g. Pentandr. Monogyn. (G. ferruginea.)
** . . .?

Galedragon „Xenocr." Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 475: nov. g. Dipsacear. (Dipsacus pilosus L.)
= Virga Hill.

Galedupa*) Lamarck 1786. Dict. II. p. 595. *Cf.* Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 69.
Juss. 1789. Gen. p. 363: g. Leguminosar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 241.

*) Vox hybrida: galea et ἀνήρ.
**) Nomen vernaculum.

Galedupa Lamarck cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 1086: g. Diadelph. Decandr. — Par. Roxb. 1832. Ind. III. p. 239. — Blanco 1837. Filipin. p. 558.
= Pongamia Lam.

Galega*) Tourn. 1700. Inst. p. 398. t. 222: g. pl. class. X.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 255. Ed. Hall. 1745. p. 265: g. pl. class. XI.
Linn. 1737. Gen. p. 220. n. 584; 1737. Cliff. p. 362; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 208; 1753. Sp. II. p. 714; 1759. Syst. ed. X. p. 1172. n. 770; 1763. Sp. ed. II. p. 1062; 1764. Gen. ed. VI. p. 384. n. 890; 1767. Syst. ed. XII. p. 496: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 565; 1784. Syst. p. 679. — Reich. 1778. Gen. p. 382. n. 963. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 506. n. 1206. — Gmel. 1791. Syst. p. 1129. — Pers. 1797. Syst. p. 717; 1807. Ench. II. p. 330. n. 1743. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1239. n. 1377; 1809. En. p. 780. — Gmel. 1826. Bad. IV p. 557. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 383.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 103.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 576: g. Leguminosar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 304. — Juss. 1789. Gen. p. 359. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 413. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 231. — DC. 1805. Franç. IV. p. 560. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 756; 1826. Syst. III. p. 279. n. 2579; 1831. Gen. II. p. 589. n. 2900. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 71. — Link 1822. En. II. p. 252. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 434. 525.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 134. n. 560: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 156.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415.
Neck. 1790. El. III. p. 35. n. 1347: g. Cyteophytor. Sejungitur Brissonia.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 248. — Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3891; 1832. Fl. exc. p. 513; 1841. Nom. p. 147. n. 5710. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 227. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 249. — Koch 1836. Syn. p. 179. Ed. II. p. 198. — Meisn. 1837. Gen. p. 89 (63). — Kunth 1838. Berol. I. p. 235. — Endl. 1840. Gen. n. 6533. p. 1272; 1841. Ench. p. 669. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 567. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 47. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 128. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 455. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 768.
Link 1831. Hdb. II. p. 197: g. Galegoidear.
Synon. Caprago Caesalp.

Galegeae Bronn 1822. Diss. Legum. p. 134: subtrib. Curvembryar. diadelphar. Gen.:

*) γάλα ἄγων, lac promovens. (Borrich.)

Galegeae Bronn cont.
Bonaveria, Poitea, Biserrula, Emerus, Galega, Tephrosia, Dalea, Liquiritia, Glycyrrhiza, Amorpha, Indigofera, Sarcodum, Oxytropis, Astragalus, Phaca, Lessertia, Swainsonia, Colutea, Sutherlandia, Caragana, Robinia, Piscidia, Diphysa, Nissolia, Machaerium.
DC. 1825. Pr. II. p. 243: subtrib. Lotear. Gen.: Petalostemum, Dalea, Glycyrrhiza, Galega, Tephrosia, Amorpha, Eysenhardtia, Nissolia, Müllera, Lonchocarpus, Robinia, Poitaea, Sabinea, Coursetia, Sesbania, Agati, Glottidium, Piscidia, Daubentonia, Corynella, Caragana, Halimodendron, Diphysa, Calophaca, Colutea, Sphaerophysa, Swainsona, Lessertia, Sutherlandia. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. Gen. fere ead. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 98. 222. Gen. ut DC. et Callotropis. — Koch 1836. Syn. p. 178. Ed. II. p. 198. Gen. germ.: Glycyrrhiza, Galega, Colutea. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (62). Gen. ut DC. et Polytropia?, Herminiera?, Sylitra, Xiphocarpus, Calycotome, Apodynomene, Callotropis, Phyllolobium?, Clianthus, Carmichaëlia. — Endl. 1840. Gen. p. 1270; 1841. Ench. p. 669. Gen.: Petalostemon, Dalea, Amorpha, Eysenhardtia, Psoralea, Ototropis, Hidrosia, Pycnospora, Indigofera, Oxyramphis, Glycyrrhiza, Galega, Cyclogyne, Calotropis (ejus loco 1841 Accorombona), Polytropia, Chaetocalyx, Apodynomene, Tephrosia, Crafordia, Brongniartia, Peraltea, Xiphocarpus, Lonchocarpus, Gliricidia, Robinia, Poitaea, Sabinea, Coursetia, Glottidium, Sesbania, Herminiera, Agati, Daubentonia, Diphysa, Corynella, Caragana, Chesneya, Halimodendron, Calophaca, Colutea, Swainsona, Lessertia, Phyllolobium, Sylitra, Sutherlandia, Clianthus, Carmichaëlia. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 96. 109) Harpalyce, Lennea et 1843 (Spl. III. p. 103) Meristotropis. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 128. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. Gen. fere ut Endl. (exclusis primis 10 et 2 ultimis) et Ptychosema. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 270. Gen. ut Endl.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVII; 1828. Consp. p. 149: subdiv. Lotear. Gen. ut DC. et 1828: Crafordia?, Carmichaëla. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 410. Gen. ut DC. et Kuhnistera, Carmichaëlia. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. 245. Gen. ead.
Rchb. 1837. Hdb. p. 226: sect. Trifoliear. Gen. ut antea et Peritropia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 147. Gen. ut Endl.

Galegeae Rchb. Nomencl. p. 149 (sect. Fabacear.): vid. *Glycineae Rchb.*

Galegoideae Link 1831. Handb. II. p. 193: sect. Papilionacear. Gen.: Anthyllis, Vulneraria, Hymenocarpus, Indigofera, Ternatea, Glycyrrhiza, Galega, Tephrosia, Arachis, Amorpha, Pterocarpus, Robinia, Sesbania, Caragana, Halimodendron, Colutea, Sutherlandia, Lessertia.

Galena Rchb. vid. *Galera Fries.*

Galenia*) Linn. 1737. Gen. p. 115. n. 327; 1737. Cliff. p. 150; 1740. Syst. p. 22; 1753. Sp. I. p. 359; 1759. Syst. ed. X. p. 1005. n. 443; 1762. Sp. ed. II. p. 515; 1764. Gen. ed. VI. p. 194. n. 492; 1767. Syst. ed. XII. p. 274. n. 487: g. Octandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 310; 1784. Syst. p. 375. — Reich. 1778. Gen. p. 199. n. 534. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 263. n. 673. — Gmel. 1791. Syst. p. 636. — Pers. 1797. Syst. p. 401; 1805. Ench. I. p. 438. n. 973. — Willd. 1799. Sp. II. p. 436. n. 781.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 84. n. 250: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Holeracear.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salsolar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 262: g. Blitor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
Hill 1769. Ht. kew. p. 370: g. Monophyllar.
Scop. 1777. Intr. p. 335: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 84: g. Atriplicum.
Neck. 1790. El. II. p. 190. n. 910: g. Aclithrophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 172: g. Oleracear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 198: g. Attriplicear.
Hedw. 1806. Gen. p. 283. n. 1135: g. Atriplicear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 95.
Link 1821. En. I. p. 383: g. Atriplicinar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 246. n. 1498; 1830. Gen. I. p. 321. n. 1637: g. Chenopodear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1313.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Tetragoniacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4401; 1841. Nom. p. 166. n. 6458: g. Galeniear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Phytolaccear.
Fenzl 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 288: g. Aizoidear. Subgen.: Kolleria, Eugalenia. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5166. p. 948; 1841. Ench. p. 500. Sect. ut Fenzl. — Walp. 1843. Rep. II. p. 232. Sect. eaed. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 768.
Meisn. 1843. Comm. p. 457: g. Ficoidear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 105: g. Tetragoniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 527: g. Tetragonear.
Synon. Kolleria Presl; Sialodes Eckl. & Zeyh.

Galenia Endl. Ench. p. 500. n. 5166 *a:* sphalm. pro *Kolleria Fenzl.*

Galenieae Rchb. 1828. Consp. p. 165: subdiv. Aizoidear. genuinar. Gen.: Gisekia, Galenia.
Rchb. 1841. Nom. p. 166: sect. Tetragoniear. Gen.: Aizoon, Galenia, Kolleria, Ruprechtia.

Galeobdolon**) Dillen. 1719. Nov. gen. p. 103. t. 4: nov. g. a Galeopside sejunctum.

---

*) Nomen in memoriam Claudii Galeni, antiquissimi patris medicinae. (Ht. Cliff.)

**) Nomen ex Dioscoride et Plinio.

Galeobdolon Dillen. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 190: g. Labiatar. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 554. — Pers. 1807. Ench. II. p. 122. n. 1389. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 376. — Link 1822. En. II. p. 108; 1829. Hdb. I. p. 469. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 725. n. 2091; 1831. Gen. II. p. 473. n. 2333.
Huds. 1778. Fl. angl. p. 285.
Wigg. 1780. Holsat. p. 44: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Willd. 1809. En. p. 614.
Mönch 1794. Meth. p. 394: g. Petalostemonis. (Galeopsis galeobdolon L.)
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 320. 362: g. Pericarpiferar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 436: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2872; 1831. Fl. exc. p. 323. — Bartl. 1830. Ord. p. 183.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22 (*Galeopdolon*): g. Galeopsidear.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 3. 58: g. Bilabiatar.
Benth. 1834. Labiat. p. 515; 1848 in DC. Pr. XII. p. 511: sect. Lamii. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 819. — Rchb. 1837. Hdb. p. 188. — Endl. 1838. Gen. n. 3645 *d.* p. 625; 1841. Ench. p. 308. — Walp. 1845. Rep. III. p. 806. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 431. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 682.
Koch 1837. Syn. p. 565. Ed. II. p. 650: g. Stachydear. — Par. Kunth 1838. Berol. II. p. 107. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166. — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4070. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 134.
Vid. Cardiaca Lam., Pollichia Pers. et Lamiopsis Dumort.

Galeoglossa*) Presl 1850. Epimel. bot. p. 492: nov. g. Polypodiear. (Acrostichi sp. Sw., Niphoboli sp. Sm.)
Fée 1852. Gen. Fil. p. 262: sect. Niphoboli?

Galeoglossum Rich. & Gal. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 31: nov. g. Neottiar. (G. prescottioides.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Cranichidar.

Galeola**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 520. Ed. Willd. p. 635: nov. g. Gynandr. Monandr. (G. nudifolia.)
Lindl. 1826. Orch. secl. p. 19 (Linnaea II. p. 532): g. Orchidear. incertae sedis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1582; 1841. Nom. p. 56. n. 2195. — Endl. 1837. Gen. p. 220. — Meisn. 1842. Comm. p. 276.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 183: g. Orchidacear. minus notum.

Galeolus Pers. 1828. Mycol. eur. III. p. 277: sect. Agarici. (A. hypnorum, stagninus, etc.)
Galera Fries.

Galeopdolon Dumort. vid. *Galeobdolon Dill.*

*) γαλῆ, mustela.
**) parva galea.

Galeopsideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Stachydear. Gen.: Lamium, Galeopdolon, Galeopsis.

Galeopsis*) Tourn. 1700. Inst. p. 185. t. 86: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 219. Ed. Hall. 1745. p. 224: g. pl. class. IX.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 103.
Linn. 1737. Gen. p. 175. n. 487; 1737. Cliff. p. 314; 1740. Syst. p. 25; 1753. Sp. II. p. 579; 1759. Syst. ed. X. p. 1100. n. 637; 1763. Sp. ed. II. p. 810; 1764. Gen. ed. VI. p. 292. n. 717; 1767. Syst. ed. XII. p. 393: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 421. — Murr. 1774. Syst. p. 446; 1784. Syst. p. 534. — Reich. 1778. Gen. p. 296. n. 775. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 389. n. 972. — Gmel. 1791. Syst. p. 905. — Pers. 1797. Syst. p. 572. — Willd. 1800. Sp. III. p. 91. n. 1107; 1809. En. p. 614. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 28.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 644: g. Gymnotetraspermar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 185. n. 764: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 397. (Stachys alpina L.)
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 162. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 369.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 187. — Juss. 1789. Gen. p. 114. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 338. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 262. — DC. 1805. Franç. III. p. 542. — Pers. 1807. Ench. II. p. 122. n. 1390. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 77. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 377. Sect.: Ladanum, Tetrahit. — Link 1822. En. II. p. 107; 1829. Hdb. I. p. 469. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 725. n. 2092; 1831. Gen. II. p. 473. n. 2334. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 405.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 240: g. Gymnospermar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 255: g. Monopetalar. irregular.
Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Pal. II. p. 474: g. Labiacear.
Neck. 1790. El. I. p. 318. n. 500: g. Corythophytor. Disjungitur Psilopsis.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 359: g. Pericarpiferar.
Rebent. 1804. Neom. p. 60: g. Tetrandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anal. II. 1. p. 435: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2873; 1831. Fl. exc. p. 322. Sect. ut Gray. — Bartl. 1830. Ord. p. 183.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Galeopsidear.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 3. 52: g. Bilabiatar.

*) Nomen ex Plinio. An à γαλῇ, felis, quia flores felis faciem repraesentare existimarint? Conf. Beckmann Lex. bot. p. 92.

Galeopsis Tourn. cont.
Benth. 1834. Labiat. p. 522: g. Stachydear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 565. Ed. II. p. 650. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 822. — Rchb. 1837. Hdb. p. 188; 1841. Nom. p. 105. n. 4076. Sect.: Ladanum, Galeopsis. — Kunth 1838. Berol. II. p. 108. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 355. 441. — Brongn. 1843. En. genr. p. 66. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 135. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 683.
Endl. 1838. Gen. n. 3648. p. 625; 1841. Ench. p. 308: g. Lamiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 287 (195). — Walp. 1845. Rep. III. p. 813. 988. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 497. — Lemr. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 3. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 419.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Lamidar.
Synon. Cannabis spuria Riv., Hall.; Ladanum Riv., Linn., Hall.; Tetrahit Mönch.

Galeottia Rich. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 25: nov. g. Vandear. (G. grandiflora.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.?
Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. p. 185: sect. Batemaniae.

Galeottia Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 311: nov. g. Gendarussear.
= Glockeria Nees.

Galeottia Ruprecht mss.
= Krombholzia Rupr.

Galependrum Leman vid. *seq.*

Galeperdon Wiggers 1780. Prodr. fl. Holsat. p. 108: nov. g. Fungoidear. (Lycoperdon epidendrum Linn.) *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 18. p. 85 (*Galependrum*).
= Lycogala Mich.

Galera*) Fries 1821. Syst. myc. I. p. 264; 1825. Pl. homon. p. 74; 1828. Elench. I. p. 34: trib. Dermini.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *D c* (sphalm. *Galena*); 1841. Nom. p. 12. n. 502. 3 *b:* subsect. Dermini. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 453. IV. *c.* p. 40; 1841. Ench. p. 22. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 471. — Math. 1853. Belg. II. p. 357.
Fries 1836. Epicr. p. 203; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 293: subg. Dermini. — Par. Bail 1858. Syst. p. 37. t. 36.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.
Synon. Bulta Batt.; Galeolus Pers.

Galera Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 415: nov. g. Orchidear.
Endl. 1837. Gen. p. 215. n. 1567: g. Neottiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2134. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 500; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Physuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1578.
Meisn. 1842. Gen. p. 387 (289): g. Physuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 21.
Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 187: g. Epipogiear.

Galeraicta Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 737: nov. g. Melanconiacear. (G. conica.)

Galericularia Hamilt. 1832 in Mém. soc. Linn. Lyon I (Seringe Bull. bot. I): sect. Scutellariae. — Par. Benth. 1834. Labiat. p. 436; 1848 in DC. Pr. XII. p. 424. — Koch 1837. Syn. p. 573. Ed. II. p. 659. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 795 (*Galericulata*). — Endl. 1838. Gen. n. 3626*d.* p. 621; 1841. Ench. p. 307. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 130. — Walp. 1845. Rep. III. p. 756. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 702. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 398.

Galericulata G. Don vid. *praeced.*

Galiaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 249; 1847. Veg. kingd. p. 768: ordo Cinchonalium. Gen.: Vaillantia, Callipeltis, Galium, Rubia, Crucianella, Asperula, Karamyschewia, Sherardia.

Galiastrum „Heist." Fabric. 1759. Hort. Helmst. ed. I. p. 108.
= Mollugo Linn.?

Galieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: trib. Rubiacear. Gen.: Valantia, Phyllis, Sherardia, Anthospermum, Galium, Rubia, Crucianella, Asperula. — Par. Kunth 1838. Fl. Berol. I. p. 296. Gen.: Galium, Asperula, Sherardia.

Galilea Parlatore 1846. Congresso di Genoa ex Flora 1847. p. 550 (Giorn. bot. II. p. 134): nov. g. Cyperacear. (Schoenus mucronatus L.) *Cf.* Duchartre Rev. bot. 1847. p. 499 et Steud. 1855. Glum. II. p. 29. — Par. Webb 1850. Canar. III. p. 364.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 899: g. Cyperear.
= Cyperus Linn.?

Galimbia Endl. Ench. p. 379. n. 4462*a:* err. typ. pro *Palimbia.*

Galiniera*) Raff.-Delile 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 92. t. 1. f. 5: nov. g. Rubiacear. (G. coffeoides.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 43: g. Coffeear.
Synon. Ptychostigma Hochst.

Galinsoga**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 110. t. 24: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Cavan. 1794. Icon. III. p. 41. t. 281 (parviflora). — Pers. 1807. Ench. II. p. 472. n. 1902. — Gmel. 1808. Fl. Bad. III. p. 489.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 417 (*Gallinsoga*): g. Corymbiferar.
Cass. 1820. Dict. v. 18. p. 96; 1821. v. 20. p. 348; 1825. v. 38. p. 16: g. Heleniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2587. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 396. — Brongn. 1843. En. genr. p. 40.
Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 264; 1830. v. 60. p. 575: g. Galinsogear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3112. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

---

*) *γαλερός*, hilaris, serenus.

*) Dicat. peregrinatori Galinier.
**) Dicat. Mariano Martinez de Galinsoga.

Galinsoga Ruiz & Pav. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Heliantheae.
DC. 1836. Pr. V. p. 677: g. Eugalinsogear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2619. p. 426; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 207 (133).
Synon. Wiborgia Roth, Less.; Galinsogea Willd.; Galinsogaea Zucc.; Vigolina Poir. (Steud.)

Galinsogaea Zuccar. 1821 in Flora p. 612. = praeced.

Galinsogea Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2228. n. 1530; 1809. En. p. 917: g. Syngenes. Superfl.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 565; 1826. Syst. III. p. 579. n. 2801; 1831. Gen. II. p. 630. n. 3136: g. Radiatar.
Link 1822. En. II. p. 350: g. Oppositifoliar.
Link 1829. Hdb. I. p. 774: g. Coreopsidear.
= Galinsoga Ruiz & Pav.

Galinsogea HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 252: g. Heliantheae. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 491.
Less. 1832. Syn. p. 245: g. Galinsogear.
= Sogalgina Cass.

Galinsogeae Cassini 1828. Dict. v. 55. p. 264; 1830. v. 60. p. 575: subdiv. Heleniear. Gen.: Sabazia, Selloa, Leontophthalmum, Mocinna, Galinsoga, Carphostephium, Ptilostephium, Sogalgina, Balbisia, Allocarpus, Caleacte.
Less. 1832. Syn. p. 241: div. Heleniear. Gen.: Wiborgia, Galinsogea, Sogalgina, Carphostephium, Ptilostephium, Tridax, Dubantia.
Rchb. 1841. Nom. p. 81: div. Anthemidear. Gen. Eugalinsogear. DC. et Leontophthalmum, Galeana, Dimerostemma?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: subtrib. Senecionidear. Gen. Eugalinsogear. Endl. excepta Layia.

Galinsogeae DC. 1836. Prodr. V. p. 668: div. Heleniear. ampliata. Subdivis.: Eugalinsogeae, Sphenogyneae. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 425; 1841. Ench. p. 240. Subdivis. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 207 (133). Subdivis. eaed.

Galinsogieae Kunth 1838. Fl. Berol. I. p. 340: div. Heleniear. Gen.: Wiborgia.

Galioides Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 475: sect. Asperulae. (Asperulae §. 3. Galioideae DC.)

Galipaea Juss. 1789. Gen. p. 418: g. incertae sedis.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 378: g. Didynam. Angiosperm.
Hedw. 1806. Gen. p. 346: g. Diandr. Monogyn. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 98.
= Galipea Aubl.

Galipea*) Aublet 1775. Guian. II. p. 662. t. 269: nov. g. Didynam. Angiosperm. (G. trifoliata.)
Willd. 1797. Sp. I. p. 41. n. 33: g. Diandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 8. n. 34. — Vahl 1805. Enum. I. p. 100. n. 34. — Hedw. 1806. Gen. p. 10. n. 47. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 53. 128. n. 65.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 34): g. Diosmear.
DC. 1822. Mém. Mus. IX. p. 148; 1824. Pr. I. p. 730: g. Cuspariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5145; 1837. Hdb. p. 283. — Bartl. 1830. Ord. p. 388. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1016. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471. — B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 7.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 53: g. Rutacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 235. n. 1240: g. Cuspariar.
Galipeae St. Hil. pars.

Galipea St. Hilaire 1823. Bull. soc. philom. p. 131; 1823. Mém. Mus. X. p. 279; 1825. Fl. Bras. I. p. 87: g. injunctis Raputia Aubl. etc. dilatatum Rutacear.
Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 493: g. Diosmear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — Meisn. 1837. Gen. p. 62 (45). — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 322.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 797: g. Cuspariear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 351. — Endl. 1840. Gen. n. 5990. p. 1151; 1841. Ench. p. 611. — Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7527.
Synon. Galipea et Raputia Aubl.; Galipaea Juss.; Pholidandra Neck.; Sciuris Schreb.; Cusparia Humb.; Bonplandia Willd.; Angostura Röm. & Schult.; Conchocarpus Mik.; Rauia Nees & Mart.; Ravia Schult.; Lasiostemum Nees & Mart.; Obentonia Vell.; Dangervilla et Rossenia Fl. Flum.; Dangervillea Arrab., Steud.

Galitachia Walp. 1846. Repert. V. p. 569: sect. Tachigaliae.

Galium Linn. 1737. Gen. p. 24. n. 65; 1737. Cliff. p. 34; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 27; 1753. Sp. I. p. 105; 1759. Syst. ed. X. p. 891. n. 117; 1762. Sp. ed. II. p. 152; 1764. Gen. ed. VI. p. 52. n. 125; 1767. Syst. ed. XII. p. 117: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 99. — Murr. 1774. Syst. p. 126; 1784. Syst. p. 150. — Reich. 1778. Gen. p. 53. n. 132. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 69. n. 162. — Lour. 1790. Coch. I. p. 79. — Gmel. 1791. Syst. p. 237. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 30; 1818. Fl. cap. I. p. 551. — Pers. 1797. Syst. p. 154; 1805. Ench. I. p. 125. n. 241. — Willd. 1797. Sp. I. p. 584. n. 185; 1809. En. p. 151. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 93. — Wall. 1820 in Roxb. Ind. I. p. 381. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 767. — Schult. 1827. Mant. III. p. 13.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 458: g. Stellatar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat. — Gis. 1792. Prael. p. 520. — Batsch 1802. Tab. p. 231. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 597. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 88. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 375. 414. Sect.: Galium, Asprellum, Aparine, Valantia. — Rchb. 1828. Consp.

*) Nomen a terra Galliponensium?

Galium Linn. cont.
p. 93. n. 1986; 1831. Fl. exc. p. 206 (sect.: Aparine, Gallium); 1841. Nom. p. 74. n. 2747 (sect.: Cruciata, Aspera, Aparine, Galium). — Bartl. 1830. Ord. p. 209. — DC. 1830. Pr. IV. p. 593. Sect.: Eugalium, Aparine. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 288. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 647. Sect. ut DC. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 442. — Koch 1836. Syn. p. 329. Ed. II. p. 361. Sect.: Cruciata, Vaillantioides, Aparine, Platygalium, Eugalium. — Endl. 1838. Gen. n. 3100. p. 522; 1841. Ench. p. 270. Sect.: Aspera, Euaparine, Leiaparine, Xanthaparine, Cruciata, Maschaligalium, Ericogalium, Xanthogalium, Erythrogalium, Coccogalium, Trichogalium, Platygalium, Leiogalium, Relbunium. — Meisn. 1838. Gen. p. 173 (120). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 469. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 19. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 406. Sect. ex Endl. — Webb . . . . Canar. II. p. 180. Sect.: Aspera, Aparine, Eugalium. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 338.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 566. — DC. 1805. Franç. IV. p. 248; 1815. V. p. 495. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 14. 214. n. 481. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 22 (*Gaillet*). — Link 1821. En. I. p. 134; 1829. Hdb. I. p. 647. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 481. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 386. n. 386; 1830. Gen. I. p. 92. n. 458. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 943. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 132. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 463. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 156. Sect.: Hylora, Eugalium, Thliphthisa, Microgalium, Aparine, Cruciata, Aspera. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 10. Sect.: Platygalia, Linogalia, Heleogalia, Aparine. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 14. Sect.: Cruciata, Platygalium, Asperulopsis, Eugalium, Aparinoides, Aparine. *Cf.* Flora 1851. p. 22 et Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 97. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 113.

Gled. 1764. Syst. p. 163. n. 663: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 84.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 168: g. Fructiflorar.

Scop. 1777. Intr. p. 138: g. Aparinium.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 109. t. 24. f. 1 (hispidum et Aparine).

Cram. 1803. Disp. p. 22 in Triandr. Monogyn. (G. trifidum.)

HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 335: g. Galear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 10.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Galiear. — Par. Kunth 1838. Berol. I. p. 296.

A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 133: g. Asperulear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 48.

Tausch 1834. Flora I. p 337. Sect.: Eugalium, Rubeola.

Galium Linn. cont.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 249; 1847. Veg. kd. p. 771: g. Galiacear.
Lemr. 1849 in Orb. Dict. V. p. 761 (*Gaillet*): g. Rubiear.
Synon. Gallium, Aparine et Cruciata Tourn.; Eyselia Neck.; Aspera Mönch.

Gallaria Schrank mss.
= Medinilla Gaudich.

Gallasia Mart. herb. ex DC. Prodr. III. p. 182. (G. pepericarpa.)
Miconia Ruiz & Pav.?

Gallesia*) Casar. 1842. Nov. stirp. Bras. dec. p. 44: nov. g. Petiveriacear. (Crataeva Gorarema Fl. Flum.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 386.
Endl. 1843. Spl. III. p. 93. n. 5254/$_1$: g. Petiveriear. verar.
Benth. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 482.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 8: g. Seguieriear.

Gallesioa**) Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 33. 45: nov. g. Clausenear., a Wight & Arn. indicatum. (Cookia graveolens W. & A.)

Gallifera Spach 1842. Hist. vég. phan. XI. p. 170: sect. Quercus. (Q. infectoria.)
Endl. 1847. Spl. IV. p. 24. n. 1845 *A* *r*: sect. Esculi.

Gallinsoga St. Hilaire vid. *Galinsoga Ruiz & Pav.*

Gallionella Ehrenb. 1840. Ber. Ak. Berl. p. 158. 211 etc.: g. Bacillarior.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 28: sect. Melosirae. (= *Eulysigonium Trev.*)
= Gaillonella Bory.

Gallium „C. et B. Bauh., Herm." Tourn. 1700. Inst. p. 114. t. 39: g. pl. class. I. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 3. Ed. Hall. 1745. p. 3.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. p. 484.
Hill 1769. Ht. kew. p. 118: g. Monopetalar.
Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Palat. II. p. 470: g. Rubiatar.
Juss. 1789. Gen. p. 196; 1820. Mém. Mus. VI. p. 369: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 430. — Hedw. 1806. Gen. p. 64. 373.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 178; 1789. Phil. Bot. I. p. 25.
Neck. 1790. El. I. p. 199. n. 332: g. Phyllastrophytor. Sejungitur Eyselia.
D. Don 1825. Nepal. p. 133: g. Stellatar.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 207: sect. Galii. Subsect: Cruciata, Mollugineа.
= Galii Linn. pars.

Gallorheus Endl. vid. *Galorrheus Fries.*

Galoglychia Gasparr. 1844. Nov. gen. Fic. p. 10; 1845. Ann. sc. nat. 3e. sér. III. p. 346; 1845. Ricerche p. 84: nov. g. a Ficu

---

*) Dicat. G. Gallesio.
**) G. Gallesio tractatum de Citro scripsit.

Galoglychia Gasparr. cont.
separatum (F. Saussureana et galactophora), a Miquel (1847) ad Urostigma Gasp. relatum.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 35. n. 1859 *D*: sect. Ficus.

Galophthalmum*) Nees & Mart. 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 7. t. 2: nov. g. Heliantheār., Verbesinae et Chthoniae proximum. (G. brasiliense.)
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 257: g. Compositar. incertae sedis. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 503; 1841. Ench. p. 251.
Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130): g. Verbesinear.? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3163 (*Calophthalmum*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715: g. Asteracear. minus notum.

Galopina Thunb. 1781. Diss. nov. gen. I. p. 3: nov. g. Tetrandr. Digyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 166. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 91. n. 231. — Gmel. 1791. Syst. p. 281. — Pers. 1797. Syst. p. 172; 1805. Ench. I. p. 150. n. 336. — Willd. 1797. Sp. I. p. 706. n. 265. — Schult. 1827. Mant. III. p. 17. 329.
Juss. 1789. Gen. p. 198; 1820. Mém. Mus. VI. p. 371: g. Rubiacear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 232. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 433. — Hedw. 1806. Gen. p. 82. n. 379. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 115. — Cruse 1825. Rub. cap. p. 18.
Neck. 1790. El. I. p. 208. n. 349: g. Phyllastrophytor.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Astrophyllae.
Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 309 in adnot.: g. Anthospermear. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 140. — Bartl. 1830. Ord. p. 210. — DC. 1830. Pr. IV. p. 579. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 635. — Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 74. n. 2755. — Endl. 1838. Gen. n. 3107. p. 524; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 172 (120). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 378.
Rchb. 1828. Consp. p. 166. n. 4419: g. Cliffortiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Anthospermidar.
Synon. Oxyspermum Eckl. & Zeyh.

Galordia Räusch. 1797. Nomencl. p. 251. = Gaillardia Foug.

Galorheus Endl., Rabenh. vid. *Galorrheus Fries.*

Galorhoeus „Haw." Endl. Gen. p. 1108 et Ench. p. 587 in synon. Euphorbiae: vid. *Galarhoeus Haw.*

Galorrheus Fries 1818. Obs. mycol. II. p. 188: fam. Agarici.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 9. 61; 1828. Elench. I. p. 8: trib. Leucospori.
Fries 1825. Pl. homon. p. 75: g. Agaricinor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 347 (*Galorrhoeus*).

*) γαλῆ, felis.

Galorrheus Fries cont.
Endl. 1836. Gen. n. 453. *VII f.* p. 41 (*Galorheus*); 1841. Ench. p. 22 (*Galorheus*): subsect. Leucospori. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 545. (*Galorheus*). — Math. 1853. Belg. II. p. 370.
Lactarius Fries.

Galorrhoeus Rchb. vid. *Galorrheus Fries.*

Galphimia*) Cavan. 1799. Anal. cienc. nat. I. t. 2; 1799. Icon. V. p. 61. t. 489; 1801. VI. t. 563: nov. g. Decandr. Trigyn. (G. glauca et glandulosa.) *Cf.* Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 116 (*Galphinia*).
Pers. 1805. Ench. I. p. 506: sect. Malpighiae.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 172: g. Malpighiacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 187. — Bartl. 1830. Ord. p. 359. — A. Juss. 1833 in St. Hil. Fl. Bras. III. p. 70. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 134. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 86.
DC. 1824. Pr. I. p. 582: g. Malpighiear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 385. n. 1705; 1830. Gen. I. p. 377. n. 1903. — — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 639. — Meisn. 1837. Gen. p. 54 (39). — Rchb. 1837. Hdb. p. 299; 1841. Nom. p. 207. n. 7868. (genuinar.) — A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 326; 1843. Arch. Mus. III. p. 321. t. 7. f. 8. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1384. 1589. — Walp. 1846. Rep. V. p. 182. — Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 28.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII; 1828. Consp. p. 207. n. 5378: g. Galphimiear.
Bartl. 1839. Linnaea XIII. p. 549. (Spec. mexic.)
Endl. 1840. Gen. n. 5590. p. 1064; 1841. Ench. p. 557: p. Apterygiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Malpighear.
Synon. Thryallis Linn.?; Vorstia Adans.

Galphimieae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LXVII; 1828. Consp. p. 207: subdiv. Malpighiear. Gen.: Galphimia, Bunchosia, Byrsonima, Malpighia, et 1828 Caucanthus.

Galphinia Poir. vid. *Galphimia Cavan.*

Galstronema Steud. 1840. Nom. I. p. 662: lege *Gastronema Herb.*

Galumpita**) Blume 1853. Mus. bot. Lugd. II. p. 73: nov. g. Celtidear.

Galurus Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 364: g. Euphorbiear. (*Caturus Linn.* Vox hybrida!)
Spreng. 1825. Syst. I. p. 138. 362. n. 361; 1830. Gen. I. p. 77. n. 377: g. Tricoccar. (Triandr. Trigyn.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 142. 415.
Acalypha Linn.

Galvania Vandell. 1788. Dict.; 1796 in Römer Script. p. 89. t. 6. f. 7: nov. g. Pentandr. Monogyn.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XI. 193. n. 891: g. Rubiacear. (An — *Palicurea?*) — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 118.

*) Anagramma vocis Malpighiae.
**) Nomen vernaculum *Galumpit.*

Galvania Vandell. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3048b: g. Pittosporear.?
= Palicourea Aubl.

Galvesia Gmel. 1791. Syst. p. 937: g. Didynam. Angiosperm.
Chavann. 1833. Antirrh. p. . . .: g. Antirrhinear. — Par. Benth. 1835. Scrop. rev. p. 2; 1846 in DC. Pr. X. p. 295; 1847 in Lindl. Veg kd. p. 684. — Rchb. 1837. Hdb. p. 198.
· Galvezia Domb.

Galvesia Pers. vid. *Galvezia Ruiz & Pav.*

Galvezia „Dombey" Juss. 1789. Gen. p. 119: g. Scrophulariar.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 274.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 110: g. Antirrhinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 532. — Endl. 1839. Gen. n. 3894. p. 674; 1841. Ench. p. 338. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267. — Walp. 1845. Rep. III. p. 230.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4494: g. Linariear. genuinar.
Synon. Galvesia Gmel.; Dodartia Ruiz & Pav.; Agassizia Chav.

Galvezia*) Ruiz & Pavon 1794. Prodr. I. p. 56. t. 35: g. Octandr. Tetragyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 445. n. 988 (*Galvesia*). — Hedw. 1806. Gen. p. 287. n. 1152.
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 119: g. Laurinear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 262. n. 1520. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1329.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 500. t. 25: g. Zanthoxylear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 197. n. 5137. — Bartl. 1830. Ord. p. 386. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 800. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 362. — Meisn. 1837. Gen. p. 64 (46).
Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1906: g. Laurear.
Spreng. 1830. Hen. I. p. 325. n. 1654: g. Rutacear.
= Pitavia Molin.

Gambelia Nuttall . . . . Pl. Gambel. ex Lond. journ. bot. VII.: nov. g. Antirrhinear., Galvesiae aff.

Gamelythrum**) Nees 1843. Lond. journ. bot. II. p. 415; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 101: nov. g. Pappophorear. (Amphipogon turbinatus Br.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 930. — Steud. 1854. Glum. I. p. 198 (*Gamelytrum*).

Gamelytrum Steud. vid. *praeced.*

Gamicae Schleiden 1843. Grundz. II. p. 94: subclass. Angiosporar. Sect.: Athalamicae, Thalamicae.
Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. VIII: class. II. plant. Divis. eaed.

Gamocarpha DC. 1836. Prodr. V. p. 2: nov. g. Calycerear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3033. p. 504; 1841. Ench. p. 259.

*) Dicat. Jos. de Galvez.

**) γαμός, connubium.

Gamocarpha DC. cont.
— Meisn. 1838. Gen. p. 174 (121). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 299. — Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3919.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 701: g. Calycerear.

Gamocespedezia Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 99. n. 5959 *b*: sect. Cespedeziae.

Gamochilum Walpers 1839. Linnaea XIII. p. 509; 1842. Rep. I. p. 630: nov. g. Genistear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6503. p. 1266; 1841. Ench. p. 668. — Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5861. (genuinar.)

Gamochilus Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341: nov. g. Hedychiear. (Hedychium speciosum Wall.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 22. n. 1630 *b*: sect. Hedychii.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear.

Gamolepis Lessing 1832. Syn. Compos. p. 251: nov. g. Chrysanthemear. (Othonna Tagetes L.) — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 40. Sect.: Psilothonna, Psilosteum. — Endl. 1838. Gen. n. 2656. p. 432; 1841. Ench. p. 241. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 211 (134). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3081. Sect.: Psilothonna, Gamolepis. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 276: g. Pyrethrear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 40: g. Anthemidear.

Gamon Gay 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VII. p. 116: sect. Asphodeli.
= Rhizophyllus Griseb.

Gamopetala Endl. 1838. Gen. p. 346; 1841. Ench. p. 221: cohors 3 Acramphibryor. Classes: Plumbagines, Aggregatae, Campanulinae, Caprifolia, Contortae, Nuculiferae, Tubiflorae, Personatae, Petalanthae, Bicornes.

Gamopetalae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XVI. 30: series Angiospermar. A. *Perigynae*. Class.: Campanulineae, Asteroideae, Loniceroideae, Coffeineae. B. *Hypogynae*. Class.: Asclepiadineae, Convolvulineae, Asperifolieae, Solanineae, Personeae, Selaginoideae, Verbenineae, Primulineae, Ericoideae, Diospyroideae.
Leun. 1849. Schul-Nat. II. p. 135: div. Dicotyledonear. Ordines: Ligustrinae, Rubiacinae, Contortae, Tubiflorae, Labiatiflorae, Myrsineae, Styracinae, Ericineae, Campanulinae, Compositae, Aggregatae.

Gamoplexis*) „Falconer in Royle's Illustr. p. 367" Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 384: g. Gastrodiear. (vix nötum.) — Par. Falcon. 1847. Ann. and Mag. XIX. p. 453. *Cf.* Endl. Spl. I. p. 1366, Meisn. Comm. p. 286 et Bot. Zeit. 1847. p. 672.
Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1900: g. Ophrydear.

*) πλέκω, plecto, necto.

Gamoplexis Falconer cont.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181: g. Arethusear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Gastrodidar.

Gamosphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 90: g. Sphaeriear. (*Sphaeria atropurpurea, serpens, etc.*)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Stigmaspherar.

Gamotion Basiner 1846. Bull. Ac. Petersb. IV. p. 310: sect. Hedysari (Isolom.)

Gamozygis Turczan. 1851. Bull. Mosc. XXIV. 2. p. 75: nov. g. Angianthear. (*G. flexuosa.*) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 260.
= Dithyrostegia A. Gray.

Gampsoceras*) Stev. 1852. Bull. Mosc. I. p. 541: nov. g. ex typo Ranunculi cornuti Pin. coll., nec DC.

Gandichaudia Dumort. vid. *Gaudichaudia HBK.*

Gandola Rumph. 1747. Amboin. V. t. 154.
= Basella Rheede.

Gandola Moquin-Tand. olim.
= Melloca Lindl. (*Moq. in DC. Pr. XIII. 2. p. 224.*)

Gandriloa**) Steud. 1840. Nomencl. I. p. 662: nov. g. Chenopodiacear. (Oligandra atriplicoides Less.)
= Chenopodium. (Moq. in DC. Pr. XIII. 2. p. 61.)

Gandsulium Rumph. 1747. Amboin V. t. 169.
= Hedychium Kön.

Gangila***) Bernhardi 1842. Linnaea XVI. p. 39. 42: nov. g. Sesamear. (Sesamum pentaphyllum E. Mey.) — Par. Buching. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 367. — Meisn. 1843. Comm. p. 367.
DC. 1845. Pr. IX. p. 251 (*Gongyla*): sect. Sesamopteridis.
= Sesamopteris Endl.

Ganitrocarpus Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 63: subg. Microdesmidis. (M. caseariaefolia Planch.)

Ganitroceras Endl. 1840. Gen. n. 5385 *b.* p. 1011; 1841. Ench. p. 523: sect. Monocerae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7938. 2.

Ganitrum Rumph. 1743. Amboin. III. p. 161. t. 102.
= seq.

Ganitrus Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 271. t. 139.
Endl. 1840. Gen. n. 5384 *b.* p. 1011; 1841. Ench. p. 523: sect. Elaeocarpi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7937. 2.
Synon. Craspedum Lour.; Ganitrum Rumph.

Ganja Rumph. 1747. Amboin. V. t. 78.
DC. 1824. Pr. I. p. 505: sect. Corchori. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5445 *d* (err. typ. *Gauja*). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 544. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 9. — Endl. 1840. Gen. n. 5371 *d.* p. 1008; 1841. Ench. p. 522.
Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Corchorear.
Rchb. 1841. Nom. p. 210. n. 7970: g. Tiliear. genuinar.

Ganophyllum*) Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 15. p. 230: nov. g. Burseracear. (*G. falcatum.*) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 289.

Gansblum Adans. 1763. Fam. II. p. 420: g. Lunariar. (*Draba verna L.*)
= Erophila DC.

Ganymedes Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. (*1815.*) p. 353: nov. g. Narcissear. (Narcissus cernuus.)
Haw. 1819. Suppl. pl. succ. p. 130: g. Narcissor.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 952: sect. Narcissi. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1289 *f.* p. 179; 1841. Ench. p. 103. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1611. 6.
Haw. 1831. Mon. Narciss. p. 4: g. Narcissinear. *Cf.* Kunth Enum. V. p. 717.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 437: subg. Narcissi.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 18. 214: sect. Hermiones.

Ganymedes Herbert 1837. Amaryll. p. 62. 79. 307: g. Narcissear. ampliat., includens Assarcum et Illum Haw. — Par. Kunth 1850. Enum. V. p. 717. — Gay 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. X. p. 77.

Garaleum Schultz Bip. vid. *Garuleum Cass.*

Garapatica Karsten „Linnaea XXX. p. 143" 1858. Fl. Columb. I. p. 57. t. 28: nov. g. Hameliear.

Garcia**) Rohr 1792 in Danskę Nat. Selsk. Skrivt. II. 1. p. 218. t. 9: nov. g. Monoec. Polyandr. (G. nutans.) — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 492. n. 1708. — Pers. 1807. Ench. II. p. 573. n. 2112.
Vahl 1794. Symb. III. p. 99.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 375: g. Linozostear.
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 148: g. Euphorbiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 41.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 866. n. 3133; 1831. Gen. II. p. 697. n. 3516: g. Tricoccar.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5068: g. Ricinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 487.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Crozophorear.
Endl. 1840. Gen. n. 5797. p. 1113; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Meisn. 1841. Gen. p. 341 (253): g. Jatrophear.
Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7402: g. Garciear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 392: g. Crotonidear.
Synon. Carcia Räusch.

---

*) γαμψός, curvatus.
**) Anagramma nominis Oligandra.
***) Nomen a synonymo africano Sesami.

*) γανόω, vernice obducere.
**) Dicat. Garcias del Huerto.

Garciana*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 14. Ed. Willd. p. 19: nov. g. Monandr. Monogyn. (G. cochinchinensis.)
Philydrum Banks. (Willd. in adnot. ad Lour.)

Garcieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 194: sect. Crotonear. Gen.: Garcia.

Garcilassa**) Pöppig & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 45. t. 251: nov. g. Millleriear., Riencourtiae aff. (G. rivularis.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 68. n. 2459/1. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 147.

Garcinia***) Linn. 1737. Gen. p. 343. n. 861; 1737. Cliff. p. 183; 1740. Syst. p. 24; 1742. Gen. ed. II. p. 212. n. 470: g. Icosandr. Monogyn. (Mangostans Garcin.)
Gled. 1749. Berl. V. p. 132: g. Calycostemonis.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Hesperidear.
Linn. 1753. Sp. I. p. 443; 1759. Syst. ed. X. p. 1043. n. 526; 1762. Sp. ed. II. p. 635; 1764. Gen. ed. VI. p. 237. n. 594; 1767. Syst. ed. XII. p. 326: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 368; 1784. Syst. p. 443. — Reich. 1778. Gen. p. 243. n. 650. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 319. n. 813. — Gmel. 1791. Syst. p. 748. — Pers. 1797. Syst. p. 475; 1807. Ench. II. p. 3. n. 1164. — Willd. 1799. Sp. II. p. 448. n. 938.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337.
Gled. 1764. Syst. p. 105. n. 429: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 268: g. Polyandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 256; 1821. Dict. v. 20. p. 104: g. Guttiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 27. — Link 1822. En. II. p. 5; 1831. Hdb. II. p. 341. — Poir. 1823. Dict. v. 29. p. 51 (*Mangoustan*). — Spreng. 1825. Syst. II. p. 448. n. 1749; 1830. Gen. I. p. 389. n. 1954. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 5. p. 213. Sect.: Garcinia, Cladogynos. — Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 425. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 100. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 9. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 749 (*Mangoustan*).
Neck. 1790. El. II. p. 275. n. 1037: g. Catizophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 782: g. Marcgraviear.
Roxb. 1819. Corom. III. p. 94. t. 298: g. Polygam. Dioec.
DC. 1824. Pr. I. p. 560: g. Garciniear. Sect.: Mangostana, Brindonia. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47. — Bartl. 1830. Ord. p. 294. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 619. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 322. — Meisn. 1837. Gen. p. 43

Garcinia Linn. cont.
(32). — Endl. 1840. Gen. n. 5443. p. 1027; 1841. Ench. p. 534. — Wight 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 193. Subgen. (an genera?): Mangostana, Garcinia, Cambogia, Stalagmites. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 365.
Rchb. 1828. Consp. p. 211. n. 5492; 1841. Nom. p. 212. n. 8046: g. Mangostanear.
Roxb. 1832. Ind. II. p. 618: g. Polyandr. Monogyn.
Rchb. 1837. Hdb. p. 311: g. Cambogiear.
Synon. Cambogia Linn.; Coddampulli Adans.; Mangostana Rumph.; Biwaldia Scop.; Oxycarpus Lour.; Brindonia Thouars.

Garcinieae Choisy 1824 in DC. Prodr. I. p. 560: trib. Guttiferar. Gen.: Ochrocarpos, Marialva, Micranthera, Garcinia. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47. Gen.: Micranthera, Garcinia. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 618. Gen.: Mammea, Pentadesma, Rheedia, Garcinia, Stalagmitis. — Meisn. 1837. Gen. p. 43. Gen. ut Don. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 432. Gen. ut Endl.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII: subdiv. Guttiferar. Gen.: Marialva, Garcinia.
Endl. 1840. Gen. p. 1026; 1841. Ench. p. 534: trib. Clusiacear. Gen. ut Don. (Hebradendron loco Rheediae.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402. Gen.: Mammea, Garcinia, Xanthochymus, Discostigma?, Pentadesma, Cambogia, Gynotroches, Platonia.

Garcinieae Rchb. 1828. Consp. p. 211: div. Guttiferar. Subdivis.: Calophylleae, Mangostaneae, Chrysopieae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 311. Subdivis.: Symphonieae, Calophylleae, Mangostaneae. — Rchb. 1841. Nom. p. 211. Subdivis.: Canelleae, Calophylleae, Mangostaneae.
Bartl. 1830. Ord. p. 292: ordo (168) Guttiferar. Divis.: Carpodonteae, Clusieae, *genuinae* (gen.: Verticillaria, Ochrocarpus, Tovomita, Micranthera, Garcinia), Calophylleae, Symphonieae.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 306: fam. (79) Guttiferar. Gen.: Tovomita, Verticillaria, Clusia, Arrudea, Havetia, Schweiggera, Quapoya, Moronobea, Platonia, Chrysopia, Pentadesma, Mammea, Rheedia, Garcinia, Stalagmitis, Macoubea, Mesua, Calophyllum, Apoterium, Kayea; Macanea?, Singana? *Affine:* Canella.

Garckea C. Müll. 1845. Bot. Zeit. p. 865: nov. g. Muscor. stegocarpor.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 424: g. Leptotrichacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.

Gardena Adans. vid. *seq.*

Gardenia*) Ellis 1761. Phil. Trans. LI. 2. p. 935. t. 23: nov. g. plant. *Cf.* Soland. 1762. ibid. LII. p. 654. t. 20.
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 305; 1764. Gen. ed. VI. p. 116. n. 296; 1767. Syst. ed.

*) Dicat. Garcia ab Horto.
**) Dicat. Garcilasso de la Vega.
***) Nomen a Garciano qui primus hujus generis characterem dedit, et a Garcia ab Horto, qui primus plantam descripsit. (Ht. Cliff.)

*) Dicat. Dr. Alex. Garden.

Gardenia Ellis cont.
XII. p. 189. n. 292: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 208; 1784. Syst. p. 251. — Reich. 1778. Gen. p. 120. n. 320. — Linn. f. 1781. Suppl. p. 23. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 162. n. 416. — Lour. 1790. Coch. I. p. 147. — Gmel. 1791. Syst. p. 433. — Pers. 1797. Syst. p. 263. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1225. n. 477; 1809. En. p. 273. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 18. t. 134—137; 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 549; ed. 1832. I. p. 703. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 67. (reform.) — Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 73. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 74.

Adans. 1763. Fam. II. p. (20) *[Gardena]*: g. Aparinium.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402.

Gled. 1764. Syst. p. 213. n. 889: g. Petalostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 145: g. Opulinar.

Juss. 1789. Gen. p. 201; 1820. Mém. Mus. VI. p. 391: g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 576. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 440. — Pers. 1805. Ench. I. p. 198. n. 442. — Hedw. 1806. Gen. p. 145. n. 623. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XVII. 235. n. 920. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 149. — Link 1821. En. I. p. 226; 1829. Hdb. I. p. 661. — Kunth 1824. Syn. III. p. 58. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 761. n. 825; 1830. Gen. I. p. 176. n. 888. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 795.

Neck. 1790. El. I. p. 262. n. 417: g. Campylophytor. Excluditur Sahlbergia.

Cram. 1803. Disp. p. 103 in Decandr. Monogyn.

Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 79.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 609: g. Cinchonear. — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 138. — Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2080.

HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 408: g. Gardeniacear. — Par. Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 197. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Geniypariae.

Nees 1825. Flora I. p. 115. Subgen.: Gardenia, Ceriscus.

Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1014: g. inter Rubiaceas et Strychnaceas medium.

A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 239: g. Gardeniar.

DC. 1830. Pr. IV. p. 379: g. Gardeniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 211. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 496. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 394. — Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 78. n. 2962. Sect. (1841): Gardenia, Bertuchia, Piringa, Rothmannia. — Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 409. — Brongn. 1843. En. genr. p. 50. — B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 27.

Endl. 1838. Gen. n. 3305. p. 562; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear. Sect.: Gardenia, Kumbaya, Piringa, Rothmannia. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 228.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Synon. Thunbergia Montin.; Piringa Juss.; Sahlbergia Neck.; Rothmannia Thunb.; Foscarenia Vand.?

Gardenia Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 140. t. 28. f. 4. (G. spinosa Thunb., *Ceriscus malabaricus* in icone.)
= Oxyceros Lour.

Gardeniaceae HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 407: sect. Rubiacear. Gen.: Genipa, Gardenia, Randia, Mussaenda, Tocoyena, Cassupa. — Par. Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 197. Gen.: Gardenia, Hillia.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. 32: fam. Rubiariear. Gen.: Gardenia, Buchnera, Randia, Luculia, Oxyanthus, Genipa, Webera, Catesbaea, Fernelia, Coccocypselum.

A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 108 *(Gardéniacées)*: vid. *Gardeniae A. Rich.*

DC. 1830. Pr. IV. p. 367: trib. Rubiacear. Subtrib.: Sarcocephaleae, Gardenieae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 487. Subtrib. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115). Subtrib. eaed.

Gardeniae A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 239: trib. 10 Rubiacear. Gen.: Gardenia, Genipa, Mussaenda, Tocoyena, Stylocoryna, Argostemma, Amaiova, Cassupa, Pouchetia, Spicillaria, Chapelieria, Bertiera, Higginsia, Hippotis, Catesbaea, Fernelia, Hoffmannia, Coccocypsilum, Burchellia, Canephora, Zuccarinia, Gynopachys, Psilobium.

Gardeniariae Rchb. 1841. Nomencl. p. 77: sect. Cinchonear. Subsect.: Hamelieae, Iserticae, Gardenieae.

Gardenidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 765: trib. Cinchonear. Gen. Gardeniear. Endl. et Aspidanthera, Rhodostoma, Lasiostoma, Conosiphon, Gardeniola, Thileodoxa, Scepseothamnus, Alibertia, Cordiera.

Gardenieae DC. 1830. Prodr. IV. p. 368: subtrib. Gardeniacear. Gen.: Burchellia, Amaioua, Mussaenda, Kutchubaea, Cassupa, Gynopachys, Tocoyena, Posoqueria, Oxyanthus, Stylocoryna, Genipa, Gardenia, Randia, Chapelieria, Heinsia, Menestoria, Helospora, Hippotis, Pomatium, Bertiera, Pouchetia, Cupia, Tarenna, Petesia, Coccocypselum, Fernelia, Petunga, Higginsia, Hoffmannia, Catesbaea. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 488. Gen. ead. — Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115). Gen. ead. et Scepseothamnus, Gardeniola, Thieleodoxa, Griffithia, Acranthera, Hyptianthera, Sommera.

Bartl. 1830. Ord. p. 211: div. Rubiacear. Gen.: Catesbaea, Posoqueria, Tocoyena, Oxyanthus, Genipa, Gardenia, Randia, Stylocoryna, Petesia Webera; Bertiera, Amaioua.

Rchb. 1837. Hdb. p. 180: sect. Cinchonear. Gen.: Isertia, Hamelia, Gardenia, etc. —

Gardenieae DC. cont.
Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372. 401. Gen. ut DC. et Sarcocephalus, Zuccarinia, Lucianea, Canephora, Breonia, Neurocarpaea, Hyptianthera.
Endl. 1838. Gen. p. 557; 1841. Ench. p. 274: trib. Cinchonacear. Subtrib.: Sarcocephaleae, Eugardenieae.
Rchb. 1841. Nom. p. 78: subsect. Gardeniariar. Subsect.: Sarcocephaleae, *genuinae* (gen. Eugardeniear. Endl.)
Brongn. 1843. En. genr. p. 50: trib. Rubiacear. Gen.: Sarcocephalus, Burchellia, Mussaenda, Oxyanthus, Genipa, Gardenia, Randia, Cupia, Coccocypselum, Fernelia. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 196. Subtrib.: Randieae, Eugardenieae, Polyphragmeae, Hypobathreae, Diplosporeae.

Gardeniola Chamisso 1834. Linnaea IX. p. 247: nov. g. Gardeniacear., an Gardenieae subgenus?
Endl. 1838. Gen. n. 3318. p. 564; 1841. Ench. p. 275: g. Rubiacear. dubiae tribus. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 524.
Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115): g. Gardeniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2977.(?)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Gardinia Bertero ex Steud. Nomencl. I. p. 664. (G. violacea.)
= Allium Gardinia St.

Gardnera Wallich vid. *Gardneria Wall.*

Gardnereae Wallich 1824 in Roxb. Fl. Ind. II. p. 317: nova fam. inter Rubiaceas et Apocyneas media. Gen.: Gardnera, Geniostomum.
= Loganiacear. Endl. pars.

Gardneria*) Wallich 1820 in Roxb. Fl. Ind. I. p. 400: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (G. ovata.) *Cf.* Spreng. neue Entd. III. p. 139. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 418. n. 427; 1830. Gen. I. p. 86. n. 424. — Schult. 1827. Mant. III. p. 3. 65.
Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 318 (*Gardnera.* — Pl. As. rar. III. t. 231): g. Gardnerear. (Pentandr. Monogyn. — G. ovata et angustifolia.)
D. Don 1825. Nepal. p. 132: g. Apocinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 212b. n. 3503b: g. Loganiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 206.
Blume 1835. Rumphia I. p. 66 in obs.: g. Strychnear.(?) — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 484. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 66: g. Strychnacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 210: g. Mitrasacmear.
Endl. 1838. Gen. n. 3361. p. 575; 1841. Ench. p. 288: g. Gardneriear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167). — Rchb. 1841. Nom. p. 135. n. 5214. — DC. 1845. Pr. IX. p. 19. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 11. p. 174.

*) Dicat. G. Gardner, directori horti botan. Ceylon.

Gardneria Wall. cont.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 444: g. Ericear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 383: g. Gärtnerear.
Synon. Cyathospermum Wall.

Gardnerieae Endl. 1838. Gen. p. 575; 1841. Ench. p. 288: trib. Strychnear. Gen. unicum: Gardneria. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167). Gen. id. — DC. 1845. Pr. IX. p. 19. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 135: sect. Strychnear. Gen. id.

Gardoquia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 86. t. 17 (Fl. peruv. IV. ined. t. 493—495): nov. g. Didynam. Gymnosperm.
Pers. 1807. Ench. II. p. 121. n. 1385: g. Labiatar. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 311. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 154. — Kunth 1823. Syn. II. p. 87. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 699. n. 2059; 1831. Gen. II. p. 466. n. 2292.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 440: g. Melissear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 106. n. 4127. — Meisn. 1840. Gen. p. 285 (193). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 235.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2824: g. Salviear.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear.
Benth. 1834. Labiat. p. 397: g. Melissinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 784. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 418. — Brongn. 1843. En. genr. p. 67. — Walp. 1845. Rep. III. p. 735. 983.
Endl. 1838. Gen. n. 3618. p. 619; 1841. Ench. p. 307: g. Melissinar.
Synon. Rizoa Cavan.

Gareilassa Walp. Rep. II. p. 601: sphalm. pro *Garcilassa.*

Garhadiolus Jaub. & Spach 1849. Ill. pl. or. III. p. 119. t. 284: nov. g. a Rhagadiolo sejunctum. *Cf.* Flora 1852. p. 715.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 952: g. Lampsanear.

Garidelia Spreng., Dietr. vid. *Garidella Tourn.*

Garidella**) Tourn. 1700. Inst. p. 655. t. 430. Append.
Linn. 1737. Gen. p. 132. n. 369; 1737. Cliff. p. 170; 1740. Syst. p. 23; 1748. Ups. p. 108; 1753. Sp. I. p. 425; 1759. Syst. ed. X. p. 1034. n. 507; 1762. Sp. ed. II. p. 608; 1764. Gen. ed. VI. p. 227. n. 571; 1767. Syst. ed. XII. p. 313. n. 566: g. Decandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 355; 1784. Syst. p. 426. — Reich. 1778. Gen. p. 232. n. 620. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 306. n. 778. — Gmel. 1791. Syst. p. 722. — Pers. 1797. Syst. p. 456; 1805. Ench. I. p. 505. n. 1124. — Willd. 1799. Sp. II. p. 731. n. 901; 1809. En. p. 482.

*) Dicat. Don Didaco de Gardoqui, Hispano.
**) Dicta in honorem Petri Garidelli.

Garidella Tourn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 100. n. 415: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 93.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Multisiliquar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 376.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Ranunculor.
Adans. 1763. Fam. II. p. 450: g. Cistor.
Scop. 1777. Intr. p. 260: g. Polycarpiar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 235; 1789. Phil. Bot. I. p. 81.
Juss. 1789. Gen. p. 233: g. Ranunculacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 61. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 158. — Link 1821. En. I. p. 423.
Neck. 1790. El. II. p. 298. n. 1070: g. Synathrophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 46: g. Multisiliquosar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 490: g. Ranunculear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 331. n. 1305. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 735 *(Garidelia)*; 1825. Syst. II. p. 416. n. 1717; 1830. Gen. I. p. 380. n. 1913 *(Garidelia)*.
DC. 1818. Syst. I. p. 325; 1824. Pr. I. p. 48: g. Helleborear. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 22. — Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4951. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 254. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 47. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4). — Endl. 1839. Gen. n. 4793. p. 849; 1841. Ench. p. 435. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 54. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 97. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 42.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX; 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7246: g. Nigellear.
Link 1831. Hdb. II. p. 385: g. Aconitear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 300: g. Nigellinear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 214. 292 *(Garidelia)*: g. Polyandr. Pentagyn.
Walp. 1843. Rep. II. p. 742: sect. Nigellae. (praeced. Spenn. 1829. Mon. gen. Nigellae.)
Synon. Nigellastrum Magnol.

Garnotia*) Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 132. t. 21: nov. g. Graminear., Paspalo aff. (G. stricta.) *Cf.* Schlechtend. 1854. Bot. Zeit. p. 270.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160: g. Panicear. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 417.

Garosmos Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 211: nov. g. plantar. (Tetrandr.) = . . .?

Garovaglia Nonnullor. vid. *Carovaglia Endl.*

Garovaglia Trevisan (1853. Caratt. d. tr. gen. Collem.?)
Polychidia Achar.

Garrya Dougl. 1834 in Lindl. Bot. Regist. XX. (n. ser. VII.) t. 1686: nov. g. Garryacear. (G. elliptica.) *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 57 et Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 159. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1900. p. 288; 1841. Ench. p. 175; 1842. Spl. II. p. 30. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 143. — Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 114. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 295. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 29.
Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2515: g. Garryear.

Garryaceae Lindl. 1834. Bot. Regist. XX. t. 1686; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 173: nova fam. Cupuliferis aff. easque cum Coniferis connectens, per Chlorantheas in Gnetaceas transiens. Gen.: Garrya. *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 55, Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 159 et A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 29.
Mart. 1835. Consp. p. 17: ordo 100.
Endl. 1837. Gen. p. 288; 1841. Ench. p. 174: fam. Juliflorar., Antidesmeis aff. Gen.: Garrya. Accedunt 1847 (Spl. IV. p. 38) Fadyenia, Simmondsia.
Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257): ordo Juliflorar. Gen.: Garrya.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 114: fam. Umbellinear.? Gen. id.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 295: ordo Garryalium. Gen.: Garrya; Fadgenia.

Garryales Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 294: nixus Exogenar. diclinar. Ordines: Garryaceae, Helwingiaceae.

Garryeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 67: subdiv. Urticear. Gen.: Garrya.

Garuga*) Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 5. t. 208; 1832. Fl. Ind. II. p. 400: nov. g. Decandr. Monogyn. (G. pinnata.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 652; 1825. Syst. II. p. 313. n. 1561: g. Terebinthacear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1165. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1372. 1408.
Link 1821. En. I. p. 398: g. Aurantior.
DC. 1825. Pr. II. p. 80: g. Burseracear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 245. — Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56). — Endl. 1840. Gen. n. 5938. p. 1137; 1841. Ench. p. 602. — B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 29. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 15. p. 227.
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3848; 1841. Nom. p. 145. n. 5645: g. Bursercar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 394. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 175. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 85.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 343. n. 1735: g. Terebinthear.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 86: g. Burseriacear.
Hamilt. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 190.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 460: g. Burseridar.
Synon. Kunthia Dennst.

Garuleum Cassini 1819. Bull. soc. philom. Nov. p. 172; 1820. Dict. v. 18. p. 162: nov. g. Calendulear. (Osteospermum caeruleum Jacq.) — Par Spach 1841. Vég. phan. X. p. 15.

*) Dicat. Garnot, medico itineris.

*) *Garuga* s. *Garoogoo* nomen vernaculum.

Garuleum Cassini cont.
Cass. 1824. Dict. v. 30. p. 324; 1830. v. 60. p. 574: g. Osteospermear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2734.
Bartl. 1830. Ord. p. 143 (*Garulium*): g. Calendulacear.
Less. 1832. Syn. p. 19: g. Asterear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 45.
DC. 1836. Pr. V. p. 309: g. Bellidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2354. p. 381; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 187 (126). — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3247. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951 (*Garaleum*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.

Garulium Bartl. vid. *praeced.*

Garumbium Reinwardt 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Monoec.

Gasoul Adans. 1763. Fam. II. p. 243: g. Portulacar.
= Mesembryanthemum Linn.

Gasparinia*) Endl. 1841. Gen. Suppl. I. p. 1408. n. 4150; 1841. Ench. p. 349. n. 4151; 1842. Suppl. II. p. 64: g. Eucyrtandrear. (*Centronia Blume.*) *Cf.* Flora 1847. II. p. 599.
= Centronota DC.

Gasparrinia Bertol. 1839. Fl. Ital. III. p. 614: nov. g. Umbelliferar. (Sium virescens Spreng.)
Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5393: g. Amminear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 361: sect. Silai.
= Silai Bess. pars.

Gassicourtia Rchb. vid. *seq.*

Gassicurtia Fée 1837. Linnaea XI. p. 596; 1837. Crypt. écorc. (*cf.* Linnaea 1838. Litt. p. 240): nov. g. Variolariear.
Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 404 (*Gassicourtia*): g. Nidulariaceor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349: g. Parmeliear.

Gassoloma Dietr. vid. *Geissoloma Lindl.*

Gasteranthus**) Benth. 1846. Pl. Hartweg. II. p. 233: nov. g. Gesneriacear. (G. quitensis.)
Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 360: g. Besleriear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 403.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 209: g. Hypocyrtear.

Gasteria Duval . . . . Pl. succ. hort. Alenç. p. 6.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 85 (ed. Schrank 1819. p. 93); 1819. Suppl. p. 48; 1821. Revis. p. 46: g. Hexandr. Monogyn.
Link 1821. En. I. p. 337: sect. Aloës. — Par. Salm-D. 1834. Hort. Dyck. p. 17. 311. — Endl. 1837. Gen. n. 1115 c. p. 143; 1841. Ench. p. 83. — Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1842. 3. — Meisn. 1842. Gen. p. 398. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 534. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 357.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1409: g. Yuccear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 50.
Link 1829. Hdb. I. p. 190: g. Aloinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Hyacinthear.

Gasterocarpeae „Grev." Montagne 1840 in Webb & Berth. Phyt. Canar. IV. p. 162: trib. Phycear. Gen.: Halymenia, Ginnania, Dumontia.
Dcne 1841. Arch. Mus. II. p. 182; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 361 (Flora 1843. p. 99): ordo Choristosporear. Gen.: Delesseria, Martensia, Nitophyllum, Rhodhymenia, Acropeltis, Halymenia, Nemastoma, Hymenena, Iridea; Endocladia?
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 66. 95: subtrib. Cryptonemear. Gen.: Dumontia, Halymenia, Kallymenia. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 39. Gen. ead. et Ginannia. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54. Gen.: Ginannia, Callymenia, Halymenia, Constantinea, Dumontia, Hymenena.

Gasterocarpidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 25: trib. Cryptonemear. Gen. Gasterocarpear. Endl.

Gasteromici Achar. 1803. Meth. p. XXVII: fam. Cryptogamar.

Gasteromyceae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 564: fam. Fungor. Divis.: Spumarideae, Myriotheciadeae, Physarideae, Trichiadeae, Cribarideae, Stemonitideae, Craterideae, Onygenideae, Sphaerobolideae, Lycoperdeae, Tulostomideae, Polyangideae, Cyathideae.

Gasteromycetes Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLVIII; 1823. Syst. II. p. 275: class. Fungor. Ordines 1821: Perisporia, Mucoroidei, Uterini veri, Angiogastres. Ord. 1823: Angiogastres, Pyrenomycetes, Trichospermi, Trichodermaceae, Perisporia.
Agdh. 1821. Aphor. p. 85; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: ordo Fungor. Gen.: Perisporium, Eurotium, Amphisporium, Myrothecium, Trichoderma, Dichosporium, Licea, Dermodium, Pitocarpium, Aethalium, Lycogala, Spumaria, Craterium, Diachea, Stemonitis, Cribraria, Dictydium, Arcyria, Trichia, Physarum, Cionium, Diderma, Didymium, Leocarpus, Leangium, Asterophora, Onygena, Tulostoma, Lycoperdon, Geastrum, Scleroderma, Erysibe, Polysaccum, Sphaerobolus, Polyangium, Cyathus; Rhizoctonia, Sclerotium, Tuber.
Link 1824. Spec. I. p. IV: ordo Cryptophytor.
Fries 1825. Pl. homon. p. 125: cohors Sporomycetum. Ordines: Angiogastres, Trichospermi, Trichodermacei, Sclerotiacei.
Rchb. 1828. Consp. p. 1. 8; 1832. Fl. exc. p. L: formatio Dermatomycetum. Fam.: Sclerotiacei, Lycoperdacei, Sphaeriacei.
Bartl. 1830. Ord. p. 6: ordo Fungor. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 22; 1841. Ench. p. 16. Subord.: Perisporiacei, Sclerotiacei, Trichodermacei, Trichospermei, Angio-

---

*) Dicat. Guil. Gasparini, directori horti botan. Panorm.
**) γαστήρ, venter.

Gasteromycetes Fries cont.
gastres. — Brongn. 1843. Én. genr. p. XII. 2. Fam.: Tuberaceae, Lycoperdaceae, Clathraceae. — Bonord. 1851. Hdb. p. 230. Subord.: Angiogastres, Trichogastres.
Fries 1836. Epicr. p. 1: fam. quarta Fungor. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 84. Gen.: Phallus, Rhizopogon, Geaster, Lycoperdon, Polysaccum, Stemonitis. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 429. Ordines: Phallodei, Tuberacei, Nidulariacei, Lycoperdacei, Trichodermacei, Myxogastres.
Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 243: class. III. Fungor. Ordines: Trichogasteres, Myxogasteres.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: ordo Fungalium. (*Synon. Lycoperdaceae.*) Subord.: Podaxinei, Hypogaei, Phalloidei, Trichogastres, Myxogastres, Nidulariacei.
Math. 1853. Belg. II. p. 379: fam. 6 Acotyledonear. Trib.: Lycoperdeae, Fuligineae, Angiogastres.
Bail 1858. Syst. p. 41: ordo Thecasporear. Fam.: Tuberacei, Elaphomycei.

Gasteromyci Willd. 1802. Bem. üb. Farrenkr. p ....: ordo 8 Cryptogamar. Gen.: Geastrum, Lycoperdon, Aecidium, etc.
Willd. 1804 in Rebent. Neom. p. XII: ordo 12 Cryptogamiae. (*Sarcocarpi*, *Dermatocarpi*, *Gymnospermi* et *Sarcospermi Pers.*)
Rebent. 1804. Neom. p. 322: class. VII. Cryptogamiae. Divis.: Sclerocarpi, Dermatocarpi, Sarcocarpi.
Willd. 1805 in Web. & Mohr Beitr. I. p. 132. Gen.: Ustilago.
Willd. .... Grundr. Ed. Link (1831) p. 236: ordo 14 Cryptogamiae.
Nees 1817. Syst. Ueberbl. p. 25: regnum III. Vegetabilium mycetoideor. Circuli: Aërogastres, Geogastri.
Wahlenb. 1826. Suec II. p. 919: div. Fungor. Subdivis.: Angiogastres, Sclerogastres, Trichogastres.

Gasteromyci diffluentes et *efflorescentes* Nees Syst. Ueberbl. p. 26. 27: vid. *Aërogasteres Nees.*

Gasteropsorae Rchb. 1828. Consp. p. 20; 1832. Fl. exc. p. L: formatio Ascopsorar. Fam.: Porineae, Trypetheliaceae, Endocarpicae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 131: subordo Dermatopsorar. Fam.: Gasterothalami, Graphithalami, Gyrothalami.
Rchb. 1841. Nom. p. 15: subordo Thallopsorar. Fam.: Gasterothalamae, Graphithalamae, Gyrothalamae.

Gasterosporae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 522): ordo Homorganor. rhizosporor. Fam.: Sarcosporae, Phalloideae, Trichiaceae, Trichodermaceae, Lycoperdaceae, Uredineae.

Gasterothalamae Wahlenb. 1826. Fl. suec. II. p. 795: div. Algar. terrestrium. Gen.: Verrucaria, Endocarpon, Sphaerophoron.
Rchb. 1841. Nom. p. 15: fam. Gasteropsorar. Divis.: Verrucarieae, Trypetheliaceae, Endocarpeae.

Gasterothalameae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: div. Lichenalium. Trib.: Verrucaridae, Trypethelidae, Endocarpidae, Sphaerophoridae.

Gasterothalami Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 323: ordo 3 Lichenum. Series.: Verrucariae, Lecideae.
Fries 1825. Pl. homon. p. 258: ordo 2 Lichenum. Trib.: Sphaerophoreae, Endocarpeae, Trypetheliaceae, Verrucarinae. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 13; 1841. Ench. p. 10. Trib. eaed. (Verrucarieae loco Verrucarinar.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 133: fam. Gasteropsorar. (= *Gasteropsorae Rchb.* 1828.)

Gasterotrichi Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLVII: sect. Byssaceor. Gen.: Clisosporium, Antennaria, Epichysium.

Gastonia*) Comm. 1786 in Lam. Enc. méth. Bot. II. p. 610: nov. g. Araliae aff. *Cf.* Röper 1848. Bot. Zeit. p. 226.
Juss. 1789. Gen. p. 217: g. Araliar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 43.
Gmel. 1791. Syst. p. 769: g. Dodecandr. Dodecagyn.
St. Hil. 1805. Expos I. p. 462: g. Araliacear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 170. — DC. 1830. Pr. IV. p. 256. — Bartl. 1830. Ord. p. 238. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 388. — Rchb. 1837. Hdb. p. 221. — Meisn. 1838. Gen. p. 152 (109). — Endl. 1839. Gen. n. 4555. p. 794; 1841. Ench. p. 393. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 113. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 114. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781. — Röper 1848. Bot. Zeit. p. 225. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 83.
Pers. 1807. Ench. II. p. 20. n. 1196: g. Dodecandr. Pentagyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 628; 1825. Syst. II. p. 440. n. 1743; 1830. Gen. I. p. 386. n. 1943: g. Araliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5545.
Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3794: g. Hederacear.
Roxb. 1832. Ind. II. p. 407: g. Decandr. Monogyn.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1627: g. Decandr. Decagyn.

Gastridiopsis Massalongo 1851. Piant. foss. Vicent. (Flora 1852. p. 732): nov. g. Algar. foss.
Halymenites Sternb.

Gastridium Palis. 1812. Agrost. p. 21: nov. g. Graminear. (Milium lendigerum L.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 16. 342. n. 228. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 171; 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 397. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 250. n. 257. — Link 1829. Hdb. I. p. 29.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72; 1830. Gram. p. 71; 1833. Agrost. p. 230: g. Agrostidear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 151. — Link 1827. Hort. I. p. 76. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Bartl. 1830. Ord. p. 28. — Rchb. 1830.

*) Dicat. principi Gaston, fratri Ludovici XIII.

Gastridium Palis. cont.
Fl. exc. p. 24. — Koch 1837. Syn. p. 786. Ed. II. p. 907. — Endl. 1837. Gen. n. 811. p. 89; 1841. Ench. p. 58. — Meisn. 1843. Gen. p. 419 (321). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 8. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 61; 1850 in Webb Canar. III. p. 389. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 488.
Trin. 1820. Fund. p. 105: g. Triandr. Digyn. — Par. Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 502.
Link 1821. En. I. p. 72: g. Graminum. — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 67. 176. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 57. n. 278.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 674): g. Agrostideor.
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 901: g. Cinnear.
Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 27: g. Phleinear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 134. 320: g. Agrostoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1178: g. Agrostear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 185.
Trin. 1841. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 248: g. Agrosteor.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 459: g. Avenear.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 439: g. Stipacear.

Gastridium*) Lyngbye 1819. Tent. hydroph. dan. p. 68: nov. g. Soleniator. (Ulva filiformis Huds.) *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 18. p. 172.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 379: sect. Gastridii.
= Valonia Agdh.

Gastridium Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 378: g. Floridear. ampliat. Sect.: Laurentia, Gastridium, Lomentaria, Plocamium, Rytiphlaea, Ptilota.

Gastridium Blume 1825. Bijdr. Nr. 7. p. 333 (err. *Grastidium*, correct. ibid. Nr. 8. p. 433); 1828. Fl. jav. Praef. p. VII: nov. g. Orchidear., Desmotricho proximum.
= Dendrobium Swartz.

Gastridium Greville 1830. Alg. Brit. p. 114.
= Lomentaria Lyngb.

Gastrocarpeae Harvey 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 397; 1841. Man. brit. Alg. p. 5. 51: trib. Rhodospermear. Gen.: Iridaea, Halymenia, Dumontia et 1841 Catenella.
Menegh. 1838. Cenni p. 36: fam. Algar. Gen.: Iridea, Halymenia, Dumontia, Catenella.
J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 19: div. Floridear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 160: trib. Cryptonemear. Gen.: Cryptonemia, Chylocladia, Chrysymenia, Halymenia, Halosaccion.
Conf. Gasterocarpeae Grev., Mont.

*) γαστρίδιον, ventriculus.

Gastrocarpha D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 231: nov. g. Polyachyrear. (Moscharia pinnatifida Rz. & P.?) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 174.
= Moscharia Ruiz & Pav.

Gastrochilus*) D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 32: nov. g. Orchidear. (Epidendrum calceolare Ham.)
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530): g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1502.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
= Saccolabium Lindl.

Gastrochilus Wallich 1829. Pl. As. rar. I. p. 22: nov. g. Scitaminear. *Cf.* Flora Lit. I. p. 193.
Endl. 1837. Gen. n. 1634. p. 224; 1841. Ench. p. 119: g. Alpiniar.
Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341: g. Kämpferiear.
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: g. Alpiniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2223. — Meisn. 1842. Gen. p. 389 (291).
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 154: g. Amomear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear.

Gastroclonium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phycol. gener. p. 441; 1849. Sp. Alg. p. 865. n. 568: g. Champiear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 154: g. Chondriear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 107: g. Lomentariear.
Synon. Physidrum Rafin.?

Gastrocotyle Bunge 1849 Del. sem. Dorpat.; 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 363: nov. g. Anchusear. (Anchusa hispida Forsk.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 128.
Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 229; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 405: sect. Anchusae.

Gastrodia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 330. Ed. Nees p. 186: nov. g. Orchidear. *Cf.* Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 175. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 696. n. 2936; 1831. Gen. II. p. 654. n. 3296. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 251.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 11 (Linnaea II. p. 529); 1840. Orchid. p. 384: g. Gastrodiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1455. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56 (*Gastrodium*). — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. p. 212. n. 1544. — Meisn. 1842. Gen. p. 382 (286). — Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 173. Sect.: verae, Epiphanes.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 126: g. Ceropagar.
Endl. 1841. Ench. n. 1544. p. 113; 1842. Spl. II. p. 18: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1898.

*) γαστήρ, venter; χεῖλος, labium: id est labium ventricosum.

Gastrodia R. Brown cont.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181: g. Arethusear. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 716. Sect.: Eugastrodia, Epiphanes.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Gastrodidar.
Synon. Epiphanes Blume.

Gastrodidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Arethusear. Gen.: Gastrodia, Ceratopsis, Gamoplexis, Epipogium. *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172.

Gastrodieae Lindl. 1826. Orch. scel. p. 11 (Linnaea II. p. 529): trib. Orchidear. Gen.: Gastrodia, Epipogium, Prescotia, Hysteria?, Epistephium, Vanilla. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. Gen.: Gastrodium, Epipogium, Prescotia, Vanilla.
Dumort. 1827. Fl. Belg. p. 133; 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 5: trib. Elatorchidear., exclusis Vanilla et Epistephio restricta.
Rchb. 1828. Consp. p. 68: div. Orchidear. Gen. ut Lindl. 1826. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 57. Gen.: Gastrodia, Epipogium, Epistephium.
Endl. 1837. Gen. p. 212: subordo Orchidear. (serius Ophrydeis insertus.) Gen.: Gastrodia, Epipogium; Hysteria.
Lindl. 1840. Orchid. p. 383: div. Arethusear. Gen.: Epipogium, Ceratopsis, Gamoplexis, Gastrodia.
Meisn. 1842. Gen. p. 382 (286): subtrib. Arethusear. Gen. ut Lindl. 1840.
Klotzsch .... in Hayne Arzneigew. XXIV: div. Opercularicar. Gen.: Epipogum.

Gastrodium Dumort. vid. *Gastrodia R. Brown.*

Gastroglottis Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 397: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1830. Orchid. p. 14: g. Pleurothallear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1328. p. 188; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1915. — Meisn. 1842. Gen. p. 368 (276). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 175.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Liparidar. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 626.

Gastrolepis Schultz Bip. 1847 in Walp. Repert. VI. p. 195: sect. Gastrostyli. Subsect.: Eugastrolepis, Pentzioides.

Gastrolobium R. Brown 1811. Hort. kew. ed. sec. III. p. 16 (Verm. bot. Schr. II. p. 468): nov. g. Leguminosar. (G. bilobum.) — Par. Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 176. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 350. n. 1651; 1830. Gen. I. p. 366. n. 1849. (in Decandr. Monogyn.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1506.
Bronn. 1822. Diss. p. 131: g. Sophorear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 100. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4063. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 121. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 178. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (58).
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 35; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 80: g. Pultenaear.

Gastrolobium R. Brown cont.
— Par. Endl. 1840. Gen. n. 6443. p. 1258; 1841. Ench. p. 667. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 66. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 456.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5937: g. Pultenaeear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553: g. Pultenear.
B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 34: g. Podalyriear.

Gastrolychnis „Fenzl" Endl. 1840. Gen. n. 5250 *d.* p. 974; 1841. Ench. p. 506: sect. Lychnidis.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7830: g. Lychnidear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 293.
Synon. Wahlbergella Fries.

Gastromeria D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111: g. Gerardiear. non descriptum, a Benth. in Lindl. Intr. ed. II. p. 292 dubitanter ad calcem Antirrhinear. collocatum. *Cf.* Endl. Gen. p. 674. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 562.
D. Don .... in Sweet Fl. gard. II. n. 75 in adnot. (Lophospermum physaloidesDon.)
Meisn. 1840. Comm. p. 215: g. Scrophularinar. minus notum.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267: g. Antirrhinear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 60. n. 3896/1. — Walp. 1845. Rep. III. p. 452.
= Melasma Berg. (Benth. in DC. Pr. X. p. 337.)

Gastromycetes Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 368: ordo 12 Cryptogamiae. Sect.: Aërogasteres, Geogasteres.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: fam. Mycetum. Divis.: Dimidiati, Nemasporei, Sporigastrei, Stilbacei, Lycoperdei, Cyathoidei, Carpobolei, Tuberacei; Asterophora.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 378: ordo Mycetum. Tribus: Geogasteres, Dermatogasteres, Trichogasteres, Aërogasteres, Sarcogasteres, *Gastrom. obscuri desciscentes* (gen.: Corynelia, Asterosporium, Septaria, Cirrolus, Nemaspora, Actinothyrium, Leptostroma, Xyloma), Mucores. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 770. Divis.: Geogasteres, Dermatogasteres, Trichogasteres, Atrichi, Aërogasteres, Cytisporeae, Sclerotieae, Mucores, Rhizomorpheae.

Gastromyci Spreng. 1806. Flor. hal.: ordo 9 Ateliae. (Römer Coll. bot. p. 278.)
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 22: ordo Anandrar. Gen.: Trichoderma, Myrothecium, Spumaria, Aethalium, Lignydium, Arongylium, Demordium, Licea, Lycogala, Leocarpus, Leangium, Didymium, Diderma, Physarum, Cionium, Trichia, Stemonitis, Arcyria, Dictydium, Cribraria, Craterium, Calicium, Onygena, Stilbum, Ascophora, Mucor, Eurotium, Thamnidium, Tulostoma, Lycoperdon, Scleroderma, Bovista, Geastrum?, Sphaerobolus, Pilobolus; Asterophorus; Tuber, Polyangium, Endogone, Pisocarpium, Nidularia; Tremella, Auricularia, Tubercularia, Aegerita, Sclo-

Gastromyci Spreng. cont.
rotium, Xyloma; Phallus, Clathrus. — Simil. Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 40. Nova gen.: Amphisporium, Pittocarpium, Strongylium (loco Arongylii), Dermodium (loco Demordii), Diploderma, Sterrebekia.
Nees 1816. Syst. p. 92: vid. *Gasteromyci.*
Spreng. 1817. Anl. II. I. p. 18: ordo 4 Fungor.

Gastronema Herbert 1821. Append. p. 30; 1825. Bot. Mag. App. p. IV; 1837. Amaryll. p. 70. 132: nov. g. Amaryllidear. (Cyrtanthiformium.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Bartl. 1830. Ord. p. 46.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1231: g. Cyrtanthear.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 899: sect. Cyrtanthi. — Par. Kunth 1850. Enum. V. p. 540.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Amaryllear. — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 9. 52.

Gastropappus Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 259; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 200: sect. Argyranthemi.

Gastrophycus Link 1833. Handb. III. p. 240.
Endl. 1836. Gen. n. 91*b*. p. 8; 1841. Ench. p. 6: sect. Chondriae.
= Laurencia Lamx.?

Gastropodium Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 181: g. Isochilidar. (Nomen.)

Gastropyrum Jaub. & Spach 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 356: subg. Aegilopis. (A. ventricosa Tausch.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 790.

Gastrorchis Blume 1856. Mus. bot. Lugd. II. p. 181: subg. Phaji.

Gastrostylum Schultz Bip. 1844. Tanac. p. 29; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 195: nov. g. Chrysanthemear. Sect.: Eugastrostylum, Gastrolepis.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 277: g. Pyrethrear.

Gattaria Caesalp. 1583. De plant. lib. 11 teste Linn. 1747. Class. plant. p. 24.
= Nepeta Linn.

Gattenhoffia*) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 39. n. 76: nov. g. Actinophytor, a Calendula L. sejunctum. *Cf.* Cassini 1820. Dict. v. 18. p. 183.
= Meteorina Cass.

Gattenhofia Medic. 1790. Act. Theod. Pal. Phys. VI. p. 418; 1791. Phil. Bot. II. p. 95: nov. g. ab Iride separatum.

Gatyona Cassini 1816. Bull. soc. philom. Nov. p. 168; 1820. Dict. v. 18. p. 184: nov. g. Lactucear. (Crepis Dioscoridis L.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 146. — Less. 1832. Syn. p. 138. — Endl. 1838. Gen. n. 3015. p. 500; 1841. Ench. p. 250. — Walp. 1843. Rep. II. p. 695. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715 (*Catyona*).
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 62; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: g. Crepidear.

*) Dicat. G. M. Gattenhoff, scriptori de plant. Heidelberg.

Gatyona Cassini cont.
(verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2141; 1831. Fl. exc. p. 254. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 178: sect. Endopterae.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3726: g. Picridiear.
Synon. Sphaerotheca Tausch.

Gaudichaudeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 390: trib. Malpighiacear. Gen. Meiostemonum Endl. 1842 (exclusa Dinemandra).

Gaudichaudia*) HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 156: nov. g. Malpighiacear. (G. cynanchoides.) — Par. St. Hil. 1823. Bull. soc. philom. p. 132. — Kunth 1824. Syn. III. p. 179. — Bartl. 1830. Ord. p. 359. — A. Juss. 1833 in St. Hil. Fl. Bras. III. p. 64. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 124.
St. Hil. 1823. Mém. Mus. X. p. 162. 365 (*Gaudichautia*): g. Malpighiear. (Char. reform.) — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 781. n. 860; 1830. Gen. I. p. 180. n. 908. (Pentandr. Monogyn.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 805.
DC. 1824. Pr. I. p. 584: g. Hiptagear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII; 1837. Hdb. p. 299. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 640. — Meisn. 1837. Gen. p. 54 (39).
Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5375: g. Banisteriear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48 (*Gandichaudia*): g. Hyptagear.
A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 251; 1843. Arch. Mus. III. p. 589. t. 21: g. Gaudichaudiear. Sect.: Tritomopterys, Gaudichaudia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7842. Sect. eaed. — Endl. 1842. Spl. II. p. 83. — Walp. 1846. Rep. V. p. 344. Sect. eaed.
Endl. 1840. Gen. n. 5564. p. 1058; 1841. Ench. p. 557: g. Meiostemonum. Sect. ut A. Juss.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Gaudichaudear.

Gaudichaudieae A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 249: trib. Malpighiacear. Gen.: Fimbriaria, Janusia, Gaudichaudia, Aspicarpa, Camarea, Dinemandra. — Par. A. Juss. 1843. Arch. Mus. III. p. 588; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 611. Gen.: Gaudichaudia, Aspicarpa, Camarea, Janusia, Schwannia. — Walp. 1846. Rep. V. p. 344. Gen. ead. — Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 101. Gen. bras.: Schwannia, Janusia, Camarea.
Rchb. 1841. Nom. p. 206: subdiv. Malpighiear. Gen. ut Juss. 1840 (Schwannia loco Fimbriariae) et Racamea.
Synon. Meiostemones A. Juss.

Gaudichautia A. St. Hil. vid. *Gaudichaudia HBK.*

*) Dicat. Ch. Gaudichaud, botanico itineris Freycinetiani.

Gaudinia*) Palis. 1812. Agrost. p. 95: nov. g. Graminear. (Avena fragilis L.) *Cf.* Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 186. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 41. 694. n. 336. — Link 1829. Hdb. I. p. 18.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Avenacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 445. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 37. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1214. Sect.: Gaudinia, Arthrostachya. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 393. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 411.
Link 1821. En. I. p. 96: g. Graminum. — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 71. n. 349. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 71. n. 345.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 573: g. Triandr. Digyn.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 172: sect. Avenae. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 234.
Link 1827. Hort. I. p. 43: g. Triticear. — Par. Rchb. 1830. Fl. exc. p. 19. — Math. 1853. Belg. I. p. 637. (verar.) — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 615.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 850: g. Secalinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 823. Ed. II. p. 950.
Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838) p. 19: g. Avenaceor.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 455: g. Avenear.
Synon. Avenae spec. Endl., etc.

Gaudinia Gay 1829 in Fér. Bull. sc. nat. XVIII. p. 412: nov. g. Phytolaccear. (G. diffusa et viscosa.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 206.
= Limeum Linn.

Gauja Rchb. vid. *Ganja Rumph.*

Gaulteria Adans. 1763. Fam. II. p. 165: g. Vaccinior.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337.
= seq.

Gaultheria**) „Kalm" Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 14; 1753. Sp. I. p. 359; 1759. Syst. ed. X. p. 1024. n. 487; 1762. Sp. ed. II. p. 565; 1764. Gen. ed. VI. p. 220. n. 551; 1767. Syst. ed. XII. p. 300. n. 542: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 339; 1784. Syst. p. 407. — Reich. 1778. Gen. p. 224. n. 595. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 295. n. 749. — Pers. 1797. Syst. p. 436. — Willd. 1799. Sp. II. p. 616. n. 870; 1809. En. p. 454. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 262.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 306. t. 63. f. 8 (procumbens).
Juss. 1789. Gen. p. 161: g. Ericar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 361. — Hedw. 1806. Gen. p. 320. n. 1264.
Neck. 1790. El. I. p. 221. n. 365: g. Dicroophytor.

*) Dicat. J. Fr. G. Gaudin, botanico helvetico.
**) Dicat. Gaulthier, medico et botanico Quebeck.

Gaultheria Kalm cont.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 463: g. Bicornium.
Batsch 1802. Tab. p. 218: g. Ericariar.
Pers. 1805. Ench. I. p. 482. n. 1090: g. Ericoidear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 516; 1825. Syst. II. p. 287. n. 1544: g. Ericear. — Par. Kunth 1822. Syn. II. p. 328. — D. Don 1825. Nepal. p. 150. (verar.) — Blume 1825. Bijdr. Nr. 15. p. 856. — Rchb. 1828. Consp. p. 129. n. 3390. — Bartl. 1830. Ord. p. 155. — Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 35. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1371. 1396. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 71. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 160.
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 186: g. Ericinear.
Link 1821. En. I. p. 395: g. Ericinar.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 839: g. Andromedear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 206 (*Gaulthiera*); 1841. Nom. p. 127. n. 4912. — Meisn. 1839. Gen. p. 247 (154). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 489 (*Gaulthiera*). — Endl. 1841. Ench. p. 370. n. 4323. Sect: Chiogenes, Amphicalyx?, Shallonium. — Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 17 (*Gaulthieria*). — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1055.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Andromedidar.
Synon. Gaulteria Adans.; Gualtieria Hill; Gualteria Scop.; Gualthiera Gmel.; Gualtheria Ell.; Gautiera Spreng.

Gaulthiera Rchb., Spach vid. *praeced.*

Gaulthieria Klotzsch vid. *praeced.*

Gaura*) Linn. 1751. Amoen. ac. IV. Ed. 1787. p. 26; 1753. Sp. I. p. 347; 1756. Vet. Ac. Handl. p. 222; 1759. Syst. ed. X. p. 999. n. 425; 1762. Sp. ed. II. p. 493; 1764. Gen. ed. VI. p. 187. n. 470; 1767. Syst. ed. XII. p. 264. n. 465: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 296; 1784. Syst. p. 358. — Reich. 1778. Gen. p. 190. n. 506. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 250. n. 638. — Lour. 1790. Coch. I. p. 225. — Gmel. 1791. Syst. p. 607. — Pers. 1797. Syst. p. 382. — Willd. 1799. Sp. II. p. 311. n. 731; 1809. En. p. 409. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 249.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Onagrar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 319. — Batsch 1802. Tab. p. 77. — Pers. 1805. Ench. I. p. 409. n. 920. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 702 (genuinar.); 1825. Syst. II. p. 234. n. 1472; 1830. Gen. I. p. 315. n. 1609. — Link 1821. En. I. p. 378. — Kunth 1824. Syn. III. p. 387. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1296.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Calycanthemar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 332.
Gled. 1764. Syst. p. 268. n. 1102: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 686.

*) γαῦρος, superbus.

Gaura Linn. cont.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172[5]: g. Tetrapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 105: g. Strictar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 304; 1789. Phil. Bot. I. p. 156.
Neck. 1790. El. II. p. 139. n. 825: g. Coryphophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 205. t. 127.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 314: g. Epilobianar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 153: g. Onagrariar. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 190.
Hedw. 1806. Gen. p. 265. n. 1069: g. Onagrear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 92. — DC. 1828. Pr. III. p. 44. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 683.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: g. Oenotherear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 319. — Brongn. 1843. En. genr. p. 117.
Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4501: g. Gaurear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. — Meisn. 1838. Gen. p. 121 (86). — Endl. 1840. Gen. n. 6131. p. 1195; 1841. Ench. p. 638. Sect.: Gauridium, Gaura, Schizocarya. — Walp. 1843. Rep. II. p. 96. Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725. — B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 35.

Gaura Lamarck Illustr. t. 281. f. 3. = Lechea Spach.

Gaura Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 381: g. Oenotherear. restrict. (G. biennis, angustifolia, coccinea.)
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 169. 281 (Nouv. Ann. Mus. IV. p. 375): g. Gaurinear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 516.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246: g. Onagrear.
Endl. 1840. Gen. n. 6131*b*. p. 1195; 1841. Ench. p. 638: sect. Gaurae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 96.
Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6584: g. Gaurear.

Gaurea Reich. vid. *Guarea Allem.*

Gaureae Rchb. 1828. Consp. p. 170: div. Onagrear. Gen.: Pleurostemon; Camissonia, Oenothera, Onosuris, Clarkia, Epilobium, Gaura; Foetidia?, Grias?, Careya?
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: trib. Onagracear. Gen.: Gaura. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725. Gen. id. et Stenosiphon.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 634: subdiv. Oenotherear. Gen.: Epilobium, Oenothera.
Meisn. 1838. Gen. p. 121 (86): subtrib. Epilobiacear. Gen.: Gongylocarpus, Gaura, Vanhallia?
Endl. 1840. Gen. p. 1195; 1841. Ench. p. 638: trib. Oenotherear. Gen.: Gaura, Stenosiphon; Gongylocarpus?
Rchb. 1841. Nom. p. 170: sect. Lopeziear. Gen. Gaurinear. Spach.
A. Rich. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 104: trib. Onagrariear. Gen. ut Lindl.

Gauridium Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 379: nov. g. Oenotherear. (Gaura mutabilis Cav. et mollis Kth.)
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 168: g. Gaurinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246: g. Onagrear.
Endl. 1840. Gen. n. 6131 *a*. p. 1195; 1841. Ench. p. 638: sect. Gaurae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 96.
Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6583: g. Gaurear.

Gaurineae Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 168: sect. Onagrear. Gen.: Gauridium, Gaura, Schizocarya, Stenosiphon.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 516: subtrib. Onagrear. Gen.: Gaura, Stenosiphon.

Gauropsis Presl 1850. Epimel. bot. p. 579: nov. g. a Gaura separatum. (G. lancifolia.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 862: g. Gaurear.

Gausapia*) Fries 1825. Pl. homon. p. 302: nov. g. Coenogonear. (Theleph. pedicellata Schwein.)
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 85: g. Coenogoneor.

Gauthiera Lév. vid. *Gautiera Vittad.*

Gautiera „Kalm emend." Spreng. 1830. Gen. I. p. 333. n. 1684: g. Ericear.
Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 25. t. 40. 41.
Endl. 1839. Gen. p. 757. n. 4323: g. Andromedear. Sect.: Chiogenes, Amphicalyx?, Shallonium. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. v. p. 392.
Sieb. & Zucc. 1846. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. IV. 3. p. 129: g. Ericacear.
Vid. Gaultheria Kalm.

Gautiera Vittadini 1831. Tuberac. p. 25: nov. g. Hymenogastereor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 354. p. 30; 1841. Ench. p. 17. — Bonord. 1851. Hdb. p. 243.
Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 341: g. Hymenogasterum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 28; 1842. Mycol. p. 114: g. Hymenangiacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 252: g. Hymenogasterear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42 (*Gautieria*): g. Hypogaeor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 435: g. Hymenogastreor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489 (*Gauthiera*): g. Hysterangieor.
Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 33: g. Splanchnomycetum.
Bail 1858. Syst. p. 9. t. 27 (*Gautieria*): g. Gautierieor.

Gautieria Lindl., Bail vid. *praeced.*

Gautieriei Bail 1858. Syst. Pilz. p. 9: div. Hymenogastreor. Gen. Gautieria.

Gavesia „Bertol. Misc. bot. VII" Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 950: g. Labiatiflorar. dubium. (G. alabamensis.)

Gavila Wittst. vid. *seq.*

---

*) γαύσαπος, pannus lanosus.

Gavilea Pöppig 1837. Nov. gen. II. p. 14. (Fragm. p. 18): sect. Asarcae. (*Gavillea Steud.* Nom. I. p. 666. — *Gavila Wittst.* Etym. Handw. p. 382.)
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182: g. Arethusear.
= Asarca Lindl. pt.
Gavillea Steud. Nom. vid. *praeced.*
Gavnia Scopoli vid. *Gahnia Forst.*
Gaya*) HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 266: nov. g. Malvacear. (Sida occidentalis L.?) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 244. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. I. p. 156.
A. Juss. 1825 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 191: g. Malvear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 346. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 343.
Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 5249; 1837. Hdb. p. 287; 1841. Nom. p. 200. n. 7634: g. Sidear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 27 (24). — Endl. 1840. Gen. n. 5290. p. 985; 1841. Ench. p. 512. — Walp. 1842. Rep. I. p. 321. — Brongn. 1843. En. genr. p. 77. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 558: sect. Sidae.
Synon. Abutiloides DC.
Gaya Spreng. 1825. Syst. I. p. 535. 971. n. 1152; 1830. Gen. I. p. 238. n. 1256: g. Lasiopetalear. (Seringia platyphylla Gay.) — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 590; II. p. 1037.
= Seringia Gay.
Gaya Gaudin 1826. Feuille du cant. de Vaud. Nr. 57. p. 128; 1828. Fl. Helv. II. p. 29. 389: nov. g. Umbellatar. (Laserpitium simplex L.) *Cf.* Linnaea II. p. 518.
DC. 1830. Pr. IV. p. 163: g. Seselinear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 320. — Koch 1836. Syn. p. 299. Ed. II. p. 323.
Schnizl. 1847. Fl. v. Bayern p. 116: g. Umbelliferar.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 699: g. Pachypleurear.
= Neogaya Meisn.
Gayacum Brongn. Énum. genr. p. 83: vid. *Guaiacum Plum.*
Gaylussacea Wittst. vid. *seq.*
Gaylussacia HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 275: nov. g. Ericear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 382 (*Gaylussacea*). — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 325. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 861. — Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 39. t. 126. 127. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1391.
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 199: g. Ericinear.
Cham. & Schltd. 1826. Linnaea I. p. 528; 1833. ibid. VIII. p. 490.
Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1976: g. Vaccinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 154: g. Vaccinieur. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 858. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 556. — Endl. 1839.

Gaylussacia HBK. cont.
Gen. n. 4329. p. 757; 1841. Ench. p. 370. — Meisn. 1839. Gen. p. 243 (152). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 522. — Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4928. (genuinar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 71. — Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 48. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1063.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: g. Gaylussaciear.
A. Gray 1846. Mem. Am. Ac. n. ser. III. t. 10.
Lind. 1847. Veg. kd. p. 758: g. Vacciniacear.
Synon. Lussacia Spreng.
Gaylussacieae Rchb. 1837. Handb. p. 206: subdiv. Vacciniear. Gen.: Gaylussacia.
Gayoides Endl. 1840. Gen. n. 5293*b*. p. 986; 1841. Ench. p. 512: sect. Bastardiae.
Synon. Bogenhardia Rchb.
Gayophyteae Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 338. 346: sect. Onagrear. Gen.: Gayophytum, Agassizia, Calylophus.
Gayophytineae Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 162: sect. Onagrear. Gen.: Gayophytum, Holostigma, Calylophis.
*Gayophytum**)* A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 18. t. 4: nov. g. Onagrariar.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 690: g. Onagrear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 120 (86).
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 346: g. Gayophytear.
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 162: g. Gayophytinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246: g. Camissoniear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 512: g. Oenotherear.
Endl. 1840. Gen. n. 6112. p. 1189; 1841. Ench. p. 637: g. Epilobiear. — Par. Walp. 1834. Rep. II. p. 76.
Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6560: g. Sphaerostigmear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Epilobear.
Gaytania Münter 1843. Bot. Zeit. I. p. 730: in not.
Walp. 1846. Rep. V. p. 900: g. Daucinear.
= Anisum Adans.
Gazamia Meisn. vid. *Gazania Gärtn.*
Gazania**) Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 451. t. 173: nov. g. Radiatar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 572; 1826. Syst. III. p. 606. n. 2834; 1831. Gen. II. p. 637. n. 3191.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 219: g. Petalostemonis.
R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 140 (Verm. bot. Schr. p. 446): g. Synantherear.
Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 35: g. Syngenes. Polygam. Frustran.
Cass. 1820. Dict. v. 18. p. 245; 1821. v. 19. p. 234; 1823. v. 29. p. 448; 1830. v. 60. p. 573: g. Gorteriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2677. — DC. 1837. Pr. VI. p. 508. Sect.: Melanchrysum, Lepto-

*) Dicat. Jac. Steph. Gay.

*) Dicat. peregrinatori Gay.
**) Dicat. Theod. de Gaza, ecclesiastico saeculi XV

Gazania Gärtn. cont.
morpha. — Endl. 1838. Gen. n. 2845. p. 466; 1841. Ench. p. 245. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139 sphalm. *Gazamia*). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. 102. — Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3646. Sect.: Gazania, Leptomorpha. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Link 1822. En. II. p. 354: g. Corymbiferar.
Link 1829. Hdb. I. p. 774: g. Coreopsidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Arctotidear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Less. 1832. Syn. p. 41. — Brongn. 1843. En. genr. p. 37.
Synon. Meridiana Hill; Möhnia Neck.; Mussinia Willd.

Geanthia*) Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 167: nov. g. Colchico simile.
= Weldenia Schult. f.?

Geanthus Reinwardt 1823. Catal. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 102: nov. g. Monandr.
Reinw. 1825. Syll. Ratisb. II. p. 5: g. Scitaminear.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 51: sect. Elettariae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1627 *b*. p. 223; 1841. Ench. p. 119. — Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2215. 2.

Geaster Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 220. t. 100: g. pl. class. XVII.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 13: g. pl. class. I.
Scop. 1772. Carn. II. p. 489: sect. Lycoperdi.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 8: g. Lycoperdeor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 336. p. 29; 1841. Ench. p. 17. Sect.: Myriostoma, Plecostoma, Geastrum, Odontostoma, Actinodermium. — Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 400. Sect. eaed. (Geaster, non Geastrum). — B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 46.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 770. n. 3945: g. Geogasterum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 399: g. Sphaerogasterum.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 85: g. Gasteromycetum. — Par. Fries 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 139.
L. R. & C. Tulasne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 135: g. Lycoperdinear.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 25. 64. t. 4. f. 42; 1842. Mycol. p. 104: g. Geastridear.
Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 243: g. Trichogasterum.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 301: g. Geastrideor. Sect. ut Endl. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 256.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Trichogastrum.

*) γῆ, terra.

Geaster Micheli cont.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 441: g. Diplodermeor. Sect.: Myriostoma, Plecostoma, Geastrum, Dontostoma, Schizostoma.
Lev. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505; ibid. VIII. p. 488: g. Geastreor.
Synon. Geastrum Pers.; Glycididerma Paulet?

Geastrei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505: trib. Lycoperdacear. Gen.: Geaster, Plecostoma, Myriostoma, Disciseda, Actinodermium?, Diploderma?
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: sect. Coniogastror. Gen. ead.

Geastrideae Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 25; 1842. Anl. Mycol. p. LXXX. 104: fam. Dermatogasterum. Gen.: Geaster, Plecostoma, Myriostoma.

Geastridei Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 301: div. Lycoperdeor. Gen.: Geaster.
Bonord. 1851. Hdb. p. 255: fam. Trichogastrum. Gen. Geastridear. Corda.

Geastroides Batt. 1759. Fung. t. 39. f. 1—4. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 18. p. 262.
= Plecostoma Desv.

Geastrum Pers. 1797. Tent. disp. p. 5. 53: g. Dermatocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. XIV. 131: g. Trichospermor. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 47.
GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 20. 256: g. Fungor. — Par. Leman 1820. Dict. v. 18. p. 262. Sect.: Geastrum, Plecostoma.
Willd. 1802. Bem. Farrenkr. p. . . .: g. Gasteromycor.
DC. 1805. Franç. II. p. 266: g. Angiocarpor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 32: g. Gastromycor.
Nees 1817. Ueberbl. p. 35: g. Dermatogasterum. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 387.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 15: g. Lycoperdor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 584: g. Lycoperdonidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Gasteromycetum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 79: g. Geoperdinear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 558: g. Lycoperdinear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 381.
Fries 1825. Pl. homon. p. 138: g. Lycoperdineor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 202. Sect. ut Leman et Myriostoma.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Lycoperdeor.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1024: g. Trichogastrum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 517. n. 3491: g. Geogasterum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Lycoperdear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
= Geaster Mich.

Geastrum Desvaux 1809. Journ. Bot. II. p. 101: g. Fungor., sejuncto Plecostomate restrict.
Leman 1820. Dict. v. 18. p. 262: sect. Geastri. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 202 *a*. — Endl. 1836. Gen. n. 336 *c*. p. 29; 1841. Ench. p. 17. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 302. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 441.

Geblera (prenanthoides) Besser in litt. 1831.
= Eucrepis DC.

Geblera*) Fisch. & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petrop. I. p. 28: nov. g. Euphorbiacear. primae sectionis. (G. suffruticosa.) *Cf.* Ann. sc. nat. 1836. 2e sér. V. p. 127 et Linnaea X. Litt. p. 89.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Phyllanthear.
Endl. 1840. Gen. n. 5865. p. 1122; 1841. Ench. p. 589: g. Buxear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 344 (255). — Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7433. (genuinar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 81. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 583.
Baill. 1858. Euphorb. p. 592: sect. Fluggeae.

Geeria*) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 241. n. 990: g. Eredophytor.
= Enourea Aubl.

Geeria Blume 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 111: nov. g. Dioec. Polyandr.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 3. p. 124: g. Ternströmiacear. *Cf.* Linnaea I. p. 660. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 41 (31). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 214. 293.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 202; 1830. Gen. I. p. 453. n. 2236: g. Ternströmiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5415; 1837. Hdb. p. 302.
Bartl. 1830. Ord. p. 336: g. Frezierear. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 60.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 566: g. Euryear.
= Eurya Thunb.

Geigera Lessing vid. *Geigeria Griess.*

Geigera Lindl. vid. *Geijera Schott.*

Geigeria*) Griesselich 1830. Linnaea V. p. 411: nov. g. Inulear. (G. africana.) — Par. Less. 1832. Syn. p. 199 (*Geigera*). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28. (verar.) — Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3403. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
DC. 1836. Pr. V. p. 482: g. Euinulear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2437. p. 395; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128).
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 953: g. Geigeriear.
Synon. Dizonium Willd.; Zeyheria Spreng.

Geigerieae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 953: div. Inulear. Gen.: Geigeria, Hochstetteria.

*) Dicat. Dr. Gebler.
**) Dicat. Batavo De Geer, collectori plantarum.
***) Dicat. Dr. Laur. Geiger, prof. Heidelberg.

Geijera*) Schott 1834. Rutac. p. 4. t. 7: nov. g. Diosmear. (G. salicifolia.) — Par. Meisn. 1837. p. 60 [*Geyera*] (44).
Endl. 1840. Gen. n. 6002. p. 1154; 1841. Ench. p. 612: g. Pilocarpear. non satis notum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7503. — Walp. 1842. Rep. I. p. 501. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471 (*Geigera*).

Geinitzia Endl. 1847. Syn. Conif. p. 280: g. Cupressinear. fossil. (Sedites Rabenhorstii Gein.)

Geiseleria**) Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 254; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 47: nov. g. Crotonear. (Croton glandulosum L.) *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 546. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 98. n. $5827/_2$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281 (*Geisseleria*).
Meisn. 1803. Comm. p. 369: g. Eucrotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 359: sect. Crotonis.

Geiseleria Kunth mss. (Abh. Berl. Ak. 1842. p. 3.)
= Anticlea Kunth.

Geisenia „Rafin." Endl. Gen. p. 848 in synon. Trollii: vid. *Gaissenia Rafin.*

Geisoloma Lindl. vid. *Geissoloma Lindl.*

Geisorrhiza Rchb. vid. *Geissorhiza Gawl.*

Geissaspis***) Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 217: nov. g. Euhedysarear., Zorniae aff. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). — Endl. 1841. Gen. n. 6597. p. 1282; 1841. Ench. p. 670. — Walp. 1842. Rep. I. p. 726. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 5979: g. Onobrychear.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 277: g. Hedysarear.

Geisseleria Lindl. vid. *Geiseleria Klotzsch.*

Geissodea Vent. 1799. Tabl. II. p. 33: nov. g. Algar., a Lichene sejunctum. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 18. p. 284. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 20.
Collema Hoffm. et Psorae Fr. sp.

Geissoideae D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. IX. p. 84: trib. Cunoniacear. Gen.: Geissois.
Meisn. 1838. Gen. p. 138 (101): trib. Saxifragacear. Gen. id.

Geissois Labill. 1825. Nov. Caledon. p. 50. t. 50.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 158; 1830. Gen. I. p. 369. n. 1868: g. Decandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1516.
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4109: g. Ceratoniear., et p. 205. n. 5339: g. Rhizobolear.?
D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. IX. p. 96: g. Geissoidear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 138 (101).
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 203: g. Symphyogynear.

*) Dicat. J. D. Geijer, auctori Dictamnographiae.
**) Dicat. Dr. E. F. Geiseler.
***) *γεῖσσον s. γεῖσον*, tectum prominens.

Geissois Labill. cont.
Endl. 1839. Gen. n. 4663. p. 819; 1841. Ench. p. 409: g. Cunoniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 159. n. 6212. — Walp. 1843. Rep. II. p. 375.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 572: g. Weinmannear.

Geissoloma „Lindl. mss." Kunth 1830. Linnaea V. p. 678: nov. g. Penaeacear. (Penaea marginata L.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2118. p. 335; 1847. Spl. IV. p. 74. (anomalar.) — Meisn. 1839. Gen. p. 329 (241). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 578 (*Geisoloma*). — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 323 (anomalum).
Spreng. 1831. Gen. II. p. 793. n. 4113: g. Octandr. Monogyn.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230 (*Gassoloma*). 1311: g. Octandr. Digyn.
Endl. 1841. Ench. p. 214. n. 2118: g. Geissolomear.
Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2426: g. Penaeear.
A. Juss. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 27: g. Penaeaceis aff.
A. DC. 1856. Pr. XIV. 1. p. 492: g. unicum Geissolomacear.

Geissolomaceae A. DC. 1856. Prodr. XIV. 1. p. 491: ordo (166) Monochlamydear. Gen.: Geissoloma.

Geissolomeae Endl. 1841. Ench. p. 214: fam. Thymelaear., Penaeaceis aff. Gen.: Geissoloma.

Geissomeria Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. t. 1045: nov. g. Acanthacear. (G. longiflora.)
Rchb. 1828. Consp. p. 212b. n. 3126b: g. Acanthear.
Endl. 1839. Gen. n. 4064. p. 702; 1841. Ench. p. 343: g. Barleriear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 295 (204). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 145. — Rchb. 1841. Nom. p. 109. n. 4261. — B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 49.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 593: g. Echmatacanthor.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 63: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Barleridar.
Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 79; 1847 in DC. Pr. XI. p. 286: g. Aphelandrear. Sect.: Brachystegiae, Platystegiae.

Geissopappus Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 44.
Meisn. 1843. Comm. p. 362: g. Euheleniear.
Synon. Schomburghia DC., Schomburgkia Meisn.; Trinchinettia Endl.

Geissorhiza Bell.-Gawl. 1805 in Konig Ann. of bot. I. p. 223: nov. g. Ensatar. (Ixia sublutea Lam.)
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 321 (*Gissorhiza*): g. Gladiolear. (Ixia secunda et ciliaris.)
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 281: g. Iridear. — Par. Ker 1827. Irid. p. 83. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Endl. 1837. Gen. n. 1246. p. 169; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 160 (*Geissorrhiza*).

Geissorhiza Bell.-Gawl. cont.
— Steud. 1840. Nom. I. p. 667 (*Geissorrhiza*). — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 23; 1849 in Orb. Dict. VI. p. 50.
Link 1821. En. I. p. 49: sect. Ixiae.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 148. n. 151; 1830. Gen. I. p. 37. n. 163: g. Spathacear.
Eckl. 1827. Verz. p. 20: g. Ixiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1203; 1841. Nom. p. 44. n. 1489 (*Geisorrhiza*): g. Ixiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 91.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Weihea Eckl.; Spatalanthus Sweet?

Geissorrhiza Dietr. vid. *praeced.*

Geissospermum Allem. 1846. Diss. (Bot. Zeit. 1854. p. 437): nov. g. Apocynear. (Tabernaemontana laevis Vell.)

Geissostegia Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 618: subsect. Ectasis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *a* 7. p. 1411; 1841. Ench. p. 370. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4887. 1 *g*.

Geitonoplesium*) A. Cunningh. . . . . Bot. Mag. t. 3131.
Endl. 1833. Norf. p. 29: g. Asphodelear.
Endl. 1837. Gen. n. 1163. p. 150; 1841. Ench. p. 84: g. Asparagear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 210. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1822: g. Dracaenear.
Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 35; 1850. Enum. V. p. 112: g. Eustrephear. (Nomen emendatum proponitur *Gitonoplesium*.)
Synon. Luzuriaga R. Brown.

Gela**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 232. Ed. Willd. p. 285: nov. g. Octandr. Monogyn., Ximeniae proximum ex Willdenowii adnotatione.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 582: g. Olacinear.
= Acronychia Forst.

Gelala Rumph. ex Rchb. Nomencl. p. 49.
= Corallodendron Tourn.

Gelasia Cassini 1818. Bull. soc. philom. Mars p. 33; 1820. Dict. v. 18. p. 285: nov. g. Lactucear. (Scorzonera villosa Scop.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 145.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 65; 1827. v. 48. p. 422. 435; 1830. v. 60. p. 569: g. Scorzonerear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2177. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 8.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 123: sect. Scorzonerae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3695. 2.
Synon. Galasia Less., Endl.

---

*) γείτων, vicinus; πλησίος, propinquus.
**) „γέλα, splendor solis: ex foliorum nitore."

Gelasine*) Herbert 1840. Bot. Mag. t. 3779: nov. g. Iridear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1563. (genuinar.)
Benth. 1840. Pl. Hartweg. p. 53: g. Iridacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 614.
= Trichonema Gawl.

Gelatina Rafin. 1809 in Desv. journ. bot. II. p. 177 (New-York med. repos. II. Hex. V. p. 350): nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 18. p. 288.
= Tremellae sect. Mesenterium.

Gelatinaria Roussel 1806. Fl. Calvad.
= Batrachospermum Roth. (Desv. Journ. bot. III. p. 143.)

Gelatinaria Flörke mss.
= Pyrenothea Fries. (*Cf.* Fries Lich. eur. p. 449.)

Gelatinia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71: ordo Soligraniae. Fam.: Glojotricheae, Glojothamneae.

Gelatinoso-Fungosae Wilbrand 1837. Handb. p. LVIII: class. I. Acotyledonum.

Geleznowia Turczan. 1849. Bull. soc. Mosc. XXII. 2. p. 12: nov. g. Diosmear., Chorilaenae aff. (G. verrucosa.) *Cf.* Flora 1850. p. 476. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 250.

Gelfuga**) Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 593: sect. Fluggeae. (*F. trichogynis.*)

Gelidiaceae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 112: ordo Desmiospermear. Subord.: Gelidieae, Solierieae, Hypneaceae.

Gelidieae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phycol. gener. p. 390. 405: fam. Periblastear. Gen.: Acrocarpus, Echinocaulon, Gelidium, Ctenodus. — Par. Kütz. (1845. Phyc. germ. p. 305) 1849. Sp. Alg. p. 761. Gen. ead. (Euctenodus) et Polycladia, Thysanocladia, Delisea, Chondrodon, Phacelocarpus.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106: subtrib. Gigartinear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 115: subordo Gelidiacear. Gen. amer.: Gelidium.

Gelidium***) Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 128: nov. g. Floridear. — Par. Leman 1820. Dict. v. 18. p. 303. — Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 362. — A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 330. — Menegh. 1838. Cenni p. 39. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 399; 1841. Brit. Alg. p. 80. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. 16. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 157. — Math. 1853. Belg. II. p. 483.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 40: g. Phycoidator.
Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 294: sect. Fuci.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 371: sect. Gigartinae.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 160: g. Halymeniar.

Gelidium Lamx. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 497 *b:* sect. Sphaerococci. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 94 *d.* p. 8; 1841. Ench. p. 6. (*Synon. Loncharion* et *Amphoriscus Targ.*)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Sphaerococcear.
Grev. 1830. Alg. brit. p. 139. (Synops. p. LVII.)
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 725: g. Plocamiear.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 101: g. Coccocarpear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 41. n. $123/_{46}$. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 174. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 150. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): g. Sphaerococcoidear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phyc. gener. p. 406; 1845. Phyc. germ. p. 306; 1849. Sp. Alg. p. 763. n. 511: g. Gelidiear. Sect. (1843): Cladothamnion, Gelinea, Heringia, Suhria, Pristidium. — Par. Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 115.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Coccocarpidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Delesseriear.
Harv. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 243: g. Gelidiacear.
Conf. Amphoriscus Targ.; Telaedema Schousb.; Heringia J. Agdh.; Suhria J. Agdh.; Pristidium Kütz.

Gelinaria Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 53; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 172: nov. g. Spongiocarpear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubiae affinitatis.
= Halymenia Agdh.

Gelinea Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phycol. gener. p. 406: sect. Gelidii. (G. corneum et crinitum.)

Gelona Adans. 1763. Fam. II. p. 11: g. Fungor. (*Agaricum Mich.* t. 65. f. 1. 2. 5. 6. 7.)
= . . . ?

Gelonium Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 271. t. 139. *Cf. Tina Röm. & Schult.*
Pet.-Thouars 1809. Gen. madag. n. 45 in Römer Collect. bot. p. 205: g. Sapindor.
= Cupania Plum.

Gelonium Roxb. 1805 in Willd. Spec. IV. p. 831. n. 1828; 1832. Fl. Ind. III. p. 829: nov. g. Dioec. Icosandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 628. n. 2268.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 367: g. Euphorbiear.
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 307: g. Euphorbiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 194. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 34.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 465. n. 1793; 1830. Gen. I. p. 398. n. 1996: g. Tricoccar. (in Dodecandr. Tri-Tetragyn.) — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 30.

---

*) γελασῖνος, fossula. (?)
**) Anagramma nominis Flueggeae.
***) Nomen a substantia gelatinosa plantae maceratae.

Gelonium Roxb. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5052; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 194. n. 7370: g. Ricinear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 487.
Endl. 1840. Gen. n. 5817. p. 1116; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Meisn. 1841. Gen. p. 340 (253): g. Rottlerear.
Synon. Erythrocarpus Blume; Suregada Jones.

Gelpkea*) Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 6. p. 88: nov. g. Myrtear. (Myrtus pendula Bl.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 630.

Gelsemieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 87: trib. Apocynear. Gen.: Gelsemium, Plectaneia.
DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123; 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 285: subtrib. Bignoniear. Gen.: Gelsemium, Platycarpum. — Par. A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 571. Gen. ead.
Meisn. 1840. Gen. p. 301 (210): trib. Bignoniear. Gen. ead. et Rhigozum.
Fenzl 1841 in Endl. Spl. I. p. 1396; 1841. Ench. p. 295: trib. Euapocynear. Gen.: Gelsemium.
Rchb. 1841. Nom. p. 134: sect. Neriear. Gen. id.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 23: trib. Loganiear. Gen. id.

Gelseminum „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 242: g. pl. class. IX. (Bignonia americana, fraxini folio, flore amplo, phoeniceo: Tourn.)
= seq.?

Gelseminum Catesby 1741. Carol. I. p. 53. t. 53. (ex Ell.)
Pursh 1814. Fl. bor. am. I. p. 184.
Elliott 1817. Sketch I. p. 311: g. Pentandr. Monogyn.
Bartl. 1830. Ord. p. 201: g. Gentianear.
Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 30: g. Polemoniacear.
Conf. seq.

Gelsemium**) Juss. 1789. Gen. p. 150: g. Apocineis aff. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 432. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 338. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 308.
Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. I. p. 120.
Pers. 1805. Ench. I. p. 267. n. 611: g. Apocynear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 113. n. 501. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXVII. 435. n. 758.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 414; 1825. Syst. II. p. 836. n. 2232; 1831. Gen. II. p. 503. n. 2476: g. Bignoniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3266. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 131. (?) — Brongn. 1843. En. genr. p. 62.
Nutt. 1818. Gen. am. I. p. 171: g. Pentandr. Digyn.

Gelsemium Juss. cont.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1091: sect. Bignoniae.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 87: g. Gelsemiear. — Par. DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123; 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 285. — Meisn. 1840. Gen. p. 301 (210). — Endl. 1841. Spl. I. n. $3430/_1$. p. 1396; 1841. Ench. p. 295. — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5186. — A. DC. 1845. Pr. IX. p. 23.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424: g. Loganiear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 359: g. Antoniear.
Synon. Gelseminum (Rupp.?), Catesb.; Guinnalda Sess. (Meisn.); Leptopteris Blume. (Miq.)

Gembanga*) Blume ex Nees 1825. Flora II. p. 678: nov. g. Palmar.
= Corypha Linn.

Gemella Hill 1769. Hort. kew. p. 12: g. Radiatar.
= . . . ?

Gemella**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 648. Ed. Willd. p. 796: g. Polygam. Monoec. (G. trifolia.)
= Aporetica Forst.

Geminella Turpin 1828. Mém. Mus. XVI. p. 329: nov. g. plant. (G. interrupta.)
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 611: g. Desmidiacear. inclusar.
Menegh. 1838. Cenni p. 34: g. Desmidiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 659. — Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 142; 1849. Sp. Alg. p. 191. n. 144. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 57.

Gemmularia Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 106: nov. g. Tuberidear. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 18. p. 311.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Polygastreor.?
= Pachyma Fries? (Fries Elench. II. p. 39.)

Genabea „Tulasne Journ. it. II. p. 60" Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 445: g. Cenococceor.?
Bail 1858. Syst. p. 45: g. Tuberaceor.

Gendarussa***) „Rumph. 1743. Amboin. IV. t. 28. 30" Nees 1832 in Wall. pl. As. rar. III. p. 103; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 410: g. Gendarussear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 110. n. 4276. Sect. (1841) ut Endl. — Endl. 1839. Gen. n. 4083. p. 705; 1841. Ench. p. 343. Sect.: Adhatoda, Gendarussa. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (205). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 155. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 831.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 69: g. Acanthacear. — Par. Webb . . . . Canar. III. p. 158 Subg.: Dipsas.
Nees 1841. Linnaea XV. p. 366: g. Justiciear.

*) Dicat memoriae prof. Gelpke Brunovicens.
**) Nomen corruptum ex Jasmino: Vent.

*) *Gembang* Javanorum.
**) Nomen a fructu gemello.
***) Nomen malaiicum.

Gendarussa Rumph. cont.

Brongn. 1843. En. genr. p. 64: g. Echmacanthear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Justiciadar.

Gendarusseae Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 76: div. Justiciear. Gen. Rostellaria, Hemichoriste, Graptophyllum, Beloperone, Adhatoda, Gendarussa, Leptostachya, Gymnostachyum. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190. Gen. ead. (Rostellularia loco Rostellariae.) — Endl. 1839. Gen. p. 704. Gen. ut Nees (Rhytiglossa loco Adhatodae.) Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1406 et Ench. p. 343) Schaueria et 1842 (Spl. II. p. 63) Odontonema. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 126. Gen. ut Nees et Rhytiglossa. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204). Gen. ut Endl. et Anthocometes? — Rchb. 1841. Nom. p. 109. Gen. ut antea (excepta Adhatoda) et Schaueria.

Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 93: trib. Acanthacear. Gen. bras.: Herpetacanthus, Thyrsacanthus, Pachystachys, Cyrtanthera, Schaueria, Sericographis, Drejera, Jacobinia, Sarotheca, Tyloglossa, Rhytiglossa, Amphiscopia, Orthotactus, Beloperone, Simonisia, Harpochilus, Adhatoda, Leptostachya.

Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 363: trib. Echmatacanthar. Gen.: Spirostigma, Mackenziea, Haplanthera, Ruttya, Ramusia, Monothecium, Stenostephanus, Glockeria, Anthocometes, Habracanthus, Halographis, Sebastiano-Schaueria, Chaetothylax; Heinzelia, Schaueria, Pachystachys, Phlogacanthus, Loxanthus, Duvernoia, Thyrsacanthus, Graptophyllum, Cyrtanthera, Hoverdenia, Cardiacanthus, Jacobinia, Harpochilus, Drejera, Plagiacanthus, Rhytiglossa, Amphiscopia, Sericographis, Herpetacanthus, Hemichoriste, Anisostachya, Rostellularia, Leptostachya, Sarotheca, Schwabea, Adhatoda, Gendarussa, Monechma, Simonisia, Beloperone, Anisotes.

(Genea Vittadini 1831. Tuberac. p. 27: g. Tubercor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 352. p. 30; 1841. Ench. p. 17. — Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 334. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 249. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 438.

Klotzsch . . . . in Dietr. Fl. Boruss. p. 474.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 27; 1842. Mycol. p. 109: g. Tuberacear.

L. R. & Ch. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 378: g. Lycoperdaceor.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Tuberaceor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491. — Bonord. 1851. Hdb. p. 276. — Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 55. (genuinor.) — Bail 1858. Syss. p. 43. t. 13.

Synon. Hydnocaryon Wallr.

(Geneium*) Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 783: sect. Justiciae. (J. paniculata, laxiflora.)

(Genersichia Heuffel 1844. Flora II. p. 528: nov. g. Caricinear. (Carex obtusata Liljebl.)

Genesiphylla L'Herit. 1788. Sert. angl. p. 29. t. 39.

= Xylophylla Linn.

Genethyllis Steud., Walp. vid. *seq.*

Genetyllis*) DC. 1826. Dict. class. XI. p. 400; 1828. Prodr. III. p. 209: g. Chamaelauciear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4663; 1837. Hdb. p. 253; 1841. Nom. p. 176. n. 6822. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 331. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 812. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 104. — Meisn. 1837. Gen. p. 107 (75). — Endl. 1840. Gen. n. 6284. p. 1226; 1841. Ench. p. 650. — Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 96.

Steud. 1840. Nom. I. p. 668 (*Genethyllis*): g. Myrtacear.

Schauer 1841. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. II. p. 177: g. Euchamaelauciear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 727 (*Genethyllis*).

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 721: g. Chamaelauciacear.

Synon. Polyzone Endl.; Hedaroma Lindl. (ex Schauer.)

Genicularia Roussel 1806. Fl. du Calvad. teste Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 144.

= Chantransia Fries.

Genioperma A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 230: sect. Helipteri. (H. tenellum n. sp.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot V. p. 280.

Geniosporum „Wallich mss.“ Benth. 1832. Labiat. p. 19: g. Ocymoidear. Sect.: Geniosporum, Platostoma. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 674. Sect. eaed. — Rchb. 1837. Hdb. p. 189. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 162. (restrict.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 351. 377.

Endl. 1838. Gen. n. 3570. p. 608; 1841. Ench. p. 306: g. Moschosmear. Sect. ut Benth. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 282 (191). — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4134. Sect. eaed. — Walp. 1845. Rep. III. p. 494. Sect. eaed.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 561: p. Moschosmidar.

Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 44: g. Ocimear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 940.

Geniostephanus Fenzl 1844. Flora p. 312: g. Meliacear. (indescriptum.)

Geniostoma**) Forst. 1776. Char. gen. p. 23. t. 12: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 131. n. 327. — Gmel. 1791. Syst. p. 377. — Willd. 1797. Sp. I. p. 998. n. 371. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 349. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 680.

Scop. 1777. Intr. p. 181: g. Luridar.

Juss. 1789. Gen. p. 420: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 99. n. 447. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XX. 200. n. 683.

R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 564 (Verm. bot. Schr. I. p. 75): g. Loganear.

*) *γένειον*, mentum.

*) *Γενετυλλίς*, cognomen Veneris, partuum protectricis.

**) *γένειον*, barba.

Geniostoma Forst. cont.
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 332: g. Apocinacear.
Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 316: g. Gardnerear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 588. n. 638; 1830. Gen. I. p. 151. n. 757: g. Contortar.
Mart. 1827. Nov. gen. II. p. 133: g. Loganiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3503; 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 133. n. 5137. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 206. — A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 45. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 483. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424.
Dumort 1829. Anal. fam. p. 28: g. Loganiacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 165. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 177.
Endl. 1838. Gen. n. 3365. p. 576; 1841. Ench. p. 289: g. Euloganiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167). — DC. 1845. Pr. IX. p. 66. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 15. p. 238. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 364.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604: g. Loganear.
Synon. Anasser Juss.; Anassera Pers.; Haemospermum Blume; Aspilobium Sol. (ex Cunn.); Aspilotum Banks & Sol. (ex DC.)

Genipa*) Tourn. 1700. Inst. p. 658. t. 436. 437. App.
Plum. 1703. Catal. p. 20.
Linn. 1740. Syst. p. 19; 1742. Gen. ed. II. p. 73. n. 168; 1759. Syst. ed. X. p. 931. n. 229; 1762. Sp. ed. II. p. 251; 1764. Gen. ed. VI. p. 96. n. 240; 1767. Syst. ed. XII. p. 168: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 190; 1784. Syst. p. 227. — Reich. 1778. Gen. p. 103. n. 271. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 136. n. 341. — Lour. 1790. Coch. I. p. 149. — Gmel. 1791. Syst. p. 388. — Pers. 1797. Syst. p. 237; 1805. Ench. I. p. 198. n. 441.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 202. n. 836: g. Petalostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 201; 1820. Mém. Mus. VI. p. 391. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 575. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 440. — Hedw. 1806. Gen. p. 145. n. 624. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XVIII. 244. n. 921. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 333. — Kunth 1824. Syn. III. p. 57. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 764. n. 826; 1830. Gen. I. p. 176. n. 887. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 591. 794.
Adans. 1763. Fam. II. p. 127: g. Aparinium.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Contortar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 402.
Scop. 1777. Intr. p. 142: g. Opulinar.
Neck. 1790. El. I. p. 143. n. 249: g. Sphanidophytor.

*) *Genipapa* nomen vernaculum.

Genipa Tourn. cont.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2979.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 614: g. Guettardear.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 407: g Gardeniacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 244: g. Gardeniar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 378: g. Gardeniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 211. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 495. — Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 408. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2693. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 50.
Endl. 1838. Gen. n. 3306. p. 562; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Synon. Thevetia Linn. 1743 (n. 143); Pubeta Linn.; Duroia Linn. f.; Duroja Batsch.

Genipantha Benth. 1849. Niger Fl. p. 383: sect. Randiae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 795.

Geniparia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: subfam. Dilarniae. Gen.: Coccocipsilum, Sicelium, Jontanea, Gomozia, Fernelia, Hoffmannia, Catesbea, Higginsia; Randia, Bertiera, Zaluzania, Genipa, Jocayena, Ucriana, Gardenia, Agylophora; Hillia, Duroia.

Genipella L. C. Rich. msc. olim.
= Alibertia Rich.

Genista Tourn. 1700. Inst. p. 643. t. 411: g. pl. class. XXII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 255. Ed. Hall. 1745. p. 265: g. pl. class. XI.
Medic. (Vorles. II. p. 341.) 1789. Phil. Bot. I. p. 204. (Spartium junceum L.)
Mönch 1794. Meth. p. 144: g. Thalamostemonis.
= Spartium Linn. emend.

Genista Linn. 1737. Gen. p. 219. n. 580; 1737. Cliff. p. 335; 1740. Syst. p. 27; 1753. Sp. II. p. 309; 1759. Syst. ed. X. p. 1156. n. 766; 1763. Sp. ed. II. p. 997; 1764. Gen. ed. VI. p. 368. n. 859; 1767. Syst. ed. XII. p. 474: g. Diadelph. Decandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 50. — Murr. 1774. Syst. p. 536; 1784. Syst. p. 645. — Reich. 1778. Gen. p. 368. n. 930. — Lour. 1790. Coch. II. p. 428. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 488. n. 1167. — Gmel. 1791. Syst. p. 1090. — Pers. 1797. Syst. p. 682; 1807. Ench. II. p. 287. n. 1691. — Willd. 1800. Sp. III. p. 936. n. 1333; 1809. En. p. 745.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 592: g. Leguminosar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 19. — Scop. 1777. Intr. p. 304. — Juss. 1789. Gen. p. 353. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 388. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 214. —

Genista Linn. cont.
DC. 1805. Franc. IV. p. 493; 1815. V. p. 546. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 901. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 313 (*Genêt*). — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 595. Sect.: Spartium. — Link 1822. En. II. p. 223. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 219. n. 2529; 1831. Gen. II. p. 577. n. 2824. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 428. 448. Sect.: Spartium, Genista.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 131. n. 538: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 364. — Gis. 1792. Prael. p. 415. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 446.
Adans. 1763. Fam. II. p. 320: g. Genistar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 280: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 28. n. 1336: g. Cyteophytor.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 479. 496: g. Monadelph. Decandr.
Rebent. 1804. Neom. p. 190: g. Decandr. Monogyn.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 145. — Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4030 (sect.: Salzwedelia, Voglera, Genista); 1832. Fl. exc. p. 519; 1841. Nom. p. 150. n. 5853. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 148. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 200. — Koch 1836. Syn. p. 152. Ed. II. p. 166. Sect.: Corothamnus, genuinae. — Meisn. 1837. Gen. p. 82 (59). — Kunth 1838. Berol. I. p. 217. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 369. — Endl. 1840. Gen. n. 6500. p. 1266; 1841. Ench. p. 668. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 516. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 1. (emend.) Sect.: Chamaesparton, Eusparton. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 128. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 349. Sect.: Syspone, Ephedrospartum, Eugenista, Teline. — B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 71 (*Genêt*). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 459.
Link 1823. Flora II. p. 756. Char. emend.
Link 1831. Hdb. II. p. 148: g Genistoidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Cytisear.
Synon. Genistella Hall.; Listera, Corniola et Lygos Adans.; Scorpius et Genistoides Mönch.

Genista Spach 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 337; 1845. ibid. III. p. 102: g. Genistear. Subgen.: Spartocarpus, Camptolobium, Phyllobotrys, Stenocarpus, Pterospartum, Teline. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 461.

Genistae Adans. 1763. Fam. II. p. 320: sect. 2 Leguminosar. Gen.: Ecastaphyllum, Amerimnon, Bootia, Genista, Spartium, Cytisus, Corniola, Erinacea, Chamaespartium, Listera, Ulex, Lygos, Barbajovis, Ebenus, Psoralea, Trifolium, Melilotus, Fenugraecum, Kentia, Galactia, Galega, Pongam, Salken, Neanthe, Glycyrhiza, Robinia, Lupinaster, Lupinus, Dorycenium, Scaligera, Damapana, Mundubi, Anonis, Colutea, Astragaloides.

Genista-Spartium „C. Bauh., Herm." Tourn. 1700. Inst. p. 645. t. 412: g. pl. class. XXII.
= Ulex Linn.

Genisteae Bronn 1822. Diss. Legum. p. 132: subtrib. Curvembryar. diadelphar. Gen.: Hovea, Platylobium, Bossiaea, Scottia, Templettonia, Rafnia, Achyronia, Borbonia, Liparia, Oedmannia, Ulex, Aspalathus, Sarcophyllum, Genista, Lebeckia, Wiborgia, Loddigesia, Calycotome, Cytisus, Adenocarpus, Goodia, Dillwynia, Crotalaria, Ononis, Psoralea, Anthyllis.
DC. 1825. Pr. II. p. 115: subtrib. Lotear. Gen.: Hovea, Platylobium, Platychilum, Bossiaea, Goodia, Scottea, Templetonia, Rafnia, Vascoa, Borbonia, Achyronia, Liparia, Priestleya, Hallia, Heylandia, Crotalaria, Hypocalyptus, Viborgia, Loddigesia, Dichilus, Lebeckia, Sarcophyllum, Aspalathus, Ulex, Stauracanthus, Spartium, Genista, Cytisus, Adenocarpus, Ononis, Requienia, Anthyllis. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. Gen. fere ead. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 95. 126. Gen. ut DC. et Plagiolobium, Clavulum. — Koch 1836. Syn. p. 151. Ed. II. p. 165. Gen.: Ulex, Spartium, Sarothamnus, Genista, Cytisus, Lupinus. — Meisn. 1837. Gen. p. 82 (58). Gen. ut DC. et Lalage, Colobotus, Argyrolobium, Sphingium, Sarothamnus, Chasmone, Euchlora, Stiza, Pelecynthis, Calobota, Acanthobotrya, Buchenrödera, Polylobium, Leptis', Capnitis, Telina, Aulacinthus, Krebsia, Lipozygis, Listia, Hydrosia, Oxyramphis, Hemispadon?, Amphithalia, Heudusa, Cryphiantha, Lathriogyna, Plagiolobium, Varennea? — Endl. 1840. Gen. p. 1259; 1841. Ench. p. 667. Gen.: Hovea, Plagiolobium, Lalage, Platylobium, Bossiaea, Goodia, Templetonia, Scottia, Rafnia, Pelecynthis, Borbonia, Achyronia, Liparia, Pristleya, Amphithalea, Lathriogyne, Coelidium, Epistemum, Hallia, Heylandia, Requienia, Crotalaria, Lupinus, Xerocarpus, Rothia (1841 Westonia), Loddigesia, Hypocalyptus, Lebeckia, Viborgia, Dichilus, Colobotus, Aspalathus, Sarcocalyx, Euchlora, Mellolobium, Leptis, Lotononis, Polylobium, Leobordea, Krebsia, Listia, Adenocarpus, Ononis, Erinacea, Ulex, Stauracanthus, Spartium, Sarcophyllum, Sarothamnus, Genista, Retama, Trichasma, Gamochilum, Argyrolybium, Cytisus, Anthyllis. Accedit 1843 (Spl. III. p. 103) Diotolotus. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 127. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553. Divis.: Hoveae, Borbonieae, Crotalarieae, Lotononideae, Cytiseae. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 269. Gen. ut Endl.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVIII; 1828. Consp. p. 153: div. Cassiear. Gen. ut DC.

Genisteae Bronn cont.
(Bossieua loco Bossiaeae) et Clavulium, Westonia.
Bartl. 1830. Ord. p. 409: subdiv. Lotear. Gen. ut DC. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 514. Gen.: Hymenocarpus, Anthyllis, Ononis, Ulex, Spartianthus, Spartium, Genista, Cytisus. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 152. 184. Gen. ut DC. et Westonia, Spartianthus.

Genisteae Rchb. 1837. Handb. p. 226: div. Papilionacear. Subdivis.: *genuinae* (gen. Genistear. 1828 exclusis Anthyllide, Ononide et Adenocarpo), Anthyllideae, Sophoreae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 150. Subdivis.: *genuinae* (gen. Genistear. Endl. [exclusis Lupino et Anthyllide] et Amphinomia?, Priotropis?), Anthyllideae, Podalirieae.

Genistella Tourn. 1700. Inst. p. 646. t. 413: g. pl. class. XXII.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 266: g. pl. class. XI.
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 224: g. Diadelph.
Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 123: sect. Stenocarpi. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 490.
Synon. Chamaespartium Adans.

Genistella Mönch 1794. Meth. p. 133: g. Thalamostemonis. (Genista sagittalis.)
= Saltzwedelia GMS.

Genistoideae Link 1831. Handb. II. p. 146: sect. Papilionacear. Gen.: Zenopogon, Aspalathus, Ulex, Stauracanthus, Spartianthus, Genista, Spartium, Calycotome, Cytisus, Chamaecytisus, Adenocarpus, Erinacea, Lotophyllus.

Genistoides Mönch 1794. Meth. p. 132: g. Thalamostemonis. *Cf.* Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 335.
Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 124: sect. Stenocarpi. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 490.
= Genistae Linn. pars.

Genistoides Rchb. 1828 in Mössl. Handb. II. p. 1245: sect. Spartii. (S. patens, scoparium, radiatum.)
= Sarothamnus Wimm. et Cytisi sp.

Genlisea*) A. St. Hilaire 1833. Voy. distr. diam. II. p. 428; 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 165: nov. g. Lentibulariear. (G. aurea, minor, etc.) — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 335. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 25.
Endl. 1839. Gen. n. 4194. p. 729; 1841. Ench. p. 354: g. Utriculariear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 314 (225). — Benjam. 1847. Linnaea XX. p. 316; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. IX. p. 252.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 186: g. Lentibulariacear.
Synon. Dörrienia Rchb.

Genlisia Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1207 (Fl. exot. t. 24): nov. g. Ixiear. (Witsesenia corymbosa Sm.)
Bartl. 1830. Ord. p. 45: g. Iridear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1572. (genuinar.)
= Witsena Thunb.

*) Dicat. comitissae de Genlis.

Genoplesium*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 319. Ed. Nees p. 175: nov. g. Orchidear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 335. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 713. n. 2968; 1831. Gen. II. p. 661. n. 3335. (Gynandr. Monandr.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 293: g. Coniopagar.
Bartl. 1830. Ord. p. 56: g. Neottiear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 216. n. 1582. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2149. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 125: g. Ceropagar.
Lindl. 1840. Orchid. p. 518; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Diuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1584.
Meisn. 1842. Gen. p. 387 (289): g. Diuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 21. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 173 (*Genosplesium*).

Genoria Pers. vid. *Ginoria Jacq.*

Genosiris**) Labill. 1804. Nov. Holl. I. p. 9: nov. g. Iridum. (G. fragilis.) *Cf.* Schrad. n. Journ. I. 3. p. 56.
Hedw. 1806. Gen. p. 26. n. 112: g. Iridear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 336.
Palis. mss. ex Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 39: g. Xyridear.
- Patersonia R. Brown.

Genosplesium Duchart. vid. *Genoplesium R. Br.*

Genthia Bayrh. 1849. Taunus p. 2; nov. g. Phascacear. (Phascum patens.)
= Ephemerum Hampe.

Gentiana***) Tourn. 1700. Inst. p. 80. t. 40: g. pl. class. I. — Par. Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 21. Sejungitur Gentianella.
Linn. 1737. Gen. p. 69. n. 197; 1737. Cliff. p. 80; 1740. Syst. p. 20; 1753. Sp. I. p. 227; 1759. Syst. ed. X. p. 951. n. 285; 1762. Sp. ed. II. p. 329; 1764. Gen. ed. VI. p. 126. n. 322; 1767. Syst. ed. XII. p. 199. n. 319: g. Pentandr. Digyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 176. — Murr. 1774. Syst. p. 221; 1784. Syst. p. 267. — Reich. 1778. Gen. p. 130. n. 352. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 175. n. 450. — Lour. 1790. Coch. I. p. 171. — Gmel. 1791. Syst. p. 460. — Fröl. 1796. De Gentian. lib. p. 9. Sect.: Coelanthae, Calathianae, Endotrichae, Crossopetalae. — Pers. 1797. Syst. p. 280. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1331. n. 512; 1809. En. p. 296. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 171. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 171. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 70.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 473: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 210. n. 878: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Rotacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 346.

*) γένος, genus.
**) γένος, familia; Iris.
***) Nomen ab inventore Gentio rege. (Dioscor. et Plinius).

Gentiana Tourn. cont.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Gentianar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 141.
Adans. 1763. Fam. II. p. 505: g. Apocynor.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 103: g. Oligantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 133: g. Monopetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 477: g. Gentianear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 413. — Batsch 1802. Tab. p. 199. — Pers. 1805. Ench. I. p. 284. n. 635. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 321. — DC. 1805. Franç. III. p. 650; 1815. V. p. 426. Sect.: Coilanthe, Calathia, Endotricha, Crossopetalum. — Hedw. 1806. Gen. p. 178. n. 742. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 450. Ed. Nees p. 306. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 472; 1825. Syst. I. p. 855. n. 1001; 1830. Gen. I. p. 213. n. 1099. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 167. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 337. — Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 346. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XIV. 135. Sect. ut Fröl. — Link 1821. En. I. p. 258. Sect.: Gentiana, Pneumonanthe, Amarella. — Kunth 1823. Syn. II. p. 261; 1838. Berol. II. p. 15. (legitimar.) — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 151. — D. Don 1825. Nepal. p. 125. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 847. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Link 1829. Hdb. I. p. 421. Divis.: Gentiana, Ericoila, Pneumonanthe, Hippion, Gentianella. Sejungitur Amarella. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 280. — Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 31. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 180. (restrict.) — Koch 1837. Syn. p. 486. Ed. II. p. 559. Sect.: Coelanthe, Calathia, Endotricha, Grossopetalum. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; 1840. II. p. 909. Sect. ut Griseb. 1839. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 63. Sect.: Amarella, Cyclostigma, Thylacites, Cyane, Coelanthe. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 488. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 177.
Scop. 1777. Intr. p. 188: g. Speciosar.
Cram. 1803. Disp. p. 42 in Tetrandr. Digyn. (G. ciliata, campestris, etc.) et p. 173 in Syngenes. Monogam. (G. purpurea, Pneumonanthe, etc.)
Nees 1818. Nov. Act. Leop. IX. p. 143. (De speciebus barbatis.)
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: g. Gentianidiear.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 12. 269. Sect.: Asterias, Gentiana, Cruciata, Pneumonanthe, Megalanthe, Hippion, Urananthe, Gentianella, Amarella, Chionanthe.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3499: g. Chironiear. Sect.: Hippion, Pneumonanthe, Gentiana. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 423. Sect.: Cyanaea, Gentiana. — Endl. 1838. Gen. n. 3528. p. 600; 1841. Ench. p. 302. Sect.: Asterias, Coelantha, Pneumonanthe, Crossocephalum, Ericala, Chondrophyllum, Erithalia, Endotriche, Oreophylax. — Brongn. 1843. En. genr. p. 54.

Gentiana Tourn. cont.
Bunge 1829. Mém. Mosc. VII. (1824.) p. 209. t. 8—11. Consp. generis. Sect.: Asteriae, Coelanthae, Pneumonanthae, Crossopetalae, Calathianae, Chondrophyllae, Erythaliae, Endotrichae, Trochanthae.
Griseb. 1834 in Hook. fl. bor. am. II. p. 54: g. Swertiear. Sect.: Cyane, Chondrophylla, Tretorrhiza, Arctophila, Endotricha, Crossopetalum. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 211. — Griseb. 1839. Gent. gen. p. 210. Sect.: Asterias, Andicola, Antarctophila, Amarella, Arctophila, Crossopetalum, Cyclostigma, Chondrophylla, Thylacites, Coelanthe, Tretorrhiza. — Meisn. 1840. Gen. p. 261 (170). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 13. Subgen. ex Griseb. — Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 86. Sect. ut 1839 et Imaicola, Eurythalia, Pneumonanthe, Dasystephana. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 78. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 52. Sect. ex Griseb. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 559.
Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5130: g. Pneumonanthear. Sect.: Gentianella, Gentiana (subsect.: Ericala, Pneumonanthe, Tretorrhiza, Chondrophyllum, Coilantha, Gentiana).
Synon. Ericoila Borckh.; Pneumonanthe, Chaelothilus, Sebeokia, Gärtneria, Rassia Neck.; Hippion Schmidt; Pneumonanthe, Ericala et Erythalia Gray; Cuttera Rafin.; Selatium et Ulostoma Don. (Reliqua sub sectionibus Gentianae.)

Gentiana Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 227; 1789. Phil. Bot. I. p. 73.
= Erythraea Ren.

Gentiana Necker 1790. Elem. bot. II. p. 11. n. 620: g. restrict. Darinyphytor. Sejunguntur Pneumonanthe, Anthopogon, Rassia, Sebeokia, Thyrophora, Spiragyne, Chaelothilus, Gärtneria.

Gentiana Mönch 1794. Meth. p. 428: g. Petalostemonis, pro G. lutea restrict.
Schmidt 1796 in Röm. Arch. I. 1. p. 9.

Gentiana Borckh. 1796 in Röm. Arch. I. 1. p. 28: g. restrict. Typi: G. filiformis, aurea L., etc.
D. Don 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 508. (G. contorta Royle.)

Gentiana Gaudin 1828. Fl. Helv. II. p. 269: sect. Gentianae. (G. punctata, pannonica, purpurea.)

Gentianaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 25: fam. Asclepiariear. Trib.: Gentianeae, Spigelieae, Romanzoviaceae.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 296; 1847. Veg. kd. p. 612: ordo Gentianalium. Subord.: Gentianeae, Menyantheae.
Meisn. 1839. Gen. p. 259 (168): ordo Contortar. Subordines: Menyantheae, Gentianeae.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 38: ordo (132) Corolliflorar. Trib. ut Meisn.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 77: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypogynar. Trib. eaed.

Gentianae B. Juss. 1759 in Hort. Trian.: ordo 29 plant. Gen.: Swertia, Chironia, Exacum, Gentiana, Ophiorhiza, Lisianthus, Chlora.

Juss. 1789. Gen. p. 141: ordo 13 class. VIII. Gen. §. 1: Gentiana, Vohiria, Coutoubea, Swertia, Chlora. §. 2: Exacum, Lisianthus, Tachia, Chironia, Nigrina. §. 3: Spigelia, Ophiorrhiza. §. 4. *Affine:* Potalia.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 291. 334: fam. Corolliflorar. Sect.: *verae* (gen.: Pneumonanthe, Ericala, Erythalia, Erythraea, Franquevillia, Chlora, Swertia), Menyantheae.

Lindl. 1833. Nix. p. 29: ordo Gentianalium.

Gentianales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 29: nixus Dicarpar. Ordines: Gentianae, Spigeliaceae, Apocyneae, Asclepiadeae.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 594: nixus Exogenar. perigynar. Ord.: Ebenaceae, Aquifoliaceae, Apocynaceae, Loganiaceae, Diapensiaceae, Stilbaceae, Orobanchaceae, Gentianaceae.

Gentianeae Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Pal. II. p. 477: ordo plant. Gen.: Gentiana.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 411: ordo 16 class. VIII. Gen. §. 1: Menyanthes, Nymphoides, Gentiana, Sarothra, Swertia, Chlora. §. 2: Exacum, Lisianthus, Chironia. §. 3: Spigelia, Ophiorrhiza. *Cf.* Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 260.

Batsch 1802. Tab. p. 199: fam. Nudar. Gen.: Gentiana, Lita, Swertia, Chlora; Exacum, Lisianthus, Myrmecia, Chironia, Nigrina; Spigelia, Ophiorrhiza; Nicandra, Menyanthes, Nymphaeum.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 321. t. 51. Gen. §. 1: Gentiana, Lita, Cutubea, Swertia, Chlora. §. 2: Exacum, Lisianthus, Tachia, Chironia, Nigrina. §. 3: Spigelia, Ophiorrhiza. *Affine:* Potalia.

DC. 1805. Franç. III. p. 646: fam. (50) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Menyanthes, Villarsia, Chlora, Swertia, Gentiana, Chironia, Exacum. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 449. Ed. Nees p. 305. Nova gen.: Orthostemon, Logania. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 88.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 471: fam. 48 plant. Gen. §. 1: Gentiana, Erythraea, Chironia, Canscora, Swertia, Frasera, Andrewsia, Chlora, Sabbatia. §. 2: Exacum, Sebaea, Houstonia, Myrmecia, Mitrasacme, Lisianthus, Melasma, Rochefortia, Logania; Menyanthes, Villarsia, Xanthosia, Spigelia, Disandra, Scoparia, Veronica, Columellia, Buddlea.

DC. 1819. Théor. élém. p. 247: ordo Corolliflorar. — Par. Koc 1837. Syn. p. 484. Ed. II. p. 557. Trib.: Menyantheae, *verae* (gen.: Chlora, Swertia, Lomatogonium, Gentiana, Cicendia [1844], Erythraea).

Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 345. Gen. §. 1: Gentiana, Erythraea, Centaurella, Vohiria, Coutoubea, Chlora, Swertia. §. 2: Chaelothilus, Exacum, Sebaea, Lisianthus, Tachia, Sabatia, Chironia, Nigrina. §. 3: Spigelia,

Gentianeae Neck. cont.
Mitreola. §. 4. *Affinia:* Potalia, Villarsia, Anopterus.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: ordo Tubiflorar.

Mart. 1826. Nov. gen. II. p. 132. Gen.: Lisianthus, Irlbachia, Schultesia, Callopisma, Cutubea, Schübleria, Tachia, Prepusa, Helia.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI: div. Contortar. Gen.: Exacum, Sebaea, Houstonia, Mitrasacme, Chlora, Sabbatia, Erythraea, Chironia, Lisianthus, Swertia, Gentiana. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 133; 1831. Fl. exc. p. 420; 1837. Hdb. p. 210; 1841. Nom. p. 132. Subdivis.: Menyantheae, Chironieae, Loganieae.

Link 1829. Hdb. I. p. 418: ordo (20) Hypanthar. Gen.: Erythraea, Exacum, Chlora, Chironia, Gentiana, Amarella, Swertia, Spigelia, Villarsia, Menyanthes.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: trib. Gentianacear. Gen.: Gentiana, Swertia, Chlora, Frasera, Chironia, Erythraea, Sabbatia, Eustoma, Hippion, Sebaea, Cicendia, Exacum. — Par. Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 38. Subtrib.: Chironieae, Chloreae, Lisiantheae, Swertieae. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 77. Subtrib. eaed.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (197) Monopetalar.

Bartl. 1830. Ord. p. 199: ordo (120) Contortar. Gen.: Gentiana, Swertia, Halenia, Chlora, Voyra, Callopisma, Sabbatia, Frasera, Centaurella, Erythraea, Orthostemon, Canscora, Chironia, Slevogtia, Coutoubea, Sebaea, Schultesia, Prepusa, Schüblera, Exacum, Helia, Irlbachia, Lisianthus, Tachia; Spigelia, Mitreola, Houstonia, Gelseminum; Mitrasacme. *Descisc.:* Villarsia, Menyanthes. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 599; 1841. Ench. p. 301. Subordines: *verae* (trib.: Chironieae, Sebaeeae), Menyantheae. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 231; 1846. Chlor. prot. p. LXXXII. Gen. foss.: Villarsites.

Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 31. Gen. §. 1: Gentiana, Ophelia, Pleurogyne, Swertia, Anagallidium. §. 2: Agathotes, Frasera, Halenia; Crawfurdia, Tachia; Chironia, Exacum, Voyra, Cicendia, Centaurella, Erythraea, Canscora, Orthostemon, Sabbatia, Chlora, Dejanira, Schultesia, Lisianthus, Irlbachia, Helia, Coutoubea, Prepusa. §. 3; Exadenus, Sebaea, Schübleria. §. 4: Menyanthes, Villarsia, Limnanthemum.

D. Don 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 503. Gen. ind.: Gentiana, Pneumonanthe, Ericala, Eurythalia, Crawfurdia, Swertia, Agathotes, Ophelia, Halenia, Erythraea, Canscora, Exacum, Slevogtia.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 173: ordo Corollaeflorar. Tribus: Gentianieae, Exacieae, Desfontainieae.

Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 232. Tribus: Eugentianeae, Menyantheae.

Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 1. 69. Tribus: Chironieae, Chloreae, Hippieae,

Gentianeae Neck. cont.
Erythraeaceae, Lisyantheae, Swertieae, Menyanthideae.
Meisn. 1839. Gen. p. 260 (168): subordo Gentianacear. Tribus ut Griseb. 1839. (Mitrasacmeae loco Menyanthidear.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614. Gen. Gentianear. verar. Endl. et Stellera, Gyrandra, Lapethea, Hockinia, Pagaea, Petalostylis, Symbolanthus, Eudoxia, Exochaenium, Apophragma, Desfontainia, Glyphospermum?
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 1: fam. (130) Contortar. Trib.: *verae* (sect.: Chironieae, Chloreae, Hippieae, Erythraeaceae, Lisyantheae, Swertieae), Menyantheae.
Griseb. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 47. Gen. Meyeniana: Gentiana, Erythraea, Exacum, Mitrasacme.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 54: fam. Asclepiadinear. Trib.: Chironieae, Menyantheae.

Gentianeae verae G. Don vid. *Gentianieae G. Don.*

Gentianella Rupp. 1718. Fl. jen. p. 21. Ed. Hall. 1745. p. 21: g. pl. class. I.
„Col." Rchb. 1841. Nom. p. 133. n. 5130. 1: sect. Gentianae. Subsect.: Eurythalia, Crossopetalum.
= Gentianae Linn. pars.

Gentianella Mönch 1794. Meth. p. 482: g. Petalostemonis. (Gentiana campestris L.)
= Endotriche Fröl.

Gentianella „Col." Borckh. 1796 in Römer Arch. I. 1. p. 29: g. pro Gentiana ciliata L. constitutum. *Cf.* Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 346.
Link 1829. Hdb. I. p. 425: sect. Gentianae.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 179: g. Gentianear. verar.
= Crossopetalum DC.

Gentianella Gaudin 1828. Fl. Helv. II. p. 270: sect. Gentianae. (G. utriculosa, nivalis.)

Gentianidieae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: fam. Thalamitubiae. Gen.: Gentiana, Swertzia, etc.

Gentianieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 173. 175: trib. Gentianear. Subtrib.: *Gentianeae verae* (gen.: Swertia, Halenia, Agathotes, Ophelia, Gentianella, Frasera, Gentiana, Centaurella, Asterias, Coilantha, Eurythalia, Pleurogyne, Ericala, Pneumonanthe, Glyphospermum, Selatium, Ulostoma, Schultesia, Callopisma, Tachia, Prepusa, Orthostemon, Chlora, Hippion, Canscora, Vohiria, Leiphaimos, Enicostema, Crawfurdia), Coutoubeae, Chironiae, Lisiantheae.

Gentianoides G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 567: sect. Veronicae. (V. gentianoides Vahl.)

Gentianoides G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 640: sect. Pentstemonis. (P. Humboldti, barbatum, centranthifolium.)

Gentineae Link Enum. I. p. 208: sphalm. pro *Gentianeae*.

Genuflexa Link 1833. Handb. III. p. 261.
= Mougeotia Agdh.

Geoblastae Willd. 1796 in Usteri n. Ann. XI. p. 19: class. plantar. Divis.: Rhizoblastae, Arhizoblastae.

Geocalyceae Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 101; 1838. ibid. IV. p. XXIII; 1845. Syn. Hepat. p. 192: subtrib. Jungermanniear. Gen. (1833): Geocalyx, Saccogyna. Accedunt 1838 Gongylanthus et 1845 Gymnanthe. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 23. Gen. ut Nees 1838. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 548. Gen. ut Nees 1845. — Bayrh. 1849. Taun. p. 49.
Rchb. 1837. Hdb. p. 137: div. Jungermanniacear.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1343; 1841. Ench. p. 28: trib. Jungermanniacear. Gen. ut Nees 1838.
Gottsche 1845. Nov. Act. Leop. XXI. 2. p. 419. (Fructif.) Gen. ut Nees 1845 et Calypogeia.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 28: sect. Jungermanniear. foliacear. Gen.: Geocalyx.

Geocalycidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 60: trib. Jungermannear. Gen. Geocalycear. Nees 1838.

Geocalyx*) Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 102; 1836. II. p. 395; 1838. IV. p. XXIII; 1845. Syn. Hepat. p. 194: g. Geocalycear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $472/_{22}$. p. 1343; 1841. Ench. p. 28. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 815. — Gottsche 1845. Nov. Act. Leop. XXI. 2. p. 425. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 28. — Bayrh. 1849. Taun. p. 49.
Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 22: g. Saccogynear.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 92: g. Jungermanniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Geocalycidar.
Synon. Calypogia Dumort.

Geocaryum Cosson 1851. Notes s. quelq. pl. midi Esp. III. p. 112: nov. g. ex typo Myrrhidis capillifoliae Guss.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 899: g. Scandicinar.

Geochorda Chamisso & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 11: nov. g. Scrofularinear. (Herpestes glechomoides Spr.)
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3154; g. Antirrhinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 171; g. Veronicear. — Par. Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 581. — Rchb. 1837. Hdb. p. 198. — Endl. 1839. Gen. n. 3974. p. 687; 1841. Ench. p. 340. — Meisn. 1840. Gen. p. 306 (217). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 362. 534. — Walp. 1845. Rep. III. p. 333. 968.
Rchb. 1841. Nom. p. 115. n. 4486: g. Sibthorpiear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 401; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Eugratiolear.

*) γῆ, terra.

Geococcus „Drumm." Harvey 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 52: nov. g. Cruciferar. (G. pusillus.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 208: g. Notorhizear.

Geocyclus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 235; 1849. Spec. Alg. p. 331. n. 226: nov. g. Mastichotrichear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 90: g. Rivulariear.

Geodorum Jacks. 1810 in Andr. Repos. t. 626.
R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 207 (Verm. bot. Schr. II. p. 30): g. Orchidear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 352. — Link 1822. En. II. p. 370. — D. Don 1825. Nepal. p. 31. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 726. n. 2994; 1831. Gen. II. p. 667. n. 3366.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 285: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 126.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 175; 1854. Fol. Orchid. 1 Nov.: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1515; 1841. Nom. p. 53. n. 2039. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1433. p. 200; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (280). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 711.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Calanthidar.
Synon. Otandra Sal.; Cistella Blume; Ascochilus Blume; Ortmannia Opiz.

Geoffraea Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1043; 1764. Gen. ed. VI. p. 378. n. 878; 1767. Syst. ed. XII. p. 490: g. Diadelph. Decandr. — Par. Swartz 1788. Prodr. p. 106. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 500. n. 1193. — Pers. 1807. Ench. II. p. 278. n. 1672.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 377. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 70.
Scop. 1777. Intr. p. 312: g. Anomalar.
Juss. 1789. Gen. p. 363: g. Leguminosar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 427. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 242. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 773 (anomal.: *Geoffrea*); 1826. Syst. III. p. 328. n. 2609; 1831. Gen. II. p. 596. n. 2944. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 353.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Dalbergiear.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 136: g. Geoffroyear.
= Geoffroya Jacq. emend.

Geoffrea Spreng. vid. *praeced.*

Geoffreae DC. 1825. Prodr. II. p. 473 (Lég. mém. XIII.): trib. Caesalpinear. Gen.: Arachis, Voandzeia, Peraltea, Brongniartia, Andira, Geoffroya, Brownea, Dipterix. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 104. — Meisn. 1837. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (69). Gen. ead. exclusis Voandzeia et Brongniartia.

Geoffreae DC. cont.
424. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (69). Gen. ead. exclusis Voandzeia et Brongniartia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVIII: subdiv. Hedysarear. Gen. ut DC. exceptis 2 ultimis.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: trib. Leguminosar. Gen.: Geoffroya, Brownea, Arachis, Andira.

Geoffroea*) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 207. t. 180: nov. g. Diadelph. Decandr. (G. spinosa.)
Gled. 1764. Syst. p. 135. n. 568: g. Thalamostemonum.
= seq.

Geoffroya „Jacq. emend." Linn. 1774 in Murr. Syst. p. 556: g. Diadelph. Decandr. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 377. n. 952. — Murr. 1784. Syst. p. 667. — Pers. 1797. Syst. p. 705. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1129. n. 1362.
Medic. (Vorles. II. p. 391.) 1789. Vorles. IV. 1. p. 358.
Neck. 1790. El. III. p. 24. n. 1329: g. Cyteophytor.
Link 1822. En. II. p. 242: g. Leguminosar.
DC. 1825. Pr. II. p. 476: g. Geoffrear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 426. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (69).
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4102: g. Geoffroyear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 415.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 107: g. Dalbergiear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6725. p. 1306; 1841. Ench. p. 673. — Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 617. — Brongn. 1843. En. genr. p. 131. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 81.
Synon. Umari Marcgr.; Geoffroea Jacq.; Geoffraea Linn.; Geoffrea Spreng.

Geoffroyeae Rchb. 1828. Consp. p. 154: subdiv. Cassiear. genuinar. Gen.: Arachis, Voandzeia, Peraltea, Brongniartia, Riveria?, Andira, Geoffroya.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: div. Caesalpinear. Gen. Geoffrear. DC.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 89. 133: sect. Caesalpiniear. Gen. ead. et Amherstia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 227: div. Cassiacear. Gen. ut antea.

Geogasteres Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 383: sect. Gastromycetum. Series: Dermatogasteres, Angiogasteres.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 378; 1831. Gen. II. p. 770: trib. Gastromycetum. Gen.: Geastrum, Mitremyces, Sphaerobolus, Atractobolus (1831 ejus loco Cenococcum), Pilobolus, Thelebolus.

Geogastri Nees 1816. Syst. p. 128; 1817. Ueberbl. p. 33: circulus II. Gasteromycor. Gen.: Sphaerobolus; Dermatogasteres, Angiogasteres.

Geoglosei Bonord. vid. *Geoglossei Link.*

*) Dicat Claude Jos. Geoffroy.

Geoglosseae Corda 1838. Icon. Fung. II. p. 35: fam. Hymenomycetum. Gen.: Geoglossum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 37; 1842. Mycol. p. XCVI: fam. Ascophoror. Gen. id.

Geoglossei Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: div. Sarcomycetum. Gen.: Geoglossum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: sect. Mitrator. Gen.: Spathularia, Geoglossum, Leotia, Mitrula, Heyderia, Vibrissea.
Bonord. 1851. Hdb. p. 206 (*Geoglosei*): fam. Discomycetum. Gen.: Geoglossum, Spathularia, Midotis. — Par. Bail 1858. Syst. p. 65. Gen.: Geoglossum.

Geoglossideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 598. 658: div. Hymenothecear. Gen.: Geoglossum, Mitrula, Leotia, Helotium, Relhanum.

Geoglossum Pers. 1795 in Usteri n. Ann. IX. p. 11; 1796. Obs. mycol. I. p. 11: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1820. Dict. p. 18. p. 357. — Par. GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 26. 363. — Link 1809. Berl. Mag. III. p. 40. (alt. seriei.)
Pers. 1797. Tent. p. 36: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XVIII. 607: g. Clavaeformium.
DC. 1805. Franç. II. p. 101: sect. Clavariae.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 52: g. Dermatothecior.
Fries 1815. Obs. myc. I. p. 159; 1818. II. p. 295.
Nees 1816. Syst. p. 171: g. Clavariar. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 400. — Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 18.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 487; 1828. Elench. I. p. 233: g. Clavator. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 56. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 492. n. 3481; 1831. Gen. II. p. 765. n. 3914.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 658: g. Geoglossidear.
Pers. 1822. Mycol. I. p. 193: g. Helvelloideor.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70: g. Clavellariar.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 576: g. Clavariear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 305.
Fries 1825. Pl. homon. p. 89: g. Mitrulinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 417. p. 36; 1841. Ench. p. 20. — Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 433. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 328.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: g. Geoglosseor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490. — Bonord. 1851. Hdb. p. 206. — Bail 1858. Syst. p. 66. t. 21.
Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 302: g. Mitrulator.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: g. Clavariacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 94: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 531: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Fries 1838. Epicr. p. 582: g. Clavariedr.

Geoglossum Pers. cont.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 35; 1842. V. p. 37; 1842. Mycol. p. 156: g. Geoglossear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 347: g. Helvellaceor.
Synon. Heyderia Fries.

Geoherpum*) „Willd. mss." Schult. 1827. Mant. III. p. 18. 350: nov. g. Tetrandr. Tetragyn. (G. alsinefolium.)
= Mitchella ovata DC. (Steud. Nom.)

Geohypha**) Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 449: sect. Hypheliae. (H. terrestris.)

Geoides Tausch 1823. Hort. Canal. fasc. I: sect. Potentillae. (P. rupestris.)
= Fragariastri pars Ser.

Geonema Rchb., Dumort. vid. *Geonoma Willd.*

Geonoma Willd. 1805. Spec. IV. p. 593. n. 1734: g. Monoec. Monadelph.
Pers. 1807. Ench. II. p. 576. n. 2124: g. Palmar. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 438. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 18. n. 1160; 1830. Gen. I. p. 250. n. 1305. (in Hexandr. Monogyn.) — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1063.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 202: g. Phoenicear.
Mart. 1823. Gen. Palm. Bras. fasc. I. p. 6. 230. t. 4—20; 1824. Palm. fam. p. 15: g. Arecinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1639 (sphalm. *Geonema*): g. Arecacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56 (*Geonema*): g. Arecinear.
Endl. 1837. Gen. n. 1751. p. 251; 1841. Ench. p. 130: g. Borassinar. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 228.
Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2285: g. Manicariear.
Meisn. 1842. Gen. p. 356 (266): g. Geonomear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 16: g. Borassinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 62.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Borassear.
Synon. Vouay Aubl.; Gynestum Poit.

Geonomeae Meisn. 1842. Gen. pl. vasc. p. 356 (266): subtrib. Borassinar. Gen.: Bentinckia, Iguanura, Cyrtostachys, Geonoma, Manicaria, Calyptrocalyx.

Geoperdineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69. 79: fam. Tectigraniae. Gen.: Lycoperdon, Scleroderma, Bovista, Geastrum, Tulostoma, Polysaccum.

Geophila D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 136: nov. g. Stipulariar. (Psychotria herbacea L., etc.)
Spreng. 1827. Cur. post. p. 50: g. Rubiacear. (serius Gen. I. p. 170 ad Psychotriam reductum.) — Par. A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 208.

*) ἕρπω, serpo.
**) ὑφή, tela.

Geophila D. Don cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2036: g. Coffeacear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 436.
Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 137: g. Cephaëlidear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 537. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 608. — Endl. 1838. Gen. n. 3139. p. 531; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 170 (119). — Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2788. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 311.
Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.

Geophila Bergeret 1803. Fl. bass. Pyrén. II. p. 184.
= Merendera Ram.

Geopogon Endl. 1837. Gen. n. 839 *d.* p. 93; 1841. Ench. p. 58: sect. Chloridis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1313. 4.

Geopyxis Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 224: subsect. Elvelae.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 55: trib. Aleuriae.
Endl. 1836. Gen. n. 430 Cl. p. 37; 1841. Ench. p. 21: subsect. Aleuriae (*α. Catinus, β. Cacabus*). — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 3. *b.* Sect. eaed. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 369.

Georchis Lindl. 1831 in Wall. Catal. n. 7379; 1833. Bot. Regist. XIX. n. 1618: nov. g. Neottiear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 214. n. 1557. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2124. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 495; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Physuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1574. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 732.
Meisn. 1842. Gen. p. 386 (289): g. Physuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 21.

Georgia*) Ehrhart 1780. Hann. Mag. p. 931; 1787. Beitr. I. p. 125. 178: nov. g. Muscor. (G. Mnemosynum.) *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 18. p. 439.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 180: g. Mniacear. Sect.: Tetrodontium, Tetracmis.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 230: g. Georgiacear. Sect. eaed. — Par. Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 359.
Synon. Tetraphis Hedw.; Tetracis Ehrh.; Tetracmis Brid.; Tetrodontium Schw.; Tetraphys Mont.

Georgia Spreng. vid. *Georgina Willd.*

Georgia Hort. (teste Karsten in Berl. Wochenschr. 1858. p. 377): g. Palmar.
= Rathea Karst.

Georgiaceae Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 230: subsect. Mniacear. Gen.: Georgia.
Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 359: trib. Acrocarpor. Gen. id.

Georgina Willd. 1803. Spec. III. 3. p. 2124. n. 1499; 1809. En. p. 898: g. Syngenes. Superfl.
DC. 1810. Ann. Mus. XV. p. 367.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 567; 1826. Syst. III. p. 610. n. 2843; 1831. Gen. II. p. 639. n. 3201 (*Georgia*): g. Radiatar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 243: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 485. — Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Link 1822. En. II. p. 388. g. Corymbiferar.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17: g. Coreopsidear. (antea [1820. Dict. v. 18. p. 439] Coreopsidi insertum.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2609. — Link 1829. Hdb. I. p. 773.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 320. 325; 1830. v. 60. p. 576: g. Synedrellear.
Less. 1832. Syn. p. 211: g. Georginear.
= Dahlia Cavan.

Georgineae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 211: div. Ecliptear. Gen.: Monactis?, Georgina, Salmia, Glossogyne.

Geothrichum Link vid. *seq.*

Geotrichum Link 1809. Berl. Mag. III. p. 17: nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 18. p. 445. — Par. Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 37. (Byssoideor.: *Geothrichum.*) — Agdh. 1821. Aphor. p. 80. — Pers. 1822. Myc. eur. I. p. 26.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 10: g. Moniliar.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 537: g. Sporotrichear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 90: g. Spondylomycetum.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 124: g. Sporotricheor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 77.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Botrytideor.?
= Sporotrichum Link?

Geotropus Pers. 1828. Mycol. eur. III. p. 88: sect. Agarici. (A. pileolarius, claviceps, etc.)

Geracium* Rchb. 1828 in Mössl. Handb. II. p. 1345. 1367: nov. g. Cichoriacear. (Hieracium praemorsum, parviflorum, succisaefolium, paludosum, etc.)
Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2149; 1831. Fl. exc. p. 259; 1841. Nom. p. 95. n. 3717: g. Crepidear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6.
Bartl. 1830. Ord. p. 146: g. Lactucear.
= Crepidis sp. et Aracium Neck.

Geraea Torrey & Gray 1847. Proc. Amer. Ac. p. 48: nov. g. Enceliae aff.
A. Gray 1848. Pl. Fendl. p. 85; 1853. Pl. Wright. II. p. 88: subg. Simsiae.

Geranarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42: ordo Toropetalar. Fam.: Zygophylleae, Oxalideae, Balsamineae, Geraniaceae, Linideae.

Gerania B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 31 plant. Gen.: Malpighia, Banisteria, Triopteris, Bombax, Hermannia, Geranium, Oxalis, Paullinia, Cardiospermum, Passiflora, Vitis, Cissus, Menispermum, Cissampelos, Sapindus.
Adans. 1763. Fam. II. p. 384: fam. 49 plant.

*) Dicat. regi Georgio III.

*) γῆρας, senectus. (?) — Mutatio vocis Hieracium.

Gerania B. Juss. cont.
Gen.: Malpighia, Banisteria, Cardamindum, Corindum, Melianthus, Geranium, Oxys, Hermannia, Melochia, Viola.

Gerania Juss. 1789. Gen. p. 268: ordo 13 class. XIII. Gen.: Geranium, Monsonia. *Affinia*: Tropaeolum, Balsamina, Oxalis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 793: fam. 84 plant. Gen.: Geranium, Erodium, Pelargonium, Monsonia, Grielum; Magallana, Tropaeolum, Melianthus, Oxalis, Impatiens, Cucullaria, Nitraria.

Geraniaceae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. II. p. 51. t. 80: fam. plant. Gen.: Erodium, Geranium, Pelargonium, Monsonia. *Affinia:* Grielum, Tropaeolum, Balsamina, Oxalis. *Cf.* Juss. 1817. Mém. Mus. III. p. 436; 1820. Dict. v. 18. p. 445.
Sweet 1820—1830. Geraniaceae. 5 vol.
DC. 1824. Pr. I. p. 637: ordo (46) Thalamiflorar. Gen.: Rhynchotheca, Monsonia, Geranium, Erodium, Pelargonium. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 713. Gen. ut DC. et Sarcocaulon, Grielum.
St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 135.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15; 1826. Isis p. 589: ordo Gynobasear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: fam. Columniferar. Divis.: Geranieae, Hermannieae, Dombeyaceae, Lasiopetaleae, Wallichieae, Sterculiaceae, Byttneriaceae.
Rchb. 1828. Consp. p. 203; 1832. Fl. exc. p. 775: fam. Geraniiflorar. Divis.: Geranieae, Sterculieae, Byttnereae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 288. Divis.: Geranieae, Sterculiariae, Büttnereae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 46: fam. Geranariear. Trib.: Pelargonieae, Geranieae.
Bartl. 1830. Ord. p. 348: ordo (201) Gruinalium. Gen. ut DC. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1166; 1841. Ench. p. 619. Gen. ead. exclusa Rhynchotheca.
Link 1831. Hdb. II. p. 327: ordo 13 Allostemonum. Gen. ut DC. exclusa Rhynchotheca.
A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 295. Tribus: Geranieae, Oxalideae.
Lindl. 1833. Nix p. 16; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 137; 1847. Veg. kd. p. 493: ordo Geranialium. Gen. ut Jaume.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 284: fam. (46) Gruinalium. Gen. ut DC.
Klotzsch 1835. Linnaea X. p. 425. Gen.: Pelargonium, Geranium, Erodium, Sarcocaulon, Olopetalum, Monsonia.
Meisn. 1837. Gen. p. 57 (41): ordo Geranioidear. Trib.: Monsonieae, Geranieae, Pelargonieae.
Rchb. 1841. Nom. p. 201: fam. Malviflorar. Divis.: Geranieae, Sterculiariae, Büttnerieae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 82: fam. Geranioidear. Gen.: Pelargonium, Erodium, Geranium, Monsonia.

Geraniaceae Jaume cont.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 200: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Gen. ut Endl.

Geraniales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 16: nixus Gynobasicar. Ordines: Hydrocereae, Tropaeoleae, Geraniaceae, Oxalideae, Balsamineae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 484: nixus Exogenar. hypogynar. Ord.: Linaceae, Chlaenaceae, Oxalidaceae, Balsaminaceae, Geraniaceae.

Geranidiae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: fam. Thalamisertiae. Gen.: Geranium, Erodium.

Geranieae DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 838: fam. (85) Dicotyledonum polypetalar. Gen.: Erodium, Geranium. *Affinia*: Tropaeolum, Impatiens, Oxalis. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 892.
DC. 1819. Théor. élém. p. 245: ordo Thalamiflorar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 623: fam. Thalamiflorar. Sect.: *verae* (gen.: Erodium, Geranium), Balsamineae, Oxalideae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: div. Geraniacear. Gen.: Rhynchotheca, Pelargonium, Jenkinsonia, Campylia, Otidium, Dimacria, Hoarea, Isopetalum, Erodium, Geranium, Monsonia. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203; 1832. Fl. exc. p. 775. Subdivis.: Tropaeoleae, Erodieae, Monsonieae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 290; 1841. Nom. p. 201. Subdivis.: *genuinae* (sect.: Erodieae [1841 Herodieae], Pelargonieae, Monsonieae), Tropaeoleae, Limnantheae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: trib. Geraniacear. Gen.: Erodium, Geranium, Monsonia. — Par. A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 295. — Meisn. 1837. Comm. p. 41. Gen.: Geranium, Erodium.

Geraniiflorae Rchb. 1828. Consp. p. 201; 1832. Fl. exc. p. 651. 770; 1837. Hdb. p. 256: formatio Schizocarpicar. Fam.: Malvaceae, Geraniaceae, Bombaceae (1832 et 1837 Oxalideae).

Geranioideae Vent. 1799. Tabl. III. p. 170: ordo 16 class. XIII. Gen.: Erodium, Geranium, Pelargonium, Monsonia. *Affinia:* Tropaeolum, Balsamina, Oxalis.

Geranioideae Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 57 (41): class. plantar. Vid. ***Gruinales*** *Meisn.*
Brongn. 1843. Én. genr. p. XXIII. 81: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam.: Balsamineae, Tropaeoleae, Geraniaceae, Limnantheae, Coriarieae, Lineae, Oxalideae, Zygophylleae.

*Geranium**) Tourn. 1700. Inst. p. 266. t. 142: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 272. Ed. Hall. 1745. p. 286: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 204. n. 554; 1737. Cliff. p. 343; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 195; 1753. Sp. II. p. 676; 1759. Syst. ed. X. p. 1141. n. 746; 1763. Sp. ed.

*) γέρανος, grus: a similitudine gruis capitis. (Plin.)

Geranium Tourn. cont.
II. p. 945; 1764. Gen. ed. VI. p. 350. n. 832; 1767. Syst. ed. XII. p. 452: g. Monadelph. Decandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 36. — Murr. 1774. Syst. p. 510; 1784. Syst. p. 612. — Reich. 1778. Gen. p. 349. n. 897. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 458. n. 1118. — Gmel. 1791. Syst. p. 1015. — Pers. 1797. Syst. p. 650; 1807. Ench. II. p. 234. n. 1604. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 80. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 156. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 392. 393. Sect.: Erodium, Geranium.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 365: g. Dicotyledonum Diplostemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 139. n. 585*: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Succulentar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Geranior. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 388. — Juss. 1789. Gen. p. 268.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Gruinalium. — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 483. — Gis. 1792. Prael. p. 320. — Batsch 1802. Tab. p. 16.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 274: g. Columniferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 290.
Hill 1769. Ht. kew. p. 207: g. Pentapetalar.
Cavan. 1787. Diss. IV. p. 194. t. 75—124: g. Malvacear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 383. t. 79. f. 5 (moschatum et pratense).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 215; 1789. Phil. Bot. I. p. 63.
Neck. 1790. El. II. p. 437. n. 1268: g. Comizophytor. Sejungitur Ramphocarpus. = Geranium, Erodium et Pelargonium L'Herit.

Geranium L'Herit. 1787. Geran.: g. restrictum.
Mönch 1794. Meth. p. 281: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 172: g. Geranioidear. — Par. Link 1822. En. II. p. 196.
Willd. 1800. Sp. III. p. 696. n. 1271; 1809. En. p. 713: g. Monadelph. Decandr.
Cram. 1803. Disp. p. 106 in Decandr. Monogyn. (G. molle, etc.) — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 182.
Andrews 1805. Monogr. gen. Geranium.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 52: g. Geraniacear. — Par Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 449. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 229. — Kunth 1824. Syn. III. p. 225; 1838. Berol. I. p. 73. — DC. 1824. Pr. I. p. 639. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 100. — D. Don 1825. Nepal. p. 207. — Presl 1826. Sicul. I. p. 205. — Bartl. 1830. Ord. p. 349. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 715. — Link 1831. Hdb. II. p. 327. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 289. — Koch 1836. Syn. p. 137. Ed. II. p. 151. Sect.: Batrachium, Columbinum. — Webb 1836. Canar. I. p. 20. — Meisn. 1837. Gen. p. 57. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 206. — Endl. 1840. Gen. n. 6046. p. 1167; 1841. Ench. p. 620. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 459. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 122. Sect. ut Koch. —

Geranium L'Herit. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 82. — Nees 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 162. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 494. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 297. Sect.: Eugeranium, Robertium. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 39. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 395.
DC. 1805. Franç. IV. p. 844; 1815. V. p. 628: g. Geraniear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 625. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 70. n. 2400; 1831. Gen. II. p. 545. n. 2670. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 227. — Meisn. 1837. Comm. p. 41.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 794: g. Geranior.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: g. Geranidiar.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 429: g. inter Gruinales et Columniferas medium.
Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5280; 1832. Fl. exc. p. 777; 1837. Hdb. p. 290: g. Erodiear.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 398: sect. Geranii.
Rchb. 1841. Nom. p. 201. n. 7653: g. Herodiear.
Synon. Gruinalis Rupp.

Gerardia*) Plumier 1703. Nov. gen. p. 30. t. 12.
Linn. 1737. Gen. p. 181. n. 503; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 610; 1759. Syst. ed. X. p. 1109. n. 665; 1763. Sp. ed. II. p. 848; 1764. Gen. ed. VI. p. 307. n. 747; 1767. Syst. ed. XII. p. 408: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 462; 1784. Syst. p. 553. — Reich. 1778. Gen. p. 309. n. 805. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 403. n. 1004. — Gmel. 1791. Syst. p. 927. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 62. t. 90; 1832. Ind. III. p. 98. — Pers. 1797. Syst. p. 589. — Willd. 1800. Sp. III. p. 221. n. 1138. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 146. — Elliott 1821. Sketch II. 2. p. 113.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 179. n. 735: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 177. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 276. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 453.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 200: g. Verbenar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 272: g. Monopetalar. irregular.
Juss. 1789. Gen. p. 119: g. Scrophulariar.
Neck. 1790. El. I. p. 349. n. 544: g. Chasmatophytor.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 185. t. 114.
Pers. 1807. Ench. II. p. 154. n. 1462: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3165. Sect.: Gerardia, Melasma. — Bartl. 1830. Ord. p. 171.

---

*) Dicat. Joanni Gerardo, Anglo.

Gerardia Plumier cont.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 343: g. Rhinanthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 107.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 397; 1825. Syst. II. p. 806. n. 2183; 1831. Gen. II. p. 493. n. 2428: g. Scrofularinar.
Cham. & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 12: g. Scrofularinear. Sect.: Gerardia, Dargeria.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 11. t. 206. 207: g. Scrophularinar. (Flora Lit. I. p. 2.)
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5; 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 204: g. Gerardiear. Sect.: Otophylla, Cyrtocodon, Pedicularoides, Eugerardia, Dargeria, Sopubia. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 556. Sect. eaed. (excepta Sopubia.) — Endl. 1839. Gen. n. 3996. p. 691; 1841. Ench. p. 340. Sect. ut Don. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 104. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. — Meisn. 1840. Gen. p. 308 (220). — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4522. Sect. fere ut Endl. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 61. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 362. 536. Sect. ut Benth. exclusa Sopubia. — Walp. 1845. Rep. III. p. 381. Sect.: Cyrtocodon, Otophylla, Pedicularioides, Eugerardia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Digitalear.

Gerardia Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 514; 1847 in Lindl. Veg. kingd. p. 685: g. restrict. Gerardiear. verar.
Synon. Eugerardia Benth.; Virgularia Ruiz & Pav.

Gerardieae Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5; 1835. Scroph. ind. p. 48: trib. Scrophularinear. Gen.: Escobedia, Physocalyx; Virgularia, Macranthera, Gerardia, Seymeria?, Glossostylis; Centranthera. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. Gen.: Gerardia, Conradia, Seymeria, Sopubia, Centranthera, Gastromeria, Virgularia. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 556. Gen.: Gerardia, Sopubia, Seymeria, Macranthera, Esterhazia, Glossostylis, Phtheirospermum, Escobedia; Physocalyx, Melasma, Gastromeria; Centranthera. — Endl. 1839. Gen. p. 690. Gen. ead. (exclusa Sopubia) et Harweya. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1405 et Ench. p. 340) Aulaya et 1842 (Spl. II. p. 61) Macrosiphon. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. Gen. fere ut Endl. et Pagesia, Dasystoma, Dasanthera. — Meisn. 1840. Gen. p. 308 (219). Gen. ut Endl. 1839. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 61. Gen.: Gerardia.
Benth. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 198: trib. Scrophulariacear. Gen.: Escobedia, Physocalyx, Melasma; Esterhazya, Macranthera, Seymeria, Gerardia, Glossostylis, Phtheirospermum?; Centranthera.
Rchb. 1841. Nom. p. 116: subsect. Digitalear. Gen. ut Don et Cobamba, Tala, Harweya.

Gerardieae Benth. cont.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 506; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: trib. Rhinanthidear. Gen. §. 1: Hydrotriche, Campylanthus. §. 2. *Verae.* Gen.: Radamaea, Raphispermum, Micrargeria, Leptorhabdos, Seymeria, Otophylla, Silvia, Macranthera, Esterhazya, Gerardia, Dasystoma. §. 3: Sopubieae. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 459. Gen. ead.

Gerascanthos Steud. vid. *seq.*

Gerascanthus*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 170. t. 29. f. 3: nov. g. Pentandr. Monogyn.
Cham. 1829. Linnaea IV. p. 171: sect. Cordiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 380. — Endl. 1839. Gen. n. 3738 *a.* p. 644; 1841. Ench. p. 318. — DC. 1845. Pr. IX. p. 471. — Fres. 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIX. p. 3.
Steud. 1840. Nom. I. p. 680 (*Gerascanthos*): g. Cordiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 629 (*Geraschanthus*).
Synon. Cerdana Ruiz & Pav.

Geraschanthus Lindl. vid. *praeced.*

Gerbera**) „Gronov." Linn. 1737. Coroll. p. 16. n. 980: g. Syngenes. Polygam. Superfl.
Linn. 1740. Syst. p. 28; 1742. Gen. ed. II. p. 385. n. 757: g. Syngenes. Polygam. Aequal.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131: g. Petalostemonum.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 575. n. 2794: g. Radiatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2257: g. Mutisiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 137. — Less. 1830. Linnaea V. p. 290; 1832. Syn. p. 118. Sect.: Gerbera, Piloselloides. — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3432. Sect.: Gerbera, Leptica.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 627. n. 3112: g. Perdiciear.
Endl. 1838. Gen. p. 482. n. 2905: g. Gerberear. Sect. ut Less.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 15: g. Eumutisiear. Sect.: Eugerbera, Leptica. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 229 (141). — Endl. 1841. Spl. I. n. 2929/4. p. 1386; 1841. Ench. p. 248. Sect. ut DC.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: g. Barnadesiear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 108: g. Mutisiacear.
Synon. Gerberia Linn.; Aphyllocaulon Lag.

Gerbera Gmel. vid. *Gerberia Scop.*

Gerbera Lessing 1830. Linnaea V. p. 291; 1832. Syn. Compos. p. 118: sect. Gerberae. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 482. n. 2905 *a.*
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 35: g. Mutisiear.
Eugerbera DC.

*) γηράσκω, senesco.
**) Dicat. Fr. et Traug. Gerber, collectoribus plantarum.

Gerbera Schultz Bip. 1847 in Walp. Repert. VI. p. 315: g. ampliat. Eumutisiear. Sect.: Eugerbera, Leptica, Oreoseris, Berniera, Lasiopus, Anandria.

Gerbereae „DC. mss." Endl. 1838. Gen. p. 481: div. Mutisiear. Gen.: Schlechtendalia, Diacantha, Barnadesia, Dasyphyllum, Nardophyllum, Fulcaldea, Gerbera, Berniera, Lasiopus.

Barnadesieae et Eumutisiear. gen. DC.

Gerberia Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.

Cass. 1817. Bull. soc. philom. p. 34; 1817. Dict. v. 8. p. 395; 1820. v. 18. p. 459: g. Mutisiear. restitutum.

Cass. 1824. Dict. v. 33. p. 464; 1830. v. 60. p. 584: g. Gerberiear.

= Gerberae Gron. pars.

Gerberia Scopoli 1777. Introd. p. 286. n. 1297: g. Columniferar.

Neck. 1790. El. II. p. 432. n. 1260: g. Comizophytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 652 (*Gerbera*): g. Enneandr. Monogyn.

= Quararibea Aubl.

Gerberia Stell. mss.

= Gymnandra Pall. (Choisy in DC. Pr. XII. p. 24).

Gerberieae Cassini 1824. Dict. v. 33. p. 464; 1830. v. 60. p. 584: div. Mutisiear. Gen.: Onoseris, Isotypus, Pardisium? (1824), Trichocline, Gerberia, Lasiopus, Chaptalia, Loxodon, Lieberkuhna, Leria, Perdicium, Leibnitzia.

Gerdaria Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 521: nov. g. ex typo Gerardiae Dregeanae Benth.

Germanea*) Lamarck 1786. Dict. II. p. 682. Juss. 1789. Gen. p. 16: g. Labiatar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 268. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 473.

Benth. 1832. Labiat. p. 32; 1848 in DC. Pr. XII. p. 62: sect. Plectranthi. — Par. E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 227. 228 (*Germorea*). — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 677. — Endl. 1838. Gen. n. 3575 *a*. p. 609; 1841. Ench. p. 306. — Walp. 1845. Rep. III. p. 501.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 162: g. Ocymoidear.

Germaria Sternb. 1838. Vers. II. p. 188: g. Graminitum. (G. elymiformis.)

= Sphenopteris (Rhizoma: Unger Syn. p. 59).

Germaria Presl 1850. Epimel. bot. p. 581 (221): nov. g. Leptospermear. (G. latifolia.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 618. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 401 (dubium).

Germinatorii Rchb. 1828. Consp. p. 5: subdiv. Byssaceor. spurior. Gen.: Herpotrichum, Tophora.

Germorea E. Meyer vid. *Germanea Lam.*

*) Dicat. dom. de Saint-Germain.

Gerontogea*) Chamisso & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 154; 1830. ibid. V. p. 169: g. Hedyotidear.

A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 267: sect. Hedyotidis.

= Oldenlandia Linn.

Gerontopogon Gesn. vid. *seq.*

Geropogon**) Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1109; 1764. Gen. ed. VI. p. 398. n. 904; 1767. Syst. ed. XII. p. 518: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 592; 1784. Syst. p. 709. — Reich. 1778. Gen. p. 397. n. 983. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 525. n. 1228. — Gmel. 1791. Syst. p. 1168. — Pers. 1797. Syst. p. 748; 1807. Ench. II. p. 359. n. 1757. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1491. n. 1399; 1809. En. p. 812. — Link 1822. En. II. p. 277.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Semiflosculosor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.

Gled. 1764. Syst. p. 241. n. 987: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 544.

Scop. 1777. Intr. p. 123: g. Semiflosculosar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 250.

Juss. 1789. Gen. p. 270: g. Cichoracear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 490. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 378. — DC. 1805. Franç. IV. p. 66. — Link 1829. Hdb. I. p. 779.

Neck. 1790. El. I. p. 56. n. 102: g. Glossariphytor.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 581; 1826. Syst. III. p. 663. n. 2892; 1831. Gen. II. p. 646. n. 3249: g. Cichorear.

Cass. 1820. Dict. v. 18. p. 498: g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 145.

Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 64; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Scorzonerear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2180; 1841. Nom. p. 94. n. 3691. — D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Less. 1832. Syn. p. 132. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 111. — Endl. 1838. Gen. n. 2992. p. 496; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 235 (144). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 783. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 313.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 269: g. Andryalear.

Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 476: g. Tragopogonear.

Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 471: g. Geropogonear.

Geropogoneae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 471: div. Tragopogonear. Gen.: Geropogon.

Geropogonoides Schultz Bip. 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 91: subg. Achyrophori.

*) Versio graeca nominis Oldenland.

**) γέρων, senex; πώγων, barba. (*Gerontopogon* Gesnero, contractum a Linnaeo.)

Gerostemum Steud. Nom. I. p. 702: vid. *Gonostemon Haw.*

Gersinia Neraud 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 27: g. Orchidear.
= Bolbophyllum Pet.-Th. (Gaudich.)

Gerulajacta Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 717: nov. g. Melanconiacear. (G. radiata, etc.)

Geruma*) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Ar. p. 62: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 411.
Scop. 1777. Intr. p. 229: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 264: g. Meliar.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 41: g. Meliacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXVII. 467. n. 1003. — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 518.
DC. 1824. Pr. I. p. 619: g. Meliear.? — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 678.
Rchb. 1828. Consp. p. 211. n. 5510: g. Strigiliear.?
Bartl. 1830. Ord. p. 355: g. Leeacear. (?) — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 207. — Meisn. 1837. Gen. p. 51 (36)? — Endl. 1839. Gen. n. 4570. p. 797; 1841. Ench. p. 395. — Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5559.
Meisn. 1837. Gen. p. 49 (36): g. Trichiliear.?
Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Gerumear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 440: g. Vitacear.? dubium.

Gerumeae Rchb. 1837. Handb. p. 313: subsect. Trichiliear. genuinar. Gen.: Geruma.

Geryonia Schrank ex Tausch & Sternb. = Bergenia Mönch.

Gesnera**) Plumier 1703. Nov. gen. p. 27. t. 9: nov. g. plant.
Adans. 1763. Fam. II. p. 157: g. Caprifolior. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 147.
= Conradia Mart.?

Gesnera Schreb. 1791. Gen. II. p. 404. n. 1006: g. Didynam. Angiosperm.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 838. n. 2237: g. Gesnerear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3242.
= Gesneria Linn.

Gesnera Martius 1829. Nov. gen. III. p. 27. t. 212—215 (Flora Lit. I. p. 7): g. Gesnerear., sejunctis Conradia et Rytidophyllo restrict. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672.
Endl. 1839. Gen. p. 721. n. 4165; 1841. Spl. I. p. 1408. n. 4155; 1841. Ench. p. 329. n. 4165: g. Eugesnerear. Sect. (1841) Gesneriae DC.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 258: g. Gesneriear.
Synon. Gesneria G. Don.

Gesnera Regel 1848. Flora p. 246: g. Gesnerear., sejunctis Kohleria, Moussonia, Nägelia, Rechsteineria ulterius restrictum.

*) Arabice *Djerrum*.
**) Dicat. Conrado Gesnero, Tiguri Helv.

Gesnera Regel cont.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 199. 203: g. Eugesnerear. Subgen.: Thamnocaula, Eugesnera, Cryptocaula, Corytholoma, Microgesnera. — Par. Oerst. 1858. Gesn. Centroam. p. 9.

Gesneraceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 283; 1847. Veg. kingd. p. 671: ordo Bignonialium. Subord.: Gesnereae, Cyrtandreae.
Endl. 1839. Gen. p. 715; 1841. Ench. p. 347: ordo Personatar. Subord.: Cyrtandreae, Gesnereae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 208: fam. Dicotyledonear. monopetalar. Divis.: Cyrtandreae, Beslerieae, Gesnerieae.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 145; 1856. XXVII. p. 697. Trib.: Gesnereae, Beslerieae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 404.
Oersted 1858. Gesnerac. Centroam. p. 9. Trib.: Gesnerieae, Rytidophylleae, Beslerieae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 430.

Gesnerarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: ordo Gynocoronar. Fam.: Gesneriaceae.

Gesnereae HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 392: ordo plant. Gen.: Gesneria, Besleria.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 685; 1831. Gen. II. p. 504: div. Personatar. Gen. 1825: Gesnera, Besleria, Parentucellia, Anthocercis, etc. (1831: Gesneria, Sinningia, Anthocercis.) — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVII. Gen.: Didymocarpus, Gloxinia, Martynia, Besleria, Tussaca, Columellia, Trevirania, Achimenes, Gesnera.
Rchb. 1828. Consp. p. 124: subdiv. Bignoniacear. Gen.: Cyrtandra, Henkelia, Loxonia, Lysionotus, Trichosporum; Sarmienta, Columellia; Besleria, Tussacia, Columnea, Quoya, Razumovia?, Trevirania, Achimenes, Gloxinia, Martynia, Craniolaria, Eriphia, Sinningia, Gesnera, Codonophora, Pentarrhaphia, Lophia?; Mitraria, Fieldia.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 68: ordo plant. Gen.: Gesnera, Conradia, Rytidophyllum, Episcia, Besleria, Nematanthus, Hypocyrta, Alloplectus, Drymonia, Tapina, Gloxinia, Columnea, Trevirania, Sarmienta, Mitraria. *Cf.* Flora Lit. I. p. 7.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: trib. Gesneriacear. Gen.: Gesneria, Sinningia, Gloxinia, Anthocercis.
Lindl. 1833. Nix. p. 30: ordo Scrophulalium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: subdiv. Orobanchear. Gen. ut 1828, exclusis 5 primis et 3 ultimis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 120. Sect.: Gloxinieae, Episcieae, Beslerieae.
Endl. 1839. Gen. p. 719; 1841. Ench. p. 349: subordo Gesneracear. Trib.: Beslerieae, Episcieae, Eugesnereae. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672. Gen. Endlicheriana (excepta Trevirana) et Picria?, Klugia, Niphaea, Achimenes, Diastemma, Trichantha.

Gesnereae HBK. cont.
Regel 1847. Ind. sem. h. Turic. (*Cf.* Linnaea XXIV. p. 183 et Walp. Ann. bot. I. p. 471); 1848. Flora I. p. 241. Gen.: Conradia, Rytidophyllum; Gesnera, Rechsteineria, Gloxinia, Niphaea, Moussonia, Nägelia, Köllikeria; Diastema, Kohleria, Trevirania, Locheria.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 199; 1856. XXVII. p. 698: trib. Gesneracear. Subtrib.: Niphaeeae, Achimeneae, Brachylomateae, Eugesnereae, Ligerieae, Rhytidophylleae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 405.
Oersted 1858. Gesn. Centroam. p. 9: subtrib. Gesneriear. Divis.: Eugesnereae, Ligerieae.

Gesneria „Plumier" Auct. vid. *Gesnera Plum.*

Gesneria Linn. 1737. Gen. p. 179. n. 497; 1737. Cliff. p. 318; 1740. Syst. p. 26; 1753. Sp. II. p. 612; 1759. Syst. ed. X. p. 1110. n. 667; 1763. Sp. ed. II. p. 850; 1764. Gen. ed. VI. p. 308. n. 749; 1767. Syst. ed. XII. p. 409: g. Didynam. Angiosperm. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 261. — Murr. 1774. Syst. p. 463; 1784. Syst. p. 554. — Reich. 1778. Gen. p. 310. n. 807. — Gmel. 1791. Syst. p. 929. — Pers. 1797. Syst. p. 590; 1807. Ench. II. p. 174. n. 1522. — Willd. 1800. Sp. III. p. 230. n. 1143; 1809. En. p. 638.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 172. n. 699: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 486.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Campanular.
Juss. 1789. Gen. p. 165: g. Campanulacear. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 503.
Neck. 1790. El. I. p. 380. n. 591: g. Plasyrgophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 212: g. Campanulatar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 368: g. Campanulear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 404: g. Orobanchear.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 392: g. Gesnerear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 140. — Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 48. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 504. n. 2480.
Link 1822. En. II. p. 131: g. Bignoniaceis aff.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57 (*Gessneria*): g. Gessneridiar.
Link 1829. Hdb. I. p. 505: g. Gesneriacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 175: g. Gesneriear.
= Gesnera, Conradia, Rytidophyllum Mart., etc.

Gesneria G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 645: g. Gloxiniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4675. Sect.: Gesneria, Prasanthea.

Gesneria G. Don cont.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 526: g. Gesneriear. Sect.: Eugesneria, Prasanthea. — Par. Benth. 1846. Pl. Hartweg. II.; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 358. — Meisn. 1840. Gen. p. 303 (213). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 569. Sect. ut DC. — Brongn. 1843. En. genr. p. 61. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 396. Sect.: Isoloma, Corytholoma.
= Gesnera Mart.

*Gesneriaceae**) Nees 1825. Ann. sc. nat. VI. p. 295.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28. 30: fam. Gesnerariear. Trib.: Gesnereae, Columellieae.
Link 1829. Hdb. I. p. 505: subordo Personatar. Gen.: Gesneria.
Kunth 1831. Hdb. p. 409.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 643: ordo Corollaeflorar. Trib.: Gesnerieae, Cyrtandraceae.
R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 112. Trib.: Gesnerieae, Beslerieae, Cyrtandreae.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 523: ordo (109) Calyciflorar. Trib.: Gesnerieae, Beslerieae.
Meisn. 1840. Gen. p. 303 (213): ordo Labiatiflorar. Trib. ut DC.
Brongn. 1843. En. genr. p. 61: fam. Personear. Trib. eaed.
Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 357. Trib. ut R. Brown.

Gesnerieae DC. 1819. Théor. élém. p. 246 (*Gessneriées*): ordo Calyciflorar.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: div. Personatar.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (209) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 174: ordo (105) Labiatiflorar. Divis.: *genuinae* (gen.: Gesneria, Gloxinia, Eriphia, Codonophora, Pentarrhaphia; Picria), Beslerieae.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 645: trib. Gesneriacear. Subtrib.: Gloxinieae, Conradieae, Beslerieae. — Par. R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 112.

Gesnerieae DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 523: trib. Gesneriacear. Gen.: Rytidophyllum, Conradia, Gesneria, Gloxinia, Achimenes, Picria, Mitraria. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 303 (213). Gen. ead. et Bellonia?, Rhabdothamnus. — Brongn. 1843. En. genr. p. 61. Gen.: Gesneria, Gloxinia, Sinningia, Trevirania. — Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 358. Gen.: Rytidophyllum, Conradia, Solenophora; Gesneria, Gloxinia, Achimenes, Diastema; Mitraria.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 209: trib. Gesneracear. Gen. Eugesnerear. Endl. — Par. Oerst. 1858. Gesnerac. Centroam. p. 9. Subtrib.: Niphaeeae, Achimeneae, Gesnereae. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 430.

---

*) Fam. jam a Rich. teste Juss. (1804. Ann. Mus. V. p. 427) absque nomine indicata.

Gesnerieae Spach 1840. Hist. vég. phan. IX. p. 255: fam. (148) Labiatiflorar. Trib.: Cyrtandreae, *Gesnerieae* (gen.: Sarmienta, Mitraria, Columnea, Besleria, Hypocyrta, Drymonia, Tapina, Nematanthus, Alloplectus, Episcia; Gesnera, Trevirana, Gloxinia, Sinningia, Rytidophyllum, Conradia, Bellonia?).

Gesnouinia Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 502: nov. g. Parietariear. (Urtica arborea L.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2500. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24. — Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 207 (Flora 1855. p. 525); 1857. ibid. VII. p. 390.
Endl. 1837. Gen. n. 1885 *d.* p. 285; 1841. Ench. p. 170: sect. Parietariae. — Par. Webb. . . . . Canar. III. p. 263.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 99: g. Urticear. — Par. Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 193.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262: g. Urticacear.

Gesnouisia Steud. Nom. I. p. 682: vid. *praeced.*

Gessneria Dumort. vid. *Gesneria Linn.*

Gessneridiae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: fam. Calicitubiae. Gen.: Gessneria.

Gethioides*) Col. 1616. Ecphras. II. t. 7. f. 2.
= Codonoprasum Rchb.

Gethylis Gleditsch vid. *Gethyllis Linn.*

Gethyllideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: trib. Hypoxidear. Gen.: Gethyllis.

Gethyllidis Hedwig vid. *seq.*

Gethyllis**) Linn. 1737. Ht. Cliff. p. VII. 493; 1737. Coroll. p. 8. n. 958; 1740. Syst. p. 24; 1742. Gen. ed. II. p. 206. n. 460; 1753. Sp. I. p. 442; 1759. Syst. ed. X. p. 1043. n. 523; 1762. Sp. ed. II. p. 633; 1764. Gen. ed. VI. p. 235. n. 590; 1767. Syst. ed. XII. p. 325: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 367. — Reich. 1778. Gen. p. 241. n. 644.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127 (*Gethylis*); 1764. Syst. p. 230. n. 949: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: g. Denudatar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Iridum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Spathacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 274. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 276. n. 1435. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1187.
Scop. 1777. Intr. p. 87: g. Liliacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 239; 1825. Syst. II. p. 82. n. 1235. — Link 1821. En. I. p. 324. — Eckl. 1827. Verz. p. 4.
Thunb. 1781. Nov. gen. I. p. 13; 1794. Prodr. I. p. 59; 1818. Fl. cap. II. p. 264 g. Hexandr. Monogyn. — Par. Linn. f 1781. Suppl. p. 27. n. 590. — Murr. 1784 Syst. p. 339. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 228. n. 584. — Gmel. 1791. Syst. p. 564. — Pers. 1797. Syst. p. 361; 1805. Ench. I. p. 362. n. 799. — Willd. 1799. Sp. II. p. 104. n. 635.
Juss. 1789. Gen. p. 54: g. Narcissor.
Neck. 1790. El. III. p. 168. n. 1520: g. Ymnodiphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 184: g. Narcissoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 145: g. Bulbiflorar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 134: g. Amaryllidear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 231. n. 939 (*Gethyllidis*). — Schult. 1830. Syst. VII. p. XLVI. 779. — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Herb. 1837. Amaryll. p. 72. 185. (Oporanthiformium.)
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 517: g. Narcissear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 174. — Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 181. — Endl. 1837. Gen. n. 1290. p. 179; 1841. Ench. p. 103. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1613. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (297). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 406.
Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1214: g. Hypoxidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Gethyllidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Dilatridear.
Lindl. 1847. Veg. hd. p. 158: g. Amaryllear.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 13. 146: g. Narcissinear. Sect.: Gethyllis, Abapus, Papiria.
Kunth 1850. Enum. V. p. 694: g. Sternbergiear.
Synon. Abapus Adans.; Papiria Thunb.

Gethyra Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 282: nov. g. Zingiberear. (Alpinia occidentalis Ht. kew.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Curcumacear.
= Renealmia Linn.

Getonia Banks & Sol. mss.
= Cyrtandra Forst.

Getonia Roxb. 1795. Pl. Corom. I. p. 61. t. 87; 1832. Fl. Ind. II. p. 428: nov. g. Decandr. Monogyn. (G. nutans et floribunda.) — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 477. n. 1081. — Hedw. 1806. Gen. p. 321. n. 1266. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 372. n. 1880. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1523.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 210. t. 217.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 479: g. Onagrariar.?
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 351. Ed. Nees p. 207: g. Combretacear. — Par. Unger 1846. Chlor. prot. p. 139. t. 147. f. 1 — 7.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 360. n. 1685: g. Onagrar.?
DC. 1828. Pr. III. p. 15: g. Terminaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4541; 1841. Nom. p. 171. n. 6599. — Bartl. 1830. Ord. p. 323. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 661. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 315. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 303. — Meisn. 1838.

*) γήθυον, Allii species.
**) Nomen ex Plinio. (Allii species.)

Getonia Roxb. cont.
Gen. p. 110 (79). — Endl. 1840. Gen. n. 6078. p. 1180; 1841. Ench. p. 632. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 604.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718: g. Terminalear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 132: g. Myrobalanear.
Synon. Calycopteris Lam.; Petraea Ung.

Geum Tourn. 1700. Inst. p. 251. t. 129: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 109. Ed. Hall. 1745. p. 122: g. pl. class. V.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 399: sect. Saxifragae.
Mönch 1794. Meth. p. 63: g. Thalamostemonis.
= Saxifragae Linn. pars.

Geum*) Linn. 1737. Gen. p. 148. n. 418; 1737. Cliff. p. 195; 1740. Syst. p. 24; 1753. Sp. I. p. 500; 1759. Syst. ed. X. p. 1065. n. 561; 1762. Sp. ed. II. p. 716; 1764. Gen. ed. VI. p. 256. n. 636; 1767. Syst. ed. XII. p. 352: g. Icosandr. Polygyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 399; 1784. Syst. p. 479. — Reich. 1778. Gen. p. 261. n. 692. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 343. n. 867. — Pers. 1797. Syst. p. 515; 1807. Ench. II. p. 56. n. 1243. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1113. n. 1002; 1809. En. p. 556. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 309. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 296. 410.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 277. n. 1144: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31; 1764. Ord. nat.: g. Senticosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 444. — Batsch 1802. Tab. p. 10. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 328.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rosacear. — Par. St. Hil. 1804. Dict. v. 4. p. 306 (*Bénoite*); 1805. Expos. II. p. 188. — Link 1822. En. II. p. 65. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 416. n. 2078. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 191. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 55.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 188: g. Calyciflorar. (1769. IV. p. 169 inter Diplosantheras.) — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 69.
Hill 1769. Ht. kew. p. 185: g. Pentapetalar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 351. t. 74. f. 1 (urbanum et Laxmanni).
Juss. 1789. Gen. p. 338: g. Potentillar. — Par. Fisch. 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 184. (Revisio generis.)
Neck. 1790. El. II. p. 96. n. 761: g. Sarcodiphytor. Segregatur Bernoullia.
Gmel. 1791. Syst. p. 860: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 234.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 348: g. Dryadear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 470; 1815. V. p. 544. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 578. — Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 550. Sect.: Caryophyllastrum, Caryophyllata, Oreogeum, Stictogeum. — Bartl. 1830. Ord. p. 402. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 264. — Link 1831. Hdb. II. p. 98. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 525. Sect.: Caryophyllastrum, Caryophyllata. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 174. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 479. — Koch 1836. Syn. p. 209. Ed. II. p. 232. Sect.: Caryophyllata, Oreogeum. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73). — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6504. (genuinar.) Sect.: Geum, Calligeum, Caryophyllata. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 95. Sect.: Caryophyllata, Sieversia. — Brongn. 1843. En. genr. p. 125. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 519.
Nestl. 1816. Potentill. p. 16: g. Fragariacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 864; 1825. Syst. II. p. 542. n. 1865: g. Potentillear. — Par. Tausch 1823. Ht. Canal. fasc. I. Sect.: Caryophyllata, Dryados. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII; 1828. Consp. p. 167. n. 4445 (sect.: Buchhavea, Caryophyllata, Caryophyllastrum); 1832. Fl. exc. p. 597. — Kunth 1838. Berol. I. p. 194.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 420: g. Eudryadear. Sect.: Eugeum, Stylipus, Caryophyllata, Sieversia. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6386. p. 1246; 1841. Ench. p. 659. Sect.: Caryophyllastrum, Calligeum, Caryophyllata et 1842 (Spl. II. p. 95) Stylipus. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 21. Sect. ut G. Don.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Potentillidar.
Synon. Caryophyllata Tourn.; Bernoullia Neck.

Geunsia*) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 331. n. 515: nov. g. Chasmatophytor., a Justicia L. sejunctum.
= . . .?

Geunsia Blume 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 107: nov. g. Viticear.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 819: g. Verbenacear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3718. p. 638; 1841. Ench. p. 312 (dubium). — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 136. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664.
Meisn. 1840. Gen. p. 291 (200): g. Lantanear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 372. 619. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 116.
Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4218: g. Aegiphilear.?
= Callicarpa Linn. (Schauer in DC. Pr. XI. p. 640.)

Geunsia Fl. mexic. ic. ined.
= Calandrinia HBK.

Geunzia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 440. n. 1273: nov. g. Comizophytor., a Samyda L. disjunctum.

---

*) Nomen ex Plinio.

*) Dicat. Steph. Joh. Geuns, Belgo.

G e v u i n a Molina 1782. Saggio p. 184: nov. g. plant.
Juss. 1789. Gen. p. 424: g. incertae sedis.
Gmel. 1791. Syst. p. 966: g. Didynam. Angiosperm.
Batsch 1802. Tab. p. 55: g. Rutacear.
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 519: g. Proteacear.
Vid. Guevina Pers., R. Brown; Guevinia Endl.

G e y e r a Meisn. vid. *Geijera Schott.*

G h a e s a e m b i l l a „Herm." A. DC. Prodr. VIII. p. 83 in synon. Embeliae: vid. *seq.*

G h a e s e m b i l l a Herm. 1714. Zeyl. p. 46. *Cf.* Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 521.
= Embelia Juss.

G h a n d i r o b a s. N h a n d i r o b a Marcgr. 1648. Brasil. p. 46 c. ic.: vid *Nhandiroba.*

G h e s a e m b i l l a „Herm." Adans. 1763. Fam. II. p. 449: g. Cistor.
= Embelia Juss.

G h i e s b r e c h t i a Lindl. vid. *seq.*

G h i e s b r e g h t i a Rich. & Galeotti 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 28: nov. g. Vandear. (G. calanthoides.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182 *(Ghiesbrechtia):* g. Calanthidar.
Lindl. 1854. Fol. Orchid. 1 Nov. *(Ghiesebreghtia):* sect. Calanthes.

G h i e s e b r e g h t i a Lindl. vid. *praeced.*

G h i n i a*) Schreb. 1789. Gen. I. p. 19. n. 42: g. Diandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 37. — Willd. 1797. Sp. I. p. 114. n. 55.
Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 1087: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 144.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 421: g. Verbenear.
= Tamonea Aubl.

G i b b a r i a Cassini 1817. Bull. occ. philom. Sept. p. 139: nov. g. Calendulacear., Osteospermo aff. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143.
Cass. 1820. Dict. v. 18. p. 526: g. Calendulear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 15.
Cass. 1824. Dict. v. 30. p. 324; 1830. v. 60. p. 574: g. Osteospermear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2733.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 257: inter genera Compositar. incertae sedis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1391. n. 15; 1841. Ench. p. 251.
Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139): g. Arctotear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3240: g. Arctotidear.

G i b b e r a Fries 1825. Pl. homon. p. 110: nov. g. Dichaenear. (Sphaeria Vaccinii, glaucina, etc.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 272. — Endl. 1836. Gen. n. 390. p. 34; 1841. Ench. p. 19.

*) Dicat. Lucae Ghini, Bononiensi.

G i b b e r a Fries cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 295: g. Hypospileor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 133: g. Sphaeriaceor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 402: g. Gibbereor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Sphaeropsideor.

G i b b e r e i Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 402: div. Dichaenaceor. Gen.: Gibbera, Dichaena, Excipula.

G i b b e r i d e a Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 395: subg. Sphaeriae. (S. Berberidis.)

G i e s e c k i a Rchb. vid. *Gisekia Linn.*

G i e s e k i a Agardh 1825. Aphor. p. 218: g. Phytolaccear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 238. n. 1255: g. Sedear.? — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 590; II. p. 1036.
Endl. 1840. Gen. n. 5261. p. 977; 1841. Ench. p. 508: g. Giesekiear. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 26. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1014.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 509: g. Phytolaccacear.
Gisekia Linn.

G i e s e k i e a e Endl. 1840. Gen. p. 977; 1841. Ench. p. 508: trib. Phytolaccear. Gen.: Microtea, Giesekia, Phytolacca, Ercilia. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 26. Gen.: Gieseckia, Pircunia, Phytolacca. *(Synon. Sarcocidia pt. Rafin.)*
Vid. Gisekieae Rchb.

G i e s l e r i a Regel 1848. Ind. sem. h. Turic.; 1849. Flora I. p. 181: nov. g. Gesnerear. (Achimenes picta.) *Cf.* Linnaea XXIV. p. 198. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1069.
= Tydaea Decne.

G i f o l a*) Cassini 1819. Bull. soc. philom. Sept. p. 142; 1820. Dict. v. 18. p. 531: nov. g. Gnaphaliear. (Filago germanica L.)
Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 564: g. Inulear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2452. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 140.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Filaginear.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1454; 1831. Fl. exc. p. 223: sect. Gnaphalii.
Less. 1832. Syn. p. 333: g. Helichrysear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 247: sect. Filaginis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2752 *a.* p. 448; 1841. Ench. p. 243. — Fenzl 1839. Flora II. p. 746. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3472. 2. — Coss. & Germ. 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 284. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 195. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 616. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 191.
Synon. Impia Dodon.

*) Anagramma vocis Filago.

Gigalobium P. Browne 1756. Jamaic. p. 362: nov. g. Dioec.
= Entada Adans.

Gigandra „Salisb." Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 621: subsect. Ectasis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *a* 8. p. 1411; 1841. Ench. p. 370. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4887. 1 *h*.

Gigantea Stackhouse 1816. Ner. brit. ed. alt. *Cf.* Spreng. n. Entd. I. p. 94 et Leman 1820. Dict. v. 18. p. 532.
= Laminariae Lamx. pars.

Gigartina*) Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 55. 74: nov. g. Fucor. (G. pistillata; an Fucus Oederi Esp.?)
Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 134; 1813. Essai p. 49: g. Floridear. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 18. p. 532. — Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 371. Sect.: Gelidium, Hypnea, Gigartina. — Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 364. (emend.) — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 399; 1841. Brit. Alg. p. 73. — Menegh. 1838. Cenni p. 40. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. . . . — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 159. — Math. 1853. Belg. II. p. 482.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 42: g. Phycoidator.
Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 299: sect. Fuci.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 150. t. 19: g. Gigartinear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phyc. gener. p. 402; 1845. Phyc. germ. p. 303; 1849. Sp. Alg. p. 749. n. 498.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 488: g. Ceramiacear., et ibid. p. 28. n. 490 *a*: sect. Rhodomelae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Sphaerococcear. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 126. — Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 301.
Grev. 1830. Alg. Brit. p. 146.
Endl. 1836. Gen. n. 94 *f*. p. 8; 1841. Ench. p. 6: sect. Sphaerococci.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 724: g. Plocamiear.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 103: g. Coccocarpear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 41. n. 122/$_{49}$. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 175. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 152. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): g. Sphaerococcoidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Coccocarpidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Chondrear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 174: g. Eugigartinear. Sect.: Eugigartina, Mastocarpus.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 251: g. Cryptonemiacear.
Synon. Mammillaria Stackh.

*) γίγαρτον, drupa.

Gigartineae Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 149: fam. Florideor. Gen.: Gigartina, Acanthophora, Hypnaea.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phyc. gener. p. 389. 395: fam. Periblastear. Gen.: Iridaea, Chondrodictyon, Grateloupia, Mastocarpus, Chondrus, Chondracanthus, Euhymenia, Constantinea, Callophyllis, Sarcophyllis, Solieria, Furcellaria, Gigartina. — Par. Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 301 (restrict.); 1849. Sp. Alg. p. 724. Gen. ut 1843 (exceptis Chondracantho, Callymenia et Constantinea) et Sarcothalia, Chondroclonium, Gloeocladia, Euhymenia, Neurocaulon, Chondrococcus, Hydropuntia.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106: trib. Centrothalamar. Subtrib.: Caulacantheae, Eugigartineae, Gelidieae, Euctenodeae, Sarcophyceae, Agareae.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 159: subordo Cryptonemiacear. Trib.: Tylocarpeae, Kallymenieae, Eugigartineae, Endocladieae,

Gigartinites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 32; 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 59: g. foss. Fucoidar.

Gigarum „Caesalp." Endl. 1837. Gen. n. 1676 *a*. p. 235; 1841. Ench. p. 128: sect. Ari. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 23. — Griseb. 1844. Rumel II. p. 474.

Gijefa Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 14. 67: sect. Turiae. (T. Gijef Forsk.)

Gilberta Turczan. 1851. Bull. soc. Mosc. XXIV. 2. p. 192: nov. g. Cassiniacear., habitu Helichryseis simile. (G. tenuifolia.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 260 inter Angiantheas.

Gilia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 25. t. 4; 1799. Fl. peruv. II. p. 17: nov. g. Pentandr. Monogyn.
Pers. 1805. Ench. I. p. 187. n. 425: g. Polemonidear.
Hedw. 1806. Gen. p. 106. n. 474: g. Convolvulear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 625. n. 666; 1830. Gen. I. p. 153. n. 766: g. Polemoniear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 685. — Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179). Subgen. ut Endl. (Welwitschia loco Collomioidis) et Courtoisia?
Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3024: g. Polemoniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 189. — Endl. 1839. Gen. n. 3821. p. 657; 1841. Ench. p. 327 (*Gillia*). Sect.: Collomioides, Linanthus, Leptosiphon, Dianthoides, Dactylophyllum, Ipomopsis, Eugilia, Navarretia. — Brongn. 1843. En. genr. p. 54. — Benth. 1845 in DC. Pr. IX. p. 310. Sect.: Collomioides, Pseudocollomia, Eugilia, Ipomopsis, Dianthoides, Linanthus, Dactylophyllum, Microgilia, Leptosiphon, Leptodactylon. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 368 (*Gillia*).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: g. Polemonear.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VII. p. 287.

*) Dicat. Phil. Gili, botan. Hispano,

Gilia Benth. 1833. Bot. Regist. n. 1622: g. Polemoniacear. restrictum. Sect.: Dactylophyllum, Ipomopsis, Eugilia. *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 22 et Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 86. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 244. Sect. eaed. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 74. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 636.
Rchb. 1837. Hdb. p. 194; 1841. Nom. p. 113. n. 4386: g. Giliear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 116.

Gilibertia Gmel. 1791. Syst. p. 682: g. Decandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 551. n. 839.
= Quivisia Comm.

Gilibertia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 50. t. 8; 1802. Fl. peruv. III. p. 75. t. 312: g. Heptandr. Heptagyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 404. n. 914. — Hedw. 1806. Gen. p. 260. n. 1053.
Cram. 1803. Disp. p. 156 in Monadelph. Octandr. et p. 159 in Monadelph. Decandr.
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 539: g. Araliacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3786; 1837. Hdb. p. 221. — DC. 1830. Pr. IV. p. 255. — Bartl. 1830. Ord. p. 238. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 387. — Meisn. 1838. Gen. p. 152 (109). — Endl. 1839. Gen. n. 4554. p. 794; 1841. Ench. p. 393. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 113. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 114. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 169. n. 1407; 1830. Gen. I. p. 297. n. 1528: g. Araliear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1224. 1226. — Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5544.
Synon. Waugenheimia Dietr.; Ginnania (Ginannia?) Dietr.

Gilieae Rchb. 1837. Handb. p. 194: subdiv. Polemoniariar. Gen.: Welwitschia, Linanthus, Leptosiphon, Fentzlia, Gilia, Aegochloa, Courtoisia, Collomia, Hoitzia, Cantua.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 108: sect. Polemoniacear. Gen. ut Rchb. et Caldasia, Navarretia, Dactylophyllum, Ipomopsis, Löselia.
Rchb. 1841. Nom. p. 113: subdiv. Polemoniear. Gen. fere ut antea et Navarretia, Rossmässlera, Dactylophyllum, Ipomopsis, Caldasia.

Gilioides Benth. 1845 in DC. Prodr. IX. p. 308: sect. Collomiae.

Gillena Adans. 1763. Fam. II. p. 166: g. Vaccinior.
= Clethra Linn.

Gillenia**) Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 286: nov. g. Calycostemonis. (Spiraea trifoliata L.)
Nutt. 1818. Gen. I. p. 307: g. Icosandr. Pentagyn. — Par. Elliott 1821. Sketch I. p. 561.

*) Dicat. Joanni Emman. Gilibert.

**) Dicat. Arn. Gillenio, medico Cassellano.

Gillenia Mönch cont.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 866: g. Spiraear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4451; 1841. Nom. p. 168. n. 6513. (genuinar.) — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 209 (*Gillonia*).
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 540: g. Rosacear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 412. n. 2058. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 128.
Cambess. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 239. 387: sect. Spiraeae. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 103 (73).
DC. 1825. Pr. II. p. 546: g. Spiraeacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. — Bartl. 1830. Ord. p. 404. — Link 1831. Hdb. II. p. 97. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 521. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 447.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 418: g. Spiraear.
Endl. 1840. Gen. n. 6393. p. 1248; 1841. Ench. p. 660: g. Spirear. verar.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 125: g. Spireacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Spiraeidar.

Gillia Endl. Gen. Suppl. I. p. 1403, Ench. p. 327; Suppl. II. p. 60 et A. Juss. in Orb. Dict. X. p. 368: vid. *Gilia Ruiz & Pav.*

Gilliesia*) Lindl. 1826. Bot. Regist. XII. t. 992 (Ann. sc. nat. IX. p. 266): nov. g. Gilliesiear. (G. graminea.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1356; 1841. Nom. p. 49. n. 1815.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 44; 1830. Gen. I. p. 42. n. 189: g. Triandr. Monogyn. — Par. Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 383. 401. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 162.
Bartl. 1830. Ord. p. 51: g. Asphodelear. desciscens, Allio aff.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 351; 1847. Veg. kd. p. 197: g. Gilliesiccear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1174. p. 152; 1841. Ench. p. 87. — Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301).
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 27. t. 137. 138.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 21: g. Gilliesiar.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 487: g. Allieis aff.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 255: g. Alliear.

Gilliesiaceae Lind. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 348; 1847. Veg. kingd. p. 196: ordo Liliacear. Gen.: Gilliesia, Miersia.
Endl. 1837. Gen. p. 152; 1841. Ench. p. 87: fam. Coronariar., Asphodeleis aff. Gen.: Gilliesia, Miersia.
Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301): subordo Liliacear. Gen. ead.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Homoblastear.

*) Dicat. Dr. Gillies, detectori plantae.

Gilliesiae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 21: fam. Lirioidear. Gen.: Gilliesia, Miersia.
Gilliesieae Lindl. 1826. Bot. Regist. t. 992 (Ann. sc. nat. IX. 1826. p. 266): nova fam. plant., inter Asphodeleas, Cyperaceas et Restiaceas ambigua. Gen.: Gilliesia, Miersia.
Rchb. 1828. Consp. p. 65: subdiv. Asphodelear. Gen. ead. et Brodiaea.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (248) Hexapetaloidear.
Lindl. 1833. Nix. p. 34: ordo Lilialium.
Mart. 1835. Consp. p. 7: ordo 30.
Rchb. 1841. Nom. p. 49: subsect. Anthericear. Gen. ut Lindl.
Gillonia A. Juss. vid. *Gillenia Mönch.*
Gimbernatia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 138. t. 36: nov. g. Polygam. Monoec. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 981. n. 1890.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 883; 1825. Syst. II. p. 359. n. 1684. g. Bucidear.
= Chuncoa Pav.
Ginalloa Korthals . . . . Verh. Bat. Genootsch. XVII. p. 260; . . . . Loranth. jav. p. 64: nov. g. Loranthacear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $4584/_1$. p. 1415; 1841. Ench. p. 399. — Walp. 1843. Rep. II. p. 439. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 791.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2712: g. Viscear.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 807: g. Viscacear.
= Viscum Tourn.? (Meisn. Comm. p. 360.)
Ginannia**) Scopoli 1777. Introd. p. 300. n. 1366: g. Leguminosar. spuriar. *Cf.* Juss. 1820. Dict. v. 18. p. 541.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 271. n. 691: g. Enneandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 653.
Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.
= Paloue Aubl.
Ginannia Dietr. vid. *Ginnania.*
Ginannia Endl. 1843. Spl. III. p. 40. n. $122/_{44}$: g. Gasterocarpear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Gasterocarpidar.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 149: g. Halymeniear.
= Ginnania Mont.
Gingidium (alterum) Dodon. 1583. Pempt. 792.
Herm. 1687. Hort. Lugd. Bat. cat. p. 291.
= Visnaga Rivin., Gärtn.
Gingidium***) Forst. 1776. Char. gen. p. 41. t. 21: nov. g. Pentandr. Digyn.
Juss. 1789. Gen. p. 221: g. Umbelliferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 471. —

*) Dicat. Ant. de Gimbernat, chirurgo Madrit.
**) Dicat. Gius. Ginanni.
***) γιγγίδιον, nomen herbae umbelliferae apud Dioscoridem.

Gingidium Forst. cont.
Hedw. 1806. Gen. p. 198. n. 813. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 542.
Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3708 *c:* sect. Ligustici.
Ligusticum Linn.
Gingidium Müll. . . . . Fragm. phyt. Austral. p. 15: g. emendat.
Klatt 1858. Linnaea XXIX. p. 717: g. Selinear.
Ginginsia*) DC. 1828. Prodr. III. p. 362: nov. g. Portulacear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 234. n. 1232. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 83. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1015.
Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4278: g. Spergulear.
Bartl. 1830. Ord. p. 302: g. Mollnginear.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205: g. Alsinear. (sect. 2.)
= Pharnacei Linn. pars.
Ginkgo Kämpf. 1712. Amoen. exot. p. 811 c. ic. (inter plantas pomiferas et nuciferas.)
Linn. 1771. Mant. II. p. 313: in Appendice. — Par. Pers. 1797. Syst. p. 1024.
Pers. 1807. Ench. II. p. 573. n. 2111: g. Monoec. Polyandr. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 543.
Agdh. 1825. Aphor. p. 212 (*Ginko*): g. Taxinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 96.
Rchb. 1828. Consp. p. 79. n. 1697: g. Taxinear. — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 298. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 135; 1849 in Orb. Dict. IV. p. 181.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: g. Phyllocladear.
= Salisburia Smith.
Ginko Agardh vid. *praeced.*
Ginnania Necker 1790. Elem. bot. II. p. 451. n. 1285: g. Chorisophytor.
= Paloue Aubl.
Ginnania Montagne 1840 in Webb & Berth. Phytogr. Canar. IV. p. 162 adnot.: nov. g. Gasterocarpear, jam a Lamouroux pro Halymenia furcellata Ag. indicatum.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 715. n. 476: g. Halymeniear.
Synon. Myelomium Kütz., Ginannia Endl.
Ginnania Dietr . . . . (*Ginannia* ex Steud. Nom. I. p. 684.)
= Gilibertia Ruiz & Pav.
Ginnania Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 79. 90: nov. g. Meliear. (Quivisia racemosa Pers. et oppositifolia Cav.)
Ginora „Jacq. Amer. 22" Linn. 1762. Spec. ed. II. p. 642; 1764. Gen. ed. VI. p. 240. n. 605; 1767. Syst. ed. XII. p. 329: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 372; 1784. Syst. p. 447. — Reich. 1778. Gen. p. 247. n. 661. — Gmel. 1791. Syst. p. 754. — Pers. 1797. Syst. p. 479.
Gled. 1764. Syst. p. 273. n. 1122: g. Calycostemonum.

*) Dicat. Fred. de Gingins-Lassaraz.

Ginora „Jacq." Linn. cont.
Scop. 1777. Intr. p. 211: g. Dumosar.
Neck. 1790. El. II. p. 119. n. 794: g. Plyrontophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 79: g. Salicariear.
= Ginoria Jacq.

Ginoria*) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 148. t. 91: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 323. n. 826. — Willd. 1799. Sp. II. p. 871. n. 953.
Juss. 1789. Gen. p. 331: g. Salicariar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 9. n. 1184 (*Genoria*). — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 710; 1825. Syst. II. p. 457. n. 1767; 1830. Gen. I. p. 391. n. 1961. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 15.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 300: g. Calycanthemar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 176: g. Lythrariar. — Par. Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 545. — Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 454.
DC. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 73; 1828. Pr. III. p. 91: g. Salicariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4572; 1841. Nom. p. 172. n. 6655. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 722. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 437. — Meisn. 1838. Gen. p. 118 (84). — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 544.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Lythrear. Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575.
Endl. 1840. Gen. n. 6155. p. 1202; 1841. Ench. p. 643: g. Eulythrariear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 118: g. Lythrariear.
Synon. Ginora Linn.

Ginoria Fl. mexic. ined.
= Heimia Link & Otto.

Ginsen Adans. 1763. Fam. II. p. 102: g. Ginsenum.
= Panax Linn.

Ginsen Adans. 1763. Fam. II. p. 102: sect. 8 Umbellatar. Gen.: Lagoecia, Echinophora, Apradus, Solandra, Ginsen, Aralia, Hedera.

Girardia**) Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 287: nov. g. Bangidear. (Bangia atrovirens Lyngb.)
= Stigonema Agdh.

Girardinia***) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 498: nov. g. Urerear. (Urtica palmata Lesch., etc.) — Par. Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 24. — Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 180 (*cf.* Flora 1855. p. 516); 1857. ibid. VII. p. 357.
Dcne . . . . in Jacquem. voy. p. 151. t. 153.
Endl. 1837. Gen. n. 1879 *e*. p. 283; 1841. Ench. p. 170: sect. Urticae.

*) Dicta in memoriam Marchionis C. Ginori, Liburni.
**) Dicat. Jean Girard, prof. Paris.
***) Dicat. J. Girardin.

Girardinia Gaudich. cont.
Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259): g. Urticacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 262. — Endl. 1847. Spl. IV. p. 37. n. 1879/$_1$. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 645. — Blume 1855. Mus. bot. Lugd. II. p. 158.
Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2486: g. Urticear. (genuinar.) — Par. Miq. 1851. Pl. Jungh. I. p. 31.

Gireoudia*) Klotzsch 1855. Begon. p. 204: nov. g. Begoniacear. (B. Barkerii Knowl. & W.) — Par. Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 339.

Girgensohnia**) „Bunge mss". Fenzl 1851 in Ledeb. Fl. Ross. III. p. 835: nov. g. Anabasear. (Halogeton appositiflorus M.) — Par. Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 302; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 478. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 739.

Giroa „Cav." Hedw. Steud. vid. *Guioa Cavan.*

Girodella***) Gaillon 1833. Obs. lim. régne vég. (Turp. Atl. I. t. 27. 28): nov. g. Nemazoariar. Naviculear. eleutheriear. (Conferva comoides L.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. I. 1834. p. 44.
= Hydrolinum Link.

Gironniera Gaudich. Voy. de la Bonite t. 85.
Planch 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 338: g. Celtidear. — Par. Blume 1853. Mus. bot. Lugd. II. p. 72.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 408: g. Celtidacear.
Synon. Nemostigma Planch.

Girtanneria Necker 1790. Elem. bot. II. p. 121. n. 798: nov. g. Plyrontophytor., a Rhamno L. disjunctum.
= Rhamnus Linn.

Giseckia Willd., Schult. vid. *seq.*

Gisekia†) Linn. 1771. Mant. II. p. 554. n. 1340: g. Pentandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 251; 1784. Syst. p. 304. — Reich. 1778. Gen. p. 157. n. 422. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 207. n. 532. — Gmel. 1791. Syst. p. 515. — Pers. 1797. Syst. p. 325; 1805. Ench. I. p. 337. n. 752. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1547. n. 593 (*Giseckia*). — Roxb. 1798. Corom. II. p. 43. t. 185. — Schult. 1820. Syst. VI. p. LXVII. 735 (*Giseckia*).
Scop. 1777. Intr. p. 249: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 315: g. Portulacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 264. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 141. — Hedw. 1806. Gen. p. 212. n. 873. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 842. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 580.
Neck. 1790. El. II. p. 301. n. 1076: g. Synathrophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 38: g. Fimbriatar.

*) Dicat. Gireoud, hortul. Berol.
**) Dicat. G. C. Girgensohn, de cognitione muscorum Livoniae meritissimo.
***) Dicat. Girod-Chantrans, phycologo.
†) Dicat. Paulo Frid. Gisecke, medico Hamburg.

Gisekia Linn. cont.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 971. n. 1151: g. Sedear.
Bartl. 1825. Beitr. II. p. 143; 1830. Ord. p. 299: g. Phytolaccear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 166. n. 6450 (*Gieseckia*).
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: g. Trianthemear.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4400: g. Galeniear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 239: g. Gisekiear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 322 (235).
Synon. Giesekia Agdh., Endl. etc.; Kölreutera Murr.; Miltus Lour.; Mittus St. Hil.

Gisekieae Rchb. 1837. Handb. p. 239: subdiv. Aizoidear. genuinar. Gen.: Gisekia, Poranthera.
Meisn. 1841. Gen. p. 322 (235): trib. Phytolaccear. Gen.: Microtea, Gisekia, Phytolacca, Ercilla, Augea?, Tryphera? *Conf.* Giesekieae Endl.

Gisopteris*) Bernhardi 1800 in Schrad. Journ. II. p. 129: nov. g. Filicum agyratar. (Hydroglossum palmatum W.) *Cf.* Leman 1820. Dict. v. 18. p. 581.
Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 359: sect. Lygodii.
= Lygodium Swartz.

Gissanthe Salisb. 1812 in Trans. hort. soc. I. (1815.) p. 279: nov. g. Cannear. (Alpinia spiralis Jacq.) An *Glissanthe* in ed. prima, citante Endl.?
= Costus Linn.

Gissonia Salisb. 1806. Parad. p. 67.
= Leucadendron Herm.

Gissorhiza Salisb. vid. *Geissorhiza Gawl.*

Githago Adans. 1763. Fam. II. p. 255: g. Alsinium.
Desf. . . . . Catal. p. 159.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 248: g. Caryophyllear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 119. — Hedw. 1806. Gen. p. 336. n. 1324.
Pers. 1805. Ench. I. p. 519: sect. Agrostemmae. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 826.
DC. 1805. Franç. IV. p. 764; 1824. Pr. I. p. 387: sect. Lychnidis. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 650. — Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5362 *a*. — Koch 1836. Syn. p. 107. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 194. — Endl. 1840. Gen. n. 5250 *a*. p. 974; 1841. Ench. p. 506.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 417: g. Silenear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 249. — A. Braun 1839. Flora I. p. 320. — Endl. 1842. Spl. II. p. 79. n. 5250/$_1$. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 165.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298; 1841. Nom. p. 206. n. 7834: g. Lychnidear. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 332.
Webb & Berth. . . . . Canar. I. p. 143: g. Caryophyllacear.
Synon. Agrostemma Medic., Fries.

*) γείσον, subgrandium s. episporangium.

Githopsis*) Nuttall 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 258: nov. g. Campanulacear. (G. specularioides.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1052.

Gitonanthia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87: fam. Osaritae. Subfam.: Fediacea, Valerianea, Triostinia.

Gitonoplesium Kunth vid. *Geitonoplesium.*

*Gitonophytum***) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 151: gen. 6 plantar. Spec. natur.: Arctopus, Hermas, Solandra, Panax, Echinophora, Lagoecia, Hedera, Psedera, Cissus, Aralia, Phyllis, Vahlia.

Givotia Jack . . . . Calcutta journ. IV. p. 388: nov. g. Euphorbiacear., Rottlerae aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 381: g. Crotonear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 626. — Endl. 1850. Spl. V. p. 89. n. 5802/$_1$. — Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 24. t. 1889.
Griff. . . . . Pl. ht. Calc. p. 14.
Baill. 1858. Euphorb. p. 389: g. Crotonidear.

Glabella Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 166: sect. Asperulae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 23. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 462.

Glabraria Linn. 1771. Mant. II. p. 156. n. 1320: g. Polyadelph. Polyandr. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 19. p. 1. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 581; 1784. Syst. p. 697. — Reich. 1778. Gen. p. 389. n. 975. — Lour. 1790. Coch. II. p. 471. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 515. n. 1219. — Gmel. 1791. Syst. p. 1153. — Pers. 1797. Syst. p. 736. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1433. n. 1393.
Scop. 1777. Intr. p. 277: g. Icosandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 433: g. incertae sedis.
Neck. 1790. El. II. p. 399. n. 1219: g. Phalarsiphytor.
Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 382: g. Polyadelph. Icosandr.
Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 480: g. Laurinear.
Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. 24. p. 372: sect. Tetrantherae.
Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 940: g. Tetrantherear.
= Tetrantherae Jacq. pars.

Gladiales Batsch 1802. Tab. affin. p. 142: ordo Liliacear. Fam. unica: Ensatae.

Gladioleae Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 316: ordo Monocotyledonum. Gen.: Crocus, Trichonema, Hyalis, Tritonia, Sparaxis, Ixia, Dichone, Hesperanthus, Gissorhiza, Rochea, Acaste, Anomaza, Watsonia, Antholyza, Petamenes, Homoglossum, Gladiolus.
Rchb. 1828. Consp. p. 59 (1830. Fl. exc. p. 83); 1837. Hdb. p. 150; 1841. Nom. p. 43: div. Iridear. Gen.: Diasia, Diplarrhena, (1841 emissa), Gladiolus, Montbretia, Watsonia, Antholyza, Ovieda, Anomatheca, Waitzia, Sparaxis, Babiana et(1841)Galaxia.

*) Nomen ob similitudinem cum floribus Githaginis segetum.
**) γειτονέω, vicinus sum; φυτόν, planta.

Gladioleae Salisb. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: trib. Iridear. Gen.: Gladiolus, Antholiza, Tritonia, Watzonia, Diasia, Lapeyrousia, Diplarrhena, Anisanthus, Synnotia. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 3. Gen.: Gladiolus, Antholyza, Montbretia, Watsonia, Diplarrhena.

Gladiolus Tourn. 1700. Inst. p. 365. t. 190: g. pl. class. IX. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 242. Ed. Hall. 1745. p. 249.
Linn. 1737. Gen. p. 10. n. 27; 1737. Cliff. p. 20; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 16; 1753. Sp. I. p. 36; 1759. Syst. ed. X. p. 862. n. 55; 1762. Sp. ed. II. p. 52; 1764. Gen. ed. VI. p. 26. n. 57; 1767. Syst. ed. XII. p. 76: g. Triandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 37. — Murr. 1774. Syst. p. 76; 1784. Syst. p. 86. — Reich. 1778. Gen. p. 27. n. 63. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 35. n. 77. — Lour. 1790. Coch. I. p. 36. — Gmel. 1791. Syst. p. 110. — Pers. 1797. Syst. p. 87; 1805. Ench. I. p. 43. n. 101. — Willd. 1797. Sp. I. p. 208. n. 94; 1809. En. p. 58. — Vahl 1806. Enum. II. p. 77. n. 98. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 101. — Thunb. 1818. Fl. cap. I. p. 170. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 409. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 63. 95.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 279: g. Liliacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 88.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 159. n. 650: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 527.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27; 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170. — Batsch 1802. Tab. p. 143. — Gawl. 1805. Ann. of bot. I. p. 230.
Adans. 1763. Fam. II. p. 60: g. Iridum. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 58.
Hill 1769. Ht. kew. p. 325: g. Monopetalar. incompletar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 247; 1789. Phil. Bot. I. p. 93.
Neck. 1790. El. III. p. 172. n. 1526: g. Ymnodiphytor.
Wendl. 1798. Bot. Beob. p. 4. t. 1. f. 4—6.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 193: g. Iridear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 147. — DC. 1805. Franç. III. p. 240. — Hedw. 1806. Gen. p. 24. 353. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 342. 405. n. 128. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 259. — Lois. 1821. Dict. v. 19. p. 38 (*Glayeul*). — Link 1821. En. I. p. 53; 1829. Hdb. I. p. 217. — Schrank 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. (verar.) — Agdh. 1823. Aphor. p. 172. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 128. — Endl. 1837. Gen. n. 1239. p. 168; 1841. Ench. p. 98. — Koch 1837. Syn. p. 699. Ed. II. p. 805. — Kunth 1838. Berol. II. p. 255. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 155. — Meisn. 1842. Gen. p. 392 (294). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 23. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 371. — G. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 231 (*Glayeul*). — Webb 1850. Canar. III. p. 313. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 106. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 247.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 325: g. Gladiolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1190; 1830. Fl. exc. p. 83; 1841. Nom. p. 43. n. 1575. Sect. (1828): Gladiolus, Hebea, Lemonia. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 76.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 151. n. 155; 1830. Gen. I. p. 38. n. 168: g. Spathacear.
Eckl. 1827. Verz. p. 37: g. Gladiolor.
Steven 1829. Mém. Mosc. VII. p. 269.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Hebea et Lemonia Pers.; Homoglossum Sal.; Synotia s. Synnetia, Streptanthera, Bertera et Sphaerospora Sweet.

Gladiolus Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 31. t. 11. f. 4. (Antholyza Cunonia L.)
= Antholyza Linn

Glaeoporus Lindl. vid. *Gloeoporus Mont.*

Glaeoprium Berkeley 1825. Trans. Edinb. soc. II. p. 119: nov. g. Desmidiear. (Desmidium mucosum.) *Cf. Gloeoprium.*

Glandiloba Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. p. 220 (Linnaea VIII. Litt. p. 84): sect. Panici. (P. molle, etc.) *Cf.* Steud. Glum. I. p. 59.
= Brachiariae Trin. sp.

Glandonia Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 23: nov. g. Malpighiear. (Burdachia macrocarpa Benth. in Pl. Spruc.)

Glandularia Gmel. 1791. Syst. p. 920: g. Didynam. Gymnosperm. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 19. p. 23.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 239: g. Verbenear.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 550; 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 193: sect. Verbenae.
Synon. Uwarowia Bunge; Shuttleworthia Meisn.; Shuttelworthia Steud.

Glandularia DC. 1836. Prodr. V. p. 320: sect. Psiadiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2368 *b*. p. 384; 1841. Ench. p. 235. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3323. 2.

Glandularia J. Agardh 1848. Spec. Fucoid. p. 274. 306: trib. Eusargassi.

Glandulifolia Wendl. 1808. Collect. plant. I. p. 35. t. 10: nov. g. Decandr. Monogyn. (G. umbellata, etc.) *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 23.
= Adenandra Willd.

Glaphiria Spach vid. *Glaphyria Jack.*

Glaphyranthus*) Endl. 1840. Gen. n. 6303 *c*. p. 1229; 1841. Ench. p. 650: sect. Metrosideri.
= Kunzea Rchb.

Glaphyria Jack 1823. Linn. Trans. XIV. 1. p. 128: nov. g. (Icosandr. Monogyn.) Myrtacear. *Cf.* Isis 1825. p. 79. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 295 (dubium). —

*) γλαφυρός, politus.

Glaphyria Jack cont.
G. Don 1831. Gen. syst. II. p. 871 (sphalm. *Glayphyria*). — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 106 (*Glaphiria*). — Endl. 1840. Gen. n. 6339. p. 1236; 1841. Ench. p. 651. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 37. 74.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 489. n. 1826; 1830. Gen. I. p. 405. n. 2027: g. Myrtear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738.
Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4466: g. Pomacear.?
Meisn. 1838. Gen. p. 109 (77): g. Barringtoniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 175. n. 6802: g. Lecythidear.?

Glaphyropteris Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 343 in adnot.: nov. g. Grammitidear. (Alsophila pilosa Mart.)
= Polypodii sp. Fée.

Glastaria Boissier 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 382: nov. g. Cruciferar. (Peltaria glastifolia DC.)
Boiss. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 203: g. Isatidear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Walp. 1842. Rep. I p. 146: g. Alyssinear.
= Texiera Jaub. & Spach.

Glastum*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 56. Ed. Hall. 1745. p. 63: g. pl. class. IV.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 242; 1821. Syst. II. p. 568; 1824. Pr. I. p. 210: sect. Isatidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4734 *b*. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 204. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 224. — Endl. 1839. Gen. n. 4938 *a*. p. 881; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 211.

Glauceae Rchb. 1837. Handb. p. 204; 1841. Nomencl. p. 124: subdiv. Lysimachiear. Gen.: Glaux.

Glaucena „Burm." Steud. Nomencl. I. p. 687: vid. *Claucena Burm.*

Glaucidium Sieb. & Zucc. 1845. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. IV. 2. p. 184. t. 1 B; 1845. Fl. jap. fam. I. p. 76: nov. g. Paeoniear. *Cf.* Flora 1846. p. 430. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 14. — Endl. 1850. Spl. V. p. 30. n. $4804/_1$.

Glaucineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: trib. Primulacear. Gen.: Glaux.

Glaucium)** Tourn. 1700. Inst. p. 254. t. 130: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 64. Ed. Hall. 1745. p. 71: g. pl. class. IV.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 304: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 248. (Chelidonium Glaucium L.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 432: g. Papaverum.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 141: g. Rhoeadum.

Glaucium Tourn. cont.
Scop. 1772. Carn. I. p. 369: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Willd. 1809. En. p. 561. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 7. — MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 362.
Scop. 1777 Intr. p. 272: g. Polyandrar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 265; 1789. Phil. Bot. I. p. 111. (Chelidonium corniculatum et flavum.)
Juss. 1789. Gen. p. 236: g. Papaveracear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 92. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 496. — Pers. 1807. Ench. II. p. 61. n. 1254. — DC. 1821. Syst. II. p. 94; 1824. Pr. I. p. 122. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 702. — Lois. 1821. Dict. v. 19. p. 29. — Link 1822. En. II. p. 68; 1831. Hdb. II. p. 279. — Presl 1826. Sicul. I. p. 33. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 418. 426. — Bartl. 1830. Ord. p. 261. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 137. — Koch 1836. Syn. p. 30. Ed. II. p. 32. — Webb 1836. Canar. I. p. 55. — Meisn. 1837. Gen. p. 7 (9). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 62. (verar.) — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 92. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 223. — Brongn. 1843. En. genr. p. 94. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 431. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 61. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 255.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 165. t. 115.
Cram. 1803. Disp. p. 118: g. Dodecandr. Monogyn.
Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 496: g. Siliquosar.
DC. 1805. Franç. IV. p. 635: sect. Chelidonii.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 727; 1825. Syst. II. p. 571. n. 1888; 1830. Gen. I. p. 423. n. 2102: g. Papaverear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4851; 1832. Fl. exc. p. 699. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 463. — Endl. 1839. Gen. n. 4826. p. 857; 1841. Ench. p. 443. (verar.) — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 291. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 174.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Chelidoniacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 52: g. Chelidoniear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 264; 1841. Nom. p. 184. n. 7069. (genuinar.)
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 30: g. Chelidoninear.

Glaucoides Rupp. 1718. Fl. jen. p. 21. Ed. Hall. p. 20: g. pl. class. I.
= Glaux Tourn.

Glaucoides*) Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 21. t. 18: g. pl. class. VI.
= Peplis Linn.

Glaucophylla**) Batsch 1802. Tab. affin. p. 267: ordo Cryptogamor. Fam. unica: Algoidea.

Glaucopis Brid. mss.
= Dicrani Hedw. pars.

*) Nomen ex Plinio.
**) γλαύκιον Dioscoridi herba quae vulnerata praebet succum luteum.

*) Etym.: „ad Glauca accedens."
**) γλαυκός, caesius.

Glaucoreseda J. Müll. 1857. Mon. Piséd. p. 196: sect. Resedae.

Glaux*) Tourn. 1700. Inst. p. 88. t. 60: g. pl. class. I.

Linn. 1737. Gen. p. 35. n. 97; 1737. Cliff. p. 43; 1740. Syst. p. 20; 1753. Sp. I. p. 207; 1759. Syst. ed. X. p. 943. n. 257; 1762. Sp. ed. II. p. 301; 1764. Gen. ed. VI. p. 114. n. 291; 1767. Syst. ed. XII. p. 188. n. 288: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 207; 1784. Syst. p. 249. — Reich. 1778. Gen. p. 118. n. 314. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 159. n. 408. — Gmel. 1791. Syst. p. 428. — Pers. 1797. Syst. p. 261; 1805. Ench. I. p. 262. n. 593. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1210. n. 466; 1809. En. p. 272. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 160.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Calycanthemor.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salicariar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 333. — Batsch 1802. Tab. p. 79. — DC. 1805. Franç. IV. p. 411. — Lois. 1821. Dict. v. 19. p. 29.

Adans. 1763. Fam. II. p. 231: g. Anagallidum.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Calycanthemar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 332. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 305.

Gled. 1764. Syst. p. 265. n. 1096: g. Calycostemonum.

Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 87: g. Oliganthérar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 329: g. Monopetalar. incompletar.

Rüling 1774. Ord. pl. p. 35: g. Primulas et Epilobia conjungens.

Scop. 1777. Intr. p. 187: g. Speciosar.

Neck. 1790. El. II. p. 26. n. 648: g. Darinyphytor.

Mönch 1794. Meth. p. 630: g. Petalostemonis.

Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 87. t. 187.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 178: g. Lythrariar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 175. n. 732. — Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 454.

Dutour de Salvert & A. St. Hil. 1815. Mém. Mus. II. p. 395: g. Primulacear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLII. 514. n. 1026. — Link 1821. En. I. p. 161; 1829. Hdb. I. p. 207. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 733. — Koch 1837. Syn. p. 593. Ed. II. p. 681.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 890; 1825. Syst. I. p. 825. n. 936; 1830. Gen. I. p. 204. n. 1042: g. Primulear. — Par. Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 273. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 578. 874. — Brongn. 1843. En. genr. p. 69. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 59. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 23.

Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 148: g. Rotaceis proximum.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Lythrear.

*) Nomen ex Plinio: γλαυξ graecorum.

Glaux Tourn. cont.

Rchb. 1828. Consp. p. 212b. n. 3597a: g. Trientalear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Glaucinear.

D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. VIII. p. 166: g. Plantaginear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 159.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 409: g. Lysimachinar.

Rchb. 1837. Hdb. p. 204; 1841. Nom. p. 124. n. 4833: g. Glaucear.

Endl. 1839. Gen. n. 4204. p. 732; 1841. Ench. p. 356: g. Lysimachiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 255 (164). — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 462.

Baudo 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 349: g. Anagalleidar.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 20: g. Rotacear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645: g. Primulidar.

Synon. Glaucoides Rupp.

Glaux „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 258. Ed. Hall. 1745. p. 270: g. pl. class. XI.

Medic. (Vorles. II. p. 376) 1789. Vorles. IV. 1. p. 356; 1789. Phil. Bot. I. p. 211. (Astragalus Cicer L.)

= Astragalus DC.

Glaux Vaillant 1727. Bot. Paris. p. 80. t. 15. f. 5.

= Peplis Linn.

Glayphyria D. Don vid. *Glaphyria.*

Glebionis Cassini 1826. Dict. v. 41. p. 41; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: nov. g. Chrysanthemear. verar. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 180.

DC. 1837. Pr. VI. p. 64: sect. Chrysanthemi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2671 *a.* p. 435; 1841. Ench. p. 241. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 559.

Synon. Chrysanthemum Schultz Bip.

Glechoma*) Linn. 1737. Gen. p. 171. n. 477; 1737. Cliff. p. 307; 1740. Syst. p. 25; 1745. Fl. suec. p. 175: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 388. n. 970. — Willd. 1800. Sp. III. p. 85. n. 1105; 1809. En. p. 612. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 31. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 7.

Gled. 1749. Berl. V. p. 129: g. Petalostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 163.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 242: g. Gymnospermar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 250: g. Monopetalar. irregular.

Neck. 1790. El. I. p. 321. n. 505: g. Corythophytor.

Rebent. 1804. Neom. p. 59: g. Tetrandr. Monogyn.

*) Glechoma a γλήχων Dioscoridis confectum, antiquum. (Hort. Cliff.)

Glechoma Linn. cont.
DC. 1805. Franç. III. p. 537: g. Labiatar. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 121. n. 1387. — Lois. 1821. Dict. v. 19. p. 41. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 373. — Link 1822. En. II. p. 107; 1829. Hdb. I. p. 471. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 727. n. 2094; 1831. Gen. II. p. 474. n. 2336. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 400.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 435: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2875; 1831. Fl. exc. p. 316; 1841. Nom. p. 105. n. 4083. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 183. — Koch 1837. Syn. p. 562. Ed. II. p. 646. — Kunth 1838. Berol. II. p. 103. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 201. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 131.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Catariear.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 1. 45: g. Bilabiatar.
Benth. 1834. Labiat. p. 484; 1848 in DC. Pr. XII. p. 391: sect. Nepetae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 809. — Endl. 1838. Gen. n. 3636 *f*. p. 623; 1841. Ench. p. 308. — Walp. 1845. Rep. III. p. 787. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 379.
Synon. Glecoma Linn.; Chamaecissus et Hedera terrestris Rupp.; Chamaeclema Mönch; Marmoritis Benth.

Glechon Spreng. 1827. Syst. Cur. post. p. 222: nov. g. Labiatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2870: g. Nepetear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 183. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 677.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Ocymear.
Benth. 1834. Labiat. p. 405: g. Melissinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 787. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 419. — Walp. 1845. Rep. III. p. 740. 983.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 106. n. 4118: g. Melissear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661.
Endl. 1838. Gen. n. 3619. p. 619; 1841. Ench. p. 307: g. Melissinar.
Meisn. 1840. Gen. p. 285 (193): g. Hedeomear.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 249: g. Satureiear. anomalar.
Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 175: g. Satureinear.

Glecoma Linn. 1753. Sp. II. p. 578; 1759. Syst. ed. X. p. 1099. n. 634; 1763. Sp. ed. II. p. 807; 1764. Gen. ed. VI. p. 291. n. 714; 1767. Syst. ed. XII. p. 393: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 445; 1784. Syst. p. 534. — Reich. 1778. Gen. p. 295. n. 773. — Gmel. 1791. Syst. p. 904. — Pers. 1797. Syst. p. 571.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 113. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 337. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 261.

Glecoma Linn. cont.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 367.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 247: g. Gymnospermar.
GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 355: g. Pericarpiferar.
= Glechoma Linn.

Gledisia Allion. vid. *Gleditsia Linn.*

Gleditschia*) „Linn." Scopoli 1777. Introd. p. 295: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 771 (anomal.); 1826. Syst. III. p. 918. n. 3208; 1831. Gen. II. p. 713. n. 3594. — Link 1822. En. II. p. 448. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XII. 73.
Reich. 1778. Gen. p. 545. n. 1272: g. Polygam. Monoec. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 735. n. 1596. — Pers. 1797. Syst. p. 959. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 1097. n. 1907; 1809. En. p. 1058.
Neck. 1790. El. II. p. 459. n. 1299: g. Chorisophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 566: g. Hexandr. Monogyn.
Mönch 1794. Meth. p. 68: g. Thalamostemonis.
Pers. 1807. Ench. II. p. 623. n. 2448: g. Dioec. Pentandr.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 238: g. Dioec. Hexandr.
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 479. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 428. — Meisn. 1837. Gen. p. 100 (71). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 398.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4154; 1841. Nom. p. 154. n. 6053: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 90. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6756. p. 1311; 1841. Ench. p. 674. — Brongn. 1843. En. genr. p. 133. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear. (legitimar.) — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 718.
Spach 1834. Hist. nat. vég. phan. I. p. 92. (Monogr.)
Synon. Gleditsia Linn.; Melilobus Mitch.; Gleditzia St. Hil.; Caesalpinoides Linn. (Steud.)

Gleditsia Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 480. n. 908: g. Dioec. Hexandr.
Linn. 1748. Ups. p. 298: g. Dioec. Octandr.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125: g. Thalamostemonum.
Linn. 1753. Sp. II. p. 1056; 1759. Syst. ed. X. p. 1313. n. 1025; 1763. Sp. ed. II. p. 1509; 1764. Gen. ed. VI. p. 549. n. 1159;

*) Dicat. Joh. Theod. Gleditsch, Lipsiensi.

Gleditsia Linn. cont.
1767. Syst. ed. XII. p. 678: g. Polygam. Dioec. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 771; 1784. Syst. p. 918. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 257.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 346. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 366. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 202 (*Gleditzia*). — Poir. 1820. Dict. v. 16. p. 497 (*Févier*).
Adans. 1763. Fam. II. p. 319: g. Cassiar.
Gled. 1764. Syst. p. 219. n. 910: g. Petalostemonum.
Allion. 1773. Misc. Taur. V. p. 75 (*Gledisia*): g. Hexastemonum siliquosar.
Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.
Link 1831. Hdb. II. p. 136: g. Cassiacear.
= Gleditschia Scop.

Gleditzia St. Hil. vid. *praeced.*

Gleicheinia Leman 1821. Dict. v. 19. p. 43: sphalm. pro *Gleichenia.*

Gleicheneae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 160. Ed. Nees p. 16: trib. Filicum. Gen.: Platyzoma, Gleichenia. — Par. D. Don 1825. Nepal. p. 17. Gen.: Gleichenia.
Kaulf. 1824. Enum. Fil. p. 36: ordo Filicum. Gen. ut R. Brown.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: subordo Polypodiacear. Gen. Gleicheniacear. Presl.
= Gleicheniaceae Mart.

Gleichenia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 314. n. 1716: nov. g. Sphaeroophytor., a Polypodio L. sejunctum.
= . . .?

Gleichenia*) Smith 1791. Mem. Ac. Turin. V. p. 418; 1797 in Röm. Arch. I. 2. p. 157; 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 106: nov. g. Filicum (dorsiferar.) e typo Onocleae polypodioidis L. — Par. Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 302; 1800. ibid. II. p. 132. (agyratar.) — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 8. 106 (exannulatar.); 1806. Syn. Fil. p. 165. (spurie gyratar.) — Willd. 1802. Bem. Farrenkr. (exannulatar.) — Leman 1821. Dict. v. 19. p. 43.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 39: g. Pleurogyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 33: g. Agyrator.
Willd. 1810. Sp. V. p. 70. n. 1945: g. Schismatopteridum. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 105.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 160. Ed. Nees p. 16: g. Gleichenear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 28. — Kunth 1822. Syn. I. p. 91. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 36. — D. Don 1825. Nepal. p. 17.
Agdh. 1822. Aphor. p. 116: g. Polypodiacear.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 70: g. Gleichenìar.
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 300: g. Gleicheniacear. — Par. Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 248. — Endl. 1836. Gen. n. 659. p. 64 (sect.: Gleichenia, Mertensia, Dicranopteris); 1841. Spl. I. p. 1351; 1841. Ench. p. 40. Sect.: Mertensia, Sticherus, Gleichenia. — J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 419; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 380. — Meisn. 1843. Gen. p. 435 (336). — Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 2. Subgen.: Eugleichenia, Mertensia. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 4. Sect. eaed. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 113.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 25. n. 3226; 1831. Gen. II. p. 719. n. 3617: g. Gleicheniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 39. n. 741; 1841. Nom. p. 29. n. 1043. Sect. (1841) ut Endl. 1841. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 199: g. Osmundacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 18.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.

Gleichenia Presl 1836. Pterid. p. 48: g. Gleicheniacear. restrict. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 34. — Corda 1845. Fl. Vorw. p. 89. (verar.) — Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 338. Sejungitur Gleicheniastrum.
Endl. 1841. Spl. I. n. 659 c. p. 1351; 1841. Ench. p. 48: sect. Gleicheniae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1043. 1.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Gleichenear.
= Eugleichenia Hook.

Gleicheniaceae Martius . . . . Pl. crypt. Bras. p. 104.
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 260: class. Filicum. Gen.: Platyzoma, Gleichenia.
Presl 1836. Pterid. p. 46: trib. Helicogyratar. Gen: Calymella, Platyzoma, Gleichenia, Mertensia, Sticherus.
Endl. 1836. Gen. p. 64; 1841. Ench. p. 40: ordo Filicum. Gen. ut Gaudich. — Par. Unger 1845. Syn. p. 39; 1846. Chlor. prot. p. XXXIV. Gen. foss.: Gleichenites, Partschia, Asterocarpus, Laccopteris, Andriania. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 15. 112. Gen.: Gleichenia.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 34: subordo Polypodiacear. Gen. ut Presl.
J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 419; sect. Cyathear. Gen.: Gleichenia.
Meisn. 1843. Gen. p. 435 (336): trib. Polypodiacear. Gen. ut Gaudich. et Mertensia.
J. Smith 1843. Lond. journ. bot. II. p. 378: div. Filicum. Gen. ut Meisn.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 1: subordo Filicum. Gen. ut Gaudich. *Cf.* Kunze in Bot. Zeit. 1844. p. 258.
Corda 1845. Fl. Vorw. p. 88: fam. Filicum. Divis.: *verae* (gen.: Gleichenia, Laccopteris, Asterotheca, Gutbiera, Phialopteris), Chorionopterides, Mertensiaceae.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 330. 338: ordo Pleurogyratar. Gen. ut antea et Gleicheniastrum.

*) Dicat. Wilh. Fr. v. Gleichen, Bayreuth.

Gleicheniaceae Mart. cont.
Hook. f. 1853. N. Zeal. II. p. 4: trib. Filicum.
Synon. Gleicheneae R. Brown; Gleicheniear. gen. Spreng.; Gleichenieae Rchb.
Gleicheniacites Sternb. 1838. Vers. II. p. 114: trib. 1 Filicaceitum. Gen.: Phialopteris, Laccopteris, Asterocarpus, Partschia.
Gleicheniae Presl 1825 in Reliq. Hänk. I. p. 70: trib. Filicum. Gen.: Gleichenia.
Gleicheniastrum Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 338: nov. g. Gleicheniacear. (Gleichenia speluncae Br.)
Gleichenieae Spreng. 1827. Syst. IV. p. 25; 1831. Gen. II. p. 719: fam. Cryptogamiae sect. primae. Gen. (1827): Gleichenia, Platyzoma, Ceratopteris, Mohria, Lygodium, Schizaea, Aneimia. Accedit 1831 Parkeria.
Gleichenieae Rchb. 1828. Consp. p. 39: div. Osmundacear. Gen.: Gleichenia, Mertensia, Platyzoma.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: trib. Filicum. Gen. ead. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. Gen. ut Rchb. 1837.
Lindl. 1833. Nix. p. 36: ordo Filicalium.
Göpp. 1836. Syst. Fil. foss. p. 172: div. Filicum fossilium. Gen.: Gleichenites, Asterocarpus.
Rchb. 1837. Hdb. p. 139; 1841. Nom. p. 29: subdiv. Amphibolocarpar. Gen.: Gleichenia, Platyzoma.
= Gleicheniaceae Mart.
Gleichenites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 172. 181: g. Gleicheniear.
Unger 1845. Syn. p. 39; 1846. Chlor. prot. p. XXXIV: g. Gleicheniacear. — Par. M'Coy 1857. Ann. and Mag. Nr. 132. p. 147.
Glineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 79: trib. Mesembrynear. Gen.: Glinus.
Glinoideae Link 1831. Handb. II. p. 481: ordo Perigynar. Gen.: Glinus.
Glinola DC. 1828. Prodr. III. p. 455: sect. Glini. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4403 *a*. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 154.
Glinus*) „Löfl." Linn. 1753. Sp. I. p. 463; 1759. Syst. ed. X. p. 1050. n. 537; 1762. Sp. ed. II. p. 663; 1764. Gen. ed. VI. p. 243. n. 610; 1767. Syst. ed. XII. p. 334: g. Dodecandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 378; 1784. Syst. p. 455. — Reich. 1778. Gen. p. 250. n. 666. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 328. n. 836. — Gmel. 1791. Syst. p. 768. — Pers. 1797. Syst. p. 488; 1807. Ench. II. p. 19. n. 1193. — Willd. 1799. Sp. II. p. 929. n. 963.
Löfl. 1758. It. hispan. p. 145.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 33.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.
Gled. 1764. Syst. p. 108. n. 444: g. Thalamostemonum.

*) γλῖνος s. γλεῖνος, succus dulcis.

Glinus Löfl. cont.
Hill 1769. Ht. kew. p. 384: g. Pentaphyllar.
Scop. 1777. Intr. p. 213: g. Dumosar.
Juss. 1789. Gen. p. 316: g. Ficoidear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 269. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 144. — Link 1822. En. II. p. 19. — DC. 1828. Pr. III. p. 455. (genuinar.) Sect.: Glinola, Rolofa. — Bartl. 1830. Ord. p. 309. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 154. Sect. ut DC. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 109. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 106.
Neck. 1790. El. II. p. 102. n. 771: g. Sarcodiphytor.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 898: g. Ficoidar. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 44.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 843: g. Aizoidar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 467. n. 1806; 1830. Gen. I. p. 400. n. 2005: g. Aizoidear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 362. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 4. 32.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Tetragoniacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4403: g. Mesembryanthemear. Sect. ut DC.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 79: g. Glinear.
Link 1831. Hdb. II. p. 481: g. Glinoidear.
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. II. p. 356: g. Mollnginear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162. n. 6295. (genuinar.) Sect.: Glinus, Pseudoglinus. — Meisn. 1838. Gen. p. 131 (95). — Endl. 1839. Gen. n. 5185. p. 952; 1841. Ench. p. 501. Sect.: Euglinus, Pseudoglinus. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 153. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1062.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 218: g. Portulacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 526: g. Mesembryacear.
Synon. Rolofa Adans.
Glinus Rafin. . . .
= Glinola DC.
Gliocladium*) Corda 1840. Icon. Fung. IV. p. 30. t. 7. f. 92: nov. g. Stilbinor. (G. penicillioides.) — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 124.
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 218: g. Stilbeor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491 (*Gloiocladium*).
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 14; 1842. Mycol. p. 55: g. Polyactidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.
Bonord. 1851. Hdb. p. 94: g. Dendrinor.
Gliosporae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 79: subdiv. Axylar. Class.: Coccosporae, Thallosporae.
Gliostroma Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 5. t. 1. f. 86: nov. g. Caeomacear. (G. pezizoides.)

*) γλία, gluten.

Gliostroma Corda cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 3. n. 75: g. Tubercularinor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 57.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 38; 1842. Mycol. p. 161: g. Tuberculariacear. — Par. Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 724.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.

Gliotrichum Eschweiler 1824. Syll. Ratisb. I. p. 165: nov. g. Byssor.?
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 545: g. Byssinear.?
Fries 1825. Pl. homon. p. 307: g. Racodiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 73: g. Racodiaceor.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 378: g. Dematieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 230. p. 20; 1841. Ench. p. 14. — Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 177.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 14; 1842. Mycol. p. 45: g. Psiloniacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 466: g. Scoriadeor.
Synon. Haplotrichum Eschw.; Acsimotrichum Corda?

Gliricidia Kunth 1825. Syn. pl. aequin. IV. p. 80 adnot.: nov. g. Papilionacear. (Robinia sepium Jacq.)
Endl. 1840. Gen. n. 6545. p. 1273; 1841. Ench. p. 669: g. Galegear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5734. — Walp. 1842. Rep. I. p. 679. — Meisn. 1843. Comm. p. 351. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 200.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555: g. Dalbergiear.

Glischrocaryon*) Endl. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 209 (Nov. stirp. Mus. Vindob. Dec. I. nr. 88): nov. g. Santalacear.
Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240): g. Thesiear.
= Loudonia Lindl. (Cf. A. DC. Pr. XIV. 2. p. 622.)

Glischrocolla Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 74. n. 2117*b*: sect. Sarcocollae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 322.
A. DC. 1856. Pr. XIV. 1. p. 490: g. Endonemear.

Glissanthe „Salisb." Endl. in synon. Costi (et Steud. Nom.): vid. *Gissanthe Salisb.*

Globba Linn. 1771. Mant. II. p. 143. n. 1287: g. Diandr. Monogyn. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 20. n. 45. — Murr. 1784. Syst. p. 72. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 25. n. 54. — Gmel. 1791. Syst. p. 49. — Willd. 1797. Sp. I. p. 153. n. 67. — Pers. 1797. Syst. p. 73.
Scop. 1777. Intr. p. 141: g. Opulinar.
Juss. 1789. Gen. p. 63: g. Cannar.
Neck. 1790. El. III. p. 374. n. 1811: g. Cratoophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 188: g. Scitaminear. —

*) γλίσχρος, lubricus.

Globba Linn. cont.
Par. Batsch 1802. Tab. p. 104. — Pers. 1805. Ench. I. p. 3. n. 11. — Roxb. 1812. Asiat. Research. XI. p. 518. *Cf.* Link Jahrb. I. p. 107. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 3. 31. — Agdh. 1823. Aphor. p. 184. — Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 28. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 15. n. 16; 1830. Gen. I. p. 7. n. 16. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 20.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 155: g. Amomear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 19. 351. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 46. — Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1590. — Bartl. 1830. Ord. p. 61. — Spach. 1846. Vég. phan. XII. p. 154.
Roscoe 1807. Linn. Trans. VIII. p. 355.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 277: g. Scitaminum verar.
Roxb. 1819. Corom. III. p. 22. t. 228—230; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 74; ed. 1832. p. 76: g. Monandr. Monogyn.
Link 1821. En. I. p. 5; 1829. Hdb. I. p. 232: g. Alpiniacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Curcumacear.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 62: g. Globbar. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 222. n. 1621.
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: g. Globbear. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 119. n. 1621. — Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2209. — Meisn. 1842. Gen. p. 388 (290).
Brongn. 1843. Én. genr. p. 24: g. Zingiberacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 591.
Synon. Catimbium Juss.; Hura Kön.; Colebrookia Don; Ceratanthera Hornem.; Mantisia Curt.

Globba Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 333. 341: g. restrict. Mantisiear. (Gl. orixensis.)

Globbae Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 41. 62: sect. Scitaminear. Gen.: Globba.
Endl. 1837. Gen. p. 222: sect. Zingiberacear. Gen. id.

Globbeae Endl. 1841. Ench. p. 119: sect. Zingiberacear. Gen.: Globba. — Par. A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 56: subdiv. Amomear. Gen. id.
Meisn. 1842. Gen. p. 388 (290): trib. Zingiberacear. Gen.: Globba, Monocystis.

Globifera Gmel. 1791. Syst. p. 32: g. Diandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 19. p. 52. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 14. n. 51.
Hedw. 1806. Gen. p. 12. 348: g. Primulacear.
= Micranthemum Rich.

Globifera C. Koch 1850. Linnaea XXIII. p. 612: sect. Androsaces. (A. odoratissima Schreb.)

Globigereae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68. 78: fam. Scutelliniae. Gen.: Endocarpon, Plocaria, Trypethelium, Verrucaria, etc.

Globulaceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 55: fam. Ligulaciae. Gen.: Globularia.

Globularia*) Tourn. 1700. Inst. p. 466. t. 265: g. pl. class. XII.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 212. Ed. Hall. 1745. p. 217: g. pl. class. IX.

Linn. 1737. Cliff. p. 490; 1740. Syst. p. 18; 1742. Gen. ed. II. p. 39. n. 80; 1753. Sp. I. p. 95; 1759. Syst. ed. X. p. 888. n. 106; 1762. Sp. ed. II. p. 139; 1764. Gen. ed. VI. p. 47. n. 112; 1767. Syst. ed. XII. p. 111: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 92. — Murr. 1774. Syst. p. 119; 1784. Syst. p. 142. — Reich. 1778. Gen. p. 48. n. 118. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 63. n. 146. — Gmel. 1791. Syst. p. 226. — Pers. 1797. Syst. p. 146; 1805. Ench. I. p. 118. n. 223. — Willd. 1797. Sp. I. p. 539. n. 169; 1809. En. p. 142. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 722. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 373. 378.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 667: g. Dipsacear.

Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 162. n. 660: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Suppl. p. 131.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Aggregatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 78. — Gis. 1792. Prael. p. 528. — Batsch 1802. Tab. p. 228. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 587. (descisc.) — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 83.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar.

Adans. 1763. Fam. II. p. 284: g. Thymelaear.

Scop. 1777. Intr. p. 203: g. Pseudocompositar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 211. t. 44. f. 11 (vulgaris).

Juss. 1789. Gen. p. 97: g. Lysimachiis aff.

Neck. 1790. El. I. p. 104. n. 182: g. Psydomorphytor. Sejungitur Abolaria.

Vent. 1799. Tabl. IV. p. 12: g. ordinis incerti.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 223: g. Primulaceis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 53. 366.

DC. 1805. Franç. III. p. 427: g. Globulariar. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 1. 38. n. 404. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 417. 427.

St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 17: g. Dipsaceis aff.

HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 222: g. Globularinar. — Par. Link 1821. En. I. p. 123. — Kunth 1823. Syn. II. p. 22. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 372. n. 372.

Lois. 1821. Dict. v. 19. p. 52: g. Globulariear. — Par. Pollin. 1822. Fl. Veron. I. (Isis 1823. p. 211.) — Camb. 1826. Ann. sc. nat. IX. p. 15. (Monogr.) — Spreng. 1830. Gen. I. p. 79. n. 388. — Bartl. 1830. Ord. p. 128. — Rchb. 1837. Hdb. p. 195; 1841. Nom. p. 114. n. 4438. (genuinar.) — Koch 1837. Syn. p. 593. Ed. II. p. 681. — Endl. 1838. Gen. p. 640. n. 3725. — Meisn. 1840. Gen. p. 315 (226). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 329. — Brongn. 1843. En. genr. p. 64. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 174. — Webb . . . . Canar. III. p. 115. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 235. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 455. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 754.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 55: g. Globulacear.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXIX: g. Plantaginear.

Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3092; 1831. Fl. exc. p. 364: g. Selaginear. Sect. (1828): Globularia, Alypum.

Link 1829. Hdb. I. p. 675: g. Globulariacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 293. — A. DC. 1848. Pr. XII. p. 611. — Willk. 1850. Rech. Glob. p. 16. (Char. emend.) — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 271.

Endl. 1841. Ench. p. 316. n. 3725: g. Globularinear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 667: g. Selaginacear.

Synon. Alypum Niss.; Abolaria Neck.

Globulariaceae Link 1829. Handb. I. p. 675: ordo Anthodiatar. Gen.: Globularia.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19. 21: fam. Globulariear. Gen. id.

Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 268.

A. DC. 1848. Pr. XII. p. 609: ordo (152) Corolliflorar. Gen.: Carradoria, Globularia.

Willk. 1850. Rech. Glob. p. 16. Gen. ead.

Globulariaceae Rchb. 1837. Handb. p. 195; 1841. Nomencl. p. 114: fam. Limbatar. Divis.: Globularieae, Brunonieae, Myoporinae.

Globulariae Lam. 1786. Dict. II. p. 730: fam. plant. Gen.: Globularia, Protea, Banksia, Brabeium, Brunia, Stilbe. (Cambess.)

DC. 1805. Franç. III. p. 427: fam. (38) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Globularia.

DC. 1818. Théor. élém. p. 247 (*Globulaires*): ordo Corolliflorar.

Globulariastrum (Gren. &) Godr. 1850. Fl. France II. p. 741: sect. Statices. (St. ovalifolia, minuta, virgata, etc.)

Globularieae (Lois. 1821. Dict. v. 19. p. 52) Pollini 1822. Fl. Veron. I (Isis 1823. p. 211): fam. plantar. Gen.: Globularia.

Cambess. 1826. Ann. sc. nat. IX. p. 15: fam. Dipsaceis proxima. Gen. id.

Bartl. 1830. Ord. p. 127: ordo (85) Aggregatar. Gen.: Stilbe, Globularia.

Koch 1837. Syn. p. 593. Ed. II. p. 681: ordo Corolliflorar. Gen.: Globularia.

Rchb. 1837. Hdb. p. 135: div. Globulariacear. Gen.: Globularia; Agathelepis,

*) Nomen a figura floris. (Linn. Phil. bot. p. 162.)

Globularieae Lois. cont.
Dischimia, Polycenia, Microdon, Hebenstreitia; Selago. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 114. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Globularia), Hebenstreitieae, Selagineae.
Endl. 1838. Gen. p. 639: ordo Nuculiferar. Gen.: Globularia.
Meisn. 1840. Gen. p. 315 (226): ordo Labiatiflorar. Gen. id.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 327: fam. (65) Aggregatar. Gen. id.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 64: fam. Selaginoidear. Gen. id.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 235. Gen. id.

Globularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19. 21: ordo Torocoronar. Fam.: Brunoniaceae, Globulariaceae.

Globularinae HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 222 (Kunth 1823. Syn. II. p. 22): ordo pl. Gen.: Globularia.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (188) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 31: ordo Plantalium.
= Globulariaceae Link.

Globularineae Endl. 1841. Ench. p. 315: ordo Nuculiferar. Gen.: Globularia.
= Globulariaceae Link.

Globulea Haworth 1812. Syn. succ. p. 60 (ed. Schrank 1819. p. 64); 1821. Rev. succ. p. 17: g. Pentandr. Pentagyn., a Crassula L. sejunctum.
DC. 1828. Pr. III. p. 390: g. Crassulear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 105. — Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6178. — Lindl. Veg. kd. p. 346.
Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4178: g. Sedear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Sempervivear.
Bartl. 1830. Ord. p. 310: g. Crassulacear. — Par. Link 1831. Hdb. II. p. 20. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 79. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 301. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 106.
Endl. 1839. Gen. n. 4611. p. 809; 1841. Ench. p. 405: g. Eucrassulear.

Globulina Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 4: nov. g. a Conferva L. disjunctum. (Conjugatar. sect. 2 Vauch.)
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 466 *a*: sect. Zygnemae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 78: g. Conjugatar.
= Zygnema Agdh.

Globulina Turpin 1828. Mém. Mus. XVI. p. 158.
= Gloeocapsa Kütz.

Glochidinopsis Steud. vid. *Glochidionopsis Blume.*

Glochidion*) Forst. 1776. Char. gen. p. 113. t. 57: nov. g. Monoec. Syngenes.
Scop. 1777. Intr. p. 81: g. Liliacear.
Juss. 1789. Gen. p. 442: g. incertae sedis.

Glochidion Forst. cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 104: g. Triandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 387: g. Monoec. Monadelph.
Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 56: g. Euphorbiacear. — Par. A. Juss. 1824. Euphorb. p. 18. — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 391 (*Glochidium*).
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 583: g. Phyllanthear. Sect.: Megastylis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5071; 1841. Nom. p. 195. n. 7418. — Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486. — Endl. 1840. Gen. n. 5855. p. 1121; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 342 (254). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 81. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Euphorb. p. 636: g. Phyllanthidear. Injungitur Gynoon A. Juss.
Synon. Bradleia Banks.

Glochidionopsis Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 588: nov. g. Phyllanthear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5854. p. 1121; 1841. Ench. p. 589 (*Glochidonopsis*). — Steud. 1840. Nom. I. p. 689 (*Glochidinopsis*). — Meisn. 1841. Gen. p. 342 (254). — Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7417. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282 (*Glochidonopsis*).
Baill. 1858. Euphorb. p. 639: g. Phyllanthidear.

Glochidium Wittst. vid. *Glochidium Forst.*

Glochidonopsis Endl., Lindl. vid. *Glochidionopsis.*

Glochidotheca Fenzl 1843 in Russegg. Reise I. 2. p. 970 in obs.
Endl. 1850. Spl. V. p. 12. n. $4502/_1$: g. Caucalinear.
Synon. Turgeniopsis Boiss.

Glochisandra Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 28. t. 1905: nov. g. Phyllanthear. (G. acuminata.)
Baill. 1858. Euphorb. p. 655: inter Euphorbiaceas incertae sedis.

Glockeria Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 172. 379. t. 39: g. Danaeacear. foss. — Par. Unger 1845. Syn. p. 35; 1846. Chlor. prot. p. XXXIII.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 75: g. Filicum foss.

Glockeria Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 728: g. Gendarussear. — Par. Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 28. Char. auct. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 657.
Synon. Galeottia Nees, nec Rich.

Gloeocapsa*) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phycol. gener. p. 173; 1849. Spec. Alg. p. 216. n. 168: g. Palmellear. — Par. Röm. 1845. Alg. Deutschl. p. 62.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: g. Coccochlorear.
Nägeli 1849. Einzell. Alg. p. 47: g. Chroococcacear.
Synon. Chaos Bory; Globulina Turp.; Merrettia Gray pt.; Merettia Trevis.?

---

*) γλωχίς, cuspis.

*) γλοιός, strigmentum, lubricus, sordidus.

Gloeocladeae Montagne 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: subtrib. Cryptonemear. Gen.: Crouania, Dudresnaya, Naccaria, Gloeocladia, Gloeopeltis, Gloeosiphonia, Nemalion.
Gloeocladia Kütz., Mont. 1849: vid. *Gloiocladia J. Agdh.*
Gloeococcus A. Braun 1851. Verjüng. d. Nat. p. 169: nov. g. Chlamydomonadum.
Gloeocystis Nägeli 1848. Gatt. einzell. Alg. p. 65: g. Tetrasporear.
Gloeodictyon Kütz. vid. *Gloiodictyon Agdh.*
Gloeonema Greville 1822. Scot. crypt. Fl. VI. t. 30: nov. g. Fungor. *Cf.* Flora 1823. I. p. 375.
= Micromegae Agdh. sp.
Gloeonema Ehrenb. (1838 Infus.) 1840. Ber. Berl. Ak. p. 211: g. Bacillarior. (G. paradoxum.)
= Encyonema Kütz.?
Gloeonema Kütz. vid. *Gloionema Agdh.*
Gloeopeltis Kütz. vid. *Gloiopeltis J. Agdh.*
Gloeoporus Montagne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 126: nov. g. Hymenomycetum.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 385: g. Polyporeor. — Par. Corda 1842. Mycol. p. 194. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41 (*Glaeoporus*). — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 325.
Gloeoprium Ralfs . . . . Trans. Edinb. bot. Soc. p. 164.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 99: g. Didymopriear.
= Hyalotheca Ehrenb.
Gloeosipheae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 85; 1843. Phycol. gener. p. 179: div. Trichoblastear. Fam.: Oscillarieae, Leptotricheae, Limnantheae, Nostoceae, Scytonemeae, Lyngbyeae, Calotricheae, Mastichotricheae, Rivularieae. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 28. Fam. eaed. (Limnochlideae loco Limnanthear.)
= Oscillarinae Kütz.
Gloeosiphonia „Carm." Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 127: subg. Helminthorae.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: subg. Dudresnayae.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Gloeocladear.
Conf. Gloiosiphonia.
Gloeosporium Montagne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 295: nov. g. Nemasporear., a Leptothyrio sejunctum. (G. Castagnei.)
Gloeothece Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 57: g. Chroococcacear.
Gloeotila Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 245: nov. g. Hormidiear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 26.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. p. 97: g. Myxonemear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: g. Bangiear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 363. n. 246: g. Confervear.
Gloeotrichia Mont. vid. *Gloiotrichia J. Agdh.*

Gloiocladeae J. Agardh 1841. Linnaea XV. p. 47: fam. Algar. Gen.: Chordaria, Myriocladia.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 5. 47: trib. Rhodospermear. Gen.: Mesogloia, Gloiosiphonia, Naccaria.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 82: subtrib. Cryptonemear. Gen.: Crouania, Dudresnaja, Naccaria, Heterocladia, Gloiocladia, Gloiopeltis, Nemalion, Gloiosiphonia. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 36. Gen. ead. exclusis Heterocladia et Gloiosiphonia. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 144. Gen.: Gloiocladia, Nemalion, Gymnophlaea.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 132: subordo Helminthocladear. Gen.: Helminthora, Nemalion.
Gloiocladia J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 87: nov. g. Gloiocladear. (Chondria furcata Agdh.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 36. n. $122/_{26}$. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 144.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): g. Cryptonemear.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 303; 1849. Sp. Alg. p. 741. n. 491 (*Gloeocladia*): g. Gigartinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Gloiocladidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Ceramiacear.?
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54 (*Gloeocladia*): g. Gloeocladear.
= Nemalion Targ.
Gloiocladidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 24: trib. Cryptonemear. Gen. Gloiocladear. Endl.
Gloiocladium Lév. vid. *Gliocladium Corda.*
Gloiococcus Shuttl. 1840. Bibl. un. Genèv. Févr. p. 405.
= Haematococcus Agdh.
Gloiodictyon Agardh 1830. Consp. Diat. p. 25: nov. g. Cymbellear. (Schizonema reticulatum Ag.)
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 591 (*Gloeodictyon*): g. Diatomacear. inclusar.
Endl. 1836. Gen. n. 16. p. 3; 1841. Ench. p. 2: g. Hydrolinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 645. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 234: g. dubium Chamaephycear.
Gloionema Agardh 1817. Syn. Alg. p. XXXV. 120; 1821. Aphor. p. 98: nov. g. Confervoidear. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 57.
Grev. 1822. Mem. Wern. Soc. IV. 1. p. 215.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XVIII. 16: g. Nostochinar.
Fries 1825. Pl. homon. p. 350: g. Undinear. (dubium). — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 25. n. 428.
Agdh. 1830. Consp. Diat. p. 30: g. Cymbellear.
Kütz. 1833. Flora II. p. 513; 1833. Linnaea VIII. p. 612 (*Gloeonema*): g. Desmidiacear. inclusar.
Endl. 1836. Gen. n. 23. p. 3; 1841. Ench. p. 2: g. Echinellear.

Gloionema Agardh cont.

Menegh. 1838. Cenni p. 26: g. Hydrurear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 598.

Berkeley 1841. Ann. and Mag. VII. p. 449 (praecedente Roberge 1827. Mém. soc. Linn. Par. p. 47) regno animali attribuit.

Gloionema Grev. ex Kütz. Spec. p. 108: vid. *Gloeonema Grev.*

Gloiopeltis J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 68: nov. g. Gloiocladear. (Fucus tenax Turn.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 37. n. $122/_{29}$.

Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): g. Sphaerococcoidear.

Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1849. Sp. Alg. p. 754. n. 503 (*Gloeopeltis*): g. Caulacanthear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Gloiocladidar.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53 (*Gloeopeltis*): g. Gloeocladear.

Harv. 1853 Ner. bor. am. II. p. 183: g. Endocladiear.

Gloiosiphonia „Carm." Berkeley 1833. Glean. Brit. Alg. p. 45. *Cf.* J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 453.

Harv. 1841. Brit. Alg. p. 49: g. Gloiocladear. — Par. J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 66.

Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 604: g. Batrachospermear.

Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): g. Cryptonemear.

Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 314: g. Cryptocarpear.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 714. n. 474: g. Gymnophlaeacear.

Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 202: g. Nemastomear.

Conf. Gloeosiphonia.

Gloiosporeae Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab.: subordo Ascophycear. Sect.: Endogloiosporeae, Ectogloiosporeae.

Gloiotrichia J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 8: nov. g. Rivulariear. (Rivularia angulosa.) — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 326. (Flora 1843. p. 92.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 12. n. 16. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 90. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52 (*Gloeotrichia*).

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Rivularidar.

Glojothamneae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71: fam. Gelatiniae. Gen.: Batrachospermum.

Glojotricheae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71: fam. Gelatiniae. Gen.: Chaetophora.

Glomera Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 372: nov. g. Orchidear.

Lindl. 1833. Orchid. p. 253: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1504. p. 207; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2109. — Meisn. 1842. Gen. p. 373 (280). — Spach 1846. Vég. phau. XII. p. 179. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 705.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Glomeraria Cavan. . . . . Hort. Madrit. (Non Zool.)

= Pyxidium Moq.-Tand. (DC. Pr. XIII. 2. p. 262.)

Glomus Tulasne . . . .

= Endogone Link.

Glonei Rchb. Nomencl. p. 7: vid. *Gloniei Endl.*

Gloniaceae Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 34; 1842. Anl. Mycol. p. 143: sect. Hysteriacear. Gen.: Hysterographium, Glonium.

Gloniei Endl. 1836. Gen. p. 32; 1841. Ench. p. 19: subtrib. Phacidiaceor. Gen.: Actidium, Lophium, Glonium. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 7 (*Glonei*). Gen. ead.

Gloniopsis De Notaris 1851. Giorn. bot. it. II. 2. p. 23: nov. g. Hysteriaceor., Glonio aff.

Glonium Mühlenb. 1813. Catal. Amer. p. 101.

Fries 1823. Syst. myc. II. p. 594; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 367: g. Phacidiaceor. — Par. A. Lib. 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 123. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Bail 1858. Syst. p. 59. t. 18.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 585: g. Phacidiacear.

Fries 1825. Pl. homon. p. 116: g. Cliostomeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 258.

Endl. 1836. Gen. n. 376. p. 32; 1841. Ench. p. 19: g. Glonieor.

Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 278: g. Gloneor.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 34; 1842. Mycol. p. 144: g. Gloniacear.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Hysterieor.

Bonord. 1851. Hdb. p. 263: g. Hysteriaceor.

Synon. Solenarium Spreng.

Gloriales Batsch 1802. Tab. affin. p. 100: ordo Ringentium. Fam.: Orchideae, Scitamineae, Palmariae.

Gloriosa*) Linn. 1737. Gen. p. 93. n. 264; 1737. Cliff. p. 121; 1740. Syst. p. 21; 1753. Sp. I. p. 305; 1759. Syst. ed. X. p. 980. n. 374; 1762. Sp. ed. II. p. 437; 1764. Gen. ed. VI. p. 164. n. 413; 1767. Syst. ed. XII. p. 241. n. 409: g. Hexandr. Monogyn. (Methonica gloriosa Burm.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 269; 1784. Syst. p. 325. — Reich. 1778. Gen. p. 167. n. 446. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 220. n.

---

*) Methonicae duplicem ob causam rejicio nomen, ejusque loco synonymon Gloriosa recipio, cum flores prae reliquis omnibus gloriam splendoris et pulchritudinis ferant. (Ht. Cliff.)

Gloriosa Linn. cont.
561. — Gmel. 1791. Syst. p. 546. — Pers. 1797. Syst. p. 345; 1805. Ench. I. p. 360. n. 795. — Willd. 1799. Sp. II. p. 95. n. 631; 1809. En. p. 365. — Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 77. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 143.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 72. n. 301: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Sarmentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 294.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.
Hill 1769. Ht. kew. p. 355: g. Hexapetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 83: g. Liliacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 233; 1825. Syst. II. p. 65. n. 1213; 1830. Gen. I. p. 219. n. 1401. — Link 1821. En. I. p. 323. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 59. — D. Don 1825. Nepal. p. 51. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXIX. 365. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1156.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 69. t. 18. f. 1 (superba).
Neck. 1790. El. III. p. 177. n. 1529: g. Gonoophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 146: g. Liriorum.
Agdh. 1823. Aphor. p. 166: g. Coronariar.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1351: g. Methonicear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60.
Link 1829. Hdb. I. p. 184: g. Tulipacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 51: g. Colchicaceis aff.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Tulipear.?
= Methonica Herm., Juss.

Gloriosae Vent. 1799. Tabl. II. p. 167: sect. Liliacear. Gen.: Tulipa, Erythronium, Methonica, Uvularia, Fritillaria, Imperialis, Lilium, Yucca.

Glosocomia*) D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 158: nov. g. Campanulacear. (Codonopsis? thalictrifolia Wall.)
Vid. Glossocomia Rchb.

Glossanthus**) „Klein" Benth. 1835. Scroph. ind. p. 57.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 664: g. Loxotiear.
R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 121 (Flora 1842. p. 218): g. Cyrtandrear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 367. 581.
Endl. 1839. Gen. p. 717. n. 4142; 1841. Ench. p. 349. n. 4143: g. Didymocarpear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4706: g. Henckeliear.
Meisn. 1840. Gen. p. 302 (212): g. Ramondiear.
= Klugia Schltd.

*Glossariphytum****) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 44: gen. 2 plant. Spec. nat.: Lactuca, Sonchus, Scorzonera, Hieracium, Aracium, Miegia, Plancia, Willemetia, Hypochaeris, Catanance, Scolymus, Seriola, Crepis, Chatelania, Closirospermum, Picris, Tragopogon, Urospermum, Adopogon, Geropogon, Hyoseris, Achyrastrum, Aposeris, Leontodon, Antodon, Prenanthes, Chondrilla, Lampsana, Rhagadiolus, Andryala, Cichorium.

*) *γλωσσοκομεῖον* (nec *γλωσόκομον* ut habet Don), marsupium.

**) *γλῶσσα*, lingua.

***) *γλωσσάριον*, lingula; *φυτόν*, planta.

Glossarrhen*) Martius & Zucc. 1824. Nov. gen. I. p. 21. t. 15: nov. g. Ionidior. (G. floribundus.) *Cf.* Flora 1824. II. p. 21. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 806. n. 900.
Nees & Mart. 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 46: g. Violariear.
Ging. 1824 in DC. Pr. I. p. 290: g. Violear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4893. — Bartl. 1830. Ord. p. 284. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 190. n. 963. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 501. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 837.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Ionidiear.
= Schweiggeria Spreng.

Glossaspis Spreng. 1826. Syst. III. p. 675. 694. n. 2929; 1831. Gen. II. p. 658. n. 3288: g. Orchidear.
Lindl. 1835. Orchid. p. 284: g. Ophrydear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1514. p. 209; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1856. — Meisn. 1842. Gen. p. 379 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Serapiadar.
Synon. Glossula Lindl.

Glossestemon Rchb. vid. *Glossostemon Desf.*

Glossocardia Cassini 1817. Bull. soc. philom. Sept. p. 138; 1821. Dict. v. 19. p. 62; 1825. v. 38. p. 17: nov. g. Coreopsidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2610. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 320; 1830. v. 60. p. 576: g. Synedrellear.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
Less. 1832. Syn. p. 233: g. Verbesinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 631. — Endl. 1838. Gen. n. 2564. p. 417; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 200 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3170. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Glossocarya Wallich 1831. Catal. n. 741: g. Verbenacear. minus cognitum. (Endl. Gen. p. 638.) — Par. Walp. 1845. Rep. IV. p. 133. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664. (?)
Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4222: g. Aegiphilear.?
Griff. 1843. Calc. journ. III. p. 366.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 625: g. Caryopteridear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 903.

*) Nomen a staminibus appendice linguaeformi auctis.

Glossocentrum Crüger 1847. Linnaea XX. p. 111: nov. g. Miconiear. (G. collinum.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 301.

Glossochilus Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 83: g. Hygrophilear.

Glossocodon Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 45: sect. Anguillariae. (A. pygmaea et tenella.)

Glossocoma Endl. in synon. Votomitae vid. *Glossoma Schreb.*

Glossocomia Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2700: g. Lobeliacear. (*Glosocomia D. Don*), a DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 424 ad Wahlenbergiae sect. Megasanthem citatum. (*Cf.* Walp. Ann. bot. I. p. 469 ex F. M. et Lall. 1845. Ind. dec. sem. Petrop. p. 46.)
Bartl. 1830. Ord. p. 152: g. Campanulacear. — Par. Lindl. 1842. Bot. Regist. n. ser. XV. t. 3.
A. DC. 1830. Mon. Camp. p. 95: g. Polemonidear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691: g. Lightfootear.
Rupr. 1857. Bull. Ac. Pet. XV. p. 209: genus restituit.

Glossodia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 325. Ed. Nees p. 181; 1813. Ht. kew. V. p. 204 (Verm. bot. Schr. II. p. 26): nov. g. Orchidear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 63. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 714. n. 2975; 1831. Gen. II. p. 663. n. 3343.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 296: g. Coniopagar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 190. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 10 (Linnaea II. p. 528); 1839. Swan-River p. L: g. Arethusear. Sect. (1839): Elytranthe. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1444. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1594. p. 217; 1841. Spl. I. p. 1367; 1841. Ench. p. 14. Sect. (1841): Euglossodia, Elytranthera. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2162. Sect. eaed. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182.
Lindl. 1840. Orchid. p. 423: g. Euarethusear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 383 (286). — Endl. 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 9.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Limodoridar.

Glossogyne (s. *Gymnactis*) Cassini 1827. Dict. v. 51. p. 475: nov. g. pro Bidente tenuifolia Labill. propositum.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 320; 1830. v. 60. p. 576: g. Synedrellear.
DC. 1836. Pr. V. p. 632: g. Verbesinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2566. p. 417; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 200 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3172. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19: g. Coreopsidear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 82: g. Helianthear.

Glossogyne Lessing 1832. Syn. Compos. p. 212: g. Georginear., a praecedente discrepans, vix notum. (DC.)

Glossoloma Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 209: nov. g. Nematanthear. (Nematanthus tetragonus Oerst.)

Glossoma Schreb. 1791. Gen. II. p. 792. n. 1728: g. Tetrandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 19. p. 63. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 664. n. 229. — Pers. 1805. Ench. I. p. 144. n. 298. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 100. n. 501. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 505.
Batsch 1802. Tab. p. 44: g. Hederacear.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 18. 318. n. 512: g. Rhamnor.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 452. n. 477: g. Rhamnear.
= Votomita Aubl.

Glossonema Decaisne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 335; 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: nov. g. Asclepiadear. (Cynanchum? Boveanum Decne.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.
Endl. 1841. Spl. I. n. $3448/_1$. p. 1397; 1841. Ench. p. 298: g. Metastelmear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 267 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4999.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 554: g. Asclepiadar.
Synon. Conomitra Fenzl.

Glossopappus Kunze 1846. Flora II. p. 748: nov. g. Chrysanthemear., Prolongoae proximum. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 722.

Glossopetalon A. Gray 1853. Pl. Wright. II. p. 29. t. 12: nov. g. Celastracear. anomalum.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 425: g. Celastrinear.

Glossopetalum Schreb. 1789. Gen. I. p. 205. n. 526: g. Pentandr. Pentagyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 510. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1521. n. 588. — Pers. 1805. Ench. I. p. 332. n. 747.
Batsch 1802. Tab. p. 70: g. Rhamnor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 664; 1825. Syst. I. p. 954. n. 1140: g. Rhamnear.
= Goupia Aubl.

Glossophylla DC. 1837. Prodr. VI. p. 154: sect. Cassiniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2726 *a*. p. 444; 1841. Ench. p. 242.
Synon. Cassinia Cass.

Glossophyllum C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 229: sect. Hypni. Subsect.: Spathularia, Euglossophyllum.

Glossophyllum Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 80: grex Philodendri. (Ph. heterophyllum Pöpp.)

Glossopteris Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 262: novum nomen pro *Scolopendrio Sm.* propositum.

Glossopteris Brongn. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 232: sect. Filicitis.
Sternb. 1825. Vers. I. p. XV: g. Filicum verar.

Glossopteris Brongn. cont.
Brongn. 1828. Prodr. p. 51; 1828. Dict. v. 57. p. 63; . . . . Hist. vég. foss. I. p. 222; 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 83: g. Filicum foss.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 103: g. Hizospermar.
Göpp. 1836. Syst. Fil. foss. p. 176. 346: g. Pecopteridum. — Par. Unger 1845. Syn. p. 94; 1846. Chlor. prot. p. XLVIII. — M'Coy 1847. Ann. and Mag. XX. p. 150.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 68. 164: g. Filicitum.
Synon. Apocynophyllum Vis. & Mass.

Glossoschima „Korth." Walp. 1842. Repert. I. p. 375: g. Gordoniear.
= Closaschima Korth.

Glossospermum Wallich 1831. Catal. n. 1153.
= Visenia Houtt.

Glossostemon Desfont. 1817. Mém. Mus. III. p. 238: nov. g. Tiliacear., Sparmanniae aff. (G. Bruguieri.) — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 73. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 340. n. 2628. (Polyadelph.)
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 310: g. Büttneriacear. (verar.) — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 689 (*Glossostemum*).
DC. 1824. Pr. I. p. 485: g. Byttneriear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 523. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 476.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV.: g. Byttneriacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5295; 1837. Hdb. p. 292 (*Glossestemon*); 1841. Nom. p. 202. n. 7714: g. Theobromear.?
Bartl. 1830. Ord. p. 342: g. Büttneriear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 602. n. 2969. — Meisn. 1837. Gen. p. 32 (26).
Endl. 1840. Gen. n. 5350. p. 1002; 1841. Ench. p. 520: g. Dombeyacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: g. Dombeyear.

Glossostemum Steud. vid. *praeced.*

Glossostephanus E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 217: nov. g. Asclepiadear. verar. (Apocynum lineare Thunb.) — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.
Endl. 1838. Gen. n. 3468. p. 592; 1841. Ench. p. 299: g. Cynoctonear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 128. n. 4965. (genuinar.)
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 520: g. Haplostemmar.

Glossostigma Arnott 1836. Nov. Act. Leop. XVIII. p. 355: nov. g. Scrophularinar. (Microcarpaea spathulata Hook.)
Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 59: g. Gratiolear.? An Veronicear.?
Endl. 1839. Gen. n. 3976. p. 687; 1841. Ench. p. 340: g. Veronicear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 306 (217)? — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 270. — Walp. 1845. Rep. III. p. 334.
Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4591: g. Limosellear.

Glossostigma Arnott cont.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 426: g. Sibthorpiear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 699.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Sibthorpear.
Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 189: g. Scrophularinear.
Synon. Microcarpaea Benth.

Glossostylis Chamisso & Schltd. 1828. Linnaea III. p. 22: nov. g. Scrofularinear. (G. aspera.)
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3160: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 6; 1835. Scroph. ind. p. 49; 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 211: g. Gerardiear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 561. — Endl. 1869. Gen. n. 4000. p. 691; 1841. Ench. p. 340. — Meisn. 1840. Gen. p. 309 (220). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4517. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 363. 540. — Walp. 1845. Rep. III. p. 390. 970.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Digitalear.
= Alectra Thunb.

Glossula Lindl. 1824. Bot. Regist. X. t. 862.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529): g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1462. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57.
= Glossaspis Spreng.

Glossula Rafin. 1828. Med. Fl. I. nr. 10: subg. Aristolochiae.
Rchb. 1887. Hdb. p. 173: g. Pistolochiear.
Meisn. 1841. Gen. p. 334 (246): sect. Aristolochiae.
= Aristolochiae sect. Clematitis.

Glottes Medic. (Vorles. II. p. 377) 1789. Phil. Bot. I. p. 210: nov. g. ex typo Astragali Epiglottidis L.

Glottidium*) Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 119 (*cf.* Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 75): nov. g. Leguminosar. (Aeschynomene platycarpos Mich.)
DC. 1825. Pr. II. p. 266: g. Galegear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3904; 1841. Nom. p. 148. n. 5739. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 241. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Torr. & Gray 1837. North-Am. I. p. 294. — Endl. 1840. Gen. n. 6550. p. 1274; 1841. Ench. p. 669. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.

Gloxinia**) L'Herit. 1785. Stirp. I. p. 149: nov. g. Didynam. Angiosperm. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 229. n. 1142; 1809. En. p. 638. — Pers. 1807. Ench. II. p. 174. n. 1521. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 508. n. 2496.

---

*) *γλῶττα*, lingua.

**) Dicat. Benj. Petro Gloxin, Colmariensi.

Gloxinia L'Herit. cont.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 193: g. Petalostemonis.
Cram. 1803. Disp. p. 176: in Syngenes. Monogam.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 368: g. Campanulear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 415: g. Bignoniear. anomal.
Link 1822. En. II. p. 131: g. Bignoniaceis aff.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. p. 66: g. Bignoniacear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 843. n. 2253: g. Personatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3237: p. Gesnerear. — Par. Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 62. t. 226. Sect.: legitimae, Sinningiae. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 9. Subgen.: Sinningia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672. — Regel 1848. Flora I. p. 247.
Link 1829. Hdb. I. p. 547: g. Scrofularinar.
Bartl. 1830. Ord. p. 175: g. Gesneriear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 533. Sect.: Eugloxinia, Hemiloba, Sinningia. — Meisn. 1840. Gen. p. 303 (213). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 258. (restrict.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 573. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 61. — Benth. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 358.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 648: g. Gloxiniear. Sect.: Eugloxinia, Sinningia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4674. (restrict.)
Endl. 1839. Gen. p. 722. n. 4167: g. Eugesnerear. Sect.: Paliavaa, Sinningia. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1408; 1841. Ench. p. 349. Sect. ut DC.
Synon. Sisyrocarpum Klotzsch?

Gloxinia Decaisne 1848. Revue hortic. . . . . . g. restrictum ex typo Gloxiniae maculatae.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 201; 1856. XXVII. p. 702. 761: g. Achimenear.
Oersted 1858. Gesn. centroam. p. 9: g. Enachimenear.
Synon. Salisia Regel 1848.

Gloxinia Regel 1848. Ind. sem. . . . . . g. restrictum, Gloxiniam maculatam affinesque excludens.
= Ligeria Decne.

Gloxinieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 645: subtrib. Gesneriear. Gen.: Treverania, Gesneria, Gloxinia.
Rchb. 1841. Nom. p. 119: sect. Gesnerear. Gen.: Mitraria, Picria, Achimenes, Solenophora, Sinningia, Gloxinia, Gesneria, Conradia, Rytidophyllum, Bellonia?

Glumaceae Rchb. 1828. Consp. p. 47; 1830. Fl. exc. p. 3. 15: formatio Caulo-Acroblastar. Fam.: Gramineae, Cyperoideae, Commelinaceae.
Bartl. 1830. Ord. p. 25: class. (IX.) Monocotyledonear. Ord.: Gramineae, Cyperaceae. — Simil. Meisn. 1842. Gen. p. 409. 442 (313). Ord. iid. — Brongn. 1843. Én. genr. p. XIV. 7. Fam.: Gramina, Cyperaceae. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 141. Fam. ut Bartl.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: trib. 2 Endogenar. Ord. iid.
Lindl. 1833. Nix. p. 36: cohors Endogenar. Ord. iid. et Desvauxieae, Restiaceae, Xyrideae.
Endl. 1836. Gen. p. 77; 1841. Ench. p. 55: class. Amphibryor. Ord. ut Bartl. — Par. Unger 1845. Syn. p. 166; 1846. Chlor. prot. p. LXVI.
Rchb. 1837. Hdb. p. 141; 1841. Nom. p. 35: formatio Caulocoleophytor. Fam. ut antea (1841 Commelynaceae).
Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): ordo Ternariar. Fam. 42—46.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 416: subdiv. Perispermear. Fam. ut Bartl.
Steud. 1854 et 1855. Syn. pl. glum. I. II. Ordines ut Bartl. et affines.

Glumacia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: ordo Insolitegmiae. Fam.: Cyperaceae, Gramineae.

Glumales Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 105: nixus Endogenar. Ord.: Graminaceae, Cyperaceae, Desvauxiaceae, Restiaceae, Eriocaulaceae.

Glumaria Boissier 1848 in DC. Prodr. XII. p. 623; 1856. Diagn. pl. nov. Ser. 2. Nr. 4. p. 61: sect. Acantholimonis.

Glumiflorae Agardh 1823. Aphor. p. 139; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: class. 3 Cryptocotyledonear. Ordines: Typhinae, Cyperaceae, Gramineae, Juncaceae, Xyrideae. (*Cf.* Agdh. 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 96.) — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 113. Ord.: Typhinae, Gramineae, Cyperaceae, Juncaceae, Calameae.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 74: class. Monocotyledonear. Fam.: Gramineae.

Glumosae Hill 1769. Hort. kew. p. 389: class. 35 herbar.
Gramineae Juss.

Glumosi Linn. 1774. Class. pl. p. 411: ordo 2 methodus calycinae. Genera Cyperacear. et Graminear.

Glumosia „Herb." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 161: g. Iridacear. (Nomen.)

Gluphiphyllaea*) DC. 1836. Prodr. V. p. 671: sect. Meyeriae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2614 *b.* p. 425 (*Glyphiphyllaea*); 1841. Ench. p. 240 (*Glyphiphyllea*). — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3106. 2.

Gluta**) Linn. 1771. Mantissa II. p. 160. n. 1327: g. Gynandr. Pentandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 683; 1784. Syst. p. 821. — Reich. 1778. Gen. p. 461. n. 1109. — Pers. 1797. Syst. p. 865.

---

*) γλύφω, excavo, sculpo.
**) Gluta olim pro gluten = Ichthyocolla. (Beckmann.)

Gluta Linn. cont.
Scop. 1777. Intr. p. 324: g. Disciferar.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 146. n. 368: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 417. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1120. n. 419. — Pers. 1805. Ench. I. p. 263. n. 596. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 354. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXVII. 471. n. 1006. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 87.
Juss. 1789. Gen. p. 427: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 162. n. 686.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 810: g. Büttnerear.
DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: g. Dombeyear.?
DC. 1824. Pr. I. p. 501: g. Dombeyacear. incertum. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 539. — Meisn. 1837. Gen. p. 34 (26).
Juss. 1825. Dict. v. 38. p. 50: g. Passiflorear.?
Spreng. 1826. Syst. III. p. 49. n. 2375; 1831. Gen. II. p. 538. n. 2638: g. Monadelph. Pentandr.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1159: g. Terebintacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5288: g. Göthe-acear.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4: g. Tiliaceis aff.
Meisn. 1837. Gen. p. 75 (55): g. Cassuviear.? (praeced. Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 68.)
Endl. 1840. Gen. n. 5911. p. 1132; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 12. p. 182.
Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5684: g. Anacardiear.

Glutago Comm. mss. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 19. p. 87.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 79: g. Loranthiae.
= Euloranthus Endl.?

Glutinaria „Comm. mss.“ DC. 1836. Prodr. V. p. 318: sect. Psiadiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2368 *a.* p. 384; 1841. Ench. p. 235.

Glutinium Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 466: nov. g. Scoriadeor. (G. exasperans.)

Glyaspermum Zolling. 1844 in Nat. en geneesk. Arch. p. 41.
= Pittosporum Soland.

Glyce Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 354: g. Alyssidar.
= Koniga R. Brown.

Glyceria*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 179. Ed. Nees p. 35: nov. g. Graminear. (Festuca fluitans L.) — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 96. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 41. 695. n. 338. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 351. n. 351. — Link 1829. Hdb. I. p. 69. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 304.

*) γλυκερός, dulcis.

Glyceria R. Brown cont.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 124. — Bartl. 1830. Ord. p. 28. — Endl. 1837. Gen. n. 878. p. 98; 1841. Ench. p. 59. Sect.: Glyceria, Hydrochloa. — Meisn. 1843. Gen. p. 424 (324). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 208.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 164: g. Festucacear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 117; 1833. Agrost. p. 366; 1838. Berol. II. p. 388. — Koch 1837. Syn. p. 806. Ed. II. p. 932. Sect.: Glyceria, Catabrosa. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 41. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 138. 364. — Brongn. 1843. En. genr. p. 9. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 153. — Steud. 1854. Glum. I. p. 284. Sect.: Sphenopus. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 530. Sect.: Euglyceria, Megachloa, Heleochloa.
Trin. 1820. Fund. p. 136: g. Triandr. Digyn. — Par. Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 585.
Link 1821. En. I. p. 89: g. Graminum. — Par. Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 59. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 101. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 75. n. 369. — Trin. 1831. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. p. 364; 1838. IV. p. 56.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 131: sect. Poae.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1027; 1830. Fl. exc. p. 45: g. Poacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: g. Poëar. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 77. Sect.: Hydrochloa, Heleochloa. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 390. Sect.: Euglyceria, Aphydris, Arctopoa.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1385: g. Poariar. Sect. ut Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Math. 1853. Belg. I. p. 616: g. Festucear.

Glyceria Nuttall 1818. Gen. Amer. I. p. 177: nov. g. Umbellatar. (Hydrocotyle repanda Pers.)
Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 98: g. Umbelliferar.
= Euhydrocotyle DC.

Glyceria Link 1827. Hort. Berol. I. p. 172: g. Glycerinar., sejuncta Hydrochloa restrict.
Endl. 1837. Gen. n. 878*a.* p. 99; 1841. Ench. p. 59: sect. Glyceriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1385. 1.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 436: g. Festucear. (G. fluitans et aquatica.)
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 414: g. Festucacear.

Glycerinae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 160: fam. Graminear. Gen.: Köleria, Bromus, Schoenodorus, Tridens, Glyceria, Hydrochloa, Poa, Eragrostis, Briza, Molinia, Catabrosa.

Glychirriza Allion. vid. *Glycyrrhiza Tourn.*

Glycideras Cassini 1830. Dict. v. 60. p. 581, antea *Glyphia Cass.*, q. conf., et *Glycyderas Cass.*

Glycideras Cass. cont.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 257: inter genera Compositar. incertae sedis.
Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132): g. Tagetear.? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3216.

Glycine*) Linn. 1737. Gen. p. 349. n. 876; 1737. Cliff. p. 361; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 227; 1753. Sp. II. p. 753; 1759. Syst. ed. X. p. 1173. n. 797; 1763. Sp. ed. II. p. 1023; 1764. Gen. ed. VI. p. 373. n. 868; 1767. Syst. ed. XII. p. 484: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 548; 1784. Syst. p. 659. — Reich. 1778. Gen. p. 373. n. 942. — Lour. 1790. Coch. II. p. 457. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 465. n. 1182. — Gmel. 1791. Syst. p. 1105. — Pers. 1797. Syst. p. 696; 1807. Ench. II. p. 299. n. 1707. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1053. n. 1350; 1809. En. p. 755. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 50. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 317.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 136. n. 159: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 46. Segregatur Apios.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 306. — Juss. 1789. Gen. p. 357. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 405. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 226. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 752; 1826. Syst. III. p. 195. n. 2519; 1831. Gen. II. p. 582. n. 2859. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 101. — Link 1822. En. II. p. 234.
Hill 1769. Ht. kew. p. 289: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 41. n. 1356: g. Cyteophytor. Disjungitur Fagelia.
Ell. 1817. Journ. Ac. Philad. I. Nr. 13: g. restrict. *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 164.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 130.
DC. 1825. Pr. II. p. 241: g. Clitoriar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 220.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVI; 1828. Consp. p. 151. n. 3961; 1841. Nom. p. 149. n. 5806: g. Glycinear. — Par. Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 126. — Endl. 1841. Gen. n. 6650. p. 1291; 1841. Ench. p. 671. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 221. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 553.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: g. Clitoriear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 410. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 208. Char. reform. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 87 (62).
Link 1831. Hdb. II. p. 177: g. Lotoidear.
Synon. Teramnus P. Browne; Tetramnus Gmel.; Bujacia E. Meyer; Bujackia Meisn.

Glycine Nuttall 1818. Gen. am. II. p. 114: g. Diadelph. Decandr.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 418: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 90.
= Rhynchosia DC.

Glycineae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XLVI: subdiv. Lotear. Gen.: Chaetocalyx, Glycine, Dumasia, Pueraria, Otoptera, Collaea, Grona, Barbieria, Vilmorinia, Odonia, Galactia, Cologania, Martiunsia, Neurocarpus, Clitoria, Indigofera, Psoralea.
Rchb. 1828. Consp. p. 151; 1837. Hdb. p. 226: subdiv. Fabacear. Gen. ead. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 149. (err. *Galegeae.*) Sect.: Clitorieae, Kennedyeae, Glycineae, Diocleae, Erythrineae, Wisterieae, Cajaneae, Rhynchosieae, Abrineae.

Glycineae Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 112: subtrib. Phaseolear. Gen.: Johnia, Cyamopsis, Stenolobium, Soya, Glycine, Shuteria?, Galactia. — Par. Endl. 1841. Gen. p. 1291; 1841. Ench. p. 671. Gen. ead. et Betencourtia, Kiesera, Vilmorinia, Barbieria. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. Gen. ead. (excepta Cyamopside). — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 271. Gen. ut Endl..
Rchb. 1841. Nom. p. 143: sect. Glycinear. Gen. ut Endl.

Glycinopsis DC. 1825. Prodr. II. p. 235: sect. Clitoriac. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3974 *d.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 216.
= Periandra Mart.

Glyciphylla Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 259: novum nomen pro Vaccinio hispidulo Michx.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443 (*Glycyphylla*): g. Andromedear.
= Chiogenes Salisb.

Glycirrhiza Gmel., Dumort. vid. *Glycyrrhiza Tourn.*

Glycirrhyza Gleditsch vid. *praeced.*

Glycosma „Nuttall mss.“ Torrey & Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 639: nov. g. Scandicinear. (G. occidentalis.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 359. — Walp. 1843. Rep. II. p. 423.
Endl. 1841. Spl. I. n. 4515/$_1$. p. 1414; 1841. Ench. p. 380: g. Scandicinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5333.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Scandicidar.

Glycosmia Rchb. vid. *seq.*

Glycosmis Correa 1805. Ann. Mus. VI. p. 384: nov. g. Aurantior. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 791; 1825. Syst. II. p. 314. n. 1566; 1830. Gen. I. p. 345. n. 1743. (Decandr. Monogyn.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1372 (*Glyscosmis*). 1409.
Mirb. 1813. Bull. soc. philom. p. 380: g. Aurantiacear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 538. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVIII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 393. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 586. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 250. — A. Rich. 1842.

---

*) γλυκύς, dulcis.

Glycosmis Correa cont.
Pl. vasc. Cub. p. 231. — Brongn. 1843. En. genr. p. 85. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 458.
Rchb. 1828. Consp. p. 212. n. 5530; g. Aurantiear.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 92: g. Limonear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 46 (34). — Endl. 1840. Gen. n. 5502. p. 1044; 1841. Ench. p. 548.
Rchb. 1837. Hdb. p. 314: g. Bergerear.
Rchb. 1841. Nom. p. 213. n. 8100 (*Glycosmia*): g. Limoniear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 31. 40. Sejungitur Myxospermum.
Synon. Myxospermum Röm.

Glycoxylum Capel. mss. in Herb. Mus. Paris.
= Dicoryphe Pet.-Thouars, Tulasne.

Glycycarpus Dalzell 1850 in Hook. Kew gard. misc. II. p. 38 (Hook. Ic. ser. nov. V. t. 842): nov. g. Anacardiear. (G. racemosa.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 286. (?)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 445: g. Anacardiacear.

Glycyderas Cassini 1829. Dict. v. 59. p. 63: g. Tagetinear.?
Vid. Glycideras Cass.

Glycydiderma Paulet. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 108.
= Geaster Mich.?

Glycyphila Montagne 1851. Compt. rend. XXXIII. p. 395: nov. g. Hyphomycetum, Sporotricho aff.

Glycyphylla Rafin. 1819. Amer. monthl. mag. (?), Spach vid. *Glyciphylla Rafin.*

Glycyphylla Steven 1834. Nouv. Mém. Mosc. III. p. 105: sect. Astragali. (A. glycyphyllus, etc.)

Glycyrhiza G. Don, Endl. et Al.: vid. *Glycyrrhiza Tourn.*

Glycyrrhiza*) Tourn. 1700. Inst. p. 389. t. 210: g. pl. class. X.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 255. Ed. Hall. 1745. p. 264: g. pl. class. XI.
Linn. 1737. Cliff. p. 494; 1737. Coroll. p. 13. n. 973; 1740. Syst. p. 28; 1742. Gen. ed. II. p. 363. n. 726; 1748. Ups. p. 230; 1753. Sp. II. p. 741; 1759. Syst. ed. X. p. 1168. n. 788; 1763. Sp. ed. II. p. 1046; 1764. Gen. ed. VI. p. 380. n. 882; 1767. Syst. ed. XII. p. 490: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 557; 1784. Syst. p. 669. — Reich. 1778. Gen. p. 379. n. 955. — Lour. 1790. Coch. II. p. 445. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 502. n. 1197. — Gmel. 1791. Syst. p. 1117. — Pers. 1797. Syst. p. 706; 1807. Ench. II. p. 313. n. 1726. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1143. n. 1366; 1809. En. p. 772. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 106.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127 (*Glycirrhyza*); 1764. Syst. p. 134. n. 558: g. Thalamostemonum.

*) Nomen Dioscoridi, Plinio etc. usitatum.

Glycyrrhiza Tourn. cont.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415. — Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 746 (*Réglisse*).
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 32 (*Glycirrhiza*). — Scop. 1777. Intr. p. 304. — Juss. 1789. Gen. p. 369. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 113. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 231. — DC. 1805. Franç. IV. p. 559. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 901. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 761; 1826. Syst. III. p. 201. n. 2521; 1831. Gen. II. p. 577. n. 2821. — Link 1822. En. II. p. 243. — Lois. 1827. Dict. v. 45. p. 19 (*Réglisse*). — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 260.
Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 65 (*Glychirriza*): g. (class. VI) Pentapetalar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 332: g. Genistar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 288: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 47. n. 1266: g. Cyteophytor.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 607: g. Trifoliatar.
DC. 1825. Pr. II. p. 247: g. Galegear. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1233. 1291 (*Glycyrrhiza*); 1828. Consp. p. 149. n. 3889 (sect.: Glycyrrhiza, Liquiritia); 1832. Fl. exc. p. 513; 1841. Nom. p. 147 n. 5711. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 79 (*Glycirrhiza*). — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 226. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 247. — Koch 1836. Syn. p. 178. Ed. II. p. 198. — Meisn. 1838. Gen. p. 89 (63). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 297. — Endl. 1840. Gen. n. 6532. p. 1271; 1841. Ench. p. 669. — C. A. Meyer 1841. Ind. sem. h. Petrop. VIII. p. 43. Subgen.: Euliquiritia, Arthrocarpaea, Brachylobium. *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 165. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 564. — Endl. 1843. Spl. III. p. 103. Sect. ut Meyer. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 497. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 455.
Link 1831. Hdb. II. p. 196: g. Galegoidear.
Synon. Pseudo-Glycyrrhiza Riv., Rupp.; Glycyrhiza Auct.

Glycyrrhiza Mönch 1794. Meth. p. 131: g. Thalamostemonis, disjuncta Liquiritia restrict.
Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3889 *a*: sect. Glycyrrhizae.

Glycyrrhizopsis Boissier 1856. Diagn. pl. nov. III. Ser. 2. Nr. 5. p. 81: nov. g. Leguminosar., Glycyrrhizae aff. (G. flavescens.)

Glypha Lour. mss.
= Sarcocarpa Don.

Glyphaea Hook. f. 1846. Ic. pl. t. 760; 1849. Niger Fl. p. 237. t. 22: nov. g. Tiliacear., Grewiae aff. (G. grewioides.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 110.

Glyphia*) Cassini 1818. Bull. soc. philom. Sept. p. 141; 1821. Dict. v. 19. p. 108; 1825. v. 38. p. 203; 1829. v. 59. p. 63: nov. g. Tagetinear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143.

Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2360: g. Tagetear.?

Cass. 1830. Dict. v. 60. p. 581: g. Solidaginear. (verar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29.

Endl. 1838. Gen. p. 503. n. 13: inter genera Compositar. penitus dubia.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715: g. Asteracear. minus notum.

Conf. Glycideras et Glycyderas Cass.

Glyphidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: trib. Idiothalamear. Gen. Glyphidear. Endl.

Glyphideae Fries 1825. Pl. homon. p. 270: trib. Idiothalamor. Gen.: Chiodecton, Glyphis, Medusula, Conioloma. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 12; 1841. Ench. p. 10. Gen.: Medusula, Chiodecton, Glyphis.

Fée 1824. Meth. lich. p. 36: subordo Verrucariear.

Rchb. 1828. Consp. p. 21: div. Graphidear. Gen.: Conioloma, Medusula, Glyphis.

Rchb. 1841. Nom. p. 16: div. Graphithalamar. Gen. ut Endl.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350: trib. Gymnocarpor. Gen. ead. et Actinoglyphis.

Glyphiphyllaea Endl. vid. *Gluphiphyllaea DC.*

Glyphiphyllea Endl. vid. *praeced.*

Glyphis**) Achar. 1814. Syn. Lich. p. 106 (Linn. Trans. XII. t. 3. f. 1): nov. g. Hyperogeneor. (Trypethelii sp.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 109 et Isis 1826. p. 30.

Agdh. 1821. Aphor. p. 91: g. Pyrenulatar.

Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 19: g. Trypetheliacear.

Meyer 1825. Flecht. p. 332: g. Hymenocarpor. (emend.) — Par. Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 185. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 255. n. 3373; 1831. Gen. II. p. 74. n. 3771.

Fries 1825. Pl. homon. p. 271: g. Glyphidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 392; 1841. Nom. p. 16. n. 547. — Endl. 1836. Gen. n. 139. p. 13; 1841. Ench. p. 10. — Mont. 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 81 (subgen.?: Actinoglyphis); 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350.

Fée 1841. Nov. Act. Leop. XVIII. Spl. I. p. 25: g. Graphidear. (Monogr.) — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 186. — Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 230. — Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 14. (Flora 1854. p. 236.)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Glyphidar.

*) γλύφω, excavo, sculpo.
**) γλυφίς, crena sagittae, sagitta.

Glyphocarpa R. Brown 1817. Linn. Trans. XII. p. 575: nov. g. Muscor. *Cf.* Kapp 1826 in R. Brown Verm. bot. Schr. II. p. 731. — Par. Schwägr. 1824. Suppl. II. 2. p. 94. — Leman 1827. Dict. v. 51. p. 98 (*Striatule*). — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 142. n. 3287; 1831. Gen. II. p. 727. n. 3682. (frondosor.)

Rchb. 1828. Consp. p. 36. n. 656: g. Conostomeor.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.

Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47: subg. Bartramiae. (B. subulata, striata.)

= Eubartramia C. Müll.

Glyphocarpus Brid. 1827. Bryol. II. p. 90: g. Acrocarpor. peristomor. (ibid. p. XLV g. Bartramiar.)

Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Bartramioidear.

Endl. 1836. Gen. n. 552. p. 53; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.

Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 28; 1842 in Orb. Dict. II. p. 481; 1849. ibid. VIII. p. 400: g. Bartramiear.

Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 930: g. Calyptrobryor.

= Glyphocarpa R. Brown.

Glypholecia Nyland. 1853. Ann. sc. nat. 3e sér. XX. p. 317; 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 313. 326: nov. g. Lecanorear. (G. candidissima.)

Glyphomitrion Schwägr. 1823. Suppl. II. 1. p. 41: nov. g. Muscor. frondosor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 113. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 160. n. 3308 (1831. Gen. II. p. 730 ad Grimmiam reductum).

Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 240: g. Grimmoidear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.

Synon. Griffithia R. Brown; Glyphomitrium Brid. 1826.

Glyphomitrium Brid. 1822. Meth. musc. p. 30: nov: g. Peristomor. acrocarpor. (Encalypta crispata Schwägr.)

Brachysteleum Rchb.

Glyphomitrium Brid. 1826. Bryol. I. p. 267: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIII g. Orthotrichoideor.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 49. p. 220 (*Sillonette*).

Rchb. 1828. Consp. p. 34. n. 620: g. Orthotricheor.

Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Orthotrichoidear.

Endl. 1836. Gen. n. 508. p. 49; 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.

Bruch, Schimp. . . . . Bryol. eur. III. p. III. (Fasc. II. III): g. Ptychomitriacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 886: g. Calyptrobryor.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: g. Orthotrichear.

Glyphomitrium Brid. cont. C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 765; 1851. ibid. II. p. 649: g. Grimmiear. = Glyphomitrion Schwägr.

Glyphospermum G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 174. 195: nov. g. Gentianear. verar. (G. violaceum.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 141: g. incertum Gentianacear.

Glyptopetalum*) Thwaites 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 267. t. 7 B: nov. g. Celastracear. (G. zeylanicum.)

Glyptospermae Vent. 1799. Tabl. III. p. 75: ordo 3 class. XIII. Gen.: Annona, Uvaria, Xylopia. = Anonaceae Dunal.

Glyptostrobites Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 123: nov. g. Cupressinear. foss. (Taxodium europaeum Brongn.)

Glyptostrobus Endl. 1847. Syn. Conif. p. 69; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 4. n. 1801: nov. g. Taxodinear. (Taxodium japonicum Brongn.)

Glyscosmis Dietr. vid. *Glycosmis Corr.*

Glyzyrrhiza Rchb. vid. *Glycyrrhiza Tourn.*

Gmelina Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 526. n. 1019: g. Diandr. Monogyn., pro *Michelia Amm.* propositum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 175. n. 715: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 170. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.
Linn. 1753. Sp. II. p. 626; 1759. Syst. ed. X. p. 1115. n. 681; 1763. Sp. ed. II. p. 873; 1764. Gen. ed. VI. p. 315. n. 763; 1767. Syst. ed. XII. p. 417: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 473; 1784. Syst. p. 565. — Reich. 1778. Gen. p. 316. n. 821. — Lour. 1790. Coch. II. p. 376. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 412. n. 1023. — Gmel. 1791. Syst. p. 944. — Pers. 1797. Syst. p. 602; 1807. Ench. II. p. 142. n. 1436. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 32. t. 162; 1819. III. p. 41. t. 246; 1832. Ind. III. p. 82. — Willd. 1800. Sp. III. p. 313. n. 1162.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Verbenar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 199.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 268. t. 56. f. 5 (lobata).
Juss. 1789. Gen. p. 108: g. Viticum.
Neck. 1790. El. I. p. 356. n. 556: g. Chasmatophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 319: g. Pyrenacear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 248: g. Verbenacear. — Par. Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 114. — Link 1822. En. II. p. 128. — D. Don 1825. Nepal. p. 104. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 814. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664.

Gmelina Linn. cont.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 425; 1825. Syst. II. p. 765. n. 2131; 1831. Gen. II. p. 481. n. 2373 (*Gmelinia*): g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2935.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Viticear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 232. — Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4205. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 678.
Endl. 1838. Gen. n. 3704. p. 636; 1841. Ench. p. 312: g. Lantanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 291 (200). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 372. 613. — Brongn. 1843. En. genr. p. 65. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 97.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 865: g. Euviticear.
Synon. Michelia Amm.; Cumbulu et Panel Adans.

Gmelinia Spreng. vid. *praeced.*

Gnaphalieae Cassini 1819. Dict. v. 14. p. 482; 1822. v. 23. p. 561: div. Inulear. Gen.: §. 1: Relhania, Rosenia?, Lapeirousia, Leysera, Leptophytus, Longchampia; §. 2: Chevreulia, Lucilia, Facelis, Podotheca; §. 3: Syncarpha, Faustula; §. 4: Phagnalon, Gnaphalium, Lasiopogon; §. 5: Ifloga, Piptocarpha, Cassinia, Ixodia; §. 6: Lepiscline, Anaxeton, Edmondia, Argyrocome, Helichrysum, Podolepis, Antennaria, Ozothamnus, Petalolepis, Metalasia; §. 7: Endoleuca, Shawia?, Perotriche, Seriphium, Staebe, Disparago, Oedera, Elytropappus, Siloxerus, Hirnellia, Gnephosis, Angianthus, Calocephalus, Leucophyta, Richea, Leontonyx, Leontopodium. — Par. Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 223; 1830. v. 60. p. 579. Subdivis.: Leysereae, Lucilieae, Faustuleae, *verae* (gen. 1827: Phagnalon, Gnaphalium, Lasiopogon; accedunt 1830 Schizogyne, Panaetia, Omalotheca), Cassinieae, Helichryseae, Seriphieae. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 25. 200. Gen. ex Cass., DC. etc.
Rchb. 1828. Consp. p. 104: subdiv. Inulear. Gen.: Relhania, Rosenia, Leysera, Leptophytum, Longchampia; Chevreulia, Lucilia, Facelis, Podosperma; Syncarpha, Faustula; Phagnalon, Gnaphalium, Lasiopogon; Ifloga, Piptocarpha, Cassinia, Ixodia, Ammobium; Lepiscline, Anaxeton, Edmondia, Argyrocome, Helichrysum, Podolepis, Antennaria, Ozothamnus, Petalolepis, Metalasia, Endoleuca, Shawia, Perotriche, Seriphium, Stoebe, Disparago, Oedera, Elytropappus; Siloxerus, Hirnellia, Gnephosis, Angianthus, Calocephalus, Leucophyta, Craspedia, Leontopodium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Jacobaear. Gen. ex Rchb. et Filago, Impia, Micropus.
Less. 1830. Linnaea V. p. 163: subtrib. Senecionear. Gen.: Gnaphalium. — Par. Fenzl 1839. Flora II. p. 724. Divis. ut DC. exclusis Antennarieis.

*) γλυπτός, sculptus.

Gnaphalieae Cassini cont.
Less. 1832. Syn. p. 269: subtrib. Senecionidear. Divis.: Craspedieae, Cassinieae, Helichryseae, Antennarieae. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 149. Divis.: Angiantheae, Cassinieae, Helichryseae, Seriphieae, Antennarieae, Leyssereae, Relhanieae. — Endl. 1838. Gen. p. 441; 1841. Ench. p. 242. Divis. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 216 (136). Divis. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 38. Gen. ex Endl. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 397. (Gen.: Carpesium, Filago, Gnaphalium, Helichrysum.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 182: sect. Amphigynanthar.
Rchb. 1841. Nom. p. 89: div. Tubuliflorar. Subdivis.: Antennarieae, Helichryseae, Cassinieae, Xeranthemeae, Angiantheae, Leyssereae, Relhanieae.

Gnaphalinae Rchb. 1831. Fl. exc. p. 219: div. Amphigynanthar.

Gnaphalioideae Lessing 1831. Linnaea VI. p. 524: subtrib. Senecionidear. Gen.: Antennaria, Gnaphalium.

Gnaphalion Koch 1837. Syn. p. 363. Ed. II. p. 399: sect. Gnaphalii.
= Eugnaphalium DC.

Gnaphalium*) Tourn. 1700. Inst. p. 461. t. 261: g. pl. class. XII.
Adans. 1763. Fam. II. p. 118: g. Xeranthemor.
= Diotis Desf.

Gnaphalium Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 314: g. Corymbiferar.
= Evax Gärtn.

Gnaphalium**) Linn. 1737. Gen. p. 250. n. 645; 1737. Cliff. p. 400; 1740. Syst p. 29; 1748. Ups. p. 255; 1753. Sp. II. p. 850; 1759. Syst. ed. X. p. 1209. n. 850; 1763. Sp. ed. II. p. 1191; 1764. Gen. ed. VI. p. 419. n. 946; 1767. Syst. ed. XII. p. 543: g. Syngenes. Polygam. Superfl. (ab auctoribus varia latitudine adoptat.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 620; 1784. Syst. p. 745. — Reich. 1778. Gen. p. 416. n. 1026. — Lour. 1790. Coch. II. p. 497. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 550. n. 1282. — Gmel. 1791. Syst. p. 1213. — Pers. 1797. Syst. p. 785; 1807. Ench. II. p. 415. n. 1840. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1849. n. 1474; 1809. En. p. 865. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 146. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 424.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 698: g. Corymbiferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1772. Carn. II. p. 149. — Juss. 1789. Gen. p. 179. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 516. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 395. — DC. 1805. Franç. IV. p. 133; 1815. V. p. 468. Sect.: Filago, Antennaria. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 459. — Link 1822. En. II. p. 317. — Math. 1853. Belg. I. p. 279.

Gnaphalium Linn. cont.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 105: g. Compositar. (ord. tertii.) — Par. D. Don 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 563. (valde restrict.) — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 136. Sect.: Conodiscus.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 249. n. 1030: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539. — Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 513. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1349. Sect.: Logfia, Oglifa, Gifola, Leontopodium, Gnaphalium, Antennaria, Astelma. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 9. 238. Sect.: Filago, Antennaria, Leontopodium.
Hill 1769. Ht. kew. p. 35: g. Tubulatar.
Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Pal. II. p. 467: g. Solidaginear.
Neck. 1790. El. I. p. 75. n. 133: g. Siphoniphytor. Segregatur Argyranthus.
Rebent. 1804. Neom. p. 105: g. Pentandr. Monogyn.
Mirb. 1815. Élém. II. p. 885: g. Flosculosar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 550; 1826. Syst. III. p. 467. n. 2724; 1831. Gen. II. p. 618. n. 3069: g. Eupatorinar. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 55.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 77: g. Vernoniacear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 392. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 899.
Presl 1822. Delic. Prag. I. p. . . .: g. Inulacear.
Schltd. 1823. Fl. Berol. I. p. . . . Sect.: Antennaria, Gnaphalium, Filago.
Schrank 1824. Denkschr. Ak. Münch. VIII. p. 145: g. Gnaphaloidear. verar.
D. Don 1825. Nepal. p. 172: g. Carduacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2418: g. Gnaphaliear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Less. 1830. Linnaea V. p. 164. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 328. — Kunth 1838. Berol. I. p. 351. — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 403. Novum subg.: Heterophania. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 426. Sect.: Eugnaphalium, Homalotheca. — Brongn. 1843. En. genr. p. 38. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 398. Sect.: Gnaphalion, Leontopodium, Antennaria. — G. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 245. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 91. Sect. ut DC. et Antennaria, Anaphalis.
Link 1829. Hdb. I. p. 718: g. Elichrysear.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear. — Par. A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 236. — Koch 1837. Syn. p. 363. Sect.: Gnaphalion, Leontopodium, Margaritaria, Antennaria. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 196. Sect.: Eugnaphalium, Omalotheca.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 525: g. Gnaphalioidear.

*) Nomen ex Plinio, a γναφάλιον, tomentum.
**) γνάφαλον, tomentum, lana.

Gnaphalium Linn. cont.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 222: g. Gnaphalinar. Sect.: Logfia et Oglifa, Gifola, Leontopodium, Gnaphalium.
Less. 1832. Syn. p. 328: g. Helichrysear. Subgen.: Gnaphalium (= *Gnaphalium Don, DC*), Achyrocline, Lasiopogon. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 221. Sect.: Eugnaphalium, Euchiton. — Endl. 1838. Gen. n. 2746. p. 447; 1841. Ench. p. 243. Sect. ut DC. et Homalotheca. — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3479. Sect.: Gnaphalium, Euchiton. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 478. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Schultz Bip. 1855 in Seem. Bot. of Herald p. 310. Subgen.: Rhodognaphalium. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 284.
Endl. 1833. Norf. p. 50: g. Synantherar.
A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 129: g. Senecionidear.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear. — Par. Ledeb. 1845. Ross. II. p. 608. Sect.: Eugnaphalium, Homalotheca.
Synon. Dasyranthus Rafin. (Steud.)

Gnaphalium Gärtn., Meyer & Scherb. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 189: g. Discoidear., sejuncta Antennaria et injuncto Helichryso a Linnaeano discrepans.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 311: g. Helichrysear. Sect.: Eugnaphalium, Helichrysum. *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 169.
= Gnaphalium Don et Helichrysum Gärtn.

Gnaphalium Cassini 1821. Dict. v. 19. p. 115; 1822. v. 23. p. 561; 1827. v. 49. p. 223; 1830. v. 60. p. 580: g. restrict. Gnaphaliear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 186.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1455: sect. Gnaphalii.
= Eugnaphalium DC.

Gnaphalodes Tourn. 1700. Inst. p. 439. t. 261: g. pl. class. XII.
Adans. 1763. Fam. II. p. 118: g. Xeranthemor.
Mönch 1794. Meth. p. 568: g. Petalostemonis.
= Micropus Linn.

Gnaphalodes A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 228: nov. g. Gnaphaliear. (G. uliginosum et condensatum.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 286.

Gnaphaloideae R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. III. p. 558 (Verm. bot. Schr. I. p. 63): sect. Corymbiferar. *Cf.* Cass. 1821. Dict. v. 19. p. 123.
F. de Paula Schrank 1824. Denkschr. Ak. Münch. VIII. p. 141. Divis.: *verae* (gen.: Gnaphalium, Anaxeton, Argyrocome, Helichrysum, Xeranthemum), Filagineae.

Gnaphalopsis DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 258: nov. g. Compositar. incertae sedis. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3032/$_6$. p. 1390; 1841. Ench. p. 251.

Gnaphalopsis DC. cont.
Meisn. 1839. Gen. p. 191 (129): g. Pluchei-near.?
A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 116: sect. Hymenatheri.

Gnemon Rumph. 1741. Amboin. I. p. 181. t. 71. 72; 1747. V. t. 7. 8. *Cf.* Hamilt. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 367.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 250: sect. Gneti.
= Gnetum Linn.

Gneorum G. Don vid. *Cneorum.*

Gnephosis Cassini 1820. Bull. soc. philom. Mars p. 45; 1821. Dict. v. 19. p. 127; 1823. v. 23. p. 563: nov. g. Gnaphaliear. (Gn. tenuissima.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2445. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Leontopodiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.
Less. 1832. Syn. p. 270: g. Craspediear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 151: g. Angianthear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2717. p. 442; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 216 (137). — Fenzl 1839. Flora II. p. 726. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 2523. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 99.

Gnesiolichenes)* Arnold 1858. Flora I. p. 97: sect. Lichenum. Ord.: Cladoniaceae, Usneaceae, Parmeliaceae, Urceolariaceae, Lecideaceae; Endocarpaceae, Verrucariaceae.

Gnesiopersea Nees 1836. Laurin. p. 124. 671: subg. Perseae. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 489.
Endl. 1837. Gen. n. 2027 *a.* p. 317; 1841. Ench. p. 197: sect. Perseae. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1338. — Rchb. 1841. Nom. p. 71. n. 2678. 1.

Gnetaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 311.
Endl. 1837. Gen. p. 262; 1841. Ench. p. 146; 1847. Syn. Conif. p. 247; 1847. Spl. IV. p. 10: ordo Coniferar. Gen.: Ephedra, Gnetum. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). Gen. ead.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 135; 1849 in Orb. Dict. VI. p. 249: fam. Coniferar. Gen. ead.
C. A. Meyer 1846. Mon. Ephedr. p. 1; 1849. Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. p. 252. Gen. ead. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 776.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 232: ordo Gymnogenar. Gen. ead.
Blume 1848. Rumphia IV. p. 1. Gen.: Gnetum.
Karst. 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 217: fam. Drupiferar.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1066: ordo Gymnospermar. Gen.: Gnetum.
Tulasne 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. X. p. 110. Gen. ut Endl.
Synon. Gneteae Blume.

---

*) γνήσιος, genuinus, legitimus.

Gneteae Blume 1833. Nov. fam. expos. p. 23; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 101: nova fam. plant. Gen.: Gnetum.
Mart. 1835. Consp. p. 11: ordo 60.
Rchb. 1841. Nom. p. 61: div. Taxinear. Gen. id.
= Gnetaceae Lindl.

Gnetum*) Linn. 1767. Mant. p. 18. n. 1278: g. Monoec. Adelph. — Par. Blanco 1837. Fl. Filipin. p. 747.
Linn. 1767. Syst. ed. XII. p. 637: g. Monoec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 724; 1784. Syst. p. 867. — Reich. 1778. Gen. p. 501. n. 1188. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 659. n. 1473. — Pers. 1797. Syst. p. 911; 1807. Ench. II. p. 577. n. 2128. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 591. n. 1731.
Scop. 1777. Intr. p. 349: g. Amentacear.
Juss. 1789. Gen. p. 406: g. Urticis aff.
Neck. 1790. El. III. p. 253. n. 1641: g. Axonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 1003: g. Monadelph. Diandr.
Batsch 1802. Tab. p. 178: g. Scabridar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 311: g. Urticeis aff. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 777. n. 3071; 1831. Gen. II. p. 683. n. 3446.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 361: g. Urticear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 129.
Agdh. 1825. Aphor. p. 204: g. Thoacear.
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 513: g. Piperacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1957: g. Chloranthear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 86.
Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 5. t. 1: g. Coniferar.
Roxb. 1832. Ind. III. p. 517: g. Monoec. Monandr.
Blume 1833. Nov. fam. exp. p. 25; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 102: g. Gnetear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 61. n. 2334.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 311; 1847. Veg. kd. p. 234: g. Gnetacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1805. p. 263; 1841. Ench. p. 146; 1847. Syn. Conif. p. 249; 1847. Spl. IV. p. 11. n. 1816/$_2$. Sect.: Gnemon, Thoa. — Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). — Blume 1848. Rumphia IV. p. 2; 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 27. — Meyer 1849. Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. p. 253. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 250. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1066. — Tulasne 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. X. p. 112.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 283: g. Ephedrear.
Synon. Ula Rheede; Gnemon Rumph.; Thoa Aubl.; Abutua Lour.; Arthostema Neck.

Gnidia**) Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Vepreculur. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 414.

*) Nomen ex Columella.
**) Gnidus s. Cnidus fuit Cariae urbs, Veneri dicata.

Gnidia Linn. cont.
Linn. 1753. Sp. I. p. 358; 1759. Syst. ed. X. p. 1004. n. 438; 1762. Sp. ed. II. p. 512; 1764. Gen. ed. VI. p. 193. n. 487; 1767. Syst. ed. XII. p. 272. n. 482: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 308; 1784. Syst. p. 372. — Reich. 1778. Gen. p. 197. n. 528. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 260. n. 666. — Gmel. 1791. Syst. p. 633. — Pers. 1797. Syst. p. 398. — Willd. 1799. Sp. II. p. 424. n. 775; 1809. En. p. 426.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Thymelear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 436. n. 969. — Agdh. 1826. Aphor. p. 234. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 450. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 120.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172: g. Tetrapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 343: g. Seminudar.
Juss. 1789. Gen. p. 77: g. Thymelaear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 181 (sphalm. *Guidia*). — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 325; 1825. Syst. II. p. 238. n. 1478; 1830. Gen. I. p. 318. n. 1625. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 130. — Link 1829. Hdb. I. p. 381. — Bartl. 1830. Ord. p. 115. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1308. — Meisn. 1840. Linnaea XIV. p. 423.
Neck. 1790. El. II. p. 180. n. 891: g. Aclithrophytor.
Wendl. 1798. Bot. Beob. p. 15. t. 2. f. 11—14.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 240: g. Daphnoidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2100. p. 331; 1841. Ench. p. 209. — Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2443.
Cram. 1803. Disp. p. 109: in Decandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 183: g. Daphnacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 272. n. 1098.
Link 1821. En. I. p. 357: g. Thymelinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1774: g. Daphnear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Thymelinear.
Meisn. 1841. Gen. p. 330 (243); 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 580: g. Gnidiear. Sect. (1857) ut Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 63. n. 2102: g. Stellerear. Sect.: Eugnidia, Phidia.
Synon. Struthia Roy., Linn. 1742; Nectandra Berg.; Dessenia Adans.; Canalia Schmidt; Epichroxantha et Calysericos pt. Eckl. & Zeyh.

Gnidieae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 330 (243): div. Thymelaear. Gen.: Cryptadenia, Lachnaea, Gnidia, Linostoma, Struthiola. — Simil. Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 495. 665. Subtrib.: *isostemoneae* (gen.: Kelleria, Daphnobryon, Struthiola), *diplostemoneae* (gen.: Cryptadenia, Lachnaea, Gnidia, Lasiosiphon, Dicranolepis, Linostoma, Lophostoma).

Gnidieae Meisn. cont.
C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 355: trib. Daphnacear. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 46.

Gnidium Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 443: sect. Daphnes. (D. Gnidium.) — Par. Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 538.

Gochnatea Steud. vid. *seq.*

Gochnatia*) HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 19: nov. g. Barnadesiar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 362.
Cass. 1821. Dict. v. 19. p. 149: g. Carlinear. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 697 (*Gochnatea*).
Spreng. 1826. Syst. III. p. 388. n. 2651: g. Cynarear.
Cass. 1827. Dict. v. 47. p. 499; 1830. v. 60. p. 570: g. Stähelinear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10.
Less. 1830. Linnaea V. p. 260; 1832. Syn. p. 102: g. Mutisiear. Subgen. (1832): Gochnatia, Leucomeris, Hedraiophyllum. — Par. Hook. & Arn. 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 108. Subgen.: Pentaphorus, Nardophyllum?, Cyclolepis?
Spreng. 1831. Gen. II. p. 610. n. 3011: g. Eupatorinar.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 24: g. Eumutisiear. Sect.: Vernonioides, Hedraiophyllum, Pentaphorus. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2915. p. 484; 1841. Ench. p. 248 (injunctis Cyclolepide et Anastraphia Don). Sect.: Eugochnatia, Hedraiophyllum. — Meisn. 1839. Gen. p. 230 (142).
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3794: g. Chuquiragear. Sect.: Gochnatia, Hedracophyllum, Pentaphorus.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: g. Barnadesiear.

Gochnatia Lessing 1830. Linnaea V. p. 261; 1832. Syn. Compos. p. 102: subg. Gochnatiae. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3794. 1.
= Eugochnatia Endl.

Gochnatieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 97: subdiv. Barnadesiear. Sect.: Moquinieae, Chuquirageae, Barnadesieae genuinae.

Gockia Bronner vid. *Gokia.*

Godal Adans. 1763. Fam. II. p. 3: g. Byssor. (*Byssus* 15—17 *Dill.* Musc. t. 1. — *Conferva* 6—24 *Dill.* Musc. t. 2—4.)
= . . .?

Godetia**) Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 386: nov. g. Epilobiear. (Oenothera purpurea W.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6116. p. 1191; 1841. Ench. p. 637. — Walp. 1843. Rep. II. p. 87.
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 172. 286 (Nouv. Ann. Mus. IV. p. 387): g. Epilobinear.
Lindl. 1836. Bot. Regist. XVII. t. 1849: g. Onagracear.

* Dicat. Fr. Ch. Gochnat, botanico Argentorat.
**) Dicat. Charles Godet, Neufchatel.

Godetia Spach cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6563: g. Onagrear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 120 (86).
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 502: sect. Oenotherae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 117: g. Oenotherear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Epilobear.
Synon. Rhodanthos Fisch. & Mey.

Godiaeum Bojer Hort. Maurit. p. 282 (teste Baillon): vid. *Codiaeum Rumph.*

Godinella „Lestib." Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 343: g. Primulacear.
Lerouxia Mérat.

Godovia Pers. vid. *seq.*

Godoya*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 58. t. 11; 1798. Syst. p. 101: nov. g. Decandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 467. n. 1059 (*Godovia*). — Hedw. 1806. Gen. p. 324. n. 1279.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 689: g. Samydear.
Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 154: g. Hypericear. — Par. Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 345.
DC. 1824. Pr. I. p. 558: g. Clusiear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 330. n. 1612: g. Guttiferar.?
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5424: g. Tremandrear.
Bartl. 1830. Ord. p. 294: g. Carpodontear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33)? — Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8011.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 430. n. 2134: g. Ternströmiear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 572: g. Laplacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 40 (30): g. Ternströmiacear.? — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 256. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.
Endl. 1840. Gen. n. 5427. p. 1023; 1841. Ench. p. 532: g. dubium, Ternströmiaceis aff.
Planch. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 259; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 597: g. Luxemburgiear. Subgen.: Eugodoya, Rutidanthera. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 176. Subgen. ead. — Endl. 1850. Spl. V. p. 98. n. 5957. Sect.: Eugodoya, Rytidanthera.

Godoya Martius & Zucc. 1824. Nov. gen. I. p. 118. t. 74: g. Bonnetiar. *Cf.* Flora 1825. I. p. 31.
= Blastemanthus Planch.

Godronia „Moug. & Lév." Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Sticteor. (Nomen.)

Goeppertia**) Nees 1831. Linnaea VI. p. 337: nov. g. Marantacear. (Maranta zebrina.)
= Calathea Meyer.

*) Dicat. Eman. Godoy, principi Pacis.
**) Dicat. H. Rob. Göppert, prof. Wratislaw.

Göppertia Nees 1836. Syst. Laurin. p. 365: g. Oreodaphnear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2051. p. 321; 1841. Ench. p. 197. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1332. 1350. — Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2659. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 473.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.
Synon. Endlicheria Nees; Schauera Nees.

Göppertia „Presl" Sternb. 1838. Vers. II. p. 120: g. Polypodiacitum. (G. polypodioides.)
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 105; 1846. Chlor. prot. p. LI: g. Pecopteridum.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 76: g. Filicum foss.

Göthea*) Nees 1821. Flora I. p. 304: nov. g. Malvacear., Pavoniae et Achaniae aff. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 91. t. 7. 8 (semperflorens et cauliflora).
DC. 1824. Pr. I. p. 501: g. Wallichiear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV. — Bartl. 1830. Ord. p. 344. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 539.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 124. n. 2451: g. Pentapetear.
Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5291: g. Götheacear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 559. n. 2732: g. Büttnerear. (Monadelph. Polyandr.)
Meisn. 1837. Gen. p. 26 (22): sect. Pavoniae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5275 *d.* p. 982; 1841. Ench. p. 511. (?)
Rchb. 1837. Hdb. p. 287: g. Pavoniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 200. n. 7628: g. Urenear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370: g. Malvear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 303.
Synon. Schouwia Schrad.

Götheaceae Rchb. 1828. Consp. p. 204 (1832. Fl. exc. p. 775): subdiv. Sterculiear. Gen.: Gluta; Eriolaena, Schillera, Göthea.

Götzea Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3928: g. Phaseolear.
= Rothia Pers.

Götzea**) Wydler 1830. Linnaea V. p. 423: nov. g. Ebenacear. (G. elegans.) *Cf.* A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 245. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 250 (159). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 400.
Endl. 1839. Gen. p. 744. n. 4356: g. Styracear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5280. (genuinar.)
Endl. 1841. Ench. p. 363. n. 4355: g. dubium Ebenaceis aff.

Gohoria Necker 1790. Elem. bot. I. p. 172. n. 287: nov. g. Scadiophytor., a Dauco L. sejunctum.
= Ammi Tourn.

Gokia***) Bronner 1857. Traub. Rheinth. p. 11 (et p. 19 *Gockia*): g. Vitium class. II.

*) Dicat. Joh. Wolfgang de Göthe.
**) Dicat. Joh. Aug. Götze, botanico Quedlinb.
***) K. F. v. Gok, scriptor de Vitis classificatione.

Goldbachia*) DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 242; 1821. Syst. II. p. 576; 1824. Prodr. I. p. 212: nov. g. Anchoniear. (Raphanus laevigatus Bieb.) — Par. C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 207. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 226. — Meisn. 1837. Gen. p. 14 (13). — Endl. 1839. Gen. n. 4944. p. 822; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 214. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 92.
Link 1822. En. II. p. 172: g. Tetradynam. Siliquos.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 852. n. 2263; 1831. Gen. II. p. 512. n. 2505: g. Synclistar.
Rchb. 1828. Consp. p. 181. n. 4715: g. Anchionear.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.
Link 1831. Hdb. II. p. 282: g. Raphanidear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 179. n. 6907: g. Goldbachiear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 322: g. Lomentosar.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 728: g. Siliquosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Anchonidar.

Goldbachia Trinius 1821 in Spreng. n. Entd. II. p. 81: nov. g. Graminum. (G. Mikani.)
Schult. 1827. Mant. III. p. 327. 661: g. Triandr. Digyn.
= Ischaemum Linn.

Goldbachieae Rchb. 1837. Hdb. p. 258: subdiv. Synclistar. Gen.: Goldbachia, Anchonium, Sterigmostemon.
Rchb. 1841. Nom. p. 179: sect. Synclistar. articulatar. Gen.: Goldbachia, Anchonium, Sterigma, Morisia; Erucarieae.

Goldenia Räusch. ex Steud. Nom. I. p. 698: g. Tetrandr. Tetragyn. (G. procumbens.) Quid? (Steud.)
Vid. Coldenia Linn.

Goldfussia**) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 87; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 171: nov. g. Ruelliear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4253. — Endl. 1839. Gen. n. 4056. p. 701; 1841. Ench. p. 343. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 149. — Meisn. 1840. Gen. p. 295 (203).
Morren 1839. Bull. Ac. Brux. p. 59.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 591: g. Echmatacanthor.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 63: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Ruellidar.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 801: sect. Strobilanthis.

Golia Adans. 1763. Fam. II. p. 231: g. Anagallidum.
= Soldanella Tourn.

*) Dicat. C. L. Goldbach, prof. botan. Mosquensi.
**) Dicat. Georgio Aug. Goldfuss, prof. Bonn.

Gomara Adans. 1763. Fam. II. p. 248: g. Sedorum.
= Crassula Haw.

Gomara*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 93. t. 19: nov. g. Didynam. Angiosperm.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 273: g. Personatar. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 157.
Pers. 1807. Ench. II. p. 148. n. 1452: g. Rhinanthoidear. et denuo p. 163. n. 1477 in Antirrhineis.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 783. n. 2161; 1831. Gen. II. p. 487. n. 2403 (*Gomaria*): g. Rhinanthear.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 218: g. Scrophularinear. — Par. Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7. (minus notum.) — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 618. — Spach 1840. Vég. phan. IV. p. 272 (*Gomaria*).
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3210: g. Caprariacear.
Endl. 1839. Gen. n. 4020. p. 695; 1841. Ench. p. 340: g. Scrophularinar. dubium. — Par. Meisn. 1840. Comm. p. 214. — Walp. 1845. Rep. III. p. 436.
Rchb. 1841. Nom. p. 119. n. 4646: g. Manulear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 364. 554: g. Scrofularineis aff.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 585; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Scrophulariacear. non satis notum.

Gomaria Spreng., Spach vid. *praeced.*

Gomesa**) R. Brown 1815. Bot. Mag. n. 1748 (Verm. bot. Schr. V. p. 408): nov. g. Orchidear. (G. recurva.) — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 161. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 729. n. 3007; 1831. Gen. II. p. 669. n. 3378 (*Gomesia*).
Synon. Gomeza Lindl.; Gomezia Bartl.; Physanthera Bertero?

Gomesia Spreng. vid. *praeced.*

Gomesia La Llave 1832. Reg. trim. Mexic. p. 40: g. Compositar. indescriptum. (Endl. Gen. p. 1391.)

Gomeza Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530): g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1534. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — *Cf.* Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. . . . . , ubi genus a plurimis, etiam a Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182, ad Rodrigueziam relatum restituitur.
= Gomesa R. Brown.

Gomezia Bartl. 1830. Ord. nat. p. 58: g. Epidendrear.
Hoffmsg. 1843. Verz.: g. Orchidear. *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 832.
= Gomesa R. Brown.

Gomezium DC. 1825. Prodr. II. p. 257: sect. Nissoliae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3895 *b*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 235.
= Machaerium Pers. pt.

Gomidesia*) Berg 1855. Linnaea XXVII. p. 6; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 11: nov. g. Myrcioidear. (Myrcia spectabilis DC. etc.)

Gomortega**) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 62. t. 10; 1798. Syst. p. 108: nov. g. Decandr. Monogyn. *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 183. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 368.
Juss. 1822. Dict. v. 25. p. 349: g. Laurinear. — Par. Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 396 (*Gomortegia*).
Rchb. 1828. Consp. p. 212a. n. 1916b: g. Laurear.?
= Cryptocaryae sect. Peumus Nees.

Gomortegia Wittst. vid. *praeced.*

Gomosia Poir. vid. *Gomozia Mutis.*

Gomotriche Turczan. vid *Goniotriche Turcz.*

Gomozia „Mutis“ Linn. f. 1781. Suppl. p. 17. n. 1365: g. Tetrandr. Digyn. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 19. p. 162. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 167. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 91. n. 230. — Gmel. 1791. Syst. p. 286. — Pers. 1797. Syst. p. 173.
Juss. 1789. Gen. p. 198: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 435. — Hedw. 1806. Gen. p. 82. n. 378. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 184 (*Gomosia*).
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
= Nertera Banks.

Gomphandra***) Wallich 1832. Catal. n. 3718. 7204.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 439.
Wight . . . . Illustr. p. 102.
Endl. 1840. Gen. n. 5497. p. 1043; 1841. Ench. p. 546: g. Olacinear. (dubium.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5268. — Meisn. 1843. Comm. p. 345. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 263.
Benth. 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 679; 1841. Ann. and Mag. VII. p. 215: g. Icacinear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 82. n. 5488/1. — Walp. 1843. Rep. II. p. 802. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 9. 14. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444.
= Stemonurus Blume.

Gomphia†) Schreb. 1789. Gen. I. p. 291. n. 738: g. Decandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 569. n. 851. — Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 739. — Cram. 1803. Disp. p. 106. — Pers. 1805. Ench. I. p. 465. n. 1046.
Vahl 1791. Symb. II. p. 49.
Hedw. 1806. Gen. p. 300. n. 1191: g. Tulipiferar.
Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 21. t. 74: g. Simarubear.
DC. 1811. Ann. Mus. XVII. p. 414; 1824. Pr. I. p. 736: g. Ochnacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 186. — St. Hil. 1823. Mém. Mus. X. p. 130. 274. t. 1; 1824.

---

*) Dicat. Lopez de Gomara, botanico Hispano.
**) Dicat. Bern. Ant. Gomes, medico.

*) Dicat. Dr. Gomides, Mariano.
**) Dicat. Dr. Casim. Gomez Ortega.
***) γόμφος, clavus ligneus. (?)
†) γομφία, dens molaris.

Gomphia Schreb. cont.
Pl. rem. Brés. p. 90. t. 9; 1825. Fl. Bras. I. p. 60. — HBK. 1824. Nov. gen. VI. p. 13. — Kunth 1824. Syn. III. p. 337. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45. — Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 116. t. 178—185. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 815. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 152. — Meisn. 1837. Gen. p. 66 (47). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1413. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 336. — Erhard 1849. Flora I. p. 241. Sect.: Ouratea, Correia, Jabotapita.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 812; 1825. Syst. II. p. 317. n. 1577; 1830. Gen. I. p. 347. n. 1755: g. Ochnear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII; 1828. Consp. p. 199. n. 5188; 1837. Hdb. p. 283; 1841. Nom. p. 197. n. 7545. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 384. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 382. — Endl. 1840. Gen. n. 5958. p. 1142; 1841. Ench. p. 606. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 475. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 421.
Planch. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 255; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 593; 1847. ibid. VI. p. 1: g. Gomphiear. Sect.: Gomphiastrum, Eugomphia. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 181. Sect. eaed. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99. n. 5961/$_2$. Sect. eaed. — Klotzsch 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 238.
Synon. Jabotapita Plum.; Ouratea Aubl.; Uratea Gmel.; Correia Vell.; Philomeda Nor.; Sophisteques Comm.; Cittorhynchus Willd.; Ochnae sp. Linn.

Gomphiastrum Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 2: sect. Gomphiae. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 181. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99. n. 59611/$_2$ *a*.

Gomphichis Lindl. 1840. Orchid. gen. p. 446; 1847. Veg. kingd. p. 182: nov. g. Cranichidar. — Par. Endl. 1841. Ench. n. 1548/$_2$. p. 113; 1842. Spl. II. p. 18.
Meisn. 1842. Gen. p. 385 (288): g. Cranichidear.

Gomphidius Fries 1838. Epicr. p. 318; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 306: g. Agaricinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 496. (genuinor.) — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 452. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 183. 186 (*Gomphidus*). — Bail 1858. Syst. p. 34. t. 34.
Synon. Gomphus Fries olim.

Gomphidus Bonord. vid. *praeced.*

Gomphieae Planchon 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. VI. p. 255; 1846. Lond. journ. bot. V. p. 593. 648: sect. Ochnacear. Gen.: Ochna, Elvasia, Gomphia. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 179. Gen. ead.
Endl. 1850. Spl. V. p. 99: subordo Ochnacear. Gen. ead.

Gomphillus Nyland. 1855. Mém. soc. Cherb. III.
Synon. Mycetodium Massal.; Berongeria Massal.

Gomphinaria Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 130: nov. g. Stilbinor. (G. amoena.) *Cf.* Preuss 1852. ibid. XXV. p. 160.

Gomphocarpus R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 38 (Verm. bot. Schr. II. p. 375): nov. g. Asclepiadear. (Asclepiadis sp. L.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 482; 1825. Syst. I. p. 849. n. 980; 1830. Gen. I. p. 211. n. 1076. (Pentandr. Digyn.) — Schult. 1820. Syst. VI. p. x. 86. — Link 1821. En. I. p. 251; 1829. Hdb. I. p. 437. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1052. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 201. — Decne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 324; 1842 in Orb. Dict. II. p. 212 (verar.); . . . . in Webb Canar. III. p. 17. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 900. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.) — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 481.
Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 190: g. Apocinear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI; 1828. Consp. p. 131. n. 3427: g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 550. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 53.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 143: g. Asclepiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4974. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3484. p. 593; 1841. Ench. p. 299: g. Euasclepiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 269 (176).
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 556: g. Asclepiadar.

Gomphogramma Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: g. Fragilariear.

Gomphogyne Griffith . . . . On Dr. Cantors coll. p. 26. not. t. 3.
Endl. 1850. Spl. V. p. 50. n. 5121/$_3$: g. Nhandirobear.

Gompholobium Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 220 (ibid. IX. p. 249); 1805 in Konig Ann. bot. I. p. 505: nov. g. Leguminosar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 294. n. 1170. — R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 11 (Verm. bot. Schr. II. p. 461). Sejunguntur Burtonia, Jacksonia. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 191. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 349. n. 1649; 1830. Gen. I. p. 365. n. 1844. (Decandr. Monogyn.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1504.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 744: g. Sophorear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 131. — DC. 1825. Pr. II. p. 105. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4073. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 408. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 118. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 173. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (57).
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 29; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 72: g. Eupodalyriear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6432. p. 1256; 1841. Ench. p. 667. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 35. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 453.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5925: g. Podaliriear.
Brongn. 1834. Én. genr. p. 126: g. Podalyriear.

Gomphonema Agardh 1824. Syst. Alg. p. XVI. 11: nov. g. in appendice Diatomear. *Cf.* Leiblein 1830. Flora p. 327.
Rchb. 1828. Consp. p. 26. n. 445: g. Echinellear.
Agdh. 1830. Consp. Diat. p. 32: g. Cymbellear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 407; 1841. Brit. Alg. p. 206. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 194. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 564: g. Diatomacear. liberar. Sect.: Cymbophora, Paltanophora, Sphenophora.
Endl. 1836. Gen. n. 5. p. 2; 1841. Ench. p. 2: g. Frustuliear. Sect. ut Kütz. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 635. Sect. eaed.
Unger 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 256: g. Bacillariear.
Ehrenb. 1840. Ber. Ak. Berl. p. 211: g. Bacillarior.
Kütz. 1844. Bacill. p. 84; 1845. Phyc. germ. p. 88; 1849. Sp. Alg. p. 63. n. 42: g. Gomphonemear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 43; 1853. Süssw. Diat. — Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97. — Math. 1853. Belg. II. p. 537.

Gomphonemeae Kützing 1844. Bacill. p. 82; 1845. Phycol. germ. p. 87; 1849. Spec. Alg. p. 62: fam. Diatomear. Gen.: Sphenella, Gomphonema, Sphenosira.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 39: sect. Diatomacear. Subsect.: Achnantheae, *genuinae* (gen.: Gomphonema), Licmophoreae.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: subtrib. Styláriear. Gen.: Sphenoneis, Gomphonema.
Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: fam. Diatomacear. cuneatar. Gen. ut Kütz.
Math. 1853. Belg. II. p. 537: trib. 33 Algar. Gen.: Sphenella, Gomphonema.

Gomphopetalum Turczan. 1841. Bull. soc. Mosc. XV. Nr. 3. p. 539: nov. g. Umbelliferar., Trochiscantho aff. (G. viridiflorum et albiflorum.) *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 292.
Endl. 1842. Spl. II. p. 69. n. $4453/_1$: g. Angelicear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 358. — Walp. 1843. Rep. II. p. 406. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 294.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Angelicidar.

Gomphophorus Brid. mss.
= Lyellia R. Brown.

Gomphophyllum Gaudin 1828. Fl. Helv. III. p. 97: sect. Saxifragae. (S. cuneifolia, umbrosa, stellaris.)

Gomphora Fries 1825. Pl. homon. p. 88: nov. g. Pileolator. (Canthar. Gomphus.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 307.
= Martella Scop.?

Gomphosia Weddell 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 14: nov. g. Cinchonear. (Exostema dissimiliflorum.) *Cf.* Flora 1849. p. 301. — Par. Benth. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 231. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 129.

Gomphosia Weddell cont.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 789: g. Eucinchonear.
= Aspidanthera Benth.

Gomphosphaeria Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phycol. gener. p. 165: g. Desmidiear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 99: g. Pediatrear.
Kütz. (Alg. Decad. XVI. nr. 151) 1849. Sp. Alg. p. 233. n. 177: g. Hydrococcear.

Gomphospora Massalongo 1853. Mem. lich. p. 40: nov. g. Lichenum. (Urceolaria viridescens.)

Gomphostegia „Benth." Rchb. vid. *seq.*

Gomphostema Hassk. vid. *seq.*

Gomphostemma Wallich 1831. Pl. As. rar. II. p. 12.
Benth. 1835. Labiat. p. 646; 1848 in DC. Pr. XII. p. 550: g. Prasiear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 857. — Rchb. 1837. Hdb. p. 189 (*Gomphostegia*); 1841. Nom. p. 107. n. 4158. — Endl. 1838. Gen. n. 3673. p. 630; 1841. Ench. p. 308. — Meisn. 1840. Gen. p. 289 (197). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 356. 463. — Walp. 1845. Rep. III. p. 896. 991. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 985.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 133 (*Gomphostema*): g. Labiatar.
Synon. Anthocoma Zoll.

Gomphostigma Turczan. 1843. Bull. soc. Mosc. XVI. Nr. 1: nov. g. Scrophularinar., Scopariae proximum. *Cf.* Flora 1844. p. 120.
Walp. 1845. Rep. III. p. 264: g. Gratiolear. et ibid. p. 452 Veronicear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 434: g. Buddleiear.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Buddleear.

Gomphostylis „Wallich mss." Lindl. 1830. Orchid. gen. p. 43: sect. Coelogynae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1347*b*. p. 190; 1841. Ench. p. 109. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1935. 2.
Synon. Pleione Don.

Gomphotheca Nuttall . . . . : sect. Oxythecae.
Miers 1853. Linn. Trans. XXI. 2. p. . . . : g. Eriogonear.

Gomphraena Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 88. t. 60: g. Pentandr. Digyn. — Par. Thunb. 1784. Fl. jap. p. 114. — Lour. 1790. Coch. I. p. 174.
Mönch 1794. Meth. p. 647: g. Petalostemonis.
Lagasc. 1816. Gen. et spec. p. 21: g. Monadelph. Pentandr. (G. decumbens.)
= seq.

Gomphrena*) Linn. 1737. Gen. p. 69. n. 168; 1737. Cliff. p. 86; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 57; 1753. Sp. I. p. 224;

---

*) Nomen ex Dalechampio et Bauhino. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 97.

Gomphrena Linn. cont. 1759. Syst. ed. X. p. 949. n. 279; 1762. Sp. ed. II. p. 326; 1764. Gen. ed. VI. p. 123. n. 314; 1767. Syst. ed. XII. p. 197. n. 311: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 219; 1784. Syst. p. 264. — Aubl. 1775. Guian. I. p. 280 *(Comphrena)*. — Reich. 1778. Gen. p. 127. n. 343. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 172. n. 441. — Gmel. 1791. Syst. p. 455. — Pers. 1797. Syst. p. 278. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1321. n. 503; 1809. En. p. 293. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 63.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 217. n. 907: g. Petalostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Holeracear.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Jalapar.

Scop. 1777. Intr. p. 346: g. Seminudar.

Medic. 1787. Malv. p. 93; 1789. Vorles. IV. 1. p. 224 *(cf. Amaranthoides)*: g. Monadelph. Pentandr. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 153.

Juss. 1789. Gen. p. 88: g. Amaranthor.

Neck. 1790. El. II. p. 174. n. 879: g. Aclithrophytor.

Gis. 1792. Prael. p. 106: g. Holoracear.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 267: g. Amaranthoidear.

Batsch 1802. Tab. p. 174: g. Amaranthinar.

Juss. 1803. Ann. Mus. II. p. 131: g. Amarantacear. — Par. Massey 1804. Dict. v. 2. p. 15 *(Amarantine)*.

Pers. 1805. Ench. I. p. 257. n. 586: g. Pentandr. Monogyn.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 207: g. Amaranthacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 186. n. 769. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 415. Ed. Nees p. 271. Disjungitur Philoxerus. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 201. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLV. 537. n. 1039. — Link 1821. En. I. p. 153; 1831. Hdb. II. p. 420. — Kunth 1823. Syn. II. p. 6. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 548. — Agdh. 1825. Aphor. p. 220.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 318; 1825. Syst. I. p. 822. n. 931; 1830. Gen. I. p. 200. n. 1016: g. Amarantear.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Amaranthear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 868.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Gomphrenear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1958. p. 301; 1841. Ench. p. 185.: Sect.: Sertürnera, Pfaffia Hebanthe, Gomphrena (1847. Spl. IV. p. 43 Eugomphrena). — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6425. Sect. eaed. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 102. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 383. Sect.: Sertürnera, Hebanthe, Pfaffia, Wadapus, Xerosiphon. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1050.

Synon. Amaranthoides Tourn.; Caraxeron Vaill.; Coluppa Adans.; Gomphraena Jacq.

Gomphrena Martins 1826. Nov. gen. II. p. 1. t. 101—122; 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 297: g. Amarantacear. restrict. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 256.

Rchb. 1828. Consp. p. 164 n. 4359: g. Gomphrenear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 318 (231). — Spach 1841 in Orb. Dict. I. p. 326 *(Amarantine)*.

Bartl. 1830. Ord. p. 298: g. Amaranthacear.

Endl. 1837. Gen. n. 1958 *d*. p. 302; 1841. Ench. p. 185: sect. Gomphrenae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6425. 4.

= Eugomphrena Endl.

Gomphreneae Rchb. 1828. Consp. p. 164: sect. Amaranthear. Gen.: Trommsdorffia, Iresine, Rosea, Philoxerus, Hebanthe, Gomphrena, Hoplotheca, Lestiboudesia, Cladostachys, Celosia, Hermbstädtia, Aërva, Acroglochin, Amaranthus, Chamissoa, Charpentiera, Digera, Deeringia.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: trib. Amaranthidear. Gen.: Gomphrena, Philoxerus, Alternanthera, Achranthes, Nyssanthes, Iresine.

Endl. 1837. Gen. p. 301: trib. Amarantacear. Gen.: Iresine, Trommsdorfia, Alternanthera, Teleianthera, Gomphrena, Frölichia. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1377 et Ench. p. 185) Gossypianthus. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 318 (230). Gen. ead. et Serturnera, Hebanthe, Pfaffia, Philoxerus, Crucita. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 102. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511. Gen. ut Endl. et Philoxerus, Brandesia, Mogiphanes. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 337. Gen.: Gossypianthus, Ireneis; Guilleminea, Iresine, Cruzeta, Gomphrena; Alternanthera, Telanthera, Frölichia, Allochlamys; Phyllepidum?, Tryphera? — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 266.

Rchb. 1841. Nom. p. 165: subsect. Achyranthear. Gen. ut Endl. 1841.

Gomphus Pers. 1797. Tent. disp. p. 74: g. Hymenothecii.

Pers. 1801. Syn. p. XVII, 498: sect. Merulii. (Clavaria truncata Schmid., Merulius clavator Pers.) — Par. Nees 1816. Syst. p. 231; 1817. Überbl. p. 60.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 638: g. Merulidear.

Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 9: g. Merulinor.

Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 301: g. Clavulator.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Clavariear.

Gomphus Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 314: subg. Agarici.

Fries 1825. Pl. homon. p. 74: subsect. Pratelli. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *B d*.

Endl. 1836. Gen. n. 253 I. p. 40; 1841. Ench. p. 21: sect. Agarici.

Math. 1853. Belg. II. p. 348: sect. Cantharelli.

= Gomphidius Fries.

Gomutus Rumph. 1741. Amboin. I. p. 57. t. 13.
Correa 1807. Ann. Mus. IX. p. 288. t. 7. f. 1. (Fructus.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 198: g. Phoenicear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 624. n. 1996; 1830. Gen. I. p. 450. n. 2222: g. Palmar. (Polyandr. Trigyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 65.
= Arenga Labill.

Gonatandra*) Schlechtend. 1851. Linnaea XXIV. p. 659.
= Campelia Rich. (Linnaea XXV. p. 188.)

Gonatanthus Klotzsch 1840. Ic. rar. h. Berol. p. 33. t. 14: nov. g. ex typo Caladii sarmentosi Fisch.
Kunth 1841. Enum. III. p. 36: g. Colocasiear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 361 (270). — Endl. 1842. Spl. II. p. 23. n. 1682. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 14.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Caladiear.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 44: g. Alocasinar.

Gonatobotrys Corda 1839. Prachtfl. Schimm. p. 9. t. 5: nov. g. Fungor. (G. simplex.)
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 174: g. Polyactideor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 105.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 13; 1842. Mycol. p. 53: g. Polyactidear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 103: g. Mucedineor. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cephalosporeor.

Gonatocarpus Schreb. 1789. Gen. I. p. 86. n. 214: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 690. n. 250. — Pers. 1805. Ench. I. p. 148. n. 318.
= Goniocarpus Kön.

Gonatopterides Eisengrein 1848. Die Pflanzenordn. d. Gonatopt. od. Hydropteriden. (Frankf. 8°.)

Gonatorhodius Lindl. vid. *seq.*

Gonatorhodum Rchb. vid. *seq.*

Gonatorrhodon Léveillé vid. *seq.*

Gonatorrhodum Corda 1839. Prachtfl. Schimm. p. 5. t. 3: nov. g. Fungor., Aspergillinis aff. (G. speciosum.)
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 176 (*Gonatorhodum*): g. Polyactideor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 12; 1842. Mycol. p. 48: g. Sporodaear. — Par. Preuss. 1851. Linnaea XXIV. p. 122.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 103: g. Mucedineor. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43 (*Gonatorhodius*): g. Mucedinum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 489: g. Aspergilleor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495 (*Gonatorrhodon*): g. Oidieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 74: g. Torulaceor.

Gonatosporium Corda 1839. Icon. Fung. III. p. 8: g. Halysiacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 115 (*Gonatosporum*): g. Psiloniaceor.

*) γόνυ. γόνατος, genu.

Gonatosporium Corda cont.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 11; 1842. Mycol. p. 42: g. Psiloniacear.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Menisporeor.
= Goniosporium Link.

Gonatosporum Rchb. vid. *praeced.*

Gonatotrichum Corda 1838. Icon. Fung. II. p. 11; 1842. V. p. 9; 1842. Anl. Mycol. p. 31: g. Cephalocladior. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 109.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Dematieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 494: g. Mucedinum.
= Gonytrichum Nees.

Gonatozygon De Bary 1857. Ber. nat. Ges. Freib. (Flora 1857. p. 667): nov. g. Algar.

Gongora*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 117. t. 25: nov. g. Gynandr. Diandr.
Swartz 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 90: g. Orchidear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 522. n. 2003. — Poir 1821. Dict. v. 19. p. 200. — Spreng. 1827. Cur. post. p. 305; 1831. Gen. II. p. 666. n. 3361.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 286: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 126.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 15 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 158: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 1540; 1841. Nom. p. 53. n. 2028. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1422. p. 199; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Bartl. 1830. Ord. p. 58: g. Epidendrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.
Rchb. f. 1858. Xen. Orchid. (p. 51. Revisio generis) p. 110: g. Catasetear.
Synon. Gongoras Hoffmsg.

Gongoras Hoffmannsegg 1843. Verz.: g. Orchidear.
= Gongora Ruiz & Pav.

Gongroceras**) Kütz. 1841. Linnaea XV. p. 730. 735; 1843. ibid. XVII. p. 100; 1843. Phycol. gener. p. 379; 1849. Spec. Alg. p. 677. n. 451: g. Ceramiear.
Menegh. 1844 in Parlat. Giorn. it. I. p. ...: subg. Ceramii. — Par. Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 167. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 143.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubias.

Gongromeriza***) Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 106: nov. g. Torulacear. (G. clavaeformis.)
Bonord. 1851. Hdb. p. 282. 290: g. Torulaceor.

Gongronema Endl. 1838. Gen. n. 3498 c. p. 595; 1841. Ench. p. 299: sect. Gymnemae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5035. 3. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 10. p. 150.

*) Dicat D. Antonio Caballero et Gongora.
**) γόγγρος, excrescentia.
***) μερίζω, divido, distribuo.

Gongronema Endl. cont.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 624: g. Gymnemar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 499: g. Gymnemear.

Gongrosira*) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phycol. gener. p. 281; 1845. Phycol. germ. p. 226: g. Protonemear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 11.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 423. n. 260: g. Confervear.
Synon. Protonema Kütz.

Gongycladon „Link" Endl. in synon. Lemaneae: vid. *Gonycladon Link.*

Gongyla DC. vid. *Gangila Bernh.*

Gongylanthus**) Nees 1836. Eur. Leberm. II. p. 405; 1838. IV. p. XXXIII; 1845. Syn. Hepat. p. 196: nov. g. Geocalycear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $472/_{21}$. p. 1343; 1841. Ench. p. 28. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 816. — Gottsche 1845. Nov. Act. Leop. XXI. 2. p. 426.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Geocalycidar.
Synon. Calypogea Dumort. 1835.

Gongylia***) Körber 1855. Syst. Lich. germ. p. 351: nov. g. Verrucariear. (Verrucaria epigaea β sabuletorum Fr.)

Gongylobrya Rchb. 1828. Consp. p. 23. 30 (1832. Fl. exc. p. L): formatio Muscor. Fam.: Ricciea, Salviniacea.

Gongylocarpus†) Chamisso & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 557: nov. g. Onagrariar. (G. rubricaulis.)
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 676: g. Fuchsiear.
Meisn. 1838. Gen. p. 121 (86): g. Gaurear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6133. p. 1195; 1841. Ench. p. 638 (dubium). — Walp. 1846 Rep. V. p. 670.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1311: g. Octandr. Monogyn.
Rchb. 1841. Nom. p. 171. n. 6623: g. Montiniear.?
= Gaura Linn. (Lindl.)

Gongylocladium Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 160: g. Asporomycetum rhizomorphor. (Oedemium atrum Link.)
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 197: g. Dematieor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 12; 1842. Mycol. p. 46: g. Psiloniacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 107: g. Rhacodieor.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: inter gen. Fungalium minus nota.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Torulaceor.?

*) *σειρά*, funis, restis.
**) *γογγύλος*, rotundus, nodosus.
***) *γογγύλη*, rapa.
†) Nomen ab insigni fructus specie.

Gongylolepis Schomb. 1847. Linnaea XX. p. 759: nov. g. Mutisiacear. (G. Benthamiana.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 457.

Gongylophycae Rchb. 1828. Consp. p. 23. 25 (1832. Fl. exc. p. L): formatio Algar. Fam.: Nostochinae, Conferveae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 135; 1841. Nom. p. 17: subordo Algar. Fam.: Nostochinae, Confervaceae, Ulvaceae.

Gongylospermeae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 8: series Rhodospermear. Ordines: Rhodymeniaceae, Cryptonemiaceae, Spyridiaceae, Ceramiaceae.

Gonianthes Dietr. vid. *Gonyanthes Blume.*

Gonianthes Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 163: subsect. Polymeridis.

Gonidiophyceae Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab. (Bot. Zeit. 1844. p. 107): ordo 2 Phycear. Series I. §. 1. Caulerpeae, etc. §. 2. Codiaceae, Flabellarieae, Anadyomeneae, Valonieae, Vaucherieae. §. 3. Olivieae, Hydrodictyeae. II. §. 1. Conferveae, Zygnemeae, etc. §. 2. Ulveae, Bangieae, etc. §. 3. Chaetophoreae, etc. §. 4. Rivularieae, Lyngbyeae, etc. §. 5. Oscillarieae, etc. §. 6. Nostoceae, Protococceae, etc.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 58: subordo Algar. Fam.: Nostochinae, Oscillatorieae, Confervaceae, Ulvaceae.

Gonidium*) „Ehrenb." Menegh. 1840. Linnaea XIV. p. 213: g. Desmidiear.
= Merismopoedia Meyen. (Kütz.)

Goniocarpus**) Konig 1805. Ann. of bot. I. p. 546: g. Onagrariar.
Juss. 1817. Dict. v. 7. p. 441: g. Cercodianar. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 66. Sect.: Apodogynus, Pterogynus. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 701. Sect. eaed.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 703; 1825. Syst. I. p. 497. n. 561: g. Onagrar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: g. Isnardiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4482: g. Cercodear. Sect. ut DC.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 324. n. 1652: g. Halorageear. (Octandr. Tetragyn.) — Par. A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. III. p. 30. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1328. — Nees 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 158; 1847. II. p. 225. Sect. ut DC.
Rchb. 1837. Hdb. p. 244: g. Myriophyllear.
Meisn. 1838. Gen. p. 122 (87): sect. Haloragidis.
Endl. 1840. Gen. p. 1197 Haloragidi inserit.
Synon. Gonocarpus Thunb.; Gonatocarpus Schreb.; Linociria Neck.

Goniocaulae Leunis 1849. Schul-Naturg. II. p. 211: ordo (55) Cryptogamar. vascularium. Fam.: Equisetaceae.

*) *γωνίδιον*, angulus.
**) *γωνία*, genu, angulus.

Goniocaulon Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 34 (1818. ibid. p. 184); 1817. Dict. v. 7. p. 377: nov. g. Centauriear.
Cass. 1821. Dict. v. 19. p. 201; 1826. v. 44. p. 36. 39; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 571: g. Chryseidear. (verar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11.
Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2695: g. Centaureear.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Centaureacear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 558: sect. Amberboae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2865 *A α.* p. 471; 1841. Ench. p. 246.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3649. 1 *a:* subsect. Chryseideae.

Goniocheton Blume 1825. Bijdr. Nr. 4. p. 176: nov. g. Aglaiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 356: g. Meliacear.
A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 231: g. Trichiliear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 683 *(Gonioscheton).* — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 180. — Meisn. 1837. Gen. p. 48 *(35).*
Synon. Goniochiton Rchb.

Goniochiton Rchb. 1837. Handb. p. 313: g. Xylocarpear.
Endl. 1840. Gen. n. 5536. p. 1050; 1841. Ench. p. 551: g. Trichilieer. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8072. — Walp. 1842. Rep. I. p. 431. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 83. 102. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464.
Conf. Goniocheton Blume.

Goniodium „Kunze", Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1771: g. Darwiniear.?

Goniogyna DC. 1825. Ann. sc. nat. IV. p. 91: nov. g. Leguminosar. (Hallia hirta W.) *Cf.* Linnaea I. p. 140.
= Heylandia DC.

Goniolimon Boissier 1848 in DC. Prodr. XII. p. 632: g. Staticear.
Trautv. 1856. Bull. Ac. Pet. XIV. p. 250: g. Staticacear.
Synon. Tropidice Griseb. pt.

Goniolippia Schauer 1851 in Mart. Fl. Bras. fasc. X. p. 223: sect. Lippiae. *(Cf. Goniostachyum Schauer.)*

Gonioma*) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. austr. II. p. 188: nov. g. Plumeriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3402. p. 582; 1841. Ench. p. 204. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. — Meisn. 1840. Gen. p. 263 (172).
Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5170: g. Vincear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 387: g. Tabernaemontanear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.
Synon. Camassia Eckl.

Goniomitrium Hook. & Wils. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 142. t. 3: nov. g. Muscor. (G. enerve et acuminatum.)
= Physcomitrii Brid. spec.

*) γωνιοω, angulum facio.

Goniomyci Nees 1817. Syst. Ueberbl. p. 5: circulus II. Protomycor. Gen.: Xyloma; Conisporium.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 16: ordo 3 Fungor.

Gonionema Nylander 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 8. 15 (Flora 1854. p. 232): nov. g. Ephebear. (Collema velutinum Somm.)

Goniophlebium Blume . . . . Fl. jav. p. 129.
Presl 1836. Pterid. p. 185: g. Polypodiear. — Par. J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 396; 1842. ibid. IV. p. 55. Sect.: Lopholepis, Lepicystis, Schellolepis, Goniophlebium. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 254.
Endl. 1836. Gen. n. 615 *e.* p. 60; 1841. Spl. I. p. 1347 *(Gonophlebium);* 1841. Ench. p. 36: sect. Polypodii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 985. 5 *(Gonophlebium).* — Meisn. 1843. Gen. p. 431 (331). — Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 391. Subsect. ut Smith. (Eugoniophlebium.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Synon. Synammia Presl. (Fée.)

Goniopogon Turczan. 1851. Bull. soc. Mosc. I. p. 173: nov. g. Heteropappear. (G. multicaule.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 184.

Goniopteris Presl 1836. Pterid. p. 181: g. Polypodiear. — Par. J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 395; 1842. ibid. IV. p. 54. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 248. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 40.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 133: g. Dryopteridear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 615 *b.* p. 1346; 1841. Ench. p. 36: sect. Polypodii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 985. 2. — Meisn. 1843. Gen. p. 431 (331). — Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 390.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.

Goniopterites Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 72: nov. g. Filicum foss. (Polypodites styriacus Ung.)

Gonioscheton G. Don vid. *Goniocheton Blume.*

Goniospora Link 1809 in Schrad. n. Journ. III. 1. p. 18: nov. g. Fungor., a Trichia disjunctum.
Endl. 1836. Gen. n. 308 *a.* p. 26; 1841. Ench. p. 16 *(Goniosporum):* sect. Trichiae.
Synon. Mucilago Mich.

Goniosporium Link 1824. Spec. I. p. 44: nov. g. Hyphomycetum. (Arthrinium puccinioides Kunze.)
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Aspergillacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 103: g. Sporomycor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 93: g. Leptomycetum.
Endl. 1836. Gen. n. 231 *c.* p. 20; 1841. Ench. p. 14: sect. Arthrinii.

Goniosporium Link cont.

Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 180 (*Gonosporium*): g. Dematieor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.

Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 104 (*Gonosporium*): g. Rhacodieor.

Bonord. 1851. Hdb. p. 88: g. Psiloniaceor.

Synon. Gonatosporium Corda; Gonatosporum Rchb.

Goniosporum Endl. vid. *Goniospora Link.*

Goniostachyum Schauer 1847 in DC. Prodr. XI. p. 574: sect. Lippiae.

= Goniolippia Schauer.

Goniostemma Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 62.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 160: g. Secamonear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3443. p. 589; 1841. Ench. p. 298. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 538. — Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5055. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.

Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 504: g. Secamonear.

Goniothalamus Blume 1829. Fl. jav. Anon. p. 68: sect. Polyalthiae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4713 *d.* p. 832; 1841. Ench. p. 422. — Rchb. 1841. Nom. p. 192. n. 7308. 4.

Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 105: g. Mitrephorear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 51. — Zolling. 1858. Linnaea XXIX. p. 313.

Goniothecium Ehrenb. 1844. Ber. Berl. Ak. p. 82: nov. g. Polygastricor.?

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95: g. Eulysigoniear.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 23. n. 15: g. Melosirear.

Goniotriche Turczan. 1849. Bull. soc. Mosc. XXII. 2. p. 299 (sphalm. *Gomotriche*): nov. g. Aërvear. *Cf.* Flora 1850. p. 480.

Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 299 (*Gomotriche*): g. Achyranthear.

= Trichinium R. Brown?

Goniotrichum Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 244: nov. g. Hormidiear.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 96: sect. Hormidii.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: g. Bangiear.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 358. n. 242: g. Ulothrichear.

Synon. Erythrotrichia Aresch.

Gonium Müll. 1773. Hist. verm. I. 1. p. 60: g. Infusorior. (Ehrenb. Infus. p. 56.)

Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 64: g. Characiear.

Cohn 1854. Nov. Act. Leop. XXIV. 1. p. 163; 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. V. p. 323: g. Volvocinear.

A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 10: g. Algar. monocytidear. ambiguar. coenobiar.

Goniurus Presl 1850. Epimel. bot. p. 604: nov. g. Orontiacear. Pothoinear., Scindapso et Anthurio aff.

Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 500: g. Orontiear.

Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 182: subg. Pothois.

Gonobolus Dietr. vid. *Gonolobus Michx.*

Gonocarpus*) Thunb. 1783. Nov. gen. III. p. 55; 1784. Fl. jap. p. 5. 69: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 164. — Gmel. 1791. Syst. p. 276. — Pers. 1797. Syst. p. 170. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 347.

Juss. 1789. Gen. p. 442: g. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 78. n. 366.

Labill. 1804. Nov. Holl. t. 53: g. Onagrar. Char. emend. *Cf.* Schrad. n. Journ. III. 1. p. 112.

Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 36. 502. n. 608: g. Onagrariar.

Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 203: g. Cercodianar.

= Goniocarpus Kön.

Gonocarpus Hamilt. 1825. Pr. fl. Ind. occ. p. 39.

= Poivrea Comm.

Gonocladeae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70: fam. Mucediniae. Gen.: Botrytis.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: trib. Mucedinear. Gen.: Pennicillium, Spicularia, Polyactis, Aspergillus, Botrytis, Verticillium, Acremonium, Sporotrichum, Fusisporium, Hapalaria, Byssocladium, Actinocladium.

Gonocytisus Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 153 adnot.: nov. g. Genistear. (Spartium angulatum L.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 505.

Gonogona Link 1822. Enum. II. p. 369; 1829. Handb. I. p. 248: nov. g. Orchidear. (Satyrium repens L.)

= Goodyera R. Brown.

Gonohoria G. Don vid. *Conohoria Aubl.*

Gonolobae Decne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 591: trib. Asclepiadear. Gen.: Matelea, Gonolobus, Ibatia, Macroscepis, Fischeria, Lachnostoma, Polystemma, Blepharodon, Nephradenia, Dictyanthus, Chthamalia.

Gonolobeae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. XLI: div. Asclepiadear., a R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. (Verm. bot. Schr. II.) in conspectu Asclepiadear. indicata. Gen.: Gonolobus, Matelea.

Rchb. 1828. Consp. p. 130; 1837. Hdb. p. 208: sect. Cynanchear. Gen. ead. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. Gen. ead.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 107. 136: trib. Asclepiadear. Gen. ead. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 594; 1841. Ench. p. 298. (verar.) Gen. ead. et Dregea. — Brongn. 1843. En. genr. p. 53. Gen.: Gonolobus.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: sect. Asclepiadear. verar. Gen. ut Endl.

---

*) γόνος, genu.

Gonolobeae Rchb. cont.
Meisn. 1840. Gen. p. 269 (176): trib. Asclepiear. Gen. ead. et Pherotrichis.
Rchb. 1841. Nom. p. 129: subdiv. Asclepiariar. Gen. ut Meisn.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: trib. Asclepiadacear. Gen. Gonolobar. Decne.

Gonolobium Pers. 1805. Ench. I. p. 274: sect. Cynanchi.
Hedw. 1806. Gen. p. 132. n. 576: g. Apocinear.
Pursh 1814. Fl. Am. sept. I. p. 379.
= Gonolobus Michx.

Gonolobus Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 119: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Vincetoxicum gonocarpos Walt.)
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 334: g. Apocinear.
R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 35 (Verm. bot. Schr. II. p. 373): g. Asclepiadear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 486; 1825. Syst. I. p. 845. n. 977; 1830. Gen. I. p. 210. n. 1073. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 207. — Schult. 1820. Syst. VI. p. IX. 59. — Kunth 1823. Syn. II. p. 284. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; 1840. II. p. 896 (*Gonobolus*).
Elliott 1817. Sketch I. p. 327: g. Pentandr. Digyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 162. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 31.
Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 205: g. Apocynear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI; 1828. Consp. p. 130. n. 3423; 1841. Nom. p. 129. n. 5015: g. Gonolobear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 136. — Endl. 1838. Gen. n. 3495. p. 595; 1841. Ench. p. 299. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540. — Meisn. 1840. Gen. p. 269 (176). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 53. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 591: g. Gonolobar.
Synon. Gonolobium Pers.

*Gonoophytum**) Necker 1790. Elem. bot. III. p. 174: gen. 44 plant. Spec. nat.: Erythronium, Gloriosa, Fritillaria, Lilium, Tulipa, Cyanella, Scilla, Albuca, Ornithogalum, Anthericum, Rydbeckia, Melanthium, Asphodelus, Hemerocallis, Colchicum, Bulbocodium, Hyacinthus, Aletris, Polyanthes, Yucca, Aloë, Tulbaghia, Convallaria, Evallaria, Tovaria, Uvularia, Phormium, Wurmbea, Scheuchzeria, Triglochin, Juncus, Dracaena, Asparagus, Medeola, Trillium, Veratrum, Flagellaria, Callisia, Burmannia, Pollia, Massonia, Aphillanthes, Witsenia.

Gonophlebium Endl., Rchb. vid. *Goniophlebium Blume.*

*) „γωνιοομαι, angulos habeo; φυτόν, planta."

Gonoptera Turczan. 1847. Bull. soc. Mosc. XX. p. 150: nov. g. Zygophyllear., Larreae aff. (*Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 435 et Flora 1848. I. p. 304.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 151.
= Bulnesia Gray.

Gonopterides Willd. 1804. Anleit. p. 574; 1810. Spec. V. p. 1 (Grundr. ed. Link 1831. p. 135): ordo 1 Cryptogamiae. Gen. unicum: Equisetum. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 1.

Gonopyrum C. A. Meyer. 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 144: nov. g. Rumicear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 35. n. 1994/2: g. Polygonear. (verar.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 368. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 54. n. 1993/1 *b:* sect. Polygonellae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 293. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 81.

Gonosilphium Rchb. 1841. Nomencl. p. 79. n. 3022. 2: sect. Silphii.

Gonospermum Lessing 1832. Syn. Compos. p. 263: g. Athanasiear. (Tanacetum fruticosum Sm.) — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 84. — Endl. 1838. Gen. n. 2688. p. 438; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 211 (135). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3845. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24: g. Anthemidear. (verar.) — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 39.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 289; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 10: g. Euanthemidear. Sect.: Eugonospermum, Lugoa.

Gonosporeae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70: fam. Mucediniae. Gen.: Dactylium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: trib. Mucedinear, Gen.: Trichothecium, Dactylium, Acrothamnium, Cladosporium.

Gonosporium Rchb., Rabenh. vid. *Goniosporium Link.*

Gonostegia Turczan. 1846. Bull. soc. Mosc. XIX. p. 509: nov. g. Polygonear.? (*Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 357 et Flora 1848. I. p. 302.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 558.

Gonostemma Spreng. vid. *seq.*

Gonostemon Haworth 1812. Syn. succ. p. 27 (Ed. Schrank 1819. p. 29); 1819. Suppl. p. 11: g. Pentandr. Diygn., a Stapelia segregat. *Cf.* Steud. Nom. I. p. 702 (*Gerostemum*); II. p. 631 (*Gorostemon*) et Wittst. Etym. Handw. p. 398 (*Gonostemum*).
Schult. 1820. Syst. VI. p. 27: sect. Stapeliae. — Par. Link 1821. En. I. p. 255. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 840; 1830. Gen. I. p. 208. n. 1062. 6 (*Gonostemma*). — Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3411 *i;* 1841. Nom. p. 130. n. 5018. 2. — Endl. 1838. Gen. n. 3524 *b.* p. 598; 1841. Ench. p. 300. — Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 655.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 561: subg. Stapeliae.

Gonostemum Wittst. vid. *praeced.*

Gonothanthus „Kltzsch." Müll. Ann. bot. V. p. 863: sphalm. pro *Gonatanthus Klotzsch.*

Gonotheca Rafin. 1809. Journ. bot. II. p. 171; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 260: nov. g. pro Polymnia tetragonotheca L.
= Tetragonotheca Dill.

Gonotheca „Blume mss." DC. 1830. Prodr. IV. p. 429: nov. g. Hedyotear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 532. — — Endl. 1834. Atakt. p. 23; 1838. Gen. n. 3239. p. 548; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 160. — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2873.
Meisn. 1838. Comm. p. 114: sect. Hedyotidis.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 495: g. Rubiacear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374: g. Hedyotidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 192: sect. Oldenlandiae.
Synon. Conyza Burm.

Gonotrichum „Nees Comm. p. 18. t. 1. f. 14" Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 19: g. Trichomycor.
= Gonytrichum Nees.

Gonsala Adans. 1763. Fam. II. p. 6: g. Fungor. (Fungus numismatalis Batarr. t. 3. f. H.)
= . . .?

Gonsii Adans. 1763. Fam. II. p. 318: g. Cassiar.
= Adenanthera Royen.

Gontarella Gilib. ex Steud. Nom. I. p. 701 (G. tertiaria).
= Isopyrum Linn.

Gonus*). Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 658. Ed. Willd. p. 809: nov. g. Polygam. Dioec. (G. amarissimus.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 257: g. Terebintacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 376.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 35. 495. n. 599: g. Tetrandr. Tetragyn. (Terebinthacear.)
= Brucea Mill.

Gonyanera Korthals 1851. Nederl. kruidk. Arch. II. p. 183: nov. g. Gardeniear., Psilobio aff. *Cf.* Flora 1850. p. 528.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 794: g. Eugardeniear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 200: g. Randiear.

Gonyanthes Blume 1823. Catal. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 123: nov. g. Gynandr. Triandr. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 678. n. 3424.
Nees 1824. Ann. sc. nat. III. p. 369; 1826 in R. Brown Verm. bot. Schr. II. p. 655: g. Cytinear.? — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 306. — Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1684.

*) „γόνος, soboles: ob multiplicem sobolem."

Gonyanthes Blume cont.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 29: g. Burmanniacear. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXV in adnot. — Endl. 1837. Gen. n. 1218. p. 164; 1841. Ench. p. 96. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127 (*Gonianthes*). 163. — Meisn. 1842. Gen. p. 390 (292). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 119. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 614.
Miers 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 537; 1848. Ann. and Mag. 2d. ser. I. p. 235: g. Burmanniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1644. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 172.

Gonycladon Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 6: nov. g. Tremellariar. *Cf.* Flora 1821. II. p. 512.
= Lemanea Bory.

Gonyopterides Bartling 1830. Ord. nat. p. 20: classis Vegetabilium vascularium cryptogamor. Ordines: Characeae, Equisetaceae.

Gonytrichum Nees fr. 1818. Nov. Act. Leop. IX. p. 244: nov. g. Byssor. discretor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 209.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Purasporior.
Link 1824. Spec. I. p. 32: g. Hyphomycetum. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 274. (episporor.)
Fries 1825. Pl. homon. p. 306: g. Racodiacear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Conopleacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 76: g. Racodiaceor.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 11: g. Sporotrichacear.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 11. t. 10. f. 51: g. Cephalocladior. (melius *Gonatotrichum.*)
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 188: g. Dematieor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 104: g. Rhacodieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cephalosporeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 111: g. Polyactideor.
Synon. Gonotrichum Pers.; Gonatotrichum Corda; Sporotrichum Spreng.; Myxotrichum Fries.

Gonzala Leman 1821. Dict. v. 19. p. 209: vid. *Gonsala Adans.*

Gonzalagunea Rchb. vid. *seq.*

Gonzalagunia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 12. t. 3; 1798. Fl. peruv. I. p. 56. t. 86: nov. g. Tetrandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 19. p. 209.
Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 194; 1830. ibid. V. p. 170: g. Hameliacear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 436: sect. Gonzaleae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 537. — Endl. 1838. Gen. n. 3235 *a*. p. 548; 1841. Ench. p. 273.

*) Dicat. Fr. Gonzalez Laguna.

Gonzalagunia Ruiz & Pav. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2932 (*Gonzalagunea*): g. Isertiear.
Schltd. 1856. Linnaea XXVIII. p. 544.
Conf. seq.

Gonzalea Pers. 1805. Ench. I. p. 132. n. 265: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 62. n. 294. — Schult. 1827. Mant. III. p. 9.
Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 225. t. 64: g. Rubiacear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 11. 188. n. 466. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 400. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 209. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 417. n. 420; 1830. Gen. I. p. 95. n. 473. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 486.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 616: g. Guettardear.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 415: g. Hameliacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 64. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2115.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Hamellidiae.
Bartl. 1830. Ord. p. 211: g. Hedyotidear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 236: g. Isertiar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 436: g. Isertiear. Sect.: Gonzalagunia, Lygistoides. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 537. Sect. eaed. — Endl. 1838. Gen. n. 3235. p. 547; 1841. Ench. p. 273. Sect. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 164 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Isertidar.
Synon. Gonzalagunia Ruiz & Pav.; Buena Cavan.; Caryococca Willd.

Goodallia „Bowd.“ Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4191: g. Sedear.? *Cf.* Meisn. Comm. p. 98: planta ignota.

Goodallia Benth. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 633: nov. g. Thymeleacear., Lagettae aff. (G. guianensis.)
Endl. 1847. Spl. IV. p. 67. n. $2106/_5$: g. Euthymelaear.
Meisn. 1855 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIV. p. 68: g. Thymelaeacear.
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 527: g. Daphnear. diplostemonear.

Goodenales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 28: nixus Epigynar. Ordines: Stylidieae, Goodenoviae, Scaevoleae.

Goodenia*) Smith 1794. Linn. Trans. II. p. 347: nov. g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Usteri n. Ann. XII. p. 134. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 954. n. 344; 1809. En. p. 218. — Cavan. 1801. Icon. VI. p. 4. t. 506. — Pers. 1805. Ench. I. p. 195. n 434.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 473 (*Goudenia*): g. Campanulacear.
St. Hil. 1805. Expos I. p. 369: g. Campanulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 139. n. 599.

*) Dicat. Samuel Goodenough, episcopo Carlisle.

Goodenia Smith cont.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 574. Ed. Nees p. 430: g. Goodenoviar. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. IV. 26. n. 867. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 156.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 2; 1823. Dict. v. 27. p. 98: g. Lobeliacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 211. — Link 1821. En. I. p. 220; 1829. Hdb. I. p. 638.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 525; 1825. Syst. I. p. 720. n. 782: g. Lobeliear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: g. Chisanthear.
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2774: g. Goodenoviear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 148.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: g. Goodeniear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 167. n. 841. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 723. Sect.: Ochrosanthus, Tetrathylax, Porphyranthus, Monochila, Selliera. — Rchb. 1837. Hdb. p. 186. — Endl. 1838. Gen. n. 3043. p. 507; 1841. Ench. p. 261. Sect. 4 priores ut Don et (1841) Amphichila. — DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 512. Sect. ut Don. — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (146). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 737. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 584. — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 4009. Sect.: Goodenia, Tetraphylax, Porphyranthus, Monochila, Amphichila. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 32. — Vriese 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 412; 1854. Nat. Verh. Haarl. X. p. 121. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 379. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 695.
Synon. Collema Anders.; Boutonia Ht. Erfurt. (Steud.)

Goodeniaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28. 30: fam. Campanariear. Trib.: Goodenieae, Scaevoleae.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 241) 1847. Veg. kd. p. 694: ordo Campanalium. Trib. eaed.
Endl. 1838. Gen. p. 505; 1841. Ench. p. 260: ordo Campanulinar. Trib. eaed. — Par. Meisn. 1839. Gen. 239 (146). Trib. eaed.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 31: fam. Campanulinear. Trib. eaed.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 278: fam. Dicotyledonear. monopetalar. epigynar. Trib. eaed.

Goodenieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: trib. Goodeniacear. Gen.: Goodenia, Calogyne, Euthales, Velleia, Lechenaultia. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 507; 1841. Ench. p. 261. Gen. ut Rchb. et Cyphia, Pentaphragma (1841 ad Campanuleas translatum.) — Meisn. 1839. Gen. p. 239 (146). Gen. ut Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 695. Gen. ead. (excepta Cyphia) et Menoceras, Latouria. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 279. Gen. ut Endl.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 723: trib. Goodenoviar. Gen. ut Dumort. et Distylis, Anthotium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 102: subdiv. Stylidiariar. Gen. ut Don et Selliera.

Goodenieae Dumort. cont.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 512: trib. Goodenoviear. Gen. ut G. Don. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 584. Gen. ut Endl. et Cyphiella, Monochila. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 31. Gen. ex Don. — De Vriese 1854. Verh. Haarl. X. p. 121. Gen.: Goodenia, Picrophyta, Selliera, Tetraphylax, Stekhovia, Euthales, Velleja, Diaspasis, Distylis, Calogyne, Leschenaultia, Latouria, Anthotium, Lemairea. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 370. 379.

Goodenoviae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 573. Ed. Nees p. 429: ordo Dicotyledonum monopetalar. Divis.: Goodenoviae (gen.: Goodenia, Calogyne, Euthales, Velleia, Lechenaultia, Anthotium), Scaevoleae; Brunonia. *Cf.* R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 559 (Verm. bot. Schr. I. p. 64: *Goodenovieae*).
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo Goodenalium.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 722: ordo Calyciflorar. Trib.: Goodenieae, Scaevoleae, Brunonieae, Campanieae.

Goodenovieae Agardh 1825. Class. plant. p. 17; 1826. Isis p. 590: div. Campanulacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 114. Gen.: Goodenia, Selliera, Calogyne, Euthales, Velleia, Distylis, Lechenaultia, Anthotium; Scaevola, Diaspasis, Dampiera, Moquinia?, Delissea?
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (176) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 147: ordo (90) Campanulinar. Gen.: Goodenia, Calogyne, Euthales, Velleja, Distylis, Lechenaultia, Anthotium, Cyphia, Scaevola, Diaspasis, Dampiera; Delissea?, Brunonia.
Mart. 1835. Consp. p. 32: ordo 165.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 502: ordo (107) Calyciflorar. Trib.: Scaevoleae, Goodenieae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 582: fam. (160) Campanulinear. Trib. eaed.
De Vriese 1854. Verh. Haarl. X. p. 5. Trib. eaed. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 369.

Goodia*) „Salisb. Parad. t. 41" R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 269 (Verm. bot. Schr. II. p. 478): g. Leguminosar. (G. lotifolia Sal.) — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 216. — Link 1822. En. II. p. 227. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 186. n. 2504; 1831. Gen. II. p. 572. n. 2789.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 749: g. Spartiear.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 117. — Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4053; 1841. Nom. p. 151. n. 5902. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst II. p. 129. — Spach 1834. Vég. phan. I.

*) Dicat. Petr. Good.

Goodia Salisb. cont.
p. 189. — Meisn. 1837. Gen. p. 82 (58); 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 88. — Endl. 1840. Gen. n. 6456. p. 1260; 1841. Ench. p. 667. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 127.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553: g. Hovear. et p. 554 Trifoliear.?

Goodiera Koch 1844, Rchb. vid. *seq.*

Goodyera*) R. Brown 1813 in Ait. hort. kew. ed. sec. V. p. 197 (Verm. bot. Schr. II. p. 17): nov. g. Orchidear. (Satyrium repens L.) — Par. Rich. 1818. Mém. Mus. IV. p. 42. 49; 1818. Orchid. eur. p. 27. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 217. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 207. — D. Don 1825. Nepal. p. 27. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 676. n. 2947; 1831. Gen. I. p. 657. n. 3309. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1552. 1570. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 422. 486. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 171.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 284: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 190: g. Gynandr. Monandr.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528): g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1415; 1841. Nom. p. 55. n. 2126. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 214. n. 1559. — Kunth 1838. Berol. II. p. 247. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 28. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 85. — Gren. (& Godr.) 1856. France III p. 268.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 131: g. Epipactear.
Koch 1837. Syn. p. 696; 1844. ed. II. p. 802 (*Goodiera*): g. Limodorear.
Lindl. 1840. Orchid. p. 492; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Physuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1572. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 727.
A. Rich. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 79: g. Neottiar.
Meisn. 1842. Gen. p. 386 (289): g. Physuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 20.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 96 (*Goodiera*): g. Ceriorchidear.
Klotzsch . . . . in Hayne Arzneigew. XXIV.: g. Goodyeracear.
Synon. Pseudorchis Johr.; Orchioides Trew.; Epipactis Hall.; Peramium Salisb.; Tussaca Rafin.; Gonogona Link; Leucostachys Hffmsg.

Goodyeraceae Klotzsch . . . . in Hayne Arzneigew. XXIV. p. . . . : div. Neottiear. Gen.: Goodyera.

Gordonia**) Ellis 1771. Phil. Trans. LX. p. 520. t. 11: nov. g. Monadelph. Polyandr. (Hypericum Lasianthus L.) — Par. Linn. 1771. Mant. II. p. 556. n. 1344. — Murr.

*) Dicat. Joh. Goodyer, botan. angl.
**) Dicat. Alex. Gordon.

Gordonia Ellis cont.
1774. Syst. p. 525; 1784. Syst. p. 631. — Reich. 1778. Gen. p. 356. n. 913. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 471. n. 1144. — Gmel. 1791. Syst. p. 1069. — Pers. 1797. Syst. p. 699. — Willd. 1800. Sp. III. p. 841. n. 1301. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 42. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 83. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 170.
Scop. 1777. Intr. p. 288: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 453.
Cavan. 1788. Diss. V. p. 307. t. 161: g. Malvacear. Char. emend. (*Cf.* Röm. & Usteri 1790. Mag. Bot. XI. p. 137). — Par. Juss. 1789. Gen. p. 275. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 191. — Batsch 1802. Tab. p. 18. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 67. — Pers. 1807. Ench. II. p. 259. n. 1645. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 219. — Link 1822. En. II. p. 214.
Neck. 1790. El. II. p. 416. n. 1240: g. Omoplephytor.
Swartz 1791. Obs. bot. p. 271: g. Polyandr. — Par. Roxb. 1832. Ind. II. p. 572. (Monogyn.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 802: g. Sidear.
DC. 1824. Pr. I. p. 528: g. Gordoniear. Sect.: Lasianthus, Haemocharis, Lacathea. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 125. n. 2458. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1841. Nom. p. 208. n. 7923. Sect. (1841): Gordonia, Franklinia. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 573. Sect.: Lasianthus, Lacathea. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 79. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 223. Sect.: Lasianthus, Franklinia. — Endl. 1840. Gen. n. 5424. p. 1022; 1841. Ench. p. 531. Sect. ut Torr. & Gray et 1843 (Spl. III. p. 94) Antheeischima, Closaschima.
D. Don 1825. Nepal. p. 225: g. Theacear.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 3. p. 130: g. Ternströmiacear. (Char. emend.) *Cf.* Linnaea II. p. 662. — Par. Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 408. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 87. — Meisn. 1837. Gen. p. 41 (31). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 75. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5408: g. Ternströmiear. Sect. ut G. Don. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 560. n. 2739.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Ternstromiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 335: g. Camelliaceis aff.
Link 1831. Hdb. II. p. 347: g. Camelliacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 302: g. Camelliear.

Gordonieae DC. 1824. Prodr. I. p. 527: trib. Ternströmiacear.? Gen.: Malachodendron, Stewartia, Gordonia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 572. Gen. ead. et Blumea, Schima, Polyspora. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 60. 77. Gen. ut DC. et Reinwardtia, Wickströmia. — Endl. 1840. Gen. p. 1022; 1841. Ench. p. 531. Gen.: Stuartia, Gordonia. Accedunt 1843 (Spl. III. p. 94) Schima et 1850 (Spl. V. p. 68) Calpandria. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 477. Gen. ut Endl. 1840.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI: div. Theacear. Gen. ut DC.
Rchb. 1841. Nom. p. 208: subdiv. Ternströmiear. Gen. ead.

Gorenia Meisn. Comm. p. 283: vid. *Govenia Lindl.*

Gorinkia Presl . . .
= Couringia Heist. (Endl. Gen. p. 875).

Gorostemon Steud. Nom. II. p. 631 in synon. Stapeliae divaricatae: lege *Gonostemon.*

Gortera Adans., Linn. 1764 vid. *seq.*

Gorteria*) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1229. 1373. n. 1163; 1763. Sp. ed. II. p. 1283; 1764. Gen. ed. VI. p. 441. n. 982 (*Gortera*); 1767. Syst. ed. XII. p. 571: g. Syngenes. Polygam. Frustran. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 652; 1784. Syst. p. 783. — Reich. 1778. Gen. p. 437. n. 1064. — Lour. 1790. Coch. II. p. 507. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 576. n. 1328. — Gmel. 1791. Syst. p. 1262. — Pers. 1797. Syst. p. 824. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2265. n. 1545; 1809. En. p. 924.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 182. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 544. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 403.
Adans. 1763. Fam. II. p. 127 (*Gortera*): g. Calthar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Capitatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.
Gled. 1764. Syst. p. 257. n. 1067: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 257. Disjunguntur Gazania et Berkheya.
Hill 1769. Ht. kew. p. 15: g. Radiatar.
Scop. 1777. Intr. p. 130: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 9. n. 12: g. Actinophytor. Sejunguntur Möhnia et Zarabellia.
Thunb. . . . . Skr. nat. Selsk. IV. 2. p. 1. (Monogr.)
= Gorteria Gärtn., Berkheya Ehrh., Cullumia R. Br., Didelta Less. etc.

Gorteria Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 427. t. 171: g. restrictum Radiatar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 572; 1826. Syst. III. p. 607. n. 2835; 1831. Gen. II. p. 638. n. 3192.
R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 140 (Verm. bot. Schr. II. p. 446): g. Synantherear.
Cass. 1821. Dict. v. 19. p. 231; 1823. v. 29. p. 448; 1824. v. 33. p. 454; 1830. v. 60. p. 573 (injuncto Ictino): g. Gorteriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2675; 1841. Nom. p. 93. n. 3642. — DC. 1837. Pr. VI. p. 500. — Endl. 1838. Gen. n. 2841. p. 465; 1841. Ench. p. 245. —

*) Dicat. Joh. v. Gorter, prof. Harderwyk.

Gorteria Gärtn. cont.
Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Arctotidear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Less. 1832. Syn. p. 51. — Brongn. 1843. En. genr. p. 37.
Synon. Personaria Lam.; Ictinus Cass.; Chrysostemma E. Meyer; Gorteriae Linn. pars.

Gorteria Lamarck Illustr. n. 702.
= Berkheya Ehrh.

Gorterieae Cassini 1821. Dict. v. 19. p. 234; 1823. v. 29. p. 448; 1830. v. 60. p. 573 (Opusc. III. p. 53): div. Arctotidear. Gen.: Hirpicium, Gorteria, Gazania, Melanchrysum, Cuspidia, Didelta, Favonium, Cullumia, Apuleja, Ictinus (1821 et 1823), Berkheya, Evopis. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 497. Gen.: Stephanocoma, Cullumia, Gorteria, Hirpicium, Didelta, Berkheya, Gazania, Stobaea. — Endl. 1838. Gen. p. 465; 1841. Ench. p. 245. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). Gen. ead. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. Gen. fere ut Cass. et Chrysostemma.
Rchb. 1828. Consp. p. 111: div. Amphicenianthar. Gen. ut Cass.
Rchb. 1841. Nom. p. 93: subdiv. Ursiniear. Gen. ut DC. et Damatras?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713: subtrib. Cynarear. Gen. ut DC.

Gosela*) Choisy 1848 in DC. Prodr. XII. p. 22: nov. g. Selaginacear.

Gossampinus „Rumph. Amboin. I. t. 80" Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 35: g. Bombacear. (G. Rumphii — Bombax pentandrum orientale Auct.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 28 (24).
Rchb. 1837. Hdb. p. 295: g. Eriodendrear.
Endl. 1840. Gen. n. 5203 *c*. p. 989; 1841. Ench. p. 515: sect. Eriodendri. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 204. n. 7749. 3. — Walp. 1842. Rep. I. p. 330.
Synon. Ceiba Medic.

Gossipium Herm. 1687. Hort. Lugd. Bat. cat. p. 294.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130: g. Petalostemonum.
Allion. 1773. Misc. Taur. V. p. 83: g. pl. class. VIII.
= Gossypium Linn.

Gossypianthus Hook. . . . . Icon. III. t. 251.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1954/$_1$. p. 1377; 1841. Ench. p. 185: g. Gomphrenear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 318 (231). — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6421. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 337.

Gossypium**) Linn. 1737. Gen. p. 206. n. 559; 1737. Cliff. p. 350; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 203; 1753. Sp. II. p. 693; 1759. Syst. ed. X. p. 1148. n. 755; 1763. Sp. ed. II. p. 975; 1764. Gen. ed. VI. p. 355. n. 845; 1767. Syst. ed. XII. p. 462: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 522; 1784. Syst. p. 628. — Reich. 1778. Gen. p. 355. n. 910. — Lour. 1790. Coch. II. p. 415. — Swartz 1790. Vet. Ac. Handl. p. 20. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 468. n. 1138. — Gmel. 1791. Syst. p. 1059. — Pers. 1797. Syst. p. 665. — Willd. 1800. Sp. III. p. 803. n. 1296; 1809. En. p. 734. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 65. t. 269; 1832. Ind. III. p. 183.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Columniferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Malvar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 401.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 282. — Gis. 1792. Prael. p. 451.
Gled. 1764. Syst. p. 233. n. 962: g. Petalostemonum.
Cavan. 1788. Diss. VI. p. 309. t. 164—169: g. Malvacear. Char. emend. (*Cf.* Röm. & Ust. 1790. Mag. Bot. XI. p. 138.) — Par. Juss. 1789. Gen. p. 274. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 188. — Batsch 1802. Tab. p. 18. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 64. — Pers. 1807. Ench. II. p. 254. n. 1639. — Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 84. — Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 34 (*Cotonnier*). — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 801; 1826. Syst. III. p. 95. n. 2436; 1831. Gen. II. p. 555. n. 2715. — Link 1822. En. II. p. 213; 1831. Hdb. II. p. 361. — DC. 1824. Pr. I. p. 456. — Presl 1826. Sicul. I. p. 181. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 486. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 54. — Torr. & Gray 1836. North-Am. I. p. 230. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 148.
Neck. 1790. El. II. p. 409. n. 1229: g. Omoplephytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 246. t. 134.
St. Hil. 1827. Fl. Bras. II. p. 254: g. Malvear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 346. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 388.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII; 1832. Fl. exc. p. 774: g. Hibiscear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 27 (23). — Endl. 1840. Gen. n. 5286. p. 984; 1841. Ench. p. 512. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 438. — Brongn. 1843. En. genr. p. 77. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. — Gérard 1849 in Orb. Dict. IV. p. 273 (*Cotonnier*). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 309.
Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5272; 1837. Hdb. p. 287; 1841. Nom. p. 200. n. 7648: g. Ketmiear.
Synon. Gossipium Herm., Gled., etc.; Xylon Tourn.

Gothofreda Vent. 1803. Choix p. 36. t. 60.
Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 234: g. Apocynear.
= Oxypetalum R. Brown.

Gottschea*) Nees 1844. Syn. Hepat. p. 13: nov. g. Coelocaulium. — Par. Lehm. 1846. Pl. Preiss. II. p. 120.
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 149: g. Hepaticar. foliosar.
= Schistochila Dumort.

*) Anagramma nominis Selago.
**) Nomen ex Plinio: frutex, quem alii *gossypium* vocant, plures *xylon*.

Gouana Linn. 1763. Spec. ed. II. p. 1663: g. Polygam. Monoec. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 733. n. 1592.
Gled. 1764. Syst. p. 266. n. 1098: g. Calycostemonum.
Gouania Jacq.

Gouania*) Jacquin 1763. Stirp. Amer. hist. p. 263. t. 179: nov. g. Polygam. Monoec. (G. tomentosa.) — Par. Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 547. n. 1157; 1767. Syst. ed. XII. p. 675. — Murr. 1774. Syst. p. 767; 1784. Syst. p. 912. — Reich. 1778. Gen. p. 543. n. 1268. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 67. t. 98. — Pers. 1797. Syst. p. 953. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 999. n. 1895.
Allion. 1773. Misc. Taur. V. p. 93 (*Govana*): g. pl. class. XI.
Scop. 1777. Intr. p. 99: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 381: g. Rhamnis aff. (B. Juss. in Ht. Trian.: g. Rhamnor.)
Neck. 1790. El. III. p. 111. n. 1443: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 432: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 248. n. 552. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 416. Ed. 1832. I. p. 631.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 475: g. Rhamnoidear. — Par. Link 1822. En. II. p. 439.
Batsch 1802. Tab. p. 44: g. Hederacear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 273: g. Rhamneis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 169. n. 710: g. Rhamnear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 665; 1825. Syst. I. p. 813. n. 914; 1830. Gen. I. p. 195. n. 989. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLVIII. 570. n. 1055. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 237. — DC. 1825. Pr. II. p. 38. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1151. — Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 378. — Bartl 1830. Ord. p. 376. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 43. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 166. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 439. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 856. — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 129 (*Guania*).
Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3797: g. Gouaniacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: g. Rhamnidear.
Endl. 1840. Gen. n. 5746. p. 1102; 1841. Ench. p. 581: g. Gouaniear. Sect. (1841): Eugouania, Retinaria. Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5573. Sect.: Gouania, Retinaria. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 122. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 649. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 436.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 360: g. Colubrinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.
Synon. Gouana Linn.; Retinaria Gärtn.

Gouaniaceae Rchb. 1828. Consp. p. 145; 1837. Handb. p. 222: div. Rhamnear. Gen.: Crumenaria, Gouania.

*) Dicat. Ant. Gouan, prof. Monspeliensi.

Gouanieae „Reissek mss." Endl. 1840. Gen. p. 1102; 1841. Ench. p. 581: trib. Rhamnear. Gen.: Helinus, Gouania, Reissekia, Crumenaria, Solenantha?, Schäfferia? — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 122. Gen.: Gouania. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 87. Gen. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 143: div. Rhamnear. Gen.: Crumenaria, Gouania, Reisseckia, Helinus.

Gouarea Hedwig vid. *Guarea Allem.*

Goudenia Vent. vid. *Goodenia Smith.*

Goudotia Decaisne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 83: nov. g. Juncear., Melanthaceis aff. (G. Tolimensis.) *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 178.

Gouffeia*) „Robill. & Cast." DC. 1815. Fl. franç. V. p. 609; 1824. Prodr. I. p. 388: nov. g. Alsinear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 206. n. 5351. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 305. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 419. — Link 1831. Hdb. II. p. 255. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205. — Meisn. 1837. Gen. p. 25 (22). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 259.
Lois. 1821. Dict. v. 19. p. 241: g. Caryophyllear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Saginear. (*Cf.* Rchb. Pl. crit. 585.)
Endl. 1840. Gen. n. 5234 *d.* p. 967; 1841. Ench. p. 505: sect. Arenariae. — Par. Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 262.
Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7782: g. Möhringiear.

Gouffeia C. A. Meyer 1831. Cauc. Pfl. p. 217.
Cambess. . . . . in Jacquem. voy. bot. t. 30.
Lepyrodiclis Fenzl.

Goughia**) Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 22. t. 1877. 1878: nov. g. Buxear. (G. Neilgherrensis.)
Benth. 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 8: g. Euphorbiacear.
Synon. Gyrandra Lindl. (*Cf.* Daphniphyllum Blume.)

Goupia Aublet 1775. Guian. I. p. 295. t. 116: nov. g Pentandr. Pentagyn. (G. glabra et tomentosa.) — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. LXVI. 706 (*Gupia*).
Scop. 1777. Intr. p. 231: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 378: g. Rhamnor.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 267 (*Gupia*): g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 212. n. 870. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 248. — DC. 1825. Pr. II. p. 29. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 237. n. 1252. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 439.(?) — Meisn. 1837. Gen. p. 71 (51)? — Dietr. 1839. Syn. I. p. 590; 1840. II. p. 1034 (*Coupia*).
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3815: g. Frangulacear.

*) Dicat. Lacour-Gouffe.
**) Dicat. Hon. Georgio Gough.

Goupia Aublet cont.
Endl. 1840. Gen. n. 5696. p. 1089; 1841. Ench. p. 575: g. Elaeodendrear. (dubium.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7904.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588: g. Celastracear. dubium.
Benth. 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 12: g. dubiae sedis, accuratius descriptum.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 427: g. Celastrinear.
Synon. Glossopetalum Schreb.; Schranckia Scop., Gmel.?

Goupilia Mérat 1834. Nouv. fl. env. Par. I. p. 91.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 23; 1842. Mycol. p. 92: g. Lycoperdaceor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: inter gen. Fungalium minus nota.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: g. Sclerodermeor.

Gourliea*) „Gillies mss." Hook. & Arn. 1833. Bot. Misc. III. p. 207. t. 106: nov. g. Leguminosar. (G. decorticans.) — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1374. 1426.
Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70): g. Cassiear.
Endl. 1841. Gen. n. 6746. p. 1309; 1841. Ench. p. 673: g. Sophorear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 154. n. 6033. — Walp. 1842. Rep. I. p. 807. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Govana Allion. vid. *Gouania Jacq.*

Govenia**) Lindl. . . . . in Lodd. Bot. Cab. t. 1709; 1833. Orchid. p. 153; 1836. Bot. Regist. XXI. t. 1795: nov. g. Vandear. (Maxillaria superba Lex.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1415. p. 198; 1841. Ench p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2020. — Meisn. 1841. Gen. p. 377 (283: *Gorenia*). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 5. t. 107.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Govindooia***) Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 34. t. 2090: g. Cranichidar. (G. nervosa.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 158 (*Govindovia*).

Grabowskia†) Schlechtend. 1832. Linnaea VII. p. 71: nov. g. Solanear. (Lycium boerhaaviaefolium L.) *Cf.* Walk.-Arn. 1837. Linnaea XI. p. 484.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 295; 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1985: g. Solanacear. — Par. Sendtn. 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 155.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 400. 480 (*Crabowskia*): g. Nolaniear.
Meisn. 1840. Gen. p. 278 (186): g. Tournefortiear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 32.

Grabowskia Schlechtend. cont.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 18: g. Grabowskiear.
Synon. Grabowskya Endl.

Grabowskieae Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 18: subtrib. Nolanear. Gen.: Grabowskia.

Grabowskya Endl. 1839. Gen. n. 3745. p. 645; 1841. Ench. p. 320: g. Tournefortiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4365. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 56.
Walp. 1845. Rep. III. p. 113: g. Solanear.
Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 510: g. Grabowskyear. (Char. emend.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 546.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
= Grabowskia Schltd.

Grabowskyeae Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 514: subtrib. Nolanacear. Gen.: Grabowskya. *Cf.* Bot. Zeit. 1846. p. 252. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 546.

Gracilaria Greville 1830. Alg. brit. p. 121. (Synops. p. LIV.)
Menegh. 1838. Cenni p. 39: g. Floridear. — Par. Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 350.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 730: g. Plocamiear.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 150; 1848. Flora II. p. 414: g. Sphaerococcoidear. Sect. (1848): Gracilaria, Plocaria, Acropeltis. — Par. Harv. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 243.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): g. Chondriear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phyc. gener. p. 408: sect. Sphaerococci. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 171.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Gracilariear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 106: g. Sphaerococcear.
Synon. Ceramianthemum Donat.; Ceramion Adans.; Plocaria Nees.

Gracilaria C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 751: sect. Schlotheimiae.

Gracilarieae Nägeli 1847. Neuere Alg. Syst. p. . . .: trib. Rhodomeniacear. Gen.: Catenella, Furcellaria, Polyides, Dumontia, Halymenia, Gracilaria, Hypnea.

Graderia*) Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 507. 521: g. Sopubiear. (Gerardia scabra Linn. f.)
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Gerardiear.
= Bopusia Presl.

Graeffenrieda Dietr. vid. *Graffenrieda DC.*

Graellsia**) Boissier 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 379: nov. g. Cruciferar. (Cochlearia saxifragaefolia DC.)

*) Dicat. Rob. Gourlie.
**) Dicat. J. R. Goven, hortulano angl.
***) Dicat. pictori tabularum.
†) Dicat. H. Grabowski, florae Silesiacae editori.

*) Anagramma nominis Geradira.
**) Dicat. Mariano Graells, prof. Madrit.

Graellsia Boissier cont.
Boiss. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 172: g. Alyssinear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 154. — Meisn. 1843. Comm. p. 340. — Endl. 1843. Spl. III. p. 86. n. $4882/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Alyssidar.

Graemia Hook. 1827. Exot. Fl. II. t. 189. *Cf. Grahamia Spreng.*
= Cephalophora Cavan.

Graevia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 253. n. 1003: g. Dapsilophytor., inter Muntingiam et Corchorum insertum.
= Grewia Linn.

Graffenrieda*) DC. 1828. Prodr. III. p. 105: nov. g. Lavoisierear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 735. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 213. — Meisn. 1838. Gen. p. 114 (81). — Endl. 1840. Gen. n. 6175. p. 1207; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6686. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4608 (*Graffenriedera*): g. Meriauiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 329: g. Melastomear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 341. n. 1726 (*Graffenriedia*).
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1375. 1431 (*Gräffenrieda*): g. Melastomacear.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 116: g. Davyear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 782.

Graffenrieda Martius. 1829. Nov. gen. III. p. 144. t. 276: g. Melastomacear.
= Jucunda Cham.

Graffenriedera Rchb. vid. *Graffenrieda DC.*

Graffenriedia Spreng. vid. *praeced.*

Grafia**) Rchb. 1837. Handb. p. 219: g. Smyrniear.
= Hladnikia Koch.

Grahamia Spreng. 1827. Cur. post. p. 297; 1831. Gen. II. p. 613. n. 3030: g. Eupatorinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2582: g. Heleniear.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
= Graemia Hook.

Grahamia***) „Gillies mss." Hook. 1833. Bot. Miscell. III. p. 331: nov. g. Portulacear. (G. bracteata.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 75.
Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 352; 1838. ibid. II. p. 296: g. Calandriniear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 130 (94). — Endl. 1840. Gen. n. 5177. p. 950; 1841. Ench. p. 501. — Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6353. — Walp. 1846. Rep. V. p. 786. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 7.
Rchb. 1837. Hdb. p. 237: g. Talinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 501: g. Portulacacear. — Par. A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 15 in adnot. Char. emend.
Synon. Xeranthus Miers?

*) Dicat. F. L. de Graffenried, Joh. Bauhini hist. plant. Editori.
**) Dicat. Siegm. Graf, medico et botanico Labacensi.
***) Dicat. Mrs. Maria Graham.

Grallatoria Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 47: sect. Synedrae.

Grameionium Rchb. vid. *Grammeionium.*

Gramen Tourn. 1700. Inst. p. 516. t. 299: g. pl. class. XV.

Gramen Rupp. 1718. Fl. jen. p. 288—300: g. pl. class. XIV, permulta complectens.

Gramen Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 35: g. pl. class. XIV a (non descriptum).

Gramina Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 203: ordo 9. Apetalar. staminiferar. Gen.: Nardus, Aegilops, Hordeum, Ischaemon, Alopecurus, Lolium, Triticum, Festuca, Poa, Agrostis, Milium, Arundo, Avena, Bromus, Anthoxanthon, Phleum, Cynosurus, Panicum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: ordo 14 plantar. Gen.: Zea, Coix, Cornucopiae, Nardus, Saccharum, Zizania, Phalaris, Phleum, Alopecurus, Panicum, Milium, Agrostis, Lagurus, Dactylis, Holcus, Melica, Aira, Poa, Briza, Uniola, Cenchrus, Cynosurus, Bromus, Festuca, Avena, Arundo, Lolium, Triticum, Aegilops, Secale, Hordeum, Elymus, Anthoxanthum, Oryza.
Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 4 plantar. Gen. ut 1751 et Bobartia, Lygeum, Tripsacum, Apluda, Ischaemum, Cinna, Andropogon, Stipa, Aristida, Pharus, Olyra, Paspalum. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 135. Gen. ead.
Spreng. 1187. Anl. II. 1. p. 137: fam. 14 plantar. Ord.: Agrostideae, Paniceae, Avenaceae, Festucaceae, Chlorideae, Hordeaceae, Saccharinae, Oryzeae.
Trin. 1824. De Gram. unifloris et sesquifloris. (Isis 1825. p. 668.) Divis.: Vilfacea, Spartea, Agrostidea, Calamagrostidea, Chloridea.
Brongn. 1843. Énum. genr. p. 7: fam. Glumacear. Trib.: Phleoideae, Agrostideae, Arundinaceae, Avenaceae, Pappophoreae, Chlorideae, Festucaceae, Hordeaceae, Andropogoneae, Paniceae, Phalarideae, Oryzeae, Stipaceae.
= Gramineae Juss.

Gramina Gmel. 1747. Fl. Sibir. I. p. 79: class. III. plantar. Gen.: Scirpus, Eriophorum, Phalaris, Alopecurus, Phleum, Panicum, Agrostis, Gramen, Aira, Melica, Hierochloë, Poa, Festuca, Triticum, Hordeum, Arundo, Anthoxanthum, Avena, Dactylis, Sparganium, Typha, Carex.
Adans. 1763. Fam. II. p. 26: fam. 7 plantar. Sect.: Phalarides, Avenae, Poae, Panica, Tritica, Oryzae, Sorga, Maïs, Cyperi.
= Gramineae Juss. et Cyperaceae.

Gramina legitima Scopoli 1777. Introd. p. 72: gens Graminear. Gen. §. 1: Cinna, Anthoxanthum, Pallasia, Nardus, Hamolocenchrus, Tragus, Lolium, Secale, Hordeum, Cynosurus, Phleum, Sesleria, Alopecurus, Aristida, Phalaris, Bromus, Festuca, Dactylis, Stipa, Agrostis, Avena, Aira, Trisetaria, Poa, Cornucopia, Lygeum, Arundo, Sacharum, Milium, Pani-

Gramina legitima Scopoli cont.
cum, Uniola, Remeira, Mapania, Bobartia, Oryza, Gaunia. §. 2: Tripsacum, Ischaemum, Andropogon, Holcus, Aegylops, Apluda, Pariana, Schima, Themeda, Thryocephalon, Cencrus, Manisuris.

Gramina spuria Scopoli 1777. Introd. p. 78: gens Graminear. Gen. §. 1: Zizania, Pharus, Zea, Coix, Olyra, Carex, Typha. §. 2: Cyperus, Eriophorum, Scirpus, Schoenus.

Graminaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 106: ordo Glumalium. Trib.: Oryzeae, Phalareae, Paniceae, Stipeae, Agrosteae, Arundineae, Pappophoreae, Chloreae, Aveneae, Festuceae, Hordeae, Rottbölleae, Andropogoneae.

Graminarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62: ordo Achnospathar. Fam.: Gramineae, Cyperaceae, Lilaearieae.

Gramineae (B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 16 plant.) Juss. 1789. Gen. p. 28: ordo 4 class. II. (*Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 19. p. 281.) Gen. §. 1: Cinna, Anthoxanthum. §. 2: Bobartia, Aristida, Alopecurus, Phleum, Phalaris, Paspalum, Digitaria, Panicum, Milium, Agrostis, Stipa, Lagurus, Saccharum. §. 3: Holcus, Andropogon. §. 4: Anthistiria, Spinifex, Ischaemum, Tripsacum, Cenchrus, Aegilops, Rottbollia. §. 5: Aira, Melica. §. 6: Dactylis. §. 7: Sesleria, Cynosurus, Lolium, Elymus, Hordeum, Triticum, Secale. §. 8: Bromus, Festuca, Poa, Uniola, Briza, Avena, Arundo. §. 9: Oryza, Ehrharta, Zizania, Luziola. §. 10: Nardus, Lygeum, Apluda, Zea. §. 11: Pharus, Olyra, Cornucopiae, Coix, Manisuris, Pommerella, Remirea. §. 12: Nastus. §. 13: Pariana. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 93. Sect. eaed. exclusis 2 ultimis. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 70. t. 13. 14. Sect. ut Juss., additis generibus pluribus.

Batsch 1802. Tab. p. 156: fam. Agrostalium. Gen. ut Juss. et Crypsis, Perotis, Muhlenbergia, Themeda, Raphis, Pappophorum, Eleusine, Miegia, Spartina, Zeugites, Diaphora.

DC. 1805. Franç. III. p. 1: fam. (12) Monocotyledonum. (phanerogamar.) — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 868.

Cassel 1810. Nat. Fam. p. 87.

Palis.-Beauv. 1812. Essai d'une nouv. Agrostogr. (8.)

R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 580. (Verm. bot. Schr. I. p. 107.) Trib.: Paniceae, Poaceae.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 62. Tribus: Paniceae, Stipaceae, Agrostideae, Bromeae, Chlorideae, Hordeaceae, Saccharineae, Oryzeae, Olyreae, Bambusaceae.

DC. 1819. Théor. élém. p. 249: ordo Endogenar. phanerogamar.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 82: fam. plant. endogenar. phanerogamar. Divis.: Hordeaceae, Chlorideae, Bromeae, Arundinaceae, Avenaceae, Agrostideae, Stipaceae, Paniceae.

Gramineae Juss. cont.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: fam. Glumaciae.

Agdh. 1823. Aphor. p. 143; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: ordo Glumiferar. Trib.: Agrostideae, Paniceae, Avenaceae, Festucaceae, Chlorideae, Hordeaceae, Saccharinae, Oryzeae, Bambusinae. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 116. Sect.: *arboreae*(*Baumgräser*), *spicatae*(*Ährengräser*), *paniculatae* (*Rispengräser*).

Link. 1827. Hort. Berol. I. p. 1: ordo Endogenear. (Parallelinerviar.) Fam.: *A.* Ophiurinae, Loliaceae, Zoysinae, Nardinae, Cenchrinae, Lappagineae, Aegilopinae, Hordeaceae, Triticeae. *B.* Spartinaceae, Paspalinae, Cynodonteae, Chlorideae. *C.* Phalarideae, Agrostideae, Miliaceae, Stipaceae, Arundinaceae, Chaeturinae, Asprellinae, Hexandrae. *D.* Avenaceae, Festucaceae, Glycerinae, Echinariaceae, Cynosuroideae. *E.* Paniceae, Tristeginae, Anthoxanthinae, Ehrhartinae, Actinodeae, Villiflorae, Triglossae, Bracteiflorae, Diclinae, Anomalae. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 1. Gen. §. 1: Ophiurus, Psilurus, Lodicularia, Lolium, Nardus, Cenchrus, Anthephora, Lappago, Aegilops, Asprella, Elymus, Hordeum, Secale, Triticum, Agropyrum, Brachypodium, Trachynia, Gaudinia, Oreochloa, Catapodium, Wangenheimia. §. 2: Spartina, Paspalus, Cynodon, Leptochloa, Dineba, Chloris, Dactyloctenium, Eleusine, Beckmannia, Chondrosium, Atheropogon. §. 3: Phalaris, Achnodon, Phleum, Crypsis, Colobachne, Polypogon, Gastridium, Alopecurus, Cornucopiae, Agrostis, Podosemum, Mühlenbergia, Anemagrostis, Cinna, Sporobolus, Sturmia, Schmidtia, Colpodium, Milium, Urachne, Aristida, Stipa, Lasiagrostis, Calamagrostis, Ammophila, Chaeturus, Leersia, Oryza. §. 4: Avena, Campella, Corynephorus, Arrhenatherum, Holcus, Hierochloa, Aira, Melica, Schismus, Triodia, Phragmites, Arundo, Ampelodesmos, Scolochloa, Festuca, Vulpia, Sclerochloa, Arthrostachya, Dactylis, Diplachne, Ceratochloa, Libertia, Uniola, Diarrhena, Brizopyrum, Airochloa, Köleria, Trisetum, Bromus, Schoenodorus, Tridens, Glyceria, Hydrochloa, Poa, Eragrostis, Briza, Molinia, Catabrosa, Echinaria, Trichaeta, Cynosurus, Sesleria, Psilathera. §. 5: Orthopogon, Echinochloa, Panicum, Pennisetum, Setaria, Digitaria, Penicillaria, Tristegis, Anthoxanthum. §. 6: Lagurus, Imperata, Saccharum, Tricholaena, Andropogon, Heteropogon, Pollinia, Sorghum. §. 7: Bambusa. §. 8: Tripsacum, Melinum, Coix, Zea. §. 9: Lygeum. — Koch 1837. Syn. p. 768. Ed. II. p. 888. Trib.: Olyreae, Andropogoneae, Paniceae, Phalarideae, Alopecuroideae, Chlorideae, Oryzeae, Agrostideae, Stipaceae, Arundinaceae, Sesleriaceae, Avenaceae, Festucaceae, Hordeaceae, Nardoideae.

Gramineae Juss. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 47; 1830. Fl. exc. p. 15: fam. Glumacear. Divis.: Ophiureae (1830 Rottbölleae), Loliaceae, Cenchrinae, Hordeaceae, Secalinae (1830 Triticeae), Chlorideae, Paspalaceae, Agrostideae, Paniceae, Oryzeae, Saccharinae, Festucaceae, Melicaceae, Poaceae, Avenaceae, Bambusaceae, Nardeae, Sparteae, Zeaceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 145. Divis.: Agrostideae, Andropogoneae, Festucaceae. — Rchb. 1841. Nomencl. p. 35. Divis.: Agrostideae, Panicaceae, Saccharinae, Festucaceae, Bambuseae. — Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 202.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62. 63: fam. Graminariear. Series: Scobiflorae, Calliflorae.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 5: ordo primus Monocotyledonear. Fam.: Paniceae, Olyreae, Sacchariueae, Stipeae, Agrosteae, Chlorideae, Hordeaceae, Festucaceae, Oryzeae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (261) Glumacear. — Simil. Bartl. 1830. Ord. p. 26. Divis.: Stipacea, Agrostidea, Bromea, Hordeacea, Chloridea, Panicea, Saccharina, Phalaridea, Oryzea, Bambusacea. — Lindl. 1833. Nix. p. 36. — Endl. 1836. Gen. p. 77; 1841. Ench. p. 55. Trib. ut Kunth. — Meisn. 1843. Gen. p. 409. 414 (316). Trib. eaed. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 166; 1846. Chlor. prot. p. LXVI. Gen. fossilia: Culmites, Bambusium; Bajera?, Poacites?, Cyperites? — Steud. 1854. Glum. I. p. 1. Trib. ut Kunth et Bambusaceae.
Kunth 1830. Gram. p. 1; 1833. Agrost. p. 3: ordo Monocotyledonum. Trib.: Oryzeae, Phalarideae, Paniceae, Stipaceae, Agrostideae, Arundinaceae, Pappophoreae, Chlorideae, Avenaceae, Festucaceae, Hordeaceae, Rottbölliaceae, Andropogoneae (1830 Andropogineae). — Simil. Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 290. Trib. eaed.
Parlat. 1845. Fl. Palerm. I. p. 3: fam. Endorrhizar. Trib. ut Kunth. (Pappophoreaceae loco Pappophorear.)
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 155: fam. (223) Glumacear. Trib. ut Kunth.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 74: class. Glumiflorar. Series: Euryanthae, Clisantheae.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 365. Series: Loxanthae, Parallelanthae.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 355. Trib.: Poaceae, Phalarideae, Paniceae.

Graminifolia Dillen. 1719. Nov. gen. p. 168: nov. g. herbae flore imperfecto, etc.
= . . . ?

Graminiris Spach 1846. Hist. vég. phan. XIII. p. 29; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 96: subg. Iridis. (I. graminea.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 820.

Graminites Sternb. 1838. Vers. II. p. 188: ordo plant. foss. Gen.: Germaria.

Grammadenia*) Benth. 1846. Pl. Hartweg. II. p. 218: nov. g. Myrsineacear., Myrsini et Cybiantho aff. (G. marginata.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 450: g. Ardisiear. — Par. Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 305.

Grammalia Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Ceramidear., pro *Hutchinsia Ag.* non *DC.* propositum.
= Polysiphonia Grev.

Grammanthes DC. 1828. Prodr. III. p. 392: g. Crassulear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 106. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346.
Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4180: g. Sedear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Cotyledonear.
Bartl. 1830. Ord. p. 310: g. Crassulacear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 81. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 302.
Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): g. Umbilicear.
Endl. 1839. Gen. n. 4613. p. 810; 1841. Ench. p. 405: g. Rochear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6180 — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 11.
Synon. Vauanthes Haw.

Grammariae Link 1841. Fil. hort. Berol. p. 136: subordo Polypodiacear. Gen.: Grammitis, Xiphopteris, Selliguea, Gymnogramma, Schizogramma, Anogramma, Stegnogramma, Neurogramma, Meniscium, Hemionitis.

Grammartheon Rchb. vid. *seq.*

Grammarthron Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 32: nov. g. Senecionear. (Arnica scorpioides L.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138.
Cass. 1821. Dict. v. 19. p. 294; 1827. v. 48. p. 447. 452; 1830. v. 60. p. 583: g. Doronicear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2488.
Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 359: g. Corymbiferar.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1508 (*Grammartheon*): sect. Arnicae.
= Aronicum Neck.

Grammatocarpus Presl 1831. Symb. I. p. 59. t. 38: nov. g Loasear. (G. volubilis.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 14 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 366. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 125 (90). — Endl. 1839. Gen. n. 5115. p. 931; 1841. Ench. p. 486. — Walp. 1843. Rep. II. p. 225. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 745.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 235: g. Bartoninear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 160. n. 6237: g. Blumenbachiear.
Synon. Scyphanthus Don.

---

*) γραμμή, linea, litera.

Grammatonema Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 140; 1849. Sp. Alg. p. 187. n. 136: g. Desmidiear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Pediastrear.
= Grammonema Agdh.

Grammatophora Ehrenb. 1840. Kreideth. p. 73; 1830. Ber. Ak. Berl. p. 161; 1844. ibid. p. 83: novum g. Bacillarior., Tabellariae simile.
Kütz. 1844. Bacill. p. 128; 1845. Phyc. germ. p. 111; 1849. Sp. Alg. p. 120. n. 75: g. Tabellariear. — Par. Math. 1853. Belg. H. p. 533.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 40: g. Achnanthear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95: g. Eutabellariear.

Grammatophyllum Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 377: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1833. Orchid. p. 173; 1839. Bot. Regist. XXV. t. 65: g. Vandear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1431. p. 200; 1841. Ench. p. 111. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2037. — Meisn. 1842. Gen. p. 376 (282). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 47. Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 550. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 708.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Brassidar.
Synon. Gabertia Gaudich.

Grammatosperma Fisch. & Meyer 1845. Ind. sem. h. Pet. (Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 378): nova sectio Mentzeliae.

Grammatothea Rchb. vid. *seq.*

Grammatotheca Presl 1836. Pr. mon. Lobel. p. 43: nov. g. Clintoniear. (Clintonia Bergiana Cham.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 186 (sph. *Grammatothea*); 1841. Nom. p. 102. n. 3977 (*Grammotheca*). — Endl. 1838. Gen. n. 3051. p. 510; 1841. Ench. p. 263. — Meisn. 1839. Gen. p. 240 (147). — A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 348. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Clintonear.

Grammeionium Rchb. 1828. Consp. p. 138. n. 4885 *e*; 1832. Fl. exc. p. 708; 1841. Nom. p. 186. n. 7138. 4; 1844. Fl. sax. p. 398 (*Grameionium*): sect. Violae. (V. alpina, cenisia, tricolor L., etc.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 269: g. Violear. genuinar.
= Melanium Ging.

Grammica*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 170. Ed. Willd. p. 212: nov. g. Pentandr. Digyn. (G. aphylla.)
Desm. . . . . . Bull. soc. bot. France I. p. 295. (?)
= Cuscuta Linn.

Grammismelia Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 272; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 202: sect. Ismeliae.

*) γραμμικός, linearis: a forma plantae lineari.

Grammita Bonnemais. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 186: nov. g. Hydrophytar. loculatar. (Hutchinsia Agdh., Ceramii sp. Rchb.)
Bonnem. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 72: g. Epidermear.
Menegh. 1838. Cenni p. 32: g. Ceramiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 705.
= Polysiphonia Grev.

Grammitaceae Presl 1836. Pterid. p. 205: trib. Gymnosorear. Sect.: Grammitideae, Hemionitideae.

Grammitella Crouan 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 372: nov. g. Rhodomelear., Grammitae etc. aff. (G. Guernisaci.)

Grammitideae Presl 1836. Pterid. p. 206: sect. Grammitacear. Gen.: Monogramma, Grammitis, Stegnogramme, Meniscium, Synammia, Microgramma, Loxogramme, Selliguea.
Meisn. 1843. Gen. p. 430 (330): trib. Polypodiacear. Gen.: Grammitis, Gymnogramme, Ceterach, Synamnia, Stenosemia, Stegnogramma, Meniscium, Selliguea, Loxogramma, Antrophyum, Hemionitis.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693: div. Polypodiacear. Gen.: Ceterach, Gymnogramma, Hemionitis, Antrophium, Polytaenium, Monogramma, Synammia, Grammitis, Stenogramma, Mesochlaena, Meniscium.

Grammitis Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 3. 17: nov. g. Filicum. (annulatar.) — Par. Swartz 1806. Syn. Fil. p. 21. (gyratar.) — Willd. 1810. Sp. V. p. 138. n. 1959. — Leman 1821. Dict. v. 19. p. 298. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 41. n. 3238; 1831. Gen. II. p. 721. n. 3631. (verar.)
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 20: sect. Gymnopteridis.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 29: g. Gyrator.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 146. Ed. Nees p. 2: g. Polypodiacear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 4. — Kunth 1822. Syn. I. p. 69. — Agdh. 1822. Aphor. p. 116. — D. Don 1825. Nepal. p. 14. — Blume 1829. Fl. jav. fasc. III. IV. p. 104 (sect. genuinae, Xiphopterides); 1830. En. pl. Jav. II. p. 114. Sect.: Grammitis, Diagramma, Paragramma. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. (nudar.) — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 35. — Brongn. 1843. En. genr. p. 4.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Polypodear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Rizospermar.
Endl. 1836. Gen. p. 59. n. 607: g. Polypodiear. Sect.: Grammitis (Kaulf.), Xiphopteris. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1346; 1841. Ench. p. 36. Sect.: Grammitis (Presl), Synammia. — Hook. f. 1855. N-Zeal. II. p. 42. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 629. (nudar. — Gr. leptophylla Sw.)

Grammitis Kaulfuss 1824. Enum. Fil. p. 84: g. Polypodiacear., sejuncta Xiphopteride restrict.
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 310: g. Hemionitidear.
Desv. 1827. Mém. soc. Linn. VI. p. 221: g. Filicum.
Rchb. 1828. Consp. p. 39. n. 728: g. Gymnopteridum.
Endl. 1836. Gen. p. 59. n. 607 *a:* sect. Grammitidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 991. 1.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 136: g. Grammariar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 282: g. Aspleniear.
= Eugrammitis Presl.

Grammitis Presl 1836. Pterid. p. 208: g. Grammitidear., sejuncta Synammia restrict. Sect.: Eugrammitis, Xiphopteris, Chilopteris. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 430 (330). — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693.
Endl. 1841. Spl. I. n. 607 *a.* p. 1346; 1841. Ench. p. 36: sect. Grammitidis. Subsect. ut Presl.
Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 991: g. Polypodiear. Sect. ut Presl (Grammitis). — Simil. J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 45. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 232. (restrict. *Synon. Mecosorus Klotzsch.)*

Grammitis Koch 1845. Syn. ed. II. p. 974: g. Polypodiacear. verar.
= Ceterach Willd.

Grammocarpus Seringe 1825 in DC. Prodr. II. p. 181: sect. Trigonellae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3872 *a;* 1841. Nom. p. 147. n. 5698. 4. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 173. — Endl. 1840. Gen. n. 6508 *a.* p. 1267; 1841. Ench. p. 668. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 530. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 40. — Walp. 1843. Rep. II. p. 847.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 499: sect. Meliloti. — Par. Koch 1843. Syn. ed. II. p. 184.
Gasparr. 1853. Rendic. Ac. Borb. I. p. 183: g. Trifoliear.
Synon. Trifoliastrum Mönch.

Grammonema Agardh 1832. Consp. Diat. p. 63: nov. g. Fragilarinar. *Cf. Grammatonema Kütz.*
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 58: g. Desmidiear.
= Fragilaria Lyngb.?

Grammosciadium DC. 1830. Prodr. IV. p. 232: nov. g. Scandicinear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 370. — Tausch 1834. Flora I. p. 343. — Rchb. 1837. Hdb. p. 219. — Meisn. 1838. Gen. p. 149 (107). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 133. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 984. — Boiss. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 66. Char. locupletat. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 355.

Grammosciadium DC. cont.
Endl. 1839. Gen. n. 4516. p. 788; 1841. Ench. p. 380; 1850. Spl. V. p. 13: g. Scandicinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5334.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Scandicidar.

Grammotheca Rchb. vid. *Grammatotheca Presl.*

Granadilla*) Tourn. 1700. Inst. p. 240. t. 123. 124: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 153. Ed. Hall. 1745. p. 166: g. pl. class. VII.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125 *(Granatilla):* g. Thalamostemonis. — Par. Mönch 1794. Meth. p. 48.
Adans. 1763. Fam. II. p. 408: g. Capparidum.
Medic. 1787. Malv. p. 96: g. Monadelph. Pentandr.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 289. t. 60. f. 5 (foetida); 1791. ibid. II. p. 479. t. 177. f. 1.
= Passiflora Juss.

Granadilla DC. 1822. Mém. soc. Genèv. I. 2. p. 435; 1828. Prodr. III. p. 327: sect. Passiflorae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3472 *d.* — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 50. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 266. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 600. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 131. 165.
Pöpp. & Endl. 1838. Nov. gen. II. p. 58: subg. Passiflorae.
Endl. 1839. Gen. n. 5098 *c β.* p. 926; 1841. Ench. p. 483: subsect. Decalobae.
Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5078. 3 *b:* subsect. Passiflorae.

Granadilleae Rchb. 1828. Consp. p. 132; 1837. Handb. p. 208: subdiv. Passiflorear. Gen.: Tetrapathaea, Vareaa, Deidamia, Thompsonia, Modecca, Paschanthus, Tacsonia, Murucuia, Disemma, Passiflora. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 131. Sect.: Modecceae, Passifloreae *genuinae* (Deidamieae, Passiflora, Murucuia), Tacsonieae.

Granata malus Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 111.
= Punica Tourn.

Granateae Don 1826 in James. Edinb. phil. Journ. Jul. p. 134.
DC. 1828. Pr. III. p. 3: ordo (66) Calyciflorar. Gen. unicum: Punica. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 653. Gen. id. — Koch 1836. Syn. p. 238. Ed. II. p. 263. Gen. id.
Rchb. 1828. Consp. p. 173: subdiv. Lythrear. Gen. id.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 38: fam. Myrtariear. Gen. id.
Bartl. 1830. Ord. p. 324: ordo (187) Calycanthinar. Gen. id.
Link 1831. Hdb. II. p. 69: ordo 24 Perigynar. Gen. id.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 638: subdiv. Myrobalanear. Gen. id.

---

*) Nomen ex Hispanorum „*granada*".

Granateae Don cont.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 287: fam. (60) Calycanthinear. Gen. id.
Meisn. 1837. Gen. p. 107 (75): subordo Myrtinear. (praecedent. Lindl. et Arnott.) Gen. id.
Rchb. 1837. Hdb. p. 247: sect. Combretear. Gen. id.
Endl. 1840. Gen. p. 1236; 1841. Ench. p. 654: fam. Myrtaceis aff. Gen. id.
Brongn. 1843. En. genr. p. 124: fam. Myrtoidear. Gen. id.
Berg 1856. Linnaea XXVII. p. 464; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 2. p. 513: trib. Myrtacear. Gen. id.
Granateae Rchb. 1841. Nom. p. 172: div. Lythrariear. Subdivis.: *genuinae* (gen.: Punica), Olinieae, Memecyleae.
Granatilla Gled. vid. *Granadilla Tourn.*
Granatum Rumph. 1743. Amboin. III. p. 92. t. 61.
= Carapa Aubl. (DC. Pr. I. p. 626.)
Grandinia Fries 1838. Epicr. p. 527: nov. g. Hydneor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 466. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 42; 1842. Mycol. p. 177. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 400. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 167.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 329: g. Hydnaceor.
Grangea Adans. 1763. Fam. II. p. 121: g. Tanacetor.
Juss. 1789. Gen. p. 184: g. Corymbiferar. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 549. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 406. — Link 1822. En. II. p. 344.
Cass. 1821. Dict. v. 19. p. 304; 1822. v. 23. p. 566: g. Buphthalmear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2480. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224: g. Pyrardear.
Bartl. 1830. Ord. p. 139: g. Inulear.
Cass. 1830. Dict. v. 60. p. 581: g. Grangeinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 373. Sect.: Crassicolla, Leptoderis, Pyrarda. — Endl. 1838. Gen. n. 2397. p. 388; 1841. Ench. p. 235. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 190 (128). — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Less. 1832. Syn. p. 201: g. Conyzear.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3574: g. Grangeinar. Sect.: Grangea, Leptoderris, Pyrarda.
Brongn. 1843. En. genr. p. 44: g. Baccharidear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 39: g. Asterinear.
Grangeinae Rchb. 1841. Nomencl. p. 91: subdiv. Conyzear. Gen. Grangeinear. DC.
Grangeineae Cassini 1830. Dict. v. 60. p. 58: subdiv. Buphthalmear. Gen.: Egletes, Xerobius, Pyrarda, Grangea, Centipeda, Cyathocline. *Cf. Pyrardeae Cass.*
DC. 1836. Pr. V. p. 371: subdiv. Conyzear. Gen.: Dichrocephala, Grangea, Cyathocline, Lestadia; Gymnarrhena. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 388; 1841. Ench. p. 235. Gen. ead. — Maisn. 1839. Gen. p. 190 (128). Gen. ead.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951: subdiv. Bellidear. Gen. ead. et Solenogyne.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Asteroidear. Gen. ut DC.
Grangeria*) „Comm.“ Juss. 1789. Gen. p. 340: nov. g. Amygdalear.
Lam. 1789. Dict. III. p. 21. t. 427.
Gmel. 1791. Syst. p. 796: g. Polyandr. Monogyn.
Willd. 1799. Sp. II. p. 848. n. 937: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 3. n. 1165.
Batsch 1802. Tab. p. 4: g. Drupiferar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 191: g. Rosacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 307. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 393. n. 1972. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 21.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 871; 1825. Syst. II. p. 450. n. 1757: g. Rosaceis aff.
R. Brown 1818. Tuckey Cong. p. 433 (Verm. bot. Schr. I. p. 205): g. Chrysobalanear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 527. — Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4520; 1841. Nom. p. 178. n. 6880. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 406. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 479. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 369. — Meisn. 1837. Gen. p. 102 (72). — Endl. 1840. Gen. n. 6413. p. 1252; 1841. Ench. p. 664. — Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 93. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 357.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 212: g. Chrysobalanacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 543.
Grantia**) Boissier 1845. Diagn. pl. or. nov. I. Nr. 6. p. 79: nov. g. Inulear. (G. Aucheri et arachnoidea.)
Walp. 1847. Rep. VI. p. 144: g. Euinulear.
Granularia Roth 1791 in Usteri Ann. Bot. I. p. 6. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 313.
Gmel. 1791. Syst. p. 1487: g. Fungor.
L. & C. Tulasne 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 100: sect. Nidulariae. (G. pisiformis Roth.)
Granularia Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 6: nov. g. Tremellariar. *Cf.* Flora 1821. II. p. 512.
Granulina „Bory“ Fée 1852. Gen. Fil. p. 48: subg. Egenolfiae. (Polybotrya nodiflora Bory.)
Granulinia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70: ordo Soligraniae. Divis.: Mucedinia, *Granulinia* (fam.: Confervaceae, Diatomeae, Hydrodictyneae, Conjugateae, Vaucheriaceae).

*) Dicat. N. Granger, peregrinatori.
**) Dicat. Dr. James Grant.

Granulosae Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 402: trib. Orchidear. Gen. jav.: Habenaria, Mecosa, Peristylus, Neottia, Etaeria, Erythrodes, Anecochilus, Cheirostylis, Adenostylis, Eucosia, Galera, Cordyla.

Graphephorum*) „Desv." Palis. 1812. Agrost. p. 76. t. 15. f. 8: nov. g. Graminear. (Aira melicoides Michx.) *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 314. — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 71; . . . . Bull. philom. II. (Isis 1823. p. 700.) — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 34. 597. n. 304.
Rchb. 1828. Consp. p. 53. n. 1017 *a:* sect. Triodiae.
Kunth 1830. Gram. p. 79; 1830. Agrost. p. 250: g. Arundinacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 823. p. 91; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 135 (*Graphophorum*). 327. — Meisn. 1843. Gen. p. 420 (322). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 162. — Steud. 1854. Glum. I. p. 195.
Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1190: g. Arundinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.

Graphidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: trib. Idiothalamear. Gen. Graphidear. Fries 1825.

Graphideae Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 13: cohors 1 Lichenum. Gen.: Diorygma, Leiorreuma, Graphis, Opegrapha, Oxystoma, Scaphis, Lecanactis, Sclerophyton, Pyrochroa.
Chevall. 1824. Graphidées.
Fries 1825. Pl. homon. p. 272: trib. Idiothalamor. Gen.: Graphis, Opegrapha, Lecanactis, Sclerophyton, Ustalia, Coniangium. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 12; 1841. Ench. p. 10. Gen. ead.
Rchb. 1828. Consp. p. 21 (1832. Fl. exc. p. L): fam. Hymenosporar. Divis.: *genuinae* (gen. Graphidear. Fries 1825 et Leucogramma, Platygramma), Glyphideae, Gyrophoreae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: fam. Lichenariear. Gen.: Arthronia, Opegrapha, Graphis.
Fries 1831. Lich. eur. p. 5. 359: trib. 3 Lichenum gymnocarpor. Gen.: Umbilicaria, Opegrapha, Lecanactis. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350. Gen.: Opegrapha, Graphis, Aulaxina, Lecanactis, Sclerophyton, Ustalia, Arthonia, Fissurina, Coniangium, Coniocarpon.
Genth 1836. Nass. I. p. 313. 380: ordo Discocarpor. Gen.: Gyrophora, Opegrapha, Conioloma.
Rchb. 1841. Nom. p. 15: div. Graphithalamar. Gen. ut Fries 1825.
Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 228: ordo Lichenum. Gen. Meyeniana: Graphis, Leiogramma, Glyphis, Arthonia, Ocellularia, Verrucaria.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 17: fam. Cryopsorar. Gen.: Lecanactis, Graphis, Opegrapha.

*) γραφίς, penicillum.

Graphideae Eschweiler cont.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 117: div. Lichenum disciferor. Gen. ut 1831 et Coniocarpon.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: fam. Lichenum heteromericor. acramphiblastor. Gen.: Opegrapha, Lecanactis, Conioloma, Arthonia.
Bayrh. 1849. Taun. p. 88: fam. Lichenum. Gen. ut Rabenh. et Coniocarpon.
Nyl. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 14 (Flora 1854. p. 236): trib. Placodear. Gen.: Xylographa, Opegrapha, Stigmatidium, Glyphis, Chiodecton, Arthonia.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 275: fam. Kryoblastor. Subfam.: Opegrapheae, Arthonieae.

Graphidei Schärer 1850. En. Lich. eur. p. 150: fam. Lichenum discoideor. Gen.: Opegrapha.

Graphidium*) Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 186: nov. g. Hymenocarpor., Porophorae aff. (Lecidea atrovirens.)
⩧ Rhizocarpon Ramond.

Graphidium Gaudin 1828. Fl. Helv. I. p. 199: sect. Arundinis. (Agrostis arundinacea L. et Arundo varia Schrad.)
= Deyeuxia Clar.

Graphina Chevall. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 49: sect. Opegraphae. (Graphis scripta, Opegr. pulverulenta, etc.)

Graphineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69. 78: fam. Scutelliniae. Gen.: Graphis, Opegrapha, Arthonia.

Graphiola*) Poiteau 1824. Ann. sc. nat. III. p. 473. t. 26. f. 2: nov. g. Fungor. (Gr. Phoenicis.) *Cf.* Kunze 1826. Flora I. p. 278.
Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 252; 1841. Nom. p. 7. n. 274: g. Phacidieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 372. p. 32; 1841. Ench. p. 19.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 800. n. 4144: g. Trichogasterum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 19; 1842. Mycol. p. 74: g. Aecidiacear.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 323: g. Pyrenomycetum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Caeomaceor.
Lév. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 138. Char. emend.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 422: g. Phyllosticteor.
Synon. Trichodesmium Chev.; Elpidophora Ehr.?

Graphis Adans. 1763. Fam. II. p. 11: g. Fungor. (*Lichenoides Dill.* Musc. t. 18. f. 1. 2.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 314.
Achar. 1810. Lich. un. p. 46. 264; 1814. Syst. Lich. p. 80: g. Heterogeneor. (G. lineola, scripta, pulverulenta, etc.
Mart. 1817. Erlang. p. 280: g. Lichenum linearium.

*) γραφείδιον, stilus.
*) Penicillus parvus.

Graphis Adans. cont.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 502: g. Opegraphidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 91: g. Rimatar.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 78: g. Graphinear.
Meyer 1825. Flecht. p. 330: g. Hymenocarpor. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 249. n. 3370; 1831. Gen. II. p. 743. n. 3766.
Fries 1825. Pl. homon. p. 272: g. Graphidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 387; 1841. Nom. p. 16. n. 544. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71. — Endl. 1836. Gen. n. 136. p. 12; 1841. Ench. p. 10. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 174; 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350. — Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 228. — Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 18. — Bayrh. 1849. Taun. p. 89.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Graphidar.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 286: g. Opegraphear. (emend.) — Par. Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 350. — Arnold 1858. Flora II. p. 693.
Conf. Leiorreuma Eschw.; Platygramma Meyer.

Graphis Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 13: g. Graphidear. (Graphides genuinae Ach.)
= Opegrapha Pers.

Graphis Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 328: g. Discocymatior. Sect.: Opegrapha, Umbilicaria.

Graphithalamae Rchb. 1841. Nomencl. p. 15: fam. Gastropsorar. Divis.: Graphideae, Glyphideae, Limborieae.

Graphithalami Rchb. 1837. Handb. p. 133: fam. Gasteropsorar., continens Graphideas genuinas et Glyphideas Rchb. 1828.

Graphium Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 18. t. 5. f. 251. 252: nov. g. Aspergillinor. *Cf.* Unger 1847. Bot. Zeit. p. 249.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 16; 1839. III. p. 13; 1842. V. p. 15; 1842. Mycol. p. 61: g. Stilbinor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 120. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 133. — Bonord. 1851. Hdb. p. 137.
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 214: g. Stilbeor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 469. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Stilbaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 450: g. Mucorear.

Graphophorum Dietr. vid. *Graphephorum Desv.*

Graptophyllum*) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 102; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 327: nov. g. Gendarussear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4273. — Endl. 1839. Gen. n. 4081. p. 704; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 824.

*) γραπτός, scriptus.

Graptophyllum Nees cont.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 68: g. Acanthacear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 63: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Justiciadar.

Grastidium Blume Bijdr. p. 333: vid *Gastridium Blume.*

Grateloupella Bory 1823. Dict. class. III. p. 340.
= Polysiphoniae Grev. pars.

Grateloupia*) Agardh 1822. Sp. Alg. I. 2. p. 221 (Aphor. p. 100); 1824. Syst. p. XXXIV. 241: nov. g. Floridear. — Par. Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 361. — Menegh. 1838. Cenni p. 40. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 399; 1841. Brit. Alg. p. 83.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 333. n. 3403; 1831. Gen. II. p. 750. n. 3800: g. Floridar. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 97. p. 8; 1841. Ench. p. 6.
Grev. 1830. Alg. brit. p. 151. (Syn. p. LIX.)
Ritg. 1831. Marb. II. p. 86: g. Chromatophycoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 723: g. Plocamiear.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 102: g. Coccocarpear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 41. n. $122/_{48}$. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 151. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360 (Flora 1843. p. 98): g. Sphaerococcoidear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phyc. gener. p. 397; 1849. Sp. Alg. p. 730. n. 486: g. Gigartinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Coccocarpidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : g. Chondrear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 198: g. Nemastomear.
Synon. Erinacea Lamx.; Phoracis Rafin.

Grateloupia Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 189: nov. g. Hydrophytar. loculatar.
= Dasya Agdh.

Gratiola**) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 241. Ed. Hall. 1745. p. 243: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 333. n. 833; 1737. Cliff. p. 9; 1740. Syst. p. 17; 1742. Gen. ed. II. p. 11. n. 25; 1753. Sp. I. p. 17; 1759. Syst. ed. X. p. 851. n. 27; 1762. Sp. ed. II. p. 24; 1764. Gen. ed. VI. p. 13. n. 29; 1767. Syst. ed. XII. p. 61: g. Diandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 24. — Murr. 1774. Syst. p. 60; 1784. Syst. p. 64. — Reich. 1778. Gen. p. 13. n. 30. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 17. n. 37. — Lour. 1790. Coch. I. p. 22. —

*) Dicat. J. P. A. G. Grateloup, de Confervis scriptori.
**) Nomen in officinis fictum: quasi parva Dei gratia. (Beckmann.)

Gratiola Rupp. cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 37. — Pers. 1797. Syst. p. 65; 1805. Ench. I. p. 14. n. 52. — Willd. 1797. Sp. I. p. 102. n. 149; 1809. En. p. 29. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 16. 29. 41. t. 128. 129. 154. 155. 178. 179; 1819. III. p. 2. t. 202—204; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 136; ed. 1832. p. 135. — Vahl 1805. Enum. I. p. 88. n. 32. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 50. — Haw. 1812. Syn. succ. p. 2. Ed. Schrank 1819. p. 2. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 8. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 340. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 6. 43.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 617: g. Dymeizonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 154. n. 633: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 432.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 212. — Scop. 1777. Intr. p. 168. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 363. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 280. — DC. 1805. Franç. III. p. 597. — Hedw. 1806. Gen. p. 11. 347. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 54. 129. n. 70. — Lois. 1821. Dict. v. 19. p. 335. — Link 1821. En. I. p. 27. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 39. n. 76; 1830. Gen. I. p. 20. n. 80. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 16. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 29. 39.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Acanthor.
Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 289: g. Angiospermar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 266: g. Monopetelar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 251. t. 53. f. 11 (virginiana).
Juss. 1789. Gen. p. 121: g. Scrophulariis aff. *Cf.* Juss. in Dict. v. 48. p. 219.
Neck. 1790. El. I. p. 333. n. 518: g. Chasmatophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 145 in Didynam. Angiosperm.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 435. Ed. Nees p. 291: g. Scrophularinar. (restrict.) — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 365. — Kunth 1823. Syn. II. p. 124. — D. Don 1825. Nepal. p. 85. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 744. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 376.
Spreng. 1817. Anl. II. I. p. 400: g. Scrofularinar. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 543.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3147: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171. — Koch 1837. Syn. p. 517. Ed. II. p. 595.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Digitalidear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 3: g. Gratiolear. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 534. — Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4604.

Gratiola Rupp. cont.
— Kunth 1838. Berol. II. p. 67. — Endl. 1839. Gen. n. 3946. p. 682; 1841. Ench. p. 339. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 316. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 100. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 60. — Bartl. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 342. — Walp. 1845. Rep. III. p. 285.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 32: g. Euscrophularinear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 402; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Eugratiolear. Sect.: Gratiolaria, Sophronanthe. — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 224.
Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 584: g. Scrophulariacear.
Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 189: g. Scrophularinear.
Synon. Nibora Raf.

Gratiolaria Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 402: sect. Gratiolae.

Gratioleae Benth. 1835. Scroph. rev. p. 3; 1835. Scroph. ind. p. 20: trib. Scrophularinear. Gen. §. 1: Pterostigma, Lindenbergia, Stemodia. §. 2: Dodartia, Mazus, Limnophila; Capraria?, Morgania; Mimulus, Uvedalia; Herpestis, Sphaerotheca, Matourea; Gratiola, Beyrichia, Achetaria; Dopatrium, Microcarpaea. §. 3: Peplidium, Bonnaya; Vandellia, Artanema, Torenia; Heteranthia?, Lindernia, Limosella. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. Gen.: Gratiola, Herpestis, Lindernia, Conobia, Limnophila, Hydrotriche, Cybbanthera, Mazus, Morgania, Mimulus, Leucocarpus, Torenia, Artanema, Collinsia, Hemianthus, Limosella, Angelonia, Stemodia, Dodartia. — G. Don 1837. Gen.: Gratiola, Beyrichia, Achetaria, Montira, Dopatrium, Microcarpaea, Peplidium, Bonnaya, Hydrotriche, Hemianthus, Pterostigma; Lindenbergia, Stemodia, Dodartia, Masus, Limnophila, Morgania, Herpestis, Mecardonia, Bramia, Sphaerotheca, Diceros, Loxophyllum, Matourea, Caconapea, Ranaria, Vandellia, Ellobum, Artanema, Torenia, Heterantha, Lindernia, Limosella, Hydranthelium, Conobea, Mimulus, Leucocarpus, Uvedalia, Hemiphragma, Collinsia. — Endl. 1839. Gen. p. 678. Gen.: Halleria, Teedia, Freylinia, Capraria, Xuarezia, Pogostoma, Pterostigma, Lindenbergia, Stemodia, Schistophragma, Erinus, Sutera, Dodartia, Mazus, Limnophila, Uvedalia, Diplacus, Mimulus, Leucocarpus, Ellobum, Morgania, Sphaerotheca, Herpestes, Curanga, Achetaria, Beyrichia, Anticharis, Hydrotriche, Gratiola, Dopatrium, Bonnaya, Microcarpaea, Peplidium, Micranthemum, Vandellia, Torenia, Achimenes, Heteranthia, Ilyogeton, Lindernia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1405 et Ench. p. 339) Bacopa, 1842 (Spl. II. p. 61) Hemichaena, Chilostigma et 1843 (Spl. III. p. 79) Ildefonsia. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. 312. Gen. ead. et Ery-

Gratioleae Benth. cont.
thranthe, Caconapea, Ranaria, Matourea, Sophronanthe, Nibora. — Meisn. 1840. Gen. p. 309 (220). Gen. fere ut Endl., et Ilysanthus, Bacopa. — Brongn. 1843. En. genr. p. 59. Gen. ex Endl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: sect. Caprariear. Gen.: Limosella, Gratiola, Beyrichia, Achetaria, Bonnaya, Peplidium, Microcarpaea, Dopatrium, Lindernia, Torenia, Artonema, Vandellia, Tittmania; Matourea, Sphaerotheca, Herpestes; Uvedalia, Mimulus; Morgania; Limnophila, Hornemannia, Dodartia; Stemodia, Lindenbergia, Pterostigma; Erinus, Nycterinia, Manulea, Palmstruckia, Sutera, Buchnera; Russelia, Capraria, Freylinia, Buddleja; Browallia, Franciscea, Hemiphragma, Teedia, Halleria. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 118. Subsect.: Limoselleae, *genuinae* (gen. ut Endl. [emissis Leucocarpo, Erino, et Sutera] et Tittmannia, Bacopa).
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 340; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: trib. Antirrhinidear. Subtrib.: Aptosimeae, Manuleieae (1847 Manuleae), Eugratioleae, Lindernieae. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 458. Gen. ead.

Gratola Willd. Spec. I. p. 102: sphalm. pro *Gratiola*.

Graumüllera*) Rchb. 1828. Consp. p. 43. n. 762: nov. g. Potamogear. (Ruppia antarctica Labill.)
Bartl. 1830. Ord. p. 72: g. Najadear.
Synon. Amphibolis Agdh.

Gravenhorstia**) Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 439.
Meisn. 1837. Gen. p. 72 (52): g. Bruniacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4606. p. 808; 1841. Ench. p. 403 (dubium). — Walp. 1842. Rep. I. p. 545. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 785.
Rchb. 1841. Nom. p. 159. n. 6210: g. Bruniear.

Gravesia***) Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 333: nov. g. Sonerilear. (G. bertolonioides.) — Par. Walp. 1854. Ann. bot. III. p. 887.

Graya Endl., Rchb. vid. *Grayia Hook. & Arn.*

Graya „W. Arnott mss." Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 119: g. Paniccar. (Panicum elegans Arn., Andropogon Graya Steud. Nom.)

Grayia Hook. & Arn. 1841 in Beech. voy. Bot. p. 387.
Endl. 1841. Spl. I. n. 1912/$_1$. p. 1376 (*Graya*); 1841. Ench. p. 181; 1842. Spl. II. p. 32. n. 1915/$_2$: g. Atriplicear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6364 (*Graya*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 119: g. Eurotiear.

*) Dicat. Joh. Chr. Fr. Graumüller, Jenensi.
**) Dicat. Joh. Lud. Chr. Gravenhorst, prof. Wratislaw.
***) Dicat. Cl. Graves.

Green Adans. 1763. Fam. II. p. 492: g. Muscor. (*Sphagnon* 3. 4. 10—13 *Dill.* Musc. t. 32.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 351.
= Phascum, Dicranum, etc.

Greenea*) Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 403: nov. g. Rondeletiear. (Wendlandia Wightiana Wall.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 158 (114).
Synon. Greenia Endl. et Auct.

Greenia Endl. 1838. Gen. p. 551. n. 3251; 1841. Ench. p. 274. n. 3250: g. Rondeletiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2886. — Walp. 1842. Rep. II. p. 504. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 156.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear. — Par. Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 15. t. 1161.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
= Greenea Wight & Arn.

Greenia Nuttall . . . . Amer. phil. trans. V. p. 142.
Endl. 1841. Spl. I. n. 793/$_1$. p. 1353; 1841. Ench. p. 57: g. Stipacear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 419 (320). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Stipear.

Greenovia**) Webb & Berth. . . . . Phyt. Canar. I. p. 198: nov. g. Crassulacear. (Sempervivum aureum Sm.)
Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6191: g. Sedear. (genuinar.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 804.
Endl. 1850. Spl. V. p. 21. n. 4623*e*: sect. Sempervivi.

Greenwaya***) Giseke 1792. Prael. p. 206. 226: nov. g. Scitaminear.
Amomi Linn. pars.

Greevesia†) F. Müll. 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 8: nov. g. Malvacear., Pavoniae aff. (G. cleisocalyx.)

Greggia Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 168. t. 33. f. 3: nov. g. plantar. (G. aromatica.)
Gmel. 1791. Syst. p. 822: g. Polyandr. Monogyn. (Dryadear.)
Eugenia Mich.

Greggia Engelm. 1848. Bot. Wisliz. exp. p. 30 adnot.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 857: g. Eudryadear.
Cowania Don. (A. Gray.)

Greggia A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 8. t. 1: nov. g. Sisymbrear.? *Cf.* Griseb. 1853. Arch. f. Naturg. II. p. 378 et Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 208.

(Gregoria††) Duby 1828. Bot. gall. I. p. 383.
Rchb. 1828. Consp. p. 128. n. 3359 b: g. Androsacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4198. p. 730; 1841. Ench. p. 356. — Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 453.

*) Dicat. B. D. Greene, Boston.
**) Dicat. G. Bellas Greenough, geologo angl.
***) Dicat. Greenway.
†) Dicat. Dr. Aug. Greeves.
††) Dicat. Jac. Gregor, botanico gallico.

Gregoria Duby cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 166: g. Primulacear.
Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 45: g. Primulear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 645; g. Primulidar.
Synon. Arctia Gaud.; Vitaliana Sessl.
Greniera Gay 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. . . .: nov. g. Alsinear. (Alsine Douglasii Fenzl.)
Grenvillea*) Sweet . . . . Geran. t. 262. f. 2: nov. g. Pelargoniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 201. n. 7655.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 731: sect. Pelargonii. (P. conspicuum.)
Grenwillea Steud. Nom. I. p. 705: vid. *praeced.*
Grevia Linn. 1748. Hort. Upsal. p. 279; 1759. Syst. ed. X. p. 1250. n. 914: g. Gynandr. Polyandr.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar.
= Grewia Linn.
Grevillea**) R. Brown 1809 in Linn. Trans. X. (1811.) p. 168 (Verm. bot. Schr. II. p. 264); 1810. Prodr. I. p. 375. Ed. Nees p. 231; Suppl. p. 17: g. Proteacear. Sect.: Lissostylis, Ptychocarpa, Eriostylis, Plagiopoda, Conogyne (1830. Suppl.), Calothyrsus, Cycloptera. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 25. 410. n. 548. Sect. eaed. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 431. — Link 1821. En. I. p. 119; 1829. Hdb. I. p. 384. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 475. n. 520 (sect. ut R. Brown); 1830. Gen. I. p. 105. n. 530. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 526. Sect. ex R. Br. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 534 (amplectens Grevilleam, Manglesiam et Anadeniam Endl.); 1847. II. p. 251. Sect.: Lissostylis, Eriostylis, Calothyrsus, Manglesia, Conogyne, Anadenia.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 335: g. Embothriear. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1756: g. Grevillear. — Par. J. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 335.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Banksiear.
Endl. 1838. Gen. n. 2143. p. 340; 1841. Ench. p. 215: g. Hakeaear. Sect. ut R. Brown. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2393. Sect. eaed. (Grevillea loco Lissostylidis.)
Meisn. 1841. Gen. p. 332 (245): g. Rhopalear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 420: g. Grevillear. (restrict.) — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 121. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 349. Subgen.: Eugrevillea, Conogyne, Manglesia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Grevillidar.

*) Dicat. Lady Grenville.
**) Dicat. Charles Francis Greville.

Grevillea R. Brown cont.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 83: g. Hakeear. Sect.: Aphanoptera, Cycloptera.
Grevilleae Endl. 1838. Gen. p. 340; 1841. Ench. p. 215: trib. Proteacear. (follicularium.) Subtrib.: Hakeaeae, Embothrieae. Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402. Gen.: Anadenia, Grevillea, Lissostylis, Ptychocarpa, Eriostylis, Plagiopoda, Conogyne, Cycloptera, Hakea, Lambertia, Xylomelum, Orites, Amphiderris, Roupala, Andripetalum, Helicia, Knightia, Eucarpha; Embothrium, Oreocallis, Telopea, Lomatia, Stenocarpus. — Brongn. 1843. En. genr. p. 121. Gen. ex Spach. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565. Gen. Endlicheriana. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 348. Gen.: Strangea, Molloya, Grevillea, Hakea, Lambertia, Xylomelum, Orites, Rhopala, Adenostephanus, Helicia, Knightia.
Rchb. 1841. Nom. p. 63: subdiv. Proteear. Sect. ut Endl.
Grevilleeae Rchb. 1828. Consp. p. 81: div. Proteacear. Gen.: Hakea, Grevillea, Anadenia.
Grevillidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 533: trib. Proteacear. Follicularium. Gen. Hakeaear. et Embothriear. Endl.
Grewia*) Linn. 1737. Gen. p. 276. n. 696; 1737. Cliff. p. 433; 1740. Syst. p. 30; 1742. Gen. ed. II. p. 439. n. 838; 1753. Sp. II. p. 964; 1763. Sp. ed. II. p. 1367; 1764. Gen. ed. VI. p. 469. n. 1026; 1767. Syst. ed. XII. p. 602: g. Gynandr. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 689; 1784. Syst. p. 826. — Reich. 1778. Gen. p. 464. n. 1117. — Pers. 1797. Syst. p. 871.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 113. n. 467: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Culminiarum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Tiliar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 382.
Scop. 1777. Intr. p. 268: g. Polyandrar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 308; 1789. Phil. Bot. I. p. 159.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 356. n. 896: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 817. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1164. n. 1031; 1809. En. p. 566. — Cram. 1803. Disp. p. 137. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 583.
Juss. 1789. Gen. p. 292: g. Tiliacear. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 215. — Batsch 1802. Tab. p. 62. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 94. — Pers. 1807. Ench. II. p. 64. n. 1266. — D. Don 1825. Nepal. p. 227. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 547. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 238.
Gis. 1792. Prael. p. 453: g. Columniferar.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 76: sect. Grewiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7953. 1.
= Grewiae Juss. pars.

*) Consecrata memoriae Nehemiae Grew, Angli.

Grewia Juss. 1804. Ann. Mus. IV. p. 82: g. Tiliacear., injuncto Microco L. emendat. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 816; 1825. Syst. II. p. 579. n. 1901; 1830. Gen. I. p. 427. n. 2123. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 425. — Link 1822. En. II. p. 71; 1831. Hdb. II. p. 349. — DC. 1824. Pr. I. p. 508. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 75. Sect.: Grewia, Microcos. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 9. — Brongn. 1843. En. genr. p. 76.
  Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5446: g. Tiliear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 38 (28). — Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7953. (genuinar.) Sect. ut Wight & Arn.
  Rchb. 1837. Hdb. p. 303: g. Tiliariarum genuinar.
  Endl. 1840. Gen. n. 5376. p. 1009; 1841. Ench. p. 523: g. Grewiear. Sect.: Mallococca, Damine. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 330.
  Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.
    Synon. Balneda Skan.; Balmeda Nocc., Steud.?; Grewia et Microcos Linn.; Grevia Linn.; Graevia Neck; Dodecadia Lour.

Grewidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 372: trib. Tilear. Gen. Grewiear. Endl. et Belotia, Aristotelia.

Grewieae Endl. 1840. Gen. p. 1006; 1841. Ench. p. 522: trib. Tiliacear. verar. Gen.: Apeiba, Lühea, Mollia, Heliocarpus, Entelea, Sparmannia, Clappertonia, Corchorus, Triumfetta, Tilia, Brownlowia, Christiana, Grewia, Diplophractum, Columbia, Berrya; Muntingia; Trilix; Bancroftia?, Vantanea? Accedunt 1842 (Spl. II. p. 108) Belotia et 1843 (Spl. III. p. 93) Corchoropsis. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 583. Gen. ut Endl. 1842.

Grias*) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1075. 1371. n. 1145; 1762. Sp. ed. II. p. 732; 1764. Gen. ed. VI. p. 266. n. 659; 1767. Syst. ed. XII. p. 362: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 409; 1784. Syst. p. 492. — Reich. 1778. Gen. p. 270. n. 715. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 354. n. 892. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 215. — Gmel. 1791. Syst. p. 814. — Pers. 1797. Syst. p. 527. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1159. n. 1025.
  Adans. 1763. Fam. II. p. 447: g. Cistor.
  Gled. 1764. Syst. p. 111. n. 455: g. Thalamostemonum.
  Scop. 1777. Intr. p. 269: g. Polyandrar.
  Juss. 1789. Gen. p. 257: g. Guttiferar. — — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 148. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 28. — Pers. 1807. Ench. II. p. 68. n. 1280. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 437. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 571. n. 1890. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 233.

*) Nomen ex Apulejo.

Grias Linn. cont.
  Neck. 1790. El. II. p. 269. n. 1025: g. Catizophytor.
  Batsch 1802. Tab. p. 89: g. Guttaeferar.
  Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 782: g. Marcgraviear.
  Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 81: g. Myrtear.?
  DC. 1828. Pr. III. p. 296: g. Myrtacear. dubium. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 872. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 106. — Endl. 1840. Gen. n. 6335. p. 1235; 1841. Ench. p. 651.
  Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4503: g. Ganrear.?
  Spreng. 1830. Gen. I. p. 424. n. 2107: g. Myrteis aff.
  Meisn. 1838. Gen. p. 109 (77): g. Barringtoniear.?
  Rchb. 1841. Nom. p. 175. n. 6798: g. Lecythidear.?
  Lindl. 1847. Veg. kd. p. 755: g. Barringtoniacear.?

Grieleae „Sweet" Ecklon & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. austr. I. p. 59: trib. Geraniacear. Gen.: Grielum.

Grielum Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 578. n. 1235; 1767. Syst. ed. XII. p. 318: g. Decandr. Pentagyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 360; 1784. Syst. p. 431. — Reich. 1778. Gen. p. 236. n. 633. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 311. n. 793. — Gmel. 1791. Syst. p. 733. — Pers. 1797. Syst. p. 463; 1805. Ench. I. p. 513. n. 1143. — Willd. 1799. Sp. II. p. 771. n. 917.
  Scop. 1777. Intr. p. 254: g. Polycarpiar.
  Gärtn. 1788. Fr. I. p. 180. t. 36. f. 6 (laciniatum).
  Neck. 1790. El. II. p. 327. n. 1114: g. Acascophytor.
  Gis. 1792. Prael. p. 320: g. Gruinalium.
  St. Hil. 1805. Expos. II. p. 53: g. Geraniaceis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 338. n. 1331.
  Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 795: g. Geranior.
  Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 441: g. Geraniear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 432. n. 1728.
  DC. 1825. Pr. II. p. 549: g. Neuradear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 166. n. 4410; 1837. Hdb. p. 240; 1841. Nom. p. 166. n. 6463. — Meisn. 1837. Gen. p. 105 (74). — Endl. 1840. Gen. n. 6402. p. 1249; 1841. Ench. p. 660. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565.
  Spreng. 1830. Gen. I. p. 382. n. 1926: g. Rosacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1384. 1616. (?)
  G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 745; g. Geraniacear.
  Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. I. p. 59: g. Grielear.

Griesebachia Endl., Meisn., etc. vid. *Grisebachia Klotzsch.*

Grieselinia „Neck." Endl. Gen. p. 1302 in synon. Montouchiae: vid. *Griselinia Scop.*

Grietum Wittst. Etym. Handw. p. 402: sphalm. pro *Grielum.*

Griffinia*) „Ker" R. Brown 1820. Bot. Regist. n. 444. t. 511. 990 (Verm. bot. Schr. V. p. 316): nov. g. Amaryllidear. — Par. Herb. 1825. Bot. Mag. App. p. II; 1837. Amaryll. p. 77. 228. (Amaryllidiformium.) — Link 1829. Hdb. I. p. 197. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LI. 840. — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1603. — Brongn. 1843. En. genr. p. 21.

Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 9: g. Coronariar.

Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 182: g. Narcissear.

Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1243: g. Amaryllear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1275. p. 177; 1841. Ench. p. 103. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (297). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 405. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 156. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 7. 31.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 275. n. 1427: g. Spathacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II p. 1045. 1176.

Kunth 1850. Enum. V. p. 542: g. Crinear.

Griffithella Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 105; 1852. Arch. Mus. VI. p. 147: sect. Mniopsidis. (Podostemon ecostatus Griff.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 439. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 786.

Griffithia**) R. Brown 1817. Linn. Trans. XII. 2. p. 575 (Verm. bot. Schr. II. p. 728): nov. g. Muscor.
= Glyphomitrion Schwägr.

Griffithia Spreng. 1827. Syst. IV. p. 351. n. 3418; 1831. Gen. II. p. 752. n. 3818: g. Confervinar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 85.
= Griffitsia Agdh.

Griffithia Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 399: nov. g. Gardeniear. (Gardenia fragrans Kön.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 162 (115). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2959.

Endl. 1838. Gen. n. 3302. p. 561; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 517.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 207: g. Randiear.

Griffithsia Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 392: g. Aphlomidear., a Duby (1833. Mém. soc. Genev. VI. p. 17) ad Ceramium reductum.

Bonnem. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 141: g. Ceramiear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 63. p. 5; 1841. Ench. p. 4; 1843. Spl. III. p. 35. n. 122/$_{17}$. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 403; 1841. Brit. Alg. p. 101. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV.

*) Dicat. W. Griffin, introductori plantae.
**) Dicat. Will. G. Griffith, Singapore.

Griffithsia Gaill. cont.
p. 175; 1849 in Orb. Dict. X. p. 53. — J. Agdh. 1841. Linnaea XV. p. 39; 1842. Alg. medit. p. 74. — Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 700. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 358. (Flora 1843. p. 98.) — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 127. — Sond. 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 168. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 141. — Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 324.

Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 100; 1843. Phyc. gener. p. 373; 1849. Sp. Alg. p. 659. n. 433: g. Callithamniear. — Par. Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 227.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Ceramear.

Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Ceramiacear. — Par. Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 258.

Derb. & Sol. 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 276: g. Antherozoidear.
= Griffitsia Agdh.

Griffitsia*) Agardh 1817. Syn. Alg. p. XXVIII; 1821. Aphor. p. 98: nov. g. Confervoidear. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 443.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 328: g. Ceramidear.

Agdh. 1824. Syst. p. XXIX. 143; 1828. Spec. II. 1. p. 126: g. Ceramiear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 31.

Fries 1825. Pl. homon. p. 333: g. Floridear.

Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 486: g. Ceramiacear.

Synon. Griffithsia Auct.; Griffithia Spreng.; Plumaria Link; Polychroma Bonnem.

Grifola „Micheli" Gray 1821. Arr. Brit. pl. I. p. 597. 643: nov. g. Boletoidear. (Boletus frondosus, cristatus, lucidus, badius, varius Pers.)
= Boleti Fries pars.

Grimaldia Schrank „1804. Bot. Zeit. p. 187" 1808. Münchn. Denkschr. p. 103. t. 4. 5: nov. g. Pentandr. Monogyn.

Link 1831. Hdb. II. p. 140: g. Cassiacear.
= Euchamaecrista Vog.

Grimaldia**) Raddi 1818. Opusc. scient. Bol. II. p. 356; 1820. Mem. soc. Moden. XVIII. p. 17: nov. g. Hepaticar. (Marchantia triandra Scop.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 450. — Par. Lindenb. 1829. Syn. Hepat. p. 105; 1833. Flora I. p. 173.

Spreng. 1827. Syst. IV. p. 235. n. 3352; 1831. Gen. II. p. 739. n. 3745: g. Muscor. hepaticor.

Rchb. 1828. Consp. p. 30. n. 520: g. Hypophyllinor.

Corda 1829 in Opiz Beitr.; 1830 in Sturm Jungerm. p. 5: g. Jungermanniacear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 74. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 463. p. 44 (*Grimmaldia*); 1841. Spl. I. p. 1337; 1841. Ench. p. 27.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69; 1831. Syll. Jung. p. 7: g. Cephalothecear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Dysbryor.

*) Dicat. Griffiths, botanico anglico.
**) Dicat canonico Grimaldi, professori Lucenci.

Grimaldia Raddi cont.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 44: g. Lichenastror. sphaerocephalor. (Gr. dichotoma Raddi.)
Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 971. 980: g. Marchantiear. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 55. — Hampe 1837. Linnaea XI. p. 93. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 60; 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549. — Bayrh. 1849. Taun. p. 55.
Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXX. 221; 1845. Syn. Hepat. p. 549: g. Jecorariar.
Rchb. 1841. Nom. p. 24. n. 847: g. Grimaldiear. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 6.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 58: g. Marchantear.
Synon. Sindonisce et Pleurochiton Corda; Mannia Opiz.

Grimaldia Hübener 1834. Hepat. germ. p. 1: g. Marchantiacear.
= Grimaldia, Rebouillia et Duvalia Nees.

Grimaldieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 24: div. Marchantiacear. Gen.: Rebouillia, Grimaldia, Duvalia, Fimbraria. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 6. Gen. ead.

Grimmaldia Endl. vid. *Grimaldia Raddi.*

Grimmia*) Hedwig 1782. Fund. II. p. 89; 1801. Spec. Musc. p. 75: nov. g. Muscor. (frondosor.), ab Auctoribus vario sensu adoptatum. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 19. p. 451. — Par. Ehrh. 1787. Beitr. I. p. 168. 176. (emend.) — Schreb. 1791. Gen. II. p. 759. n. 1642. — Mönch 1794. Meth. p. 730. — Roth 1800. Germ. III. p. 138. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 290. — Rebent. 1804. Neom. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I p. 31. — DC. 1805. Franç. II. p. 457; 1815. V. p. 212. — Mart. 1817. Erlang. p. 113. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 726. — Agdh. 1822. Aphor. p. 107. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 153. n. 3305; 1831. Gen. II. p. 730. n. 3702. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 126. (odontostomor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 62.
Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 155; II. 1. p. 56; 1806. Suppl. II. p. 94; g. Aploperistomator. — Par. Röhl. 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 90.
Palis. 1805. Pr. Aethéog. p. 24; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 449 (sejuncto in tab. 4 Apocarpo): g. Ectopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 220.
Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 72: sect. Grimmiae.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 31: g. Peristomor. acrocarpor.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 759: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 169.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 160: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. II. p. XLIII g. Grimmioideor.) — Par. Nees & Hornsch. 1827. Bryol. germ. II. 1. p. 64.

*) Dicat. Dr. J. F. Car. Grimm, Gothano.

Grimmia Hedwig cont.
Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 240: g. Grimmoidear. Sect.: Pseudo-Grimmia, Grimmia (apocarpa etc.), Campylopus.
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 589: g. Grimmiaceor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Grimmiear. — Par. Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 42. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 43; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401. — C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 776. Sect.: Platystoma, Eugrimmia, Dryptodon, Rhacomitrium.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Grimmioidear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 81.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 158: g. Aploperistomor.
Endl. 1836. Gen. n. 490. p. 48; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 8.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 865: g. Calyptrobryor.
Bruch, Schimp. & Gümb. 1845. Bryol. eur. Fasc. 25—28: g. Grimmiacear. — Par. Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 116. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 159. (= *Dryptodon Brid.*) — Bayrh. 1849. Taun. p. 12.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 92: g. Racomitriear.
Wils. 1855 in Hook. N. Zeal. II. p. 75: g. Grimmiar.
Synon. Codriophorus Palis.; Codonophorus Desv.; Apocarpum Palis.; Apocarpium Desv.

Grimmia Willd. 1799 in Schrad. Journ. II. p. 511: g. Muscor. frondosor. ampliatum, includens Grimmiam, Weissiam, Leersiam et Pterigynandrum Hedw., Encalyptam Schreb. et Orthotrichum anomalum.

Grimmia Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 72: g. Muscor. ampliat. Sect.: Grimmia, Weissia, Pterigynandrum.

Grimmiacea Rchb. 1828. Consp. p. 33: sect. Splachnoideor. Gen.: Harrisonia, Grimmia, Hydropogon, Dryptodon, Racomitrium, Olomitrium, Orthotheca, Cinclidotus, Tetraphis.

Grimmiaceae Bruch, Schimp. & Gümb. 1845. Bryol. eur. Fasc. 25—28: fam. Muscor. Gen.: Schistidium, Grimmia, Racomitrium.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 151: sect. Stegocarpor. Gen. ead. et Hedwigia, Harrisonia, Anodon, Gümbelia.
Bayrh. 1849. Taun. p. 12: fam. Muscor. frondosor. Gen. Bruchiana et Hedwigia.

Grimmiae Wilson 1855 in Hook. f. Fl. N. Zeal. II. p. 74: trib. Bryacear. Gen.: Schistidium, Grimmia, Racomitrium.

Grimmieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: trib. Aplopogonor. Gen.: Grimmia, Trichostomum, Cinclidotus, Encalypta.
Hampe 1839. Linnaea XIII. p. 42: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Schistidium, Grimmia.

Grimmieae Dumort. cont.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 43: trib. Muscor. Gen.: Grimmia, Trichostomum.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: trib. Acrocarpor. Gen.: Grimmia, Racomitrium, Dryptodon, Schistidium.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 764: hemicyclus Orthotrichacear. Gen.: Coscinodon, Glyphomitrium, Brachysteleum, Gümbelia, Grimmia.

Grimmioideae Fürnrohr 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: fam. 5 Muscor. Gen.: Schistidium, Grimmia, Brachyodon, Thysanomitrium, Dryptodon, Racomitrium.

Grimmioidei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIII: fam. Vaginulator. acrocarpor. Gen.: Schistidium, Grimmia, Hydropogon, Dryptodon, Racomitrium, Olomitrium, Orthotheca. *Affinia:* Cinclidotus, Tetraphis, Cleistostoma.

Grimmoideae Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 239: trib. 8 Muscor. Gen.: Glyphomitrion, Grimmia, Trichostomum, Cinclidotus, Encalypta.

Grindelia*) Willd. 1807. Mag. nat. Ges. Berl. I. p. 259; 1809. Enum. p. 894. n. 931: nov. g. Syngenes. Superfl. (Aster spathularis Brouss.)
R. Brown 1816. Linn. Trans. XII. 1. p. 102 (Verm. bot. Schr. II. p. 539): g. Compositar. Injungitur Donia.
Cass. 1816. Dict. v. 3. spl. p. 64; 1821. v. 19. p. 461: g. Asterear. — Par. HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 309. — Kunth 1823. Syn. II. p. 407. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Less. 1832. Syn. p. 163. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 44.
Link 1822. En. II. p. 336: g. Corymbiferar.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 459; 1830. v. 60. p. 581: g. Grindeliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3319.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 575. n. 2793; 1831. Gen. II. p. 632. n. 3153: g. Radiatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2520: g. Grindeliacear.
Dunal 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 48.
DC. 1836. Pr. V. p. 314: g. Achyridear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2364. p. 383; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 187 (127). — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 314: g. Chrysocomear.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 246: g. Solidaginear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29.
Synon. Demetria Lag.; Donia R. Brown; Aurelia Cass.

Grindeliaceae Rchb. 1828. Consp. p. 107: sect. Solidaginear. Gen.: Xanthocoma, Grindelia, Donia.

*) Dicat. D. H. Grindel, professori Dorpat.

Grindelieae Cassini 1825. Dict. v. 37. p. 458; 1830. v. 60. p. 581: subdiv. Solidaginear. Gen.: Xanthocoma, Grindelia, Aurelia.
Rchb. 1841. Nom. p. 85: sect. Chrysocomear. Gen. Achyridear. DC.

Grinnellia*) Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 91: nov. g. Delesseriear. (Delesseria americana Ag.) *Cf.* Flora 1853. p. 673.

Grinula Fries, Rchb. vid. *Crinula Fries.*

Griphopus Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 319: sect. Hellebori. (H. foetidus, lividus.)
= Helleboraster Mönch.

Grischowia Karsten 1848. Auswahl t. 5: nov. g. Osbeckiear. (*Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 695; 1848. p. 66 et Karsten in Linnaea XXVIII. p. 435.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 298.
= Monochaetum DC.?

Grisebachia**) Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 225: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 245 (153: *Griesebachia*). — Spach 1840. Vég. phan. IV. p. 443 (*Griesebachia*). — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4893. (genuinar.)
Endl. 1839. Gen. n. 4304. p. 752 (*Griesebachia*); 1841. Ench. p. 369: g. Sympiezear.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 700: g. Salaxidear. ampliat. Sect.: Eugrisebachia, Finckea.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455: g. Ericidar.
Synon. Finckea Klotzsch.

Griselea Dietr. vid. *Grislea Linn.*

Griselinia***) Forst. 1776. Char. gen. p. 153. Ind. nr. 70: g. Polygam. Monoec. (pro *Scopolia Forst.* substitutum.) — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 1128. n. 1927.
Gmel. 1791. Syst. p. 493: g. Pentandr. Trigyn. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. LXI. 641. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 935. n. 1105; 1830. Gen. I. p. 233. n. 1226. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1009.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 368: g. Euphorbiear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 194: g. Euphorbiacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 212b. n. 5113b (minus cognitum.) — A. Cunn. 1840. Ann. nat. hist. IV. p. 261. (?)
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Crozophorear.
Endl. 1841. Gen. n. 6886. p. 1332; 1841. Ench. p. 685: inter genera dialypetala incertae sedis.
Meisn. 1841. Gen. p. 341 (254): g. Jatrophear.?
Raoul . . . . Choix pl. Nouv. Zéel. p. 22. t. 19. (cit. Endl.)
Endl. 1850. Spl. V. p. 16. n. $4562/_1$: g. Araliacear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 97: g. Cornear.
Synon. Scopolia Forst.; Pukateria Raoul.

*) Dicat. Henry Grinnell, New-York.
**) Dicat. A. H. R. Grisebach, prof. Gotting.
***) Dicat. Franc. Griselini, botanico Veneto.

Griselinia Scopoli 1777. Introd. p. 302. n. 1373: g. Leguminosar.

Neck. 1790. El. III. p. 49. n. 1368: g. Cyteophytor. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 19. p. 464.

= Moutouchia Aubl.

Grislea*) Linn. 1737. Gen. p. 342. n. 857; 1737. Cliff. p. 146; 1740. Syst. p. 22; 1753. Sp. I. p. 348; 1759. Syst. ed. X. p. 999. n. 427; 1762. Sp. ed. II. p. 496; 1764. Gen. ed. VI. p. 189. n. 474; 1767. Syst. ed. XII. p. 265. n. 468: g. Octandr. Monogyn. *(Löfl. It. p. 245.)* — Par. Murr. 1774. Syst. p. 297; 1784. Syst. p. 360. — Reich. 1778. Gen. p. 191. n. 510. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 252. n. 642. — Gmel. 1791. Syst. p. 612. — Roxb. 1795. Corom. I. p. 29. t. 31; 1832. Ind. II. p. 233. — Pers. 1797. Syst. p. 384; 1805. Ench. I. p. 412. n. 926. — Willd. 1799. Sp. II. p. 320. n. 736. — Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 30.

Adans. 1763. Fam. II. p. 234: g. Salicariar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 331. — Batsch 1802. Tab. p. 79. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 709; 1825. Syst. II. p. 216. n. 1441; 1830. Gen. I. p. 303. n. 1547. — Link 1821. En. I. p. 380. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 184. — Kunth 1824. Syn. III. p. 447. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227 *(Griselea)*. 1268.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Calycanthemar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 332.

Gled. 1764. Syst. p. 82. n. 340: g. Thalamostemonum, p. 323 ad Calycostemones octantheras translatum.

Scop. 1777. Intr. p. 211: g. Dumosar.

Neck. 1790. El. II. p. 116. n. 789: g. Plyrontophytor.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 177: g. Lythrariar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 267. n. 1076. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 468. — Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 454.

DC. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 73; 1828. Pr. III. p. 92: g. Salicariear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4574; 1841. Nom. p. 172. n. 6656. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 723. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 438. — Meisn. 1838. Gen. p. 117 *(84)*.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIV: g. Lythrear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 307. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 620.

Endl. 1840. Gen. n. 6156. p. 1202; 1841. Ench. p. 643: g. Eulythrariear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 689.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 118: g. Lythrariear.

Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 127: g. Lythrariacear.

Synon. Woodfordia Salisb.

Groby a*) Lindl. 1834. Bot. Regist. XX. (n. ser. VII.) t. 1740: nov. g. Orchidear. (G. Amherstiae.) *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 63, et Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 154.

Endl. 1837. Gen. n. 1428. p. 199; 1841. Ench. p. 111: g. Vandear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2034. — Meisn. 1842. Gen. p. 379 (284). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Grönlandia Gay 1854. Compt. rend. Ac. Par. XXXVIII. p. 703: nov. g. Potamear. primae sectionis.

Grona**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 459. Ed. Willd. p. 561: nov. g. Diadelph. Decandr. (G. repens.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 295. n. 1700.

Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 473: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 245. n. 2557 *(Grone)*; 1831. Gen. II. p. 583. n. 2865.

Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear.

DC. 1825. Pr. II. p. 239: g. Clitoriar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 219.

Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3966: g. Glycinear.

Bartl. 1830. Ord. p. 410: g. Clitoriear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154. — Meisn. 1837. Gen. p. 86 (62).

= Galactiae P. Browne pars.

Grone Spreng. vid. *praeced.*

Gronovia***) „Houst." Linn. 1737. Gen. p. 56. n. 159; 1737. Cliff. p. 74; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 202; 1759. Syst. ed. X. p. 941. n. 248; 1762. Sp. ed. II. p. 292; 1764. Gen. ed. VI. p. 111. n. 282; 1767. Syst. ed. XII. p. 184. n. 279: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 202; 1784. Syst. p. 243. — Reich. 1778. Gen. p. 114. n. 302. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 154. n. 391. — Gmel. 1791. Syst. p. 420. — Pers. 1797. Syst. p. 255; 1805. Ench. I. p. 257. n. 584. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1176. n. 448; 1809. En. p. 266.

Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 263. n. 1089: g. Calycostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Cucurbitacear. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 394. — Gis. 1792. Prael. p. 439. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 510. — Batsch 1802. Tab. p. 221. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 293. — Hedw. 1806. Gen. p. 170. n. 714. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 118. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XL. 491. n. 1015. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 474. — Link 1821. En. I. p. 223. — Kunth 1822. Syn. I. p. 425. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29. — Spreng. 1830. Gen.

*) Dicat. Gabr. Grisley, botanico anglico.

*) Dicat. Lord Grey of Groby.

**) γρώνη, caverna: ob carinam cavernosam.

***) Dicat. a Houstono doctissimo botanico Jo. Fr. Gronovio. (Linn. Cliff. p. 74.)

Gronovia Houst., Linn. cont.
I. p. 196. n. 992. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 857.
Adans. 1763. Fam. II. p. 498: g. Onagrar.
Scop. 1777. Intr. p. 108: g. Strictar.
Neck. 1790. El. II. p. 135. n. 817: g. Coryphophytor.
Mönch 1802. Meth. Spl. p. 270: g. Petalostemonis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 686; 1825. Syst. I. p. 810. n. 910: g. Meliear.?
Seringe 1825. Mém. Genèv. III. 1. p. 25: g. Cucurbitaceis aff. — DC. 1828. Pr. III. p. 320. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 43.
Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4231: g. Loasear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 125 (90)?
Rchb. 1837. Hdb. p. 232; 1841. Nom. p. 160. n. 6236: g. Gronoviear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 5152. p. 940; 1841. Ench. p. 493. — Brongn. 1843. En. genr. p. 117. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 19. 107. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 745.
Meisn. 1838. Gen. p. 126 (91): g. Cucurbitear.? — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 230.
Fenzl 1841. Regensb. Denkschr. III. p. 196.
Endl. 1842. Spl. II. p. 76. n. $5118/_2$; 1850. Spl. V. p. 50: g. Loaseis aff.

Gronovieae Rchb. 1837. Handb. p. 232; 1841. Nomencl. p. 160: subdiv. Loasear. Gen.: Gronovia.
Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 408: trib. Cucurbitacear.?
Endl. 1840. Gen. p. 940; 1841. Ench. p. 493: fam. Cucurbitaceis aff. Gen. id.
Brongn. 1843. En. genr. p. 117: fam. Cucurbitinear.? Gen. id.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 19. 107: subordo Cucurbitacear. Gen. id.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 745: trib. Loasacear. Gen.: Cevallia, Mackaya, Gronovia, Fissenia.

Grossales Lindl. 1833. Nix. pl. Ed. germ. p. 14: nixus Albuminosar. Ord.: Grossulaceae, Escallonieae, Bruniaceae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 749: nixus Exogenar. epigynar. Ord.: Grossulariaceae, Escalloniaceae, Philadelphaceae, Barringtoniaceae.

Grossopetalum Koch 1844 vid. *Crossopetalum.*

Grossostylis Pers. vid. *Crossostylis Forst.*

Grossulaceae Mirbel 1815. Élém. II. p. 897: fam. Dicotyledonum polypetalar. Gen.: Ribes.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (45) Calyciflorar. syncarpar.
Lindl. 1833. Nix. p. 14: ordo Grossalium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 26.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 544. Gen.: Ribes.

Grossularia Tourn. 1700. Inst. p. 639. t. 409: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 365. Ed. Hall. 1745. p. 53: g. pl. class. I.

Grossularia Tourn. cont.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 111.
Adans. 1763. Fam. II. p. 243: g. Portulacar.
Scop. 1772. Carn. I. p. 167: g. Pentandr. Monogyn.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 143. t. 28. f. 9 (Uva crispa).
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 120. *Cf. Ribes* nr. 291—293 Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 272.
Pers. 1805. Ench. I. p. 252: sect. Ribis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 168. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. 501. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 550. — Berland. 1826. Mém. soc. Genèv. III. 2. p. 56; 1828 in DC. Pr. III. p. 478. — Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4247 *b;* 1832. Fl. exc. p. 561; 1841. Nom. p. 160. n. 6248. 1. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 177. — Koch 1836. Syn. p. 265. Ed. II. p. 292. — Endl. 1839. Gen. n. 4682 *a.* p. 824; 1841. Ench. p. 413. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 545. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 194. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 634.
A. Rich. 1823. Bot. med. II. p. 487: g. Ribesiar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L: g. Ribesiear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 42: g. Grossulariacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 233: g. Grossulariear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 172. (restrict.) Sect.: Distylium, Cynosbatium.

Grossulariaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. 42: fam. Cactariear. Gen.: Ribes, Grossularia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 750: ordo Grossalium. Gen.: Ribes, Polyosma.

Grossulariae DC. 1805. Fl. franç. IV. p. 405: fam. (67) Dicotyledonum. Gen.: Ribes.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246 (*Groseillers*): ordo Calyciflorar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 548: fam. Calyciflorar. Gen.: Ribes.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: fam. Caliculiae.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 59: ordo plant. Gen.: Ribes.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: ordo Hypodicarpar.

Grossularieae Berland. 1826. Mém. soc. Genèv. III. 2. p. 43: fam. plant. Gen.: Ribes.
DC. 1828. Pr. III. p. 477: ordo (90) Calyciflorar. Gen. id. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 177. Gen. id. — Koch 1836. Syn. p. 264. Ed. II. p. 292. Gen. id.
Rchb. 1828. Consp. p. 161: div. Ribesiacear. Gen. id.
Bartl. 1830. Ord. p. 275: ordo (156) Peponiferar. Gen. id. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 128 (92). Gen. id.
Link 1831. Hdb. II. p. 6: ordo 6 Perigynar. Gen. id.

Grossularieae Berland. cont
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 16. Gen. §. 1: Chrysobotrya. §. 2: Calobotrya, Coreosma, Rebis.
Rchb. 1837. Hdb. p. 233: div. Cactear. Gen.: Grossularia, Robsonia, Rebis, Ribes, Botrycarpum, Calobotrya, Chrysobotrya.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 144: fam. (91) Peponiferar. Gen.: Chrysobotrya, Cerophyllum, Coreosma, Botryocarpium, Ribes, Rebis, Grossularia, Robsonia.
Grosulariae D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 208: ordo plant. Gen.: Ribes.
Groutia Guillem. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 100: nov. g. Olacinear. (Flora Lit. II. p. 54.) *Cf.* Arnott 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 236.
= Opilia Roxb.
Grubbia*) Berg. 1767. Act. Ac. Holm. t. 2.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 260. n. 663: g. Octandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 629. — Willd. 1799. Sp. II. p. 914. n. 772. — Pers. 1805. Ench. I. p. 434. n. 965.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 363: g. Ericis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 278. n. 1118: g. Ericar.
Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 516: g. Ericinear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 245. n. 1491; 1830. Gen. I. p. 318. n. 1623: g. Thymelaear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1306.
Rchb. 1828. Consp. p. 79. n. 1700 c; 1841. Nom. p. 62. n. 2341: g. Ophirear.
Bartl. 1830. Ord. p. 113: g. Santalacear. — Par. Klotzsch 1839. Linnaea XIII. p. 379. Sejungitur Strobilocarpus.
Endl. 1838. Gen. p. 327. n. 2085: g. Grubbiacear. (injuncta Ophira L.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1378; 1841. Ench. p. 403. n. $4606/_2$ (exclusa Ophira). — Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239). — A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 618. Sect.: Ophira, Strobilocarpus.
Dcne 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XII. p. 157: g. Bruniacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 785.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 460: g. Grubbiear.
Synon. Ophira Burm.; Grubia Scop.?
Grubbiaceae Endl. 1838. Gen. p. 327: fam. Santalaceis aff. Gen.: Grubbia.
Endl. 1841. Ench. p. 403: fam. Bruniaceis aff. Gen.: Ophira, Grubbia.
Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239): ordo Daphnoidear. Gen. ut Endl. 1841.
A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 617: ordo (169) Monochlamydear. Gen. unicum: Grubbia.
Grubbieae Spach 1841. Hist. vég. phan. X. p. 460: trib. Santalacear. Gen.: Grubbia.
Grubia Scopoli 1777. Introd. p. 236: g. Nomadear.
= Grubbia Berg.?

*) Dicat. Mich. Grubb, soc. ind. praefecto.

Gruhlmania Necker 1790. Elem. bot. I. p. 202. n. 338: g. Phyllastrophytor., a Spermacoce L. disjunctum.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85 (*Grulhmannia*): g. Astrophyllae.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 1997 *a* (*Gruhlmannia*): sect. Spermacoces.
Borreria Meyer.
Gruhlmannia Rchb. vid. *praeced.*
*Gruinales**) Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 14 plantar. Gen.: Linum, Aldrovanda, Drosera, Oxalis, Geranium, Guajacum, Quassia, Zygophyllum, Tribulus, Fagonia, Averrhoa. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 320. Gen. ead. et Roridula, Sauvagesia, Dionaea, Grielum, Monsonia, Sparrmannia?
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 483. Gen.: Oxalis, Geranium.
Batsch 1802. Tab. p. 16: fam. Columnariarum. Gen.: Monsonia, Geranium, Erodium, Pelargonium.
Bartl. 1830. Ord. p. 347: class. (55) Gymnoblastor. Ord.: Geraniaceae, Lineae, Oxalideae.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 231: class. VI. Dicotyledoneor. Fam. ut Bartl.
Endl. 1840. Gen. p. 1166; 1841. Ench. p. 619: class. Acramphibryor. Dialypetalor. Ord.: Geraniaceae (Rhynchotheceae, Ledocarpeae, Vivianieae), Lineae, Oxalideae, Balsamineae, Tropaeoleae, Limnantheae.
Meisn. 1843. Gen. p. 439: class. XI. Diplochlamydear. (antea Geranioideae.) Ord.: Geraniaceae, Lineae, Oxalideae, Ledocarpeae, Vivianiaceae, Balsamineae, Tropaeoleae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 96: ordo Choristopetalar. Fam. ut Bartl. et Tropaeoleae, Balsamineae.
Gruinalis Rupp. 1718. Fl. jen. p. 116. Ed. Hall. 1745. p. 129: g. pl. class. V.
= Geranium L'Herit.
Gruinum Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 119: sect. Erodii. (E. gruinum, laciniatum, etc.)
Grulhmannia Rafin. vid. *Gruhlmania Neck.*
Grumaria Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 5: sect. Erinei. — Par. Kunze 1823. Mykol. Heft. II. p. 133. 137. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 560; 1831. Gen. II. p. 783. n. 4058 *b.* — Endl. 1836. Gen. p. 21; 1841. Ench. p. 15. — Math. 1853. Belg. II. p. 449.
Synon. Rubigo Link.
Grumelia Wight vid. *seq.*
Grumilea**) Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 138. t. 28. f. 2: nov. g. Stellatar.? (G. nigra.) *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 527.

*) „Erit mihi magnus Apollo, qui hujus ordinis dicat characterem". (Gis. Prael. p. 325.)
**) grumulus, dimin. vocis grumus.(?)

Grumilea Gärtn. cont.
Theis 1810. Gloss. de botan. (*Grumilia*).
Poir. 1811. Suppl. II. p. 857 (*Grunilea*).
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. xx. 269. n. 932: g. Pentandr. Monogyn.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 406: g. Rubiacear.? dubium.
DC. 1830. Pr. IV. p. 495: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 577. — Endl. 1838. Gen. n. 3156. p. 534; 1841. Ench. p. 272.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 432: g. Coffeacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 376. — Wight 1845. Ic. pl. Ind. III. 3. p. 16 (*Grumelia*). t. 1036. 1037. (An Psychotriae injungendum?)
Meisn. 1838. Gen. p. 168 (118): g. Psychotriacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2806: g. Psychotriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 295: g. Chasaliear. Sect.: genuinae, Psychotriopsis.

Grumilia Theis vid. *praeced.*

Grunilea Poir. vid. *praeced.*

Gruvelia*) A. DC. 1846. Prodr. X. p. 119: nov. g. Cynoglossear. (Cynoglossum pauciflorum Bert.)

Grymania Presl 1850. Epimel. bot. p. 553 (193): nov. g. Chrysobalanacear. (Hirtella polyandra Kunth.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 853: g. Chrysobalanear.
= Couepia Aubl. (restrict.)

Gryphonemata Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 47: subdiv. Dermatonematum. Gen.: Zygnema, Hydrodictyon.

Grypoctenium Wallroth 1842. Beitr. z. Bot. I. p. 32. 36: sect. Agrimoniae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 38 (*Gryptoctenium*).
= Agrimonia Tourn.

Gryptoctenium Walp. vid. *praeced.*

Guaco . . . .? *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 623.

Guadarella Caesalp. 1583. De plant. lib. 9. (Linn. 1747. Class. pl. p. 20.)
= Resedae Linn. pars.

Guadua**) Kunth 1822. Syn. pl. aequin. I. p. 253: nov. g. Bambusacear. (Bambusa Guadua.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 55. n. 1053. — Bartl. 1830. Ord. p. 32. — Steud. 1854. Glum. I. p. 333.
HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 153: g. Graminear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 245. n. 1279. (Hexandr. Monogyn.)
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 532; 1834. Linnaea IX. p. 469: sect. Bambusae. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. 1347.
Kunth 1830. Gram. p. 141; 1833. Agrost. p. 433: g. Festucacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 139. 386.

*) Dicat. Dr. Gruvel, translatori operis Molinaiani.
**) Nomen vernaculum.

Guadua Kunth cont.
Rupr. 1839. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. p. 128: g. Bambusar. (verar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1424.
Endl. 1841. Spl. I. n. 907/1. p. 1354; 1841. Ench. p. 59: g. Bambusear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 426 (326). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 233.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bambusidar.

Guagnebina Flor. Flum. I. t. 115: g. Tetrandr. Monogyn. (Rubiacear.?) ex Steud. Nom. I. p. 708.
= Manettia Mutis.

Guaiacana Tourn. 1700. Inst. p. 600. t. 371: g. pl. class. XX.
Hall. 1745 in Rupp. fl. jen. p. 52: g. pl class. I.
= Ebenus Comm.

Guaiaceae Rchb. 1828. Consp. p. 200 (1832. Fl. exc. p. 768); 1837. Handb. p. 285: subdiv. Zygophyllear. Gen.: Fagonia, Seezenia, Röpera, Zygophyllum, Larrea, Porliera, Guaiacum. — Par Rchb. 1841. Nom. p. 198. Gen. ead. et Trichanthera, Chitonia, Juliana, Plectrocarpa.

Guaiacon Adans. vid. *seq.*

Guaiacum*) Plumier 1703. Gen. p. 39. t. 17.
Linn. 1737. Gen. p. 140. n. 394; 1737. Cliff. p. 187: g. Icosandr. Monogyn.
Linn. 1740. Syst. p. 23; 1742. Gen. ed. II. p. 180. n. 410; 1753. Sp. I. p. 381; 1759. Syst. ed. X. p. 1018. n. 465; 1762. Sp. ed. II. p. 546; 1764. Gen. ed. VI. p. 208. n. 518; 1767. Syst. ed. XII. p. 291. n. 513: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 329; 1784. Syst. p. 396. — Reich. 1778. Gen. p. 212. n. 561. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 287. n. 727. — Gmel. 1791. Syst. p. 673. — Pers. 1797. Syst. p. 424. — Willd. 1799. Sp. II. p. 538. n. 819; 1809. En. p. 445.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 271. n. 1115: g. Calycostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rutar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 507 (*Guaiacon*): g. Zizyphor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Gruinalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 320.
Scop. 1777. Intr. p. 212 (*Quajacum*): g. Dumosar.
Medic. 1786. Theod. spec. p. 26: g. Antho-Mallonandriae.
Juss. 1789. Gen. p. 296: g. Rutacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 226. — Batsch 1802. Tab. p. 55. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 104. — Pers. 1805. Ench. I. p. 462. n. 1035. — Hedw. 1806. Gen. p. 306. n. 1213. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 674; 1825. Syst. II. p. 322. n. 1585; 1830. Gen. I. p. 349. n. 1765. — Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 196 (*Gayac*). — Link 1821. En. I. p. 399. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1421.

*) Nomen americanum.

Guaiacum Plumier cont.
Neck. 1790. El. III. p. 375. n. 1812: g. Plyrontophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 148. t. 113.
DC. 1824. Pr. I. p. 706: g. Zygophyllear. (verar.) — Par. A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 456. — Bartl. 1830. Ord. p. 392. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 772. (verar.) — Link 1831. Hdb. II. p. 229. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 309. (genuinar.) — Meisn. 1837. Gen. p. 59 (43). — Endl. 1840. Gen. n. 6041. p. 1164; 1841. Ench. p. 616. (verar.) — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 318. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 83 (*Gayacum*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479. — B. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 35 (*Gayac*).
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5200; 1841. Nom. p. 198. n. 7558: g. Guaiacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Fagoniear.
Lindl. 1839. Bot. Regist. n. ser. XII. t. 9: g. Zygophyllacear.
Synon. Guajacum Auct.

Guaiava Tourn. 1700. Inst. p. 660. t. 443 in App.
Adans. 1763. Fam. II. p. 88: g. Myrtor.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 185. t. 38. f. 3 (pyriformis).
= Psidium Linn.

Guajacanae Juss. 1789. Gen. p. 155: ordo 1 class. IX. Gen. §. 1: Diospyros, Royena, Pouteria, Styrax, Halesia (= *Ebenaceae Vent.*) §. 2: Alstonia, Symplocos, Ciponima, Paralea, Hopea.

Guajacum Auct. vid. *Guaiacum Plum.*

Guajavos Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 112.
= Psidium Linn.

Gualteria Scopoli 1777. Introd. p. 194: g. Speciosar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: g. Ericacear.
= Gaultheria Linn.

Gualtheria Elliott 1817. Sketch Bot. South-Carol. I. p. 501: g. Decandr. Monogyn.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 282: g. Ericear. — Par. Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 126.
Gaultheria Linn.

Gualthiera Gmel. 1791. Syst. p. 697: g. Decandr. Monogyn.
Mönch 1794. Meth. p. 458: g. Petalostemonis.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 558. Ed. Nees p. 414: g. Ericear.
= Gaultheria Linn.

Gualtieria Hill 1769. Hort. kew. p. 146: g. Monopetalar.
= Gaultheria Linn.

Guanabani „Mart." Walp. 1842. Repert. I. p. 86: sect. Anonae. — Par. Endl. 1843. Spl. III. n. 4723*a*. p. 85 (*Guassabani*); 1850. Spl. V. p. 27.

Guanabanus*) Plumier 1703. Gen. p. 42. t. 10. *Cf.* Juss. 1821. Dict. 20. p. 8.
= Anona Linn.

*) *Nomen americanum.*

Guandiola Steud. Nomencl. I. p. 34: sphalm. pro *Guardiola Humb. & Bonpl.*

Guania Tulasne vid. *Gouania Jacq.*

Guapea „Gomez" Endl. Ench. p. 361 in synon. Labatiae: vid. *Guapeba Gomes.*

Guapeba*) Gomes 1812. Mem. Ac. Lisboa III. Mem. dos corresp. p. 19. t. 2: nov. g. Tetrandr. Monogyn., Walleniae et Labatiae aff. (G. laurifolia.)
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 166: sect. Lucumae.

Guapina „Aubl." Steud. Nomencl. I. p. 708: sphalm. pro *Guapira.*

Guapira Aublet 1775. Guian. I. p. 308. t. 119: nov. g. Hexandr. Monogyn. (G. guianensis.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 574.
Scop. 1777. Intr. p. 201: g. Speciosar.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 10: g. Viticum („*des gattiliers*").
Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. 8. 23: g. Verbenacear.
= Avicennia Linn.?

Guapurium*) Juss. 1789. Gen. p. 324: nov. g. Myrtor. (G. peruvianum.)
Gmel. 1791. Syst. p. 793 (*Guapurum*): g. Polyandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 161: g. Myrtear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 11. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 479. n. 1821.
= Eugenia Mich.

Guapurum Gmel. vid. *praeced.*

Guarania „Weddell mss." Baill. 1858. Ét. Euphorb. p. 598: nov. Wielandiidear. (Amanoa purpurascens Pöpp.)

Guararibea Cavan. Diss. II. App. II: vid. *Quararibea Aubl.*

Guardiola*) „Cervantes" Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 143. t. 41: nov. g. Corymbiferar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 568; 1826. Syst. III. p. 621. n. 2863; 1831. Gen. II. p. 642. n. 3221: g. Radiatar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 247: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 488. — Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 12; 1825 v. 38. p. 17: g. Coreopsidear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2611. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 319; 1830. v. 60. p. 575: g. Silphiear. (?) — Par. Less. 1832. Syn. p. 1419. — DC. 1836. Pr. V. p. 511. — Endl. 1838. Gen. n. 2472. p. 401; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 197 (129). — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3020. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 110. Char. reform.
Synon. Guandiola Steud.; Tulocarpus Hook. & Arn.

*) Nomen brasiliense.
*) *Guapuru* Peruanorum.
*) Dicat. Marquis de Guardiola.

Guarea*) „Allem." Linn. 1771. Mant. II. p. 150. n. 1305: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 298; 1784. Syst. p. 360. — Reich. 1778. Gen. p. 193. n. 515 (*Gaurea*). — Schreb. 1789. Gen. I. p. 254. n. 649. — Gmel. 1791. Syst. p. 614. — Pers. 1797. Syst. p. 385; 1805. Ench. I. p. 416. n. 945. — Willd. 1799. II. p. 332. n. 753. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 240.

Scop. 1777. Intr. p. 287: g. Columniferar.

Juss. 1789. Gen. p. 265: g. Meliar.

Cavan. 1789. Diss. VII. p. 366. t. 210.

Neck. 1790. El. II. p. 435. n. 1265: g. Comizophytor.

Gis. 1792. Prael. p. 357: g. Trihilatar.

Batsch 1802. Tab. p. 53: g. Hesperidear.

Cram. 1803. Disp. p. 157 in Monadelph. Octandr.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 44: g. Meliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 274. n. 1103 (*Gouarea*). — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 217. — Poir. 1821. Dict. v. 19. p. 239. — Juss. 1823. Dict. v. 29. p. 519 (*Quarea*). — Kunth 1825. Syn. III. p. 217. — A. Juss. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 81. — Bartl. 1830. Ord. p. 356. — Wight 1839. Ic. pl. Ind. I. 8. t. 146. (*Guaria* in explic. tabular.) — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 302. — Brongn. 1843. En. genr. p. 86.

Spreng. 1818. Anl. II. p. 684; 1826. Syst. III. p. 64. n. 2378; 1831. Gen. II. p. 540. n. 2647: g. Meliear.

DC. 1824. Pr. I. p. 623: g. Trichiliear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1828. Consp. p. 212. n. 5514; 1841. Nom. p. 212. n. 8079. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48 (*Guaria*). — A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 239. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 683. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 199. — Meisn. 1837. Gen. p. 49 (35). — Endl. 1840. Gen. n. 5543. p. 1052; 1841. Ench. p. 551. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464.

Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Guareear.

Römer 1846. Fam. nat. I. p. 87. 117: g. Xylocarpear.

Synon. Elutheria P. Browne?; Plumea Lunan?

Guareeae Rchb. 1837. Handb. p 313: subsect. Trichiliear. genuinar. Gen.: Guarea, Sandoricum, Didymocheton, Cabralea, Epicharis, Hartighsea, Disoxylon, Chisocheton.

Guaria Dumort., Wight vid. *Guarea All.*

Guariruma Cassini 1824. Dict. v. 33. p. 463; 1830. v. 60. p. 584: nov. g. Mutisiear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2268. — Bartl. 1830. Ord. p. 137. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 35.

Less. 1830. Linnaea V. p. 270: sect. Mutisiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2917 c. p. 484; 1841. Ench. p. 248. — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3436. 3.

Guariruma Cassini cont.

Less. 1832. Syn. p. 104: subg. Mutisiae, a DC. (Pr. VII. p. 6. 7) in sectiones 2 et 3 distributum.

Guassabani „Plum." Endl. vid. *Guanabani Mart.*

Guatteria*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 85. t. 17: nov. g. Polyandr. Polygyn.

Pers. 1807. Ench. II. p. 94. n. 1350: g. Annonar.

Dunal 1817. Anon. p. 50. 123: g. Anonacear. — Par. DC. 1818. Syst. I. p. 502; 1824. Pr. I. p. 93. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 64. — Kunth 1824. Syn. III. p. 129. — St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 36. — Blume 1829. Fl. jav. Anon. p. 92. — Dumort. 1829. Anal. fam p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 247. — A. DC. 1832. Mém. Genèv. V. p. 216. (*Cf.* Flora Lit. III. p. 118.) — Schltd. 1834. Linnaea IX. p. 320. — Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 505. — Mart. 1841. Fl. Bras. fasc. II. p. 25.

Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 15: g. Anonear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 634. n. 2021; 1830. Gen. I. p. 456. n. 2248. — Endl. 1839. Gen. n. 4721. p. 833; 1841. Ench. p. 423. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 295. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 422.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI; 1828. Consp. p. 193. n. 5001: g. Unonear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 98.

Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 193. n. 7306: g. Guatteriear. — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 138. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 69. — Zoll. 1858. Linnaea XX1X. p. 321.

Synon. Cananga Aubl.; Aberemoa Aubl.

Guatterieae Rchb. 1837. Handb. p. 278; 1841. Nomencl. p. 193: sect. Annonear. Gen.: Anaxagorea, Artabotrys, Duguetia, Polyalthia, Guatteria.

Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 91. 126; trib. Anonacear. Gen.: Cyathocalyx, Artabotrys, Cananga, Unona, Polyalthia, Guatteria, Anaxagorea, Oxymitra, Phaeanthus. — Par. Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 302. 318. Gen. ead. (excepto primo) et Anomianthus, Saccopetalum.

Guazamaea Cassel vid. *seq.*

Guazuma**) Plumier 1703. Gen. p. 36. t. 18.

Adans. 1763. Fam. II. p. 382: g. Tiliar.

Juss. 1789. Gen. p. 276: g. Malvacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 196. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 69. — Pers. 1807. Ench. II. p. 238. n. 1611. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 19.

Cassel 1810. Nat. Fam. p. 149 (*Guazamaea*): g. Malvar.

---

*) *Guara* nomen arboris apud Cubenses.

*) Dicat. Joh. Bapt. Guatteri, prof. Parm.

*) Nomen americanum ex Oviedo.

Guazuma Plumier cont.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 320: g. Büttneriacear. (verar.) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 268.
DC. 1824. Pr. I. p. 485: g. Byttneriear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 522. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 486.
St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 547: g. Buttneriear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Brongn. 1843. En. genr. p. 79.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV: g. Byttneriacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5296; 1837. Hdb. p. 292; 1841. Nom. p. 202. n. 7716: g. Theobromear.
Bartl. 1830. Ord. p. 342: g. Büttneriear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 32 (26). — Endl. 1840. Gen. n. 5334. p. 999; 1841. Ench. p. 519.
A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 186: g. Büttneriar.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 72. t. 283.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: g. Byttnerear.
Synon. Bubroma Schreb.

Guazumoides DC. 1824. Prodr. I. p. 505: sect. Corchori. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5445 *e*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 544. — Endl. 1840. Gen. n. 5371 *c*. p. 1008; 1841. Ench. p. 522.
Synon. Psammocorchorus Rchb.

Güldenstädtia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 204. n. 928: nov. g. Sysellophytor., ab Axyride L. sejunctum.
= Eurotia Adans.

Güldenstädtia*) Fischer 1823. Mém. soc. Mosc. VI. p. 170: nov. g. Leguminosar. (Astragalus pauciflorus Willd.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 279. n. 2581; 1831. Gen. II. p. 590. n. 2905. — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 260.
DC. 1825. Pr. II. p. 307: g. Astragalear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3879; 1841. Nom. p. 148. n. 5758. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40 (*Guldenstädtia*). — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 273. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155. — Meisn. 1837. Gen. p. 90 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6570. p. 1277; 1841. Ench. p. 669. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554 (*Guldenstädtia*). — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 270 (*Guldaenstedtia*).
Ledeb. 1842. Ross. I. p. 564: g. Galegear.

Gümbelia*) Hampe 1846. Bot. Zeit. p. 124: nov. g. Muscor. (Grimmia elliptica Fl.)
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 167: g. Grimmiacear.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 770: g. Grimmiear. Sect. (ibid. II. p. 649): Platystomium, Eugümbelia, Cinclidotus, Scouleria.

*) Dicat. peregrinatori insigni A. J. Güldenstädt.
*) Dicat. Gumbel, Bryologo.

Günthera „Andrz." Spreng. 1825. Syst. II. p. 911: sect. Brassicae. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1185 (*Güntheria*).
Rchb. 1832 Fl. exc. p. 694; 1841. Nom. p. 183. n. 7042. 2 (*Güntheria*): sect. Erucastri.
= Micropodium DC.

Günthera Regel 1858 ...... nov. g. a Gutierrezia disjunctum.

Güntheria*) Trevir. 1820 in Link Jahrb. Gew. I. 3. p. 3: nov. g. Hepaticar. (G. graveolens.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 35. — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 104.
Corsinia Raddi. (Trevir. l. c. p. 157.)

Güntheria Spreng. 1826. Syst. III. p. 356. 449. n. 2699; 1831. Gen. II. p. 614. n. 3039: nov. g. Eupatorinar. *Cf.* Meisn. Comm. p. 145. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2243. — Bartl. 1830. Ord. p. 136.
Cercostylos Less.?

Güntheria „Andrz. mss." Rchb. vid. *Günthera Andrz.*

Guepinia Bastard 1812. Suppl. fl. Maine et Loire p. 35.
DC. 1815. Franç. V. p. 596: g. Cruciferar.
= Teesdalia R. Brown.

Guepinia**) Fries 1825. Pl. homon. p. 92: nov. g. Pileolarium. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 292. — Endl. 1836. Gen. n. 408. p. 35; 1841. Ench. p. 20.
Fries 1828. Elench. II. p. 30: g. Tremellinor. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 768. n. 3931. — Bail 1858. Syst. p. 18. t. 27.
Fries 1838. Epicr. p. 566; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 331; 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 115: g. Auricularinor. — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 370. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 42; 1842. Mycol. p. 176 (*cf.* p. 193: *Quepinia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 456: g. Hydneor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 314: g. Helotieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 187: g. Tremelleor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 153: g. Hymeniophoror.
Synon. Gyrocephalus Pers.

Guepinia Schwein. 1825. Amer. p. 184.
= Collyria Fries.

Guesmelia „Gaudich." Auct.: vid. *Quesnelia Gaudich.*

Guettarda***) „Osb." Linn. 1753. Sp. II. p. 991; 1759. Syst. ed. X. p. 1270. n. 943; 1763. Sp. ed. II. p. 1408; 1764. Gen. ed. VI. p. 492. n. 1064; 1767. Syst. ed. XII. p. 628: g. Monoec. Heptandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 715. — Reich. 1778. Gen. p. 489. n. 1161. — Pers. 1797. Syst. p. 899.

*) Dicat. Joh. Christ. Günther, Wratislaw.
**) Dicat. J. P. Guepin, prof. Angers.
***) Dicat. Jean Et. Guettard, medico Paris.

Guettarda Osb. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 147: g. Aparinium.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 474.
Gled. 1764. Syst. p. 225. n. 933: g. Petalostemonum.
Aubl. 1775. Guian. I. p. 317. t. 123: g. Hexandr. Monogyn. (G. coccinea et speciosa.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 566. — Cram. 1803. Disp. p. 74 (praeterea p. 37 in Tetrandr. Monogyn. et p. 181 in Monoec. Pentandr.)
Scop. 1777. Intr. p. 141: g. Opulinar.
Murr. 1784. Syst. p. 855: g. Monoec. Hexandr. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 641. n. 1437. — Cram. 1803. Disp. p. 182. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 398. n. 1679. — Blanco 1837. Filipin. p. 722.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 179. t. 36. f. 5 (speciosa).
Juss. 1789. Gen. p. 207; 1820. Mém. Mus. VI. p. 398: g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 587. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 447. — Pers. 1805. Ench. I. p. 200. n. 447. — Hedw. 1806. Gen. p. 116. n. 512. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXIX. 440. n. 765. Sect.: genuinae, Laugieriae. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 62. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 738. n. 791; 1830. Gen. I. p. 173. n. 874. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 992. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 787.
Batsch 1802. Tab. p. 235: g. Guettardear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 612. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 419. — Kunth 1824. Syn. III. p. 67. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2107; 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 76. n. 2842. Sect. (1841): Guettarda, Guettardaria, Ulolobus, Laugeria. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 181. — Bartl. 1830. Ord. p. 212. — DC. 1830. Pr. IV. p. 455. Sect.: Cadamba, Guettardaria, Ulolobus, Laugeria. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 550. Sect. eaed. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 421. — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (117). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 261.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84: g. Pyrenidiae.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 201: g. Guettardacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3192. p. 540; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear. Sect. ut DC. (Ullobus pro Ulolobus.) — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 34.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 27. t. 232.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Guettardidar.

Guettardaceae DC. 1807. Ann. Mus. IX. p. 217; 1830. Prodr. IV. p. 446: trib. Rubiacear. Subtrib. (1830): Morindeae, Guettardeae. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 200. Gen.: Guettarda, Malanea, Crusea, Scolosanthus, Saldinia, Nonatelia, Retiniphyllum, Gynochtodes, Coelospermum, Ancylanthus, Lasianthus, Cuviera, Morinda, Myonima, Lithosanthes, Erithalis, Psathura, Bobaea, Pyrostria, Vangueria, Strumpfia. Gen. dubia: Nertera, Mitchella, Leptodermis. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 544. Subtrib. ut DC. — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (117). Subtrib. eaed.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375. 425: sect. Rubiacear. Gen. Guettardear. DC. et Morinda, Baumannia, Eupyrena, Santia, Hylacium, Phallaria, Epithinia.

Guettardaria DC. 1830. Prodr. IV. p. 455: sect. Guettardae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 550. — Endl. 1838. Gen. n. 3192 *b*. p. 540; 1841. Ench. p. 272. — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2842. 2.
Synon. Matthiola Plum.; Mathiola Scop.; Halesia P. Browne; Hallesia Scop.; Edechi Löfl.; Dicrobotryum Willd.; Laugeria Jacq.; Laugieria Linn.; Sardinia Fl. Flum.

Guettardeae Batsch 1802. Tab. affin. p. 235: fam. Rigidar. Gen.: Oribasia, Laugeria, Erythalis, Psathura, Myonima, Pyrostria, Vangueria, Matthiola, Guettarda, Iserta; Hamelia, Patima, Schwenkfeldia.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 612: ordo Rubiacear. Gen.: Guettarda, Isertia, Nonatelia, Laugeria, Penaea, Genipa, Cuviera, Vangueria, Psathyra, Erithalis, Pyrostria, Schwenkfeldia, Hamelia, Gonzalea.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 419: sect. Rubiacear. Gen.: Guettarda, Retiniphyllum, Nonatelia. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 67. Gen. ead. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. Gen.: Nonatelia, Ancylanthus, Bobea, Erithalis, Psathura, Cuviera, Vangueria, Pyrostria, Myonima, Laugeria, Guettarda. — Cham. & Schltd 1829. Linnaea IV. p. 181. Gen.: Guettarda, Chomelia, Burneya. — Bartl. 1830. Ord. p. 211. Gen.: Guettarda, Chomelia, Myonima, Malanea, Antirrhea, Scolosanthus, Pyrostria, Psathura, Erithalis, Burneya; Cuviera, Stigmatanthus, Bobea, Ancylanthus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: trib. Rubiacear. Gen.: Guettarda, Isartia, Ancylanthus. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 49: Gen.: Erithalis, Hamiltonia, Guettarda, Vangueria, Mitchella, Morinda.
DC. 1830. Pr. IV. p. 450: subtrib. Guettardacear. Gen.: Myrmecodia, Hydnophytum, Hypobathrum, Nertera, Mitchella, Mephitidia, Vangueria, Guettarda, Malanea, Antirhoea, Stenostomum, Chione, Timonius, Hamiltonia, Leptodermis, Psathura, Myonima, Pyrostria, Octavia, Litosanthes, Erithalis, Retiniphyllum, Nonatelia, Gynochtodes, Coelospermum, Ancylanthus, Cuviera, Dondisia, Stigmanthus, Strumpfia. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 547. Gen. ead. et Phallaria, Hylacium, Billiotia. — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (117). Gen. ut DC. (exclusa Dondisia) et

Guettardeae Batsch cont.
Santia, Baumannia?, Anisomeris, Eupyrena. (= *Euguettardeae Endl.*)
Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 76: sect. Coffeinar. Subsect.: Morindeae, *genuinae* (gen. Euguettardear. Endl.), Cordiereae.
Endl. 1838. Gen. p. 538; 1841. Ench. p. 272: trib. Coffeacear. Subtrib.: Morindeae, Euguettardeae. (*Synon. Guettardaceae DC.*)
Guettardella Champion & Benth. 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 197: nov. g. Guettardear., aff. Guettardae et Chomeliae. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 113.
Guettardidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 764: trib. Coffear. Gen. Guettardear. Endl. et Pachystigma, Commianthus, Tricalysia.
Gützlaffia Walpers vid. *Gutzlaffia Hance.*
Guevina Molina 1782. Chil. p. 198 (teste R. Brown); ed. II. p. 279.
Pers. 1805. Ench. I. p. 118. n. 221: g. Tetrandr. Monogyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 75. n. 353: g. Proteacear. — Par. R. Brown 1809. Linn. Trans. X. (1811) p. 165. (Verm. bot. Schr. II. p. 261.) — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 23. 398. n. 535. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 472. n. 508; 1830. Gen. I. p. 103. n. 518. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 522.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 331: g. Coelismenar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1846: g. Protecar.
Endl. 1838. Gen. n. 2140. p. 340 (*Guevinia*); 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 82: g. Persoonicar. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 401 (*Guevinia*). — Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2417 (*Guevinia*). — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 347.
Meisn. 1841. Gen. p. 331 (244): g. Proteinar.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 121: g. Protear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533 (*Guevinia*): g. Persoonidar.
Synon. Gevuina Molina!; Quadria Ruiz & Pav.; Nebu Feuill.
Guevinia Endl., Spach, etc. vid. *praeced.*
Guiabara Adans. 1763. Fam. II. p. 277: g. Persicariar.
= Coccoloba Jacq.
Guibourtia Bennett 1857. Proc. Linn. Soc. V. p. 149: nov. g. Caesalpiniear., Hymenaeae simile. (Bot. Zeit. 1858. p. 231.)
Guichenotia*) Gay 1821. Mém. Mus. VII. p. 448. t. 5: nov. g. Lasiopetalear. (G. ledifolia.) — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 312. — DC. 1824. Pr. I. p. 489. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 776. n. 846; 1830. Gen. I. p. 185. n. 936. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1828. Consp. p. 204. n. 5302; 1837. Hdb. p. 292; 1841. Nom. p. 202. n. 7712. — Bartl. 1830. Ord. p. 342. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 527. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 477. — Meisn. 1837. Gen. p. 33 (26). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 830. — Endl. 1840. Gen. n. 5323. p. 996; 1841. Ench. p. 519. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.
Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 317. 318: g. Thomasiear.
Guidia Batsch sphalm. pro *Gnidia.*
Guidonia*) Plumier 1703. Gen. p. 4. t. 24. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 71.
Adans. 1763. Fam. II. p. 305: g. Zizyphor.
DC. 1825. Pr. II. p. 48: sect. Samydae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 177. n. 4693 *b*; 1841. Nom. p. 189: n. 7194. 2. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 51. — Endl. 1839. Gen. n. 5059 *b*. p. 916; 1841. Ench. p. 477.
Rchb. 1837. Hdb. p. 273: g. Samydear. genuinar.
Guidonia P. Browne 1756. Jamaic. p. 249. t. 29. f. 4: g. Polyandr. Monogyn. *Cf.* *Laetia Adans.*
= Laetiae Löfl. pars. (Meisn. Comm. p. 17.)
Guiera „Adans." Juss. 1789. Gen. p. 320: g. Onagrar. (An Myrtoideis affinius?) — Par. Batsch 1802. Tab. p. 77. — Pers. 1805. Ench. I. p. 470. n. 1071.
Gmel. 1791. Syst. p. 675 (*Gujera*): g. Decandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 154: g. Onagrariar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 309. n. 1224. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 72.
Spreng. 1817. Anl. II. 2. p. 854: g. Myrtear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 332. n. 1620; 1830. Gen. I. p. 357. n. 1807: g. Combretear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 662. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IV. p. 132.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: g. Combretacear. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 710 (*Guirea*). — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1378. 1472.
DC. 1828. Pr. III. p. 17: g. Terminaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4534; 1841. Nom. p. 171. n. 6606. — Bartl. 1830. Ord. p. 323. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 305. — Meisn. 1838. Gen. p. 110 (78). — Endl. 1840. Gen. n. 6085. p. 1182; 1841. Ench. p. 632.
Guill. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 182.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718: g. Terminalear.
Guiina „Aubl. em." Crüger 1847. Linnaea XX. p. 115: g. Ternströmiacear. *Cf.* Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 154 et Grisob. 1850. Arch. f. Nat. II. p. 319.

*) Dicat. Antonio Guichenot, itineris Baudiniani socio.

*) Dicat. Guidoni Crescentio Fagon, Parisiensi.

Guiina Crüg. cont.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 116: g. Cochlospermear. (a Quiina Aubl. diversum: Walp. ibid. II. p. 191 adnot.)
Conf. Quiina Aubl.

Guilandia P. Browne, Linn. 1764 vid. *seq.*

Guilandina*) Linn. 1737. Gen. p. 124. n. 348; 1737. Cliff. p. 158; 1740. Syst. p. 23; 1742. Gen. ed. II. p. 518. n. 997; 1748. Ups. p. 101; 1753. Sp. I. p. 381; 1759. Syst. ed. X. p. 1018. n. 464; 1762. Sp. ed. II. p. 545; 1764. Gen. ed. VI. p. 207. n. 517 (*Guilandia*); 1767. Syst. ed. XII. p. 291. n. 512: g. Decandr. Monogyn. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 228 (*Guilandia*). — Murr. 1774. Syst. p. 329; 1784. Syst. p. 396. — Reich. 1778. Gen. p. 212. n. 560. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 279. n. 704. — Lour. 1790. Coch. I. p. 265. — Gmel. 1791. Syst. p. 672. — Pers. 1797. Syst. p. 423; 1805. Ench. I. p. 461. n. 1022. — Willd. 1799. Sp. II. p. 534. n. 816; 1809. En. p. 445.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 271. n. 1114: g. Calycostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 669.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Lomentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 429. — Batsch 1802. Tab. p. 98.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 298. — Juss. 1789. Gen. p. 350. (emend.) — Vent. 1799. Tabl. III. p. 378. — St. Hil. 1804. Dict. v. 5. p. 147 (*Bonduc*); 1805. Expos. II. p. 208. — Hedw. 1806. Gen. p. 300. n. 1189. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 768 (anomal.); 1825. Syst. II. p. 327. n. 1597; 1830. Gen. I. p. 352. n. 1776. — Link 1821. En. I. p. 409. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1426.
Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 69 (*Guillandina*): g. Decastemonum monostylar.
Neck. 1790. El. II. p. 455. n. 1292: g. Chorisophytor. Segregatur Alandina.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 315. t. 148.
Cram. 1803. Disp. p. 198: in Dioec. Decandr.
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 480. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 429. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 280. — Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 397. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 479.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4151; 1841. Nom. p. 155. n. 6065: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 94. (verar.) — Endl. 1840. Gen. n. 6763. p. 1312; 1841. Ench. p. 672. — Brongn. 1843. En. genr. p. 132.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Link 1831. Hdb. II. p. 137: g. Cassiacear.

*) Dicat. Melch. Guilandini, prof. Patav.

Guilandina Linn. cont.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Eucaesalpiniear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 113.
Synon. Bonduc Plum.

Guildingia*) Hook. 1830. Bot. Misc. I. p. 22. t. 30: nov. g. Memecylear. (G. psidioides.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 111 (79). — Endl. 1840. Gen. n. 6271. p. 1223; 1841. Ench. p. 647. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1413. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6679. — Walp. 1843. Rep. II. p. 149. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 794. n. 4117: g. Decandr. Monogyn.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. g. Mouririear.
Synon. Olisbea DC.

Guilelma Link vid. *seq.*

Guilielma*) Martius 1824. Palm. fam. p. 21; 1824. Gen. Palm. bras. fasc. III. p. . . . t. 66. 67 (*cf.* Isis 1825. p. 873): nov. g. Cocoinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1628; 1841. Nom. p. 58. n. 2269. — Endl. 1837. Gen. n. 1766. p. 254; 1841. Ench. p. 136. — Kunth 1841. Enum. III. p. 268. — Meisn. 1842. Gen. p. 358 (267). — Karst. 1856. Linnaea XXVIII. p. 397. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 847.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 141. n. 1349 (*Gulielma*); 1830. Gen. I. p. 285. n. 1477: g. Palmar. (Hexandr. Trigyn.) — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 259 (*Guilelma*). — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047 (*Gulielma*). 1204.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Cocoinear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 16. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 115.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Cocoëar.

Guillandina Allion. vid. *Guilandina Linn.*

Guilleminea***) HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 40. t. 518: nov. g. Paronychiear. (Illecebrum densum W.) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 353. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 202. n. 1026. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 872.
Bartl. 1825. Beitr. II. p. 154; 1830. Ord. p. 300: g. Scleranthear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 378. — Rchb. 1828. Consp. p. 161. n. 4257 (*Guilleminia*); 1837. Hdb. p. 235; 1841. Nom. p. 161. n. 6276. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 19 (*Guilleminia*). — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 96. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 239. — Meisn. 1837. Gen. p. 133 (97). — Endl. 1840. Gen. n. 5223. p. 963; 1841. Ench. p. 505.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 52: g. Pentandr. Monogyn.

*) Dicat. Mich. Guilding.
**) Dicat. Carolinae Wilhelminae, reginae Bavariae.
***) Dicat. Joanni Ant. Guillemin.

Guilleminea HBK. cont.
Endl. 1843. Spl. III. p. 91: g. Euscleranthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 528 (*Guilleminia*): g. Scleranthacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 338: g. Gomphrenear.

Guilleminia Necker 1790. Elem bot. II. p. 132. n. 813: g. Coryphophytor.
= Votomita Aubl.

Guilleminia Rchb., Dumort., Lindl. vid. *Guilleminea HBK.*

Guillimia Rchb. vid. *Gwillimia Rottl., DC.*

Guillonea Cosson 1851. Not. s. q. pl. midi Esp. III. p. 109: nov. g. ex typo Laserpitii scabri Cav.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 899: g. Thapsiear.

Guindilia „Gillies mss." Hook. & Arn. 1833. Bot. Miscell. III. p. 170: nov. g. Rutacear. (G. trinervis.)
Meisn. 1837. Gen. p. 62 (45): g. Diosmear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5987. p. 1149; 1841. Ench. p. 609: g. Zanthoxylear. dubium. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 524.
Rchb. 1841. Nom. p. 196. n. 7490: g. Xanthoxylear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 473: g. Xanthoxylacear.?

Guinnalda Sessé mss. in Mart. herbar.
= Gelsemium Juss. (Meisn.)

Guioa*) Cavan. 1797. Icon. IV. p. 49. t. 373: nov. g. Octandr. Monogyn. (G. lentiscifolia.)
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 12: g. Saponacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 269. n. 1083 (et denuo p. 270. n. 1086? *Giroa Cav.*)
DC. 1824. Pr. I. p. 614: sect. Cupaniae? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5212 *d.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 668.
Bartl. 1830. Ord. p. 364: g. Sapindear.
= Cupaniae Plum. pars.

Guiraoa Cosson 1851. Not. s. q. pl. midi Esp. III. p. 97: nov. g. Raphanear., Rapistro aff. (G. arvensis.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 824.

Guirea Steud. Nom. vid. *Guiera Adans.*

Guiterrezia Schultz Bip. vid. *Gutierrezia Lag.*

Guizotia Cassini 1821. Bull. soc. philom. p. 127; 1829. Dict. v. 59. p. 237. 247; 1830. v. 60. p. 577: nov. g. Sigesbeckiear.
DC. 1836. Mém. Genèv. VII. 2. p. 271; 1836. Pr. V. p. 551: g. Heliopsidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2507. p. 408; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3138. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22: g. Milleriear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 42: g. Helianthear. — Par Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 75.

*) Dicat. Jos. Guio et Sanchez.

Guizotia Cassini cont.
Synon. Ramtilla DC.; Veslingia Vis.; Werinnua Heyn.

Gujera Gmelin Syst. p. 675: vid. *Guiera Adans.*

Guldaenstedtia A. Juss. vid. *seq.*

Guldenstädtia Dumort., Lindl. vid. *Güldenstädtia Fisch.*

Gulielma Spreng., Dietr. vid. *Guilielma Mart.*

Gumillaea Schult. 1820. Syst. VI. p. XXVI. 297: g. Pentandr. Digyn. — Par. Poir 1821. Dict. v. 20. p. 92.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3511: g. Loganiear.?
Meisn. 1838. Gen. p. 138 (101): g. Cunoniacear.?
= seq.

Gumillea*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 42. t. 7; 1802. Fl. peruv. III. p. 23. t. 245: nov. g. Pentandr. Digyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 290. n. 650. — Hedw. 1806. Gen. p. 184. n. 760. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 227. n. 1192. — — Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 990.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 896; 1825. Syst. I. p. 930. n. 1098: g. Gentianear.?
Endl. 1839. Gen. n. 4660. p. 819; 1841. Ench. p. 409: g. Cunoniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 159. n. 6213. — Walp. 1843. Rep. II. p. 374.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 572: g. Weinmannear.
Synon. Gumillaea Schult.

Gumira Rumph. 1743. Amboin. III. p. 208. t. 133.
Hassk. 1842. Flora XXV. Beibl. p. 26; 1844. Cat. Bogor. alt. p. 135: g. a Premna L. distinctum. *Cf.* Endl. Spl. III. p. 77.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664: g. Verbenacear.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 630: sect. Premnae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 891.

Gumteolis**) Hamilt. mss. (D. Don 1825. Pr. fl. Nepal. p. 87.)
Centranthera R. Brown.

Gundelia***) Tourn. 1703. Coroll. p. 51. t. 486: g. pl. class. XII.
Linn. 1737. Gen. p. 242. n. 626; 1740. Syst. p. 28; 1742. Gen. ed. II. p. 386. n. 758; 1753. Sp. II. p. 814: g. Syngenes. Polygam. Aequal.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 240. n. 983: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Capitator.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1232. n. 828: g. Syngenes. Polygam. Frustran.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cinarocephalar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 175. (anomalar.) — Vent. 1799. Tabl. II. p. 506. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 388.

*) Dicat. Jos. Gumilla.
**) Nomen vernaculum *Gumteouli.*
***) Dicat. Andr. v. Gundelsheimer, socio itineris.

Gundelia Tourn. cont.
Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1315; 1764. Gen. ed. VI. p. 453. n. 1000; 1767. Syst. ed. XII. p. 581: g. Syngenes. Polygam. Segregat. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 664; 1784. Syst. p. 797. — Reich. 1778. Gen. p. 449. n. 1085. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 593. n. 1356. — Gmel. 1791. Syst. p. 1281. — Pers. 1797. Syst. p. 839; 1807. Ench. II. p. 500. n. 1972. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2402. n. 1585.
Adans. 1763. Fam. II. p. 114: g. Echinopor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Capitatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538. — Batsch 1802. Tab. p. 251.
Hill 1769. Ht. kew. p. 79: g. Aggregatar.
Scop. 1777. Intr. p. 125: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 93. n. 169: g. Siphoniphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 386. t. 163: g. Tubulosar.
DC. 1808. Mém. Inst.; 1810. Ann. Mus. XVI. p. 153: g. Gundeliacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 541: g. Centaurear.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 93: g. Vernoniear. — Par. Less. 1829. Linnaea IV. p. 334. — Brongn. 1843. En. genr. p. 46.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 409. n. 2666; 1831. Gen. II. p. 609. n. 3004: g. Cynarear.
Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2348: g. Rolandrear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Less. 1831. Linnaea VI. p. 695; 1832. Syn. p. 151. — DC. 1836. Pr. V. p. 88. — Endl. 1838. Gen. n. 2232. p. 362; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 178 (123). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 464. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3929: g. Lagascear.
Synon. Hacub Vaill.; Gundelsheimera Cass.

Gundeliaceae DC. 1808. Mém. de l'Inst.; 1810. Ann. Mus. XVI. p. 153: div. Cinarocephalar. Gen.: Gundelia, Acicarpha. *Cf.* Cassini 1821. Dict. v. 20. p. 93.

Gundelsheimera Cassini 1828. Dict. v. 57. p. 344; 1830. v. 60. p. 587: g. Rolandrear.
= Gundelia Tourn.

Gunisanthus*) A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 219: nov. g. Ebenacear. (Diospyros? villosula Wall.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 596.

Gunnera**) Linn. 1767. Mant. p. 16. n. 1272; 1767. Syst. ed. XII. p. 597: g. Gynandr. Diandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 682; 1784. Syst. p. 819. — Reich. 1778. Gen. p. 459. n. 1102. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 607. n. 1378. — Pers. 1797. Syst. p. 864. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 148. n. 1616.

---

*) γυνις, effeminatus.
**) Dicat. Ern. Gunner, episcopo Drouthem.

Gunnera Linn. cont.
Scop. 1777. Intr. p. 100: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 405: g. Urticis aff.
Neck. 1790. El. III. p. 107. n. 1435: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 76: g. Diandr. Digyn. — Par. Thunb. 1794. Prodr. I. p. 6; 1807. Fl. cap. I. p. 143. — Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 29. Char. reform. — Pers. 1805. Ench. I. p. 30. n. 73. — — Vahl 1805. Enum. I. p. 308. n. 70.
Batsch 1802. Tab. p. 178: g. Scabridar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 310: g. Urticeis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 21. 352. — Link 1822. En. II. p. 373. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 361; 1825. Syst. I. p. 123. n. 132; 1830. Gen. I. p. 32. n. 143: g. Urticear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 61. 286. n. 113. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 43. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 96. — Kunth 1822. Syn. I. p. 377. — Agdh. 1825. Aphor. p. 204. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 124.
Blume 1822. Bijdr. Nr. 10. p. 513: g. Coenosanthear.
Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 512: g. Misandrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2542.
Rchb. 1828. Consp. p. 84. n. 1818: g. Cecropiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 105: g. Artocarpear.
Endl. 1837. Gen. p. 285. n. 1889; 1841. Ench. p. 640. n. 6139/₂: g. Gunneracear. Sect.: Misandra, Perpensum. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257). — Walp. 1843. Rep. II. p. 100. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 769. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 683.
Rchb. 1837. Hdb. p. 272: g. Gunnerear. — Par. Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 99. 170.
Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 70. t. 15. (G. macrophylla.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781: g. Araliacear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 65: g. Halorageär.
Synon. Milligania Hook.; Dysemone Forst.?

Gunnera Örsted 1857. Nat. For. Vid. Medd. p. 192: g. Gunneracear. restrict. (Gunnera perpensa L.)
Synon. Perpensum Burm.

Gunneraceae Endl. 1837. Gen. p. 285: div. Urticaceis aff. Gen.: Gunnera.
Endl. 1841. Ench. p. 640: div. Halorageis aff. Gen: Milligania, Gunnera.
Meisn. 1841. Gen. p. 346 (257): ordo Juliflorar. Gen.: Gunnera, Misandra.
Örsted 1857. Nat. For. Vid. Medd. p. 191. Gen.: Panke, Pseudo-Gunnera, Gunneropsis, Gunnera, Misandra, Misandropsis, Milligania.

Gunnereae Rchb. 1837. Handb. p. 172: subdiv. Urticear. Gen.: Gunnera, Misandra.
Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 99: subordo Halaragear. Gen.: Gunnera.

Gunneropsis Örsted 1857. Nat. For. Vid. Medd. p. 192: nov. g. Gunneracear. (Gunnera petaloidea Gaud.)

Gunnia*) Lindl. 1834. Bot. Regist. XX. (n. ser. VII.) n. 1699: nov. g. Orchidear., Chiloschistae aff. (G. australis.) *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 57.
Endl. 1837. Gen. n. 1478. p. 205; 1841. Ench. p. 111: g. Vandear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 54. n. 2084. — Meisn. 1842. Gen. p. 377 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Sarcanthidar.

Gupia St. Hil., Schult. vid. *Goupia Aubl.*

Gurania**) Schlechtend. 1851. Linnaea XXIV. p. 724: sect. Anguriae. An genus proprium? (A. speciosa Pöpp.)

Gurltia***) Klotzsch 1855. Begon. p. 176: nov. g. Begoniacear. (Begonia Meyeri Otto & D.) — Par. Hassk. 1858. Hort. Bogor. p. 323.

Gurua „Hamilt. herb.“ Steud. Nomencl. I. p. 642 (*Guroa* ibid. p. 711: obovata.)
= Finlaysonia Wall.

Gusmannia Juss., Brongn. vid. *Guzmania Rz. & Pav.*

Gusmannia Gay 1849. Fl. Chil. IV. p. 12. *Cf.* Rémy in Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 185.
= Astradelphus Rémy.

Gussonea A. Rich. 1828. Mém. soc. h. n. Par. IV. p. 67.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 664. n. 3348 (*Gussonia*): g. Orchidear.
Saccolabium Lindl.

Gussonea†) Presl fr. 1828 in Reliq. Hänk. I. p. 183: nov. g. Cyperoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 212a. n. 1082b: g. Cyperear.
Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 171. t. 34: g. Sclerinear.
Endl. 1837. Gen. n. 978 *b*. p. 114; 1841. Ench. p. 24: sect. Schoeni. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1460. 2.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 223: g. Cyperacear.
= Arthrostylis R. Brown.

Gussonea „Tornab.“ Massal. 1854. Geneacaena Lich.: g. Lichenum.

Gussonia Spreng. 1821. Neue Entdeck. II. p. 119: g. Tricoccar., serius (Gen. II. p. 530) ad Excoecariam reductum.
Agdh. 1823. Aphor. p. 195: g. Euphorbiacear.

*) Dicat. Ronald L. Gunn, insulae Van Diemen exploratori.

**) Anagramma nominis Anguriae.

***) Dicat. prof. Gurlt, Berolin.

†) Dicat. Giov. Gussone, botanico Palerm.

Gussonia Spreng. cont.
Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 183: g. Hippomanear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 88. n. 5772/3. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 519: sect. Stillingiae.

Gussonia Spreng. Gen. II. p. 664: vid. *Gussonea A. Rich.*

Gussonia Dietr. n. 1244: vid. *Cussonia Thunb.*

Gustavia*) Linn. 1775. Amoen. ac. VIII. Ed. 1785. p. 266. t. 5: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 357. n. 917. — Linn. f. 1781. Suppl. p. 51. n. 1414. — Murr. 1784. Syst. p. 620. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 474. n. 1151. — Gmel. 1791. Syst. p. 1038. — Pers. 1797. Syst. p. 658; 1807. Ench. II. p. 260. n. 1654. — Willd. 1800. Sp. III. p. 846. n. 1309.
Batsch 1802. Tab. p. 13: g. Myrtoidear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 854; 1826. Syst. III. p. 127. n. 2468; 1831. Gen. II. p. 563. n. 2752: g. Myrtear.
Link 1822. En. II. p. 201: g. Myrtacear.
Poit. 1826. Mém. Mus. XIII. p. 156.
DC. 1828. Pr. III. p. 289: g. Barringtoniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 175. n. 4656; 1841. Nom. p. 175. n. 6806. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — Bartl. 1830. Ord. p. 332. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 869. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 187. — Meisn. 1838. Gen. p. 109 (77). — Endl. 1840. Gen. n. 6327. p. 1234; 1841. Ench. p. 651. — Berg 1856. Linnaea XXVII. p. 441; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 2. p. 469.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 123: g. Lecythidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 755: g. Barringtoniacear.
Synon. Janiparandiba Pis.; Japarandiba Marcgr., Adans.; Pirigara Aubl.; Teichmeyeria Scop.; Spallanzania Neck.

Gutbiera**) „Presl“ Sternb. 1838. Vers. II. p. 116. t. 33. f. 13: nov. g. Cyatheacitum.
Corda 1845. Fl. Vorw. p. 89: g. Gleicheniacear. verar.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 79 (*Gutlbiera*): g. Filicum foss.
Cyatheites Göpp.

Gutenbergia Schultz Bip. 1840. Mainzer Festalbum; 1842. Flora II. p. 483: nov. g. Ethuliear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 703.

Gutenbergia Walp. vid. *Guttenbergia Zoll.*

*) Dicat. Gustavo III, Succiae regi.

**) Dicat. Aug. de Gutbier.

Guthnickia*) Regel 1848. Ind. sem. h. Turic.; 1849. Flora I. p. 179: nov. g. Gesnerear. (Achimenes atrosanguinea Hort.) *Cf.* Linnaea XXIV. p. 198. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1068.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 201; 1856. ibid. XXVII. p. 700. 749: g. Achimenear.
Örst. 1858. Gesn. centroam. p. 9: g. Euachimenear.

Gutierrezia Lagasca 1816. Nov. gen. et sp. p. 30: nov. g. Corymbiferar., Columelliae aff. (G. linearifolia.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 901: g. Radiatar.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 100: g. Asterear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 460; 1830. v. 60. p. 581: g. Lepidophyllear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2531.
DC. 1836. Pr. V. p. 653: g. Euheleniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2586. p. 421; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 205 (132).
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 193: g. Achyridear. Sect.: Gutierrezia, Hemiachyris. — Par. Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951 (*Guiterrezia = Brachyris DC.* ex parte et *Hemiachyris DC.*)
Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3178: g. Heleniear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17 (et p. 19 inter Solidagineas?) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Gutsonia Harvey . . . . nov. g. Cryptonemiacear.? *Cf.* Bot. Zeit. 1858. Beil. p. 94.

Guttaeferae Batsch 1802. Tab. affin. p. 89: fam. Capnanthemar. Gen.: Cambogia, Clusia, Tovomita, Quapoya, Grias, Calophyllum, Mammea, Singana, Meesua, Rhedia, Vateria, Elaeocarpus, Vatica, Allophylus.

Guttales Lindl. 1833. Nix pl. p. 19: nixus Calycosar. Ordines: Guttiferae, Rhizoboleae, Marcgraviaceae, Hypericinae.

Guttbiera Brongn. vid. *Gutbiera Sternb.*

Guttenbergia Zollinger 1846. Nat. Arch. Neerl. Indie II. p. 1: nov. g. Morindear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 374 (*Gutenbergia*).
Zoll. 1847. Flora II. p. 593: g. Rubiacear., Morindae proximum.

Guttierrezia Wittst. Etym. Handw. p. 406: sphalm. pro *Gutierrezia Lag.*

Guttiferae Juss. 1789. Gen. p. 243: ordo 9 class. XIII. Gen. §. 1: Cambogia, Clusia, Garcinia, Tovomita, Quapoya, Grias. §. 2: Moronobea, Macoubea, Mammea, Macanea, Singana, Mesua, Rheedia, Calophyllum. §. 3: *Guttiferis et Aurantiis affinia:* Vateria, Elaeocarpus, Vatica, Allophyllus. *Cf.* Juss. 1813. Ann. Mus. XX.

*) Dicat. pharmacopolae Guthnick, Bern.

Guttiferae Juss. cont.
p. 463. (Isis 1826. p. 698.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 144. Gen. §. 1: Mangostana, Clusia, Grias. §. 2: Mammea, Mesua, Rheedia, Calophyllum.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 26. t. 76. Gen. §. 1 et 2 ut Juss. §. 3: *Guttiferis et Hesperideis affinia:* Vateria, Elaeocarpus, Vatica.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 779: fam. 82 plant. Divis.: Marcgravieae, Mesuëae, Hypericeae.
DC. 1819. Théor. élém. p. 244; 1824. Pr. I. p. 557: ordo (35) Thalamiflorar. Trib. (1824): Clusieae, Garcinieae, Calophylleae, Symphonieae. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 614. Trib.: Clusieae, Chrysopieae, Garcinieae, Calophyllieae.
Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 103: ordo Hypopetalear. Gen. §. 1: Clusia, Quapoja, Cambogia, Garcinia, Ochrocarpus, Marialva, Brindonia, Ruyschia, Marcgravia, Norantea. §. 2: Antholoma, Souroubea, Stalagmitis, Moronobea, Macoubea, Mammea, Rheedia, Macanea, Singana, Mesua, Chloromyron, Calophyllum, Venana.
Choisy 1823. Mém. soc. h. n. Par. I. p. 210.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 587: ordo Brevistylar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII: div. Hypericinear. Subdivis.: Clusieae, Garcinieae, Calophylleae, Marcgravieae.
Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 417: ordo emend. Gen. §. 1: Tovomita, Verticillaria, Clusia, Arrudea, Havetia. §. 2: Moronobea, Chrysopia. §. 3: Mammea, Rheedia, Garcinia, Stalagmitis. §. 4: Mesua, Calophyllum.
Rchb. 1828. Consp. p. 210; 1837. Hdb. p. 310; 1841. Nom. p. 211: fam. Aurantiiflorar. Divis.: Marcgravieae, Clusieae (1837 Clusiariae), Garcinieae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43 (*Guttifereae*). 47: fam. Hypericariear. Trib. Clusiae, Garcinieae, Calophylleae, Canelleae.
Bartl. 1830. Ord. p. 288: class. (47) Gymnoblastor. Ordines: Sauvagesiae, Frankeniaceae, Hypericineae, Garcinieae.
Link 1831. Hdb. II. p. 340: ordo 19 Allostemonum. Gen.: Garcinia, Calophyllum.
Lindl. 1833. Nix. p. 19: ordo Guttalium.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 304: class. (14) Dicotyledoneor. Fam.: Garcinieae, Hypericaceae, Frankeniaceae, Sauvagesieae.
Meisn. 1837. Gen. p. 42 (31): ordo 31 plant. (p. 439 Lamprophyllar.) Trib.: Clusieae, Symphonieae, Garcinieae, Calophylleae, *spuriae* (gen.: Macoubea?, Macanea?, Singana?).
Endl. 1840. Gen. p. 1012; 1841. Ench. p. 524: class. Dialypetalar. Ordines: Dipterocarpeae, (Lophiraceae), Chlaenaceae. (Eucryphiaceae, Hugoniaceae), Ternströmiaceae, (Aristoteliaceae), Clusiaceae,

Guttiferae Juss. cont.
(Canellaceae), Marcgraviaceae, Hypericineae, (Ochranthaceae), Elatineae, Reaumuriaceae, Tamariscineae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. XXII. 74: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam.: Clusiaceae, Marcgraviaceae, Hypericineae, Reaumuriaceae, Tamariscineae, Cistineae, Bixineae, Ternströmiaceae, Chlaenaceae, Dipterocarpeae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 431: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Tribus Clusiacear. Endl.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 112: ordo Choristopetalar. Fam.: Hypericineae, Garcinieae.
Choisy 1855. Descr. d. Guttif. de l'Inde, précédée d'observations générales.

Guttiferales Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 392: nixus Exogenar. hypogynar. Ordines: Dipteraceae (*cum* Lophiraceis), Toernströmiaceae, Rhizobolaceae, Clusiaceae, Marcgraviaceae, Hypericaceae, Reaumuriaceae.

Guttineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: fam. Thalamisertiae. Gen.: Clusia, Rheedia.

Gutzlaffia*) Hance 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 142: nov. g. Acanthacear., Endopogoni et Codonacantho aff. (G. aprica.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 213 (*Gützlaffia*): g. Ruelliear.

Guyonia**) Naudin 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 149: nov. g. Lasiandralium. (G. tenella.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 593.

Guzmania***) Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 37. t. 261: nov. g. Hexandr. Monogyn. (G. tricolor.) *Cf.* Schrad. n. Journ. II. 1. p. 60 et Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 99 (*Gusmannia*).
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 105: g. Amomear.
Schult. 1830. Syst. VII. p. LXVIII. 1231: g. Bromeliacear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 24 (*Gusmannia*).
Synon. Guzmannia Pers.

Guzmannia Pers. 1805. Ench. I. p. 344. n. 765: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 219. n. 890.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 255: g. Bromeliar.
Agdh. 1823. Aphor. p. 175: g. Bromeliacear. — Par. Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. n. 1068; 1847. Veg. kd. p. 148. — Bartl. 1830. Ord. p. 47. — Endl. 1837. Gen. n. 1308. p. 184; 1841. Ench. p. 106.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 22. n. 1166; 1830. Gen. I. p. 249. n. 1297: g. Bromeliear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1060.

Guzmannia Pers. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 1273; 1841. Nom. p. 45. n. 1623: g. Tillandsiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 130. — Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299). — A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 740.
Beer 1857. Fam. Bromel. p. 21. 101: g. Guzmanniar.
= Guzmania Ruiz & Pav.

Guzmanniae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 9. 19. 21: div. Lepidanthear. Gen.: Guzmannia.

Gwillimia*) „Rottler mss." DC. 1818. Syst. I. p. 455; 1824. Prodr. I. p. 81: sect. Magnoliae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4992 *a* (*Guillimia*). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 83. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 591.
Synon. Kobus Banks.

Gyalecta**) Achar. 1810. Lich. univ. p. 30. 151; 1814. Syn. Lich. p. 9: nov. g. Homogeneor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 106.
Agdh. 1821. Aphor. p. 92: g. Scutellator.
Fries 1825. Pl. homon. p. 246; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 109: g. Parmeliacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 399; 1841. Nom. p. 17. n. 568. — Endl. 1836. Gen. n. 170. p. 15; 1841. Ench. p. 11. — Genth 1836. Nass. I. p. 368. — Bayrh. 1849. Taun. p. 74.
Fries 1831. Lich. eur. p. 4. 194: g. Parmeliear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 27: g. Urceolariear.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4: g. Lecanorear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Parmeliadar.
Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 93: g. Lecidinor.
Flot. 1850. Bot. Zeit. p. 382: g. Lecanorinar.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 14 (Flora 1854. p. 235): g. Lecidinear.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 170: g. Urceolarinar.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 338: g. Biatorear.
Arnold 1858. Flora p. 332: g. Gyalectear.
Synon. Volvariae sp. DC.

Gyalecteae Arnold 1858. Flora I. p. 331: trib. Urceolariacear. Gen.: Petractis, Phyalopsis, Gyalecta, Secoliga.

Gyalolechia Massalongo 1852. Ricerch. aut. Lich. crost. (Flora 1854. p. 315): nov. g. Lichenum. (L. bracteatus et Parmelia aurea.)
Vid. Callopisma Not.

---

*) Dicat. Car. Gutzlaff, theologiae Dr.
**) Dicat. cl. Guyon, exercituum algeriensium protochirurgo.
***) Dicat. Don Anastasio Guzman.

*) Dicat. Gwillim, gubernatori quondam Madras.
**) *γύαλος*, concavus; *λέκτρον*, (potius *λέκτρον*), receptaculum.

Gyas Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. (1815.) p. 299: nov. g. Orchidear. (Cymbidium verecundum W., hyacinthinum Sw., Epidendrum tuberosum L.)
= Bletia Ruiz & Pav.

Gymnacanthus*) Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 444: nov. g. Nelsoniear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4036. p. 698; 1841. Ench. p. 343. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Meisn. 1840. Gen. p. 293 (202). — Rchb. 1841. Nom. p. 110. n. 4302. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 368. 584.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 579: g. Nelsonear.
= Sclerocalyx Nees. (Nomen ex meliore cognitione loco aptiori accommodatum.)

Gymnacanthus Oersted 1855. Mex. og Centralam. Acanth. p. 14: nov. g. Acanthacear. (Dipteracanthi Nees sp.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 639.

Gymnachaena Rchb. in Sieb. herb. Cap. n. 23.
= Perotriche Cass.

Gymnacranthera A. DC. 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 31; 1856. Prodr. XIV. 1. p. 200: sect. Myristicae.

Gymnactis Cassini 1827. Dict. v. 51. p. 475: vid. *Glossogyne Cass.*

Gymnactis DC. 1836. Prodr. V. p. 317: sect. Heterothecae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2365 *b*. p. 383; 1841. Ench. p. 235.
Synon. Calycium Ell.; Diplocoma Don.

Gymnadenia R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 191 (Verm. bot. Schr. II. p. 8): nov. g. Orchidear. (Orchis conopsea L.) — Par. Rich. 1818. Mém. Mus. IV. p. 42. 48; 1818. Orch. eur. p. 26. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 205. — Link 1822. En. II. p. 368; 1829. Hdb. I. p. 242. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 693. n. 2925; 1831. Gen. II. p. 652. n. 3284. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1551. 1563 (sect.: Strephogyne, Compsanthe); 1830. Fl. exc. p. 120. (genuinar.) — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 169.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529); 1832. Bot. Regist. XVIII. n. 1499; 1835. Orchid. p. 275: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1472; 1841. Nom. p. 50. n. 1847. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1509. p. 208; 1841. Ench. p. 112. — Kunth 1838. Berol. II. p. 241. — Meisn. 1842. Gen. p. 381 (285). — Brongn. 1843. En. genr. p. 28. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 363. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 64.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 126: g. Ceropagar.
Koch 1837. Syn. p. 688. Ed. II. p. 794: g. Ophrydinear.

*) γυμνός, nudus.

Gymnadenia R. Brown cont.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 87: g. Coniorchidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Gymnadenidar.
Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 298: sect. Orchidis.
Synon. Triplorhiza Ehrh.; Entaticus Gray.; Sieberia Spreng.; Damasonii Rupp. pars.

Gymnadenidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Ophrear. Gen.: Aopla, Herminium, Gymnadenia, Platanthera, Peristylus, Habenaria, Ate, Bonatea, Stenoglottis, Diplomeris, Bicornella, Cynorchis, Coeloglossum, Ommatodium. *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172.

Gymnagathis Schauer 1843. Linnaea XVII. p. 243: nov. g. Lophostemonear. (Melaleuca teretifolia Endl.)
Walp. 1843. Rep. II. p. 927; 1846. V. p. 745: g. Melaleucear. — Par. Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 133.

Gymnalypha Griseb. 1858. Bonplandia p. 2: nov. g. pro Acalypha villosa Jacq. propositum, nondum stabilitum.

Gymnamblosis*) Torrey 1853. Nat. hist. Red-Riv. Louis. App. G: nov. g. Crotonear. (Engelmannia Nuttalliana Kl.)
Baill. 1858. Euphorb. p. 378 (*Gynamblosis*): g. Crotonidear.

Gymnandra Pall. 1776. It. III. p. 712; 1778. Reis. russ. B. III. App. p. 22. t. A. f. 1: nov. g. Diandr., Bartsiae et Pedicularibus proximum (a Linn. f. ad Bartsiam reductum.) *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 108. — Par. Willd. 1811. Berl. Mag. V. p. 390.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 391; 1825. Syst. II. p. 772. n. 2152: g. Rhinanthear. — Par. Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 321. — Bartl. 1830. Ord. p. 172. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 420.
Cham. & Schltd. 1827. Linnaea II. p. 560: g. Scrofularinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3087: g. Pedicularinar.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 22. n. 89: g. Personatar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 29. 43.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5; 1835. Scroph. ind. p. 46: g. Veronicear. — Par. D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 581. — Rchb. 1837. Hdb. p. 198; 1841. Nom. p. 115. n. 4479. — Endl. 1839. Gen. n. 3984. p. 689; 1841. Ench. p. 340. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 102. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. — Meisn. 1840. Gen. p. 307 (218). — Walp. 1845. Rep. III. p. 371.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 667: g. Selaginacear. — Par. Choisy 1848 in DC. Pr. XII.

*) ἄμβλωσις, abortus.

Gymnandra Pall. cont.
p. 24 (anomalum.) *Cf.* Griseb. 1849. Arch. f. Nat. II. p. 429. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 331.
Synon. Lagotis Gärtn.

Gymnandropogon Nees 1841. Agrost. cap. p. 103: subg. Andropogonis. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 486.

Gymnanthe „Taylor mss." Lehm. 1844. Nov. pl. pug. oct.: nov. g. Hepaticar. *Cf.* Flora 1844. p. 494. — Par. Mitten 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 143. (foliosar.)
Nees 1845. Syn. Hepat. p. 192: g. Geocalycear. — Par. Gottsche 1845. Nov. Act. Leop. XXI. 2. p. 425. — Bayrh. 1849. Taun. p. 49.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Jungermannidar.
Synon. Acrobolbus Nees pt.

Gymnanthemum Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 10; 1821. Dict. v. 20. p. 108; 1828. v. 57. p. 342; 1830. v. 60. p. 586: nov. g. Vernoniear. (Archetypar. verar. — Baccharis Senegalensis Pers.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 136.
Rchb. 1828. Consp. p. 89. n. 2212: g. Eupatorinar.
DC. 1836. Pr. V. p. 67: sect. Decaneuri. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2205 *b.* p. 358; 1841. Ench. p. 232. — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3869. 2. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 21.

Gymnanthemum Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 548: g. Heterocomear. emend.
Synon. Cheliusia Schultz; Phyllocephalum Blume; Decaneurum DC.

Gymnanthera R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 58 (Verm. bot. Schr. II. p. 395); 1810. Prodr. I. p. 464. Ed. Nees p. 320: nov. g. Periplocear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3458; 1837. Hdb. p. 208. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Bartl. 1830. Ord. p. 203. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 164. — Endl. 1838. Gen. n. 3435. p. 588; 1841. Ench. p. 298. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 538. — Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212; 1844 in DC. Pr. VIII. p. 493. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.
Schult. 1820. Syst. VI. p. XIV. 129: g. Asclepiadear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 837. n. 965. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 883.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 111: g. Apocynear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 208. n. 1060.
Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5063: g. Gymnantherear.

Gymnantherae Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 356: subtrib. Eumimosear. Gen.: Desmanthus, Mimosa, Schranckia, Leucaena, Xylia.

Gymnanthereae Rchb. 1841. Nomencl. p. 131: subdiv. Periplocear. Gen.: Gymnanthera, Cornacchinia, Finlaysonia.

Gymnanthes Swartz 1788. Prodr. p. 6. 95: nov. g. Monadelph. Triandr. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1005.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 656. n. 1465: g. Monoec. Monadelph.
Gis. 1792. Prael. p. 474: g. Tricoccar.?
Endl. 1840. Gen. n. 5772 *a.* p. 1109; 1841. Ench. p. 587: sect. Excoecariae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7336. 1.
Klotzsch 1841. Arch. f. Nat. I. p. 182: g. Hippomanear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 87. n. 5772/$_1$; 1850. Spl. V. p. 87 (*Gymnanthus*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 530: g. Stillingiidear.

Gymnanthus Junghuhn 1840 in Hoev. & Vriese Tijdschr. VII. p. 308: nov. g. Magnoliacear.
= Trochodendron Sieb. & Zucc.

Gymnanthus Endl. vid. *Gymnanthes Swartz.*

Gymnarhea Steud. Nomencl. vid. *seq.*

Gymnarhena DC. vid. *seq.*

Gymnarrhena*) Desfont. 1818. Mém. Mus. IV. p. 1. t. 1: nov. g. Compositar., nulli affine. (G. micrantha.)
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 111; 1822. v. 23. p. 566: g. Buphthalmear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2483. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 581: g. Sphaeranthear.?
Bartl. 1830. Ord. p. 139: g. Inulear.
DC. 1836. Pr. V. p. 374 (*Gymnarhena*): g. Grangeinear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2400. p. 389; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 190 (128). — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3577: g. Grangeinar.
Synon. Gymnarhea Steud.; Frankia Steud.

Gymnarrhoea Baillon vid. *Gymnorrhoea Leand.*

Gymneia Benth. 1833. Labiat. p. 77; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 86: sect. Hyptidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 687. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *a.* p. 611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 1. — Walp. 1845. Rep. III. p. 524.

Gymnelaea Endl. 1833. Prodr. fl. Norf. p. 156; 1838. Gen. n. 3349 *a.* p. 572; 1841. Ench. p. 286: sect. Oleae. — Par. DC. 1844. Pr. VIII. p. 284.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 258: g. Oleinear.

Gymnema R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 33 (Verm. bot. Schr. II. p. 371); 1810. Prodr. I. p. 461. Ed. Nees p. 317: nov. g. Asclepiadear. (Asclepias lactifera L. et Periploca sylvestris W.) — Par.

*) γυμνός, nudus; ἄῤῥην, masculus.

Gymnema R. Brown cont.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 487; 1825. Syst. I. p. 844. n. 975; 1830. Gen. I. p. 210. n. 1071. — Schult. 1820. Syst. VI. p. IX. 57. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 44. — Decne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 276. (verar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 895.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 130. n. 3421: g. Pergularinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Pergulariear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 554. — Wight 1840. Ic. pl. Ind. II. 1. p. 3 (*Gymnima*). t. 349.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 135: g. Hoyacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3498. p. 595; 1841. Ench. p. 299: g. Sarcolobear. Sect.: Eugymnema, Bidaria, Gongronema. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (176). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5035. Sect. similes. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 10. p. 149. Sect.: Eugymnema, Gongronema.
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Ceropegiear.

Gymnema Decne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 621: g. Gymnemar. restrict.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 498: g. Gymnemear.
Synon. Eugymnema Endl.

Gymnema Rafin. ex Endl. Gen. p. 391: vid. *Gynema Rafin.*

Gymnemae Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 621: div. Stapeliar. Gen.: Gymnema, Bidaria, Gongronema, Sarcolobus, Trichosandra, Rhyssolobium.

Gymnemeae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 497: subtrib. Stapeliear. Gen.: Bidara, Gymnema, Gongronema, Jasminanthes.

Gymneucladium Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 121: sect. Gymnostomi.
= Euweisia C. Müll. §. 2.

Gymnima Wight vid. *Gymnema R. Brown.*

Gymnobalanus Nees 1833. Linnaea VIII. p. 38: nov. g. Laurinar. (G. minarum.)
Nees 1833. Progr. p. 17; 1836. Laurin. p. 479: g. Oreodaphnear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2055. p. 322; 1841. Ench. p. 198. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1333. 1357. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 473. — Meisn. 1841. Gen. p. 326 (238). — Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2654.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.

Gymnoblasta Bartl. 1830. Ord. nat. p. 89: subdiv. Dicotyledoneor. Classes: Coniferae, Amentaceae, Urticinae, Fagopyrinae, Proteinae, Salicinae, Aggregatae, Compositae, Campanulinae, Ericineae, Styracinae, Myrsineae, Labiatiflorae, Tubiflorae, Contortae, Rubiacinae, Ligustrinae, Lorantheae, Umbelliflorae, Cocculinae, Trisepalae, Polycarpicae, Rhoeadeae, Peponiferae, Cistiflorae, Guttiferae, Caryophyllinae, Succulentae, Calyciflorae, Calycanthinae, Myrtinae, Lamprophyllae, Columniferae, Gruinales, Ampelideae, Malpighinae, Tricoccae, Terebinthinae, Calophytae.

Gymnobothrys Wallich teste Baillon.
Falconeria Royle.

Gymnobythus*) A. DC. 1845. Prodr. IX. p. 296: sect. Cosmanthi.

Gymnocalycium Pfeiff. 1844. Abbild. u. Beschr. Cact. II. H. 1. p. 1: nov. g. Cactear. (Cactus gibbosus Haw.)

Gymnocalyx Schmidt vid. *Gymnocylix Benth.*

Gymnocampus Leschen. mss. (? — *Gynocampus* ex Steud.)
Levenhookia R. Brown.

Gymnocarpeae Klotzsch 1855. Abh. Berl. Ak. f. 1854. p. 239: subordo Begoniacear. Trib.: Platycentreae, Isopterygeae.

Gymnocarpi Pers. 1801. Syn. Fung. p. XV: class. II. Fungor. Ordines: Lytothecii, Hymenothecii, Naematothecii.
DC. 1805. Franç. II. p. 66: ordo Fungor. Gen.: Bissus, Monilia, Botrytis, Aegerita, Conoplea, Erineum, Helotium, Peziza, Tremella, Helvella, Spathularia, Clavaria, Thelephora, Hydnum, Boletus, Merulius, Agaricus, Morchella, Phallus, Clathrus. — Par. Leman 1817. Dict. v. 8. p. 105. Sect.: Nematothecae, Hymenothecae, Lythothecae.

Gymnocarpi Fries 1831. Lich. eur. p. 1. 15: ordo prior Lichenum. Trib.: Parmeliaceae, Lecidinae, Graphideae, Calicieae. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 349. Trib. eaed. et Coccocarpeae, Pyxineae, Glyphideae.

Gymnocarpium Newman 1851. Syn. Brit. ferns p. 23: nov. g. Filicum. (Polypodium Dryopteris, etc.)

Gymnocarpon Pers. 1805. Ench. I. p. 262. n. 591: g. Pentandr. Monogyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 174. n. 731: g. Portulacear.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLIII. 524. n. 1030: g. Paronychiear.
= Gymnocarpos Forsk.

Gymnocarpos Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 65: nov. g. Pentandr. Monogyn. (G. decandra.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 429.
Scop. 1777. Intr. p. 343: g. Seminudar.
Meisn. 1838. Gen. p. 132 (97): g. Illecebrear.
Endl. 1839. Gen. p. 958. n. 5203: g. Euparonychiear.
Synon. Gymnocarpus Juss.; Gymnocarpon Pers.; Gymnocarpum DC.

Gymnocarpum DC. 1828. Prodr. III. p. 369: g. Illecebrear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 302. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 87. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 238.

---

*) βυθός; fundus.

Gymnocarpum DC. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4268: g. Polycarpear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Illecebrinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 235: g. Herniariar.
Webb 1836. Canar. I. p. 165: g. Paronychiear.
= Gymnocarpos Forsk.

Gymnocarpus Juss. 1789. Gen. p. 314: g. Portulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 140. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 117.
A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 38: g. Paronychiear. — Par. Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 388; 1825. Dict. v. 38. p. 9. — Agdh. 1825. Aphor. p. 220. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 872.
Viv. 1824. Fl. libyc. p. 13. t. 10.
Endl. 1841. Ench. p. 504. n. 5203: g. Enparonychiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6283: g. Herniariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebraccar.
= Gymnocarpos Forsk.

Gymnocarpus Petit-Thouars mss.
= Uapaca Baill.

Gymnocarya Nees 1836. Laurin. p. 220: sect. Cryptocaryae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 2036 *b*. p. 318; 1841. Ench. p. 197. — Rchb. 1841. Nom. p. 71. n. 2674. 2.

Gymnocaulis Nuttall 1818. Gen. Am. II. p. 59: sect. Orobanches. (O. fasciculata et biflora.)

Gymnocaulus Philippi 1856. Linnaea XXVIII. p. 705: nov. g. Calycerear. (G. viridiflorus.)

Gymnocephalus Schwägr. 1816. Suppl. I. 2. p. 87: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1821. Dict v. 20. p. 118. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 56. — Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 225.
Brid. 1817. Muscol. rec. Suppl. III. p. 1: g. Diploperistomator.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 117: sect. Bryi.
Brid. 1827. Bryol. II. p. 5: sect. Mnii.
Aulacomnion Schwägr.

Gymnochaeta Steud. 1855. Syn. pl. glum. II. p. 156: nov. g. Rhynchosporear. (G. Drummondii.)

Gymnochiton Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 61. n. 5320 *b*: sect. Brachychitonis. Subsect.: Trichosiphon, Poecilodermis.

Gymnocimum Benth. 1836. Labiat. p. LII; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 39: sect. Ocimi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3569 *c*. p. 608; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4133. 3.
Conf. Gymnocymum Benth.

Gymnocladus Lamarck 1783. Dict. I. p. 733. (Ill. t. 823.)
Juss. 1789. Gen. p. 346: g. Leguminosar. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 367. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 202. — Hedw. 1806. Gen. p. 299. n. 1188. — Poir. 1817.

Gymnocladus Lamarck cont.
Dict. v. 8. p. 526 (*Chicot*). — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 769 (anomal.); 1825. Syst. II. p. 327. n. 1596; 1830. Gen. I. p. 350. n. 1769. (Decandr. Monogyn.) — Link 1822. En. II. p. 430.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 696. n. 1537: g. Dioec. Decandr. — Par. Michx. 1803. Fl. am. II. p. 241. t. 51. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 816. n. 1818; 1809. En. p. 1019. — Pers. 1807. Ench. II. p. 626. n. 2258. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 243.
Gis. 1792. Prael. p. 429: g. Lomentacear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 97.
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 479. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 428. — Meisn. 1837. Gen. p. 98 (70). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 397.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4153; 1841. Nom. p. 154. n. 6054: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 89. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6757. p. 1311; 1841. Ench. p. 674. — Brongn. 1843. En. gen. p. 132.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Link 1831. Hdb. II. p. 136: g. Cassiacear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Eucaesalpiniear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Gymnocline Cassini 1816. Bull. soc. philom. Déc. p. 199; 1821. Dict. v. 20. p. 119: nov. g. Anthemidear. (Chrysanthemum macrophyllum W. & K.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 141. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 204.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 178; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: g. Chrysanthemear. (verar.) — Par. Less. 1832. Syn. p. 255. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 339. Sect.: Leucactis, Chrysactis, Anactis.
Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 399: g. Corymbiferar.
Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2379: g. Matricariear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 58: sect. Pyrethri. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2670 *b*. p. 434; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3069. 2. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 553.

Gymnococca C. A. Meyer 1842. Ind. X. sem. h. Petrop. p. 46; 1845. ibid. (Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 372); 1846. Bull. Ac. Pet. IV. p. 71: nov. g. Pimelear. Sect.: Melanococca, Leucococca.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 59. n. 2091: g. Pimelinar. Sect. eaed.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 585: g. Daphnoidear.
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 514: sect. Pimeleae.
Synon. Banksia Forst.

Gymnocolea Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 52: sect. Jungermanniac. (J. inflata.)
Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 17: g. Aploziear.

Gymnocoma Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 330: subg. Aplopappi. (A. pinnatifidus.)

Gymnocoronis*) DC. 1836. Prodr. V. p. 106: nov. g. Alomiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2256. p. 366; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1838. Gen. p. 179 (124). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37: g. Ageratear.

Gymnocroton Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 356: sect. Crotonis. (G. Verreauxii.)

Gymnocylix Benth. 1834. Labiat. p. 412; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 248 (*Gymnocylyx*): sect. Keithiac. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 789. — Endl. 1838. Gen. n. 3620 *d*. p. 619; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4119. 4. — Walp. 1845. Rep. III. p. 744. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 172 (*Gymnocalyx*).

Gymnocylyx Benth. vid. *praeced.*

Gymnocymum Benth. 1832. Labiat. p. 12: sect. Ocymi. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p 672.
= Gymnocimum Benth.

Gymnodenia Ritg. vid. *Gymnadenia R. Brown.*

Gymnodermata Pers. 1801. Syn. Fung. p. XVII: div. Hymenothecior. Gen.: Thelephora, Merisma.
Rebent. 1804. Neom. p. 379: subdiv. Dermatothecior.

Gymnodermates Leman 1817. Dict. v. 8. p. 105: subsect. Hymenothecear. Gen.: Thelephora, Coniophora, Merisma.

Gymnodes Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 405: sect. Luzulac. (L. campestris, etc.)
Synon. Stachyphora C. Koch.

Gymnodesmus Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 99: g. Desmidiear. (Desmidium bambusinum Bréb.)
= Bambusina Kütz.

Gymnodiscus Lessing 1831. Linnaea VI. p. 95; 1832. Syn. Compos. p. 89: nov. g. Othonnear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 469. — Endl. 1838. Gen. n. 2827. p. 463; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 222 (138). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 33. — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3231. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Gymnodispermae Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 51: vid. *Plantae All.*

Gymnogenae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 221: class. VI. plantar. Nixus: Gymnogenae. Ord.: Cycadeaceae, Pinaceae, Taxaceae, Gnetaceae.

*) *κορωνις*, apex, terminus.

Gymnogongrus*) Martius 1825. Fl. Brasil. I. p. 27.
Endl. 1843. Spl. III. p. 39. n. $122/_{39}$ *b*: sect. Chondri.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Spongiocarpidar.
J. Agdh. 1848. Flora II. p 412: g. Cystocloniear.?
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 106: g. Agarear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Spongiocarpear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 788. n. 526: g. Tylocarpear. — Par. Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 165.
Rupr. 1855 in Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 21: g. Rhodophycear.
Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 354: g. Floridear.
Harv. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 250: g. Cryptonemiacear.
Synon. Mastocarpos pt. et Nodularia Targ.; Tylocarpus Kütz.; Ahnfeldtia J. Agdh.?

Gymnogonia R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 222 (Verm. bot. Schr. IV. p. 28): subg. Cleomes. (Cl. pentaphylla.)
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 121: sect. Gynandropsidis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4984 *a*. p. 890; 1841. Ench. p. 456.
Synon. Podogyne Hoffmsg.

Gymnogramma Desvaux 1811. Berl. Mag. V. p. 304; 1813. Journ. bot. III. p. 24; 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 213: nov. g. Filicum. (Pteris rufa L., Asplenium tomentosum Lam., etc.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 122. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 720. n. 3628. (verar.)
Link 1822. En. II. p. 456: g. Polypodear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79.
Kaulf. 1824. En. Fil. p. 69: g. Polypodiacear. — Par. Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 17. t. 2. 3. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 112. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. (nudar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 4. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 311.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 308: g. Hemionitidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 39. n. 730: g. Gymnopteridum.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 136: g. Grammariar.
Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 990. 3: sect. Gymnogrammes.
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 51: g. Polypodiear. — Par. Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 45.
Meisn. 1843. Comm. p. 372: g. Grammitidear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693. — Webb 1850. Canar. III. p. 454. Sect.: Anogramma.
Conf. seq.

*) *γόγγρος*, excrescentia.

Gymnogramme Kunze 1824. Flora I. p. 314: nomen emendat. pro *Gymnogramma Desv.*
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 38. n. 3236: g. Filicum verar.
Blume 1829. Pl. jav. fasc. III. IV. p. 88: g. Polypodiacear. — Par. Kunze 1834. Linnaea IX. p. 34; 1846 in Lehm. Pl. Preis. II. p. 110. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 507. (nudar.)
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 11: g. Phyllopteridum.
Presl 1836. Pterid. p. 217: g. Hemionitidear. Sect.: Neurogramma, Calomelanos.
Endl. 1836. Gen. n. 606. p. 59; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. Sect. 1841 (Spl. I. p. 1345 et Ench.) ut Presl et Ceterach. — Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 990. Sect.: Ceterach, Neurogramma, Gymnogramma. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 39.
Meisn. 1843. Gen. p. 430 (330): g. Grammitidear.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 406: g. Neurosoror. Sect.: Hecistopteris, Jamesonia, Anogramma, Neurogramma, Stenogramme, Ceropteris.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 180: g. Leptogrammear.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 281: g. Asplenicar.
Synon. Asplenium Rupp.; Gymnogramma Desv.; Anogramma et Schizogramma Link.; Hecistopteris Smith; Heterogonium Presl?

Gymnogrammeae Rchb. 1837. Handb. p. 139: subdiv. Polypodicar.

Gymnogyne Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 431: nov. g. Ivear., Euphrosynae proximum. (G. cotyloides.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 155.

Gymnogyne Didrichsen 1849 in Ind. sem. h. Haun. p. 13: subg. Böhmeriae. (B. elongata Fisch.)

Gymnogynum Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 133: nov. g. Lycopodior. ex typo novo. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 123.
Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1676 *d*: sect. Lycopodii.
= Stachygynandrum Brongn. pt.

Gymnolaena DC. 1836. Prodr. V. p. 641: sect. Dysodiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2577 *d*. p. 419; 1841. Ench. p. 239. — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3208. 4.

Gymnolobus Duchartre 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 30: sect. Aristolochiae. Subsect.: 1. *Pentandrae* (Einomenia Raf.); 2. *Hexandrae*.

Gymnoloma Ker 1823. Bot. Regist. VIII. t. 662. (*Gymnolomia* ex Wittst.)
= Wulffia Neck.

Gymnoloma Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
Less. 1832. Syn. p. 227: g. Rudbeckiear.
= Gymnolomia HBK.

Gymnolomia HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 217: nov. g. Helianthear. (G. tenella, etc.) — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 472.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 124; 1825. v. 38. p. 17; 1827. v. 46. p. 398. 402; 1830. v. 60. p. 576: g. Rudbeckiear. (1827 verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2653.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 610. n. 2842; 1831. Gen. II. p. 639. n. 3200: g. Radiatar.
Less. 1830. Linnaea V. p. 153: g. Coreopsidear.
= Gymnopsis DC.

Gymnolomia „Ker" Wittst. Etym. Handw. p. 408: vid. *Gymnoloma Ker*.

Gymnomesium Schott 1855. Oestr. Woch. p. 17: nov. g. Aroidear. (Arum pictum L.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 867.
Schott 1856. Syn. Aroid. p. 8: g. Arinar.

Gymnomitria Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 99. 106: subtrib. Jungermanniear. Gen.: Schisma, Gymnomitrium, Haplomitrium, Sarcoscyphus. — Par. Nees 1838. ibid. IV. p. XXI; 1844. Syn. Hepat. p. 1. Gen.: Haplomitrium, Gymnomitrium, Sarcoscyphus, Alicularia et 1844 Acrobolbus. — Bayrh. 1849. Taun. p. 37.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1344; 1841. Ench. p. 28: trib. Jungermanniacear. Gen. ut Nees 1838.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 65: sect. Jungermanniear. foliosar. Gen. ead.

Gymnomitridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 60: trib. Jungermannear. Gen. Gymnomitrior. Endl. et Acrobolbos.

Gymnomitrieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 23: subdiv. Jungermanniear. Gen. Gymnomitrior. Nees 1838.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 548: subtrib. Jungermanniear. Gen. ead. et Acrobolbus.

Gymnomitrion Corda 1829 in Opiz Beitr. I; 1830 in Sturm Jungerm. p. 6. 21: nov. g. Jungermanniacear. (Jung. concinnata Lightf.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 78.
= Gymnomitrium Nees.

Gymnomitrion Hübener 1834. Hepat. germ. p. 27: g. Jungermanniear. (Dermatophyllinar.) — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 68.
= Aneura Dumort., Pellia Raddi et Pallavicinius Gray.

Gymnomitrium Nees 1836. Eur. Leberm. I. p. 110. 113; 1838. ibid. IV. p. XXI; 1844. Syn. Hepat. p. 2: g. Gymnomitrior. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1344. n. $474/_2$; 1841. Ench. p. 28. n. $473/_4$. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 68.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 89: g. Jungermanniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 805: g. Gymnomitriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Gymnomitridar.
Synon. Cesius Gray; Gymnomitrion Corda; Acolea Dumort.

Gymnomonospermae Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 662: div. Dicotyledonum petalodear. Subdivis.: Dipsaceae, Syngenesia.

Gymnomycetes Link 1824. Spec. I. p. IV; 1825. II. p. 1: ordo Cryptophytor. Gen.: *A.* Caeoma, Puccinia, Triphragmium, Phragmidium, Sporisorium. *B.* Spilocaea, Septaria, Hypodermium, Melanconium, Didymosporium, Stilbospora, Cryptosporium, Fusidium, Myxosporium, Conisporium. *C.* Tubercularia, Fusarium, Dermosporium, Epicoccum, Aegerita, Periconia, Helminthosporium, Cephalotrichum, Isaria, Ceratium. *D.* Sporidesmium, Exosporium, Coryneum, Seiridium, Phragmotrichum, Sarcopodium, Podisoma, Gymnosporangium.

Rchb. 1828. Consp. p. 1. 3; 1832. Fl. exc. p. L: ordo Fungor. Formationes: Blastomycetes, Hyphomycetes.

Endl. 1836. Gen. p. 16; 1841. Ench. p. 13: ordo Fungor., continens *Proletarios* (Mycomater, Nosophlaea, Strumella, Spermoedia) et subordines: Entophytos, Sporodermeos, Stilbosporeos, Tubercularinos.

Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 245: class. 4 Fungor. Ord.: Sporodermei, Entophyti.

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 461: fam. Fungor. Ord.: Isariacei, Sporocybacei, Hymenulacei, Coryneacei, Sclerotiacei, Illosporiacei.

Gymnomyosotis DC. 1846. Prodr. X. p. 111: sect. Myosotidis.

Gymnonthes Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 136: vid. *Gymnanthes Swartz.*

Gymnonychium*) Bartling 1843. Linnaea XVII. p. 353: nov. g. Diosmear., Macrostylidi aff. (G. pubescens.)

Walp. 1846. Rep. V. p. 393: g. Eudiosmear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471. — Endl. 1850. Spl. V. p. 103. n. $6019/_1$.

Gymnopera Don 1823. Linn. Trans. XIII. p. 356.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 362: sect. Saxifragae. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 525. — Sternb. 1831. Rev. Saxifr. = Arabisa Tausch.

Gymnoperistomati Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 141: class. II. Muscor. Gen.: Sphagnum, Hedwigia, Gymnostomum. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 136.

Gymnopetalum Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 278: nov. g. Cucurbitear. (Bryonia tubiflora W. & A.) — Par. Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 270. — Meisn. 1843. Comm. p. 356. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.

Endl. 1842. Spl. II. p. 77 post n. 5140: g. Cucumerinar. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 203. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 17. 99. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 679.

*) ὀνύχιον, parva ungula.

Gymnophlaea Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101 (*Gymnophloea*); 1843. Phycol. gener. p. 390; 1849. Spec. Alg. p. 711. n. 472: g. Gymnophlaeacear.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 145: g. Gloiocladear.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: g. Eududresnayear.

Gymnophlaeaceae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101 (*Gymnophloeaceae*); 1843. Phycol. gener. p. 390: fam. Periblastear. Gen.: Gymnophlaea, Helminthora, Naccaria. — Par. Kütz. (1845. Phyc. germ. p. 298) 1849. Sp. Alg. p. 711. Gen.: Gymnophlaea, Nemalion, Gloiosiphonia, Naccaria.

Gymnophloea Kütz. 1843 vid. *Gymnophlaea.*

Gymnophloeaceae Kütz. 1843 vid. *Gymnophlaeaceae.*

Gymnophlomis Benth. 1834. Labiat. p. 623; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 537: subsect. Euphlomidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 851. — Walp. 1845. Rep. III. p. 880.

Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4106. 2: sect. Phlomidis.

Gymnophyton Hook. f. 1846. Fl. antarct. p. 289 (Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 220): sect. Myzodendri. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 18. n. 4581 *a.*

Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 361: sect. Mitodendri.

Gymnophyton Clos 1847 in Gay Fl. Chil. III. p. 102: nov. g. a Mulino DC. sejunctum. (*Cf.* Phil. 1860. Fl. Atacam. p. 24: *Gymnophytum.*)

Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 978: g. Mulinear.

Gymnopogon Scopoli 1777. Introd. p. 154: g. Monocarpiar., inter Rauwolfiam et Sideroxylon collocatum.

— . . . ?

Gymnopogon Palis. 1812. Agrost. p. 41. t. 9. f. 3: nov. g. Graminear. (Andropogon ambiguus Michx.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 23. 421. n. 256. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 137. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 272. n. 284.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73; 1830. Gram. p. 96; 1833. Agrost. p. 284: g. Chloridear. — Par. Nees 1829. Agrost. Bras. p. 426. — Endl. 1837. Gen. n. 849. p. 94; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 336. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1323. — Meisn. 1843. Gen. p. 422 (323). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Steud. 1854. Glum. I. p. 217.

Trin. 1820. Fund. p. 124: g. Triandr. Digyn.

Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 678): g. Chlorideor.

Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 918: g. Stipacear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Cynodonear.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 54. n. 260: g. Graminum.

Gymnopogon Palis. cont.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Chlorear.

Synon. Anthopogon Nutt.; Aloëatheros Ell.; Alloiatheros Steud.

Gymnopogoneae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. III. p. 358: cohors Chloridear. Gen.: Cynodon, Eutriana, Polyschistis.

Gymnopolyspermae „Boerh." Hall 1742. En. stirp. Helv. I. p. 319: div. Dicotyledonum petalodear. polystemonum. Gen. §. 1: Adonis, Trinitas, Ficaria, Ranunculus, Anemone, Clematis. §. 2: Dryas, Caryophyllata, Comarum, Potentilla, Sibbaldia, Fragaria, Rubus.

Gymnopsis DC. 1836. Prodr. V. p. 561: g. Rudbeckiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2520. p. 410; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1839. Gen. p. 202 (131). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3623. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 316: g. Euhelianthear.

Synon. Gymnolomia HBK.; Gymnoloma Bartl.; Aldama Llav.?

Gymnopsorae Rchb. 1828. Consp. p. 17. 19 (1832. Fl. exc. p. L): ordo Lichenum. Formationes: Blastopsorae, Hyphopsorae.

Gymnopterides Rchb. 1828. Consp. p. 38: vid. *Polypodiaceae nudae.*

Gymnopteris Bernhardi 1800 in Schrad. Journ. II. p. 121: nov. g. Filicum gyratar.

Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 20: g. Cathetogyratar. Fam.: Blechnoideae, Grammitides, Hemionitides, Asplenoideae, Ceteracha.

Gymnopteris Presl 1836. Pterid. p. 242: g. Acrostichacear. Sect.: Gymnopteris, Anapausia. *Cf.* Presl 1850. Epimel. bot. p. 510. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 147.

J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 403: g. Acrostichiear.

Endl. 1841. Spl. I. p. 1345. n. 603 *b* ₁; 1841. Ench. p. 35. n. 603 *b* ₁: sect. Acrostichi. Subsect. ut Presl. (Eugymnopteris in Ench.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 987. 7. Subsect.: Hymenolepis, Anapausia. — Meisn. 1843. Gen. p. 430 (330).

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.

Synon. Hymenolepis Kaulf.; Hyalolepis Kunze.

Gymnopteris Presl 1836. Pterid. p. 244: sect. Gymnopteridis. — Simil. Endl. 1841. Spl. I. p. 1345. n. 306 *b* ₁ *aa.*

J. Smith 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 156: g. Acrostichiear.

= Eugymnopteris Endl.

Gymnopteris Fée 1844. Acrost. p. 18. 83; 1852. Gen. Fil. p. 55: g. Acrostichear. emend. (Gymnopteridis, Acrostichi, Anapansiae et Poecilopteridis sp. Auct.)

Gymnopteris Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693: g. Acrostichear., alio modo circumscriptum. (*Poecilopteris* et *Gymnopteris Presl*, *Photinopteris Sm.*, *Hymenolepis* et *Leptochilus Kaulf.)*

Gymnopus Pers. 1801. Syn. p. XVI. 302; 1828. Mycol. eur. III. p. 113: sect. Agarici. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 187. — Mart. 1817. Erlang. p. 409. — Leman 1820. Dict. v. 17. p. 208.

Fries 1815. Obs. myc. I. p. 8; 1818. II. p. 89: fam. Agarici.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 604: g. Agaricidear. (A. pratensis, reflexus, macrorhizus, badipus etc. Pers.)

Gymnoreima Decaisne . . . . in Jacquem. voy. p. 122: sect. Lithospermi. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 77. n. 3761 *g.*

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656 (*Gymnoreime):* g. Anchusidar.

Gymnoreime Lindl. vid. *praeced.*

Gymnorrhoea Leand. de Sacram. mss.

Baill. 1858. Euphorb. p. 532 (*Gymnarrhoea*): sect. Actinostemonis.

Dactylostemon Klotzsch.

Gymnoschoenus Nees 1841. Ann. nat. hist. VI. p. 47: nov. g. Cyperacear., Arthrostylidi R. Br. aff. (Chaetospora sphaerocephala et anceps R. Br.?)

Endl. 1842. Spl. II. p. 10. n. 978/₁: g. Schoenoidear.

Meisn. 1843. Comm. p. 371: g. Rhynchosporear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 166.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Schoenidar.

Gymnosciadium Hochstett. 1844. Flora I. p. 20: nov. g. Amminear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 848.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

= Euapium DC. pt.

Gymnoscyphus Corda 1835 in Sturm Jungerm. p. 158. t. 42: nov. g. Jungermanniacear. (G. repens.)

Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 16: g. Aploziear.

Nees 1836. Eur. Leberm. II. p. 381: g. Jungermanniar. propriar.

Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXIII; 1845. Syn. Hepat. p. 191: g. Jungermannidear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 472/₂₄. p. 1343; 1841. Ench. p. 28. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 29.

Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 813: g. Jungermanniear. genuinar.?

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Jungermannidar.

Gymnosiphon Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 29: nov. g. Burmanniacear. (G. aphyllum.) — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXVI in adnot. — Endl. 1837. Gen. n. 1217. p. 164; 1841. Ench. p. 96. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127 (*Gymnosyphon*). 163. — Meisn. 1842. Gen. p. 390 (292). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 119. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 615.

Gymnosiphon Blume cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1643: g. Burmanniear.
Miers 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 549; 1848. Ann. and Mag. 2d. ser. I. p. 235: g. Apteriear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 172.

Gymnosoreae Presl 1836. Pterid. p. 164: cohors Cathetogyratar. Trib.: Vittariaceae, Polypodiaceae, Grammitaceae, Taenitideae, Acrostichaceae.

Gymnosorus Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 108: nov. g. Peyssoneliear. (Nardoa heteromorpha Zan.)

Gymnosperma Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 49: div. Dermatocarpor. Gen. Gymnospermor. Pers. 1801 (exceptis Onygena et Conoplea) et Cribraria, Dictydium, Chaenocarpus, Röstelia.

Gymnosperma Lessing 1832. Syn. Compos. p. 194: nov. g. Asterear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 44.
DC. 1836. Pr. V. p. 311: g. Gymnospermear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2360. p. 382; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 187 (127). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 191. — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3315. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Solidaginear.
Synon. Selloa Spreng.

Gymnospermae Gmelin 1768. Fl. Sibir. III. p. 226: ordo Ringentium. Gen.: Salvia, Scutellaria, Dracocephalum, Leonurus, Prunella, Nepeta, Betonica, Stachys, Galeopsis, Lamium, Phlomis, Glechoma, Lavendula, Hyssopus, Origanum, Clinopodium, Thymus, Mentha, Lycopus, Amethystea. — Par. Crantz 1769. Stirp. austr. p. 236. Gen. fere ead.

Gymnospermae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. clav.: trib. 2 Exogenar. Ord.: Cycadeae, Coniferae.
Lindl. 1833. Nix. p. 32: class. II. plant. Ord.: Cycadeae, Coniferae, Taxinae, Equisetaceae.
Endl. 1837. Gen. p. 258; 1841. Ench. p. 138: cohors Acramphibryor. Class. unica: Coniferae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. XXXII. 135: subramificatio Dicotyledonear. Class.: Coniferae, Cycadoideae.
Karst. 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 216. Divis.: Strobuliferae, Coniferae, Drupiferae.

Gymnospermeae DC. 1836. Prodr. V. p. 310: subdiv. Chrysocomear. Gen.: Xanthocoma, Xerothamnus, Anaglypha, Gymnosperma. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 382; 1841. Ench. p. 235. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 187 (126). Gen. ead.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951: subdiv. Bellidear. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Asteroidear. Gen. ead.

Gymnospermeae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 82; 1843. Phycol. gener. p. 146: trib. Isocarpear. Ord.: Eremospermeae, Cryptospermeae, Pycnospermeae.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 118: trib. Chlorophycear. Ord. iidem.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 145: trib. Malacophycear. Ord. iidem.

Gymnospermi Pers. 1801. Syn. Fung. p. XV: div. Dermatocarpor. Gen.: Licea, Tubulina, Mucor, Onygena, Aecidium, Uredo, Puccinia, Trichoderma, Conoplea.

Gymnospermia Linn. Gen., Syst., Spec., etc., sequentibus auctoribus Linnaeanis: ordo prior Didynamiae.

Gymnospermium Spach 1839. Hist. vég. phan. VIII. p. 66: nov. g. Leonticinear. (Leontice altaica Pall.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 408 (*Gymnospermum*).

Gymnospermum Wittst. vid. *praeced.*

Gymnosphace Benth. 1833 in Hook. Bot. Misc. III. p. 374; 1833. Labiat. p. 310: sect. Salviae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 756. — Endl. 1838. Gen. n. 3597 *n.* p. 615; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4144. 10. — Walp. 1845. Rep. III. p. 677.

Gymnosphaera*) Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 242: nov. g. Polypodiacear., inter Chnoophoram Kaulf. et Trichopteridem Presl intermedium. (G. glabra et squamulata.)
J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 419; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 667 (*Gymnosphera*): g. Cyathear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 341: sect. Alsophilae.
= Haplophlebia Mart.?

Gymnosphaeria Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 267: sect. Sphaeriae. (Denudatae, Byssisedae, Villosae et Pertusae Fr.)

Gymnosphera J. Smith vid. *Gymnosphaera Blume.*

Gymnosporae Schleiden 1843. Grundz. II. p. 24: class. I. plant. Divis.: Algae, Lichenes, Fungi.

Gymnosporae Hasskarl 1848. Pl. jav. rar. p. VIII: div. Agamar. Subdivis.: *Arhizae* (sect.: Hepaticae, Musci), *Radicatae* (sect.: Lycopodiaceae, Filices, Equisetaceae).

Gymnosporangiae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): div. Epiphyllosporar. Sect.: Woodsiacea, Polypodiacea.

Gymnosporangideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 533. 546: div. Protomycear. Gen.: Gymnosporangium.

Gymnosporangium „Hedw." DC. 1805. Fl. franç. II. p. 216: nov. g. Angiocarpor. (Tremella juniperina L.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 140.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 562. n. 3580; 1831. Gen. II. p. 784. n. 4060: g. Coniomycetum suffultor.

---

*) σφαῖρα, globulus.

Gymnosporangium Hedw. cont. Endl. 1836. Gen. n. 187. p. 17; 1841. Ench. p. 13: g. Entophytor. Sect.: Gymnosporangium, Podisoma.
= Gymnosporangium et Podisoma Link.

Gymnosporangium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 9: g. Epiphytar., sejuncto Podisomate emendat.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 34: g. Mucedinum (Tremelloidear.)
Nees 1816. Syst. p. 37. f. 23 a.
Mart. 1817. Erlang. p. 333: g. Coniomycetum suffultor.
Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 12: g. Exosporior.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 546: g. Gymnosporangidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 84: g. Tremellinar.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 522: g. Uredinear. (verar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75.
Link 1825. Spec. II. p. 127: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 190: g. Sporodesmior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 33.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Pucciniastror.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 89: g. Spondylomycetum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 505: g. Hypodermior.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 229: g. Sporomycetum hyposporor.
Endl. 1836. Gen. n. 187*b*. p. 17; 1841. Ench. p. 13: sect. Gymnosporangii.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 23: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 29.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Pucciniaeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 474: g. Coryneaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 419: g. Sporidesmiear.
Tul. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 188: g. Puccinieor.

Gymnosporeae Zanardini 1843. Classif. Fic. Tab.: series Ascophycear. Sect.: Endogymnosporeae, Ectogymnosporeae, Antheridieae, Antheridiosporeae.

Gymnosporeae A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 415: div. Acotyledonear. cellularium. (Hepaticae, Musci.)

Gymnospori Spreng. 1827. Syst. IV. p. 238: div. Lichenum. Gen.: Coniocybe, Calycium, Sphaerophoron. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 746. Gen. ead. et Coniocarpon.

Gymnosporia Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 159: sect. Celastri.
= Catha Forsk.

Gymnosporium Corda 1836 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 69. t. 35: nov. g. Fungor. (G. olivaceum.)
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 1; 1838. II. p. 1. t. 8; 1842. V. p. 3. 49; 1842. Mycol. p. 10: g. Caeomacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 102 (*Gynosporium*).
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 57: g. Stilbosporear. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 46.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.?

Gymnostachium Rchb. vid. *Gymnostachyum Nees.*

Gymnostachyeae Rchb. 1828. Consp. p. 44: subdiv. Taccacear. Gen.: Gymnostachys, Acorus.

Gymnostachys R. Brown 1810. Prodr. I. p. 337. Ed. Nees p. 193: nov. g. Orontiacear. (G. anceps.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 68.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 126; 1825. Syst. I. p. 490. n. 542: g. Aroidear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 28. 457. n. 564. — Agdh. 1822. Aphor. p. 132. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 135.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 142: g. Aroidar.
Rchb. 1828. Consp. p. 44. n. 776: g. Gymnostachyear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 113. n. 570: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 549.
Schott 1832. Melet. p. 22: g. Acoroidear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1707. p. 240; 1841. Ench. p. 129. — Kunth 1841. Enum. III. p. 86. — Meisn. 1842. Gen. p. 360 (269). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 33.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 365: g. Acoracear.
Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1722: g. Acorinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 194: g. Acorear.

Gymnostachyum Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 106: nov. g. Gendarussear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190 (*Gymnostachium*); 1841. Nom. p. 110. n. 4279. — Endl. 1839. Gen. n. 4086. p. 705; 1841. Ench. p. 343. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146 (*Gymnostechium*). — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204).
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 70: g. Acanthacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Justiciadar.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 93: g. Hygrophilear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 779.

Gymnostechyum Spach vid. *praeced.*

Gymnostegia DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 508: sect. Scaevolae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 4008. 2.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1391. n 3038 *b α*: subsect. Xerocarpae.

Gymnostephia Walp. Repert. II. p. 712: err. (?) pro *Gymnostegia.*

Gymnostephium Lessing 1832. Syn. Compos. p. 185: nov. g. Asterear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.)

Gymnostephium Lessing cont.
Nees 1833. Aster. p. 253: g. Asterum plumigeror.
DC. 1836. Pr. V. p. 300: g. Heteropappear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2340. p. 379; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 185 (126). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3258: g. Boltoniear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Gymnostichum Schreb. . . . . Gram. t. 43: nov. g. Graminear. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 311.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 844; 1841. Nom. p. 39. n. 1378: g. Hordeacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Endl. 1837. Gen. n. 916. p. 103; 1841. Ench. p. 60. — Meisn. 1843. Gen. p. 426 (326). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Hordear. *Synon.* Asprella Willd.; Hystrix Mönch.

Gymnostomae Agardh 1822. Aphor. p. 107: vid. *Musci Agdh.*

Gymnostomea Rchb. 1828. Consp. p. 33: sect. Splachnoideor. Gen.: Gymnostomum, Hymenostylium, Pyramidium, Entosthymenium.

Gymnostomeae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75: sect. Muscear. Gen.: Gymnostomum, etc.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: trib. Apogonor. Gen.: Gymnostomum, Extinctorium, Schistotega, Anictangium, Hedwigia.

Gymnostomi Brid. 1822. Meth. musc. p. XIII. 11: classis Vaginulator. Ordines: *Acrocarpi* (Gymnostomum, Pyramidula, Schistidium), *Pleurocarpi* (Anoectangium).
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 21: class. II. Muscor. Gen.: Sphagnum, Schistidium, Gymnostomum, Anoectangium, Schistostega, Hymenostomum.

Gymnostomi Brid. Meth. musc. p. XVIII: vid. *Epistomi Brid.*

Gymnostomoideae Grev. & Arn. 1824. Mem. Wern. Soc. V. 1. p. 42: trib. Muscor. Gen.: Gymnostomum, Schistostega, Anictangium, Hedwigia. — Par. Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 219. Gen. ead.

Gymnostomoidei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLII: fam. Vaginulator. acrocarpor. Gen.: Gymnostomum, Hymenostomum, Hymenostylium, Pyramidium. *Affinia:* Hyophila, Physcomitrium, Entosthymenium.

Gymnostomum Hedwig 1782. Fund. hist. musc. II. p. 87; 1801. Sp. Musc. p. 30: nov. g. Muscor. (frondosor.) ab auctoribus varia latitudine adoptatum. (Typi Hedwigiani: Bryum pyriforme, truncatulum, pusillum.) — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 758. n. 1638. — Mönch 1794. Meth. p. 728. — Roth 1800. Germ. III. p. 121. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 286. — Rebent. 1804. Neom. p. 251. Sect.: Gymnostoma, Sphagna. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 29. — DC. 1805. Franç. II. p. 444; 1815. V. p. 206. Sect.: Anyctangium, Gymnostomum. — Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 71. Sect.: Gymnostomum (Hedw.), Anictangium. — Mart. 1817. Erlang. p. 119. — Leman 1821. Dict. v. 20. p. 142 (includens Schistidium et Anictangium). — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 713. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 143. n. 3288; 1831. Gen. II. p. 727. n. 3684. (frondosor. *Synon. Physcomitrion et Rottleria Brid.*) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 94. (anoplostomor.) Sect.: Holomitria, Pyramitria, Schizomitria. — Math. 1853. Belg. II. p. 69.
Hoffm. 1795. Crypt. p. 27: g. Calyptrator.
Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 152; II. 1. p. 36; 1806. Spl. I. p. 27: g. Gymnoperistomator. — Par. Röhl. 1810. Ann. Wett. Ges. II. p. 115.
Batsch 1802. Tab. p. 264: g. Muscoideor.
Palis. 1805. Aethéog. p. 14; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 435: g. Apogonor. *Cf.* Desvaux 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 217.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 36: g. Mitrocarpor.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 11: g. Gymnostomor. (Acrocarpor.) — Par. Nees & Hornsch. 1823. Bryol. germ. I. p. 112. — Hüb. 1833. Musc. germ. p. 34.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75; 1829. Anal. fam. p. 69: g. Gymnostomear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 45.
Agdh. 1822. Aphor. p. 107: g. Gymnostomar.
Grev. & Arn. 1824. Mem. Wern. Soc. V. 1. p. 43: g. Gymnostomoidear. — Par. Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 219.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 57: g. Acrocarpor. (gymnostomor. et 1827. ibid. II. p. XLII: g. Gymnostomoideor.) — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 510.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 771: g. Bryoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 153.
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 584: g. Gymnostomeor. Sect.: Pottia, Physcomitrium, Hyophila.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Weissioidear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 80.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.
Endl. 1836. Gen. n. 483. p. 47; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear. Sect.: Gymnostomum, Physcomitrium. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 5.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 858: g. Calyptrobryor. Sect. ut Endl.
Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: g. Weisiacear. — Par Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 121. Sect.: Gymnoweisia, Gymneucladium.
Augstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 96: g. Dicranear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.
Bayrh. 1849. Taun. p. 6: g. Weissiacear.

Gymnostomum Hedw. cont.
Wils. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 58: g. Weissiar.
= Pottia Ehrh.

Gymnostrix Dietr. vid. *Gymnotrix Palis.*

Gymnostyleae Rchb. 1828. Consp. p. 102: subdiv. Echinopcar. Gen.: Soliva.

Gymnostyles Juss. 1804. Ann. Mus. IV. p. 258: nov. g. Corymbiferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 383.
Pers. 1807. Ench. II. p. 497. n. 1951: g. Syngenes Necessar. — Par. Willd. 1809. En. p. 940. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 184.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 552; 1826. Syst. III. p. 499. n. 2736; 1831. Gen. II. p. 620. n. 3077: g. Eupatorinar.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 152: g. Anthemidear.
Link 1822. En. II. p. 365: g. Discoidear.
Tratt. 1825. Nov. pl. gen. nr. 9: g. Compositar. *Cf.* Flora 1825. II. p. 764.
Link 1829. Hdb. I. p. 724: g. Elichrysear.
= Soliva Ruiz & Pav.

Gymnosyphon Dietr. vid. *Gymnosiphon Blume.*

Gymnotetraspermae Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 630: div. Dicotyledonum petalodear.
= Labiatae B. Juss.

Gymnothalamae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 101: subordo Fucacear. Divis.: Siphonothallae, Trichothallae, Dermatothallae.

Gymnothalamae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 108: subordo Floridar. Trib. unica: Peyssonelieae.

Gymnothalamium Zenker mss. (nov. g. Filicum) teste Kunze.
= Aspidii sp.

Gymnotheca Decaisne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 100: nov. g. Saururear. (G. chinensis.) — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 18. n. $1824/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 521: g. Saururacear.? (ibid. p. 745 Loasear.?)
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 387: g. Houttuyniear.

Gymnotheca „Presl mss." Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 92: nov. g. Marattiacear. (Nomen.)
Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 272: g. Marattiear. (Marattia cicutifolia, Raddiana.) — Par. Vriese & Hart. 1853. Mon. d. Maratt.

Gymnothecamycetes Bail 1858. Syst. Pilz. p. 41: ordo Thecasporear.
= Mucorini Bonord.

Gymnothecium Pers. 1797. Tent. disp. p. 16: class. II. Fungor. Ordines: Sarcothecium, Litothecium, Hymenothecium, Nematothecium.

Gymnotrix Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 154: g. Panicear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 148. — Nees. 1829. Agrost. Bras. p. 277. — Meisn. 1843. Gen. p. 416 (319). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.

Gymnothrix Spreng. cont.
— Schltd. 1852. Linnaea XXV. p. 559.
Trin. 1820. Fund. Agrost. p. 170: g. Graminum.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 302: sect. Penniseti. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 926 *b*; 1841. Nom. p. 37. n. 1288. 1. — Endl. 1837. Gen. n. 781 *b*. p. 85; 1841. Ench. p. 57. — Steud. 1854. Glum. I. p. 102.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Setariear.
= Gymnotrix Palis.

Gymnothyrsus Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 204: sect. Alni. (A. glutinosa, etc.)
Endl. 1847. Spl. IV. p. 21. n. 1841 *c β*: subsect. Alni.

Gymnotrix Palis. 1812. Agrost. p. 59. t. 13 f. 6: g. Graminear. — Par. Röm. & Schult 1817. Syst. II. p. 28. 499. n. 281. — Poir 1821. Dict. v. 20. p. 156. — Brongn 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 102.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 112; 1822. Syn. I. p. 185; 1833. Agrost. p. 158: g. Panicear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 133 (*Gymnostrix*). 295. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 10.
Synon. Gymnothrix Spreng.: Catatherophora Steud.

Gymnotus Fries 1836. Epicr. p. 191: sect. Naucoriae.

Gymnoweisia Bruch & Schimp. 1846. Bryol. eur. Fasc. 33—36: sect. Gymnostomi. (G. bicolor.) — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 121.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402 (*Gymnoweissia*): g. Weissiear.
= Hymenostylium Brid.

Gymnoweissia Montagne vid. *praeced.*

Gymnozyga Ehrenb. 1840. Ber. Ak. Berl. p. 212: g. Bacillarior.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 99: g. Desmidiear.
Bambusina Kütz.

Gymnurus C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 359: sect. Arthrosolenis. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 63. n. 2100 *B*.

Gynaecocephalium Hassk. vid. *Gynocephalum Blume.*

Gynaecopachys Hassk. vid. *Gynopachys Blume.*

Gynaecotrochus Hassk. vid. *Gynotroches Blume.*

Gynaecura Hassk. vid. *Gynura Cass.*

Gynaion*) A. DC. 1845. Prodr. IX. p. 468: nov. g. Cordiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 629: g. Cordiacear.

Gynamblosis Baillon vid. *Gymnamblosis Torr.*

Gynandrae Agardh 1823. Aphor. p. 179; 1825. Class. plant. p. 9; 1826. Isis p. 585: class. V. Cryptocotyledonear. Ordines: Musaceae, Cannaceae, Scitamineae, Orchi-

*) γύναιον, muliercula: quia pistillum abbreviatum stylo destitutum.

Gynandrae Agardh cont.
deae. (*Cf.* Agdh. 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 98.) — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 121. Ordines: Museae, Canneae, Scitamineae, Stylideae, Orchideae.
Perleb 1838. Clav. class. etc. (Isis 1838. p. 811): ordo Ternariar. Fam. 75—78.

Gynandrae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 34: cohors Endogenar. Ordines: Orchideae, Cypripedieae, Apostasieae.
Endl. 1837. Gen. p. 185; 1841. Ench. p. 107: class. Acramphibryor. Ordines: Orchideae, Apostasieae.
Meisn. 1842. Gen. p. 367. 442 (275): class. 42 Monocotyledonear. Ord. ut Endl.

*Gynandria**) Linn. Gen., Syst., Spec. etc. (sequentibus auctoribus Linnaeanis): class. XX. plantar. Ordines: Di-, Tri-, Tetr-, Pent-, Hex-, Dec-, Polyandria.

Gynandriris Parlat. 1854. Nuovi gen. monocot. p. 49: nov. g. Iridear. (Iris Sisyrinchium L.) — Par. (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 246.

Gynandropsis DC. 1824. Prodr. I. p. 237: nov. g. Cleomear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4860; 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 185. n. 7104. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51. — Bartl. 1830. Ord. p. 266. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 271. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 21. — Meisn. 1837. Gen. p. 17 (15). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 313. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 121. Sect.: Gymnogonia. — Endl. 1839. Gen. n. 4984. p. 890; 1841. Ench. p. 456. Sect.: Gymnogonia, Eugynandropsis. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 90. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358. — Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 59.
R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. App. p. 222 (Verm. bot. Schr. IV. p. 28): subg. Cleomes.
Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. 23: sect. Cleomes. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1064. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 74.
Link 1831. Hdb. II. p. 321: g. Capparidear.
Synon. Sinapistrum Medic.

Gynanthistrophe „Poit." Steud. Nomencl.: vid. *seq.*

Gynantistrophe Poiteau mss.
= Tounatea Aubl.

Gynapteina Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 871: sect. Araliae.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 113: g. Araliacear.
= Hedera Linn.

Gy̆nastrum Necker 1790. Elem. bot. I. p. 224. n. 371: g. Dicroophytor.
= Guapira Aubl.

Gyneheteria „Willd." DC. Prodr. V. p. 456 in synon. Tessariae: vid. *Gynheteria Willd.*

*) Conf. Beckmann Lex. bot. p. 99.

Gynema Rafin. 1817. Fl. Ludov. (*vid. Gymnema Raf.*)
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 157: g. Gnaphaliear.
Stylimnus Rafin.

Gynerium*) Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 112. t. 115: nov. g. Graminear. (Dioec. Diandr.) — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 138. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 159. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 322. n. 324.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 149; 1822. Syn. I. p. 213; 1830. Gram. p. 80; 1833. Agrost. p. 251: g. Arundinacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 461. — Endl. 1837. Gen. n. 826. p. 91; 1841. Ench. p. 58. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 135. 327. — Meisn. 1843. Gen. p. 420 (322). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 8. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 162. — Steud. 1854. Glum. I. p. 197.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 160: g. Avenacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 149. — Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1050.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Bromear.
Rchb. 1841. Nom. p. 35. n. 1193: g. Arundinear. — Par. Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 153. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.

Gynestum**) Poiteau 1822. Mém. Mus. IX. p. 387: nov. g. Palmar. (G. maximum t. 1, etc.) — Par. Poir. 1829. Dict. v. 59. p. 94 (*Wouaie*).
= Geonoma Willd.

Gyneteria „Willd." Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 899: g. Centaurear. *Cf. Gynheteria Willd.*
Spreng. 1821. Neue Entd. II. p. 135; 1826. Syst. III. p. 482. n. 2725; 1831. Gen. II. p. 619. n. 3070: g. Eupatorinar.
= Tessaria Ruiz & Pav.

Gynheteria***) Willd. 1807. Mag. Ges. naturf. Fr. Berl. I. p. 140: nov. g. Syngenes. Necessar. *Cf. Gyneteria.*
Less. 1832. Syn. p. 208: g. Epaltidear.
= Tessaria Ruiz & Pav.

Gynicidia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 81. n. 736: nov. g. Sarcodiphytor., a Mesembryanthemo L. disjunctum.

Gynobaseae Agardh 1825. Class. plant. p. 15; 1826. Isis p. 589: class. Phanerocotyledonear. completar. discigynar. Ord.: Ochnaceae, Simarubeae, Rutaceae, Zygophylleae, Geraniaceae.

Gynobasicae Lindl. 1833. Nix. pl. Ed. germ. p. 15: cohors 2 Polypetalar. Nixus: Rutales, Geraniales, Coriales, Flörkeales.

Gynocampus „Lesch." Steud. Nom. I. p. 714; II. p. 21: vid. *Gymnocampus Lesch.*

*) ἔριον, lana.
**) „Id est germen vestitum".
***) ἕτερος, alter, diversus. An ἑταιρία, connexio (Wittst.)?

Gynocardia Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 95. t. 299: nov. g. Dioec. Polyandr. (G. odorata.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 490.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 632. n. 2013; 1830. Gen. I. p. 453. n. 2237: g. Capparidear.? (in Polyandr. Pentagyn.)
Meisn. 1837. Gen. p. 17 (15): g. Capparear.?
Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 209: g. Pangiear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 58ª. — Blume 1848. Rumphia IV. p. 23. — Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 364; 1857. ibid. VIII. p. 267.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 214. 293: g. Bixinear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 324: g. Pangiacear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 47. n. 5085/$_3$.
Synon. Chaulmoogra Roxb.; Chilmoria Hamilt.; Hydnocarpi pars Endl.

Gynocephalium Endl. 1837. Gen. n. 1870. p. 281; 1841. Ench. p. 168: g. Artocarpear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 349 (260)?
Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 49: g. Morear.? *Cf.* Endl. Spl. I. p. 1375.
Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2531 (*Gyrocephalium*): g. Brosimear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 38: g. Artocarpidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 271: g. Artocarpacear.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 256: g. Phytocrenear.
= Gynocephalum Blume.

Gynocephalum Blume 1825. Bijdr. Nr. 9. p. 483: g. Artocarpear.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 78 (*Gynaecocephalium*): g. Proteaceis aff. — Par. Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 69. 147. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 667.
Synon. Phytocrene Wall.; Gynocephalium Endl.; Gyrocephalium Rchb.

Gynochlamydae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 57: class. (12) Chlamydanthar. Ord.: Iridarieae, Narcissarieae, Taccarieae, Tamarieae.

Gynochthodes G. Don vid. *seq.*

Gynochtodes*) Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 993: nov. g. Rubiacear. — Par. Dcne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 419 (*Gynoctodes*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 421 (*Gynoctodes*). 497.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 208: g. Guettardacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375.
DC. 1830. Pr. IV. p. 467: g. Guettardear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 558 (*Gynochthodes*). — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2860. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3210. p. 543; 1841. Ench. p. 273: g. Euguettardear.

Gynochtodes Blume cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 313: g. Pyrostriear.

Gynocoronae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 28: class. (5) Coronanthar. Ord.: Vaccinarieae, Cucurbarieae, Gesnerarieae, Campanarieae; Synanthereae; Dipsarieae, Rubiarieae, Viburnarieae. Samolinarieae.

Gynoctodes Dcne, Dietr. vid. *Gynochtodes Blume.*

Gynomane Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 411: sect. Caricis. (C. Linkii Schk.)

Gynoon*) A. Juss. 1824. Euphorb. p. 17: nov. g. Euphorbiacear. *Cf.* Ann. sc. nat. I. 1824. p. 148. — Par. Wight & Arn. 1833. Edinb. n. phil. journ. XIV. p. 299.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5070; 1841. Nom. p. 195. n. 7419: g. Phyllanthear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486. — Endl. 1840. Gen. n. 5856. p. 1121; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 343 (254). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Ét. Euphorb. p. 637 Glochidioni injungit.

Gynopachis Spach vid. *seq.*

Gynopachys Blume 1823. Cat. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 134: nov. g. Cinchonacear. — Par. Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 115 (*Gynaecopachys*).
Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 983: g. Rubiacear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 263: g. Gardeniar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 374: g. Gardeniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 492. — Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372 (*Gynopachis*). — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2967. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3310. p. 563; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 219: g. Randiear.

Gynopera G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 206: sect. Saxifragae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 367.
= Hydatica Tausch.

Gynopetalae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 33: class. (6) Petalanthar. Ord.: Loranthariceae, Cornariceae, Umbellarieae, Bruniarieae.

Gynopleura Cavan. 1797. Icon. IV. p. 51. t. 376: nov. g. Pentandr. Trigyn. (G. tubulosa et linearifolia.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 828; 1825. Syst. I. p. 947. n. 1127: g. Ionidior.? (in Gen. I. p. 252 Malesherbiae injunctum.)
Presl 1836 in Reliq. Hänk. II. p. 45.
Meisn. 1838. Gen. p. 123 (89): g. Malesherbiacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n.

*) ἀγχθώδης, marginatus.

*) Nomen a stigmatum connatorum forma.

Gynopleura Cav. cont.
5109. p. 929; 1841. Ench. p. 484. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 335. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 608.
Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5067: g. Malesherbiear.

Gynopogon Forst. 1776. Char. gen. p. 35. t. 18: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 161. n. 414. — Gmel. 1791. Syst. p. 430. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1221. n. 474.
Juss. 1789. Gen. p. 148: g. Apocinear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 335.
Gis. 1792. Prael. p. 402: g. Contortar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 201.
Pers. 1805. Ench. I. p. 266. n. 609: g. Apocynear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 116. n. 511. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 161.
= Alyxia Banks.

Gynosepalae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 13: class. Sepalanthar. Ord.: Santalarieae, Gyrocarparieae, Datiscarieae, Begonarieae, Aristolarieae, Cytinarieae.

Gynosporium Preuss vid. *Gymnosporium Corda.*

Gynostemma Blume 1825. Bijdr. Nr. 1. p. 23: nov. g. Menispermear. *Cf.* Linnaea I. p. 497. — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 246. — Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1883; 1841. Nom. p. 70. n. 2627. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 243. — Meisn. 1837. Gen. p. 5 (7). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 7. — Walp. 1842. Rep. I. p. 98.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 104: g. Lardizabalear.
Endl. 1839. Gen. p. 827. n. 4696: g. Menispermacear. dubium.
Decne 1839. Arch. Mus. I. p. 147 adnot.: g. Cucurbitaceis aff. *Cf.* Endl. Spl. I. p. 1417. — Par. Römer 1846. Fam. nat. II. p. 21. 110.
Endl. 1841. Ench. p. 491. n. $5147/_1$: g. Sicyoidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315: g. Sicear.

Gynostoma DC. 1824. Prodr. I. p. 515: sect. Sloaneae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 555. — Endl. 1840. Gen. n. 5363 *b*. p. 1006; 1841. Ench. p. 522. — Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7948. 2.

Gynotepalae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 56: class. (11) Tepalanthar. Ord.: Cannarieae, Orchidiarieae.

Gynotrocheae Rchb. 1837. Handb. p. 311: sect. Symphoniear. Gen.: Gynotroches.

Gynotroches*) Blume 1825. Bijdr. Nr. 5. p. 218: nov. g. Guttiferar.
Meisn. 1837. Gen. p. 42 (31): g. Symphoniear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 311: g. Gynotrochear.
Endl. 1840. Gen. n. 5453. p. 1028; 1841. Ench. p. 535: g. dubium Clusiacear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 397. — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 213 (*Gynaecotrochus*).

*) τροχός, rota. (?)

Gynotroches Blume cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8039: g. Chrysopiear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402: g. Garciniear.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 126: g. Legnotidear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 592. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 674.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 529: g. Rhizophorear.
Synon. Dryptopetalum Arn.; Microtropis Wall. pt.

Gynoxis Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2500: g. Senecionear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Endl. 1841. Ench. p. 244. n. 2805: g. Eusenecionear.
= Gynoxys Cass.

Gynoxys Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 448. 455; 1830. v. 60. p. 583: nov. g. Senecionear. (Archetypar. — Senecio laurifolius Kth. etc.) — Par. Less. 1832. Syn. p. 390. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3359. (genuinar.)
DC. 1837. Pr. VI. p. 325: g. Eusenecionear. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 457. n. 2805. — Meisn. 1839. Gen. p. 215 (136).
Synon. Gynoxis Rchb.

Gynura Cassini 1825. Dict. v. 34. p. 391; 1827. v. 48. p. 448. 458; 1830. v. 60. p. 583: nov. g. Senecionear. (1827 Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2506; 1841. Nom. p. 86. n. 3345. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 97.
DC. 1837. Pr. VI. p. 298: g. Eusenecionear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2792. p. 455; 1841. Ench. p. 244. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (136). — Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 103 (*Gynaecura*).
Synon. Cacalia Lour.

Gypothamnium*) Philippi „Fl. Atacam. ined." Bot. Zeit. 1857. p. 681: nov. g. Synantherear. (Nomen. *Cf.* descriptionem in Fl. Atacam. 1860. p. 27. t. 3. f. C: G. pinifolium.)

Gypsocallis „Salisb. mss." Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 398: nov. g. Ericinar.
D. Don 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 153: g. Ericear. normalium. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 800.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 667: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d* 37. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4. *l*.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 390: sect. Ericae.

Gypsohila Walp. Repert. I. p. 270: sphalm. pro *Gypsophila.*

*) γύψ, vultur.

G y p s o p h i l a*) Linn. 1751. Amoen. acad. III. Ed. 1787. p. 23; 1753. Sp. I. p. 406; 1759. Syst. ed. X. p. 1028. n. 498; 1762. Sp. ed. II. p. 581; 1764. Gen. ed. VI. p. 224. n. 563; 1767. Syst. ed. XII. p. 306. n. 558: g. Decandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 346; 1784. Syst. p. 415. — Reich. 1778. Gen. p. 229. n. 612. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 302. n. 768. — Gmel. 1791. Syst. p. 708. — Pers. 1797. Syst. p. 444. — Willd. 1799. Sp. II. p. 662. n. 891; 1809. En. p. 463.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian. (*Gypsophyla*): g. Caryophyllear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 301. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 244. — Batsch 1802. Tab. p. 34. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 115. — DC. 1805. Franç. IV. p. 735. — Pers. 1805. Ench. I. p. 492. n. 1115. — Hedw. 1806. Gen. p. 328. n. 1294. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 831 (genuin.); 1825. Syst. II. p. 371. n. 1695; 1830. Gen. I. p. 373. n. 1886. — Lois. 1821. Dict. v. 20. p. 176. — Link 1821. En. I. p. 413. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 266. — D. Don 1825. Nepal. p. 213. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 62. 136. — Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5359. Sect.: Banffya, Struthium, Rokejeka, Petrorhagia. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1540. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 125. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 325.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Caryophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.

Gled. 1764. Syst. p. 95. n. 391: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 60.

Hill 1769. Ht. kew. p. 196: g. Pentapetalar.

Neck. 1790. El. II. p. 162. n. 862: g. Catotaphytor. Sejungitur Asophila.

Cram. 1803. Disp. p. 198 in Dioec. Decandr. (G. paniculata.)

Seringe 1824 in DC. Pr. I. p. 351: g. Silenear. Sect.: Struthium, Petrorhagia. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 143. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1832. Fl. exc. p. 801. Sect.: Banffya, Gypsophila, Tunica. — Dumort 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 306. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 381. Sect. ut Ser. — Link 1831. Hdb. II. p. 234. — Koch 1836. Syn. p. 93. Ed. II. p. 101. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 195. — Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21). — Kunth 1838. Berol. I. p. 109. (genuinar.) — Fries 1842 in Lindbl. Bot. Notis. Nr. 10; 1843. Flora I. p. 124. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 182. Sect.: Eugypsophila, Tunicastrum. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 103. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.

Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Dianthear. (genuinar.) — Par. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 227 (ampliat.) Sect.: Vaccaria, Eugypsophila.

Endl. 1840. Gen. n. 5245. p. 971; 1841. Ench. p. 506; 1842. Spl. II. p. 77: g. Lychnidear. Sect.: Dichoglottis, Heterochroa, Struthium. — Par. Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 288. Sect. eaed. — A. Braun 1843. Flora p. 382. Sect.: Rokejeka, Struthium, Heterochroa, Banffya, Dichoglottis, Hagenia. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 276.

Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7811: g. Saponariear. Sect.: Gypsophila, Rokejeka.

Synon. Lanaria Adans.; Rokejeka Forsk.; Rokeika Scop.; Gypsophytum Ehrh.; Katarsis Med.?; Asophila Neck.?; Banffya Baumg.; Arrostia Rafin.; Struthium Ser.; Banfya Spach.

G y p s o p h i l o i d e s Griseb. 1843. Spic. fl. Rumel. I. p. 184: sect. Tunicae. (T. Saxifraga Scop.)

G y p s o p h y l a B. Juss. vid. *Gypsophila Linn.*

G y p s o p h y t u m Adans. 1763. Fam. II. p. 256: g. Alsinium.
= Arenaria Linn.?

G y p s o p h y t u m Ehrh. 1780. Phytophyl. Nr. 85; 1789. Beitr. IV. p. 149. (Gypsophila fastigiata L.)

G y p t i s Cassini 1818. Bull. soc. philom. Sept. p. 139; 1821. Dict. v. 20. p. 177: subg. Eupatorii.

Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 10; 1823. v. 26. p. 228; 1830. v. 60. p. 585: g. Eupatoriear. (1823 Archetypar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37.

Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2233: g. Eupatorinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 136.

G y r a n d r a „Lindl. mss." Wallich Catal.: g. indescriptum.
= Goughia Wight. (Benth. in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 9.) *Cf. Daphniphyllum Blume.*

G y r a n d r a*) Griseb. 1845 in DC. Prodr. IX. p. 44: nov. g. Chironiear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614: g. Gentianear.

G y r a n d r a Moq.-Tand. olim.
= Tersonia Moq.

G y r a n d r e a e Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 564: div. Euphorbiacear. Gen.: Daphniphyllum.

G y r a n t h u s „Nuttall" Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 509: subsect. Sphaerostigmatis.

Walp. 1843. Rep. II. p. 77: sect. Sphaerostigmatis.

G y r a r i a Nees 1816. Syst. p. 155; 1817. Ueberbl. p. 39: stirps Tremellae. — Simil. Mart. 1817. Erlang. p. 394.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 593: g. Tremellidear. (Tremella mesenterica Jacq.)

Pers. 1822. Mycol. I. p. 99: sect. Tremellae.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.

G y r a t a Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 28: ordo Hypophyllocarpor. Gen. Gyratar. Swartz.

*) Planta amans solum gypsaceum.

*) γῦρος, circulus.

Gyratae Swartz 1806. Syn. Fil. p. 1: div. Filicum. Gen.: Acrostichum, Meniscium, Hemionitis, Grammitis, Taenitis. Polypodium; Aspidium, Asplenium, Caenopteris, Scolopendrium, Diplazium, Lonchitis, Pteris, Vittaria, Onoclea, Blechnum, Woodwardia, Lindsaea, Adianthum, Cheilanthes, Davallia, Dicksonia, Cyathea, Trichomanes, Hymenophyllum.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 145. Ed. Nees p. 1: trib. Filicum. (= *Polypodiaceae R. Brown.*)

Gyratae verae Bernhardi 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 4: subordo Filicum. Divis.: Helicogyratae, Cathetogyratae.

Gyrateae Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 261: class. Filicum. Trib.: Polypodiaceae, Hymenophyllaceae, Pteridaceae.

Gyratylium Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 722: nov. g. Melanconiacear. (G. atrum.)

Gyrenia Knowl. & West. ex Steud. Nomencl. I. p. 716: g. Asphodelear. (G. biflora.) Quid?

Gyrinopeae Meisn. 1857 in DC. Prodr. XIV. 2. p. 495. 601: trib. Aquilarinear. Gen.: Aquilaria, Gyrinops, Gyrinopsis, Leucosmia.

Gyrinops Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 276. t. 140. *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 179.
R. Brown 1818. Narr. exp. Cong. App. 5. p. 444 (Verm. bot. Schr. I. p. 235): g. Aquilarinar. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 225. — Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1786; 1841. Nom. p. 64. n. 2427. — Bartl. 1830. Ord. p. 420.
DC. 1825. Pr. II. p. 60: g. Aquilarinear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 60. — Meisn. 1837. Gen. p. 73 (53). — Endl. 1838. Gen. n. 2110. p. 333; 1841. Ench. p. 211. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 289.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Aquilariacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 579.
Decne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 38: g. Aquilariear.
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 602: g. Gyrinopear.

Gyrinopsis Decaisne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 41: nov. g. Aquilariear. (G. Cumingiana.) *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 599.
Endl. 1843. Spl. III. p. 65. n. 2110: g. Aquilarinear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 410. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 289.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 579: g. Aquilariacear.
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 602: g. Gyrinopear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 883.

Gyrinopsis „Gärtn." Lindl. vid. *Gyrinops Gärtn.*

Gyrocarparieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: ordo Gynosepalar. Fam.: Gyrocarpeae.

Gyrocarpeae Rchb. 1828. Consp. p. 172: sect. Combretacear. Gen.: Gyrocarpus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13. 14: fam. unica Gyrocarparicar. Gen. id.
Nees 1833. Progr. p. 20: trib. Laurinar. Gen. id.
Endl. 1838. Gen. p. 324; 1841. Ench. p. 205: ordo Thymelaear. Gen.: Gyrocarpus, Illigera. Accedit 1842 (Spl. II. p. 35) Sparattanthelium.
Spach 1841. Vég. phan. V. p. 474: fam. Laurineis aff. Gen. ut Endl.
Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239): ordo Daphnoidear. Gen.: Gyrocarpus.
Rchb. 1841. Nom. p. 62: div. Santalacear. Gen. ut Endl.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 119: fam. Daphnoidear. Gen.: Gyrocarpus.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718: trib. Combretacear. Gen. ut Endl.
Synon. Illigereae Blume; Illigeraceae Lindl.

Gyrocarpos Pers. vid. *seq.*

Gyrocarpus Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 282. t. 178 in Append. (G. americanus.)
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 92. t. 97.
Roxb. 1795. Corom. I. p. 1. t. 1; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 465; ed. 1832. I. p. 445: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 145. n. 305 (*Gyrocarpos*). — Hedw. 1806. Gen. p. 79. n. 370.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 982. n. 1891; 1809. En. p. 1043: g. Polygam. Monoec. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 180.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 404. Ed. Nees p. 260: g. Laurinis aff. — Par. HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 192. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 219.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 329: g. Bucidear.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 16. 292. n. 493: g. Myrobalanear. — Par. Link 1821. En. I. p. 145.
Juss. 1824. Dict. v. 31. p. 462: typum novi ordinis declarat.
Agdh. 1825. Aphor. p. 228: g. Laurinar. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 112. n. 565. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 548.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 489. n. 537: g. Thymelaear.
Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4547; 1841. Nom. p. 62. n. 2343: g. Gyrocarpear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14. — Nees 1833. Progr. p. 20. — Endl. 1838. Gen. n. 2068. p. 324; 1841. Ench. p. 205. — Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 474. — Schltd. 1842. Linnaea XVI. p. 397. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 119. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 978.
Bartl. 1830. Ord. p. 323: g. Terminaliear. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 296.
Blume 1833. Nov. fam. p. 14; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 96: g. Illigerear. — Par. Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 370. — Nees 1836. Linnaea p. 699.

Gyrocephalium Rchb. vid. *Gynocephalium Endl.*

Gyrocephalus Pers. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 77: nov. g. Fungor. (Helvellae Brond., Tremellae DC. et Bosc, Phalli Vent. sp.) *Cf.* Brondeau Descr. de deux champignons nouv., etc. (1824).
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 176.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Morchelleor.
= Guepinia Fries.

Gyrocerei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: trib. Sclerochaeteor. Gen.: Gyrothrix, Gyrocerus, Chaetopsis, Streptothrix, Ceratocladium, Circinotrichum.

Gyrocerus Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 9. t. 2. f. 141; 1842. V. p. 5; 1842. Anl. Mycol. p. 19: nov. g. Torulacear. (G. Ammonis.)
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 39: g. Torulaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 38. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Gyrocereor.

Gyrodon Opat. 1836 in Wiegm. Arch. f. Naturg. I. p. 5: nov. g. Boletoideor. (Boletus sistotremoides Fr. et volvatus Pers.) *Cf.* Flora Lit. VI. p. 137.
= Ochrosporus Fries.

Gyrogonites Lam. 1806. Ann. Mus. V. p. 356; 1807. ibid. IX. t. 17. f. 4. (sequentibus Desmar., Brongn., etc.)
= Charae sp. foss. (Unger Syn. p. 16.)

Gyrolecana Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 19. p. 299: sect. Quercus. (Q. acuta Thunb., Reinwardtii Korth., etc.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 385.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 855: subg. Quercus.
= Cyclobalanus Endl.?

Gyrolophium Kunze in Sieb. Crypt. exsicc. nr. 62.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 328: g. Radularior.
Endl. 1836. Gen. n. 439. p. 39; 1841. Ench. p. 21: g. Hydneor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 469.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.

Gyromerieae Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 35: subordo Phytolaccacear.? Trib.: Stegnospermeae, Gyrostemoneae, Tersonieae.

Gyromia*) Nuttall 1818. Gen. Amer. I. p. 238: nov. g. Hexandr. Trigyn. (Medeola virginica L.) *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 161.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53: g. Paridear.
= Medeola Gron.

Gyromitra Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 346: nov. g. Helvellaceor. (Helvellae sp. Auct.)

*) γῦρος, circulus: a foliis verticillatis.

Gyromium Wahlenb. 1826. Fl. suec. II. p. 855: g. Idiothalamar.
Gyrophora Achar.

Gyrophora Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXI. 100: nov. g. Idiothalamor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 182.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 41: g. Idiothalamior.
Achar. 1810. Lich. un. p. 86. 218; 1814. Syn. Lich. p. 63: g. Homogeneor.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handb. II. p. 324: g. Lecidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 92: g. Lobiolatar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 476: g. Gyrophoridear.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 21. f. 29: g. Dermatocarpear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 186: g. Hymenocarpor.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 262; 1831. Gen. II. p. 745. n. 3772 γ: sect. Lecideae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Umbilicariear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 45. — Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 4; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 94. — Bayrh. 1849. Taun. p. 87. — Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 329.
Genth 1836. Nass. I. p. 380: g. Graphidear.
Endl. 1836. Gen. n. 145 *b*. p. 13; 1841. Ench. p. 10: sect. Umbilicariae.
Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 228: g. Lecidinar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 350: g. Pyxinear.
Synon. Capnia Vent.; Umbilicaria Mérat; Gyromium Wahlenb.

Gyrophoreae Rchb. 1828. Consp. p. 21: div. Graphidear. Gen.: Pyxine, Umbilicaria.
Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 13 (Flora 1854. p. 235): trib. Phylloidear. Gen.: Umbilicaria.

Gyrophorideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 410. 476: div. Cenothalamear. Gen.: Gyrophora.

Gyrophragmium*) Montagne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 77: nov. g. Podaxinear. (Montagnites Dunalii Fries.) *Cf.* Lond. journ. bot. II. p. 525.
L. & Ch. Tulasne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 176: g. Secoticar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Podaxineor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 439.
Synon. Catachyon Ehr.; Endoptychum Czern.

Gyrophykea Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 100: ordo 4 Algar. Gen. unicum: Chara.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 193: subordo Algar. Fam.: Characeae.

*) γῦρος, circulus; φράγμα, septimentum.

Gyrophyllites Glocker 1841. Nov. Act. Leop. XIX. 2. p. 322: nov. g. plant. (Algar.?) foss.

Gyrophyllum Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 358: sect. Coreopsidis. (C. senifolia Michx., etc.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 614.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 341: subsect. Eucoreopsidis. (*Eucoreopsis* et *Gyrophyllum Nutt.*)

Gyropodium Hitchc. .... in Sillim. Amer. journ. IV. p. 56.
= Mitremyces Nees.

Gyropteris Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 84. t. 54: nov. g. Rhachiopteridear. (G. crassa.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 86: g. Rachiopteridear.

Gyrorytis Koch 1843. Synops. ed. II. p. 184: sect. Meliloti. (M. sulcata Desf.)
= Campylorutis Ser.

Gyrosigma Hassall ....
Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: g. Naviculacear.
= Naviculae Bory pars.

Gyrosorium Presl 1850. Epimel. bot. p. 499: nov. g. Polypodiear. (Niphobolus africanus Kz.)
Fée 1854. Gen. Fil. p. 262: sect. Niphoboli?

Gyrostachis Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 406: sect. Neottiae. (N. longifolia, crispata.)

Gyrostachys Pers. 1807. Ench. II. p. 511.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Neottiear.
= Spiranthes Rich.

Gyrostachys G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 357: sect. Heliotropii.
= Euheliotropium DC.

Gyrostemon Desfont. 1820. Mém. Mus. VI. p. 16. t. 6: novum genus nulli ordini cognito referendum. (G. ramulosum.)
Desf. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 115: g. Malvaceis aff.
Agdh. 1823. Aphor. p. 195: g. Euphorbiacear.
DC. 1824. Pr. I. p. 516: g. Tiliaceis aff.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 674. n. 2047: g. Malvacear. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 716 (*Gyrostemum*).
Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 5245: g. Sidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: g. Tiliacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 556.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 462. n. 2278: g. Polyandr. Polygyn.
Hook. 1830. Bot. Misc. I. p. 243. t. 53: g. Urticear.?
Meisn. 1837. Gen. p. 38 (29): g. Tiliear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5264. p. 978; 1841. Ench. p. 509: g. Gyrostemonear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 322 (235). — Rchb.

Gyrostemon Desfont. cont.
1841. Nom. p. 166. p. 6454. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 38.
Lehm. 1845. Pl. Preiss. I. p. 243: g. Phytolaccacear.
Synon. Codonocarpus Cunn.?

Gyrostemoneae Endl. 1840. Gen. p. 978; 1841. Ench. p. 509: fam. Caryophyllinar. Gen.: Gyrostemon, Codonocarpus.
Meisn. 1841. Gen. p. 322 (235): trib. Phytolaccear. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 166: subsect. Rivinear. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282: appendix Euphorbiacear. Gen. ead.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 36: trib. Gyromeriear. Gen. ead. et Didymotheca, Cyclotheca.

Gyrostemum Steud. vid. *Gyrostemon Desf.*

Gyrostephium Turczan. 1851. Bull. soc. Mosc. XXIV. 2. p. 76: nov. g. Cassiniear. (G. rhizocephalum.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 273.

Gyrostomum Fries 1825. Pl. homon. p. 268: nov. g. Limborinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 20. n. 368.
Endl. 1836. Gen. n. 143. p. 13; 1841. Ench. p. 10: g. Limboriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 551. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 351.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Limboridar.

Gyrothalamae Rchb. 1841. Nomencl. p. 16: fam.: Gasteropsorar. Gen.: Umbilicaria, Pyxine.

Gyrothalami Rchb. 1837. Handb. p. 133: fam. Gasteropsorar. Gen.: Pyxine, Umbilicaria.

Gyrotheca Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 327: nov. g. Haemodorear. (Heritiera Gmelini Michx.)
= Lachnanthes Ell.

Gyrothecium Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 14 (Flora 1854. p. 236): nov. g. Lecidinear., Psoram Flot. includens.

Gyrothrix Corda 1839. Prachtfl. Schimm. p. 25. t. 12: subg. Campsotrichi.
Corda 1842. Ic. Fung. p. 13; 1842. Mycol. p. 49: g. Ceratocladior.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 72: g. Psiloniacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Sepedonieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Gyrocereor.

Gyrotrichum Spreng. 1827. Syst. IV. p. 554. n. 3561; 1831. Gen. II. p. 781. n. 4034: g. Byssoideor. (*Circinotrichum Nees.*)
= Psilonia Fries.

Gytonanthus Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 88: nov. g. Fediaceae. (Valeriana sibirica.)
= Patrinia Juss.

H.

Haagea*) Klotzsch 1855. Begon. p. 223: nov. g. Begoniacear. (Begonia dipetala Grah.)

Haasia „Blume“ Nees 1836. Laurin. p. 372: g. Oreodaphnear. (p. 675 ad Perseas transtatum.) — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1332. 1350. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 473.

Miq. 1852. Pl. Jungh. II. p. 177: g. Laurinear.

Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 928: g. Cryptocaryear.

= Dehaasia Blume.

Habbasia**) DC. 1825. Prodr. II. p. 428: sect. Mimosae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4162 *b;* 1841. Nom. p. 156. n. 6128. 2. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 384. — Endl. 1841. Gen. n. 6831 *b.* p. 1325; 1841. Ench. p. 682. — Benth. 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 390.

Habenaria Willd. 1805. Spec. IV. p. 44. n. 1589: nov. g. Gynandr. Monandr. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 189.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 312. Ed. Nees p. 168; 1813 in Ait. h. kew. V. p. 192 (Verm. bot. Schr. II. p. 9): g. Orchidear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 330. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 185. — Kunth 1822. Syn. I. p. 323. — Link 1822. En. II. p. 368. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 8. p. 402. — D. Don 1825. Nepal. p. 24. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 688. n. 2924; 1831. Gen. II. p. 652. n. 3282. — Rchb. f. 1850 in Webb Canar. III. p. 306.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 282: g. Ceropagar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 125.

Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.

Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529); 1832. Bot. Regist. XVIII. n. 1499. (XXII. t. 1858); 1835. Orchid. p. 306: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1471; 1841. Nom. p. 50. n. 1868. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1525. p. 210; 1841. Ench. p. 112. — A. Rich. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 70. — Meisn. 1842. Gen. p. 380 (284). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 28. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.

A. Rich. 1828. Mém. soc. h. n. Par. IV. p. 18. t. 1. 2; 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIV. p. 267. t. 16. 17.

Rchb. 1830. Fl. exc. p. 130: g. Limodorear.

Pöpp. & Endl. 1835. Nov. gen. I. p. 44. t. 75—78.

Rchb. f. 1844. Linnaea XVIII. p. 407. Sect.: Henidia.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Gymnadenidar. (*Synon. Dissorhynchium Schau.?; Centrochilus Schau.*)

Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 713: g. Ophrear.

Habenaria Koch 1837. Synops. p. 689: g. Ophrydinear.

Coeloglossum Hartm.

Haberlea*) Fries 1835. Flora I. p. 331; 1835. Act. soc. Hung. II. p. 249. t. 1: nov. g. Acanthoidear., Ruelliae proximum.

Endl. 1839. Gen. n. 4025. p. 695; 1841. Ench. p. 341: g. Scrophularineis aff. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 272. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 364. 554. — Walp. 1845. Rep. III. p. 438.

DC. 1840 in Meisn. Gen. p. 302 (212); 1845. Pr. IX. p. 273: g. Ramondiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4691.

Griseb. 1844. Rumel. II. p. 54: g. Gesneracear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672: g. Didymocarpidar.

Haberlia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 30: nov. g. plant. (*Kalesjam Rheede* IV. t. 32.)

= Odina Roxb.

Hablanthera Hochstett. vid. ***Haplanthera Hochst.***

Hablitzia Marsch.-Bieb. 1819. Fl. taur. cauc. III. p. 170 (Cent. pl. ross. II. t. 54 et Mém. soc. Mosc. V. p. 24): nov. g. Pentandr. Monogyn. (Amaranthor.? — H. tamnoides.)

Eichw. 1831. Pl. Cauc. p. 34.

Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278. 302: g. Chenopodear.

Endl. 1837. Gen. n. 1935. p. 297; 1841. Ench. p. 182: g. Kochiear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234).

Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6389 (sph. *Hablitzlia*): g. Betear.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 103: g. Achyranthear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511: g. Celosiear.

C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 734: g. Hablitziear.

Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 254: g. Amarantear. — Par. Ledeb. 1851. Ross. III. p. 854.

Synon. Hablizia Spreng.

Hablitzieae C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 734: div. Amarantacear. Gen.: Hablitzia.

Hablitzlia Rchb. vid. ***Hablitzia.***

Hablizia („Marsch.-Bieb. 1810. Cent. pl. ross. II. t. 54“) Spreng. 1825. Syst. I. p. 824. n. 933: g. Amarantear.

Rchb. 1828. Consp. p. 165. n. 4887: g. Basellear.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 202. n. 1029: g. Chenopodear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 872.

*) Dicat. Hortulano F. A. Haage jun. Erford.
**) *Habbas* nomen aegypt. Mimosae polyacanthae.

*) Dicat. Car. Const. Haberl, prof. Pestinensi.

Hablizia Spreng. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear. = Hablitzia Marsch.-Bieb.

Habracanthus*) Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 312: nov. g. Gendarussear. (Justicia haematodes Schl.) — Par. Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 28. Char. emend. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 659.

Habranthus Herbert . . . . Bot. Mag. t. 2464: nov. g. Amaryllidear. — Par. Herb. 1825. Bot. Mag. App. p. III; 1837. Amaryll. p. 71. 156. (Hippeastriformium.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58 (*Habrantus*).
Schult. 1830. Syst. VII. p. 806: sect. Amaryllidis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1273 c. p. 176; 1841. Ench. p. 103. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1177. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1601. 3. — Meisn. 1842. Gen. p. 393 (296).
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 415: subg. Amaryllidis. — Par. Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 144.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Amaryllear. — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 11. 95. Sect.: Habranthus, Zephyrites.
Kunth 1850. Enum. V. p. 491: g. Hippeastrear.

Habrantus Dumort. vid. *praeced.*

Habrosia Fenzl 1843. Bot. Zeit. p. 321: nov. g. Scleranthear. (Arenaria spinuliflora Ser.)
Fenzl 1843. Bot. Zeit. p. 326: g. Habrosiear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 91. n. 5223/$_1$. — Walp. 1846. Rep. V. p. 76.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 528 (*Habrozia*): g. Scleranthacear.

Habrosieae Fenzl 1843. Bot. Zeit. p. 326: subtrib. Scleranthear. Gen.: Habrosia. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 91. Gen. id.

Habrothammus Endl. 1839. Gen. n. 3867. p. 667; 1841. Ench. p. 332: g. Cestrinear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 278 (185). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 58. — Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4268. (genuinar.) — Walp. 1845. Rep. III. p. 122.
Benth. 1840. Pl. Hartweg. p. 49: g. Solanacear.
Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 151: sect. Cestri. — Par. Schltd. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 260. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 599.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 621: g. Rectembryar.
Synon. Meyenia Schltd.

Habrozia Lindl. vid. *Habrosia Fenzl.*

Habsia Steud. Nom. I. p. 719: lege *Halesia P. Browne.*

Habzelia**) A. DC. 1832. Mém. soc. Genèv. V. p. 207: nov. g. Anonacear. *Cf.* Flora Lit. III. p. 9. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 515.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 193. n. 7318: g. Uvariear.

*) ἁβρός, tener, mollis.

**) *Habzeli* nomen antiquum Unonae aethiopicae Dun., in C. Bauh. citatum.

Habzelia A. DC. cont.
Endl. 1839. Gen. n. 4715. p. 832; 1841. Ench. p. 422; g. Xylopiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 76. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 123. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 61. — Zoll. 1858. Linnaea XXIX. p. 318.
Synon. Waria Aubl.; Krockeria Neck. Xylopia Linn.? (Endl. Spl. II. p. 107. III. p. 85.)

Hachenbachia Dietr. vid. *Hagenbachia Nees.*

Hackela Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plant. (Nomen.)

Hackelia Opiz . . . . Ökon. Fl. Böhm. II. p. 147.
= Echinospermi Swartz pars.

Hacquetia*) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 182. n. 306: nov. g. Scadiophytor., ab Astrantia Scop. sejunctum.
DC. 1830. Pr. IV. p. 85: g. Saniculear. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 482; 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5528. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 265. — Koch 1836. Syn. p. 279. Ed. II. p. 308. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103). — Endl. 1839. Gen. n. 4383. p. 767; 1841. Ench. p. 377. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582 (*Haquetia*); 1840. II. p. 935. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 110.
Tausch 1834. Flora I. p. 354: g. Amminear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 137.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Sanicular.
Gay 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. IX. p. 151. Char. emend.
Synon. Dondia Spreng.; Dondisia Rchb.

Hacub Vaillant 1718. Act. Ac. Paris. p. 150: g. Cynarocephalar.
= Gundelia Tourn.

Hadestaphyllum Dennst. 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 30: nov. g. plant. (*Katou Tsjeroë Rheede* IV. t. 9.)
= Holigarna Roxb.

Häckeria**) F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 406: nov. g. Compositar., Humeae aff. (H. cassiniaeformis.)

Haemadiction Steud. Nom. vid. *seq.*

Haemadictyon***) Lindl. 1825. Trans. hort. soc. VI. p. 71: nov. g. Apocynear. (Echites nutans Sims.) *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 27. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 718 (*Haemadiction*).
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3514; 1841. Nom. p. 134. n. 5165: g. Echitear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Meisn. 1840. Gen. p. 265 (173). — Endl. 1841. Spl. I. n. 3424/$_1$. p. 1396; 1841. Ench. p. 295. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 52. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 425.

*) Dicat. Balth. Hacquet, prof. Lemberg.

**) Dicat. cl. Häcker, florae Lubecensis auctori.

***) αἷμα, sanguis.

Haemadictyon Lindl. cont.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 83: g. Echitiear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 67. t. 275.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.
Haemadoraceae Rchb. vid. *Haemodoraceae R. Brown.*
Haemadorum Hedwig vid. *Haemodorum Smith.*
Haemantheae Kunth 1850. Enum. pl. V. p. 584: div. Amaryllear. Gen.: Clivia, Haemanthus, Amaryllis, Buphane, Brunsvigia, Ammocharis, Nerine, Strumaria, Imhofia, Carpolyza, Hessea.
Haemanthus*) Tourn. 1700. Inst. p. 657. t. 433 in Append.
Linn. 1737. Gen. p. 97. n. 276; 1737. Cliff. p. 127; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 88; 1753. Sp. I. p. 325; 1759. Syst. ed. X. p. 987. n. 394; 1762. Sp. ed. II. p. 412; 1764. Gen. ed. VI. p. 160. n. 400; 1767. Syst. ed. XII. p. 234. n. 396: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 261; 1784. Syst. p. 316. — Reich. 1778. Gen. p. 162. n. 432. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 214. n. 546. — Gmel. 1791. Syst. p. 534. — Pers. 1797. Syst. p. 335; 1805. Ench. I. p. 348. n. 774. — Willd. 1799. Sp. II. p. 24. n. 610; 1809. En. p. 348. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 252.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 35: g. pl. class. I.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 220. n. 915: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 530.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Spathacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 274. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 249; 1825. Syst. II. p. 56. n. 1201; 1830. Gen. I. p. 276. n. 1431. — Eckl. 1827. Verz. p. 8. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1185.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Narcissor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 57. — Juss. 1789. Gen. p. 55.
Scop. 1777. Intr. p. 87: g. Liliacear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 31. t. 11. f. 3 (puniceus).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 278; 1789. Phil. Bot. I. p. 125.
Neck. 1790. El. III. p. 160. n. 1507: g. Ymnodiphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 182: g. Narcissoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 138: g. Alooidear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 136: g. Amaryllidear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 227. n. 926. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 281. — Kunth 1822. Syn. I. p. 287. — Herb. 1825. Bot. Mag. App. p. 1; 1837. Amaryll. p. 77. 232. (Amaryllidiform.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. —

*) *αἷμα*, sanguis; *ἄνθος*, flos.

Haemanthus Tourn. cont.
Link 1829. Hdb. I. p. 206. — Bartl. 1830. Ord. p. 46. — Schult. 1830. Syst. VII. p. LII. 883. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1607. Sect.: Polystegia, Haemanthus. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 21.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 517: g. Narcissear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 173. — Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 182.
Link 1821. En. I. p. 309: g. Narcissinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1248: g. Amaryllear. Sect.: Polystegia, Tristegia. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1278. p. 177; 1841. Ench. p. 103. — Meisn. 1842. Gen. p. 393 (296). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 412. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 8. 33. Sect. ut Rchb. 1828.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 586: g. Haemanthear.
Haemaria Lindl. 1826. Orch. scel. p. 9 (Linnaea II. p. 528); 1833. Bot. Regist. n. 1618: nov. g. Neottiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1417; 1841. Nom. p. 55. n. 2127. — Bartl. 1830. Ord. p. 56. — Endl. 1837. Gen. p. 214. n. 1560. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 489; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Physuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1569.
Meisn. 1842. Gen. p. 386 (289): g. Physuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 20.
Haematobanche Presl 1850. Epimel. bot. p. 609 (249): nov. g. Orobanchear. (Hyobanche sanguinea β Drege.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 206: g. Hyobanchear.
Haematococceae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 16. 37 (Flora 1849. p. 611): subtrib. Protococcear. Gen.: Micraloa, Haematococcus, Diplocystis.
Haematococcus Agardh 1828. Ic. Alg. eur. t. 22—24.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 758. n. 3867 inter primordia Algar.
Kütz. 1838. Linnaea VIII. p. 372: sect. Microcystidis.
Endl. 1836. Gen. n. 27. p. 3; 1841. Ench. p. 3: g. Nostochinar. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 578. (genuinar.)
Menegh. 1838. Cenni p. 25: g. Nostochinear.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 180: g. Ulvacear.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92): g. Palmellear.
Menegh. 1842. Mon. Nost. p. 18: g. Protococcoidear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 10. n. 2. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . .: g. Protococcear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Protococcidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. . . .: g. Protococcacear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 38: g. Haematococcear.
Synon. Gloiococcus Shuttl.

Haematolepis Presl 1850. Epimel. bot p. 598: novum nomen pro *Hypolepide Pers.* (nec Willd.) propositum.
= Cytinus Linn.?

Haematomma Massalongo 1853. Mem. Lich. p. 32: nov. g. Lichenum. (Parmelia haematomma et ventrosa.)
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 152: g. Lecanorinar.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 369: sect. Lecanorae.

Haematophlaea J. Agardh . . . . *Cf.* Crouan 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 73.

Haematospermum „Wallich" Lindl. 1836. Introd. ed. II. p. 116: nov. g. Crotonear. indescript. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1117; 1841. Ench. p. 588. n. $5823/_1$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Meisn. 1841. Comm. p. 252: g. Rottlerear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7363: g. Ricinear. genuinar.
Baill. 1858. Euphorb. p. 293: sect. Spathiostemonis.

Haematostrobos Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 413: g. Rafflesiacear.
= seq.

Haematostrobus Endl. mss. olim: g. Rhizanthear. (Endl. Gen. p. 76 in adnot. ad n. 727.)
= Langsdorffia Mart.?

Haematoxyllum Scop. vid. *Haematoxylum Linn.*

Haematoxylon Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Lomentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 429. — Batsch 1802. Tab. p. 98.
Willd. 1799. Sp. II. p. 547. n. 830: g. Decandr. Monogyn.
Pers. 1805. Ench. I. p. 462. n. 1028: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 773 (anomal.); 1825. Syst. II. p. 328. n. 1601; 1830. Gen. I. p. 353. n. 1783. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1374. 1427.
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 485. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 434. — Meisn. 1837. Gen. p. 99 (70).
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4142; 1841. Nom. p. 155. n. 6079: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 106. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6777. p. 1315; 1841. Ench. p. 674. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 132.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 72: g. Leptolobiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 115.
= Haematoxylum Linn.

Haematoxylum*) Linn. 1737. Gen. p. 342. n. 859; 1737. Cliff. p. 160; 1740. Syst. p. 23; 1753. Sp. I. p. 384; 1759. Syst. ed. X. p. 1019. n. 471; 1762. Sp. ed. II. p. 549; 1764. Gen. ed. VI. p. 210. n. 525; 1767. Syst. ed. XII. p. 293. n. 519: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 331; 1784. Syst. p. 398. — Reich. 1778. Gen. p. 214. n. 567. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 280. n. 708. — Gmel. 1791. Syst. p. 677. — Pers. 1797. Syst. p. 426.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 93. n. 381: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 348; 1804. Dict. v. 6. p. 328 (*Campêche*). — Vent. 1799. Tabl. III. p. 375. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 206. — Hedw. 1806. Gen. p. 305. n. 1210. — Link 1821. En. I. p. 410.
Adans. 1763. Fam. II. p. 318: g. Cassiar.
Scop. 1777. Intr. p. 225 (*Haematoxyllum*): g. Nomadear.
Neck. 1790. El. II. p. 376. n. 1183: g. Ypsoophytor.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 324: g. Caesalpiniear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 43.
Link 1831. Hdb. II. p. 138: g. Cassiacear.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 486: g. Cassiear.
Synon. Hematoxylon Linn. et Auct.

Haemax*) E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 223: nov. g. Asclepiadear. verar. — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.
Endl. 1838. Gen. n. 3446. p. 589; 1841. Ench. p. 298: g. Astephanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4996.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 509: g. Astephanar.

Hämmerlenia Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 101: g. Ileinar.
Synon. Percursaria Menegh.

Haemocarpus Noronha ex Pet.-Thouars. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 788; 1826. Syst. III. p. 333. n. 2613; 1831. Gen. II. p. 599. n. 2958: g. Hypericear.
= Haronga Pet.-Thouars.

Haemocharis „Salisb. mss." Mart. & Zuccar. 1824. Nov. gen. I. p. 106. t. 66. 67: g. Bonnetiar. *Cf.* Flora 1825. I. p. 29.
DC. 1824. Pr. I. p. 528: sect. Gordoniae.
= Laplacea HBK.

Haemodoraceae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 299. Ed. Nees p. 155: ordo Monocotyledonum. Gen.: Haemodorum, Conostylis, Anigozanthos, Phlebocarya.
DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Endogenar. phanerogamar.
Rchb. 1828. Consp. p. 60 (sphalm. *Haemadoraceae*): div. Narcissear. Subdivis.: Hypoxideae, Haemodoreae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58 (sph. *Hemodoraceae*): trib. Agavinear. Gen. ut

*) Quasi lignum sanguineum, cum rubro tingat colore. (Ht. Cliff.)

*) αιμάζω, αιμος, acus s. spina.

Haemodoraceae R. Brown cont.
R. Brown et Barbacenia, Vellosia, Dilatris, Lanaria, Heriteria (cujus loco p. 80 Cameria).
Bartl. 1830. Ord. p. 43: ordo (31) Ensatar. Gen. ut R. Brown et Dilatris, Lachnanthes, Lanaria, Lophiola, Barbacenia, Wachendorfia. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 170. Gen.: Hagenbachia, Xiphidium, Wachendorfia, Lophiola; Haemodorum, Dilatris, Lachnanthes; Lanaria, Anigosanthus, Conostylis, Aletris; Phlebocarya; Vellozieae. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1360 et Ench p. 100) Androstemma, Blancoa, Tribonanthes. — Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299). Trib.: Vellozieae, Lanarieae, Phlebocaryeae, Haemodoreae, Xiphidieae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (237) Hexapetaloidear.
Lindl. 1833. Nix. p. 33; 1836. Nat. syst. ed. II. p. 330; 1847. Veg. kd. p. 151: ordo Narcissalium. Trib. (1847): Haemodoreae, Conostyleae, Vellozieae.
Mart. 1835. Consp. p. 9: ordo 47.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 334. Trib.: Haemodoreae, Wachendorfieae.
Brongn. 1843. En. genr. p. 23: fam. Bromelioidear. Gen. ex Endl.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 108: fam.(108) Ensatar. Gen. fere ut Endl.
Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 51. Gen. bras.: Hagenbachia, Xiphidium.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Homoblastear.

Haemodoreae Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 326: ordo Monocotyledonum. Gen.: Wachendorfia, Xiphidium, Gyrotheca, Anigosia.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 240: div. Liliacear. Gen.: Lanaria, Schwägrichenia, Conostylis, Phlebocarya, Dilatris, Haemodorum.
Agdh. 1823. Aphor. p. 170; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis. p. 585: ordo Liliiflorar. Gen. §. 1: Dilatris, Haemodorum, Lanaria, Phlebocarya, Conanthera, Witsenia. §. 2: Xiphidium, Wachendorfia. §. 3: Conostylis, Schwägrichenia.
Eckl. 1827. Verz. p. 5: ordo Coronariarum. Gen. capens.: Lanaria, Dilatris.
Rchb. 1828. Consp. p. 60: subdiv. Haemodorear. Gen.: Haemodorum; Phlebocarya; Conostylis, Anoegosanthus, Dilatris, Astelia, Lanaria, Lophiola, Lachnanthes, Barbacenia, Xerophyta, Vellosia.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 335: trib. Haemodoracear. Gen.: Dilatris, Lanaria. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299). Gen.: Haemodorum, Dilatris, Lachnanthes. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 153. Gen.: Haemodorum, Phlebocarya.
Conf. Haemodoraceae R. Brown.

Haemodoreae Rchb. 1837. Handb. p. 151: div. Narcissinear. Subdivis.: Burmannieae, Hypoxideae, Vellosieae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 45. Subdivis.: Burmannieae, Hypoxideae, *genuinae* (sect.: Lanarieae, Wachendorfieae, Vellozieae).

Haemodoron Wallroth 1825. Orob. gen. p. 69: sect. Orobanches.
Rchb. 1828. Consp. p. 212b. n. 3085: g. Orobanchear.
C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 461: sect. Phelipaeae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 633.
= Cistanche Link & Hoffmsg.

Haemodorum Smith 1798. Linn. Trans. IV. p. 213.
Vahl 1806. Enum. II. p. 179. n. 107: g. Triandr. Monogyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 28 (*Haemadorum*): g. Iridear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 343. 484. n. 136. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 561.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 299. Ed. Nees p. 155: g. Haemodoracear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Bartl. 1830. Ord. p. 43. — Endl. 1837. Gen. n. 1253. p. 171; 1841. Ench. p. 100; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 14. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 109.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 241; 1825. Syst. I. p. 158. n. 162: g. Haemodorear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 168. — Rchb. Consp. p. 60. n. 1219. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 162. — Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 153.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 39. n. 174: g. Spathacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Dilatridear.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1655: g. Lanariear.

Haemospermum Reinwardt 1825. Syll. Ratisb. II. p. 9: nov. g. Rubiacear.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1018: g. inter Rubiaceas et Strychneaceas medium.
Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167): g. Euloganiear.
= Geniostoma Forst.?

Hänckea Juss. Dict. v. 20. p. 204: vid. *Hänkea Ruiz & Pav.*

Hänelia Walp. 1843. Repert. II. p. 974: g. Buphthalmear. (Amellus flosculosus DC.?) *Synon.* Kraussia Schultz Bip.

Hänkea*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 36. t. 6: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 241. n. 536.
Hedw. 1806. Gen. p. 152. n. 651: g. Rhamnear.?
Maytenus Juss.

Hänkea Salisb. 1796. Prodr. p. 174.
= Portulacaria Jacq.

---

*) Dicat. Thadd. Hänke, peregrinatori.

Hänkea Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 8. t. 231: g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Schrad. n. Journ. II. 1. p. 49. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 357.
= Codonium Vahl.

Hänkea Schmidt 1794 in Usteri Ann. X. p. 115.
Adenandra Willd. (Endl. Gen. p. 1157.)

Hänselera*) Lagasca 1816. Gen. et. spec. p. 13: nov. g. Umbelliferar. (*H. danaeformis.*) — Par. Vela 1821 in Lag. Amen. nat. II. p. 75.
= Physospermum Coss.

Hänselera „Boissier" DC. 1838. Prodr. VII. I. p. 83: nov. g. Hyoseridear. *Cf.* Steud. Nom. I. p. 718 (*Hänslera*). — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 234 (143). — Endl. 1841. Spl. I. n. $2976/_1$ (err. $2966/_2$). p. 1387; 1841. Ench. p. 249. — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3677 (*Hänseleria* et p. 96. n. 3749 inter Hypochaerideas: *Henselera*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 8: g. Scorzonerear.

Hänseleria Rchb. vid. *Hänselera Boiss.*

Hänslera Steud. vid. *praeced.*

Hafgygia Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phycol. gener. p. 346; 1845. Phyc. germ. p. 276; 1849. Sp. Alg. p. 577. n. 383: nov. g. Laminariear. (Laminaria digitata Lamx.) — Par. Mont. 1849 in Orb. X. p. 56.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 103: g. Eulaminariear.

Hagaea**) Vent. 1799. Tabl. III. p. 240: g. Caryophyllear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 112. — Hedw. 1806. Gen. p. 174. n. 730. *Cf. Lahaya Röm. & Schult.*
= Polycarpaea Lam.

Hagea Pers. 1805. Ench. I. p. 262. n. 592: g. Pentandr. Monogyn.
A. St. Hil. 1815. Bull. soc. philom. p. 38: g. Paronychiear. — Par. Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 390; 1825. Dict. v. 38. p. 9. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 206: g. Caryophyllear.
= Polycarpaea Lam.

Hagea „Lam." Poir. 1818. Dict. v. 12. p. 253 (*Cusso*): g. Meliaceis aff.?
Vid. Hagenia Lam.

Hagea Bivon. . . . . Manip. II. p. 2.
= Polycarpon Löfl.

Hagenbachia*) Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 18. t. 2: nov. g. Haemodoracear. (H. brasiliensis.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1249. p. 170; 1841. Ench. p. 100. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 109. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 61.
Schult. 1822. Mant. I. p. 353: g. Triandr. Monogyn.

*) Dicat. Fel. Hänseler, Malag.

**) Dicat. peregrinatori La Haye.

Hagenbachia Nees cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1161: g. Xiphidiear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 397 (300).
Spreng. 1830. Gen. I. p. 41. n. 185: g. Iridear.
Bartl. 1830. Ord. p. 40: g. Commelinacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 127 (*Hachenbachia*). 170: g. Xiphidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1665: g. Wachendorfiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Wachendorfear.

Hagenia**) Lamarck Illustr. t. 311.
Gmel. 1791. Syst. p. 613: g. Octandr. Monogyn. (Bruce Trav. in Eg. V. App. p. 74. ic.) — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 331. n. 751. — Pers. 1805. Ench. I. p. 416. n. 943. — Hedw. 1806. Gen. p. 264. n. 1063. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 220. n. 1452.
Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3788: g. Hageniacear.?
= Brayera Kunth? (Endl. Gen. p. 1248: *Hagenia Willd. —Cusso Bruce.*)

Hagenia Mönch 1794. Meth. p. 61: nov. g. Thalamostemonis. (Saponaria porrigens L.)
A. Braun 1843. Flora p. 383: sect. Gypsophilae.
= Dichoglottis Fisch. & Mey.

Hagenia Eschweiler 1824. Syst. Lich. p. 20: nov. g. Parmeliacear. (Borreria ciliaris.)
Bayrh. 1849. Taun. p. 61: g. Peltopsorar.
= Anaptychia Körb.

Hageniaceae Rchb. 1828. Consp. p. 145: subdiv. Vitear.? Gen.: Hagenia Lam.

Hagidryas***) Griseb. 1841. Reise n. Rumel. I. p. 311: nov. g. Rosacear., pro Pruno prostrata Labill. propositum, serius (Fl. Rumel.) ad Cerasum reductum.

Hagioseris Boissier 1849. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 11. p. 35: nov. g. Cichoracear., Picridi aff. (H. Galilaea et Amalecitana.) *Cf.* Flora 1850. p. 55.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 963: g. Scorzonerear.

Hagnothesium†) A. DC. 1857. Esp. nouv. du genre Thes. p. 4: sect. Thesii.
= Thesidium Sond.

Hahnia Medic. 1793. Gesch. d. Bot. p. 81; 1794 in Usteri n. Ann. III. p. 91: nov. g. Antho-Mallonandriae. (Crataegus torminalis Jacq.)
Römer 1847. Fam. nat. III. p. 101. 134 (*Halmin* ex citat. erromea Endlicheri sub Pyro): g. Pomacear.
= Tormineria DC.

Haidingera Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. $1841/_1$. p. 1373; 1841. Ench. p. 147: g. Coniferar. foss.
Endl. 1842. Spl. II. p. 27. n. $1806/_2$: g. Abietinar. foss.

*) Dicat. C. F. Hagenbach, prof. Basil.

**) Dicat. Car. Gottfr. Hagen, botanico Regiomont.

***) Nomen a monte ἅγιον ὄρος et Dryas ob similitudinem.

†) ἄγνος, vitex. (?)

Haidingera Endl. cont.
Unger 1845. Syn. p. 203; 1846. Chlor. prot. p. LXXV: g. Abietinear. foss. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 303; 1847. Gen. Spl. IV. p. 13. n. 1816/₂₈. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 118.
Synon. Albertia Schimp. & Moug.

Hakea*) Schrad. 1797. Sert. Hannov. I. fasc. 3. p. 27. t. 17: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (Protear. — glabra.) — Par. Cavan. 1801. Icon. VI. p. 23. t. 533—536. — Pers. 1805. Ench. I. p. 117. n. 217.
Hedw. 1806. Gen. p. 74. n. 349: g. Proteacear. — Par. R. Brown 1809 in Linn. Trans. X. (1811) p. 178 (Verm. bot. Schr. II. p. 278); 1810. Prodr. I. p. 381. Ed. Nees p. 237. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 25. 417. n. 549. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 209. — Link 1821. En. I. p. 117; 1829. Hdb. I. p. 385. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 478. n. 521; 1830. Gen. I. p. 106. n. 531. — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 531. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 555; 1847. ibid. II. p. 259.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 336: g. Embothriear. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1755: g. Grevilleear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Banksiear.
Endl. 1838. Gen. n. 2144. p. 341; 1841. Ench. p. 215; 1847. Spl. IV. p. 85: g. Hakeaear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2394.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 422: g. Grevillear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 121. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 393.
Meisn. 1841. Gen. p. 332 (245): g. Rhopalear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Grevillidar.
Synon. Conchium Smith.

Hakeaeae Endl. 1838. Gen. p. 340: subtrib. Grevillear. Gen.: Anadenia, Grevillea, Hakea, Lambertia, Xylomelum, Orites, Rhopala, Andripetalum, Helicia, Knightia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1379 et Ench. p. 215) Manglesia et 1842 (Spl. II. p. 37) Adenostephanus.
Rchb. 1841. Nom. p. 63: sect. Grevillear. Gen. ut Endl. 1841.

Halanthium C. Koch 1843. Linnaea XVII. p. 313: nov. g. Salsolear. (H. rarifolium.)
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 203: g. Anabasear.
Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 833: sect. Halogetonis.

Halarachnion Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phycol. gener. p. 394; 1845. Phycol. germ. p. 300; 1849. Spec. Alg. p. 721. n. 479: nov. g. Halymeniear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubias.
Synon. Chrysymeniae Agdh. pars; Euchrysymenia Endl.

Halea*) Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 304: nov. g. Heliopsidear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 69. n. 2508/₁. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 158.

Halenea Wight vid. *seq.*

Halenia**) Borckh. 1796 in Röm. Arch. I. 1. p. 25: nov. g. pro Swertia corniculata L. propositum.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3501: g. Chironiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3535. p. 601; 1841. Ench. p. 302.
Bartl. 1830. Ord. p. 200: g. Gentianear. — Par. Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 33. — D. Don 1837. Linn. Trans. XVII. 4. p. 528. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 176. (verar.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 918. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614. — Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. 2. p. 8 (*Halenea*). t. 1334.
Griseb. 1836 in Hook. Fl. bor. am. II. p. 67; 1839. Gent. gen. p. 323; 1845 in DC. Pr. IX. p. 128: g. Swertiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 261 (170). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 6. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 73.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 133. n. 5121: g. Erythraeariar.
Synon. Tetragonanthus Stell.; Ceratia Pers.

Halerica Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phycol. gener. p. 354; 1845. Phycol. germ. p. 279; 1849. Spec. Alg. p. 594. n. 408: nov. g. Cystosirear.

Halesia P. Browne 1756. Jamaic. p. 205: nov. g. Heptandr. Monogyn.
Scop. 1777. Intr. p. 141 (*Hallesia*): g. Opulinar.
= Guettardaria DC.

Halesia***) „Ellis" Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1044. 1369. n. 1138; 1762. Sp. ed. II. p. 636; 1764. Gen. ed. VI. p. 237. n. 596; 1767. Syst. ed. XII. p. 326: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 369; 1784. Syst. p. 443. — Reich. 1778. Gen. p. 244. n. 651. — Schreb. 1789. Gen. p. 319. n. 814. — Gmel. 1791. Syst. p. 749. — Pers. 1797. Syst. p. 475; 1807. Ench. II. p. 4. n. 1166. — Willd. 1799. Sp. II. p. 849. n. 939; 1809. En. p. 496.
Ellis 1761. Phil. Trans. LI. 2. p. 932. t. 22.
Adans. 1763. Fam. II. p. 158: g. Caprifolior.

---

*) ἅλς, mare; ἄνθος, flos.

*) Dicat. Dr. Hale.

**) Dicat. Jon. Halen.

***) Dicat. Dr. Stephen Hales.

Halesia Ellis cont.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337.
Gled. 1764. Syst. p. 230. n. 947: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 506.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 160. t. 32. f. 2 (tetraptera).
Cavan. 1788. Diss. VI. p. 337. t. 186: g. Malvacear. Char. emend. *Cf.* Röm. & Ust. Mag. Bot. XI. 1790. p. 150.
Juss. 1789. Gen. p. 156: g. Guajacanar.
Neck. 1790. El. III. p. 376. n. 1813: g. Coryphophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 447: g. Ebenacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 349. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 215.
Batsch 1802. Tab. p. 204: g. Sapotar.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 40: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 82.
Cram. 1803. Disp. p. 163: g. Monadelph. Dodecandr.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 506; 1826. Syst. III. p. 84. n. 2421; 1831. Gen. II. p. 552. n. 2703: g. Styracear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII; 1828. Consp. p. 136. n. 3593. — Bartl. 1830. Ord. p. 160. — Meisn. 1839. Gen. p. 250 (159). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 425. — Endl. 1841. Ench. p. 364. n. 4258. — Brongn. 1843. En. genr. p. 74. — DC. 1844. Pr. VIII. p. 269. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 593.
Link 1822. En. II. p. 1: g. Styracinar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 315 in not.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 29: g. Styracinear.
Link 1829. Hdb. I. p. 668: g. Halesiacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 6.
Endl. 1839. Gen. p. 744. n. 4258: g. Halesiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5282.

Halesiaceae Link 1829. Handb. I. p. 667: ordo Epanthar. Gen.: Halesia.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 6: ordo Corollaeflorar. Gen. id.

Halesieae Endl. 1839. Gen. p. 744: fam. Ebenaceis aff. (serius Styraceis injuncta.) Gen.: Halesia.
Rchb. 1841. Nom. p. 136: subsect. Styracear. genuinar. Gen. id.

Halgania*) Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 448. t. 59: nov. g. Boraginear.? (*H. littoralis.*)
Spreng. 1831. Gen. II. p. 789. n. 4090: g. Asperifoliar. (Pentandr. Monogyn.)
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 365: g. Heliotropear.
Endl. 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 204: g. Ehretiacear. — Par. Lehm. 1845. Pl. Preiss. I. p. 347; 1847. II. p. 238.
Meisn. 1840. Gen. p. 278 (186): g. Tournefortiear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $3749/_1$. p. 1402; 1841. Ench. p. 320. — Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4368.

*) Dicat. Ammirali Halgan.

Halgania Gaudich. cont.
A. DC. 1846. Pr. X. p. 177: g. Ehretiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653: g. Tournefortear.

Halianthus Fries 1817. Fl. Halland. p. 75.
Wahlb. 1820. Fl. Gothob. p. 45: g. Decandr. Trigyn.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV: g. Alsinear. (ibid. p. 741. sect. Arenariae.) — Par. Koch 1841. Flora II. p. 503; 1843. Syn. ed. II. p. 121. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 38.
= Honkenya Ehrh.

Halicacaba Klotzsch. (DC. Pr. VII. p. 623.) Eurylepidis Benth. pars.

Halicacabum J. Bauh. Hist. II. 1. 15. p. 173.
= Cardiospermum Linn.

Halicoccus „Aresch." Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 123: g. Cyclosporear.
Aresch. 1847. Nov. Act. Act. Ups. XIII. p. 253: g. Fucear. (Fucus nodosus L.)
Ozothallia Decne.

Halicystis Aresch. 1850. Nov. Act. Upsal. XIV. p. 446: nov. g. Vaucheriear. (Valonia ovalis Ag.)

Halidrys*) Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 52. 63; 1816. Ner. brit. Ed. alt.: nov. g. Fucor. (Fucus serratus et vesiculosus L.) *Cf.* Spreng. 1820. N. Entd. I. p. 93 et Leman 1821. Dict. v. 20. p. 220.
= Fucus Linn. emend.

Halidrys Lyngbye 1819. Tent. Hydroph. dan. p. 37: nov. g. Phycoidator. (Fucus nodosus L.) *Cf. Halicoccus Aresch.*
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 391: g. Fucoidear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 44. — Harv. 1841. Brit. Alg. p. 19 (*Halydrys*). — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 790.
Fries 1825. Pl. homon. p. 327: sect. Fuci. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 29. n. 513*b*. — Math. 1853. Belg. II. p. 491.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 355: g. Fucacear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 139. — J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 235. — Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 63.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Fucinear.
Grev. 1830. Syn. p. XXXIV.
Endl. 1836. Gen. n. 120 *f.* p. 10; 1841. Ench. p. 8: sect. Cystoseirae.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 331 (Flora 1843. p. 93): g. Sargassear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 30. n. $122/_4$: g. Cystoseirear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 191.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 359; 1845. Phyc. germ. p. 281; 1849. Sp. Alg. p. 604. n. 413: g. Cystosirear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 253. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 123: g. Cyclosporear.

*) ἅλς, mare; δρῦς, quercus.

Halidrys Lyngbye cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Cystoseiridar.
Synon. Siliqnaria Gray.

Haligenia Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330 (Flora 1843. p. 93): nov. g. Laminariear. (Laminaria bulbosa Lamx.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 27. n. 108. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 188. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 577. n. 384. — Thuret 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 241.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 20 (*Haligeria*): g. Laminaridar.
Synon. Phycocastanum Kütz.; Saccorhiza Agdh.; Phasgonon Walk. pt.

Haligeria Lindl. vid. *praeced.*

Haligraphium Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 18. n. 50 *a*: sect. Penicilli. — Par. Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 44.

Halilobium Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 30. n. 1225/$_1$ *a*: sect. Blossevilleae.

Halimeda Lamx. 1812. Bull. soc. philom. (An *Halymeda?*) *Cf.* Dict. v. 20. (1821) p. 221.
Menegh. 1838. Cenni p. 35: g. Siphonear.
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 118: g. Halimedear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53.
Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 685: g. Corallinear. — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 102 (Zoosporear.). — E. D. 1849 in Orb. Dict. VI. p. p. 459.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p 95; 1843. Phyc. gener. p. 310; 1845. Phyc. germ. p. 253; 1849. Sp. Alg. p. 504. n. 318: g. Codiear. — Par. Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 22.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 128: g. Codiacear.
Synon. Hormisus Targ.; Hormiscus Spreng.; Halymeda Auct.; Sertolara Imp., Nardo; Opuntia Nacc.

Halimedeae Decaisne 1841. Arch. Mus. II. p. 118: trib. Zoosporear. Gen.: Halimeda, Liagora. *Cf. Halymedeae Decne.*
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 101: trib. Siphonothallar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: trib. Zoospermear. Gen.: Udotea, Avrainvillea, Halimeda, Penicillus, Espera, Rhipocephalus.

Halimium *) Dunal 1824 in DC. Prodr. I. p. 267: sect. Helianthemi. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 118. — Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4915 *i*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 301.
Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 365: g. Cistoidear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 50: g. Cistinear. Sect.: Chrysorhodion, Leucorhodion.

*) ἅλιμος, -αλ-ον.

Halimium Dunal cont.
Endl. 1839. Gen. n. 5028 *a*. p. 904; 1841. Ench. p. 467: sect. Cisti. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 188. n. 7193. 1. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 160.

Halimocnemideae Endl. 1837. Gen. p. 298; 1841. Ench. p. 182: subtrib. Salsolear. Gen.: Traganum, Salsola, Halimocnemis, Halogeton. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 104) Horaninovia et 1847 (Spl. IV. p. 41) Physogeton. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 165. Gen. ut Endl. 1837 et Horaninowia.

Halimocnemides Moquin-Tand. 1840. Chenop. p. . . .: subtrib. Salsolear. Gen. Halimocnemidear. Endl.

Halimocnemis C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Fl. Alt. I. p. 381: nov. g. Salsolear. (Polycnemum brachiatum MB.) — Par. Moq.-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 212. — Rchb. 1837. Hdb. p. 239 (genuinar.) — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234).
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4327: g. Chenopodear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278.
Endl. 1837. Gen. n. 1945. p. 299; 1841. Ench. p. 182: g. Halimocnemidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6398.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. . . .: g. Halimocnemidum.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 102: g. Spirolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 194: g. Anabasear. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 837.

Halimodendron „Fisch. mss." DC. 1825. Prodr. II. p. 269 (Mém. Légum. VI. p. 283): nov. g. Galegear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3909; 1841. Nom. p. 148. n. 5748. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 410. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 244. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 270. — Meisn. 1837. Gen. p. 88 (63). — Endl. 1840. Gen. n. 6559. p. 1275; 1841. Ench. p. 669. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 572. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 129. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 263; 1831. Gen. II. p. 584. n. 2870: g. Leguminosar. — Par. Ledeb. 1831. Alt. III. p. 267.
Link 1831. Hdb. II. p. 200: g. Galegoidear.
Jaub. & Spach 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 235. (Monogr.)
Synon. Halodendron DC.

Halimolobos Tausch 1836. Flora p. 410: nov. g. pro Sisymbrio polystachyo et Arabide lasioloba constitutum. (*Halimolobus Wittst.*)
Meisn. 1837. Comm. p. 12: g. Sisymbrear.? — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 260. (genuinar.)
= Arabidopsis DC.?

Halimus P. Browne 1756. Jamaic. p. 206: nov. g. Octandr. Monogyn.
= . . .?

Halimus*) Löfling . . . . Ic. 191.
= Sesuvium Linn.

Halimus Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 280: sect. Atriplicis. (A. portulacoides L.) — Par. C. A. Meyer 1833 in Ledeb. Alt. IV. p. 316. — Endl. 1837. Gen. n. 1912 *d.* p. 293; 1841. Ench. p. 181.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 117: g. Pentandr. (Atriplex pedunculata L.)
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4334: g. Chenopodear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Atriplicear. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 576; 1837. Hdb. p. 238; 1841. Nom. p. 164. n. 6365. — Koch 1837. Syn. p. 609. Ed. II. p. 700.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 114: sect. Obiones. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 736.
Synon. Halymus Wahlenb.; Spinacina Moq.

Halionyx Ehrenb. 1844. Ber. Ak. Berl. p. 198: nov. g. Naviculaceor., Actinocyclo aff.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 130. n. 82: g. Coscinodiscear.

Halipsygma**) Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 18. n. 50 *b*: sect. Penicilli. — Par. Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 46.
= Rhipocephalum Kütz.

Haliptilon „Decne“. Lindl. vid. *seq.*

Haliptylon Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 123: sect. Janiae. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 49. n. $122/_{72}$ *b.* — Sond. 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 186.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25 (*Haliptilon*): g. Corallinear.
= Corallinae Tourn. pars. (Kütz.)

Haliseris Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 314: nov. g. Algar. (Fucus polypodioides Desf.)
Agdh. 1821. Spec. Alg. I. 1. p. 141 (Aphor. p. 101): g. Fucoidear.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXXVII. 262: g. Laminariear. — Par. Zanard. 1843. Classif. p. 10. (?)
Fries 1825. Pl. homon. p. 329: subg. Dictyotae. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 508 *b.*
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 327. n. 3392; 1831. Gen. II. p. 749. n. 3792: g. Phycoidear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.
Menegh. 1838. Cenni p. 42: g. Dictyotear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 147; 1842. Pl. cell. Cub. p. 62. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 768. — Decne

Haliseris Targioni cont.
1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. p. 93.) — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phyc. gener. p. 340; 1845. Phyc. germ. p. 272. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 181.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 102: g. Dictyotacear.
Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 362: g. Phaeosporear.
Synon. Polypodoidea Stackh.; Dictyopteris Lamx.; Neurocarpus Web. & Mohr; Halyseris Endl.

Haliserites Sternb. 1838. Vers. II. p. 34. t. 24. f. 7: g. Fucoiditum.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Phycear.
Synon. Halyserites Unger; Chiropteris Rossm.

Halitea Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 602: sect. Cystosirae.

Halithridax*) Targioni mss. ex Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 93: nov. g. Fucor. (Ulva crispata.)
= Ulvastrum DC.

Halleria**) Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 323; 1737. Coroll. p. 10. n. 964; 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 287. n. 601; 1753. Sp. II. p. 625; 1759. Syst. ed. X. p. 1115. n. 679; 1763. Sp. ed. II. p. 872; 1764. Gen. ed. VI. p. 314. n. 761; 1767. Syst. ed. XII. p. 416: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 472; 1784. Syst. p. 564. — Reich. 1778. Gen. p. 315. n. 819. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 411. n. 1020. — Gmel. 1791. Syst. p. 943. — Pers. 1797. Syst. p. 601. — Willd. 1800. Sp. III. p. 310. n. 1159; 1809. En. p. 650.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 173. n. 705: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 504.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 213. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 358. — Batsch 1802. Tab. p. 193. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 274. — Link 1822. En. II. p. 141. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 843. n. 2249; 1831. Gen. II. p. 507. n. 2492. (Baccatar.)
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Scrophulariar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 118. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 234.
Hill 1769. Ht. kew. p. 261: g. Monopetalar. irregular.
Scop. 1777. Intr. p. 146: g. Caprifolior. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 619.
Neck. 1790. El. I. p. 377. n. 584: g. Plasyrgophytor.
Thunb. 1799. Nov. Act. Ups. VI. p. 38. Char. emend.

---

*) ἅλιμος apud Dioscoridem et Plinium.
**) ψῦγμα, flabellum.

*) θρίδαξ, lactuca.
**) Dicat. Alberto Haller, prof. botan. Gotting.

Halleria Linn. cont.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 41. t. 185.
Pers. 1807. Ench. II. p. 163. n. 1478: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3196.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 218: g. Scrophularinear.
Link 1829. Hdb. I. p. 506: g. Halleriacear.
Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 54: g. Gratiolear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 119. n. 4630. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 3918. p. 678; 1841. Ench. p. 339. — Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 509. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 59. — Walp. 1845. Rep. III. p. 262. 962.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 617: g. Halleriear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 301; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Chelonear.
Halleriaceae Link 1829. Handb. I. p. 506: subordo Personatar. Gen.: Halleria, Teedia.
Halleriae Rüling 1774. Ord. nat. Tab.: div. Ringentium.
Hallerieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 617: trib. Scrophularinear. Gen.: Halleria.
Hallesia Scop. vid. *Halesia P. Browne.*
Hallia*) Thunb. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 318; 1800. Nov. gen. XI. p. 155; 1800. Prodr. II. p. 131. 193; . . . . Fl. cap. p. 593: nov. g. Diadelph. Decandr. (Glycine monophylla L.) — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 1168. n. 1374. — Pers. 1807. Ench. II. p. 317. n. 1737.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 239: g. Leguminosar. — Par. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 125. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 760; 1826. Syst. III. p. 195. n. 2518; 1831. Gen. II. p. 571. n. 2784. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 235. — Link 1822. En. II. p. 246.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Coronillear.
DC. 1825. Pr. II. p. 122: g. Genistear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4044; 1841. Nom. p. 151. n. 5889. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 133. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 172. — Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59). — Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 511. — Endl. 1840. Gen. n. 6469. p. 1262; 1841. Ench. p. 668. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 127.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Hedysarear.
Hallia Jaume St. Hilaire 1812. Bull. soc. philom. Déc. p. 192; 1813. Journ. bot. III. p. 60: nov. g. ab Hedysaro disjunctum. (H. vaginale et bupleurifolium L.)
= Alysicarpus Neck.

*) Dicat. Dr. Birg. Hall.

Hallia Dumort. (ubi?)
= Honkenya Ehrh.
Halmia „Medic." Endl. Gen. p. 1237 (in synon. Pyri) et Römer Syn. III. p. 101. 134: vid. *Hahnia Medic.*
Halmiltonia Dumort. vid. *Hamiltonia Mühl.*
Halmyra*) „Salisb." Herbert 1837. Amaryll. p. 75. 202: sect. Pancratii, an genus? *Cf. Almyra Salisb.* — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 16. 179.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 429: subg. Pancratii.
Parlat. 1854. Nuov. gen. monoc. p. 28: g. Amaryllear. (Müll. Ann. bot. VI. p. 62.)
Halocharis Bieb. teste Turcz. (DC. Pr. VI. p. 665.)
= Fornicium Cass.
Halocharis Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 201: nov. g. Anabasear. (Halimocnemis sulphurea Moq.)
Synon. Androphysa Moq.
Halochloa Kütz. 1843. Bot. Zeit. p. 55: nov. g. Fucor. (Fucus scoparius Turn.)
Endl. 1843. Spl. III. p. 31. n. $122/_7$ *b:* sect. Sargassi.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 99; 1843. Phyc. gener. p. 366: g. Halochloar. Sect.: Phyllophysa.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Cystosirear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 632. n. 425: g. Sargassear.
Halochloae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 99; 1843. Phycol. gener. p. 349. 363: fam. Angiospermear. Gen.: Blossevillea, Spongocarpus, Halochloa, Myagropsis, Carpacanthus, Sirophysalis, Coccophora, Scaberia?, Carpodesmia?
= Sargassear. Kütz. 1849 pars.
Halochloëae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 104: trib. Actinothalamar.
= praeced.
Halochloris Unger 1843. Chlor. protog. p. 55. 66. t. 18 (1846. p. LXIX); 1845. Syn. pl. foss. p. 177: g. Najadear. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 136.
Halochrysis Schousb. (mss.?)
= Callophyllis Kütz.
Halocnemon Spreng. 1825. Syst. I. p. 19. n. 30; 1830. Gen. I. p. 10. n. 31: g. Chenopodear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4320. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.
Halocnemum MBieb.
Halocnemum Marsch.-Bieb. 1819. Fl. taur. cauc. III p. 3: nov. g. Monandr. Digyn. (Salicornia strobilacea et caspica MB. antea.) — Par. Schult. 1822. Mant. I. p. 3.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI: g. Atriplicear.
C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 5. 371: g. Salicorniear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1909. p. 293; 1841. Ench. p. 181;

*) ἁλμυρός, salsus.

Halocnemum Marsch.-Bieb. cont.
1842. Spl. II. p. 31. — Moq.-Tand. 1840. Chenop. en. p. 108; 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 149. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 733. — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234). — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 772.
Link 1831. Hdb. II. p. 414: g. Chenopodear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 26.
Rchb. 1837. Hdb. p. 238; 1841. Nom. p. 164. n. 6358: g. Salicornear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Synon. Halocnemon Spreng.

Halodendron DC. mss.
= Halimodendron Fisch.

Halodendron Röm. & Schult., Rchb. vid. *seq.*

Halodendrum Petit.-Thouars 1809. Gen. madag. nr. 26 in Römer Collect. bot. p. 201: nov. g. Viticum? (*Mangium album Rumph.?*) *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 237.
Römer & Schult. 1818. Syst. III. p. 34. n. 595 (p. 485 *Halodendron*): g. Tetrandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2942 *a* (*Halodendron*): sect. Avicenniae.
= Avicennia Linn.

Halodictyon Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 97; 1843. Phycol. gener. p. 336: g. Encoeliear. (*Hydroclathrus Bory* vox hybrida.)
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 434: g. Scytosiphonear.
= Encoelium Agdh.

Halodictyon Mont. vid. *Halydictyon Zanard.*

Halodule*) Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 1662/$_1$. p. 1368; 1841. Ench. p. 125: g. Najadear. — Par. Unger 1843. Chlor. protog. p. 67. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 227.
Rchb. 1841. Nom. p. 33. n. 1133: g. Potamear.
Meisn. 1842. Gen. p. 363 (271): g. Zannichelliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 144: g. Naiadacear.
Synon. Diplanthera Pet.-Th.

Halogareae Blume Mus. bot. Lugd. I. p. 110: sphalm. pro *Halorageae.*

Halogeiton (sphalm. *Halageiton*) Wittst. vid. *seq.*

Halogeton C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Fl. Alt. I. p. 378. t. 40: nov. g. Salsolear. — Par. Moq.-Tand. 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 211. — Rchb. 1837. Hdb. p. 239. (genuinar.) — Meisn. 1841. Gen. p. 321 (234).

*) δοῦλος, servus, subjectus.

Halogeton C. A. Meyer cont.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278: g. Chenopodear. — Par. Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 416 (*Halogeiton*).
Endl. 1837. Gen. n. 1946. p. 299; 1841. Ench. p. 82: g. Halimocnemidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6400.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 157: g. Halimocnemidum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 204: g. Anabasear. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. 2. p. 830. Sect.: Noëa, Agathophora, Euhalogeton, Halanthium.
Synon. Physogeton Jaub. & Spach.

Haloglossum Kütz. 1843. Phycol. gener. p. 340; 1845. Phycol. germ. p. 272; 1849. Spec. Alg. p. 561. n. 367: nov. g. Dictyotear.
J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 77: sect. Asperococci.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: inter Phycoideas dubias.
Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 430: subg. Scytosiphonis.

Halolachna Endl., Walp. vid. *Hololachna Ehrenb.*

Halolinum Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 598; 1848. ibid. VII. p. 507: series Linastri. (Linum maritimum, tenue.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 95.

Halonia Lindl. & Hutt. 1831. Foss. fl. II. p. 12: g. Coniferar.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 137; 1846. Chlor. prot. p. LIX: g. Lepidodendrear. Par. Dawes 1848. Quart. journ. geol. soc. (Flora 1849. Nr. 48.) — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 92.

Halonia Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 397: nov. g. Sphaeriaceor. (H. ditopa.) Subg.: Robergia?

Halophila Petit-Thouars 1809. Gen. madag. nr. 6 in Römer Collect. bot. p. 196: nov. g. Naiadum.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 238: g. Najadum.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 429. t. 40: g. Aroideis aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 43. n. 758: g. Zosterear.
Bartl. 1830. Ord. p. 72: g. Najadear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 796. n. 4127: g. Podostemear. (Monadelph. Triandr.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 122 (88). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 12.
Endl. 1837. Gen. n. 1837. p. 271; 1841. Ench. p. 155: g. dubium Podostemmear.
Rchb. 1841. Nom. p. 31. n. 1077: g. Zosteracear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 483: g. Podostemacear.
Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 229: g. Najadeis, magis forsan Hydrocharideis aff.
Synon. Barkania Ehrenb.

Halopithys Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 105; 1843. Phycol. gener. p. 433; 1845. Phycol. germ. p. 327; 1849. Spec. Alg. p. 840. n. 547: nov. g. Polysiphoniear.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 168: sect. Rytiphlaeae.

Synon. Lophyros Targ. pt.

Haloplegma*) Montagne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 258: nov. g. Phyceear.

Endl. 1843. Spl. III. p. 36. n. $122/_{24}$ (err. *Haplolegma*): g. Ceramiear. dubiae affinitatis. — Par. Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 171.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24 (*Haplolegma*): g. Ceramear.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 672. n. 444: g. Callithamniear.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53; 1849. ibid. XI. p. 121 (sub Rhodoplexia): g. Haloplegmear. — Par. Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 676.

Synon. Rhodoplexia Harv.

Haloplegmeae Montagne 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: trib. Floridear. Gen.: Haloplegma, Hanovia, Spongotrichum, Halodictyon.

Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 676: fam. Floridear. Gen.: Haloplegma. (Id. 1854. Linnaea XXVI. 5. p. 514. Nova gen.: Brachycladia, Spongoclonium.)

Halopteris Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 93; 1843. Phycol. gener. p. 292; 1845. Phycol. germ. p. 240: g. Sphaceleariear.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 175: sect. Sphacelariae.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 462. n. 285: g. Ectocarpear.

Haloragaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 722: ordo Myrtalium. Trib.: Halorageae, Trapeae.

Halorageae R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 549 (Verm. bot. Schr. I. p. 43); ordo plantar. ab Onagreis separatus. Gen.: Haloragis, Meionectes, Proserpinaca, Myriophyllum, Serpicula, Hippuris, Callitriche.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 555: fam. Calyciflorar. Gen.: Callitriche, Hippuris, Myriophyllum. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 442. Trib.: Hippurideae, Callitricheae, Hygrobieae.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: fam. Onagriflorar. Gen.: Hippuris, Proserpinaca, Myriophyllum, Serpicula, Haloragis, Datisca. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 169. Divis.: Hydrobiae, Cercodeae, Datisceae. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 632; 1837. Hdb. p. 244; 1841. Nom. p. 169. Divis.: Hippurideae, Myriophylleae et (1837) Datisceae.

Halorageae R. Brown cont.

DC. 1828. Pr. III. p. 65: ordo (72) Calyciflorar. Trib.: Cercodianae, Callitrichineae, Hippurideae. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 314. Divis.: Hippurideae, Callitricheae, *genuinae* (gen.: Trapa, Myriophyllum, Mejonectes, Proserpinaca, Cercodia, Haloragis, Serpicula). — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 700. Trib. ut DC. — Koch 1836. Syn. p. 244. Ed. II. p. 269. Gen.: Myriophyllum. — Endl. 1840. Gen. p. 1195; 1841. Ench. p. 639. Gen.: Hippuris, Myriophyllum, Serpicula, Proserpinaca, Meionectes, Haloragis, Loudonia. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 243; 1846. Chlor. prot. p. LXXXV. Gen. foss.: Myriophyllites, Trapa.

Link 1831. Hdb. II. p. 52: ordo 16 Perigynar. Gen.: Cercodia, Serpicula, Myriophyllum.

Lindl. 1833. Nix. p. 16: ordo ad Onagrarias accedens.

Mart. 1835. Consp. p. 48: ordo 228.

Meisn. 1838. Gen. p. 122 (87): subordo Onagracear. Trib. ut DC. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 527. Gen.: Proserpinaca, Myriophyllum, Hippuris. — Simil. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 723. Gen. ut Endl.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 117: fam. Oenotherinear. Gen.: Callitriche?, Hippuris, Myriophyllum, Proserpinaca, Haloragis, Trapa.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 464: fam. Dicotyledonear. perigynar. Gen. ut Endl.

Conf. Hygrobiae Rich.; Cercodianae Juss.; Haloragideae Dumort.; Halorrhageae Lindl.

Haloragideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 39: fam. Onagrariear. Gen.: Serpicula, Haloragis, Cercodia, Myriophyllum.

Haloragis*) Forst. 1776. Char. gen. p. 61. t. 31: nov. g. Octandr. Tetragyn. — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 34. n. 1389. — Murr. 1784. Syst. p. 381. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 267. n. 686. — Gmel. 1791. Syst. p. 641. — Pers. 1797. Syst. p. 408; 1805. Ench. I. p. 446. n. 993. — Willd. 1799. Sp. II. p. 473. n. 796; 1809. En. p. 433. — Cram. 1803. Disp. p. 97.

Scop. 1777. Intr. p. 105: g. Strictar.

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 305; 1789. Phil. Bot. I. p. 157.

Neck. 1790. El. II. p. 86. n. 744: g. Sarcodiphytor.

Mönch 1794. Meth. p. 108: g. Thalamostemonis.

Rich. 1808. Anal. fr. p. 34. Ed. Voigt p. 29: g. Hygrobiar.

R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 550 (Verm. bot. Schr. I. p. 44): g. Halorageur. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 324. n. 1653. — Bartl. 1830. Ord. p. 317.

*) πλέγμα, textum.

*) ἅλς, mare; ῥάξ, ῥαγός, acinus.

Haloragis Forst. cont.
— Fenzl 1837. Enum. pl. Hügel. p. 44. — Endl. 1840. Gen. n. 6138. p. 1197; 1841. Ench. p. 640. (ampliat.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1328. — Brongn. 1843. En. genr. p. 117. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 723. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 62. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 633. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 683.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 703; 1825. Syst. II. p. 260. n. 1514: g. Onagrar. (genuinar.) — Par. Link 1821. En. I. p. 387.
DC. 1828. Pr. III. p. 66: g. Cercodianar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 702. — Meisn. 1838. Gen. p 122 (87). Sect.: Cercodia, Haloragis, Goniocarpus.
Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4484: g. Cercodear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: g. Haloragidear.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 338: g. Cercodear.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 443: g. Hygrobiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 244; 1841. Nom. p. 169. n. 6548: g. Myriophyllear.
Synon. Cercodia Murr.; Goniocarpus Kön.

Halorhiza Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 96; 1843. Phycol. gener. p. 335; 1845. Phycol. germ. p. 269; 1849. Spec. Alg. p. 551. n. 360: nov. g. Chordear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 185.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: inter Phycoideas dubias.

Halorrhageae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (48) Calyciflorar. syncarpar.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 41: fam. Fauciflorar. Gen.: Myriophyllum, Hippuris.

Halosaccion Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phycol. gener. p. 439: nov. g. Chondrosiphear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 107: g. Chrysymeniear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 719: sect. Dumontiae.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 193: g. Gastrocarpear.

Haloschoemus Wittst. Etym. Handw. p. 416: sphalm. pro *Haloschoenus.*

Haloschoeni Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 109: subtrib. Rhynchosporear. Gen.: Dichromena, Psilocarya, Spermodon, Haloschoenus.

Haloschoenus Nees 1834. Linnaea IX. p. 296: nov. g. Rhynchosporear.
Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 119: g. Haloschoenor.
Steud. 1855. Glum. II. p. 136: sect. Dichromenae.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 271: sect. Rhynchosporae.
= Zosterospermum Palis.

Halostachys „Fisch. & Meyer" Rchb. 1841. Nomencl. p. 164. n. 6359: g. Salicornear. (Nomen.)

Halostachys Fisch. cont.
Schrenk 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 361: g. Chenopodiacear., intermedium inter Halocnemum et Salicorniam. (H. songarica.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 63. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513.
Endl. 1843. Spl. III. p. 63. n. 1908: g. Salicorniear. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 147. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 733. — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 771.

Halothamnus Jaub. & Spach 1846. Ill. pl. Or. II. p. 50. t. 136: nov. g. Salsolear. (H. Bottae.) *Cf.* Flora 1847. I. p. 293. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 569.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 42. n. $1949/_2$: g. Anabasear.
: Caroxylon Thunb.

Haloxylon „Bunge mss." Fenzl 1851 in Ledeb. Fl. Ross. III. p. 819: nov. g. Sodear. (Anabasis Ammodendron M.) — Par. Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 292; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 468. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 738.

Halterophora Endl. 1836. Gen. n. 294. p. 25; 1841. Ench. p. 16: g. Aegeriteor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 369.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 459: g. Myxogastrum recedens.
Synon. Tipularia Chev.

Halticosia „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1838. Fl. North-Am. I. p. 69: sect: Corydalidis. (C. paeoniaefolia Pers.)

Halurus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 100; 1843. Phycol. gener. p. 374; 1845. Phycol. germ. p. 288; 1849. Spec. Alg. p. 668. n. 435: nov. g. Callithamniear. — Par. Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 226.

Halydictyon Zanardini 1843. Sagg. classif. Fic. p. 52: nov. g. Algar., Callithamnio aff. (H. mirabile.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53 (*Halodictyon*): g. Haloplegmear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 662. n. 434: g. Callithamniear.
Synon. Coelodictyon Kütz.

Halydrys Harv. vid. *Halidrys Lyngb.*

Halymeda Lamx. . . . . Expos. méth. p. 26. (*Conf. Halimeda.*)
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465): g. Codiear.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92): g. Halymedear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 17. n. 49: g. Euhalymedear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 19: g. Halymedidar.

Halymedeae Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92): trib. Zoosporear. Gen.: Halymeda, Udotea.
Endl. 1843. Spl. III. p. 17: trib. Siphonear. Subtrib.: Udoteae, Euhalymedeae, Anadyomeneae.

Halymedidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 19: trib. Siphonear. Gen. Halymedear. et Ulvacear. Endl. 1843.

Halymenia*) Agardh 1817. Syn. Alg. p. XIX. 35; 1822. Spec. Alg. I. 2. p. 199 (Aphor. p. 100); 1824. Syst. Alg. p. XXXIV. 241: nov. g. Florideae. Cf. Lamx. 1827. Dict. v. 20. p. 239. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 351. — Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 360. — A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 330. — Mart. 1833. Belg. II. p. 484.

Spreng. 1827. Syst. IV. p. 333. n. 3492: g. Floridear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 92 p. 8: 1841. Ench. p. 6. (injunctis Dumontia Lamx., Catenella Grev., Sciniaia Biv., Dumontia Lamx.)

Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 178. t. 14. 15: g. Halymeniar.

Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 500: g. Halymeniaceae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: g. Sphaerococcear.

Rieg. 1831. Mart. II. p. 56: g. Chromatophyceae.

Spreng. 1831. Gen. II. p. [illegible] n. [illegible]: g. Ulvacear.

Harv. 1836 Gen. South-Afr. pl. p. 397; 1841. Brit. Alg. p. [illegible]; 1848. Ner. bor. am. II. p. [illegible] g. Gastrocarpeae. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. [illegible]. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg.

Mont. 1839 in Webb Canar. IV. p. [illegible]; 1842 in Orb. Dict. X. p. 34: g. Gastrocarpear. — Par. J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 70. — Decne. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 361. (Pers. 1844 p. [illegible]) — Endl. 1843. Sp. III. p. 30. n. [illegible] — Sond. 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 178.

Kütz. 1841. Nom. p. [illegible] n. [illegible]: g. Halymeniear. — Par. Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phyc. gener. p. 396; 1845. Phyc. germ. p. 300; 1849. Sp. Alg. p. 716. n. 477. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 142.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 23: g. [illegible].

Nägeli 1847. Alg. Syst. p. [illegible]: g. Grateloupiear.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: g. Euhalymeniear.

Sond. 1852 Linnaea XXV. p. 677: g. Cryptonemear.

Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 250: g. Cryptonemiaceae.

Synon. Platoma Schousb.: Nemastoma J. Agdh. pt.; Sciniaia Biv. Gelinaria Sond.

Halymeniaceae Rchb. 1828. Consp. p. 28: div. Floridear. Gen.: Amansia, Halymenia, Wormskioldia, Cladhymenia.

Halymenieae Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 176: fam. Floridear. Gen.: Chondria, Gelidium, Ptilota, Sphaerococcus, Halymenia.

Halymenieae Kütz. 1841. Nomencl. p. 20: div. Lemanieae. Gen.: Iridaea, Halymenia, Dumontia, Catenella.

Halymenieae Kütz. cont.

Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phyc. gener. p. 390. 393; 1845. Phyc. germ. p. 296; 1849. Sp. Alg. p. 713: fam. Periblasteae. Gen. 1849: Myelomium, Halymenia, Dumontia, Hoderiaceae, Catenella, Acrodiscus 1849, Grateloupia (non Myrionema), Schimmelmannia, Myelophycus, Kallymenia.

Rabenh. 1847. Krypt. II. 2 p. 142: subsect. Cryptonemear. Gen.: Ginnania, Kallymenia, Halymenia, Dumontia, Catenella.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: trib. Cenomyceae. Subtrib.: Euhalymeniear, Dumontieae.

Halymenites Sternb. 1838. Vers. II. p. 29: g. Floridearum.

Unger 1843 in Endl. Gen. Suppl. III. p. 54. n. 122/[illegible]: g. Algar. foss.

Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 12; 1846. Chlor. prot. p. XXVII: g. Florideae.

Mass. 1849 in Orb. Dict. X. p. 57: g. Phycear. foss.

Massal. 1858. Fl. foss. regni Veneti.

Synon. Arthrophycus (Endl.); Sabulopsis et Hemiphlyctis Massal.

Halymus Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. [illegible]: g. [illegible], ex typo Ampelisa ... 1841 in Nov. Act. Ups. VIII. p. 128. 334 sine nomine indicatum.

= Halimus Gray.

Halypterideae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 23: subordo Fucacear. Trib.: Sphacelarideae, Dictyoteae, Laminarideae, Sporochnideae.

Halypterideae Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 35: subordo Phycear. Trib.: Sphacelarieae, Dictyoteae, Laminarieae, Sporochnideae.

Halyseris Endl. 1836. Gen. n. 105 p. 9; 1841. Ench. p. 7: nom. dubium.

Harv. 1838 Gen. South-Afr. pl. p. 398; 1841. Brit. Alg. p. 27: g. Dictyoteae. — Par. J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 36; 1848. Spec. Gen. p. 114. — Endl. 1843. Spl. III. p. 23 n. [illegible] — Kütz. 1843. Sp. Alg. p. 561. n. [illegible].

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 23: g. Dictyoteae.

= Haliseris Targ.

Halyserites Unger 1843 in Endl. Spl. III. p. 34 n. 122/[illegible]: g. Algar. foss. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. [illegible].

Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 9; 1846. Chlor. prot. p. XXV: g. Phycear.

= Haliserites Sternb.

Halysiomeae Corda 1838. Icon. Fung. III p. 7: subtr. Perisporiacear. Gen.: Campsotrichum, Chaetosporium, Monosporium, Chaetopsis, Sporidesmium, Botryum.

Halysium*) Corda 1837. Icon. fung. I p. 11 t. 3. f. 156; 1842. ibid. V. p. 11; 1842. Mycol. p. 41: nov. g. Tuberculariear (Hyphomycetes). — Par. Rabenh. 1844 Krypt. I. p. 74.

Rchb. 1841. Nom. p. 4. n. 111: g. Tuberculariear.

*) ἁλυμός, marinus.

*) ἅλυσις & ἅλυσιον, parva catena.

Halysium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 96; 1843. Phycol. gener. p. 323: g. Lemaniear.
= Galaxaura Lamx.

Hamadryas „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 232: nov. g. Ranunculacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 240. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 329.
Gmel. 1791. Syst. p. 876: g. Polyandr. Polygyn.
Batsch 1802. Tab. p. 47: g. Multisiliquosar.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 833. n. 1831: g. Dioec. Polyandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 629. n. 2273.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 487: g. Ranunculear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 731; 1825. Syst. II. p. 658. n. 2038; 1830. Gen. I. p. 460. n. 2267. — Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4935. — Endl. 1850. Spl. V. p. 29. n. $4785/_1$.
DC. 1818. Syst. I. p. 226; 1824. Pr. I. p. 25: g. Anemonear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 253. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 24. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 451.*(?)* — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (3). — Endl. 1839. Gen. n. 4776. p. 846; 1841. Ench. p. 434. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428.
Rchb. 1837. Hdb. p. 276; 1841. Nom. p. 190. n. 7233: g. Knowltoniear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 190: g. Adoninear.

Hamamelaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 48.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 596: ordo Dicotyledonum. Trib.: Hamameleae, Fothergilleae.
= Hamamelideae R. Brown.

Hamameleae DC. 1830. Prodr. IV. p. 268: trib. Hamamelidear. Gen.: Hamamelis, Dicoryphe, Trichocladus. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 396. Gen. ead. — Meisn. 1838. Gen. p. 153 (109). Gen. ead. et Parrotia.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 596: trib. Hamamelacear. Gen.: Hamamelis.
= Euhamameleae Endl.

Hamameleae Endl. 1839. Gen. p. 803; 1841. Ench. p. 401: trib. Hamamelidear. *(Vid. Amamelideae Lemr.)* Subtrib.: Euhamameleae, Fothergilleae. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 466. Gen. ut Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 784: trib. Hamamelidacear. Gen.: Dicoryphe, Corylopsis, Trichocladus, Hamamelis, Loropetalum, Parrotia, Fothergilla, Distylium. — Par. Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 322. Subtrib.: Fothergilleae, Helwingieae, Euhamameleae, Parrotieae. — Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 273. Subtrib. eaed.

Hamamelidaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 784: ordo Umbellalium. *(Vid. Amamelidaceae Lemr.)* Trib.: Hamameleae, Bucklandeae.

Hamamelidaceae Lindl. cont.
Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 321: ordo emendat. Trib.: Altingieae, Hamameleae, Bruniaceae. *Cf.* Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 272.
Miers 1852. Ann. and Mag. IX. p. 130. Trib.: Diclidanthereae.

Hamamelideae R. Brown 1818 in Abel narr. journ. Chin. p. 374 (Descr. pl. chin. p. 3. — Verm. bot. Schr. I. p. 561): novus ordo plantar. Gen.: Hamamelis, Dicoryphe, Dahlia, Fothergilla?
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 19; 1826. Isis p. 592: ordo Calycanthemar.
A. Juss. 1826. Dict. class. VIII. p. 28; 1849 in Orb. Dict. VI. p. 465: fam. Dicotyledonear. perigynar. Trib. (1849) ut Endl.
Rchb. 1828. Consp. p. 87; 1837. Hdb. p. 176: div. Laurinear. Gen. ut R. Brown et Loropetalum. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 70. Gen.: Hamamelis, Trichocladus, Corylopsis, Dicoryphe.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: fam. Bruniariear. Gen.: Hamamelis, Dicoryphe, Foterghillia.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo *(42)* Calyciflorar. (syncarpar.) — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 267. Trib.: Hamameleae, Fothergilleae. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 395. Trib. eaed.
Bartl. 1830. Ord. p. 239: ordo (134) Umbelliflorar. Gen.: Hamamelis, Dicoryphe.
Link 1831. Hdb. II. p. 4: ordo 3 Perigynar. Gen.: Hamamelis.
Lindl. 1833. Nix p. 17: ordo Cornalium.
Meisn. 1838. Gen. p. 153 *(109)*: ordo 102 plant. *(p. 440 Umbelliflorar.)* Trib. ut DC.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 110: fam. Hamamelinear. Gen.: Hamamelis, Fothergilla.
Conf. Hamameleae Endl.

Hamamelideae Endl. 1839. Gen. p. 803; 1841. Ench. p. 400: ordo Discanthar. Trib.: Hamameleae, Bucklandieae.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 76: fam. (116) Umbelliflorar. Gen.: Sedgwickia, Bucklandia, Hamamelis, Loropetalum, Parrotia, Dicoryphe, Corylopsis, Fothergilla, Trichocladus.

Hamamelineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. XXIX. 109: class. Dialypetalar. perigynar. Fam.: Plataneae?, Balsamifluеae, Hamamelideae, Alangieae?, Bruniaceae.

Hamamelis*) „Gron." Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 54. n. 125; 1753. Sp. I. p. 124; 1759. Syst. ed. X. p. 900. n. 155; 1762. Sp. ed. II. p. 180; 1764. Gen. ed. VI. p. 66. n. 169; 1767. Syst. ed. XII. p. 129: g. Tetrandr. Digyn. — Par. Gron. 1743. Fl. virg. p. 139. — Murr. 1774. Syst. p. 140; 1784. Syst. p. 167. — Reich. 1778. Gen. p. 68. n. 181. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 90. n. 226. — Gmel. 1791. Syst. p.

*) Ἀμαμηλίς Graecorum genus quoddam pyri, mespili aut ficus.

Hamamelis Gron. cont.
281. — Pers. 1797. Syst. p. 173; 1805. Ench. I. p. 150. n. 332. — Willd. 1797. Sp. I. p. 701. n. 261; 1809. En. p. 171. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 107. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 491. n. 545.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 26. n. 101: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 273.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lauror.
Scop. 1777. Intr. p. 324: g. Disciferar.
Walt. 1788. Carol. p. 56. 255. n. 416: g. Polygam. Dioec.
Juss. 1789. Gen. p. 288: g. Berberidibus aff.
Neck. 1790. El. II. p. 224. n. 961: g. Eredophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 86: g. Berberideis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 87.
Batsch 1802. Tab. p. 114: g. Berberinar.
Cram. 1803. Disp. p. 189 in Dioec. Tetrandr.
Hedw. 1806. Gen. p. 80. n. 375: g. Berberidear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 672. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 242. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 550.
R. Brown 1818 in Abel Chin. p. 374 (Verm. bot. Schr. I. p. 561): g. Hamamelidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 87. n. 1899; 1841. Nom. p. 70. n. 2638. Sect. (1841): Hamamelis, Loropetalum. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35. — Bartl. 1830. Ord. p. 240. — Link 1831. Hdb. II. p. 5. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 78. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 110.
Röm. & Schlt. 1818. Syst. III. p. 32. 483. n. 589: g. Rubiacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 113. n. 573: g. Fothergillear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 268: g. Hamamelear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 396. — Meisn. 1838. Gen. p. 153 (109). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 596. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 784.
Endl. 1839. Gen. n. 4591. p. 804; 1841. Ench. p. 401: g. Euhamamelear. Sect.: Hamamelis (1841 Euhamamelis), Loropetalum. — Par. Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 323.
Synon. Trilopus Mitch.; Homomelis Wittst.

Hamaria „Kunze chil." Rchb. 1828. Consp. p. 212b. n. 4424b: g. Rosear. (Nomen.)

Hamastris Martius mss.
. Myriaspora DC.

Hamatolobium Fenzl 1842. Pug. pl. nov. Syr. p. . . .: nov. g. Papilionacear. (Linnaea XVI. Litt. p. 227.)
Walp. 1842. Rep. I. p. 724: g. Coronillear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 351.
Conf. Hammatolobium Fenzl, Endl.

Hambergera Scopoli 1777. Introd. p. 106. n. 276: g. Strictar.
Neck 1790. El. II. p. 141. n. 830 (*Hambergia*): g. Coryphophytor.
= Cacoucia Aubl.

Hambergeria Wittst. Etym. Handw. p. 416: vid. *praeced.*

Hambergia Necker vid. *praeced.*

Hamelia*) Jacquin 1763. Stirp. Amer. hist. p. 71. t. 50: g. Pentandr. Monogyn.
Scop. 1777. Intr. p. 142: g. Opulinar.
Juss. 1789. Gen. p. 207 (praeced. B. Juss. in Ht. Trian.); 1820. Mém. Mus. VI. p. 398: g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 589. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 448. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 244. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 765. n. 830; 1830. Gen. I. p. 175. n. 883. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 792.
Neck. 1790. El. I. p. 137. n. 236: g. Sphanidophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 235: g. Guettardear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 615.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 413: g. Hameliacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 63. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2109. — Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 191. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 227.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: g. Vanguerіear.
Bartl. 1830. Ord. p. 211: g. Hedyotidear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 441: g. Hameliear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 540. — Endl. 1838. Gen. n. 3228. p. 546; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 422. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 35. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2925. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 50.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180: g. Gardeniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hamelidar.
Synon. Hamellia Linn.; Tangaraca Adans.; Lonicera Plum.; Duhamelia Pers.; Duhamela Rafin.

Hameliaceae HBK. Nov. gen. III. p. 413 (Kunth 1824. Syn. III. p. 63): sect. Rubiacear. Gen.: Hamelia, Isertia, Gonzalea, Sabicea, Euosmia, Amaioua. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 96. Gen. ead. et Leycestera, Piringa, Polyphragmon, Patima. — Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 191. Gen.: Hamelia, Sabicea, Axanthes, Gonzalagunia.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 108. 226: trib. 8 Rubiacear. Gen.: Hamelia, Sabicea, Schradera, Patima, Bikkia, Polyphragmon, Morelia, Evosmia, Axanthes, Alibertia.
Conf. Hamelieae DC.

Hamelidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 765: trib. Cinchonear. Gen. Hameliear. Endl. et Lachnosyphonium.

Hamelieae DC. 1830. Prodr. IV. p. 438: trib. Rubiacear. Gen.: Tepesia, Evosmia, Sabicea, Olostyla, Axanthes, Urophyllum, Hamelia, Alibertia, Schradera, Brignolia, Patima, Polyphragmon. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 538. Gen. ead. et Morelia. — Meisn. 1838. Gen. p. 164 (116).

*) Dicat. Joanni Bapt. Du Hamel du Monceau.

Hamelieae DC. cont.
Gen. ut DC. et Schizostigma. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 50. Gen.: Hamelia.
Endl. 1838. Gen. p. 545: trib. Cinchonacear. Gen. ut DC. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1393 et Ench. p. 273) Schizostigma et 1843 (Spl. III. p. 73) Lachnosiphonium.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. 422: sect. Rubiacear. Gen. ut DC.
Rchb. 1841. Nom. p. 77: subsect. Gardeniariar. Gen. fere ut DC.
Synon. Hameliaceae Kunth; Hamelidae Lindl.; Rubiacear. sect. 5 Juss.

Hamelinia A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 158: nov. g. Colchicacear.
= Astelia Banks.

Hamellia Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 246; 1764. Gen. ed. VI. p. 93. n. 232; 1767. Syst. ed. XII. p. 165. n. 231: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 179; 1784. Syst. p. 215. — Reich. 1778. Gen. p. 95. n. 249. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 123. n. 305. — Gmel. 1791. Syst. p. 366. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 77. — Pers. 1797. Syst. p. 224. — Willd. 1797. Sp. I. p. 980. n. 359; 1809. En. p. 220.
Gled. 1764. Syst. p. 203. n. 842: g. Petalostemonum.
Link 1821. En. I. p. 227: g. Rubiacear.
= Hamelia Jacq.

Hamellidia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: subfam. Polarniae. Gen.: Duhamela, Patima?, Phosanthus, Jangaraca, Bellilla, Sabicea, Gonzalea, Isertia.

Hamiltonia*) „Mühlenb.“ Willd. 1805. Spec. IV. p. 1114. n. 1913; 1809. Enum. p. 1061: g. Polygam. Dioec.
Pers. 1807. Ench. II. p. 615. n. 2211: g. Dioec. Pentandr.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 323; 1825. Syst. I. p. 831. n. 949; 1830. Gen. I. p. 205. n. 1047: g. Santalear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13 (sph. *Halmiltonia*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 578. 878.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 156: g. Pentandr. Monogyn.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 247: g. Elaeagnor. („*des chalefs*“).
Link 1822. En. II. p. 247: g. Apetalar.
Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1711: g. Osyridear.
Sonder 1857. Flora p. 365: g. Santalacear.
= Pyrularia Rich.

Hamiltonia Roxb. 1814. Cat. h. Calc. p. 15; 1824. Fl. Ind. ed. Wall. II. p. 223; ed. 1832. I. p. 554: nov. g. Pentandr. Monogyn. (H. suaveolens et pilosa.)
D. Don 1825. Nepal. p. 137: g. Stipulariar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 462: g. Guettardear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 554. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 423. — Meisn. 1838. Gen. p. 166 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2851. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49.

*) Dicat. Will. Hamilton, botanico anglico.

Hamiltonia Roxb. cont.
Endl. 1838. Gen. n. 3201. p. 542; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g Guettardidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 326: g. Pyrostriear.
Synon. Spermadictyon Roxb.; Spermadyction Rchb.

Hammatocaulis*) Tausch 1834. Flora I. p. 347: nov. g. Peucedanear. (Peucedanum creticum DC.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. IV. (1835.) p. 47. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). — Endl. 1839. Gen. n. 4469. p. 780; 1841. Ench. p. 379. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 135. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5468. — Walp. 1843. Rep. II. p. 413.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Hammatolobium Fenzl 1843. Ill. pl. Syr. p. 1; 1843 in Russegg. Reise I. p. 887. t. 1: nov. g. Coronillear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 103. n. $6587/_1$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Conf. Hamatolobium Fenzl, Walp., Meisn.

Hamolocenchrus „Hall.“ Scopoli 1777. Introd. p. 73: g. Graminum legitimor.
Conf. Homalocenchrus Mieg.

Hamosa Medic. (Vorles. II. p. 276) 1789. Phil. Bot. I. p. 310: nov. g. pro Astragalo hamoso L. constitutum.

Hampea**) Schlechtend. 1837. Linnaea XI. p. 371: nov. g. Bombacear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5310. p. 991; 1841. Ench. p. 515 (dubium). — Meisn. 1843. Comm. p. 343. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 361. (?)
Rchb. 1841. Nom. p. 204. n. 7751: g. Ochromear.

Hampea Nees mss. olim.
= Santeria Nees.

Hamulium Cassini 1820. Bull. soc. philom. Nov. p. 173; 1821. Dict. v. 20. p. 260; 1825. v. 38. p. 17: nov. g. Helianthear. (Verbesina alata L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2627. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20. (verar.)
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 139; 1830. v. 60. p. 576: g. Verbesinear.
DC. 1836. Pr. V. p. 617: sect. Verbesinae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2550 *b.* p. 415; 1841. Ench. p. 239. — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3153. 2.

Hanburia Seemann 1858. Bonplandia VI. p. 293: nov. g. Cucurbitacear., Cyclantherae aff.

Hancornia***) Gomes 1812. Mem. Ac. Lisboa III. Mem. dos corresp. p. 51: nov. g. Pentandr. Monogyn., Ambelaniae et Pacouriae aff. (H. speciosa.) — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 157. n. 787. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 691.

*) ἅμμα, nodus.
**) Dicat. Hampe, botanico.
***) Dicat. Phil. Hancorn.

Hancornia Gomes cont.
Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 84: g. Apocynear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 671. n. 738: g. Contortar.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3565: g. Cerberear.
Bartl. 1830. Ord. p. 205: g. Carissear.. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3373. p. 578; 1841. Ench. p. 293. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 501. — Meisn. 1840. Gen. p. 262 (171). — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5190. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 102: g. Melodiniear.
Horkel 1841. Ber. Ak. Berl. p. 81.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 325: g. Eucarissear.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 70. n. 279.
Synon. Mangaiba Pis.; Mangabiba Marcgr.

Handschia Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plant. (Nomen.)

Hanguana*) Blume 1830. Enum. pl. Jav. I. p. 15: nov. g. Asparagear., Asteliae aff.
Endl. 1837. Gen. n. 1052. p. 131; 1841. Ench. p. 75: g. Asteliear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 365. — Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1677. — Meisn. 1842. Gen. p. 406 (310). — Steud. 1855. Glum. II. p. 312. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 248.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 134: g. Junceaceis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 192 in synon. Asteliae.

Hannoa**) Planchon 1846. Lond. journ. bot. V. p. 566: nov. g. Simarubear. (Simaba undulata Guill.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 163. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 277. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99. n. $5964/_1$.

Hanovia Montagne vid. *seq.*

Hanowia Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 52; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 170: nov. g. Ceramiear. (H. australis.)
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53 (*Hanovia*): g. Haloplegmear.?
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 672. n. 443: g. Callithamniear.

Hansenia Turczan. 1844. Bull. soc. Mosc. XVII. p. 754: g. Umbellatar.
Ledeb. 1845. Ross. II. p. 362: g. Smyrnear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 920.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 15. n. $4536/_1$: g. Eusmyrnear.

Hansteinia***) Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 30: nov. g. Acanthacear. (H. gracilis.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 640.

*) *Hangaan-Kassintu* Sund.
**) Dicat. celebr. Hanno, navigatori Carthagin.
***) Dicat. Dr. Joh. Hanstein, Berolin.

Hapalanthus*) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 11. t. 11: nov. g. Triandr. Monogyn. (H. repens.)
Adans. 1763. Fam. II. p. (19): g. Juncor. (*Apalantus.*)
= Callisia Löfl.

Hapalaria Dumort. vid. *Haplaria Link.*

Hapalidium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phycol. gener. p. 385; 1845. Phycol. germ. p. 295; 1849. Sp. Alg. p. 695. n. 464: nov. g. Spongitear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: g. Ulvear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Floridear. dubium.

Hapalocarpum**) Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 305: subg. Ammanniae. (A. indica Lam.) — Par. Blume 1855. Mus. bot. Lugd. II. p. 133.
Miq. 1855. Ind. bad. I. p. 617: g. Lythrear.
= Corneliae Ard. pars.

Hapalochlamys Rchb. vid. *Apalochlamys Cass.*

Hapalosia „Wallich" Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 358: nov. g. Illecebrear. (Pharnaceum depressum L.)
Meisn. 1838. Gen. p. 133: g. Spergulear. (Comm. p. 97 Spergulariear.)
= Arversia Camb.

Hapalosiphon „Nägeli mss." Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 894: nov. g. Scytonemear.

Hapalostephium D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307: nov. g. Hieracear. (Hieracium pyrenaicum, paludosum, etc.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 140.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 644. n. 3237: g. Cichorear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 165: sect. Crepidis. — Soyeria Monn.

Hapalus Endl. vid. *Apalus DC.*

Hapaxantha Webb & Berth. 1836. Phytogr. Canar. I. p. 181: sect. Aichrysi. (Sempervivum dichotomum DC.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6189. 1. — Walp. 1843. Rep. II. p. 263; 1846. V. p. 797.

Haplachne***) Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. 235: nov. g. Agrostidear. *Cf.* Flora 1830. II. Erg. Bl. p. 95.
Kunth 1833. Agrost. p. 472: g. Andropogonear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 398. — Meisn. 1843. Gen. p. 427 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166.
Endl. 1837. Gen. n. 936 *a.* p. 106; 1841. Ench. p. 60: sect. Dimeriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1341. 1.

Haplanthera Hochstett. 1843. Flora I. p. 71: nov. g. Aphelandrear. *Cf.* Hochst. in Bot. Zeit. 1844. p. 853 (*Hablanthera*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Justiciadar.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 308: g. Gendarussear.

*) Nomen a florum habitu tenello.
**) ἁπαλός, tener.
***) ἁπλόος, simplex.

Haplanthus Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 115; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 512: nov. g. Andrographidear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 110. n. 4293. — Endl. 1839. Gen. n. 4100. p. 707; 1841. Ench. p. 344. — Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 147. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 855.

Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 82: g. Acanthacear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Andrographidar.

Haplaria Link 1809. Berl. Mag. III. p. 11: nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 473. — Par. Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 34. (Byssoidear.) — Nees 1816. Syst. p. 52; 1817. Überbl. p. 13. (capitatar.) — Mart. 1817. Erlang. p. 340. — Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 28.

Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Botrytidum.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 552: g. Aspergillidear.

Link 1824. Spec. I. p. 52: g. Hyphomycetum.

Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 536: g. Botrytidear.

Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Aspergillacear.

Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 115 *h*; 1841. Nom. p. 4. n. 162. 2: sect. Botrytidis. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 227 *b*. p. 19; 1841. Ench. p. 14.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75 (*Hapalaria*): g. Gonocladear.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 89: g. Spondylomycetum.

Bonord. 1851. Hdb. p. 87: g. Psiloniaceor.

Haplarthron Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 203: sect. Desmodii. (D. molle DC.)

Haplocalea Lessing 1832. Syn. Compos. p. 241: subg. Caleae.

= Caleacte DC. pt.

Haplocarpaea „W. & A." Endl. Gen. p. 1200 in synon. Corneliae: vid. *Hapalocarpum Wight & Arn.*

Haplocarpha Lessing 1831. Linnaea VI. p. 90; 1832. Syn. Compos. p. 36: nov. g. Artotidear. (H. lanata.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. (verar.) — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3237.

DC. 1837. Pr. VI. p. 494: g. Arctotear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2833. p. 464; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Haplochilus Endl. 1841. Ench. n. 1566. p. 113; 1842. Spl. II. p. 20: g. Physuridar.

Meisn. 1843. Comm. p. 371: g. Physuridear.

Synon. Monochilus Wall.

Haplodesmium Naudin 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 150: nov. g. Lasiandralium. (H. Lindenianum.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 593.

Haplodictyon Fée vid. *seq.*

Haplodictyum Presl 1850. Epimel. bot. p. 410 (50): nov. g. Nephrodiariar, Pleocnemiae aff. (Nephrodium Blumei Sm.)

Fée 1852. Gen. Fil. p. 309 (*Haplodictyon*): g. Aspidiear.

Haplodiscus Endl. 1838. Gen. n. 2381 *g*. p. 386; 1841. Ench. p. 235: sect. Haplopappi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3335. 7.

Aplodiscus DC.

Haplodon Mont. vid. *Aplodon R. Brown.*

Haplodon Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVII. p. 372: subsect. Clidemiopsidis. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 765.

Haploësthes A. Gray 1849. Pl. Fendl. p. 109 adnot. (Mem. Amer. Ac. IV. p. 1. — — Flora 1850. II. p. 713): nov. g. Senecionear. (H. Greggii.)

Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 909: g. Eusenecionear.

Haplohymenium Schwägr. 1829. Suppl. III. vol. II. 1. t. 271: nov. g. Muscor. frondosor. (H. microphyllum.)

Dozy & Molk. 1846. Musc. frond. ined. t. 30.

= Leptohymenium Schwägr. *Cf.* Hampe in Bot. Zeit. 1847. p. 940.

Haplolaeneae Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXVII: gradus 3 Frondosar. Gen.: Pellia, Blasia.

Endl. 1841. Spl. I. p. 1339; 1841. Ench. p. 27: subtrib. Jungermanniear. frondosar. Gen. ead. et Symphyogyna. — Par. Nees 1845. Syn. Hepat. p. 479. Gen. ead. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 15. — Bayrh. 1849. Taun. p. 52.

Haplolaenidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 59: trib. Jungermannear. Gen. Haplolaenear. Endl.

Haplolegma Endl., Lindl. vid. *Haloplegma Mont.*

Haplolepidea Rchb. 1841. Nomencl. p. 93. n. 3655. 1: sect. Centaureae. (Series Aplolepideae DC.) Subsect.: Hyalea, Centaurium, Microlophus, Chartolepis, Phalolepis.

Haplolophium „Martius mss." Endl. 1839. Gen. n. 4120. p. 712; 1841. Ench. p. 346: g. Eubignoniear. — Par. DC. 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 284; 1845. Pr. IX. p. 192. (Monostictidum.)

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130: g. Bignoniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4565. (genuinar.)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677: g. Bignoniacear.

Synon. Aplolophium Cham.

Haplomitrium Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 100. 109; 1838. ibid. IV. p. XXI; 1844. Syn. Hepat. p. 1: g. Gymnomitrior. Par. Gottsche 1843. Nov. Act. Leop. XXI. 1. p. 265. — Endl. 1841. Spl. I. n. 474/$_3$. p. 1344; 1841. Ench. p. 28. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 69.

Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 304: g. Gymnomitriear.

Haplomitrium Nees cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Gymnomitridar.
Synon. Scalius Gray; Mniopsis Dumort.

Haplomycetes Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 485: fam. Fungor. Series: Hyphomycetes, Coniomycetes.

Haplopappus Endl. 1838. Gen. n. 2381. p. 385; 1841. Ench. p. 235: g. Solidaginear. Sect.: Leiachenium, Blepharodon, Euaplopappus, Leucopsis, Pyrochaeta, Inulopsis, Haplodiscus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3335. Sect. eaed. — Walp. 1843. Rep. II. p. 592. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.
= Aplopappus DC.

Haploperistomi Hübener 1838. Muscol. germ. p. 543: series 1 Pleurocarpor. Gen.: Fabronia, Leptodon, Leucodon.

Haplopetalon A. Gray 1853. Char. n. gen. p. 8 (Proc. Amer. Ac. III); 1854. Un. st. expl. exp. p. 608: nov. g. Legnotidear. *Cf.* Flora 1855. p. 399. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 596 (*Haplopetalum*). — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 674.

Haplopetalum Miquel vid. *praeced.*

Haplophlebia Martius 1828. Crypt. p. 64.
Endl. 1841. Spl. I. n. 652 *a.* p. 1351; 1841. Ench. p. 37: sect. Alsophilae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Cyathear.

Haplophyllion Rchb. 1841. Nomencl. p. 88. n. 3436. 5: sect. Mutisiae.
Synon. Aplophyllum Cass.; Haplophyllum Endl.

Haplophylloxys Endl. 1840. Gen. n. 6058 *e.* p. 1172; 1841. Ench. p. 624: sect. Oxalidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 203. n. 7728. 5.

Haplophyllum Rchb. 1832. Fl. exc. p. 766; 1837. Handb. p. 282; 1841. Nom. p. 196. n. 7493: g. Rutear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Endl. 1840. Gen. n. 6028. p. 1161; 1841. Ench. p. 614: g. Rutacear. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 490. — Walp. 1842. Rep. I. p. 518. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 129.
Spach 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 174. (Monogr.) Subgen.: Euhaplophyllum, Peganoides. *Cf.* Walp. Ann. bot. II. p. 251.
Conf. Aplophyllum A. Juss.

Haplophyllum Endl. 1838. Gen. n. 2917 *e.* p. 484; 1841. Ench. p. 248: sect. Mutisiae. (*Aplophyllum Cass., Less.*)
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Vernoniear. verar.
= Haplophyllion Rchb.

Haplophyton A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 412: nov. g. Echitear. (Echites cimicifuga Pav.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Haplopteris Presl 1836. Pterid. p. 141: g. Adiantariar. (Pteris scolopendrina Bory.) *Cf.* Fée 1852. Gen. Fil. p. 357.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 48: g. Pteridear.
= Vittariae sp. Mett.

Haplorhiza Ledeb. 1849. Fl. Ross. III. 1. p. 18: sect. Androsaces. (A. septentrionalis, maxima.) — Par. C. Koch 1850. Linnaea XXIII. p. 608 (*Haplorrhiza*).

Haplorrhiza C. Koch vid. *praeced.*

Haplosciadium Hochstett. 1844. Flora I. p. 20: nov. g. Hydrocotylear.? — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 839. — Endl. 1850. Spl. V. p. 2. n. 4368/$_2$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Haplosiphon Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 438: nov. g. Scytosiphonear. (Chorda lomentaria Lyngb.)

Haplosphaeriae De Notaris 1844. Cenni Pirenomic. (*cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 483): sect. Sphaeriacear. Nova gen.: Venturia, Massaria, Rosellinia, Bertia.

Haplosporium Montagne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 372: nov. g. Fungor. (H. bulborum.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Sphaeriaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 417: g. Sphaeropsideor.

Haplostelis Rchb., Spach vid. *seq.*

Haplostellis Endl. 1837. Gen. n. 1603. p. 219; 1841. Ench. p. 114: g. Arethusear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2173 (*Haplostelis*). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182 (*Haplostelis*).
Lindl. 1840. Orchid. p. 411: g. Euarethusear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 382 (286).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Pogonidar.
Conf. Aplostellis A. Rich.

Haplostemma Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 75. n. 3486/$_1$: g. Euasclepiear. (*Blyttia W. Arn.*)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Asclepiadear. verar.
= Vincetoxicum Mönch?

Haplostemmae Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 511: div. Asclepiadear. verar. Gen.: Metaplexis, Parapodium, Barjonia, Pycnostelma, Metastelma, Raphistemma, Roulinia, Enslenia, Cordylogyne, Xysmalobium, Periglossum, Glossostephanus, Podostigma, Acerates, Vincetoxicum, Oncinema.

Haplostemmeae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 477: subtrib. Asclepiadear. verar. Gen.: Rhaphistemma.

Haplostemum „Rafin. Journ. Phys. LXXIX. p. 105" Endl. Gen. p. 119; Ench. p. 64 et Lindl. Veg. kingd. p. 119: vid. *Aplostemon Rafin.*

Haplostephium „Martius" DC. 1836. Prodr. V. p. 78: nov. g. Albertiniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2222. p. 361;

Haplostephium Martius cont.
1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 177 (123). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3857.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 40: g. Rolandrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709: g. Heterocomear.

Haplostigma Ledeb. 1842. Fl. Ross. I. p. 132: sect. Parryae. (Draba grandiflora Mey.)

Haplostyleae Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 124: subtrib. Rhynchosporear. Gen. Asteroschoenus, Haplostylis, Cephaloschoenus, Echinoschoenus, Mitrospora, Ephippiorhynchium, Calyptrostylis.

Haplostylis Nees 1834. Linnaea IX. p. 295; 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 265; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 101: nov. g. Rhynchosporear.
Nees 1834 in Wight & Arn. Contrib. p. 15. (= Sphaeroschoenus Arn.) *Cf.* Steud. 1855. Glum. II. p. 143.
Endl. 1837. Gen. n. 966 *c.* p. 112; 1841. Ench. p. 63: sect. Haplostylidis. Subsect.: Pterotheca, Calyptrostylis, Cephaloschoenus, Diplochaete. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1450. 3.
Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 126: g. Haplostylear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Rhynchosporidar.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 271: sect. Rhynchosporae. (Rh. polycephala Wight.)
Conf. Pterorrhynchium et Ephippiorhynchium Nees.

Haplostylis Endl. 1837. Gen. n. 966. p. 112; 1841. Ench. p. 63: g. ampliat. Rhynchosporear. Sect.: Morisia, Mitrospora, Haplostylis, Ceratoschoenus. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1450. Sect. eaed. (p. 236 Microchaeta loco Morisiae.)

Haplotaxis Endl. 1838. Gen. n. 2854. p. 468; 1841. Ench. p. 246: g. Carlinear. Sect.: Frolovia, Cirsioides, Eriocoryne. — Par. Ledeb. 1846. Ross. II. p. 672. Sect.: Frolowia, Eriocoryne. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3894: g. Saussureear. Sect.: Frolovia, Haplotaxis, Eriocoryne.
Conf. Aplotaxis DC.

Haplotaxis Rchb. 1841. Nomencl. p. 99. n. 3894. 2: sect. Haplotaxidis.
= Cirsioides Endl.

Haplotella Endl. 1836. Gen. n. 1 *b.* p. 2; 1841. Ench. p. 2: sect. Frustuliae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 631. 2.
Conf. Aplotella Kütz.

Haplotrichum Link 1824. Spec. I. p. 52: nov. g. Hyphomycetum. (Acladium capitatum Link.)
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 164: g. Aspergillacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 6. n. 115 *i*: sect. Botrytidis.

Haplotrichum Link cont.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 20: g. Aspergillinor.
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 11; 1839. Prachtfl. p. 23. t. 11 (roseum): g. Polyactidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 167: g. Dendryphieor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 15; 1842. Mycol. p. 59: g. Stilbinor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 101: g. Mucedineor. genuinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucedinum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 490: g. Botrytideor.
Lev. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Cephalosporeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 104: g. Polyactideor.
Sporocephalum Chev.?

Haplotrichum Eschweiler 1824. Syll. Ratisb. I. p. 166: nov. g. Byssor.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 545: g. Byssinear.?
Fries 1825. Pl. homon. p. 307: g. Racodiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 72: g. Racodiaceor.
= Gliotrichum Eschw.

Happia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 126. n. 807: g. Plyrontophytor.
= Tococa Aubl.

Haquetia Dietr. vid. *Hacquetia Neck.*

Hardenbergia*) Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 40: nov. g. Phaseolear. (Kennedya Comptoniana Link.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 352. — Brongn. 1843. En. genr. p. 130.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 124: g. Kennedyear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6644. p. 1290; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5800. — Walp. 1842. Rep. I. p. 758. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 94. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.

Hardwickia**) Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 6. t. 209; 1832. Fl. Ind. II. p. 423: nov. g. Decandr. Monogyn. (H. binata et pinnata.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 482.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 275: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 357. n. 1676; 1830. Gen. I. p. 368. n. 1860. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1515.
DC. 1825. Pr. II. p. 486: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 435. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 284. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (69).
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4106; 1841. Nom. p. 154. n. 6048: g. Ceratoniear.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear. legitimar.

---

*) Dicat. comitissae de Hardenberg, e gente de Hügel.
**) Dicat. Colonel Thomas Hardwicke.

Hardwickia Roxb. cont.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88: g. Caesalpiniear. (verar.) — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6808. p. 1321; 1841. Ench. p. 675.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Cynometrear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 79.

Hargasseria „Schiede & Deppe mss.“ C. A. Meyer 1843. Bull. Ac. Pet. I. Nr. 23. p. 356: g. Daphnear. (a Meisn. in DC. Pr. XIV. 2. p. 520 ad Daphnopsidem relatum.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 68. n. 2106/8: g. Eudaphnear.
Synon. Nordmannia Fisch. & Mey.

Harina Hamilt. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 317: novum nomen pro *Wrightea Roxb.*
Spreng. 1831. Gen. II. p. 792. n. 4110: g. Palmar. (Hexandr. Monogyn.)
Mart. . . . . Palm. p. 188. t. 136.
Endl. 1837. Gen. n. 1732. p. 248; 1841. Ench. p. 135: g. Arecinar. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 193. — Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2263. — Meisn. 1842. Gen. p. 356 (266).
Brongn. 1843. Én. genr. p. 15: g. Arecinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 60.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 465: sect. Wallichiae.
= Wallichia Roxb.

Hariota Adans. 1763. Fam. II. p. 243: g. Portulacar.
= Rhipsalis Gärtn.

Hariota DC. 1834. Mém. esp. Cact. p. 23: nov. g. Opuntiacear. (Rhipsalis salicornoides Haw.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 114.
Pfeiff. 1837. En. Cact. p. 141: g. Cactear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 128 (92).
Miq. 1839. Bull. Néerl. 2e livr. p. 116: subg. Hariotae.
Endl. 1839. Gen. p. 945. n. 5160 c: sect. Rhipsalidis.
SalmD. 1840 in Otto's Gartenz. p. 60: g. Rhipsalidear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 5160/2. p. 1422; 1841. Ench. p. 496. — Rchb. 1841. Nom. p. 161. n. 6260.
Spach. 1846. Vég. phan. XIII. p. 395: g. Nopalear.

Hariota Miquel 1839. Bull. Néerl. 2e livr. p. 114: g. Cactear. ampliat. Subgen.: Rhipsalis, Lepismium, Hariota.

Harissona „Adans.“ Leman 1821. Dict. v. 20. p. 290: vid. *Harrisona Adans.*

Harlandia „Hance Pl. Nov. Austr. Chin. diagn. II. p. 10“ Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 648: g. Cucurbitacear.

Harmala*) Tourn. 1700. Inst. p. 257. t. 133: g. pl. class. VI.

Harmala Tourn. cont.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 124: g. pl. class. V.
Adans. 1763. Fam. II. p. 343: g. Pistaciar.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 81. *Cf. Peganum Medic.*
Mönch 1794. Meth. p. 239: g. Thalamostemonis.
= Peganum Link.

Harmodia*) D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 202: sect. Proustiae. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 27. — Endl. 1838. Gen. n. 2918 c. p. 484; 1841. Ench. p. 248. — Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3790. 4.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 9: g. Stähelinear.

Harmogia Schauer 1843. Linnaea XVII. p. 238: nov. g. Bäckear. (Bäckea densifolia Sm.)
Walp. 1843. Rep. II. p. 921; 1846. V. p. 734: g. Bäckeear.

Harnemia Fisch. & Meyer . . . . Ind. sext. sem. h. Petrop. (Linnaea Litt. 1840. p. 149): sect. Hermanniae. (H. arabica Hochst. & St.)

Haronga**) Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. nr. 49 in Römer Collect. bot. p. 206: g. Hypericor. (*Harongana Lam.*)
Choisy 1821. Prodr. Hypér. p. 33; 1824 in DC. Pr. I. p. 541: g. Vismiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 210. n. 5475; 1837. Hdb. p. 308; 1841. Nom. p. 211. n. 8012.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII: g. Hypericear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33).
Bartl. 1830. Ord. p. 292: g. Hypericinear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 614: g. Eucryphiear.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 355; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 350: g. Vismiear.
Endl. 1840. Gen. n. 5468. p. 1034; 1841. Ench. p. 539: g. Elodear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406.
Synon. Harongana Lam.; Harungana Poir.; Arungana Pers.; Haemocarpus Nor.

Harongana Lamarck Illustr. t. 645.
= Haronga Pet.-Th.

Harpachaena***) Bunge 1845. Del. sem. h. Dorp. p. 3 adnot.; 1846. Linnaea XIX. 4. p. 396 (Ann. sc. nat. 3e sér. V. 1846. p. 369): g. Hyoseridear. *Cf.* Walp. 1847. Rep. VI. p. 327.
= Harpocarpus Endl.

Harpachne Hochstett. 1841 in Schimp. pl. Abyss. sect. 1. nr. 171 (Flora 1841. Intell. p. 20): nomen.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1400: g. Seslerieaг.

*) *ἁρμαλα* Graecorum et Apuleji.

*) *ἁρμόδιος*, aptus, commodus.
**) *Haronga* nomen Madagascariensium.
***) *ἅρπη*, falx.

Harpachne Hochstett. cont.
Meisn. 1843. Comm. p. 324: g. Bromear. — Par. Spach 1849. Vég. phan. XIII. p. 164. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 780.
Hochst. 1850 in Rich. Fl. Abyss. II. p. 431: g. Poacear.
Steud. 1854. Glum. I. p. 300: g. Festucacear.

Harpaecarpus Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 389: nov. g. Madiear. (H. madarioides.) — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 406. — Endl. 1842. Spl. II. p. 45. n. 2628|₁. — Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Walp. 1843. Rep. II. p. 631.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Sphenogynear.

Harpagophytum*) „DC. mss." Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 298 (206): nov. g. Pedaliear.
DC. 1845. Pr. IX. p. 257: g. Pedalinear.
Synon. Uncaria Burch.

Harpalium Cassini 1818. Bull. soc. philom. Sept. p. 141; 1821. Dict. v. 20. p. 299: subg. Helianthi. — Par. Less. 1832. Syn. p. 229.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1829. v. 59. p. 140; 1830. v. 60. p. 576: g. Heliantheae. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2628. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 182. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 149. (verar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 42.
DC. 1836. Pr. V. p. 583: g. Coreopsidear. Sect.: Euharpalium, Harpalizia. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2536. p. 412; 1841. Ench. p. 238. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 203 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3604. Sect. Harpalium, Harpalizia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Gardn. 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 404: sect. Viguierae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 864.

Harpalizia DC. 1836. Prodr. V. p. 584: sect. Harpalii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2536 *b*. p. 412; 1841. Ench. p. 238. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3604. 2.
Gardn. 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 402: sect. Viguierae. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 863.

Harpalyce „Moç. & Sess. Fl. mexic." DC. 1825. Prodr. II. p. 523: g. Leguminosar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 467.
Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3883: g. Astragalear.? — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). — Endl. 1840. Gen. n. 6577. p. 1278; 1841. Ench. p. 669 (dubium). — Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5766.
Benth. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 209: g. Galegear. Char. emend. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 96. n. 6542|₁.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Brongniartiear.
Synon. Megastegia Don?

Harpalyce D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 308: g. Hieracear. (Prenanthes alba et altissima L., etc.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 140.
Nabalus Cass.

Harpanema Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 496: nov. g. Periplocear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626.

Harpanthus Nees 1836. Eur. Leberm. II. p. 351: nov. g. Jungermanniar. propriar.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 91: g. Jungermanniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 811. (genuinar.)
Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXII; 1845. Syn. Hepat. p. 170: g. Jungermannidear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 472/₂₆. p. 1343; 1841. Ench. p. 28. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 30.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Jungermannidar.

Harpechloa Kunth 1830. Gram. p. 92; 1833. Agrost. p. 274: nov. g. Chloridear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 422 (322). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 163. — Steud. 1854. Glum. I. p. 203.
Conf. Harpochloa Endl.

Harpelema Jacq. f. Eclog. II. t. 129 ined. (*Harpeloma* ex Wittst.)
= Rothia Pers.

Harpeloma „Jacq." Wittst. Etym. Handw. p. 419 (Papilionac.): vid. *praeced.*

Harpephora Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 2558/₁. p. 1382; 1841. Ench. p. 293: nov. g. Verbesinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3162. — Meisn. 1843. Comm. p. 362. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 170. — Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 532.
= Coronocarpus Schum.? (Walp. Ann. bot. II. p. 845.)

Harpephyllum „Bernh. mss." Krauss 1844. Flora I. p. 349: nov. g. Terebinthacear.
= Spondias Linn.?

Harpidium*) Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. 157: nov. g. Urceolarinar. (Zeorae sp. Flot.)

Harpidium Sulliv. 1856. Musc. Un. St. p. . . .: sect. Hypni.
Drepanocladus Müll.

Harpocarpus Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 70. n. 2829/₁: g. Othonnear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 666. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Synon. Acanthocephalus Kar. & Kir. (non Zoolog.); Harpachaena Bunge.

Harpochilus Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 93. 146; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 333: nov. g. Gendarussear.

Harpochloa „Kunth Gram. p. 92" Endl. 1837. Gen. n. 842. p. 93; 1841. Ench. p. 58: g. Chloridear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 136. 334. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1316.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Chlorear.
Harpechloa Kunth.

*) Nomen ex vernaculo anglico „*grapple plant*". (ἅρπαξ, rapax.)

*) ἅρπη, falx; εἶδος, forma.

Harpostachys Trinius 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835) p. 227: sect. Panici. (P. decumbens R. & S.) *Cf.* Schltd. 1854. Linnaea XXVI. p. 535. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 55.

Harpulia G. Don vid. *seq.*

Harpullia*) Roxb. 1826. Fl. Ind. ed. Wall. II. p. 441; ed. 1832. I. p. 645: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 180. n. 911. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 805.

Spreng. 1827. Cur. post. p. 51: g. Sapindear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 669 (*Harpulia*). — Meisn. 1837. Gen. p. 52 (38).

Rchb. 1828. Consp. p. 201. n. 5232: g. Dodonaeacear.?

Blume 1850. Rumphia III. p. 177: g. Cossigniear.

Cupania Plum.?

Harrachia**) Jacq. f. 1816. Eclog. t. 21.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 409; 1825. Syst. II. p. 826. n. 2217; 1831. Gen. II. p. 500. n. 2461: g. Acanthear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3124.

Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 793: g. Acanthacear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 501. — Bartl. 1830. Ord. p. 184.

= Crossandra Salisb.

Harrisona***) Adans. 1763. Fam. II. p. 491: g. Muscor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 290 (*Harissona*).

Synon. Harrisonia Spreng. et Auct.; Braunia et Hedwigidium Br. & Sch.

Harrisonia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 84. n. 151: nov. g. Siphoniphytor., a Xeranthemo L. disjunctum. *Cf.* Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 306.

Xeranthemum Tourn.

Harrisonia†) „R. Brown mss." A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 517: nov. g. Simarubeis aff. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 811. — Endl. 1840. Gen. n. 5967. p. 1144; 1831. Ench. p. 607. — Walp. 1842. Rep. I. p. 525.

Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 478. t. 103: g. Simarubear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 385. (p. 364 Sapindear.) — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 373. — Meisn. 1837. Gen. p. 65 (47)?

Rchb. 1841. Nom. p. 197. n. 7540: g. Quassieis aff.

Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 569: g. Harrisoniear. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 165. — Endl. 1850. Spl. V. p. 100. Sect.: Euharrisonia, Lasiolepis.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 477: g. Simarubacear.

Synon. Ebelingia Rchb.; Lasiolepis Benn.?

*) *Harpulli*, nomen vernaculum.

**) Dicat. comiti de Harrach.

***) Dicat. Edm. Harrison, scriptori de Opio.

†) Dicat. Charles Harrison, pomologo.

Harrisonia Spreng. 1827. Syst. IV. p. 145. n. 3289; 1831. Gen. II. p. 727. n. 3685: g. Muscor. frondosor.

Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 588: g. Grimmiaceor.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.

Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 118: g. Neckerear.

Hampe 1847. Linnaea XX. p. 82: g. Harrisoniacear.

Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 153: g. Grimmiacear.

C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 102: subsect. Leucodontis.

= Harrisona Adans.

Harrisonia Hook. . . . . Bot. Mag. t. 2699.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 134: g. Hoyacear.

Baxtera Rchb.

Harrisoniaceae Hampe 1847. Linnaea XX. p. 82: fam. Clonocarpor. Gen.: Harrisonia.

Harrisonieae Planchon 1846. Lond. journ. bot. V. p. 569: trib. Simarubacear. Gen.: Harrisonia, Lasiolepis. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 165. Gen. ead. — Endl. 1850. Spl. V. p. 100. Gen.: Harrisonia.

Hartighaea Rchb. vid. *seq.*

Hartighsea*) A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 207. t. 15: nov. g. Trichiliear. (Trichilia bijuga Labill., alliacea Forst. etc.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 109. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 188. — Meisn. 1837. Gen. p. 49 (35). — Endl. 1840. Gen. n. 5532. p. 1050; 1841. Ench. p. 551. — Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8068 (sph. *Hartighaea*). — Walp. 1842. Rep. I. p. 429. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 84. 103. (restrict.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464.

Endl. 1833. Norf. p. 79: g. Meliacear. — Par. A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. III. p. 318 (*Hartighsia*). — Steud. 1840. Nom. I. p. 722 (*Hartigsea*). Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 38.

Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Guareear.

Synon. Macrocheton Blume; Hartigsia Wittst.; Cambania Röm.?

Hartighsia A. Cunn. vid. *praeced.*

Hartigia Miquel 1844. Linnaea XVIII. p. 284. t. 7: nov. g. Melastomacear., Cremanio proximum. (H. spectabilis.)

Walp. 1846. Rep. V. p. 722: g. Miconiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.

Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 236: sect. Miconiae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 740.

Hartigsea Steud. vid. *Hartighsea A. Juss.*

Hartigsia Wittst. Etym. Handw. p. 420 (a Batavo to Dirk Hartigs): vid. *praeced.*

*) Dicat. Batavo, qui primus Novam Hollandiam fertur appulisse.

Hartmannia*) Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 370: nov. g. Oenotherear. (Oenothera rosea Act.)
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 166. 278 (Nouv. Ann. Mus. IV. p. 360): g. Oenotherinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246: g. Onagrear.
Endl. 1840. Gen. n. 6115. 7. p. 1190; 1841. Ench. p. 637: sect. Oenotherae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6562. 7 (serius. *Fleischmannia Rchb.*). — Walp. 1843. Rep II. p. 84.

Hartmannia**) DC. 1836. Prodr. V. p. 693: nov. g. Madiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2632. p. 428; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 208 (134). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 391. — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3035.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Sphenogynear.
= Hemizonia DC. (Torr. & Gray.)

Hartogia***) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 939. 1365. n. 1126; 1762. Sp. ed. II. p. 288; 1764. Gen. ed. VI. p. 108. n. 273: g. Pentandr. Monogyn.
Adans. 1763. Fam. II. p. 344: g. Pistaciar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Aggregatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 529.
Gled. 1764. Syst. p. 38. n. 151: g. Thalamostemonum.
Linn. 1767. Mant. I. p. 23. 124. n. 273; 1767. Syst. ed. XII. p. 625: g. Monoec. Pentandr. (in Murr. Syst. 1774. p. 199 ad Diosmam reductum.)
„Berg.“ Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 667: g. Diosmear.
= Agathosma Willd. pt.

Hartogia Linn. f. 1781. Suppl. p. 16. n. 1363: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1784. Nov. gen. V. p. 86. — Murr. 1784. Syst. p. 165. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 81. n. 197. — Gmel. 1791. Syst. p. 278. — Pers. 1797. Syst. p. 171; 1805. Ench. I. p. 145. n. 301. — Willd. 1797. Sp. I. p. 669. n. 232. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 16. 294. n. 498.
Neck. 1790. El. III. p. 367. n. 1800: g. Osariphytor.
Hedw. 1806. Gen. p. 67. 374: g. Rhamnear.
DC. 1825. Pr. II. p. 12: g. Aquifoliacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3621. — Bartl. 1830. Ord. p. 377. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 422.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI: g. Celastrinear. — Par. Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. p. 127. — Brongn. 1843. En. gener. p. 88.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Ilicear.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 13: g. Cassiniear.

*) Dicat. Emman. Hartmann.
**) Dicat. peregrinatori Jos. Ad. Hartmann.
***) Dicat. Joh. de Hartog, peregrinatori batavo.

Hartogia Linn. f. cont.
Meisn. 1837. Gen. p. 69 (49): g. Evonymear.
Endl. 1840. Gen. n. 5687. p. 1088; 1841. Ench. p. 575: g. Elaeodendrear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7895. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 588.
Synon. Schrebera Thunb.

Hartwegia*) Nees 1831. Nov. Act. Leop. XV. 1. p. 372: nov. g. Asphodelear. (Anthericum Sternbergianum Schult.)
Kunth 1843. Enum. IV. p. 607: g. Anthericear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 256.
Synon. Anthericella Presl; Chlorophyti sp. Endl.

Hartwegia Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. sub n. 1970: nov. g. Epidendrear. (H. purpurea.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1371/2. p. 1362; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1966. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (278). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.

Harungana „Lam.“ Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 307: g. Hypericear. — Par. Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 345.
= Haronga Pet.-Thouars.

Harveya**) Hook. 1837. Icon. t. 118. 351: nov. g. Scrophularinar. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 723 (*Harwaya*).
Meisn. 1840. Gen. p. 309 (220): g. Gerardiear. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 390. — Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 508. 524: g. Sopubiear.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 4: g. Hyobancheear.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 208. g. Hyobanchear.
Conf. Harweya Endl., Presl.

Harveyastrum Walp. vid. *Harweyastrum Presl.*

Harwaya Steud. vid. *Harveya Hook.*

Harweya Endl. 1839. Gen. n. 3999. p. 691; 1841. Ench. p. 340: g. Gerardiear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 271. — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4519. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 363. 539.
Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 521. Sect.: Pseudoharweya, Harweyastrum.
Conf. Harveya Hook., Meisn.

Harweyastrum Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 521: sect. Harweyae. (Orobanche tulbaghiensis Eckl. & Zeyh.)

Hassallia „Berkeley“ Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. 232: g. Stigonemear.
= Sirosiphon Kütz.

Hassallia Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 67: nov. g. Coccochloridear. (Haematococcus insignis.) *Cf.* Flora 1849. p. 613.

*) Dicat. Theod. Hartweg, peregrinatori.
**) Dicat. W. H. Harvey, botanico anglo.

Hasselquistia*) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 957; 1762. Sp. ed. II. p. 355; 1764. Gen. ed. VI. p. 135. n. 341; 1767. Syst. ed. XII. p. 209. n. 339: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 226; 1784. Syst. p. 275. — Reich. 1778. Gen. p. 133. n. 360. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 180. n. 462. — Gmel. 1791. Syst. p. 471. — Pers. 1797. Syst. p. 290. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1379. n. 526; 1809. En. p. 302.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Umbelliferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 113. — Juss. 1789. Gen. p. 224. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 32. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 477. — Hedw. 1806. Gen. p. 195. n. 803. — Link 1821. En. I. p. 264. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 309. — Bartl. 1830. Ord. p. 235.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 98. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 313. n. 694.

Gled. 1764. Syst. p. 53. n. 211: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 78.

Gärtn. 1788. I. p. 84. t. 21. f. 2 (*aegyptiaca*).

Neck. 1790. El. I. p. 177. n. 296: g. Scadiophytor.

Spreng. 1813. Umbell. prodr. p. 11.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 636; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXIX. 458; 1825. Syst. I. p. 894. n. 1060; 1830. Gen. I. p. 223. n. 1161: g. Smyrniear.

Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 88: g. Tordylinear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 197. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 345. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5487. — Meisn. 1838. Gen. p. 146 (107). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 973.

Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3687: g. Peucedanear. — Par. Tausch 1834. Flora I. p. 347. — Endl. 1839. Gen. n. 4481. p. 782; 1841. Ench. p. 379. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136. — Brongn. 1843. En. genr. p. 112.

Link 1829. Hdb. I. p. 354: g. Selinear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35 (*Hasselquitia*): g. Tordyliear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Hasselquitia Dumort. vid. *praeced.*

Hasseltia**) HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 231. t. 601: nov. g. Tiliacear. (H. floribunda.) — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 241. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 425. n. 2113. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 4. (?)

Spreng. 1827. Cur. post. p. 201: g. Bixear.

Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5439: g. Tiliear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 38 (29)?

Hasseltia HBK. cont.

G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 296: g. Bixinear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 234.

Endl. 1840. Gen. n. 5360. p. 1005; 1841. Ench. p. 522: g. Sloanear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 209. n. 7949. (genuinar.) — Walp. 1842. Rep. I. p. 352.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Sloanidar.

Hasseltia Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1045: nov. g. Apocynear.

= Kixia Blume.

Hasskarlia Meisn. 1843. Gen. pl. vasc. Comm. p. 348: nov. g. Staphyleacear. (Turpinia? sphaerocarpa Hassk.)

Hasskarlia Walp. 1849. Ann. bot. syst. I. p. 753: g. Pandanear. (Nomen ob *Marquartiam Vogel* 1843 mutatum!)

= Marquartia Hassk. 1842.

Hastifolia Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 74; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Scutellaria hastifolia L.)

Hastingia*) „König mss." Smith 1806. Exot. bot. II. p. 41. t. 80: nov. g. Didynam. Gymnosperm. (H. coccinea.)

Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 311: g. Verbenacear.

Roxb. 1832. Ind. III. p. 65 (Smith Exot. Bot. 100.): g. Didynam. Angiosperm. (Holmskioldia sanguinea.)

= Holmskioldia Retz.

Hastingia König . . .

= Abroma Jacq. (Endl. Gen. p. 998)

Hateranthia Juss. vid. *Heteranthia.*

Hauera**) Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 228; 1846. Chlor. protog. p. LXXXI; g. Aquilarinear. foss. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 70. n. $2111/_2$.

Hauffia Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 103. n. $712/_1$: g. Cycadeacear. foss.

Synon. Hisingera Miq., non Hellen.

Hausmannia***) Dunker 1846. Mon. Weald. p. 12. t. 5. f. 1. t. 6. f. 12: nov. g. Filicum foss., Schizopteridi Brongn. aff. (H. dichotoma.) — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 81. (Thaumatopteridi aff.?)

Hauya†) „Moç. & Sess. Fl. mex. ic. ined." DC. 1828. Prodr. III. p. 36: nov. g. Montiniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4303; 1841. Nom. p. 171. n. 6625. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 676. — Endl. 1840. Gen. n. 6124. p. 1193; 1841. Ench. p. 637.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 315. n. 1608: g. Onagrar. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1298.

Meisn. 1838. Gen. p. 120 (86): g. Onagrear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 104.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Montinear.

---

*) Dicat. Fr. Hasselquist, Linnaei discipulo peregrinatori.

**) Dicat. cl. Va Hasselt, peregrinatori.

*) Dicat. Warren Hastings, gubernatori Indiae.

**) Dicat. Jos. de Hauer.

***) Dicat. Hausmann, prof. Götting.

†) Dicat. René Just. Hauy, mineralogo.

H a v a n n e l l a*) Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 488: g. Syngenes. Polygam. Necessar. (Milleriae affinis Houst.)
. . .?

H a v e t i a**) HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 203. t. 462: nov. g. Guttiferar. (Clusia tetrandra W.) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 207. — Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 421. — Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 166. t. 197.
Rchb. 1828. Consp. p. 210. n. 5484: g. Clusiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 294. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 618. — Meisn. 1837. Gen. p. 42 (31). — Endl. 1840. Gen. n. 5435. p. 1025; 1841. Ench. p. 534. — Walp. 1842. Rep. I. p. 393. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 402.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Clusiar.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 315: g. Garciniear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 310: g. Havetiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 211. n. 8024: g. Clusiariar.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 11. t. 209.

Havetieae Rchb. 1837. Handb. p. 310: subdiv. Clusiariar. Gen.: Havetia, Renggeria, Arrudea.

H a w l e a Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 89. t. 57: nov. g. Mertensiaceear. (H. pulcherrima.)
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 77: g. Filicum foss.

H a w o r t h i a***) Duval . . . . Pl. succ. h. Alenç. p. 7.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 90 (ed. Schrank 1819. p. 97); 1819. Suppl. p. 50; 1821. Revis. p. 48; 1824. Phil. Mag. p. 301: g. Hexandr. Monogyn.
Link 1821. En. I. p. 336: sect. Aloës. — Par. SalmD. 1834. Ht. Dyck. p. 311. — Endl. 1837. Gen. n. 1115 *b*. p. 143; 1841. Ench. p. 83. — Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1842. 2. — Meisn. 1842. Gen. p. 398. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 496. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 337.
Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1407: g. Yuccear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 50.
Link 1829. Hdb. I. p. 192: g. Aloinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: g. Hyacinthear.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 346: g. Asphodelear.
Synon. Apicra Willd.

H a x t o n i a „Caley" Don 1831. Edinb. n. phil. journ. p. 273.
A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 127: g. Asteroidear.
= Olearia Mönch.

H a y e c k a Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plant. (Nomen.)

H a y l o c k i a*) Herbert 1830. Bot. Regist. XVI. t. 37; 1837. Amaryll. p. 72. 182: nov. g. Amaryllidear. (Hippeastriformium.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1599.
Endl. 1837. Gen. n. 1271. p. 175; 1841. Ench. p. 103: g. Amaryllear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 393 (296). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 405. — Lindl. 1847. Veg. kd. p 158. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 143.
Kunth 1850. Enum. V. p. 480: g. Hippeastrear.

H a y n e a**) Willd. 1803. Spec. III. 3. p. 1787. n. 1462: g. Syngenes. Aequal. *Cf.* Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 319.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 537; 1826. Syst. III. p. 390. n. 2653: g. Cynarear.
Pacourina Aubl.

H a y n e a Schumach. 1827. Beskriv. Guin. pl.; 1829. Danske Vid. Selsk. Afh. IV. p. 180: nov. g. plant. (H. ovalifolia.)
= Pilea Lindl.

H a y n e a***) Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 5256: g. Lavaterear.
= Modiola Mönch.

H e b a n t h e†) Martius 1826. Nov. gen. II. p. 42. t. 140; 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 304: nov. g. Amarantacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 298. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 268.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4358: g. Gomphrenear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 200. n. 1017: g. Amarantear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 870.
Endl. 1837. Gen. n. 1958 *c*. p. 302; 1841. Ench. p. 185: sect. Gomphrenae. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 318 (230). — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6425. 3 (*Hebeanthe*). — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 385.
Synon. Iresine Lam.

H e b e „Comm." Juss. 1789. Gen. p. 105: nov. g. Jasminear. (An Scrophulariis affinior?) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p 241.
Gmel. 1791. Syst. p. 27: g. Diandr. Monogyn.
Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 200: g. Oleinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3063 *c*: sect. Veronicae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 570. — Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 459.
Synon. Aidelus Spreng.

H e b e a Pers. 1805. Ench. I. p. 44: sect. Gladioli. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1190 *b*.
Eckl. 1827. Verz. p. 41: g. Gladiolor.
= Gladioli Tourn. pars.

H e b e a Hedwig f. 1806. Gen. p. 24: g. Triandr. Monogyn. Sect.: Lemonia, Peyrousia, Micranthus, Aglaea.

---

*) Crescit in Havanna.
**) In memoriam botanici Havet, in Madagascar morte subrepti.
***) Dicat. A. H. Haworth.

*) Dicat. Math. Haylock, hortulano.
**) Dicat. Fr. Gottl. Hayne, prof. Berol.
***) Nomen propter Modiolam Zool. mutatum, sed Modiola Lam. 1799.
†) ἥβη, pubes: ob flores lanatos.

Hebeandra*) Bonpl. 1808. Berl. Mag. II. p. 40: nov. g. (Diadelph. Octandr.) Leguminosar. (H. cestrifolia, etc.)
Juss. 1815. Mém. Mus. I. p. 389: g. Polygalear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 738.
DC. 1824. Pr. I. p. 338: sect. Monninae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3038 *a*. — Presl 1831. Rel. Hänk. II. 1. p. 102. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 366.

Hebeanthe Rchb. vid. *Hebanthe Mart.*

Hebecarpaea DC. 1836. Prodr. V. p. 219: sect. Feliciae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2297 *a*. p. 373; 1841. Ench. p. 234.
Synon. Felicia Cass.; Polylepis Less.

Hebecladus**) Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 321 adnot.: nov. g. Solanear. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 611.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Iochromear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 468: g. Atropinear.

Hebeclinium DC. 1836. Prodr. V. p. 136: nov. g. Adenostylear. Sect.: Hebeclinium, Urolepis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2276. p. 369; 1841. Ench. p. 233. Sect.: Amblylepis, Urolepis. — Meisn. 1839. Gen. p. 181 (124). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3833. Sect. ut DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37: g. Eupatoriear. verar.

Hebelaena DC. 1837. Prodr. VI. p. 180: sect. Argyraeae. — Par. Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss I. p. 469.

Hebelia Gmelin 1806. Fl. Bad. II. p. 5. 117: nov. g. Hexandr. Trigyn. (Anthericum calyculatum L.)
= Tofieldia Huds.

Hebeloma Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 249; 1825. Pl. homon. p. 73; 1828. Elench. I. p. 30: trib. Dermini.
Rchb. 1828 Consp. p. 14. n. 349 *Df*; 1841. Nom. p. 12. n. 502. 3. *e*. subsect. Dermini. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 453 *IV g*. p. 40; 1841. Ench. p. 22. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 480. — Math. 1853. Belg. II. p. 358.
Fries 1836. Epicr. p. 170: subg. Dermini. Sect.: Inocybe, Hymenocybe. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 289 (exclusa Inocybe). — Bail 1858. Syst. p. 37. t. 36.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.

Hebenaster Rumph. 1743. Amboin. IV. t. 13. f. 6.
Diospyros Linn.

Hebenstreitia Linn. 1774 in Murr. Syst. p. 476: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Reich. 1778. Gen. p. 320. n. 831. — Murr. 1784. Syst. p. 570. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 416. n. 1033. — Gmel. 1791. Syst. p. 950. — Pers. 1797. Syst. p. 607. — Willd. 1800. Sp. III. p. 330. n. 1172; 1809. En. p. 653.
Neck. 1790. El. I. p. 340. n. 529: g. Chasmatophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 528: g. Aggregatar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 421; 1825. Syst. II. p. 754. n. 2113; 1831. Gen. II. p. 477. n. 2355: g. Verbenear.
Link 1822. En. II. p. 124; 1829. Hdb. I. p. 452: g. Verbenacear.
Choisy 1823. Mém. Genèv. II. p. 92: g. Selaginear. — Par. Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 322. — Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3094. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22. — Bartl. 1830. Ord. p. 178. — Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 246. — Endl. 1839. Gen. 3727. p. 641; 1841. Ench. p. 317. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 245. — Meisn. 1840. Gen. p. 292 (201). — Dietr. 1843. Syn. I. p. 357. 473. — Walp. 1845. Rep. IV. p. 144.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVIII: g. Buchnerear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 196: g. Globulariear.
Rchb. 1841. Nom. p. 114. n. 4440: g. Hebenstreitiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 667: g. Selaginacear. — Par. Choisy 1848 in DC. Pr. XII. p. 3.
Synon. Hebenstretia Linn.

Hebenstreitieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 114: subdiv. Globulariear. Gen.: Polycenia, Hebenstreitia, Dischisma, Agathelepis, Microdon.

Hebenstretia*) Linn. 1737. Gen. p. 384. n. 874; 1737. Cliff. p. 326; 1740. Syst. p. 26; 1742. Gen. ed. II. p. 306. n. 639; 1753. Sp. II. p. 629; 1759. Syst. ed. X. p. 1117. n. 688; 1763. Sp. ed. II. p. 878; 1764. Gen. ed. VI. p. 318. n. 770; 1767. Syst. ed. XII. p. 420: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 146. n. 1448.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 173. n. 704: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Aggregatar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Veronicar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 200: g. Verbenar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 260: g. Monopetalar. irregular.
Scop. 1777. Intr. p. 171: g. Personatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 193.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 238. t. 51. f. 5 (dentata).
Juss. 1789. Gen. p. 110: g. Viticibus aff.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 323: g. Pyrenacear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 252: g. Verbenacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 324.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 64: g. Selaginear.
= Hebenstreitia Linn., Murr.

*) ἥβη, pubes.
**) κλάδος, ramus tener.

*) Dicat. Jo. Ernesto Hebenstreit, professori Lipsiensi.

Hebephora DC. 1836. Prodr. V. p. 453: sect. Plucheae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2414 *b.* p. 391; 1841. Ench. p. 236. — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3567. 2.

Heberdenia „Banks mss." A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 79; 1844. Prodr. VIII. p. 105; . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. III. p. 168: g. Ardisiear. *Cf.* Endl. Spl. II. p. 66. n. 4222. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648.
Synon. Niara Denst.

Hebesinapis DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 243: sect. Erucae. (Sinapis pubescens L.)
= Ceratosinapis DC.

Hebradendron*) Graham 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 199. t. 27: nov. g. Guttiferar. (H. cambogioides.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 5446. p. 1027; 1841. Ench. p. 534: g. Garciniear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 396. — Meisn. 1843. Comm. p. 345.
Rchb. 1841. Nom. p. 212. n. 8042: g. Mangostanear.
= Cambogia Linn. (Lindl.)

Hecastaphyllum Spreng. vid. *seq.*

Hecastophyllum**) HBK. 1824. Nov. gen. VI. p. 387: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 75.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4019; 1841. Nom. p. 153. n. 5995: g. Dalbergiear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6703. p. 1302; 1841. Ench. p. 672. — Brongn. 1843. En. genr. p. 131. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555 (*Hecastaphyllum*).
Spreng. 1831. Gen. II. p. 573. n. 2798 (*Hecastaphyllum*): g. Leguminosar.
= Ecastaphyllum P. Browne.

Hecatea***) Petit-Thouars 1805. Vég. îl. Afr. I. p. 13. 30; 1809. Gen. Madag. n. 87 in Röm. Collect. bot. p. 215: nov. g. Euphorbiar.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 513. n. 1714: g. Monoec. Monadelph. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 387.
Pers. 1807. Ench. II. p. 588. n. 2146: g. Euphorbiacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 326. — Agdh. 1823. Aphor. p. 195.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 374: g. Linozostear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 19. n. 2340; 1831. Gen. II. p. 529. n. 2597: g. Tricoccar.
Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5016: g. Hippomanear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5794. p. 1112; 1841. Ench. p. 588: g. Acalyphear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 338 (251). — Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7358. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Baill. 1858. Euphorb. p. 529: sect. Omphaleae.
Synon. Adenophyllum Pet.-Th.; Hecaterium Kunze?

Hecaterium „Kze." Rchb. 1837. Handb. p. 281: g. Acalyphear. (Nomen.)
= praeced.?

Hecatonia*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 302. Ed. Willd. p. 370: nov. g. Dodecandr. Polygyn. (H. palustris et pilosa). *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 327 (*Hecatounia*).
DC. 1818. Syst. I. p. 227: g. Anemonear.
DC. 1824. Pr. I. p. 30: sect. Ranunculi. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 732. — Presl 1826. Sicul. I. p. 15. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 968; 1828. Consp. p. 191. n. 4941 *a*; 1832. Fl. exc. p. 719; 1841. Nom. p. 190. n. 7221. 2. — Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 308. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 29. — Link 1831. Hdb. II. p. 391. — Koch 1836. Syn. p. 12. Ed. II. p. 14. — Endl. 1839. Gen. n. 4783 *d.* p. 847; 1841. Ench. p. 434. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 31. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 303. — Gren. (& Godr.) 1848. Franç. I. p. 38. (restrict.)
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 198: g. Ranunculinear. (restrict. — Ranunculus sceleratus L.)
Synon. Leiosperma Pers., Gray.

Hecatounia Poir. vid. *praeced.*

Hechtia Klotzsch 1835 in Otto & Dietr. Gartenz. III. Nr. 51. p. 401: nov. g. Bromeliacear. (H. stenopetala.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $1314/_2$. p. 1361; 1841. Ench. p. 106. — Zuccar. 1843. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. III. p. 239. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 148.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1631: g. Tillandsiear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 396 (299).

Hecistopteris**) J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 193: nov. g. Polypodiear. (Gymnogramma pumila Spreng.)
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 407: sect. Gymnogrammes.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 179: g. Leptogrammear.

Heckeria***) Kunth 1839. Linnaea XIII. p. 564: nov. g. Piperacear.
Meisn. 1841. Gen. p. 335 (248): g. Piperear.
= Pothomorphe Miq.

Hectocerus Rafin. olim.
= Cerophora Rafin. (Leman 1817. Dict. v. 8. p. 6.)

Hectorea†) DC. 1836. Prodr. V. p. 95: nov. g. Liabear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2243. p. 364; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 179 (123). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 38. — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3221. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Schultz Bip. 1853. Flora I. p. 33: g. Hectorear.

---

*) ἑβραῖος, hebraicus; δένδρον: alludens ad peculiarem antherarum dehiscentiam.
**) ἑκαστός, quivis, singulus.
***) Hecate, dea triformis.

*) ἑκατόν, centum: ob centena semina.
**) ἥκιστος, minimus.
***) Dicat. professori Dr. Hecker, Berolinensi.
†) Nomen ob affinitatem cum Andromachia.

Hectoreae Schultz Bip. 1853. Flora I. p. 33: div. Liabear. Gen.: Xanthisma, Hectorea, Heyfeldera.

Hecubaea*) DC. 1836. Prodr. V. p. 665: nov. g. Euheleniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2606. p. 424; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 205 (132).

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17: g. Heleniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3200. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Hedaroma**) Lindl. 1839. Veg. Swan-River (App. to Bot. Regist.) p. VII. t. 2. B: nov. g. Chamaelauciear. (H. latifolium. An = Genetyllis citriodora Endl.?) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6285. p. 1226; 1841. Ench. p. 650. — Meisn. 1843. Comm. p. 354.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 721: g. Chamaelauciacear.

Heddaea Bronner 1857. Traub. Reinth. p. 11: g. Vitium class. II.

Hedeoma Pers. 1807. Ench. II. p. 131. n. 1407: g. Labiatar. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 329 *(Hedeona)*. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 16. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 327.

Elliott 1821. Sketch I. p. 27: g. Diandr. Monogyn.

Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2836: g. Nepetear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Catariear.

Bartl. 1830. Ord. p. 182: g. Salviear.

Benth. 1834. Labiat. p. 365: g. Melissinear. Sect.: Mosla, Hedeoma. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 775. Sect. eaed. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 67. — Walp. 1845. Rep. III. p. 716. Sect. eaed.

Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 106. n. 4121: g. Melissear. Sect. eaed. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661. — Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 244. Sect. ut antea et Pseudacynos.

Endl. 1838. Gen. n. 3615. p. 618; 1841. Ench. p. 307: g. Melissinar. Sect. ut Benth. (1841 Euhedeoma).

Meisn. 1840. Gen. p. 285 (193): g. Hedeomear.

Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 169: g. Satureinear.

Hedeoma Benth. 1834. Labiat. p. 367; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 245: sect. Hedeomae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 776. — Endl. 1838. Gen. p. 618. n. 3615 *b*. — Walp. 1845. Rep. III. p. 717. — Euhedeoma Endl.

Hedeoma „Lour." Endl. in synon. Eulychnidis: vid. *Hedona Lour.*

Hedeomeae Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 285 (193): subtrib. Melissinear. Gen.: Hedeoma, Glechon, Keithia.

Hedeona Juss. vid. *Hedeoma Pers.*

---

*) Nomen ob affinitatem cum Helenio: Hecuba mater Heleni.

**) ἡδύς, gratus, suavis; ἄρωμα, aroma.

Hedera Tourn. 1700. Inst. p. 612. t. 384: g. pl. class XXI.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 123: g. pl. class. V. (Ed. Hall. 1745. p. 158 in class. VI.)

Linn. 1737. Gen. p. 56. n 160; 1737. Cliff. p. 74; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 202; 1759. Syst. ed. X. p. 941. n. 249; 1762. Sp. ed. II. p. 292; 1764. Gen. ed. VI. p. 111. n. 283; 1767. Syst. ed. XII. p. 184. n. 280: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 168. — Murr. 1774. Syst. p. 202; 1784. Syst. p. 243. — Reich. 1778. Gen. p. 115. n. 304. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 155. n. 395. — Gmel. 1791. Syst. p. 420. — Pers. 1797. Syst. p. 255; 1805. Ench. I. p. 252. n. 576. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1179. n. 452; 1809. En. p. 266. — Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 515. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 11. 232.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 165: g. ordinis 3 class. III.

Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 36. n. 138: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 75.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Sarmentacear.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.

Adans. 1763. Fam. II. p. 102: g. Ginsenum.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Hederacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 519. — Batsch 1802. Tab. p. 44. — Rchb. 1828. Consp. p. 145. n. 3793; 1832. Fl. exc. p. 785; 1837. Hdb. p. 221. — Bartl. 1830. Ord. p. 239. — Link 1831. Hdb. II. p. 5.

Hill 1769. Ht. kew. p. 214: g. Pentapetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 109: g. Umbelliferis aff.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 130. t. 26. f. 9 (H. Helix, sphalm. *Melix*).

Juss. 1789. Gen. p. 214: g. Caprifolior. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. p. 622; 1825. Syst. I. p. 813. n. 916.

Neck. 1790. El. I. p. 158. n. 266: g. Gitonophytor.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 606: g. Caprifoliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 460. — DC. 1805. Franç. IV. p. 278. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XL. 508. n. 1020. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 491. — Lois. 1823. Dict. v. 26. p. 295 *(Lierre)*.

Hedw. 1806. Gen. p. 169. n. 708: g. Caprifoliear.

Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 147: g. Dumosar.

D. Don 1825. Nepal. p. 186: g. Araliacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35. — DC. 1830. Pr. IV. p. 261. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 391. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 376. — Koch 1836. Syn. p. 321. Ed. II. p. 353. — Meisn. 1838. Gen. p. 152 (109). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 124. — Endl. 1839. Gen. n. 4560. p. 795; 1841. Ench. p. 393. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 387. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 114. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 643. — Le-

Hedera Tourn. cont.
deb. 1845. Ross. II. p. 375. — Webb .... Canar. II. p. 172. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 781. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 353 *(Lierre)*. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 1. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 84.
Presl 1826. Sicul. I. p. XXVII: g. Sambucinar.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 195. n. 985: g. Aralear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 853. — Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5551.
Kunth 1838. Berol. I. p. 290: g. Araliaceis proximum.
Synon. Helix Mitch.?; Gynapteina Blume; Araliae sp. Linn.

Hedera terrestris „Riv." Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 232: g. pl. class. IX.
= Glechoma Linn.

Hederaceae Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 46 plant. Gen.: Panax, Aralia, Zanthoxylon, Hedera, Vitis, Cissus. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 519. Gen. ead.
Batsch 1802. Tab. p. 44: fam. Umbracularia. Gen.: Hedera, Cissus, Vitis, Cornus, Gouania, Plectronia, Carpodetus, Aucuba, Glossoma.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: fam. Fructunguliae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 590: ordo Hypodicarpar.
Rchb. 1828. Consp. p. 145; 1832. Fl. exc. p. 485: subdiv. Vitear. Gen.: Hedera, Gastonia, Dicophe?
Bartl. 1830. Ord. p. 238: ordo (133) Umbelliflorar. Gen.: Hedera; Marlea, Cornus.
Link 1831. Hdb. II. p. 5: ordo 4 Perigynar. Gen.: Hedera.
Rchb. 1837. Hdb. p. 221: subdiv. Cissear. Gen.: Hedera, Arthrophyllum.
Conf. Araliaceae, Caprifoliaceae, etc.

Hederodonta Walp. vid. *Heterodonta Nutt.*

Hedichium Ritgen vid. *Hedychium Kön.*

Hediosmum Poir. vid. *Hedyosmum Swartz.*

Hediotideae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: fam. Fructitubiae. Gen.: Hediotis, Oldenlandia.

Hediotis Vent. 1799. Tabl. II. p. 570: g. Rubiacear.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear.
Cram. 1803. Disp. p. 37: g. Tetrandr. Monogyn.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: g. Hediotidear.
= Hedyotis Linn.

Hedona*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 286. Ed. Willd. p. 351: nov. g. Decandr. Pentagyn. (H. sinensis = Lychnis corona Thunb.: Willd. in adnot.)
= Eulychnis Fenzl.

Hedracophyllum Rchb. vid. *Hedraiophyllum Less.*

*) ἡδονή, jucunditas.

Hedraeanthus Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 292: g. Campanulacear. — Par. Griseb. & Schenk 1852. Arch. f. Naturg. I. p. 334.
= Edraianthus A. DC.

Hedraiophyllum*) Lessing 1832. Syn. Compos. p. 103: subg. Gochnatiae.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 24: sect. Gochnatiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2915 *b*. p. 484; 1841. Ench. p. 248. — Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3794. 2 *(Hedracophyllum)*.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10: g. Stähelinear.

Hedraiostylus Hasskarl 1844. Cat. Bogor. alt. p. 234: g. Acalyphear. (antea *Pterococcus Hassk.*) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Baill. 1858. Euphorb. p. 483: sect. Sajorii.

Hedranthe Griseb. vid. *seq.*

Hedranthum**) G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 746: sect. Phyteumatis. — Par. A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 450. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 291 *(Hedranthe)*. — Ledeb. 1842. Ross. II. p. 872.
Endl. 1841. Spl. I. n. 3082 *b α*. p. 1392; 1841. Ench. p. 266: subsect. Rapunculi.

Hedwigia***) Ehrhart 1781. Hann. Mag. Nr. 69. p. 1095; 1787. Beitr. I. p. 171. 174: nov. g. Muscor. (Bryum apocarpum β Linn.), ab Auctoribus vario sensu adoptatum. — Par. Hedw. 1782. Fund. II. p. 86. (frondosor.: Bryum apocarpum L.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 331. — Roth 1788. Germ. I. p. 453. — Mönch 1794. Meth. p. 728.
Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 151; II. 1. p. 30: g. Gymnoperistomator.
Palis. 1805. Pr. Aethéog. p. 15; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 437: g. Apogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 217.
Grev. & Arn. 1824. Mem. Wern. Soc. V. 1. p. 67: g. Gymnostomoidear. (H. aquatica, Hornschuchiana, Humboldti, secunda.) — Par. Arn. 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 226.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Gymnostomear.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Hypnoidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 864: g. Calyptrobryor.
Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 29. 30: g. Hedwigiacear. (H. ciliata Ehrh.) — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 92. Sect.: Eurystomum, Sclerostomum.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 93: g. Hedwigiear.

*) ἑδραῖος, sessilis, firmus.
**) ἕδρα, sedes: ob flores sessiles.
***) Dicat. Dr. J. Hedwig, Chemnitz.

Hedwigia Ehrhart cont.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 152: g. Grimmiacear. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 14. (H. ciliata.)
Pfeiff. 1855. Fl. Niederhess. II. p. 192: g. Grimmiear.
Conf. Schistidium Brid.; Pilotrichi subsect. Dichotomaria Müll.; Cinclidotus, Perisiphorus Palis.

Hedwigia Swartz 1788. Prodr. p. 4. 62; 1800. Fl. Ind. occ. II. p. 670. t. 13: nov. g. Octandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 800. n. 1747. — Gmel. 1791. Syst. p. 614. — Willd. 1799. Sp. II. p. 332. n. 754. — Pers. 1805. Ench. I. p. 414. n. 935. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 301. n. 1541.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 255: g. Terebintacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 273. n. 1101.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 373: g. Linozostear.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 353 (Gen. Tereb. p. 21): g. Burseracear. — Par. HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 26 adnot. — DC. 1825. Pr. II. p. 80. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 243. — Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56). — Endl. 1840. Gen. n. 5937. p. 1137; 1841. Ench. p. 602. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 15. p. 226. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 450.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 202. n. 1411: g. Tricoccar. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227. 1263.
Bartl. 1838. Ord. p. 394: g. Bursercar.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 85: g. Burseriacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 460: g. Burseridar.
Synon. Tetragastris Gärtn.; Schwägrichenia Rchb.; Knorrea Moç. & Sess.?; Caproxylon Tuss.?
= Icica Aubl.? (Rich.)

Hedwigia Medic. 1790. Act. Ac. Theod. Palat. Phys. VI. p. 495: nov. g. ex typo Commelinae africanae L.
= Commelyna R. Brown.

Hedwigia Hook. 1818. Musc. exot. t. 46. 139. (Schwägr. Suppl. t. 104.)
= Anoectangium Hedw.

Hedwigiaceae Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 29. 30: fam. Muscor. Gen.: Hedwigia, Hedwigidium, Braunia.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: trib. Acrocarpor. Gen. ead.

Hedwigidium Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. Fasc. 29. 30: nov. g. Hedwigiacear. (Anictangium imberbe Hook. & Tayl.) — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402.
= Harrisonia Adans.

Hedwigieae Angström 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 93: div. Bryacear. Gen.: Hedwigia.

Hedycapnos*) Planchon 1853. Fl. d. serr. VIII. p. 193: subg. Capnorchidis. (Fumaria spectabilis L.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 177.
= Capnorchis Borckh.

Hedycaria Murr. 1784. Syst. p. 894: g. Dioec. Polyandr. — Par. Pers. 1797. Syst. p. 936. n. 1432.
Juss. 1789. Gen. p. 401: g. Urticar.
Gmel. 1791. Syst. p. 862: g. Polyandr. Polygyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 304: g. Urticear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 333. — A. Cunn. 1838. Ann. nat. hist. I. p. 215. Char. emend.
Agdh. 1825. Aphor. p. 204: g. Artocarpear.
= Hedycarya Forst.

Hedycarpus Jack 1823. Linn. Trans. XIV. 1. p. 118: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (H. malayanus.) Cf. Flora 1823. II. Beil. p. 95. 319 et Isis 1825. p. 74. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 455. n. 492; 1830. Gen. I. p. 111. n. 560. — Schult. 1827. Mant. III. p. 16. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 543.
Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5554: inter genera vix cognita.
Endl. 1840. Gen. n. 5877. p. 1124; 1841. Ench. p. 589: g. Buxear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 343 (255). — Rchb. 1841. Nom. p. 195. n. 7445. (genuinar.) — Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 27. 61.
Meisn. 1843. Comm. p. 346: g. Sapindacear.? — Par. Baill. 1858. Euphorb. p. 668.
Walp. 1846. Rep. V. p. 367: g. dubium Sapindear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.

Hedycarya**) Forst. 1776. Char. gen. p. 127. t. 64: nov. g. Dioec. Polyandr. — Par. Linn. f. 1781. Suppl. p. 67. n. 1434.
Scop. 1777. Intr. p. 255: g. Polycarpiar.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 702. n. 1547: g. Dioec. Icosandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 833. n. 1830. — Pers. 1807. Ench. II. p. 628. n. 2270.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 359: g. Urticear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 546. n. 1872; 1830. Gen. I. p. 418. n. 2087: g. Urticeis aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 85. n. 1836: g. Calycanthear.
Endl. 1837. Gen. n. 2018. p. 314; 1841. Ench. p. 195: g. Monimiear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 324 (236). — Rchb. 1841. Nom. p. 69. n. 2593. — Tul. 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. III. p. 45; 1855. Arch. Mus. VIII. p. 405. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 111.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 91: g. Amborear.

*) ἡδύς, gratus; καπνός, fumus (Fumaria).
**) ἡδύς, dulcis; καρύα, nucifera arbor.

Hedycarya Forst. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 299: g. Monimiacear. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 218.
Synon. Hedycaria Murr., etc.; Crinonia Banks.

Hedychieae Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341: div. Scitaminear. Gen.: Hedychium, Gamochilus, Roscoea.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 356: trib. Zingiberacear. Gen. ead.

Hedychion Hassk. vid *seq.*

Hedychium König 1783 in Retz. Observ. III. p. 73.
Juss. 1789. Gen. p. 448: g. Cannar.
Gmel. 1791. Syst. p. 9: g. Monandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 10. n. 6; 1809. En. p. 4. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 47. t. 251; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 9; ed. 1832. p. 10.
Gis. 1792. Prael. p. 199. 204: g. Scitaminear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 104. — Pers. 1805. Ench. I. p. 2. n. 6. — Hedw. 1806. Gen. p. 2. — Roxb. 1812. Asiat. Research. XI. p. 518. *Cf.* Link Jahrb. I. p. 71. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 2. 19. — Agdh. 1823. Aphor. p. 184. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 9. n. 7; 1830. Gen. I. p. 5. n. 7. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123 (*Hedichium*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 9. — Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 314.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 275: g. Scitaminum veror.
Poir. 1820. Dict. v. 18. p. 12 (*Gandasuli*): g. Amomear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1602; 1841. Nom. p. 57. n. 2118. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 61. — A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367. — Meisn. 1842. Gen. p. 388 (291). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 164.
Link 1821. En. I. p. 2; 1829. Hdb. I. p. 228: g. Alpiniacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Curcumacear.
Lestib. 1829. Ann. sc. nat. XVII. p. 113: g. Musacear. (Isis 1834. p. 1059.)
Blume 1830. En. pl. Jav. p. 55: g. Amomar.
Endl. 1837. Gen. n. 1630. p. 224; 1841. Ench. p. 119; 1842. Spl. II. p. 22: g. Amomor. Sect. (1842): Hedychium, Gamochilus. — Par. Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 50 (*Hedychion*).
Brongn. 1843. En. genr. p. 25: g. Zingiberacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167. — Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 135 (*Hedychion*). — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 607.
Wallich 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 321: disquisitio specierum. Sect.: Coronariae, Spicatae, Siphonium, Brachychilum. *Cf.* char. gen. ibid. p. 377.
Synon. Gandsulium Rumph.

Hedychium Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341: g. Hedychiear., sejuncto Gamochilo restrictum.
Endl. 1842. Spl. II. p. 22. n. 1630 *a:* sect. Hedychii.

Hedychloa Rafin. 1820. Ann. nat. p. 16. (ex Torrey.)
= Kyllingia Linn. f.

Hedycrea*) Schreb. 1789. Gen. I. p. 160. n. 209: g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 334. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 428. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1210. n. 468.
Batsch 1802. Tab. p. 2: g. Drupiferar.
Vahl 1806. Enum. II. p. 37. n. 86: g. Triandr. Monogyn. (ex observatione Richardi.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 345. 498. n. 147.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 868: g. Rosaceis aff.
= Licania Aubl.

Hedyosmon Spreng. vid. *Hedyosmum Swartz.*

Hedyosmos Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 211: nov. g. plant. (Diandr. Monogyn.)
= Ziziphora Linn.? (Amoen. acad. III. p. 9.)

Hedyosmum**) Swartz 1788. Prodr. p. 5. 84; 1800. Fl. Ind. occ. II. p. 957. t. 18: nov. g. Polyandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 826.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 650. n. 1413: g. Monoec. Polyandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 476. n. 1703. — Pers. 1807. Ench. II. p. 573. n. 2110.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 347; 1826. Syst. III. p. 865. n. 3129; 1831. Gen. II. p. 696. n. 3512 (*Hedyosmon*): g. Amentacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 330 (*Hediosmum*).
R. Brown 1821. Bot. Mag. n. 2190: g. Chloranthear. — Par. HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 164. t. 634. 635. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 200. — Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1956; 1841. Nom. p. 68. n. 2561. — Bartl. 1830. Ord. p. 86. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 434. — Meisn. 1841. Gen. p. 334 (247). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 19.
Agdh. 1825. Aphor. p. 209: g. Corylacear.
Endl. 1837. Gen. n. 1817. p. 264; 1841. Ench. p. 148: g. Chloranthacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 520. — Miq. 1852 in Mart. Fl. Bras. fasc. XI. p. 3.
Synon. Tafalla Ruiz & Pav.; Tavalla Pers.

Hedyoteae DC. 1830. Prodr. IV. p. 419: subtrib. Hedyotidear. Gen.: Hedyotis, Oldenlandia, Gonotheca, Kohautia, Kadua, Anotis, Rachicallis, Lucya, Polypremum? — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 524. Gen. ead. — Meisn. 1838. Gen. p. 160 (114). Gen.: Dentella, Hedyotis, Polypremum? — Endl. 1838. Gen. p. 548. Gen.: Dentella, Gonotheca, Hedyotis; Polypremum. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1393 et Ench. p. 273) Karamyschewia.
Rchb. 1841. Nom. p. 76: subsect. Hedyotidear. Gen. ut Endl. 1841.

---

*) *χρέας*, caro.
**) „*Ἡδύοσμος* fuit nomen plantae apud Graecos, odore suavi praeditae: Plin.

Hedyotidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 765: trib. Cinchonear. Gen. Hedyotidear. Endl. et Ereicotis, Oldenlandia, Kohautia, Kadua, Rhachicallis, Lucya, Pentas, Hindsia, Lindenia.

Hedyotideae HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 838: sect. Rubiacear. Gen.: Bouvardia, Manettia, Hedyotis. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 40. Gen. ead. — Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 150. Gen.: Dentella, Hedyotis, Gerontogea, Kohautia, Kadua, Rondeletia, Sipanea. — Bartl. 1830. Ord. p. 210. Gen.: Dentella, Hedyotis, Kohautia, Bouvardia, Carphalea, Rondeletia, Fernelia, Kadua, Sclerococcus, Hoffmannia, Helospora, Ohigginsia, Virecta, Coccocypselum, Burchellia, Sabicea, Patima, Axanthes, Hamelia, Leycesteria; Gonzalea, Isertia, Polyphragmon. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. 418. Gen. Rondeletiear. DC. et Adenosacme, Greenia, Lipostoma, Hedyotis, Diplophragma, Macrandria, Dimetia, Anotis, Scleromitrion, Oldenlandia, Kohautia, Kadua, Rhachicallis, Lucya, Gonotheca, Polypremum.

DC. 1830. Pr. IV. p. 401: trib. Rubiacear. Subtrib.: Rondeletieae, Hedyoteae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 511. Subtrib. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 158 (114). Subtrib. eaed. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 50. Gen.: Oldenlandia, Rondeletia, Sipanea, Portlandia.

Rchb. 1837. Hdb. p. 180; 1841. Nom. p. 76: sect. Cinchonear. Subsect. ut DC.

Endl. 1838. Gen. p. 548; 1841. Ench. p. 273: trib. Cinchonacear. Subtrib. ut DC.

Hedyotis*) Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 117: nov. g. plant., ab Auctoribus diversissima latitudine adoptatum.

Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 26 (Nov. gen. zeyl. p. 5. n. 1041); 1753. Sp. I. p. 101; 1759. Syst. ed. X. p. 890. n. 110; 1762. Sp. ed. II. p. 147; 1764. Gen. ed. VI. p. 49. n. 118; 1767. Syst. ed. XII. p. 115: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 124; 1784. Syst. p. 147. — Reich. 1778. Gen. p. 51. n. 124. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 66. n. 153. — Lour. 1790. Coch. I. p. 77. — Gmel. 1791. Syst. p. 232. — Pers. 1797. Syst. p. 151; 1805. Ench. I. p. 122. n. 232. — Willd. 1797. Sp. I. p 564. n. 176; 1809. En. p. 149. — Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 56. (reform.) — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 368; ed. 1832. I. p. 363. — Schult. 1827. Mant. III. p. 10.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 198; 1820. Mém. Mus. VI. p. 382. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 434. — Hedw. 1806. Gen. p. 62. 372. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 11. 189. n. 469. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 334. — Link 1821. En. I. p. 131. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 411. n. 411; 1830. Gen. I. p. 96. n. 481. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 970. — A. Rich. 1834. Sert. Astrol. p. 64. — — Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 490.

Adans. 1763. Fam. II. p. 147: g. Aparinium.

Gled. 1764. Syst. p. 164. n. 671: g. Petalostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 139: g. Opulinar.

Neck. 1790. El. I. p. 204. n. 342: g. Phyllastrophytor.

HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 388: g. Hedyotidear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 43. — Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 153; 1830. ibid. V. p. 168. (restrict.) — Bartl. 1830. Ord. p. 210. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 286. — Rchb. 1837. Hdb. p. 180. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. (restrict.) — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 37. Sect.: Houstonia, Amphiotis, Diodella, Elatinella, Pentotis. — Miq. 1856. Ind. II. p. 177. Sect.: Diplophragma, Euhedyotis, Tetragyneia.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 505: g. Cinchonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2043. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 266. Sect.: Hedyotis, Gerontogea, Kohautia, Kadua.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.

D. Don 1825. Nepal. p. 134: g. Stipulariar.

DC. 1830. Pr. IV. p. 419: g. Hedyotear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 524. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 405. Sect.: Diplophragma, Macrandria, Dimetia, Anotis, Euhedyotis, Scleromitrion, Oldenlandia. — Endl. 1838. Gen. n. 3240. p. 548; 1841. Ench. p. 273. Sect. eaed., praeterea Kohautia, Kadua, Rhachicallis, Lucya et (Spl. II. p. 53) Pentotis? — Meisn. 1838. Gen. p. 160 (114). Sect. (in Comm.) ut Endl. 1838 et Gonotheca. — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2874. Sect. ut Endl. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 116.

Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 30. t. 235.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar. (restrict.)

Synon. Hediotis Vent.

Hedyotis Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 148. t. 30. f. 4 (herbacea).

= Oldenlandia Linn.

Hedypnoideae Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 392: div. Rhagadiolear. Gen.: Hedypnois.

Hedypnois*) Tourn. 1700. Inst. p. 478. t. 271: g. pl. class. XIII.

---

*) ἡδύς, suavis; οὖς, ὠτός, auris.

*) Nomen ex Plinio.

Hedypnois Tourn. cont.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 209: g. pl. class. VIII.
Juss. 1789. Gen. p. 169: g. Cichoracear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 486. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 375. — Link 1829. Hdb. I. p. 810.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 532. n. 1243: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1616. n. 1418; 1809. En. p. 830. — Link 1822. En. II. p. 293.
Batsch 1802. Tab. p. 250: g. Semiflosculosar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 379: sect. Hyoseridis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 577; 1826. Syst. III. p. 670. n. 2901; 1831. Gen. II. p. 647. n. 3259: g. Cichorear.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 337: g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 146.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 65: g. Scorzonerear. (verar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 8.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Hyoseridear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2130; 1841. Nom. p. 94. n. 3677. — Koch 1837. Syn. p. 417. Ed. II. p. 479. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 81. — Endl. 1838. Gen. n. 2973. p. 494; 1841. Ench. p. 249. — Meisn. 1839. Gen. p. 234 (144). — Brongn. 1843. En. genr. p. 34. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 773. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 288.
D. Don 1829. Edinb. n. journ. VI. p. 307: g. Taraxacear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 249: g. Cichoriacear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 258: g. Liguliflorar.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 395: g. Hedypnoidear.
Synon. Rhagadioloides Vaill.; Hyoseris Gärtn.

Hedypnois Scopoli 1772. Fl. Carn. II. p. 99: g. Semiflosculosar. (H. Taraxacum et paludosa.)
= Taraxacum Hall.

Hedypnois Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 363. t. 160: g. Ligulatar.
Less. 1832. Syn. p. 128: g. Hyoseridear.
= Hyoseris Juss.

Hedysareae DC. 1825. Prodr. II. p. 307 (Lég. mém. VII): trib. Papilionacear. Subtrib.: Coronilleae, Euhedysareae, Alhageae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 99. 273. Subtrib. eaed. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155. 279. Sect.: Coronilleae, Onobrycheae. — Koch 1836. Syn. p. 187. Ed. II. p. 207. Subtrib.: Coronilleae, Euhedysareae. — Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). Subtrib. ut DC. — Endl. 1840. Gen. p. 1280; 1841. Ench. p. 670. Subtrib. eaed. — Benth. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 133. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 129. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. Subtrib.: Arachideae, Coronilleae, *Hedysareae* (gen. Euhedysarear. et Alhagear. Endl., accedentibus pluribus. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 270. Subtrib.: Coronilleae, Hedysareae, Alhageae.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLVII; 1828. Consp. p. 151; 1832. Fl. exc. p. 540; 1837. Hdb. p. 226; 1841. Nom. p. 152: div. Papilionacear. Subdivis.: Coronilleae, Onobrycheae, Dalbergieae (et 1827 Geoffreae). — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 411. Subdivis.: Coronilleae, Onobrycheae. — Link 1831. Hdb. II. p. 209. Gen.: Scorpiurus, Coronilla, Astrolobium, Ornithopus, Hippocrepis, Securidaca, Desmodium, Hedysarum, Onobrychis, Ebenus, Alhagi.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: trib. Leguminosar. Subtrib.: Onobrycheae, Coronilleae.
Vogel 1838. Linnaea XII. p. 51. Gen. brasil.: Poiretia, Myriadenus, Zornia, Stylosanthes, Adesmia, Aeschynomene, Nicolsonia, Desmodium, Rhadinocarpus.

Hedysareae Endl. Ench. p. 670 (subtrib. Hedysarear.) et Lindl. Veg. kingd. p. 554 vid. *Euhedysareae*.

Hedysaroides Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 152: sect. Ebeni. (E. Sibthorpii DC.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 898.

Hedysarum*) Tourn. 1700. Inst. p. 401. t. 225: g. pl. class. X. ab Auctoribus varie circumscriptum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 256. Ed. Hall. 1745. p. 266: g. pl. class. XI.
Linn. 1737. Gen. p. 225. n. 595; 1737. Cliff. p. 365; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 231; 1753. Sp. II. p. 745; 1759. Syst. ed. X. p. 1169. n. 793; 1763. Sp. ed. II. p. 1051; 1764. Gen. ed. VI. p. 382. n. 887; 1767. Syst. ed. XII. p. 493: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 559; 1784. Syst. p. 672. — Reich. 1778. Gen. p. 381. n. 961. — Lour. 1790. Coch. II. p. 447. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 505. n. 1204. — Gmel. 1791. Syst. p. 1121. — Pers. 1797. Syst. p. 709; 1807. Ench. II. p. 319. n. 1740. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 50. t. 194; 1832. Ind. III. p. 344. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1171. n. 1375; 1809. En. p. 777. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 108. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 208.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 113. t. 50—54.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 577: g. Leguminosar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 26. — Scop. 1777. Intr. p. 307. — Juss. 1789. Gen. p. 362. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 423. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 238. — DC. 1805. Franç. IV. p. 609; 1815. V. p. 583. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 901. — Link 1822. En. II. p. 246. — Spreng.

*) Ἡδύσαρον Veterum?

Hedysarum Tourn. cont.
1826. Syst. III. p. 311. n. 2597 (injunguntur Uraria, Heteroloma, Adesmia, Desmodium et Alysicarpus); 1831. Gen. II. p. 592. n. 2920. — Lois. 1827. Dict. v. 47. p. 34 (*Sainfoin*). — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 432. 567. — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 337.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127. 1764. Syst. p. 136. n. 573: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 117.
Linn 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 424. — Gis. 1792. Prael. p. 415.
Adans. 1763. Fam. II. p. 328: g. Coronillar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 294: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 16. n. 1316: g. Cyteophytor. Emittuntur Alysicarpus, Onobrychis et Lourea.
= Hedysarum Jaume, etc.

Hedysarum Jaume St. Hilaire 1812. Bull. soc. philom. Déc. p. 193; 1813 in Desv. Journ. bot. III. p. 61: g. Leguminosar., accuratius definitum. Sejunguntur Hallia, Pleurolobus, etc. — Simil. Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 123. Sect.: Hedysarum, Heteroloma.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 759: g. Coronillear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 134.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 516: g. Papilionacear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 133. — D. Don 1825. Nepal. p. 243. Sejungitur Manna. — Duch. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 293 (*Sainfoin*).
DC. 1825. Pr. II. p. 340: g. Euhedysarear. Sect.: Echinolobium, Leiolobium. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 299. Sect. eaed. — Koch 1836. Syn. p. 190. Ed. II. p. 210. — Meisn. 1837. Gen. p. 91 (65). — Endl. 1841. Gen. n. 6618. p. 1285; 1841. Ench. p. 670. Sect. ut DC. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 698. Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 544.
Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4003; 1832. Fl. exc. p. 543; 1841. Nom. p. 152. n. 5958: g. Onobrychear. Sect. (1828) ut DC. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 286.
Link 1831. Hdb. II. p. 213: g. Hedysarear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 356. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 65. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 130. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 503.
Basiner 1846. Bull. Ac. Pet. IV. p. 310. Tribus: Isoloma, Heteroloma.
Synon. Echinolobium Desv.; Hedysari sp. Linn.

Hedystachys Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Veronicear., inter Diplophyllum et Leptandram collocatum. (Nomen.)
= Veronicae spec.?

Heeria Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 75 (55): g. Cassuviear.? — Par. Walk.-Arn. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 148. Char. emend.

Heeria Meisn. cont.
Endl. 1840. Gen. p. 1134. n. 5924: g. dubium Anacardiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 557.
Synon. Römeria Thunb.; Anaphrenium E. Meyer; Ozoroa Delile.

Heeria*) Schlechtend. 1839. Linnaea XIII. p. 432: nov. g. Melastomacear.
Endl. 1840. Gen. n. 6212. p. 1213; 1841. Ench. p. 646: g. Osbeckiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6720. — Walp. 1843. Rep. II. p. 132. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Naud. 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 150: g. Lasiandralium. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 593.
= Schizocentron Meisn.

Hegemone**) Bunge 1842 in Ledeb. Fl. Ross. I. p. 51: nov. g. Helleborear. (Trollius lilacinus Bunge.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 73. n. 4787/$_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 339. — Walp. 1843. Rep. II. p. 741. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428.

Hegetschweilera***) Heer 1842. Ind. sem. h. Turic. (Bot. Zeit. 1843. p. 47): nov. g. Alhagear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 104. n. 6627/$_1$. — Walp. 1843. Rep. II. p. 900; 1846. V. p. 528.

Heimea Necker 1790. Elem. bot. III. p. 338. n. 1756: nov. g. Phryganophytor., a Jungermannia L. disjunctum.
— . . .?

Heimia†) Link & Otto 1822. Abbild. auserl. Gew. V. p. 63. t. 28: nov. g. Salicarinar. *Cf.* Flora 1823. I. p. 137.
Link 1822. En. II. p. 3: g. Salicariar. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 15.
DC. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 75; 1828. Pr. III. p. 89: g. Salicariear. — Par. Cham. & Schltd. 1827. Linnaea II. p. 346. — Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4563; 1841. Nom. p. 172. n. 6644. — Bartl. 1830. Ord. p. 317. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 717. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 428.
Link 1831. Hdb. II. p. 51: g. Lythrariear.
Meisn. 1838. Gen. p. 118 (84): sect. Nesaeae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6147 *b*. p. 1200; 1841. Ench. p. 643. — Walp. 1843. Rep. II. p. 103.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575; g. Lythrear.
Synon. Chrysoliga Willd. Hoffmsg; Chrysolyga Hfmsg., Wittst.; Ginoria Fl. mex.

Heinekenia Webb 1846. Phyt. Canar. II. p. 86: sect. Loti. (L. arabicus L.)

Heinsia††) DC. 1830. Prodr. IV. p. 390: nov. g. Gardeniear. Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 503. — Meisn. 1838. Gen. p. 162 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2957. (genuinar.)

*) Dicat. Osw. Heer, Turicensi.
**) ἡγεμών, summus.
***) Dicat. Joh. Hegetschweiler, botanico helvetico.
†) Dicat. Dr. Heim, medico Berolinensi.
††) Dicat. Heinsio, Theophrasti traductori.

Heinsia DC. cont.
Endl. 1838. Gen. n. 3300. p. 561; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Heintzia Karsten 1848. Gew. Venez. H. II. p. 34. t. 11: nov. g. Gesneracear. *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 694; 1849. p. 455.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1075: g. Besleriear.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 207: g. Drymoniear.

Heinzelia Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 151. 153; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 314: nov. g. Gendarussear.

Heinzelmania Necker 1790. Elem. bot. I. p. 371. n. 575: g. Plasyrgophytor.
= Montira Aubl.

Heinzia Scopoli 1777. Introd. p. 301. n. 1370: g. Leguminosar. spuriar.
Gmel. 1791. Syst. p. 609: g. Octandr. Monogyn.
= Coumarouna Aubl.

Heistera Schreb. vid. *Heisteria Jacq.*

Heisteria*) Linn. 1737. Gen. p. 350. n. 879; 1737. Cliff. p. 352; 1740. Syst. p. 27; 1742. Gen. ed. II. p. 341. n. 687: g. Diadelph. Octandr., serius Polygalae insertum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126: g. Thalamostemonum.
Berg. 1767. Fl. cap. p. 185.
Kunth 1824. Syst. III. p. 310 not.: g. Polygalear.
= Muraltia Neck.

Heisteria Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 126. t. 81: nov. g. Decandr. Monogyn. (H. coccinea.) — Par. Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1663; 1764. Gen. ed. VI. p. 114. n. 535; 1767. Syst. ed. XII. p. 297. n. 533. — Murr. 1774. Syst. p. 336; 1784. Syst. p. 403. — Reich. 1778. Gen. p. 221. n. 586. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 291. n. 736 (*Heistera*). — Gmel. 1791. Syst. p. 686. — Pers. 1797. Syst. p. 431; 1805. Ench. I. p. 466. n. 1052. — Willd. 1799. Sp. II. p. 579. n. 858.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.
Gled. 1764. Syst. p. 100. n. 417: g. Thalamostemonum.
Juss. 1789. Gen. p. 260: g. Aurantior. spurior.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 153: g. Hesperidear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 53. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 34. — Hedw. 1806. Gen. p. 311. n. 1230.
Mirb. 1813. Bull. soc. philom. Déc. p. 377: g. Olacinear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 532. — Cambess. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 340. — Bartl. 1830. Ord. p. 423. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 581. — Meisn. 1837. Gen. p. 45 (33). — Endl.

*) Dicat. Laur. Heister, prof. botan. Helmstad.

Heisteria Jacq. cont.
1840. Gen. n. 5491. p. 1042; 1841. Ench. p. 546. — Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5262. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 265.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 340: g. Aurantiacear.
Agdh. 1825. Aphor. p. 228: g. Laurinar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 330. n. 1614; 1830. Gen. I. p. 355. n. 1794: g. Santalear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1378. 1471.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI; 1828. Consp. p. 136. n. 3613: g. Olacinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: g. Heisteriear.
Benth. 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 677; 1841. Ann. and Mag. VII. p. 215: g. Olacear. — Par. Römer 1846. Fam. nat. I. p. 12. 21. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444.
Pöpp. & Endl. 1842. Nov. gen. III. p. 35. t. 241.
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 353: g. Olacinear.

Heisterieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: trib. Olacinear. Gen.: Heisteria, Ximenia.

Hekaterosachne*) Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 118: nov. g. Panicear. (H. elatior.)

Hekeria „Kunth" Endl. Gen. Spl. I. p. 1374 in synon. Pothomorphae: vid. *Heckeria Kunth.*

Hekorima Kunth 1843. Enum. IV. p. 203: g. Uvulariear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 235: g. Veratrear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199: g. Uvularear.
= Hexorima Rafin.

Heladena**) A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 321; 1843. Arch. Mus. III. p. 347. t. 10: nov. g. Malpighiear. (Bunchosia multiflora Hook. & Arn.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 197.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390 (*Heladraia*): g. Malpighear.
Synon. Heladenia Rchb.

Heladenia Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7864: g. Malpighiear. (genuinar.) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 346.
Endl. 1842. Spl. II. p. 84. n. $5586/_1$: g. Apterygiar.
= Heladena A. Juss.

Heladraia Lindl. vid. *Heladena A. Juss.*

Helcia Lindl. 1845. Bot. Regist. XXXI. Misc. 26: nov. g. Orchidear., Trichopiliae aff. (H. sanguinolenta.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Brassidar.

*) ἑκάτερος, alteruter.
**) ἧλος, clavus: nomen a clavatis glandulis calycinis.

Heldreichia Boissier 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 381: nov. g. Cruciferar. (H. rotundifolia, etc.)
Boiss. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 184: g. Thlaspidear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 341. — Endl. 1843. Spl. III. p. 87. n. $4888/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Thlaspidar.
Synon. Zygopeltis Fenzl.

Heleastrum*) DC. 1836. Prodr. V. p. 263: nov. g. Enasterear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2315. p. 375; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (126).
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3302: g. Asterear. (genuinar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.

Heleiotis Hasskarl mss.
= Phylacium Benn. (Walp. Rep. II. p. 520)

Helemonium Steud. vid. *Helenomoium Willd.*

Helena Haworth 1831. Mon. Narciss. p. 13: nov. g. Narcissinear. (Narc. gracilis Sab.) *Cf.* Kunth Enum. V. p. 731.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 452: subg. Narcissi.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 18. 232: sect. Hermiones.
= Narcissi Haw. pars.

Helenia Linn. 1737. Gen. p. 260. n. 664; 1737. Cliff. p. 418; 1740. Syst. p. 29; 1742. Gen. ed. II. p. 410. n. 796; 1748. Ups. p. 266: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. (*Heleniastrum Vaill.*) *Cf. Helenium Linn.*
Gled. 1749. Berl. V. p. 131: g. Petalostemonis. — Par. Mönch 1794. Meth. p. 589.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.
Hill 1769. Ht. kew. p. 6: g. Radiatar. — Par. Gärtn. 1791. Fr. II. p. 483. t. 169.
DC. 1836. Pr. V. p. 666: sect. Helenii. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2603 *a.* p. 424; 1841. Ench. p. 240. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 384.

Heleniastrum Vaillant 1720. Act. Ac. Paris. p. 314: g. Corymbiferar.
= Helenium Linn.

Helenieae Cassini 1818. Dict. v. 10. p. 419; 1821. v. 20. p. 346: div. Helianthear. Gen.: Achyropappus, Actinea, Allocarpus, Bahia, Balbisia, Balduina, Calea, Caleacte, Cephalophora, Dimerostemma, Eriophyllum, Florestina, Gaillardia, Galinsoga, Helenium, Hymenopappus, Leontophtalmum, Leptopoda, Marshallia, Mocinna, Polypteris, Ptilostephium, Schkuhria, Sogalgina, Tithonia, Trichophyllum. — Par. Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 16; 1828. v. 55. p. 263; 1830. v. 60. p. 575. (Opusc. III. p. 36.) Subdivis.: *verae* (gen.: Schkuhria, Trichophyllum, Eriophyllum, Achyropappus, Bahia, Actinea, Dugaldia, Helenium, Tetrodus, Leptopoda, Balduina, Gaillardia), Galinsogeae, Caleineae, Hymenopappeae. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17. Gen. fere ead.
Rchb. 1828. Consp. p. 109: subdiv. Helianthear. Gen.: Achyropappus, Actinea, Allocarpus, Bahia, Balbisia, Balduina, Calea, Caleacte, Calydermos?, Cephalaphora, Grahamia, Dimerostemma, Eriophyllum, Florestina, Gaillardia, Galinsoga, Helenium, Hymenopappus, Leontophthalmum, Leptopoda, Marshallia, Hysterionica?, Mocinna, Polypteris, Ptilostephium, Schkuhria, Sogalgina, Trichophyllum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Helianthidear. Gen.: Helenium, Balbisia, Galinsoga, Cephalophora, Hymenopappus, Leontophthalmum, Leoptoda, Polypteris, Trichophyllum.
Less. 1832. Syn. p. 237: subtrib. Senecionidear. Divis.: Galardieae, Caleae, Rosilleae, Galinsogeae. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 651. Divis.: Gaillardieae, Galinsogeae, Madieae. — Endl. 1838. Gen. p. 420; 1841. Ench. p. 239. Divis. ut DC. — Meisn. 1839. Gen. p. 205 (132). Divis. eaed. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 40. Gen. ex Endl. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 396. Gen.: Galinsoga. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711. Gen. Euhelenicar. Endl. 1843 (Macrocephalus loco Macrocarphi) et Pleurophyllum.
Rchb. 1841. Nom. p. 83: div. Anthemidear. Gen. Euheleniear. Endl. 1841 et Psilostrophe?

Helenium Rupp. 1718. Fl. jen. p. 163. Ed. Hall. 1745. p. 175: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1720. Act. Ac. Par. p. 302: g. Corymbiferar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 125: g. Jacobear.
Inulae sect. Corvisartia Mérat.

Helenium*) Linn. 1753. Sp. II. p. 886; 1759. Syst. ed. X. p. 1220. n. 863; 1763. Sp. ed. II. p. 1248; 1764. Gen. ed. VI. p. 429. n. 961; 1767. Syst. ed. XII. p. 560: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 639; 1784. Syst. p. 769. — Reich. 1778. Gen. p. 425. n. 1041. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 560. n. 1299. — Gmel. 1791. Syst. p. 1244. — Pers. 1797. Syst. p. 811; 1807. Ench. II. p. 474. n. 1912. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2120. n. 1496; 1809. En. p. 898.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 189. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 531. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 417. — Link 1822. En. II. p. 338.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Compositar. quartae sectionis. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540.

*) ἕλος, ἕλεος, palus; ἄστρον, astrum.

*) Nomen ex Plinio: e lacrimis Helenae dicitur natum.

Helenium Linn. cont.

Gled. 1764. Syst. p. 253. n. 1044: g. Petalostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 131: g. Flosculosar.

Neck. 1790. El. I. p. 29. n. 54: g. Actinophytor.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 565; 1826. Syst. III. p. 573. n. 2788; 1831. Gen. II. p. 631. n. 3145: g. Radiatar.

Nutt. 1818. Gen. II. p. 173: g. Galardiar.

HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 298: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 513. — Bartl. 1830. Ord. p. 142.

Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 348; 1825. v. 38. p. 16; 1828. v. 55. p. 264; 1830. v. 60. p. 575: g. Heleniear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2588; 1841. Nom. p. 83. n. 3196. Sect. (1841): Tetrodus, Helenium. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 317. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 121. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 41. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Link 1829. Hdb. I. p. 775: g. Coreopsidear.

Less. 1831. Linnaea VI. p. 520; 1832. Syn. p. 240: g. Galardiear.

DC. 1836. Pr. V. p. 665: g. Euheleniear. Sect.: Helenia, Tetrodus. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2603. p. 428; 1841. Ench. p. 240. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 205 (133). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 383. Sect. ut DC.

Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 384: g. Gaillardiear.

Synon. Heleniastrum Vaill.; Helenia Linn.; Brassavola Adans.

Helenomoium Willd. herb. ex DC. Prodr. V. p. 551. (*Helemonium* ex Steud. Nom. I. p. 733.)

= Heliopsidis Pers. spec.

Heleocharis Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 25 et Schult. Mant. II. p. 2): g. Scirpear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1118; 1829 ap. Mössl. III. p. 1806; 1830. Fl. exc. p. 77. — Koch 1837. Syn. p. 738. Ed. II. p. 852.

Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.

Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1477. 2: sect. Scirpi. — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 620.

Rchb. 1844. Fl. sax. p. 58: g. Cyperoidear. Sect.: Heleocharis, Dichostylis, Heleogiton.

Webb 1850. Canar. III. p. 365: g. Cyperacear.

Synon. Eleocharis R. Brown; Eleogenus Nees; Chaetocyperus Nees; Scirpidium Nees; Mariscus Mönch; Bulbostylis Stev. (ex Rchb.); Mitrocarpa et Somphocarya Torrey. (Steud.)

Heleochloa Host 1801. Gram. Austr. I. p. 23. t. 29. 30: nov. g. Graminum. *Cf.* Panz. 1814. Denkschr. Münchn. Ak. f. 1813. p. 276.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Agrostidear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 150.

Heleochloa Host cont.

Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 17: Crypsidi inserunt.

Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 943 *a;* 1841. Nom. p. 36. n. 1227. 2: sect. Crypsidis. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 745 *b.* p. 80; 1841. Ench. p. 56. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 467; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 459.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Alopecurear. (Nomen absque auctore.)

Heleochloa Palis. 1812. Agrost. p. 23: nov. g. Graminear.

Sporobolus R. Brown.

Heleochloa Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 77: sect. Glyceriae. (G. maritima, distans, etc.) — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 534.

Heleogalia Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 10: sect. Galii. (G. uliginosum, palustre, trifidum.)

Heleogiton Schult. 1824. Mantissa II. p. 2: nomen pro *Heleophila Palis., Lestib.* propositum (ob Heliophilam L.)

„Lestib." Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1119; 1829 ap. Mössl. III. p. 1807; 1830. Fl. exc. p. 77: g. Scirpear. (Sc. triqueter L.)

Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.

Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1478. 4: sect. Isolepidis.

Rchb. 1844. Fl. sax. p. 59: sect. Heleocharidis.

Scirpi Linn. pars.

Heleogonus Wittst. vid. *Eleogenus Nees.*

Heleonastes Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 28; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Carex Heleonastes.)

Rchb. 1844. Fl. sax. p. 41: sect. Vigneae. (Carex brizoides, arenaria, muricata, etc.)

Heleophila „Palis. mss." Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 25); g. Scirpear.

Vid. Heleogiton Schult.

Heleophylax Lestib. ex Steud. Nom. p. I. p. 733 (*Heliophylax* ibid. p. 713 et II. p. 537 in synon. Scirpi): vid. *praeced.*

Helepta Rafin 1825. Nov. gen. p. 3.

Heliopsis Pers.?

Helia*) Martius 1827. Nov. gen. II. p. 122. t. 191: nov. g. Gentianear. (Lisianthus spathulatus HBK.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 377. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 200. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 36. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.

Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3489: g. Chironiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3552. p. 604; 1841. Ench. p. 302.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 202: g. Coutoubear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 132. n. 5103: g. Erythraeariar.

Griseb. 1839. Gent. gen. p. 184; 1845 in DC. Pr. IX. p. 74: sect. Lisianthi.

*) ἕλος, quia herba palustris.

Heliactis Kützing mss.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Desmidiear.

= Micrasterias Agdh.

Heliamphora Benth. 1840. Linn. Trans. XVIII. 3. p. 429; 1840. Ann. nat. hist. V. p. 47: nov. g. Sarraceniacear. (H. nutans.) — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 109. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 329. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 429.

Endl. 1841. Spl. V. n. 5023/$_1$. p. 1420; 1841. Ench. p. 463: g. Sarraceniear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 334 (247. 340). — Rchb. 1841. Nom. p. 188. n. 7182.

Helianthaceae Lemaire „Dict. bot. mss." 1849 in Orb. Dict. IV. p. 413 (sub Cryphiospermo).

= Synanthereae Cass.

Heliantheae DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 146: sect. Tubulosar.

Heliantheae Cassini 1815. Bull. soc. philom. p. 173: trib. 9 Synantherear. — Par. Cass. 1818. Dict. v. 10. p. 419. Divis.: Archetypae (subdiv. 1825: Spilantheae, Verbesineae, *verae* [gen.: Simsia, Encelia, Pterophyton, Helianthus, Harpalium, Leighia, Viguiera]), Rudbeckieae, Coreopsideae, Helenieae, Tagetineae, Millerieae. — Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 346. 369; 1825. v. 38. p. 16; 1830. v. 60. p. 574. Divis. eaed. exclusis Tagetineis. — Simil. A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 234. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 16. 120. Sect.: Helenieae, Coreopsideae, *verae* (gen.: Spilanthes, Platypteris, Ditrichum, Dunantia, Petrobium, Salmea, Melanthera; Lipotriche, Blainvillea, Acmella, Micractis, Sanvitalia, Anactis, Zinnia, Philactis. Tragoceras, Hamulium, Verbesina, Ximemesia; Simsia, Oyedaea, Encelia, Philoglossa, Actinomeris, Helianthus, Harpalium, Leighia, Flourensia, Viguiera), Rudbeckieae, Millerieae.

HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 199: sect. Compositar. Gen.: Melananthera, Platypteris, Verbesina, Encelia, Spilanthes, Heliopsis, Diomedea, Wedelia, Gymnolomia, Helianthus, Viguiera, Ximenesia, Coreopsis, Bidens, Cosmos, Georgina, Rudbeckia, Synedrella, Heterospermum, Guardiola, Tragoceros, Zinnia, Balbisia, Galinsogea, Ptilostephium, Wiborgia, Achyropappus, Parthenium, Hymenopappus, Schkuhria, Pectis, Eclipta, Selloa, Eriocoma, Meyera, Centrospermum, Melampodium, Xanthium, Ambrosia, Iva, Jägeria, Unxia, Espeletia, Polymnia, Siegesbeckia, Milleria, Flaveria, Monactis, Baillieria, Cacosmia, Allocarpus, Calea, Leontophthalmum, Actinea, Helenium. *Cf.* Spreng. N. Entd. III. p. 199. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 463. Gen. ead.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 56: fam. Tubulariae.

Rchb. 1828. Consp. p. 109 (1831. Fl. exc. p. 211); 1837. Hdb. p. 182: div. Amphicenianthar. Subdivis.: Helenieae, Coreopsideae, *genuinae* (gen.: Acmella, Blainvillea, Ditrichum, Encelia, Hamulium, Harpalium, Helianthus, Isocarpha?, Leighia, Lipotriche, Melanthera, Petrobium, Platypteris, Pterophyton, Salmia, Sanvitalia, Simsia, Spilanthes, Tragoceros, Verbesina, Vigniera, Ximenesia, Zinnia), Rudbeckieae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 92. Subdivis.: Coreopsideae, Rudbeckieae, Gaillardieae.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: subtrib. Helianthidear. Gen.: Helianthus, Verbesina, Acmella, Ximenesia, Encelia, Salmea, Sanvitalia, Spilanthes, Zinnia.

Bartl. 1830. Ord. p. 141: div. Synantherear. Gen.: Iva, Melampodium, Elvira, Meratia, Centrospermum, Millera, Unxia, Villanova, Chrysogonum, Polymnia, Polymniastrum, Riencurtia, Eriocoma, Euxenia, Sclerocarpus, Caesulia, Meyera, Phaëtusa, Monactis, Siegesbeckia, Jägeria, Hybridella, Madia, Flaveria, Biotia, Ogiera, Zaluzania; Baltimora, Chakiatella, Adelmannia, Dracopis, Echinacea, Eclipta, Selloa, Ferdinanda, Fougeria, Gymnoloma, Helicta, Heliophthalmum, Heliopsis, Kallias, Obeliscaria, Pascalia, Podanthus, Rudbeckia, Stemmodontia, Tithonia, Wedelia, Wulffia; Acmella, Blainvillea, Ditrichum, Encelia, Hamulium, Harpalium, Helianthus, Isocarpha, Leighia, Lipotriche, Melanthera, Petrobium, Platypteris, Pterophyton, Salmea, Sanvitalia, Simsia, Spilanthes, Tragoceros, Verbesina, Viguiera, Ximenesia, Zinnia; Aspilia, Baillieria, Bidens, Chrysanthellina, Chrysanthellum, Coreopsis, Calliopsis, Cosmos, Espeletia, Georgina, Glossocardia, Guardiola, Heterospermum, Kerneria, Leachia, Mnesiteon, Narvalina, Neuractis, Parthenium, Peramibus, Silphium, Synedrella, Tetragonotheca; Achyropappus, Actinea, Allocarpus, Bahia, Balbisia, Balduina, Calea, Caleacte, Calydermos, Cephalophora, Dimerostemma, Eriophyllum, Florestina, Gaillardia, Galinsoga, Grahamia, Helenium, Hymenopappus, Leontophthalmum, Leptopoda, Marschallia, Mocinna, Polypteris, Ptilostephium, Schkuhria, Sogalgina, Trichophyllum.

Less. 1832. Syn. p. 221: subtrib. Senecionidear. Divis.: Wedelieae, Heliopsideae, Rudbeckieae, Coreopsideae, Bidentideae, Verbesineae. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 534. Divis. eaed. exclusis Wedelieis. — Endl. 1838. Gen. p. 405; 1841. Ench. p. 238. Divis. ut DC. — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). Divis. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 41. Gen. ex Endl. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 396. Gen.: Bidens, Helianthus.

Koch 1837. Syn. p. 355: trib. Corymbiferar. Gen.: Wiborgia, Bidens, Helianthus.

Heliantheae Lessing 1830. Linnaea V. p. 148: subtrib. Asteroidear. Gen.: Wiborgia, Salazia, Eclipta.

Eclipteae Less. 1831.

Helianthella Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Am. II. p. 333: nov. g. Euhelianthear. (H. grandiflora, Douglasii, etc.)
Walp. 1843. Rep. II. p. 986; 1847. VI. p. 166: g. Coreopsidear.

Helianthemoideae Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 360: subdiv. Cistinear. Gen.: Helianthemum, Rhodax, Tuberaria.

Helianthemoides Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 95: nov. g. ex typo Portulacae patentis L. *Cf. Portulaca Medic.* 1789. Vorl. IV. 1. p. 250.
= Talinastrum DC.

Helianthemoides Walp. 1843. Repert. II. p. 808: sect. Hyperici. (H. armenum Jaub. & Sp.)

Helianthemum*) Tourn. 1700. Inst. p. 248. t. 128: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 107. Ed. Hall. 1745. p. 119: g. pl. class. V.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 358: g. Multilocularium.
Adans. 1763. Fam. II. p. 443: g. Cistor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 294. — DC. 1805. Franç. IV. p. 815; 1815. V. p. 621.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 371. t. 76. f. 11 (vulgare, ledifolium et aegyptiacum).
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 95.
Mönch 1794. Meth. p. 232: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 221: g. Cistoidear.
Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 307: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 75. n. 1314. — Willd. 1809. En. p. 569. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 3. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 418. 443.
Cram. 1803. Disp. p. 58 in Pentandr. Monogyn. et p. 94 in Octandr. Monogyn.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 99: g. Cistear. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 894. — Juss. 1817. Dict. v. 9. p. 282. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 826; 1825. Syst. II. p. 586. n. 1909; 1830. Gen. I. p. 429. n. 2129. — Lois. 1821. Dict. v. 20. p. 385. — Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4915 (sect. ut Dunal); 1832. Fl. exc. p. 711; 1837. Hdb. p. 272; 1841. Nom. p. 188. n. 7190. (genuinar. Sect. fere ut Endl.) — A. St. Hil. 1829. Fl. Bras. II. p. 128.
Link 1806 in Schrad. n. Journ. I. p. 109. (Observationes de genere.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 661: g. Cistinear. — Par. Dunal 1824 in DC. Pr. I. p. 266. Sect.: Halimium, Lecheoides, Tuberaria, Macularia, Brachypetalum, Eriocarpum, Fumana, Pseudocistus, Euhelianthemum. — Presl 1826. Sicul. I. p. 118. Sect. eaed. (excepta Lecheoide.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 283. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 301. Sect. ut Dun. — Link 1831. Hdb. II. p. 364. — Koch 1836. Syn. p. 80. Ed. II. p. 85. Sect. ex Dunal. — Meisn. 1837. Gen. p. 19 (17). — Kunth 1838. Berol. I. p. 92. — Endl. 1839. Gen. n. 5029. p.

*) ἥλιος, sol; ἄνθεμος, flos.

Helianthemum Tourn. cont.
905; 1841. Ench. p. 467. Sect.: Brachypetalum, Ericocarpum, Euhelianthemum, Pseudocistus, Tuberaria, Lecheoides. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 239. Sect. ex Dun. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 248. Sect. ut Dun. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 75. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 232. Sect. ex Dun. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 167. Sect. similes. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 502. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 231.
Link 1822. En. II. p. 74: g. Cistinar.
Wahlenb. 1824. Suec. 1. p. 332: g. Columniferar.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 150: g. Cistacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 350.
Synon. Cyticystus Burm.; Helianthemum, Rhodax et Tuberaria Spach; Cisti Linn. pars.

Helianthemum Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4915 *a*: sect. Helianthemi.
= Euhelianthemum Dun.

Helianthemum Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 360: g. restrict. Helianthemoidear. Sect.: Aphananthemum, Eriocarpum, Euhelianthemum, Argyrolepis.
Bernh. 1838. Flora II. p. 682: g. Cistacear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 15: g. Cistinear. Sect. ut antea. — Par. Webb .... Canar. I. p. 116.

Helianthi Rüling 1774. Ord. nat. Tab.: div. Compositar.

Helianthideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: trib. Trichostigmear. Subtrib.: Millerieae, Rudbeckieae, Heliantheae, Coreopsideae, Helenieae, Tagetineae.

Helianthus*) Linn. 1737. Gen. p. 262. n. 668; 1737. Cliff. p. 419; 1740. Syst. p. 29; 1748. Ups. p. 268; 1753. Sp. II. p. 904; 1759. Syst. ed. X. p. 1227. n. 877; 1763. Sp. ed. II. p. 1276; 1764. Gen. ed. VI. p. 439. n. 979; 1767. Syst. ed. XII. p. 569: g. Syngenes. Polygam. Frustran. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 650; 1784. Syst. p. 781. — Reich. 1778. Gen. p. 435. n. 1060. — Lour. 1790. Coch. II. p. 509. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 573. n. 1322. — Gmel. 1791. Syst. p. 1258. — Pers. 1797. Syst. p. 822; 1807. Ench. II. p. 475. n. 1913. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2237. n. 1533; 1809. En. p. 919. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 177. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 443.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131; 1764. Syst. p. 258. n. 1071: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 607.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Oppositifolior.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 188. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 530. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 417. — DC. 1805. Franç. IV. p. 219. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 447. — Math. 1853. Belg. I. p. 291.

*) ἥλιος, sol; ἄνθος, flos. Conf. Linn. Crit. bot. p. 97.

Helianthus Linn. cont.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Oppositifoliar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540. — Link 1822. En. II. p. 351.
Hill 1769. Ht. kew. p. 12: g. Radiatar. — Par. GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 236. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 570; 1826. Syst. III. p. 616. n. 2851; 1831. Gen. II. p. 640. n. 3209. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 13. 383.
Scop. 1777. Intr. p. 133: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 13. n. 21: g. Actinophytor.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 220: g. Heliantheae. — Par. Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 351; 1825. v. 38. p. 17; 1829. v. 59. p. 140; 1830. v. 60. p. 576. (Archetypar.) — Kunth 1823. Syn. II. p. 473. — Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2629 (genuinar.); 1831. Fl. exc. p. 211. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Koch 1837. Syn. p. 356. Ed. II. p. 396. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 142. (verar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 42. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 500.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 437: subg. Helianthi. — Par. Less. 1832. Syn. p. 229.
Link 1829. Hdb. I. p. 771: g. Coreopsidear. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 312. — DC. 1836. Pr. V. p. 585. — Endl. 1838. Gen. n. 2538. p. 413; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen p. 203 (131). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 366. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3601. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 318: g. Euhelianthear.
Synon. Corona Solis Tourn.; Sol Rupp.; Chrysis Ren.; Vosacan Adans.; Discomela Raf.; Echinomeria Nutt.

Helianthus Cassini 1822. Dict. v. 25. p. 437: g. Helianthear. latius circumscriptum. Subgen.: Helianthus, Harpalium, Leighia. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31.
Less. 1832. Syn. p. 229: g. Coreopsidear. Subgen. ead.

Helicanthera Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. X. 170. n. 888: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 755. n 804; 1830. Gen. I. p. 169. n. 854. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 760.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 c. n. 5555 inter genera vix cognita.
Helixanthera Lour.

Helichroa Rafin. 1825. Nov. gen. nr. 35; 1830 in Seringe Bull. p. 216: nov. g. ex typo Rudbeckiae purpureae.
= Echinacea Mönch.

Helichryseae Cassini 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: subdiv. Gnaphaliear. Gen.: Lepiscline (Lepidocline), Edmondia (Aphelexis), Macledium, Damironia (Astelma), Argyrocome, Helichrysum, Scalia, Podolepis, Antennaria, Ozothamnus, Petalolepis, Metalasia.
Less. 1832. Syn. p. 272: div. Gnaphaliear. Gen.: Podotheca, Humea, Leptorhynchos, Millotia, Panaetia, Helichrysum, Leontonyx, Gnaphalium, Oglifa, Gifola, Ifloga, Metalasia, Lachnospermum, Elytropappus, Stoebe, Seriphium, Perotriche. — Par. DC. 1837. Par. VI. p. 157. Gen.: Humea, Crossolepis, Quinetia, Rutidosis, Rhodanthe, Podotheca, Leptorhynchos, Morna, Millotia, Ixiolaena, Panaetia, Podolepis, Swammerdamia, Ozothamnus, Eriosphaera, Leontonyx, Helichrysum, Helipterum, Aphelexis, Stenocline, Achyrocline, Gnaphalium, Omalotheca, Cladochaeta, Pteropogon, Lasiopogon, Amphidoxa, Demidium, Filago, Metalasia, Erythropogon, Lachnospermum, Pachyrhynchus, Elytropappus, Disparago, Amphiglossa. — Endl. 1838. Gen. p. 444. Gen. ead. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1384 et Ench. p. 242) Pithocarpa, Lawrencella, Xyridanthe, Scaliopsis, Chrysocephalum (*cf.* Spl. II. p. 47) et 1843 Spl. III. p. 70) Chrysocoryne. — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). Gen. ut DC. — Fenzl 1839. Flora II. p. 726. Subdivis.: Humeae, Demidieae, Eugnaphalieae. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. Gen. ut DC. (exclusis 2 ultimis) et Pithocarpa, Lawrencella, Xyridanthe.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: subtrib. Senecionidear. Gen. ut Endl. et Anisolepis, Waitzia, Pterochaeta, Chrysodiscus, Siemssenia, Hyalosperma, Schoenia.

Helichrysoides Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 297: g. Corymbiferar.
= Stoebe Linn.

Helichrysoides A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 267: sect. Pteropogonis. (P. spicatus Steetz.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 287.

Helichrysum*) Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 290: g. Corymbiferar., ab Auctoribus varie circumscriptum.
Pers. 1807. Ench. II. p. 414. n. 1839: g. Syngenes. Superfl.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 449; 1822. v. 23. p. 562: g. Gnaphaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2429. — Less. 1831. Linnaea VI. p. 222. Subgen.: Helichrysum, Metalasia, Plocamophyllum, Anaxeton. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 401.
Schrank 1824. Denkschr. Ak. Münch. VIII. p. 146: g. Gnaphaloidear. verar.
D. Don 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 549. Char. emend.
Cass. 1827. Dict v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Helichrysear. (restrict.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Less. 1832. Syn. p. 274. Subgen.: Helichrysum, Lepicline, Ereicephyllum, Ozothamnos, Leucostemma, Astelma, Syncarpha, Edmondia, Argyrocome.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 365. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 197.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 224: g. Gnaphalinar.

*) ἥλιος, sol.

Helichrysum Vaillant cont.
A. Cunn. 1839. Ann. nat. hist. II. p. 129: g. Senecionidear.
Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.
Synon. Elichrysum s. Elychrysum Tourn.

Helichrysum Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 404: g. Tubulosar.
Less. 1832. Syn. p. 274: subg. Helichrysi.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 210: g. Gnaphaliear.
Euhelichrysum DC.

Helichrysum D. Don 1825. Prodr. fl. Nepal. p. 175: g. Carduacear. (H. stoloniferum et elegans.)
= Anaphalis DC.?

Helichrysum Gaudich. . . . . Freyc. voy. Bot. II. p. 465.
= Helipteri sect. Sericophorum DC.

Helichrysum DC. 1837. Prodr. VI. p. 169: g. Helichrysear. emendat. Sect.: Euhelichrysum, Blepharolepis, Taxostiche, Lepicline, Chionostemma. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2741. p. 446; 1841. Ench. p. 243. Sect. eaed — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3490. Sect. eaed. (Helichrysum loco Euhelichrysi.) — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 469. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Kunth 1838. Berol. I. p. 350: g. Gnaphaliear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 39. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 512. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 183. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 89.
Ledeb. 1845. Ross. II. p. 604: g. Eugnaphaliear.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 313: sect. Gnaphalii.
Hook. f. 1855. N.-Zeal. I. p. 140: g. Compositar.
Synon. Helichrysi sp. Vaill.; Helichrysum et Lepiscline Cass.; Helichrysi subg. 1, 2, 3, 5 et 9 Less.; Gnaphalii sp. Linn.

Helicia*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 83. Ed. Willd. p. 104: nov. g. Tetrandr. Monogyn. (H. cochinchinensis. — An Samarae species?: Willd.) *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 454.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 18. 306. n. 509: g. Ardisiacear.
R. Brown 1830. Prodr. Suppl. p. 32 (Verm. bot. Schr. V. p. 108): g. Proteacear. — Par. Blume 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 214. (Char. reform.) — Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 81. t. 18. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 983.
Endl. 1838. Gen. n. 2150. p. 342; 1841. Ench. p. 216; 1847. Spl. IV. p. 87: g. Hakeear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 2400.
Meisn. 1841. Gen. p. 333 (245): g. Rhopalear.

*) ἕλιξ, spira: a petalis spiraliter revolutis.

Helicia Lour. cont.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Grevillear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 438.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Grevillidar.
Synon. Helittophyllum Blume; Castronia Nor.?

Helicia Pers. 1805. Ench. I. p. 214. n. 488: g. Caprifolior.
Helixanthera Lour.

Helicilla Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 169: nov. g. Sodear.

Helicmotrichum „Bess." Steud. Nom. I. p. 172: vid. *Helicotrichum Bess.*

Helicobolus Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 751: g. Pyrenomycetum sphinctrostomor.
Ceuthospora Fries?

Helicocladia Webb . . . . Phytogr. Canar. III. p. 32: sect. Rhodorrhizae. (Convolvulus fruticulosus Desrouss.)

Helicocoryne Corda 1854. Icon. Fung. VI. p. 9. t. 3. f. 38: nov. g Helminthosporiacear. (H. viridis.)

Helicodiceros Schott 1853. Östr. bot. Woch. III. p. 369: nov. g. Aroidear. (H. crinita.) *Cf.* Koch 1855. Ind. sem. Berol. et Müll. Ann. bot. V. p. 870.
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 21: g. Helicophyllinar.

Helicodontium Schwägr. 1830. Suppl. III. vol. II. sect. 2. t. 293: nov. g. Muscor. frondosor. (H. tenuirostre.)
Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 69: g. Bryacear.
Sigmatella C. Müll.

Helicogyratae Bernhardi 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 4: div. Gyratar. verar. Gen.: Trichomanes, Hymenophyllum; Cyathea, Sphaeropteris, Dicksonia.
Presl 1836. Pterid. p. 46: subordo Filicacear. Tribus: Gleicheniaceae, Cyatheaceae.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 330: div. Filicacear. Ordines: Alsophilaceae, Thyrsopterideae, Cyatheaceae.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 39. 315: div. Polypodiacear. Trib.: Cyatheae, Thyrsopterideae.

Helicoma Corda 1837. Icon. Fung. I. p. 15; 1842. V. p. 10; 1842. Anl. Mycol. p. 39: nov. g. Helminthosporiacear. (H. Mülleri.)
Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 207: g. Dematieor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 116: g. Rhacodieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Helicosporeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 74: g. Torulaceor.

Helicomyces Link 1809. Berl. Mag. III. p. 21: nov. g. Mucedinum. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 517 (*Helycomyces*).
Nees 1816. Syst. p. 40; 1817. Überbl. p. 10: g. Nematomycor.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Dematior.

Helicomyces Link cont.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 543: g. Byssinear.?
Link 1824. Spec. I. p. 131: g. Hyphomycetum.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 559. n. 3577: g. Inomycetum, serius (Gen. II. p. 782) ad Helicosporium reductum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 147: g. Asporomycetum helicomorphor.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 9; 1842. V. p. 5; 1842. Mycol. p. 19: g. Torulacear. — Par. Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 725.
Corda 1839. Prachtfl. p. 29. t. 14 (aureus). Injungitur Helicosporium Nees.
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 38: g. Torulaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 38. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495.
Bonord. 1851. Hdb. p. 37: g. Protomycetum.
= Byssus Linn.? (Endl. Gen. p. 21.)

Heliconeae Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. (1815) p. 272: ordo Monocotyledonum. Gen.: Musa, Heliconia, Strelitzia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 164: trib. Musacear. Gen.: Heliconia.

Heliconia*) Linn. 1771. Mant. II. p. 147. n. 1297: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 204; 1784. Syst. p. 245. — Reich. 1778. Gen. p. 116. n. 310. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 158. n. 403. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 96. Char. corr. — Gmel. 1791. Syst. p. 423. — Pers. 1797. Syst. p. 257. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1187. n. 460; 1809. En. p. 268. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 494; ed. 1832. I. p. 670.
Scop. 1777. Intr. p. 95: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 61: g. Musar.
Neck. 1790. El. III. p. 148. n. 1493: g. Cratoophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 188: g. Scitaminear.
Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 70. t. 303—305: g. Hexandr. Monogyn. Char. reform.
Batsch 1802. Tab. p. 106: g. Palmariar.
Cram. 1803. Disp. p. 149: in Monadelph. Pentandr.
Massey 1804. Dict. v. 4. p. 398 (*Bihaï*): g. Musacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 152. — Pers. 1805 Ench. I. p. 263. n. 597. — Hedw. 1806. Gen. p. 176. n. 739. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 326. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. LI. 590. n. 1066. — Link 1821. En. I. p. 149; 1829. Hdb. I. p. 234. — Kunth 1822. Syn. I. p. 318. — Agdh. 1823. Aphor. p. 180. — Rchb. 1828. Consp. p. 71. n. 1609. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 68. — Lestib. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 265. — Brongn. 1843. En. genr. p. 24.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 272: g. Heliconear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 164.

*) Nomen a monte Helicon.

Heliconia Linn. cont.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 279; 1825. Syst. I. p. 833. n. 956; 1830. Gen. I. p. 280. n. 1452: g. Musear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXV. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1199.
Rich. 1831. Musac. p. 13: g. Heliconiar.
Endl. 1837. Gen. n. 1647. p. 228; 1841. Ench. p. 123: g. Heliconiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2232. — Meisn. 1842. Gen. p. 389 (292). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 136.
Synon. Bihai Plum.

Heliconia Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 270. t. 130.
= Strelitzia Banks?

Heliconiae A. Rich. 1831. Musac. p. 13: trib. Musacear. Gen.: Heliconia.

Heliconieae Endl. 1837. Gen. p. 228; 1841. Ench. p. 123: trib. Musacear. Gen.: Heliconia. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 389 (292). Gen. id. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 136. Gen. id. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 434. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 57: subdiv. Musear. Gen. id.

Heliconiopsis Miquel 1858. Fl. Ind. bat. III. p. 590: nov. g. Musacear. (Heliconia buccinata Roxb.)

Helicophyllinae Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 21: subtrib. Dracunculear. Gen.: Helicodiceros, Helicophyllum.

Helicophyllum Brid. 1827. Bryol. II. p. 771: nov. g. Hypophyllocarpor. (astomor. et ibid. p. XLVI g. Jungermannoideor.) — Par. Fürnr. 1829. Flora. II. Erg. Bl. p. 60.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 535: g. Hypophyllocarpior.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: g. Hypopterygiear.
C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 15: g. Hypopterygiacear.?

Helicophyllum Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 22: nov. g. Helicophyllinar. (Arum crassipes Boiss.)

Helicopus E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. austr. I. p. 146: sect. Scytalidis.

Helicosperma Lindl. vid. *Heliosperma Rchb.*

Helicosporei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: trib. Sclerochaeteor. Gen.: Helicotrichum, Helicoma.

Helicosporium Nees 1816. Syst. p. 68; 1817. Überbl. p. 19: g. Byssor. disjunctor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 460.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Parasporior.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 557: g. Byssidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 18: g. Trichomycor.
Link 1824. Spec. I. p. 51: g. Hyphomycetum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 541: g. Chloridiear.

Helicosporium Nees cont.
Fries 1825. Pl. homon. p. 305: g. Racodiacear.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 166: g. Conopleacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 553. n. 3555: g. Byssoideor.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 77: g. Racodiaceor.?
Ritg. 1831. Marb. II. p. 90: g. Spondylomycetum.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 782. n. 4049: g. Inomycetum.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 353: g. Dematieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 237. p. 20; 1841. Ench. p. 15. — Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 208. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Corda (1837 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 29. t. 15. 16.) 1837. Ic. Fung. I. p. 15; 1842. V. p. 10; 1842. Mycol. p. 39: g. Helminthosporiacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 116: g. Rhacodieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 500: g. Dematiaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 73: g. Torulaceor.
Synon. Helicotrichum Nees.

Helicostylis Trécul 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 134: nov. g. Olmediear. (Olmedia tomentosa Pöpp.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 664. — Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 118.

Helicostylium Fries vid. *seq.*

Helicostylum Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 18. 55. t. 2. f. 28; 1842. Anl. Mycol. p. 69: nov. g. Mucoroidear. (verar.) — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 134.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucorinor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 494 *Helicostylium*): g. Mucedinum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Mucorineor.

Helicothamnion Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 105; 1843. Phycol. gener. p. 433: nov. g. Polysiphoniear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Rhodomelear.
= Bostrychiae Mont. pars.

Helicotrichum Nees 1818. Nov. Act. Leop. IX. p. 246: nov. g. Byssor. disjunctor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 461.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 11: g. Parasporior.
Link 1824. Spec. I. p. 33: g. Hyphomycetum.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 165: g. Conopleacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 161: g. Aspromycetum rhizomorphor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 9; 1842. Mycol. p. 33: g. Bactridiacear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 111.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Dematieor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 494: g. Helicosporeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 102: g. Dendrinor.
= Helicosporium Nees?

Helicotrichum Bess. in Rchb. Fl. g. ex Steud. Nom. I. p. 741 (*Helicmotrichum* ibid. p. 172).
Avena planiculmis.

Helicta*) Cassini 1818. Bull. soc. philom. Nov. p. 167: nov. g. Helianthear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 461; 1825. v. 38. p. 17: g. Rudbeckiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2656. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21.
Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 399. 406; 1830. v. 60. p. 577: g. Heliopsidear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 537. — Endl. 1838. Gen. n. 2494. p. 406; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3124. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Helicta Lessing 1832. Syn. Compos. p. 221: g. Wedeliear.
Epallage DC.

Helictereae DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: subtrib. Dombeyacear. Gen.: Ayenia, Kleinhovia, Helicteres.
Schott 1832. Melet. bot. p. 30: trib. Sterculiacear. Sect.: Myrodieae, Euhelictereae, Reevesieae. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 991; 1841. Ench. p. 515. Sect. eaed. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 78. Gen.: Plagianthus, Helicteres. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 361. Gen. Endlicheriana.
Meisn. 1837. Gen. p. 29 (25): subordo Sterculiacear. Trib. ut Schott.
Rchb. 1837. Hdb. p. 294; 1841. Nom. p. 203: div. Oxalidear. Subdivis.: Isoreae, Ungerieae (1841 Reevesieae), Myrodieae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615: trib. Bombacear. Gen.: Methorium, Helicteres, Ungeria, Reevesia.

Helicteres**) Linn. 1737. Gen. p. 275. n. 695; 1737. Cliff. p. 433; 1740. Syst. p. 30; 1742. Gen. ed. II. p. 439. n. 837; 1753. Sp. I. p. 963; 1759. Syst. ed. X. p. 1250. n. 913; 1763. Sp. ed. II. p. 1366; 1764. Gen. ed. VI. p. 468. n. 1025; 1767. Syst. ed. XII. p. 601: g. Gynandr. Decandr. — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 235. t. 149. 150. 179. 181. — Murr. 1774. Syst. p. 688; 1784. Syst. p. 825. — Reich. 1778. Gen. p. 463. n. 1114. — Lour. 1790. Coch. II. p. 530. — Pers. 1797. Syst. p. 870.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 99. n. 412: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Columniferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Tiliar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 452. — Batsch 1802. Tab. p. 22.
Scop. 1777. Intr. p. 249: g. Polycarpiar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 308. t. 64. f. 3 (baruensis).

---

*) ἑλικτός, tortus.
**) Nomen ex Pluk. 1696. Almag. 182.

Helicteres Linn. cont.

Schreb. 1789. Gen. I. p. 290. n. 734: g. Decandr. Monogyn.

Juss. 1789. Gen. p. 278: g. Malvacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 201. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 71. — Pers. 1807. Ench. II. p. 239. n. 1616. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 463. — Link 1822. En. II. p. 199.

Neck. 1790. El. II. p. 303. n. 1080: g. Synathrophytor. Disjunguntur Alicteres et Opsopaea.

Gmel. 1791. Syst. p. 727: g. Decandr. Pentagyn.

Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 1156: g. Monadelph. Decandr. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 160.

Willd. 1800. Sp. III. p. 720. n. 1276; 1809. En. p. 718 *(Helicteris)*: g. Monadelph. Dodecandr. — Par. Roxb. 1832. Ind. III. p. 143.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 809: g. Büttnerear.

HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 303: g. Bombacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 263. — DC. 1824. Pr. I. p. 475. Sect.: Spirocarpaea, Orthocarpaea. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 80. n. 2415; 1831. Gen. II. p. 551. n. 2697. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1828. Consp. p. 205. n. 5323. Sect. ut DC. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 346. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 506. Sect. eaed. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 60. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 410. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 169.

DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: g. Helicterear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 78. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 361. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 615.

St. Hil. 1827. Fl. Bras. I. p. 271: g. Bombaceis aff.

Schott & Endl. 1832. Melet. p. 31: g. Euhelicterear. Sect. ut DC. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 29 (25). — Endl. 1840. Gen. n. 5316. p. 992; 1841. Ench. p. 515. Sect.: Euhelicteres, Isora, Alicteres, Orthothecium. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 320.

Blanco 1837. Fl. Filipin. p. 383: g. Decandr. Pentagyn.

Rchb. 1837. Hdb. p. 294; 1841. Nom. p. 203. n. 7735: g. Isorear. Sect. ut Endl.

Synon. Isora Plum.; Opsopaea et Alicteres Neck.

Helicterioides Steud. Nom. I. p. 742: vid. *Helicteroides DC.*

Helicteris Willd. vid. *Helicteres Linn.*

Helicteroides DC. 1828. Prodr. III. p. 340: sect. Loasac. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4232 *b*.

= Cajophora Presl.

Helictonia Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 66; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Ophrys spiralis L.)

= Spiranthes Rich.

Helie Römer 1846. Fam. nat. syn. I. p. 32. 42: nov. g. Limoniear. (Sclerostylis atalantioides W. & A.)

= Sclerostylis Blume sp.

Helierella Bory 1826. Dict. class. VIII. p. 98: nov. g. pro Echinella radiosa Lyngb. p. 208. t. 69. E 3 (non 2) propositum. (H. Lyngbyi.) *Cf.* Turp. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 317.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Desmidiear.

= Pediastrum Meyen.

Helietta*) L. Tulasne 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 280: nov. g. Zanthoxylear. (H. Plaeana.) *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 311. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 158. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 277. — Endl. 1850. Spl. V. p. 101. n. 5977/$_1$.

Heligme**) Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VII: g. Apocynear., pro *Helygia Blume.*

Endl. 1838. Gen. n. 3419. p. 584; 1841. Ench. p. 295: g. Echitear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. — Meisn. 1840. Gen. p. 264 (173). — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5159. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 425. — Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. p. 3. t. 1303. *(Synon. Caudicia Ham.)*

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.?

Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 428: g. Parsonsiear.

Synon. Helygia Blume; Helygma Hassk.; Caudicia Hamilt.?

Helinus***) „E. Meyer mss." Endl. 1840. Gen. n. 5745. p. 1102; 1841. Ench. p. 581: nov. g. Gouaniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5575.

Meisn. 1843. Comm. p. 348: g. Rhamnear.

Heliocarpos†) Linn. 1737. Gen. p. 157. n. 444; 1737. Ht. Cliff. p. 211; 1742. Gen. ed. II. p. 243. n. 530: g. Polyandr. Digyn.

Reich. 1778. Gen. p. 247. n. 662: g. Dodecandr. Digyn.

Juss. 1789. Gen. p. 290: g. Tiliacear. (verar.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 208.

= Heliocarpus Linn.

Heliocarpus Linn. 1740. Syst. p. 25: g. Polyandr. Digyn.

Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 106. n. 435: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Culminiar.

Linn. 1753. Sp. I. p. 448; 1759. Syst. ed. X. p. 1046. n. 533; 1762. Sp. ed. II. p. 643; 1764. Gen. ed. VI. p. 241. n. 606; 1767. Syst. ed. XII. p. 329: g. Dodecandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 372; 1784. Syst. p. 447. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 325. n. 829. — Gmel. 1791. Syst. p. 755. — Pers. 1797. Syst. p. 479; 1807. Ench. II. p. 9. n. 1186. — Willd. 1799. Sp. II. p. 874. n. 956.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Tiliar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 381.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 452.

---

*) Dicat. medico Hélie.

**) ἕλιγμα, tortum, volutum.

***) ἕλινος, palmes.

†) Nomen ob capsulam membranaceam planam, cujus margo undique exerit radios in orbem. (Ht. Cliff. Conf. Crit. bot. p. 97.)

Heliocarpus Linn. cont.
Scop. 1777. Intr. p. 274: g. Polyandrar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 225. t. 49. f. 6 (americana).
Neck. 1790. El. II. p. 276. n. 1039: g. Catizophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 62: g. Tiliacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 92. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 819; 1825. Syst. II. p. 448. n. 1750; 1830. Gen. I. p. 388. n. 1950. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 340. — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 466. — Link 1822. En. II. p. 7. — Kunth 1824. Syn. III. p. 277. — DC. 1824. Pr. I. p. 403. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46 (et ibid. *Helocarpus*). — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 542. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 6. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 5. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 76.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5443: g. Tiliear. (?) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 38 (29).
Rchb. 1837. Hdb. p. 303; 1841. Nom. p. 210. n. 7974: g. Sparmanniear.
Endl. 1840. Gen. n. 5367. p. 1007; 1841. Ench. p. 522: g. Grewiear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 329.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 372: g. Grewidar.
Synon. Montia Houst.; Heliocarpos Linn.

Heliogenes Benth. 1840. Pl. Hartweg. p. 42: nov. g. Chrysanthemear.? (H. Reglae et longifolia.) *Cf.* Flora Lit. XI. p. 103.
Endl. 1841. Spl. I. n. 2637/$_1$. p. 1384; 1841. Ench. p. 241: g. Euanthemidear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Walp. 1843. Rep. II. p. 633.
Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3058: g. Ptarmicear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Anthemidear.
= Aganippea DC. (A. Gray.)

Heliomeris Nuttall . . . . Journ. Amer. Ac. n. ser. I. p. 171.
A. Gray 1848. Pl. Fendl. p. 84; 1852. Pl. Wright. I. p. 107: g. Compositar.

Heliomyces Léveillé 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 177 (Voy. Bonite t. 136. f. 5); 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 486: nov. g. Agaricinor. (H. elegans.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41.

Heliopelta Ehrenb. 1844. Ber. Ak. Berl. p. 262: nov. g. Naviculaceor., Actinoptycho aff.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 132. n. 85: g. Coscinodiscear.

Heliophanes „Salisbury" Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 682: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d*. 42. p. 1412; 1841. Ench. p. 370. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4. q. — Rach 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 785 (*Helophanes*).

Heliophila*) „N. Burm." Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 926; 1764. Gen. ed. VI. p. 340. n. 816; 1767. Syst. ed. XII. p. 442: g. Tetradynam Siliculos. (Burm. . . . . Nov. Act. Upsal. I. p. 94.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 501; 1784. Syst. p. 598. — Reich. 1778. Gen. p. 340. n. 880. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 443. n. 1092. — Gmel. 1791. Syst. p. 985. — Pers. 1797. Syst. p. 636. — Willd. 1800. Sp. III. p. 527. n. 1241; 1809. En. p. 682. — Link 1822. En. II. p. 175.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 317. n. 1452 (*Heliophylla*). — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 500. — Pers. 1807. Ench. II. p. 203. n. 1572. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 716; 1825. Syst. II. p. 916. n. 2331; 1831. Gen. II. p. 524. n. 2582. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 324. (Sejunguntur Ormiscus, Orthoselis et Selenocarpaea.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 717.
Gled. 1764. Syst. p. 65. n. 271: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172 [17]: g. Siliculosar.
Burm. 1773. Nov. Act. Ups. I. p. 94.
Juss. 1789. Gen. p. 238 (praeced. B. Juss. in Ht. Trian.): g. Cruciferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 502. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 92. (Verm. bot. Schr. V. p. 38.) — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 468.
Neck. 1790. El. III. p. 79. n. 1404 (*Heliophyla*): g. Styridophytor.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 246; 1821. Syst. II. p. 677; 1824. Pr. I. p. 231: g. Heliophilear. Sect.: Carponema, Leptormus, Ormiscus, Selenocarpaea, Orthoselis, Lanceolaria, Pachystylum, Carpopodium. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVII; 1828. Consp. p. 185. n. 4821 (sect. eaed. et Cephaloceras); 1841. Nom. p. 182. n. 7020 (sect. fere ut DC.). — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 264. Sect. ut DC. — Meisn. 1837. Gen. p. 16 (14). — Endl. 1839. Gen. n. 4978. p. 888; 1841. Ench. p. 451. Sect. eaed. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 93.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1102. 1144: g. Arabidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Cardaminear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260: g. Hesperinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Heliophilidar.
Synon. Trentepolia Roth.

Heliophila Ecklon & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. austr. I. p. 10: g. Heliophilear. restrict. — Par. Sond. 1846. Abh. Hamb. nat. Ver. I. p. 180. — Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 51.
Rchb. 1841. Nom. p. 182. n. 7020. 5: sect. Heliophilae.
= Orthoselis DC.

Heliophileae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 246; 1821. Syst. II. p. 154. 676; 1824. Prodr. I. p. 231: trib. Diplecolobear.

*) Novum nomen: solem amans.

Heliophileae DC. cont.
Gen.: Chamira, Heliophila. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 264. Gen. ead. — Endl. 1839. Gen. p. 888; 1841. Ench. p. 451. Gen. ead. — Endl. 1850. Spl. V. p. 41. Gen.: Heliophila, Carponema.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVII; 1828. Consp. p. 185: sect. Siliquosar. Gen. ut DC. et 1828 Schizopetalon.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: div. Cruciferar. Gen.: Subularia, Chamira, Heliophila, Schizopetalon. — Par. Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. austr. I. p. 8. Gen.: Carponema, Leptormus, Ormiscus, Selenocarpaea, Heliophila, Pachystylum, Carpopodium.
Rchb. 1841. Nom. p. 182: sect. Sisymbriear. Gen. ut DC.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 93: trib. Cruciferar. Gen.: Heliophila.
Sonder 1846. Hamb. Abh. Nat. I. p. 179: fam. Cruciferar. (Bot. Zeit. 1846. p. 588.) Excluditur Chamira et admittitur Carponema.

Heliophilidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Diplecolobear. Gen.: Heliophila, Chamira.

Heliophthalmum Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 72.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 471; 1825. v. 38. p. 17; 1827. v. 46. p. 398. 401; 1828. v. 54. p. 461: g. Rudbeckiear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2657.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 321: g. Coreopsidear. verar.?
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear. = Rudbeckia Linn.

Heliophthalmum Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 25: sect. Ranunculi. = Ranunculastrum et Echinella DC.

Heliophyla Necker vid. *Heliophila Burm.*

Heliophylax Steud. Nom. I. p. 743; II. p. 537: vid. *Heleophylax.*

Heliophylla Scop. vid. *Heliophila Burm.*

Heliophyton Benth. vid. *Heliophytum DC.*

Heliophytum Chamisso 1829. Linnaea IV. p. 485: sect. Heliotropii. = Euheliophytum DC.

Heliophytum DC. 1845. Prodr. IX. p. 551: g. Heliotropear. Sect.: Pterotropium, Euheliophytum, Rutidotheca, Hieranthemum, Coeloma, Tiaridium.
Benth. 1846. Pl. Hartweg. II. p. 240 (*Heliophyton*): g. Boraginear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653 in synon. Tiaridii.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 925: g. Heliotropiear. — Par. Fres. 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIX. p. 44.
Synon. Schobera Scop.; Schoebera Neck.; Heliotrophytum Don.

Heliopsideae Cassini 1827. Dict. v. 46. p. 398; 1828. v. 54. p. 461; 1830. v. 60. p. 576: subdiv. Rudbeckiear. Gen.: Ferdinanda, Diomedea (Diomedella), Heliopsis, Kallias (Callias), Pascalia, Helicta, Stemmodontia, Wedelia, Trichostephus, (Trichostemma), Eclipta.
Less. 1832. Syn. p. 223: div. Helianthear. Gen.: Jägeria, Pascalia, Heliopsis, Ferdinanda, Chrysophania, Zaluzania, Calydermos. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 534. Gen.: Philactis, Zinnia, Helicta, Alarçonia, Wedelia, Jägeria, Lipotriche, Melanthera, Ogiera, Monactis, Wollastonia, Tilesia, Pascalia, Rumfordia, Heliopsis, Guizotia, Tetragonotheca, Ferdinanda, Chrysophania, Zaluzania, Chiliophyllum. — Endl. 1838. Gen. p. 405; 1841. Ench. p. 238. Gen. ead. et Scalesia? (*Cf.* Spl. II. p. 42.) Accedit 1843 (Spl. III. p. 69) Halea. — Meisn. 1839. Gen. p. 200 (130). Gen. ut DC. et Scalesia, Trimetra?, Abasoloa?, Allendea?
Rchb. 1841. Nom. p. 82: div. Anthemidear. Gen. ut Endl. et Würschmittia, Veslingia, Abasoloa?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711: subtrib. Senecionidear. Gen. ut Endl. 1843.

Heliopsis Pers. 1807. Ench. II. p. 473. n. 1908: nov. g. Syngenes. Superfl. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 172.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 569; 1826. Syst. III. p. 603. n. 2828; 1831. Gen. II. p. 637. n. 3185: g. Radiatar.
Dunal 1819. Mém. Mus. V. p. 54.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 212: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 470. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 42.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 472; 1822. v. 24. p. 333: g. Rudbeckiear. Subgen. (1822): Heliopsis, Kallias. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31.
Link 1822. En. II. p. 350: g. Oppositifoliar.
Less. 1830. Linnaea V. p. 153: g. Coreopsidear.
Less. 1832. Syn. p. 223: g. Heliopsidear. — Par. Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 310. — DC. 1836. Pr. V. p. 550. Sect.: Euheliopsis, Kallias, Balsamorhiza. — Endl. 1838. Gen. n. 2506. p. 407; 1841. Ench. p. 238. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (131). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 353. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 302. — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3137. Sect. fere ut DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Synon. Helepta Rafin.?; Helenomoium Willd.; Helemonium Steud.

Heliopsis Cassini 1822. Dict. v. 24. p. 333: subg. Heliopsidis.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17: g. Rudbeckiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2658. — Spach 1842. Vég. phan. X. p. 160.
Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 398. 405; 1830. v. 60. p. 577: g. Heliopsidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.

Heliopsis Cassini cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. $3137/_1$: sect. Heliopsidis.
= Euheliopsis DC.

Heliosciadium Bluff & Fing., Spach vid. *Helosciadium Koch.*

Helioscopia „Röp. in Duby Bot. gall. p. 413" (Gren. &) Godr. 1855. Fl. France III. p. 76: sect. Euphorbiae.
= Tithymalus Pers.

Heliosperma Rchb. 1832. Fl. exc. p. 817: sect. Silenes. (S. pusilla, quadrifida, pudibunda, alpestris.) — Par. Fenzl 1842 in Endl. Spl. II. p. 78. n. 5248 *h*. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 317. — Walp. 1843. Rep. II. p. 780.
Endl. 1840. Gen. n. 5246 *b a.* p. 972; 1841. Ench. p. 506: subsect. Silenanthae.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7825: g. Silenear. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 181. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498 („*Helicosperma Rchb. et Heliosperma Griseb.*").
A. Braun 1843. Flora p. 372: g. Lychnidear. — Par. Vis. . . . Fl. dalm. III. p. 171. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 290.

Heliotropeae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (223) Monopetalar.
D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 240: trib. Boraginear. Gen.: Heliotropium, Tournefortia, Tiaridium. — Par. Koch 1837. Syn. p. 495. Ed. II. p. 570. Gen.: Heliotropium. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 357. Gen.: Heliotropium, Piptoclaina, Tiaridium, Coldenia, Halgania, Preslaea, Euploca, Tournefortia, Messerschmidtia, Canala.
Endl. 1839. Gen. p. 646: trib. Ehretiacear. Gen.: Schleidenia, Heliotropium, Tiaridium. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1402 et Ench. p. 320) Pentacarya? — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 279 (187). Gen. ead. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653. Gen. ead. et Euploca.
DC. 1845. Pr. IX. p. 531: trib. Borraginear. Gen.: Heliotropium, Heliophytum, Schleidenia, Coldenia, Pentacarya, Euploca.

Heliotrophytum*) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 363: sect. Heliotropii. (H. tomentosum Poir.)
= Heliophytum DC.

Heliotropiceae Schrad. 1820. Comm. Gott. rec. IV. p. 192: fam. Asperifoliar. Gen.: Heliotropium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 193: subdiv. Idiocarpicar. Gen.: Tiaridium, Heliotropium, Preslaea.

Heliotropieae Agardh 1825. Class. plant. p. 15: div. Boraginear. — Par. Cham. 1829. Linnaea IV. p. 452; 1830. ibid. V. p. 115. Gen.: Tiaridium, Heliotropium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: trib. Boraginear. Gen.: Heliotropium, Coldenia, Triaridium.

*) Heliotropium; φυτόν, planta.

Heliotropieae Agardh cont.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31: sect. Ehretiacear. Gen.: Tiaridium, Hieranthemum, Heliotropium, Orthostachys, Schleidenia.
Rchb. 1841. Nom. p. 112: subdiv. Idiocarpicar. Gen. Heliotropear. Endl. 1841.
A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 657: subtrib. Ehretiear. Gen. ut Cham. et Schleidenia.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 56: trib. Borraginear. Gen. ut Cham.
Fres. 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIX.* p. 29. Gen. bras.: Heliotropium, Schleidenia, Heliophytum, Tournefortia.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 922: ordo Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Heliotropium, Piptoclaina, Heliophytum, Tournefortia, Tetrandra.

Heliotropioides G. Don vid. *Heliotropoides Röm. & Schult.*

Heliotropium Caesalp. 1583. De plant. lib. 9. (Linn. 1747. Class. pl. p. 19.)
= Croton Linn.

Heliotropium*) Tourn. 1700. Inst. p. 138. t. 57: g. pl. class. II.
Linn. 1737. Gen. p. 37. n. 103; 1737. Cliff. p. 45; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 33; 1753. Sp. I. p. 130; 1759. Syst. ed. X. p. 913. n. 964; 1762. Sp. ed. II. p. 187; 1764. Gen. ed. VI. p. 73. n. 179; 1767. Syst. ed. XII. p. 144: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 120. — Murr. 1774. Syst. p. 155; 1784. Syst. p. 184. — Reich. 1778. Gen. p. 76. n. 191. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 99. n. 239. — Lour. 1790. Coch. I. p. 103. — Gmel. 1791. Syst. p. 314. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 33; 1818. Fl. cap. II. p. 1. — Pers. 1797. Syst. p. 189; 1805. Ench. I. p. 155. n. 348. — Willd. 1797. Sp. I. p. 740. n. 274; 1809. En. p. 174. — Ruiz & Pav. 1799. Fl. peruv. II. p. 2. (reform.) — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 1; ed. 1832. I. p. 454.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 120.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 520: g. Asperifoliar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 159. — Gis. 1792. Prael. p. 489. — Batsch 1802. Tab. p. 188. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 112. — Lehm. 1818. Nov. Act. Leop. IX. p. 25; 1818. Asperif. I. p. 19. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. v. 28. n. 625. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 538. n. 581; 1830. Gen. I. p. 123. n. 611. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 2. 29. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 173. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 592.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 196. n. 812: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 415.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 130. — Vent.

*) τρέπω, verto. Nomen ex Plinio, Varrone, etc.

Heliotropium Tourn. cout.
1799. Tabl. II. p. 387. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 299. — DC. 1805. Franç. III. p. 619. — Hedw. 1806. Gen. p. 90. n. 407. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 492. Ed. Nees p. 348. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 85. — Lour. 1821. Dict. v. 20. p. 475. — Link 1821. En. I. p. 163; 1829. Hdb. I. p. 571. — Kunth 1823. Syn. II. p. 204. — D. Don 1825. Nepal. p. 101. — Lehm. 1840 in Hook. Fl. bor. am. II. p. 81. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 77. Sect.: Odontotropium, Euheliotropium, Chamaetropium. — Decne . . . . in Webb Canar. III. p. 40.

Adans. 1763. Fam. II. p. 178: g. Borraginum.

Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 74: g. Oligantherar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 126: g. Monopetalar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 329. t. 68. f. 2 (curassavicum).

Neck. 1790. El. I. p. 279. n. 440: g. Trachytophytor.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 449: g. Echiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2958.

Schrad. 1820. Comm. Gott. rec. IV. p. 192: g. Heliotropicear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 193.

Cham. 1829. Linnaea IV. p. 453; 1830. V. p. 115: g. Heliotropiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 43. (restrict.) — Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4358. Sect.: Heliotropium, Orthostachys. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 923. Sect.: Euheliotropium, Orthostachys. — Fres. 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XIX. p. 31.

Bartl. 1830. Ord. p. 197: g. Tournefortiear.

D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 240: g. Heliotropear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 496. Ed. II. p. 571. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 357. Sect.: Gyrostachys, Orthostachys, Heliotrophytum. — Endl. 1839. Gen. n. 3751. p. 646; 1841. Ench. p. 320. Sect.: Orthostachys, Euheliotropium. — Meisn. 1840. Gen. p. 279 (187). — DC. 1845. Pr. IX. p. 532. Sect.: Catimas, Piptoclaina, Euheliotropium, Orthostachys. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 653. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 98. Sect. ex DC.

Rchb. 1832. Fl. exc. p. 347: g. Hydrophyllear.

Lehm. 1845. Pl. Preiss. I. p. 348: g. Ehretiacear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 519.

(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 539: g. Cynoglossear.

Bunge 1852. Rel. Lehm. p. 222; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 398: g. Ehretiear. Nova sect.: Pleurolasia.

Stschegl. 1853. Bull. Mosc. XXVI. 1. p. 326. Nova sect.: Bucanion.

Heliotropoides Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. 538: sect. Tournefortiae. (Heliotropium gnaphalodes, microstachyum et synstachyum.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 369 *(Heliotropioides)*.

Helipteridium A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 231: sect. Helipteri. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 280.

Helipteroides A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 269: sect. Pteropogonis? (P. gracilis, ramosus n. sp.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 288.

Helipteropsis F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 415: sect. Pteropogonis. (P. ramosissimus et platyphyllus n. sp.)

Helipterum DC. 1837. Prodr. VI. p. 211: g. Helichrysear. Sect.: Astelma, Syncarpha, Edmondia, Leucochrysum, Leiochrysum, Sericophorum. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2742. p. 446; 1841. Ench. p. 243. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3489. Sect. ut DC. (Helipterum loco Leucochrysi et Leiochrysi.) — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 473. Sect. nova: Pachypterum. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — A. Gray 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 230. Sect.: Geniosperma, Synachyrum, Helipteridium. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 280. Sect. eaed.

Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 39: g. Gnaphaliear.

Synon. Argyrocome Gärtn.

Helisanthera Rafin. vid. *Helixanthera Lour.*

Heliscophora*) Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 42. n. $122/_{50}$ *b:* sect. Chrysymeniae.
= Chondrothamnion Kütz.

Helitophyllum Wittst. vid. *seq.*

Helittophyllum Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 652: nov. g. Proteacear., Anadeniae et Lambertiae proximum. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 426 *(Helitophyllum)*.
= Helicia Lour.

Helix Mitchell 1748. Act. nat. cur. VIII. App. p. 224: nov. g. pl. dioicum, Hederae simile.
= Hedera Linn.? (Linn. Amoen. III. p. 9.)

Helix Dumort. 1826 in Van Hall Bijdr. tot nat. Wet. I: subsect. Capri-Salicis.

Fries 1840. Bot. Notiser; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 56: sect. Salicis.

Helixanthera**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 142. Ed. Willd. p. 176: nov. g. Pentandr. Monogyn. (H. parasitica.) *Conf. Helicia Pers., Helicanthera Spreng.*

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 457: g. Caprifoliacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 130. n. 569.

*) ἥλιαχος, clavulus.

**) ἕλιξ, spira: ab antheris spiralibus.

Helixanthera Lour. cont.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87 *(Helisanthera)*: g. Lentaginiae.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 481: g. Loranthear. — Par. Juss. 1823. Dict. v. 27. p. 201.
= Loranthi Linn. pars.

Helixira Steud. Nom. I. p. 745: vid. *seq.*

Helixyra Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 305: nov. g. Iridear. (Moraea longiflora Ker.)

Helleboraceae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 285: fam. (109) Polycarpicar. Trib.: Helleboreae, Actaearieae, Paeonieae.

Helleboraster „Lob." Mönch 1794. Meth. p. 236: g. Thalamostemonis.
Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4964 *a;* 1832. Fl. exc. p. 745 *(Helleborastrum)*: sect. Hellebori. (H. foetidus L.)
= Hellebori Linn. pars.

Helleborastra Rchb. 1837. Handb. p. 277: subsect. Helleborear. genuinar. Gen.: Cimicifuga, Coptis, Eranthis, Helleborus.
Rchb. 1841. Nom. p. 191: subsect. Helleborinar. Gen. ead. exclusa Cimicifuga.

Helleborastrum Rchb. vid. *Helleboraster Mönch.*

Helleborastrum Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 316: sect. Hellebori. (H. viridis, atrorubens.)

Helleboreae DC. 1818. Syst. I. p. 130. 306: trib. Ranunculacear. Gen.: Caltha, Trollius, Eranthis, Helleborus, Coptis, Isopyrum, Garidella, Nigella, Aquilegia, Delphinium, Aconitum. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 44. Gen. ead. et Enemion? — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. Gen. ut DC. 1818. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 43. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4). Gen. ead. — Endl. 1839. Gen. p. 847; 1841. Ench. p. 434. Gen. ead. Accedunt 1842. (Spl. II. p. 73) Hegemone et 1850 (Spl. V. p. 30) Xaveria. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 97. Gen. ut DC. 1818. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. Gen. ut Endl. et Paeonia. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 717. Gen. ut DC. et Psychrophila.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 711: div. Ranunculacear. Gen.: Consolida, Aquilegia, Helleborus, Trollius, Caltha. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX. Subdivis.: Delphinieae, Nigelleae, Isopyreae, Caltheae, Paeoniaceae. — Bartl. 1830. Ord. p. 254. Gen. ut DC.
Rchb. 1828. Consp. p. 192: subdiv. Ranunculear. Gen. ut DC. et Thalictrum, Leptopyrum, Cimicifuga, Macrotys, Actaea; Xanthorrhiza; Paeonia. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 735. Sect.: Delphinieae, Isopyreae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 277. Sect: Isopyreae, Delphinieae, *genuinae* (subsect.: Nigelleae, Trollieae, Actaeariae, Helleborastra, Paeonieae). — Rchb. 1841. Nom. p. 191. Sect.: Isopyreae, Delphinieae, Helleborinae.

Helleboreae DC. cont.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452: subsect. Ranunculinar. Gen. ut DC. 1818 exclusa Caltha.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 289. 292: trib. Helleboracear. Sect.: Calthineae, Nigellineae, Helleborineae, Isopyrineae, Aconitineae.

Helleborinae Rchb. 1832. Fl. exc. p. 744: subsect. Isopyrear. Gen.: Trollius, Eranthis, Helleborus.
Rchb. 1841. Nom. p. 191: sect. Helleborear. Subsect.: Nigelleae, Trollieae, Helleborastra, Actaeariae, Caltheae, Paeonieae.

Helleborine Tourn. 1700. Inst. p. 436. t. 249: g. pl. class. XI. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 489.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 274: g. Orchidum.
Mönch 1794. Meth. p. 715: g. Stylostemonis.
Pers. 1807. Ench. II. p. 512. n. 1989: g. Orchidear.
= Serapias Linn.

Helleborine „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 178: g. pl. class. XIII. (Ed. Hall. 1745. p. 294 in class. XIV.)
Ehrh. 1780. Phytophyl. Nr. 37; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Serapias latifolia.)
= Epipactis Rich.

Helleborineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 290. 312: sect. Helleborear. Gen.: Helleborus, Eranthis, Coptis.

Helleboroides Adans. 1763. Fam. II. p. 458: g. Ranunculor.
= Eranthis Salisb.

Helleborus*) Tourn. 1700. Inst. p. 271. t. 144: g. pl. class. VI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 149. Ed. Hall. 1745. p. 163: g. pl. class. VII.
Linn. 1737. Gen. p. 164. n. 462; 1737. Cliff. p. 227; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 157; 1753. Sp. I. p. 557; 1759. Syst. ed. X. p. 1088. n. 622; 1762. Sp. ed. II. p. 783; 1764. Gen. ed. VI. p. 282. n. 702; 1767. Syst. ed. XII. p. 381: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 404. — Murr. 1774. Syst. p. 431; 1784. Syst. p. 519. — Reich. 1778. Gen. p. 287. n. 760. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 379. n. 956. — Gmel. 1791. Syst. p. 882. — Pers. 1797. Syst. p. 556; 1807. Ench. II. p. 107. n. 1366. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1335. n. 1089; 1809. En. p. 591.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 317: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 121. n. 498: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Multisiliquar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 133. — Gis. 1792. Prael. p. 376.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Ranunculor.

---

*) Nomen ex Virgilio.

Helleborus Tourn. cont.
Hill 1769 Ht. kew. p. 342: g. Pentapetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 259: g. Polycarpiar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 220; 1789. Phil. Bot. I. p. 66.
Juss. 1789. Gen. p. 233: g. Ranunculacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 60. — DC. 1805. Franç. IV. p. 906. — Lois. 1821. Dict. v. 20. p. 483.
Neck. 1790. El. II. p. 292. n. 1059: g. Synathrophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 46: g. Multisiliquosar.
Cram. 1803. Disp. p. 138: g. Polyandr. Digyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 489: g. Ranunculear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 734. (descisc.)
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 906. 984: g. Helleborear. Sect.: Eranthis, Helleborus.
= Helleborus Adans. et Eranthis Salisb.

Helleborus Adans. 1763. Fam. II. p. 458: g. Ranunculor., sejuncta Helleboroide restrict.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 482: g. Ranunculear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 658. n. 2040; 1830. Gen. I. p. 460. n. 2269.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 310. t. 65. f. 2 (viridis).
Salisb. 1807. Linn. Trans. VIII. p. 304. Distinguitur Eranthis.
Biria 1811. Hist. Rénonc. p. 21.
DC. 1818. Syst. I. p. 315; 1824. Pr. I. p. 46: g. Helleborear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 712. — Presl 1826. Sicul. I. p. 22. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 422. 563. — Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4964. Sect.: Helleboraster, Helleborus. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 254. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 45. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Koch 1836. Syn. p. 19. Ed. II. p. 21. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4). — Endl. 1839. Gen. n. 4789. p. 848; 1841. Ench. p. 435. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 659. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 51. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 97. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 316. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 41. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 520. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 26.
Röpert 1821. Flora I. p. 123. Char. emend.
Link 1822. En. II. p. 97: g. Ranunculacear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 217. 337.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX: g. Calthear. (ibid. II. p. 985 sect. Hellebori.)
Link 1831. Hdb. II. p. 386: g. Aconitear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 745: g. Helleborinar. Sect.: Helleborastrum, Helleborus.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7253: g. Helleborastror.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 312: g. Helleborinear. Sect.: Chionorhodon, Helleborastrum, Griphopus.
Synon. Helleporaster Rupp.; Helleboraster Mönch; Helleborastrum Rchb.

Helleborus Mönch 1794. Meth. p. 312: g. Thalamostemonis.
= Eranthis Salisb.

Hellenia*) Retz. 1791. Observ. VI. p. 18.
= Costus Linn.

Hellenia Willd. 1797. Spec. I. p. 4. n. 2: nov. g. Monandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 104: g. Scitaminear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 1. n. 2. — Hedw. 1806. Gen. p. 1. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 308. Ed. Nees p. 164. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 2. 22. — Agdh. 1823. Aphor. p. 184. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 14. n. 14; 1830. Gen. I. p. 6. n. 14. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 13.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 281: g. Zingiberear.
Juss. 1816. Dict. v. 2. spl. p. 20: g. Amomear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 490. — Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1593. — Bartl. 1830. Ord. p. 61. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 154.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 277: g. Scitaminum veror.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Curcumacear.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 60: g. Alpiniar. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1635. p. 225; 1841. Ench. p. 119.
Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341: g. Alpiniear. — Par. A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367. — Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2224. — Meisn. 1842. Gen. p. 389 (291).
Brongn. 1843. Én. genr. p. 25: g. Zingiberacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 603.
Synon. Heritiera Retz.; Languas Kön.

Helleporaster Rupp. 1718. Fl. jen. p. 150: g. pl. class. VII.
= Hellebori Linn. pars.

Helleria**) Nees & Mart. 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 38: nov. g. Hesperidum. (H. obovata.)
Spreng. 1826. Syst. III. p. 126. n. 2463; 1831. Gen. II. p. 561. n. 2744: g. Aurantior.
Mart. 1827. Nov. gen. II. p. 147: g. inter Styracinas et Meliaceas medium.
A. Juss. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 90: g. Humiriacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 676. — Meisn. 1837. Gen. p. 47 (34). — Endl. 1840. Gen. n. 5487. p. 1040; 1841. Ench. p. 545. — Walp. 1842. Rep. I. p. 425. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 298. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 447.
Rchb. 1837. Hdb. p. 314; 1841. Nom. p. 213. n. 8096: g. Humiriear.
= Vantanea Aubl.

*) Dicat. Car. Nic. Hellenio, prof. Aboënsi.
**) Dicat. F. X. Heller, prof. botan. Wirceburg.

Hellmannia Rchb. 1828. Consp. p. 132. n. 3472 *e:* sect. Passiflorae.
= Tacsonioides DC.

Hellmuthia*) Steud. 1850. Flora I. p. 229: nov. g. inter Scirpeas et Restiaceas. (Nomen.)
Steud. 1855. Glum. II. p. 90: g. Scirpear.

Hellwingia „Adans." Endl. Gen. p. 919 et Ench. p. 479 in synon. Laetiae; vid. *Helvingia Adans.*

Helmentia St. Hilaire vid. *Helmintia Juss.*

Helmia**) Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 55; 1850. Enum. V. p. 414: nov. g. Dioscorinear. (Dioscorea brachycarpa Schl., etc.)
Synon. Dioscoreae sect. Allactostemon, Dematostemon et Amphistemon pt. Griseb.

Helminthia***) (Juss. emend.) Willd. 1803. Spec. III. 3. p. 1607. n. 1413: g. Syngenes. Aequal. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 370. n. 1772. — Link 1822. En. II. p. 291.
DC. 1805. Franç. IV. p. 57: g. Cichoracear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 431. — Link 1829. Hdb. I. p. 792. — Math. 1853. Belg. I. p. 314.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 581; 1826. Syst. III. p. 668. n. 2897; 1831. Gen. II. p. 646. n. 3255: g. Cichorear.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 493: g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 146.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 63: g. Crepidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2138; 1831. Fl. exc. p. 254. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Picridear.
Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 479; . . . . in Webb Canar. II. p. 465: g. Helminthiear.
Koch 1837. Syn. p. 422. Ed. II. p. 484: g. Leontodontear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 132: g. Scorzonerear. Sect.: Euhelminthia, Virea. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3000. p. 497; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 235 (144). — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3699. Sect. ut DC. — Brongn. 1843. En. genr. p. 33. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 801. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 304.
Griseb. 1843. Rumel. II. p. 262: g. Liguliflorar.
Synon. Helmintia Juss.; Helminthotheca Vaill.

Helminthieae Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 478: div. Picridear. Gen.: Deckera, Helminthia.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 465: subdiv. Eupicridear. Gen.: Helminthia.

Helminthocarpon Fée 1837. Ess. crypt. écorc. II. p. . . .: nov. g. Graphidear. *Cf.* Linnaea 1838. Litt. p. 241 et Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 252.

Helminthocarpon Rich. 1847. Fl. Abyssin. I. p. 200: nov. g. Coronillear.

Helminthochorton Zanardini 1843. Saggio p. 48.
= Echinocaulon Kütz.?

Helminthochortos Link 1833. Hdb. III. p. 245.
= Alsidium Agdh.

Helminthocladeae J. Agardh . . . . Spec. II. p. 410.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 131: ordo Desmiospermear. Subord.: Gloiocladeae, Scinaieae, Liagoreae.

Helminthocladia Harvey . . . . in Mackay Fl. hibern. III. p. 184; 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 396; 1841. Man. brit. Alg. p. 45: nov. g. Chordariear. (Mesogloia vermicularis Ag.)
= Mesogloia Agdh.

Helminthocladieae Harvey 1855 in Hook. f. Fl. New-Zeal. II. p. 245: trib. Rhodospermear. Gen.: Nemalion, Scinaia.

Helminthonema „Kütz." Montagne 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: g. Coccochlorear.? (Nomen.)

Helminthophora Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 93: nov. g. Pleurosporiaceor. (H. tenera.)

Helminthora Fries 1825. Pl. homon. p. 341: nov. g. Batrachospermear.
Rchb. 1828. Consp. p. 25. n. 432: g. Chordariacear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phyc. gener. p. 391; 1845. Phyc. germ. p. 299: g. Gymnophlaeacear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 127: g. Cryptocarpear. (Subg.: Gloeosiphonia.) — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 316.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 105: sect. Dudresnayae.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 133: g. Gloiocladear.
= Nemalion Targ. et Gloiosiphonia Carm.

Helminthospermum Thwaites 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 301. t. 9. C: nov. g. Ulmacear. (H. scabridum.)

Helminthosporei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: trib. Sclerochaeteor. Gen.: Helminthosporium, Podosporium, Soredospora, Azosma, Mitrosporium, Macrosporium, Coccosporium, Midonotrichum, Septosporium, Stemphylium, Triposporium, Trichaegum, Macroon, Amphitrichum?, Midonosporium?

Helminthosporiaceae Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 12: fam. Hyphomycetum. Gen.: Mystrosporium, Septosporium, Helminthosporium, Cladosporium, Azosma, Mydonotrichum, Polythrincium, Mydonosporium, Trichaegum, Coccosporium, Helicoma, Helicosporium, Triposporium, Amphitrichum. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 9; 1842. Mycol. p. LIX. 35. Gen.: Blastotrichum, Cladosporium, Azosma, Leptotrichum, Helminthosporium, Mydonotrichum, Macroon, Coccosporium, Polythrincium, Diplosporium, Mystrosporium, Stem-

---

*) Dicat. filio Hellmuth Steudel.
**) Dicat. C. Helm, archidiacono.
***) ἕλμινς, vermis.

Helminthosporiaceae Corda cont.
phylium, Septosporium, Trichaegum, Amphitrichum, Triposporium, Helicoma, Helicosporium, Cladotrichum, Mydonosporium. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 113. Gen.: Blastotrichum, Cladosporium, Mystrosporium, Septosporium, Diplosporium, Trichaegum, Triposporium, Cladotrichum, Helminthosporium.

Helminthosporium Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 17: g. Trichomycor.
Link 1824. Spec. I. p. 47: g. Hyphomycetum. — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 302.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 166: g. Conopleacear.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 354: g. Dematieor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 236. p. 20; 1841. Ench. p. 14. Sect.: Helminthosporium, Exosporium. — Rchb. 1841. Nom. p. 5. n. 200. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.
Corda 1837 in Sturm Fl. Fung. III. p. 19. t. 10—14.
Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 12; 1838. II. p. 13; 1842. V. p. 10; 1842. Mycol. p. 36: g. Helminthosporiacear. — Par. Preuss 1848 in Sturm Fl. III. H. 25. 26. p. 33. t. 17; 1851. Linnaea XXIV. p. 117. — Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 8.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 108: g. Rhacodieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 500: g. Dematiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: g. Helminthosporeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 89: g. Psiloniaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 468: g. Chloridear.
Synon. Helmisporium Link; Podosporium Schwein.; Sarcopodium Corda; Macroon Corda?; Stemphylium Wallr.?

Helminthostachis Ritg. vid. *Helminthostachys.*

Helminthostachydeae Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 318: subordo Ophioglossacear. Gen.: Helminthostachys.

Helminthostachys Kaulfuss 1824. Enum. Fil. p. 28: nov. g. Ophioglossear. (Osmunda zeylanica L.) — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 22. n. 3219; 1831. Gen. II. p. 717. n. 3610. — Rchb. 1828. Consp. p. 40. n. 748; 1841. Nom. p. 30. n. 1064. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 258. — Bartl. 1830. Ord. p. 19. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 105 (*Helminthostachis*). — Grev. & Hook. 1833. Bot. Misc. III. p. 220. — Endl. 1836. Gen. n. 673. p. 66; 1841. Ench. p. 42. — J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 421. — Meisn. 1843. Gen. p. 435 (337). — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694 (*Helmintostachys*). — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 121.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Ophioglossinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 77: g. Ophioglossacear.

Helminthostachys Kaulfuss cont.
Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 318: g. Helminthostachydear. Sect.: Helminthostachys, Botryopteris.
Synon. Botryopteris Presl; Ophiala Desv.

Helminthotheca Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 205: g. Cichoracear.
= Helminthia Juss., Willd.

Helmintia Juss. 1789. Gen. p. 170: g. Cichoracear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 489. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 376 (*Helmentia*).
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 368. t. 159: g. Ligulatar.
Mönch 1794. Meth. p. 500: g. Petalostemonis.
MBieb. 1808. Taur. cauc. II. p. 250: g. Syngenes. Aequal. — Par. Willd. 1809. En. p. 829.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307: g. Taraxacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: g. Crepidear.
Less. 1832. Syn. p. 134: g. Scorzonerear.
= Helminthia Juss., Willd.

Helmintostachys Brongn. vid. *Helminthostachys Kaulf.*

Helmisporia Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLVI: subsect. Byssor. solidor. Gen.: Cladosporium, Helicosporium, Helmisporium, Chloridium.

Helmisporium Link 1809. Berl. Mag. III. p. 10: nov. g. Epiphytar. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 495.
Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 39: g. Mucedinum. (Sphaerioidear.)
Nees 1816. Syst. p. 67; 1817. Ueberbl. p. 18: g. Byssor. disjunctor.
Mart. 1817. Erlang. p. 350: g. Inomycetum. (aëreor.) — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 782. n. 4048.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Parasporior.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLVI: g. Helmisporior.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 548 (*Helmosporium*). 556: g. Byssidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 542: g. Chloridiear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 305: g. Racodiacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 554. n. 3558: g. Byssoideor.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 78: g. Racodiaceor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 90: g. Spondylomycetum.
Wallr. 1833. Krypt. II. p. 163: g. Asporomycetum rhizomorphor.
Corda 1839. Prachtfl. p. 7. t. 4 (stemphylioides).
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 10: g. Helminthosporiacear.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 190: sect. Chroolepi?
= Helminthosporium Pers.

Helmosporium Gray vid. *Helmisporium.*

Helmyton Rafin. 1810. Caratt. p. 90: g. Algar. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 497.

Helobia Rchb. 1841. Nomencl. p. 211. n. 8004. 1: sect. Helodeae.
Synon. Elodea Spach.

Helobiae Rchb. 1828. Consp. p. 45; 1830. Fl. exc. p. 3. 11: formatio Rhizo-Acroblastar. Fam.: Typhaceae, Alismaceae, Hydrocharideae.
Bartl. 1830. Ord. p. 70: class. (17) Monocotyledoneor. Ordines: Najadeae, Podostemeae, Alismaceae, Butomeae. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 363. 442 (271). Ord.: Najadeae, Alismaceae, Butomeae, Hydrocharideae.
Endl. 1837. Gen. p. 126; 1841. Ench. p. 71: class. Amphibryor. Ord.: Alismaceae, Butomaceae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 141: subordo Rhizocoleophytor. Fam.: Pistiaceae, Alismaceae, Hydrocharideae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 33. Fam.: Potamogetoneae, Alismaceae, Hydrocharideae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 197: ordo (52) Eleutherogynar. Fam.: Butomeae, Alismaceae, Juncagineae, Najadeae, Lemnaceae.

Helobieae Spach 1846. Hist. vég. phan. XII. p. 6: class. (44) Monocotyledoneor. Familiae Helobiarum Bartl.

Helocarpus Dumort. vid. *Heliocarpus Linn.*

Helocirsium Rchb. 1844. Fl. saxon. p. 179: sect. Cirsii. (C. palustre, Chailletii.)
Synon. Pterocaulon Gaud.

Helodea Rchb. vid. *Elodea Pursh.*

Helodeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 211: sect. Vismiear. Gen.: Helodea.

Helogyne Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 449: nov. g. Eupatoriacear. (H. apaloidea.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 38. n. 2267: g. Ageratear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Walp. 1843. Rep. II. p. 548. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.

Helogyne Benth. 1844. Bot. voy. Sulph. p. 20. t. 14.
= Hofmeisteria Walp.

Helonias Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 12; 1753. Sp. I. p. 342; 1759. Syst. ed. X. p. 992. n. 416; 1762. Sp. ed. II. p. 485; 1764. Gen. ed. VI. p. 180. n. 458; 1767. Syst. ed. XII. p. 257. n. 453: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 287; 1784. Syst. p. 349. — Reich. 1778. Gen. p. 182. n. 493. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 241. n. 622. — Gmel. 1791. Syst. p. 589. — Pers. 1797. Syst. p. 371; 1805. Ench. I. p. 398. n 888. — Cram. 1803. Disp. p. 80. — Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 211. (Sejungitur Xerophyllum.) — Elliott 1817. Sketch I. p. 421. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 234.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 47.
Adans. 1763. Fam. II. p. 50: g. Cepar.
Linn. 176h. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283.

Helonias Linn. cont.
Gled. 1764. Syst. p. 74. n. 310: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 358: g. Hexapetalar. incompletar.
Neck. 1790. El. III. p. 376. n. 1814: g. Gonoophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 133: g. Melanthior.
Hedw. 1806. Gen. p. 253. n. 1024: g. Juncinear.
Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 29: g. Liliacear.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 267: g. Colchicear. — Par. Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 16. — Kunth 1822. Syn. I. p. 275.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 191; 1825. Syst. II. p. 114. n. 1362: g. Juncear.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 503: g. Colchicacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 52.
Link 1821. En. I. p. 348: g. Melanthacear. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. CI. 1561. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 288. n. 1489. — D. Don 1832. Edinb. n. phil. journ. XIII. p. 234. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1208.
Agdh. 1823. Aphor. p. 167: g. Veratrear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p 130. — Endl. 1837. Gen. n 1066. p. 135; 1841. Spl. I. p. 1356; 1841. Ench. p. 79. Sect. (1841): Euhelonias, Chamaelirium. — Meisn. 1842. Gen. p. 402 (309). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 17. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 240. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199.
Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1294: g. Heloniear. Sect.: Chamaelirium (sphalm. *Chamaelivium*), Helonias. — Par. Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 3; 1843. Enum. IV. p. 174. (restrict.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Veratrinear.
A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York IV. p. 130: g. Melanthear. Subgen.: vera, Chamaelirium. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1695. Sect. ut 1828.
Synon. Abalum Adans.

Helonias Willd. 1799. Spec. II. p. 273. n. 708; 1809. Enum. p. 402: g. Hexandr. Trigyn.
= Tofieldia Huds.

Helonias Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1294 *b;* 1841. Nom. p. 47. n. 1695. 1: sect. Heloniadis.
A. Gray 1837. Ann. Lyc. N. York IV. p. 130: subg. Heloniadis.
= Euhelonias Endl.

Helonias Sims .... Bot. Mag. t. 985. 1680. 1703.
= Zigadenus Rich.

Helonieae Rchb. 1828. Consp. p. 63: subdiv. Melanthear. Gen.: Nolina, Tofieldia, Helonias, Calochortus, Wurmbea, Anguillaria, Zigadenus, Burchardia, Ornithoglossum, Androcymbium, Erythrostictus, Melanthium, Kolbea, Pleea, Butomus.
Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 3; 1843. Enum. IV. p. 174: trib. Melanthacear. Gen.: Helonias, Chamaelirium, Xerophyllum.

Helophanes Rach vid. *Heliophanes Salisb.*

Helophyllum Hook. f. 1845. Antarct. voy. p. 38; 1853. Fl. N.-Zeal. I. p. 155: sect. Forsterae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 371.

Helophytum*) Ecklon & Zeyh. 1836. Enum. pl. Afr. austr. II. p. 288: nov. g. Crassulacear. (Crassula natans Thunb.)

Meisn. 1838. Gen. p. 134 (98): subg. Tillaeae.

Endl. 1839. Gen. n. 4607 c. p. 809; 1841. Ench. p. 405: sect. Tillaeae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 252.

Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6174: g. Crassulear.

Helopodia Achar. 1810. Lich. univ. p. 567; 1814. Syn. Lich. p. 273: sect. Cenomyces. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 15. n. 521. 4.

Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 414 *d*: sect. Cladoniae.

= Helopodium Achar.

Helopodium Achar. 1798. Lich. suec. p. 198: g. Lichenum. (foliaceor.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 506 et Dufour in Ann. gén. sc. phys. VIII. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 341.

Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXVI: sect. Baeomycetis.

Michx. 1803. Fl. am. II. p. 329: g. Lichenacear.

Mart. 1817. Erlang. p. 273 (*Helopodes*): sect. Capitulariae.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 416 (*Helopodia* p. 409): g. Cenomycidear.

= Cenomyce Achar.

Helopus Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 103. t. 4: nov. g. Triandr. Digyn. (Milium ramosum Retz.)

Link 1827. Hort. I. p. 269: g. Paspalacear. — Par. Rchb. 1828. Consp p. 49. n. 856.

Nees 1829. Agrost. Bras. p. 16; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 135: g. Panicear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Steud. 1854. Glum. I. p. 99.

Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 134: g. Graminear.

Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835.) p. 129: sect. Paspali.

Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 434: g. Eupaspalear.

= Eriochloa Kunth?

Helosciа Dumort. vid. *seq.*

Helosciadium**) Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 125; 1836. Syn. p. 283. Ed. II. p. 312: nov. g. Amminear. (Sium nodiflorum L.) — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 398 (*Heliosciadium*). — Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3735; 1832. Fl. exc. p. 475; 1837. Hdb. p. 219 (genuinar.); 1841. Nom. p. 139. n. 5381 (sect.: Helosciadium, Cyclospermum, Trachysciadium).

Helosciadium Koch cont.

— Link 1829. Hdb. I. p. 333. — DC. 1830. Pr. IV. p. 104. Sect.: Mauchartia, Cyclospermum, Trachysciadium. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 260. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 281. Sect. ut DC. — Tausch 1834. Flora I. p. 355. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 367. — Meisn. 1838. Gen. p. 142 (103). — Kunth 1838. Berol. I. p. 263. — Endl. 1839. Gen. n. 4397. p. 769; 1841. Ench. p. 378. Sect. ut DC. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 941. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 138 (*Heliosciadium*). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 606. — Brongn. 1843. En. genr. p. 111. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 244. — Parlat. . . . . in Webb Canar. II. p. 148. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 735. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 67.

Mert. & Koch 1826. Deutschl. Fl. II. p. 28. 443: g. Umbelliferar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 236. — Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 294.

Gaud. 1828. Helv. II. p. 430: sect. Sii.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34 (*Heloscia*): g. Pimpinellear.

Griseb. 1843. Rumel. I. p. 341: g. Pleurospermar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.

Synon. Sium Adans.

Heloseris Rchb. 1828 in Mössl. Handb. II. p. 1497; 1831. Fl. exc. p. 241: sect. Cinerariae. (C. palustris L.)

DC. 1837. Pr. VI. p. 362 (*Heloserides*): sect. 10 Senecionis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2811 *l. k.* p. 459; 1841. Ench. p. 244.

Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3366. 2; 1844. Fl. sax. p. 146: sect. Tephroseridis.

Synon. Eriopappus Dumort.

Helosidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 90: trib. Balanophoracear. Gen. Helosiear. Endl. 1842.

Helosieae Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 11: trib. Balanophorear. Gen.: Helosis, Scybalium. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 74; 1841. Ench. p. 52. Gen.: Cynopsole, Scybalium, Helosis, Langsdorfia. Accedit 1842 (Spl. II. p. 6) Rhopalocnemis. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 548. Gen. ut Endl. 1836. — Meisn. 1842. Gen. p. 366 (274). Gen. ead.

Rchb. 1837. Hdb. p. 164; 1841. Nom. p. 60: div. Balanophorear. Gen. ut Endl.

Helosis Rich. 1822. Mém. Mus. VIII. p. 416. 430: nov. g. Balanophorear. (H. guyannensis.) — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 765. n. 3054; 1831. Gen. II. p. 680. n. 3429. — Rchb. 1828. Consp. p. 78. n. 1682. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66. — Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 184. t. 299. 300. — Bartl. 1830. Ord. p. 80.

Agdh. 1825. Aphor. p. 203: g. Cynomoriear.

*) ἕλος, stagnum.

**) ἕλος, palus; σκιάδιον, umbella.

Helosis Rich. cont.
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 11: g. Helosiear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 721. p. 74; 1841. Ench. p. 52. — Rchb. 1837. Hdb. p. 164; 1841. Nom. p. 60. n. 2324. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 548. — Meisn. 1842. Gen. p. 367 (275).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 90: g. Helosidar.
Synon. Caldasia Mutis; Lathraeophila Leandr.

Helospora Jack 1823. Linn. Trans. XIV. p. 127: nov. g. Rubiacear. (H. flavescens.) *Cf.* Isis 1825. p. 78. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 416. n. 417; 1830. Gen. I. p. 95. n. 476. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 487.
Schult. 1827. Mant. III. p. 12. 149: g. Tetrandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2017: g. Coffeacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 210: g. Hedyotidear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 391: g. Gardeniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 504. — Meisn. 1838. Gen. p. 163 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2955. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3298. p. 560; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 233.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Helothrix Nees 1841. Ann. nat. hist. VI. p. 45: nov. g. Acrolepidear. (H. pusilla.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 10. n. $999/_1$: g. Scirpear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 371. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — Steud. 1855. Glum. II. p. 105.

Helotiei Rchb. 1841. Nomencl. gen. p. 11: subdiv. Tremellinor. Gen.: Laschia, Helotium. — Simil. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 314. Gen.: Guepinia, Cyphella, Midotis, Helotium. (*Synon. Pileolares Endl.*)

Helotioides Endl. 1836. Gen. n. 430 *A c α.* p. 37; 1841. Ench. p. 21: subsect. Calyculi. (Octosporae sp. Hedw.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 1. *c. a.*

Helotium*) Tode 1790. Fung. meckl. I. p. 22: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 507 et Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 354 adnot. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1442. — Link 1809. Berl. Mag. III. p. 40. (alt. seriei.)
Pers. 1797. Tent. p. 32: g. Hymenothecii.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 82: g. Mitracear., p. 83 Acetabulear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 92: g. Pileolarium. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 294. — Endl. 1836. Gen n. 411 p. 35; 1841. Ench. p. 20.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 488. n. 3476: g. Mitrator.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 777. n. 4006: g. Mucorum.

*) ἧλος, clavus.

Helotium Tode cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 426: g. Helotieor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 316.
Corda 1842. Mycol. p. 194: g. Auricularinor.
Synon. Perona Pers.

Helotium Pers. 1801. Syn. p. XIX. 677; 1822. Mycol. eur. I. p. 343: g. Helvelloideor.
DC. 1805. Franç. II. p. 74: g. Gymnocarpor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 52: g. Dermatothecior.
Nees 1816. Syst. p. 174; 1817. Ueberbl. p. 45: g. Clavariar. — Par. Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 18.
Fries 1818. Obs. mycol. II. p. 310.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 660: g. Geoglossidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 86: g. Clavator.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 155: subg. Pezizae.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 573: g. Pezizear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73. — Math. 1853. Belg. II. p. 297.
Leman 1826. Dict. v. 39. p. 376: g. Pezizoidear.
Weinm. 1828. Syll. Ratisb. II. p. 166: sect. Pezizae? — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 343.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 94: g. Orthomycetum. (Nees f. 161.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 354: g. Helvellaceor. Sect.: Pelastea, Calycella.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Pezizeor.
Conf. Sarea Fries.

Helvela Roth vid. *seq.*

Helvella Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1649; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 725. n. 1214: g. Fungor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 20. p. 510. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 822; 1784. Syst. p. 979. — Reich. 1778. Gen. p. 563. n. 1330. — Roth 1788. Fl. Germ. I. p. 541 (*Helvela*). — Juss. 1789. Gen. p. 4 — Lour. 1790. Coch. II. p. 694. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 769. n. 1679. — Gmel. 1791. Syst. p. 1449. — Gis. 1792. Prael. p. 618. — Pers. 1797. Syst. p. 1017. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 21. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 26. 367. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 10. — Link 1809. Berl. Mag. III. p. 40 (alter. seriei).
Gled. 1764. Syst. p. 301. n. 1212: g. Fungosar. superficialium.
Afzel. 1783. Vet. Ac. n. Handl. p. 299.
Pers. 1796. Obs. mycol. I. p. 71.
Pers. 1799. Tent. p. 36: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XVIII. 614; 1822. Mycol. eur. I. p. 209: g. Helvelloideor. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 381.
DC. 1805. Franç. II. p. 93; 1815. V. p. 28: g. Gymnocarpor.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 52: g. Dermatothecior.

Helvella Linn. cont.
Nees 1816. Syst. p. 175; 1817. Ueberbl. p. 15: g. Clavariar. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 401. (mitratar.) — Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 18.
Fries 1818. Obs. mycol. II. p. 301.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 662: g. Helvellidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 86: g. Clavator. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 976.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 69: g. Mitracear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 13; 1825. Pl. homon. p. 85; 1828. Elench. II. p. 2: g. Mitrator. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 489. n. 3477; 1831. Gen. II. p. 764. n. 3907. — Rchb. 1828. Consp. p. 13. n 320. — Endl. 1836. Gen. n. 434. p. 38; 1841. Ench. p. 21. Sect.: Omphalomitra, Mitra. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 378.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 574: g. Helvellear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 298.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: g. Helvellaceor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 346. Subg.: Biverpa. — Bonord. 1851. Hdb. p. 209. — Bail 1858. Syst. p. 68. t. 21.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Helvellacear. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 38. 80; 1842. Mycol. p. 158.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 94: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833 Fl. crypt. II. p. 553: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 452: g. Morchellinor genuinor. Sect. ut Endl.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Elvellaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Helvelleor.
Synon. Elvela Linn.; Pezica Adans.?

Helvellaceae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 570: div. Fungor. Subdivis.: Pezizeae, Helvelleae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72. 74: fam. Fungariear. Gen.: Morchella, Helvella, Verpa, Vibrissea, Rhizina, Leotia.
Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 36; 1839. III. p. 37: fam. Hymenomycetum. Gen: Spathularia, Leotia.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 38; 1842. Mycol. p. XCVIII. 158: fam. Ascophoror. Gen.: Verpa, Helvella, Morchella.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: vid. *Ascomycetes.*
Math. 1852. Belg. II. p. 267: subtrib. Funginear. Sect. ut Brongn.

Helvellacei Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: div. Sarcomycetum. Gen.: Ditiola, Leotia, Vibrissea, Spatularia, Mitrula, Helvella, Verpa, Morchella.
Endl. 1836. Gen. p. 36; 1841. Ench. p. 20: subordo Hymenomycetum. Trib.: Cupulati, Claviculares, Cupulati (Fries pl. homon.), Mitrati. (*Synon. Elvellaceae Fries 1823.*)
Rchb. 1841. Nom. p. 11: subdiv. Morchellinor. Sect.: Cupulati, Claviculares, Pezizei.

Helvellacei Link cont.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 331: sect. Hymeninor. Subsect. eaed. et Mitrati.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 345. 346: ordo Discomycetum. Gen.: Morchella, Gyromitra, Helvella, Verpa, Mitrula, Spathulea, Geoglossum; Rhizina; Cidaris, Cudonia, Discina, Peziza, Helotium, Chlorosplenium, Dübenia, Pilopeza, Orbilia. Solenia?
Bonord. 1851. Hdb. p. 207: fam. Discomycetum. Gen.: Leotia, Mitrula, Vibrissea, Cucullaria, Verpa, Helvella, Morchella. — Par. Bail 1858. Syst. p. 66. Gen.: Spathularia, Mitrula, Sarea, Vibrissea, Leotia, Verpa, Helvella, Morchella.

Helvelleae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 573: subdiv. Helvellacear. Gen.: Vibrissea, Leotia, Verpa, Helvella, Morchella. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 298. Gen. ead. (excepto primo.)

Helvellei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: sect. Mitrator. Gen. unicum: Helvella.

Helvellideae Gray 1821. Arrang. brit. pl. I. p. 598. 661: div. Hymenothecear. Gen.: Morchella, Helvella, Spathularia.

Helvelloideae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. Hymenosporangiar. Sect.: Clavariacea, Pezizea, Helvellariea.

Helvelloidei Pers. 1801. Syn. Fung. p. XVIII: div. Hymenothecior. Gen.: Spathularia, Leotia, Helvella, Morchella, Tremella, Peziza, Ascobolus, Helotium, Stilbum, Aegerita.
Rebent. 1804. Neom. p. 381: subdiv. Dermatothecior.
Leman 1817. Dict. v. 8. p. 105: subsect. Hymenothecar. Gen.: Helotium, Spermodermia, Ascobolus, Peziza, Tremella, Helvella, Leotia, Spathularia.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 160: div. Sarcomycor. Gen.: Clavaria, Phacorhiza, Geoglossum, Spathularia, Leotia, Verpa, Morchella, Helvella, Rhizina, Peziza, Triblidium, Solenia, Stictis, Ascobolus, Helotium, Stilbum.

Helvellopsis Endl. 1836. Gen. n. 430 *Cm.* p. 38; 1841. Ench. p. 21: sect. Aleuriae. Subsect.: Crucibulum, Cochlidium, Acetabularium. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 3 *d.* Subsect. eaed. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 372.
Synon. Scodellina Gray.

Helvingia Adans. 1763. Fam. II. p. 345: g. Pistaciar.
Laetia Löfl.

Helwingia*) Willd. 1805. Spec. IV. p. 716. n. 1764: nov. g. Dioec. Triandr.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 515: g. Osyridear.
Sieb. & Zucc. 1835. Fl. jap. I. p. 164. t. 86.

*) Dicat. G. Andr. Helwing, botanico borussico.

Helwingia Willd. cont.
Morr. & Decne 1836. Obs. pl. jap. p. 5; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 65: g. Helwingiacear. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 328. n 2090; 1841. Ench. p. 404. n. $4606/_3$; 1850. Spl. V. p. 20. — Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 296.
Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5557: g. Helwingiear. — Par. Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 323.

Helwingiaceae Morren & Decaisne 1836. Bull. Ac. Brux. Nr. 5; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 69: nova fam. Hamamelideis et Araliaceis aff. Gen. unicum: Helwingia.
Endl. 1838. Gen. p. 328: fam. Santalaceis aff. Gen. id.
Endl. 1841. Ench. p. 403: fam. Discanthar. Gen. id.
Meisn. 1841. Gen. p. 328 (240): ordo Daphnoidear. Gen. id.
Lindl. 1847. Veg kd. p. 296: ordo Garryalium. Gen. id.
Hook. 1850. Kew gard. misc. II. p. 12: Araliaceis adjungit.

Helwingieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 143: subdiv. Araliacear. Gen.: Helwingia.
Gardn. 1849 in Hook. Kew gard. misc. I. p. 323: subtrib. Hamamelear. Gen. id.

Helxine*) Linn. 1737. Gen. p. 116. n. 330; 1737. Fl. lapp. p. 116. Ed. Smith p. 123; 1737. Cliff. p 250; 1740. Syst. p. 22; 1742. Gen. ed. II. p. 170. n. 392; 1745. Fl. suec. p. 117; 1748. Ups. p. 96: g. Octandr. Trigyn. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 20. p. 516.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123: g. Thalamostemonis.
Linn. 1751 Phil. bot. p. 30: g. Vaginalium.
Linn. 1753. Sp. I. p. 363; 1762. Sp. ed. II. p. 520: sect. Polygoni. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 441. — MBieb. 1808. Taur. cauc. I. p. 305. — Link 1821. En. I. p. 386; 1829. Hdb. I. p. 298. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 652. — Mert. & Koch 1831. Deutschl. Fl. III. p. 61. — Endl. 1833. Norf. p. 42. — Koch 1837. Syn. p. 619. Ed. II. p. 713. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 54.
= Tiniaria Meisn.

Helxine Requien 1825. Ann. sc. nat. V. p. 381: nov. g. Parietariae aff. *Cf.* Linnaea I. p. 150.
Rchb. 1828. Consp. p. 84. n. 1807 *a*: sect. Parietariae.
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 210 (Flora 1855. p. 526); 1857. ibid. VII. p. 393: g. Parietariear.
Synon. Soleirolia Gaudich.

Helycomyces Leman vid. *Helicomyces Link.*

*) Nomen ex Dioscoride.

Helygia Blume 1823. Catal. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 131; 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1043: nov. g. Apocynear., Nerio aff. — Par. Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 123 (*Helygma*).
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 69 (recte). p. 79 (*Heylygia*): g. Echitiear.
— Heligme Blum.

Helygma Hassk. vid. *praeced.*

Hemarthria*) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 207. Ed. Nees p. 63: nov. g. Graminear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 521. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 58. t. 15.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 583 (Verm. bot. Schr. I. p. 115): g. Panicear.
Trin. 1820. Fund. p. 180: g. Graminum.
Rchb. 1828. Consp. p. 47. n. 821: g. Ophiurear.
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear.
Kunth 1830. Gram. p. 153; 1833. Agrost. p. 464: g. Rottbölliacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 925. p. 105; 1841. Ench. p. 60. — Meisn. 1843. Gen. p. 427 (327). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 166. — Steud. 1854. Glum. I. p. 358. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 406.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 247: g. Andropogineor.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1362: g. Rottbölliear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Rottböllear.
Synon. Lodicularia Palis.; Sanguinella Gleich. (Steud.)

Hemecyclia Wight vid. *Hemicyclia.*

Hemenaea Scopoli vid. *Hymenaea Linn.*

Hemerocalis**) Murr. 1784 vid. *Hemerocallis Linn.*

Hemerocalleae Rchb. 1837. Handb. p. 154: subdiv. Hemerocallidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: trib. Liliacear. Gen.: Hemerocallis, Funkia, Agapanthus, Polianthes, Blandfordia, Veltheimia, Tritoma, Phormium, Sanseviera.

Hemerocallideae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 295. Ed. Nees p. 151: ordo Monocotyledonum. (Gen.: Blandfordia.) — Par. Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 334. Nova gen.: Niobe, Bryocles.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: fam. Thalamauliae.
Agdh. 1823. Aphor. p. 166; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 585: trib. Coronariar. Gen.: Funkia, Hemerocallis, Blandfordia, Alströmeria.
Rchb. 1828. Consp. p. 65: subdiv. Anthericear. Gen.: Agapanthus, Cyrtanthus, Hemerocallis, Czackia, Funkia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: trib. Liliacear. Gen.: Hemerocallis, Libertia, Funckia, Blandfordia. — Par. Koch 1837. Syn. p. 721. Ed. II. p. 833. Gen.: He-

*) ἥμι (ἥμισυς), semi.
**) ἡμέρα, dies.

Hemerocallideae R. Brown cont. merocallis, Endymion, Muscari. — Brongn. 1843. En. genr. p. 20. Gen. ex Meisn.
Bartl. 1830. Ord. p. 50: div. Asphodelear. Gen.: Liriope, Aletris, Veltheimia, Sanseviera, Polianthes, Agapanthus, Hemerocallis, Czackia, Funckia; Blandfordia?
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 115: subdiv. Asphodelear.
Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302): trib. Asphodelear. Gen.: Phormium, Polianthes, Hemerocallis, Funkia, Blandfordia, Agapanthus, Bessera, Leucocoryne, Brodiaea, Triteleia, Calliprora, Milla, Tristagma, Hesperoscordum.

Hemerocallideae Rchb. 1837. Handb. p. 154: div. Coronariar. Subdivis.: Pontedereae, Polliantheae, Hemerocalleae.

Hemerocallis*) Linn. 1737. Gen. p. 98. n. 279; 1737. Cliff. p. 128; 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 88; 1753. Sp. I. p. 324; 1759. Syst. ed. X. p. 986. n. 391; 1762. Sp. ed. II. p. 462; 1764. Gen. ed. VI. p. 172. n. 433; 1767. Syst. ed. XII. p. 249. n. 429: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 253. — Murr. 1774. Syst. p. 279; 1784. Syst. p. 339 (*Hemerocalis*). — Reich. 1778. Gen. p. 174. n. 167. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 228. n. 585. — Lour. 1790. Coch. I. p. 205. — Curt. 1790. Bot. Mag. I. t. 19. — Gmel. 1791. Syst. p. 565. — Pers. 1797. Syst. p. 361; 1805. Ench. I. p. 381. n. 838. — Willd. 1799. Sp. II. p. 197. n. 662; 1809. En. p. 388. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 219. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 467. 537. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 168.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 290: g. Liliacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 86. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 234; 1825. Syst. II. p. 65. n. 1214; 1830. Gen. I. p. 257. n. 1338. — Link 1821. En. I. p. 330. — Dietr. 1840. II. p. 1041. 1097.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 37: g. Lilior.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 222. n. 923: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 634.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Narcissor. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 57. — Juss. 1789. Gen. p. 54.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283. — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 39.
Hill 1769. Ht. kew. p. 334: g. Monopetalar. incompletar.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 35: g. Lilia et Antherica conjungens.
Neck. 1790. El. III. p. 184. n. 1541: g. Gonoophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 14. t. 83.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 171: g. Aloidear.
Batsch 1802. Tab. p. 146: g. Lirior.

Hemerocallis Linn. cont.
St Hil. 1805. Expos. I. p. 135: g. Amaryllidear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 234. n. 949.
DC. 1805. Franç. III. p. 205: g. Asphodelor.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 295. Ed. Nees p. 151: g. Hemerocallidear. — Par. Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 334. — Agdh. 1823. Aphor. p. 166. — D. Don 1826. Nepal. p. 53. („Genus in duo separandum.") — Rchb. 1828. Consp. p. 66. n. 1374; 1830. Fl. exc. p. 115. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXI. 422. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. — Bartl. 1830. Ord. p. 50. — Koch 1837. Syn. p. 721. Ed. II. p. 833. — Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302). — Brongn. 1843. En. genr. p. 20.
Lois. 1821. Dict. v. 20. p. 542: g. Asphodelear.
Juss. 1825. Dict. v. 34. p. 181: g. Narcissear.
Link 1829. Hdb. I. p. 172: g. Hyacinthinar.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Endl. 1837. Gen. n. 1143. p. 147; 1841. Ench. p. 84: g. Anthericear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1797. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 587. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 374. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 527. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 194. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 220.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Hemerocallear.
Synon. Lilio-Asphodelus Tourn.; Liliago Caesalp.

Hemesotria*) Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 88: nov. g. Valerianeae. (Valer. chaerophylla.)
= Astrephia DC.

Hemestheum Newman 1851. Syn. brit. ferns p. 21: nov. g. Filicum. (Aspidium Oreopteris, etc.)

Hemiachyris**) DC. 1836. Prodr. V. p. 313: nov. g. Achyridear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2362. p. 383; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 187 (127). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 194: sect. Gutierreziae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 989.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Solidaginear.
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3317: g. Grindeliear.

Hemiadelphis Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 80; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 80: nov. g. Hygrophilear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4234. — Endl. 1839. Gen. n. 4037. p. 698; 1841. Ench. p. 343. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Meisn. 1840. Gen.

*) Nomen ex Theophrasto, Dioscoride, etc.

*) ἥμι, semi; ἐσώτερος, internus.

**) Nomen alludit ad achaenia alia calva, alia squamellus gerentia.

Hemiadelphis Nees cont. p. 296 (204). — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 775.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 66: g. Acanthacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Hygrophilidar.

Hemiaërva „Fenzl in Kotschy It. nubic. p. 372" Moq-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 303: sect. Aërvae. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1039.

Hemiandra R. Brown 1810. Prodr. I. p. 502. Ed. Nees p. 358: nov. g. Labiatar. (H. pungens.) — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 545 — Spreng. 1825. Syst. II. p. 705. n. 2069; 1831. Gen. II. p. 468. n. 2305.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2807: g. Salviear.
Bartl. 1830. Ord. p. 182: g. Westringiear.
Benth. 1834. Labiat. p. 456; 1848 in DC. Pr. XII. p. 564: g. Prostantherear. — Par. G. Don 1837. Gen syst. IV. p. 800. — Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 107. n. 4173. — Endl. 1838. Gen. n. 3631. p. 621; 1841. Ench. p. 307. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 165. — Meisn. 1840. Gen. p. 286 (194). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 354. 428. — Bartl. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 354. — Walp. 1845. Rep. III. p. 769. 985. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661.

Hemianthus Nuttall 1817. Journ. Ac. Philad. I. p. 119: nov. g. Anagallidear. (H. micranthemoides.) *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 163. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 127. n. 3324.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 42: g. Diandr. Monogyn. — Par. Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 215. 229.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 545: g. Utricularinear. — Par. Juss. 1828. Dict. v. 56. p. 409.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 17; 1830. Gen. I. p. 26. n. 109: g. Primulear.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3134: g. Linderniacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 166: g. Primulacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 100.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7: g. Scrophularinear. minus notum.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111: g. Gratiolear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 538.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 423; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Linderniear.
= Micranthemum Rich.?

Hemiarcyria „Fries syst. III. p. 183" Endl. 1836. Gen. n. 308 *b.* p. 26; 1841. Ench. p. 16: sect. Trichiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 352. 2. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 457.

Hemiaulus Ehrenb. 1844. Ber. Ak. Berl. p. 199. 203: nov. g. Naviculaceor., Biddulphiae simile.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 139. n. 95: g. Biddulphiear.

Hemibromus Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 317: nov. g. Festucacear.

Hemicardion Fée 1852. Gen. Fil. p. 282 (p. 277 (*Hemicardium*): nov. g. Cyclodiear. (Aspidium semicordatum, etc.)
Cyclopeltis J. Smith.

Hemicardium Fée vid. *praeced.*

Hemicarpha Nees 1834. Linnaea IX. p. 287; 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 263; 1843 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 61: nov. g. Hypolytrear. (Scirpus hemisphaericus Roth?) — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 268. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — Steud. 1855. Glum. II. p. 130. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 382.
Endl. 1837. Gen. n. 987 *a.* p. 116; 1841. Ench. p. 64: sect. Lipocarphae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1480. 1.

Hemicarpideae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 128: series Ulvacear. Divis.: Lemanieae, Ectocarpeae, Batrachospermeae.

Hemicarpurus Nees 1839. Del. sem. h. Vratisl. n. 1 (Linnaea 1840. Litt. p. 167): nov. g. Spathicarpear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 40.
Pinellia Tenore.

Hemicarpus F. Müll. 1857. Papers roy. soc. Tasman. (Bot. Zeit. 1859. p. 56): sect. Didisci.
Synon. Anisocarpaea Turczan.

Hemichaena Benth. 1841. Pl. Hartweg. p. 78: nov. g. Gratiolear. (H. fruticosa.) *Cf.* Flora 1843. p. 132. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 61. n. 3936/$_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 368. — Walp. 1845. Rep. III. p. 452. 964.
Leucocarpus Don.

Hemichlaena Schrad. 1821. Gött. gel. Anz. p. 2066; 1832. Comm. Gott. VII. p. 140. t. 3. f. 1: nov. g. Cyperear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1092. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 283. — Steud. 1855. Glum. II. p. 1.
Schult. 1824. Mant. II. p. 3. 94: g. Triandr. Monogyn.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Cyperinar.
Endl. 1837. Gen. n. 993 *a.* p. p. 117; 1841. Ench. p. 64: sect. Hemichlaenae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1487. 1.
Kunth. 1837. Cyper. p. 330: g. Rhynchosporear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 412 (315). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 146.
Dietr. 1847. Syn. I. p. 129. 227: g. Cyperacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Hemichlaenidar.

Hemichlaena Endl. 1837. Gen. n. 993. p. 117; 1841. Ench. p. 64: g. dilatatum Hemichlaenear. Sect.: Hemichlaena, Acrolepis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1487. Sect. eaed.

Hemichlaeneae „Fenzl mss." Endl. 1837. Gen. p. 117; 1841. Ench. p. 64: subtrib. Fuirenear. Gen.: Hemichlaena, Pleurachne. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 41. Gen ead.

Hemichlaenidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 119: trib. Fuirenear. Gen.: Hemichlaena, Acrolepis, Pleurachne.

Hemichoriste Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 107; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 367: nov. g. Gendarussear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4272. — Endl. 1839. Gen. n. 4080. p. 704; 1841. Ench. p. 343. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (205).
Dietr. 1843. Syn. III. p. 370. 595: g. Echmatacanthor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Justiciadar.

Hemichroa R. Brown 1810. Prodr. I. p. 409. Ed. Nees p. 265: nov. g. Chenopodear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 215. — Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4337. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 278.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLVII. 568. n. 1048: g. Atripliceur. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 546.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Salsolear.
Bartl. 1830. Ord. p. 297: g. Chenopodiear.
Moq.-Tand. 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 41; 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 334: g. Polycnemear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1961. p. 302; 1841. Ench. p. 185. — Meisn. 1841. Gen. p. 319 (231). — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6412.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511: g. Achyranthear.

Hemichroma Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 532: sect. Castillejae.

Hemicicca Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 645: nov. g. Phyllanthidear. (H. japonica.)

Hemiclidia R. Brown 1830. Prodr. Suppl. I. p. 40 (Verm. bot. Schr. V. p. 116): nov. g. Proteacear. (Dryandra falcata R. Br.)
Endl. 1838. Gen. n. 2159. p. 343; 1841. Ench. p. 216; 1847. Spl. IV. p. 90: g. Banksiear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402. — Meisn. 1841. Gen. p. 333 (246); 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 601; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 481. — Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2390.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Banksidar.

Hemicouepia Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 212: sect. Couepiae.
Endl. 1842. Spl. II. p. 95. n. 6410 *b β*: subsect. Couepiae.

Hemicrambe Webb 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 248. t. 19: nov. g. Crucifear. (H. fruticulosa.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 215: g. Brassicear.

Hemicyclia (*Hemecyclia*) Wight & Arnott 1833. Edinb. n. phil. journ. XIV. p. 297: nov. g. Euphorbiacear., Gelonio aff. (H. sepiaria.)
Endl. 1840. Gen. n. 5816. p. 1115; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.

Hemicyclia Wight cont.
Meisn. 1841. Gen. p. 339 (252): g. Rottlerear.
Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7371: g. Ricinear. genuinar.
Thwait. 1855. Hook. Kew gard. misc. VII. p. 270: g. Buxear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 562: g. Cyclostemonear.
Synon. Astylis Wight; Periplexis Wall.

Hemicyphe Corda 1836 in Sturm Deutschl. Fl. Fung. III. p. 55. t. 28: nov. g. Fungor. (H. stilboidea.)
Endl. 1836. Gen. n. 258. p. 22; 1841. Ench. p. 15: g. Mucorinor.
Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 245: g. Mucoroideor.
= Hemiscyphe Corda.

Hemidematostemon Griseb. 1842 in Mart. Fl. Bras. Diosc. p. 46: sect. Dioscoreae.

Hemidemus Dumort. vid. *Hemidesmus R. Brown.*

Hemideptium „Presl" Endl. Gen. et Ench. in Ind.: sphalm. pro *Hemidictyum.*

Hemidesmeae Rchb. 1837. Handb. p. 208; 1841. Nomencl. p. 131: subdiv. Periplocear. Gen.: Hemidesmus.

Hemidesmus R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 56 (Verm. bot. Schr. II. p. 394): nov. g. Periplocear. (Periploca indica.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 131. n. 3456. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26 (*Hemidemus*). — Bartl. 1830. Ord. p. 203. — Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 62. — Endl. 1838. Gen. n. 3438. p. 588; 1841. Ench. p. 298. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 542. — Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212; 1844 in DC. Pr. VIII. p. 494. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 465.
Schult. 1820. Syst. VI. p. XIII. 126: g. Asclepiadear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 836. n. 963.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 557: g. Apocynear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 208. n. 1059. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 883.
Rchb. 1837. Hdb. p. 208; 1841. Nom. p. 131. n. 5062: g. Hemidesmear.

Hemidictyon Fée vid. *seq.*

Hemidictyum Presl 1836. Pterid. p. 110: g. Aspleniariar. (Asplenium marginatum L.)
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 74: g. Asplenincear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 630 c. p. 1348 (err. *Hemidyctium*); 1841. Ench p. 36: sect. Asplenii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 1015. 3.
J. Smith 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 177: g. Asplenicar. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. — Fée 1852. Gen. Fil. p. 205 (*Hemidictyon*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.

Hemidyctium Endl. vid. *praeced.*

Hemigenia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 502. Ed. Nees p. 358: nov. g. Labiatar. (H. purpurea.) — Par. Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 548. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 712. n. 2076; 1831. Gen. II. p. 469. n. 2312.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2842: g. Nepetear.
Bartl. 1830. Ord. p. 182: g. Westringiear.
Benth. 1834. Labiat. p. 457; 1848 in DC. Pr. XII. p. 565: g. Prostanthererar. Sect. (1848): Homalochilus, Atelandra, Hemigenia. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4174. — Endl. 1838. Gen. n. 3632. p. 622; 1841. Ench. p. 307. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 165. — Meisn. 1840. Gen. p. 286 (194). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 354. 428. — Bartl. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 359. — Walp. 1845. Rep. III. p. 770. 985. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661.

Hemigraphis Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 722: nov g. Ruelliear. (Ruellia elegans Bot. Mag.) — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 784.

Hemigymnia Griff. 1843 in M'Clell. Calcutta journ. III. p. 363.
Walp. 1845. Rep. III. p. 99: g. Lantanear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664: g. Verbenacear.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 697: g. Viticear.

Hemigyne*) A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 90; 1844. Prodr. VIII. p. 111: sect. Badulae. (An genus distinctum?)

Hemigyrosa Blume 1850. Rumphia III. p. 165: nov. g. Cupaniear. (H. Perrottetii.)
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 212: g. Sapindear.

Hemiloba DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 534: sect. Gloxiniae.
= Sinningiae Nees pars.

Hemilobos Endl. 1839. Gen. n. 4115 *b.* p. 712; 1841. Ench. p. 346: sect. Jacarandae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4547. 2. — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 430 (*Hemilobus*).

Hemilobus Wittst. vid *praeced.*

Hemimerideae Benth. 1835. Bot. Regist. n. ser. VIII. Jun. (Scroph. rev. p. 1): trib. Scrophularinear. Gen.: Angelonia, Phylacanthus, Hemimeris; Nemesia. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 672; 1841. Ench. p. 338. Gen. ut Benth. 1836. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 266. Gen. ead. — Meisn. 1840. Gen. p. 305 (216). Gen. ead. et Callibrachoa, Anastrabe.
Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 13: trib. Scrophulariacear. Gen.: Thylacantha, Angelonia, Hemimeris, Diascia, Nemesia, Diclis.

Hemimerideae Benth. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 116: subsect. Linariear. Gen. ut Benth. 1836.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 248; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: trib. Antirrhinidear. Gen.: Alonsoa, Schistanthe, Angelonia, Hemimeris, Diascia, Colpias, Nemesia, Diclis. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 458. Gen. ead.

Hemimeris*) Linn. f. 1781. Suppl. p. 45. n. 1405: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Thunb. 1784. Nov. gen. IV. p. 74; 1800. Prodr. II. p. 105. 192. — Murr. 1784. Syst. p. 561. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 409. n. 1016. — Gmel. 1791. Syst. p. 939. — Pers. 1797. Syst. p. 598. — Willd. 1800. Sp. III. p. 282. n. 1154; 1809. En. p. 647.
Juss. 1789. Gen. p. 120: g. Scrophulariar.
Neck. 1790. El. I. p. 385. n. 600: g. Plasyrgophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 487: g. Personatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 192. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 277. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 406. (anomal.) — Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 548.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 157: g. Petalostemonis.
Smith 1802. Linn. Trans. VI. p. 96.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 21. t. 183.
Pers. 1807. Ench. II. p. 161. n. 1473: g. Antirrhinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3189; 1837. Hdb. p. 198.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 809. n. 2187; 1831. Gen. II. p. 490. n. 2414: g. Scrofularinar. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 548.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 218: g. Scrophularinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Scrophulariear.
Bartl. 1830. Ord. p. 170: g. Verbascear.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 1; 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 15; 1846 in DC. Pr. X. p. 255; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Hemimeridear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3886. p. 672; 1841. Ench. p. 338. — Meisn. 1840. Gen. p. 305 (217). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267. — Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4500. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 358. 484. — Walp. 1845. Rep. III. p. 179. 958.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 112: g. Calceolariear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 608. Sect.: Distemon, Tetrastemon.

Hemimeris HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 376: g. Scrophularinar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 131.
= Alonsoa Ruiz & Pav.

Heminéura Harvey 1847. Ner. austr. p. 116.
Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 691: g. Sphaerococcoidear. — Par. Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 240.
= Hypoglossi sp. Kütz.

---

*) Nomen ex eo, quod pars inferior pistilli tantum adest.

*) ἡμι s. ἥμισυ, dimidium; μερίς, pars.

Hemionitidastrum Fée 1852. Gen. Fil. p. 190: sect. Asplenii. (A. palmatum Lam.)

Hemionitideae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 261: subtrib. Polypodiacear. Gen.: Hemionitis, Gymnogramma, Anthrophium, Grammitis, Xyphopteris, Cochlidium.
Presl 1836. Pterid. p. 217: sect. Grammitacear. Gen.: Gymnogramme, Hemionitis.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 36. 163: trib. Cathetogyratar. Gen.: Trismeria, Botryogramme, Coniogramme, Nevrogramme, Callogramme, Syngramme, Dictyogramme, Hemionitis.

Hemionitis*) Tourn. 1700. Inst. p. 546. t. 322. 323: g. pl. class. XVI.
Linn. 1737. Cliff. p. 474; 1737. Coroll. p. 20. n. 990; 1740. Syst. p. 32; 1742. Gen. ed. II. p. 503. n. 944; 1751. Phil. bot p. 35; 1753. Sp. II. p. 1077; 1759. Syst. ed. X. p. 1322. n. 1040; 1763. Sp. ed. II. p. 1535; 1764. Ord. nat.; 1764. Gen. ed. VI. p. 560. n. 1176; 1767. Syst. ed. XII. p. 689: g. Filicum. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 134. — Adans. 1763. Fam. II. p. 20. — Murr. 1774. Syst. p. 783; 1784. Syst. p. 932. — Reich. 1778. Gen. p. 555. n. 1293. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 333. — Juss. 1789. Gen. p. 15. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 757. n. 1628. — Gmel. 1791. Syst. p. 1300. — Gis. 1792. Prael. p. 594. — Pers. 1797. Syst. p. 973. — Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 300. — Smith 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 99. (dorsiferar.) — Vent. 1799. Tabl. II. p. 64. — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 3. 16. (annulatar.); 1806. Syn. Fil. p. 20. (gyratar.) — St. Hil. 1805. Expos. I, p. 46. — Willd. 1809. En. p. 1067; 1810. Sp. V. p. 126. n. 1955. — Leman 1821. Dict. v. 20. p. 552. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 38. n. 3235; 1831. Gen. II. p. 720. n. 3627. (verar.) — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 216.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 121.
Gled. 1764. Syst. p. 290. n. 1177: g. Filicinar.
Scop. 1777. Intr. p. 63: g. Dorsiferar.
Neck. 1790. El. III. p. 317. n. 1723: g. Sphaerophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 262: g. Filicinor.
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 21: sect. Gymnopteridis.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 29: g. Gyrator.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 3: g. Polypodiacear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 68. — Agdh. 1822. Aphor. p. 116. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 68 — D. Don 1825. Nepal. p 13. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 311. — Bartl. 1830. Ord. p. 18. (nudar.) — Kunze 1834. Linnaea IX. p. 34. — Brongn. 1843. En. genr. p. 4.

Hemionitis Tourn. cont.
Link 1822. En. II. p. 456: g. Polypodear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 309: g. Hemionitidear. — Par. Fée 1852. Gen. Fil. p. 171.
Rchb. 1828. Consp. p. 39. n. 731: g. Gymnopteridum.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Presl 1836. Pterid. p. 221: sect. Hemionitidis.
Endl. 1836. Gen. n. 604. p. 59; 1841. Spl. I. p. 1345; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. — Par. J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 400; 1842. ibid. IV. p. 69. — Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 988.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 140: g. Grammariar.
Meisn. 1843. Gen. p. 430 (331): g. Grammitidear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 417: g. Neurosoror.

Hemionitis Presl 1836. Pterid. p. 220: g. dilatatum Hemionitidear. Sect.: Hemionitis, Antrophyum.

Hemipappus C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 340: nov. g. Chrysanthemear. (H. canus et isabellinus.)

Hemiphlebium Presl 1843. Hymenophyll. p. 117: nov. g. Didymoglossear. (Trichomanes pusillum Sw.)

Hemiphractae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 94: subordo Diatomacear. Tribus unica: Dictyocheae.

Hemiphragma Wallich 1822. Linn. Trans. XIII. p. 611; 1824. Tent. fl. Nepal. p. 17: nov. g. Scrofularinar. (H. heterophyllum.) *Cf.* Linnaea II. p. 536.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 767. n. 2140: g. Didynam. Angiosperm.
Schult. 1827. Mant. III. p. 5. 103: g. Tetrandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3070; 1841. Nom. p. 115. n. 4482: g. Veronicear. — Par. Benth. 1835. Scroph. ind. p. 47. — Endl. 1839. Gen. n. 3987. p. 689; 1841. Ench. p. 310. — Meisn. 1840. Gen. p. 306 (217). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 362. 535. — Walp. 1845. Rep. III. p. 375. 969.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 482. n. 2382: g. Verbenear. deseisc.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 5: g. Teediear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 555: g. Gratiolear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 199.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 429: g. Sibthorpiear.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Sibthorpear.

Hemiphragmium Koch 1836. Syn. p. 180. Ed. II. p. 200: sect. Phacae. (P. australis L.)

*) ἡμίονος, mulus.

Hemiphues Hook f. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 469: nov. g. Saniculear. (H. bellidioides etc.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 343. — Endl. 1850. Spl. V. p. 3. n. 4378/1 (*Hemiphyes*).

Hemiphyes Endl. vid. *praeced.*

Hemiphyta Rchb. 1832. Fl. exc. p. XLIX: sect. plantar. Classes: Fungi, Lichenes.

Hemipilia Lindl. 1835. Orchid. gen. p. 296: nov. g. Ophrydear. (Platanthera cordifolia Lindl.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1516. p. 209; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1858. — Meisn. 1842. Gen. p. 379 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Serapiadar.

Hemipodion Miquel 1844. Syst. Piperac. II. p. 490; 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 461; 1852 in Mart. Fl. Bras. fasc. XI. p. 52: sect. Artanthes. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 17. n. 1823/11 *f.*

Hemipogon Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 509: nov. g. Astephanar. (H. acerosus et setaceus.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Asclepiadear. verar.

Hemipteropus Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 76: grex Philodendri. An genus? (Ph. erythropus Mart. mss.)

Hemiptychus Ehrenb. 1848 . . . .
= Arachnodiscus Bail.

Hemipus Endl. 1837. Gen. n. 927 *a.* p. 105; 1841. Ench. p. 60: sect. Rottböllae.

Hemiragis Brid. 1827. Bryol. II. p. 334: sect. Leskiae. (Leskia striata Brid.) — Par. Endl. 1836. Gen. n. 572 *c.* p. 55; 1841. Ench. p. 32.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 950. 3: sect. Leskeae.
= Cuspidariae Müll. pars.

Hemiramma*) Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 190; 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 43: sect. Banisteriae.

Hemisacris Steud. 1829. Flora II. p. 490: nov. g. Graminear., inter Schismum et Triplasin Pal. intermedium.
= Schismus Palis.

Hemisandra Scheidweil. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 1. p. 22 (*cf.* Flora 1843. p. 514): nov. g. Acanthacear. (H. aurantiaca.)
= Aphelandra R. Brown.

Hemiscleria Lindl. 1853. Fol. Orchid. (19 Febr.): nov. g. Orchidear., Epidendro aff. (H. nutans.)

Hemiscyphe**) Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 17; 1842. Anl. Mycol. p. 67: g. Crateromycetum. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 120.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 134: g. Mucoroidear. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 138.

*) ῥάμμα, sutura.
**) σκύφος, poculum, scyphus.

Hemiscyphe Corda cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Mucorinor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Crateromyceor.
Conf. Hemicyphe Corda.

Hemiseuma*) Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 1040. 1071: sect. Ricciae. (R. natans L.) — Par. Endl. 1836. Gen. n. 454 *c.* p. 43; 1841. Ench. p. 25. — Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. 419; 1846. Syn. Hepat. p. 606. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 798. 1. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 3.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 57 (*Hemiseumata*): g. Ricciacear.
Synon. Ricciocarpus Corda; Salviniella Hüb.; Hemna Rafin.

Hemiseumata Lindl. vid. *praeced.*

Hemisinapsium Endl., Rchb. vid. *Hemisynapsium Brid.*

Hemisiphocampylus DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 397: sect. Siphocampyli. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3990. 1.

Hemispadon**) Endl. 1832. Flora II. p. 385 (Atakt. I. p. 3. t. 3): nov. g. Lotear., Cyamopsi proxime aff. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 240.
Meisn. 1837. Gen. p. 84 (60): g. Genistear., an p. 85 (60) Trifoliear.?
= Indigofera Linn.

Hemispadon Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 540: sect. Lamourouxiae.

Hemisphace Benth. 1833 in Hook. Bot. Misc. III. p. 374; 1833. Labiat. p. 310; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 357: sect. Salviae. — Par. Koch 1837. Syn. p. 556. Ed. II. p. 639. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 756. — Endl. 1838. Gen. n. 3597 *c.* p. 615; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4144. 4. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 113. — Walp. 1845. Rep. III. p. 678. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 368.
Synon. Covola Medic.

Hemisphaeria Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 241: g. Sphaerinor.

Hemistegia Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 354: nov. g. Hemiteliear. (Hemitelia obtusa Kaulf., etc.)
Fée 1852. Gen. Fil. p. 350: g. Hemitheliear., injunctis Microstegno et Actinophlebia auctum. Sect.: Euhemistegia, Actinophlebia.

Hemisteirus F. Müll. 1852. Linnaea XXV. p. 434: nov. g. Amarantacear., inter Psilotrichum et Ptilotum ponendum. (H. psilotrichodes.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 723.

*) ἡμισεύω, diminuo ad dimidium.
**) Nomen a staminibus alternis castratis.

Hemistemma „Juss. mss." Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 61 in Römer Collect. bot. p. 209: nov. g. Annonar.
DC. 1818. Syst. I. p. 412; 1824. Pr. I. p. 71: g. Dillenear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 72. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (5). — Endl. 1839. Gen. p. 842. n. 4757. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.
Poir. 1821. Dict. v. 20. p. 559: g. Dilleniacear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 610. n. 1973; 1830. Gen. I. p. 444. n. 2198: g. Dilleniear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 250. — Endl. 1841. Ench. p. 431. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 270.
Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4982: g. Hibbertiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 192. n. 7274: g. Hemistemonear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413.
Synon. Aglaja Nor.

Hemistemma Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2887: g. Nepetear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 183.
= Hemistoma Ehrenb.

Hemistemoneae Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nomencl. p. 192: subdiv. Dilleniear. Gen.: Hemistemma, Pleurandra.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413: trib. Dilleniacear. Gen ead.

Hemistephia Steud. vid. *Hemisteptia Bunge.*

Hemistephus „Drumm." Harvey 1855 in Hook Kew gard. misc. VII. p. 51: nov. g. Dilleniacear. (*H. linearis.*) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 38.

Hemisteptia*) „Bunge" Fisch. & Meyer 1835. Ind. sec. sem. h. Petrop. p. 38: nov. g. Carlinear. (Cirsium lyratum Bunge.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. V 1836. p. 294, Linnaea 1837. Litt. p. 106 et Steud. Nom. I. p. 749 (*Hemistephia*).
Cirsioides DC.?

Hemistoma „Ehrenb." Benth. 1829 in Wall. Pl. As. rar. I. p. 60.
Benth. 1834. Labiat. p. 605; 1848 in DC. Pr. XII. p. 523: sect. Leucadis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 846. — Endl. 1838. Gen. n. 3662 *a.* p. 628; 1841. Ench. p. 308. — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4103. 1. — Walp. 1845. Rep. III. p. 868.
Synon. Hemistemma Rchb., Bartl.

Hemistylis Walp., Miquel, Wedd. vid. *seq.*

Hemistylus Benth. 1843. Pl. Hartweg. II. p. 123; nov. g. Urticear. (*H. böhmerioides.*) *Cf.* Miq. 1853 in Mart. Fl. Bras. fasc. XII. p. 193 adnot. (*Hemistylis*).
Endl. 1847. Spl. IV. p. 37. n. 1884/$_{4}$: g. Urticacear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 648 (*Hemistylis*).
Wedd. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 208; 1857. ibid. VII. p. 391 (*Hemistylis*): g. Parietariear. *Cf.* Flora 1855. p. 525.

Hemisynapsium*) Brid. 1826. Bryol. I. p. 604: nov. g. Acrocarpor. peristomor. *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 51. p. 456.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIV: g. Bryoideor. (Pohlia bryoides Br.)
Rchb. 1828. Consp. p. 35. n. 640: g. Bryaceor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: g. Bryoidear.?
Endl. 1836. Gen. n. 540. p. 42 (*Hemisinapsium*); 1841. Ench. p. 31: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 918 (*Hemisinapsium*): g. Calyptrobryor.
= Bryi Dill. pars.

Hemitalia Dumort. vid. *seq.*

Hemitelia**) R. Brown 1810. Prodr. I. p. 158. Ed. Nees p. 14: nov. g. Polypodiacear. — Par. Kaulf. 1824. En. Fil. p. 252. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 246. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.) *Cf.* Gardn. 1842. Lond. journ. bot. I. p. 438.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262: g. Cyathear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67 (*Hemitalia*). — J. Smith 1842. Lond. journ. bot I. p. 662. — Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 28.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 125. n. 3278; 1831. Gen. II. p. 725. n. 3673: g. Filicum verar. — Par. Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 320.
Rchb. 1828. Consp. p. 37. n. 678: g. Cyatheacear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 651. p. 63; 1841. Spl. I. p. 1350; 1841. Ench. p. 37. Sect. (1841): Euhemitelia, Cnemidaria. — Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1046. Sect.: Hemitelia, Cnemidaria. — Meisn. 1843. Gen. p. 434 (335). — Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694 (*Hemithelia*). — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 110. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 228.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Rhizospermar.
Kunze 1834. Linnaea IX. p. 99: g. Cyathoidear.

Hemitelia Presl 1836. Pterid. p. 57: g. Cyatheacear. restrict. — Par. Link 1841. Fil. h. Berol. p. 35.
Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1046. 1: sect. Hemiteliae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Cyathear.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. V. p. 349: g. Hemitheliear. Subgen.: Notophoria, Euhemitelia.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 349 (*Hemithelia*): g. Hemitheliear. Sect.: Euhemitelia, Dispœnia.
Euhemitelia Endl.

Hemitelieae Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 346 in adnot.: trib. Cyatheacear. Gen.: Hemitelia, Microstegnus, Hemistegia, Actinophlebia.

*) στεπτός, coronatus.

*) συναψις, adhaesio.

**) τηλία, cribrum. (?)

Hemitelites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p 175. 329. t. 21. 38: g. Pecopteridum. — Par. Unger 1845. Syn. p. 89; 1846. Chlor. prot. p. XLVII.
F. Braun 1847. Flora I. p. 83: g. Polypodiacear. foss.
Synon. Cyphopteris Sternb.

Hemithelia Brongn., Fée vid. *Hemitelia Presl.*

Hemithelieae Fée 1852. Gen. Fil. p. 39. 345. 349: subtrib. Cyathear. Gen.: Hemithelia, Hemistegia.

Hemitome Nees mss.
= Aphelandra R. Brown.

Hemitomus L'Herit. mss.
= Alonsoa Ruiz & Pav.

Hemitrema „R. Brown mss." J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 67. 68: g. Rhodomelear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 50. n. $122/_{76}$: g. Anomalophyllear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25.
= Martensia Hering.

Hemitria Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 79: g. Loranthiae. (H. uniflora.)

Hemixera Endl. 1840. Gen. n. 5216 *a.* p. 961; 1841. Ench. p. 504: sect. Polycarpaeae.

Hemizonia DC. 1836. Prodr. V. p. 692: nov. g. Madiear. Sect.: Madaroides, Olocarpha. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2630. p. 428; 1841. Ench. p. 240. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 208 (134). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 396. — Rchb. 1841. Nom. p. 80. n. 3033. Sect.: Madaria, Holocarpha.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21: g. Milleriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: g. Sphenogynear.
Synon. Hartmannia DC.?

Hemizygia Benth. 1848 in DC. Prodr. XII. p. 41: sect. Ocimi.

Hemna Rafin. 1817. New-York monthl. mag.
= Hemiseuma Bisch.?

Hemodoraceae Dumort. vid. *Haemodoraceae R. Brown.*

Hemoracallis Medic. in Act. Theod. Pal. VI. p. 493: sphalm. pro *Hemerocallis.*

Hempelia*) Meyen 1827. Flora II. p. 712: nov. g. Confervar. *Cf.* Rudolphi 1829. Flora I. p. 358.
= Calothrix Agdh.

Hemprichia**) Ehrenb. 1829. Linnaea IV. p. 396: nov. g. Burseracear. (H. erythraea.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5939. p. 1138; 1841. Ench. p. 602. — Walp. 1842. Rep. I. p. 559.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 540. n. 2646: g. Terebinthear.
Meisn. 1837. Gen. p. 76 (55): g. Spondiacear.?

Hemprichia Ehrenb. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 145. n. 5646: g. Bursereαr.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 460: g. Burseridar.

Henanthus*) Lessing 1832. Syn. Compos. p. 196: nov. g. Chrysocomear. (Pteronia fasciculata L.)
Scepinia Neck.

Henckelia**) Spreng. 1817. Anleit. II. p. 402: g. Scrofularinar., pro *Rottlera Vahl* propositum.
Spreng. 1825. Syst I. p. 38. n. 70; 1827. Cur. post. p. 11; 1830. Gen. I. p. 21. n. 86: g. Personatar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 29. 41 (*Henkelia*).
Rchb. 1828. Consp. p. 124. n. 3224 (*Henkelia*): g. Gesnerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 185: g. Cyrtandrear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 199 (*Henkelia*).
Meisn. 1840. Gen. p. 302 (212): g. Ramondiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4701: g. Henckeliear.
Synon. Streptocarpus Lindl.

Henckelieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 120: sect. Cyrtandrear. Gen.: Cotylanthera?, Isanthera?, Aeschinanthus, Lysionotus, Liebigia, Agalmyla, Chirita, Craterostigma, Henckelia, Streptocarpus, Baea, Loxocarpus; Loxotis, Glossanthus, Monophyllea, Loxonia, Platystemma, Quintilia, Stauranthera; Epithema, Rhabdothamnus.

Hendecandra Eschscholtz 1823. Mém. Ac. Pet. X. (1826) p. 287: nov. g. Euphorbiacear. (H. procumbens.) *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 150.
Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5013; 1837. Hdb. p. 281: g. Tithymalear.
Bartl. 1830. Ord. p. 372: g. Euphorbiear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 488.
Endl. 1840. Gen. n. 5284. p. 1117; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Hook. & Arn. 1841. Beech. voy. Bot. p. 389. t. 91.
Meisn. 1841. Gen. p. 339 (252): g. Rottlerear.
Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7362: g. Ricinear. genuinar.
Baill. 1858. Euphorb. p. 371: g. Crotonidear.
Synon. Astrogyne Benth.

Hendelotia Endl. Ench. p. 602 in synon: Balsamodendri: vid. *Heudelotia Guillem.*

Hendersonia***) Berkeley 1841. Ann. nat. hist. VI. p. 430. t. 11. f. 9: g. Sphaeriaceor. (H. elegans.) *Cf.* Bot. Zeit. 1850. p. 509.
Lév. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 288 (*Hindersonia*): g. Sphaeropsideor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 416.

---

*) Dicat. Ad. Fr. Hempel, prof. Gotting.
**) Dicat. Fr. W. Hemprich, itineris Ehrenbergiani socio.

*) ἕν, unicum.
**) Dicat. comiti L. Henckel de Donnersmark.
***) Dicat. J. Henderson.

Hendersonia Berkeley cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Sphaeronemeor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492.
Desmaz. 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 341. Char. emend.
Math. 1853. Belg. II. p. 209 (*Hindersonia*): g. Sphaeriacear.

Henfreya*) Lindl. 1847. Bot. Regist. t. 31: nov. g. Ruelliear. (H. scandens.) — Par. Walp 1849. Ann. bot. I. p. 540.
Asystasia Blume.

Henicostemma**) Endl. 1838. Gen. n. 3562. p. 605; 1841. Ench. p. 303: g. Gentianear. dubium. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Rchb. 1841. Nom. p. 312. n. 5115: g. Erythraeariar.
= Enicostema Blume.

Henidia Rchb. f. 1844. Linnaea XVIII. p. 407: sect. Habenariae. (H. strictissima et odontopetala.)

Henisia Walp. Repert. II. p. 517: lege *Heinsia DC.*

Henkelia Rchb., Dietr. vid. *Henckelia Spreng.*

Henna Arabum.
= Lawsonia Linn.

Henningia***) Karelin & Kirilow 1842. Bull. soc. Mosc. Nr. 3. p. 516: nov. g. Ammolirio aff. (H. anisoptera.) *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 315.
Endl. 1843. Spl. III. p. 59. n. 1139/$_1$: g. Anthericear. — Par Kunth 1843. Enum. IV. p. 692. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 255. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 192.

Henonia†) Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 237: nov. g. Celosiear.

Henonia Cosson & Durieu 1857. Bull. bot. soc. Fr. II. p. 246: nov. g. Brassicear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 216.
Henophyton Cosson.

Henophyton Cosson 1858. Bull. bot. soc. Fr. II. p. . . .: novum nomen pro *Henonia Coss. & Dur.*

Henotogyna††) DC. 1836. Prodr. V. p. 432: sect. Tarchonanthi. (An genus?) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2412 *b*. p. 391; 1841. Ench. p. 256. — Rchb. 1841. Nom. p. 92. n. 3596. 2.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 38: g. Tarchonanthear.

Henricea Lem.-Lis. 1824. Bull. soc. philom. p. 171.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 78: g. Swertiear.
= Ophelia Don.

*) Dicat. Arth. Henfrey.
**) ἑνικός, simplex.
***) Dicat. Henning, botanico Mosquensi.
†) Dicat. Dr. Henon, Lugdun.
††) ἑνότης, simplicitas, unitas.

Henricia*) Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 11; 1818. ibid. p. 183; 1821. Dict. v. 20. p. 567: nov. g. Asterear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3300. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 464; 1830. v. 60. p. 582: g. Bellidear. (spuriar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2561: g. Amelloidear.
Nees 1833. Aster. p. 219: g. Asterum tenellor.
DC. 1836. Pr. V. p. 262: g. Euasterear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2313. p. 375; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 184 (125).
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951: g. Erigerear.

Henrietia Rchb. vid. *seq.*

Henriettea**) DC. 1828. Prodr. III. p. 178: nov. g. Miconiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 788. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 260. — Meisn. 1838. Gen. p. 112 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6252. p. 1219; 1841. Ench. p. 647. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1462. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6761. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4637 (*Henrietia*): g. Blakeacear.
Bartl. 1830. Ord. p. 330: g. Melastomear.
Naud. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 56. Char. emend.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 104: g. Clidemiear. (Includitur Phyllopus DC.) — Par Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 777.

Henriettella Naudin 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 107: nov. g. Clidemiear. (Henriettea? Patrisiana DC.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 178.

Henriquezia***) „Spruce" Benth. 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 337: nov. g. Bignoniacear., Platycarpo H. & B. aff. (H. verticillata.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 520.

Henrya†) Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 491: nov. g. Diclipterear. (Justicia scorpioides L.)

Henrya „Gaudich." Endl. Gen. Suppl. IV. p. 36. n. 1879*d* (sect. Urticae): err. pro *Fleurya Gaudich.*

Henschelia††) Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 81. t. 63: nov. g. Menispermacear. (H. luzonensis.)
Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6): g. Anonacear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 496.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278: g. Annonear. genuinar.

*) Dicat. Rob. Steph. Henrici.
**) *Caca Henriette* Cayennensium.
***) Dicat. Señor Henriquez Antonij.
†) Dicat. Henry, Bonnensi.
††) Dicat. A. G. E. T. Henschel, prof. Wratislawiensi.

Henschelia Presl cont.
Endl. 1839. Gen. n. 4705. p. 829; 1841. Ench. p. 417: g. Lardizabalear. dubium. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2637. — Walp. 1842. Rep. I. p. 99.

Henselera „Boiss." Rchb. vid. *Hänselera Boiss.*

Henslera „Lagasc." Endl. Gen. p. 791 in synon. Physospermi: vid. *Hänselera Lag.*

Henslovia A. Juss., Miq. vid. *Henslowia Wall.*

Hensloviaceae A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 536: fam. Dicotyledonear. diclinar. Gen.: Henslovia.
Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 715: ordo Dicotyledonum polypetalar. perigynar. Gen. id.

Henslowia*) Wallich 1832. Pl. As. rar. III. p. 14. t. 221: nov. g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Isis 1834. p. 981.
Griff. 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 173: g. Henslowiacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1905. p. 291; 1841. Ench. p. 179.
Meisn. 1838. Gen. p. 118 (84): g. Salicariear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 66. n. 2475: g. Henslowiear.
Planch. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 475: g. Lythrariear., Abatiae Ruiz & Pav. aff.
Hook. f. 1846. Ann. and Mag. XVII. p. 361.
Walp. 1846. Rep. V. p. 675: g. Eulythrariear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 536 *(Henslovia)*: g. Hensloviacear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 715 *(Henslovia)*.
= Crypteronia Blume.

Henslowia Lowe in litt. (genus aut sectio).
= Picconia DC.

Henslowia Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 16. p. 242: nov. g. Santalacear. (Viscum umbellatum Bl.) ex Griseb. (Arch. f. Naturg. 1851. II. p. 378) Loranthaceis adnumerandum. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 315.
A. DC. 1857. Pr. XIV. 2. p. 630: g. Thesiear.
Synon. Dendrotrophe Miq.

Henslowiaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 173.
Endl. 1837. Gen. p. 291; 1841. Ench. p. 179: fam. Salicineis aff. Gen. unicum: Henslowia.

Henslowieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 66: subdiv. Faginear.? Gen.: Henslowia.

Hepataria Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 168: nov. g. Tremellae aff.
= Mesenterii Endl. pars.

Hepatica**) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 145. Ed. Hall. 1745. p. 159: g. pl. class. VII.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 108. t. 5: g. herbae Gymnopolyspermae.
Linn. 1737. Gen. p. 162. n. 457; 1737. Cliff. p. 223; 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 255. n. 548; 1745. Fl. suec. p. 162;

*) Dicat. J. L. Henslow, prof. Cantabridg.
**) Nomen ab hepate, cujus viciis praecipue mederi existimatur: Dill.

Hepatica Rupp. cont.
1748. Ups. p. 155: g. Polyandr. Polygyn. — Par. GMS. 1800. Fl. Wett. II. p. 263. 300. — Willd. 1809. En. p. 580. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 23. — Elliott 1821. Sketch II. p. 55.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 216.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Multisiliquar. (serius Anemonae insertum.)
DC. 1805. Franç. IV. p. 885: g. Ranunculacear. — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 40. — Lois. 1821. Dict. v. 21. p. 3. — Link 1822. En. II. p. 88. — Kunth 1824. Syn. III. p. 113. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 217. 335.
Pers. 1807. Ench. II. p. 96: sect. Anemones. — Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 480. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 948. — Koch 1836. Syn. p. 6. Ed. II. p. 7. — Pritz. 1841. Linnaea XV. p. 690. *Cf.* Flora 1842. Lit. p. 78. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 15.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 732: g. Ranunculear.
DC. 1818. Syst. I. p. 215; 1824. Pr. I. p. 22: g. Anemonear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 720. — Presl 1826. Sicul. I. p. 7. — Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4943; 1832. Fl. exc. p. 730. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 253. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 22. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (3). — Kunth 1838. Berol. I. p. 11. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 14. — Endl. 1839. Gen. n. 4774. p. 846; 1841. Ench. p. 434. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 22. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 300. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 97. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 16.
Link 1831. Hdb. II. p. 397: g. Anemonidear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 276; 1841. Nom. p. 190. n. 7230: g. Pulsatillear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 240: g. Anemoninear.
Synon. Trinitas Hall.; Isopyrum Adans.

Hepatica Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 3. t. 2: g. pl. class. I.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 126: g. Muscis adfine.
Adans. 1763. Fam. II. p. 14: g. Hepaticar.
Conocephalus Hill, etc.

Hepaticae Adans. 1763. Fam. II. p. 14: fam. 4 plant. Gen.: Marchantia, Hepatica, Lunularia, Marsilea, Jungermannia, Targionia, Sphaerocarpus, Anthoceros, Blasia, Riccia, Salvinia.
Juss. 1789. Gen. p. 7: ordo (3) Acotyledonum. Gen.: Riccia, Blasia, Anthoceros, Targionia, Jungermannia, Marchantia. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 37. Gen. ead. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 23. t. 4. Gen. ead. — DC. 1809. Théor. élém. p. 239.

Hepaticae Adans. cont.

Schreb. 1791. Gen. II. p. 763: ordo 4 Cryptogamiae. Gen. ut Juss. et Sphaerocarpus. — Par. Roth 1800. Germ. III. p. 358. Gen. ut Juss. et Andreaea. — Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. II. p. 276. Gen.: Marchantia, Anthoceros, Jungermannia. — Link 1831 in Willd. Grundr. p. 236.

Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 137: div. Calyptrogamiae. — Par. Mass. 1818. Dict. v. 12. p. 104.

Batsch 1802. Tab. p. 266: fam. Chlorophyllor. Gen. ut Juss.

Willd. 1802. Bem. üb. Farrenkr.: ordo 5 Cryptogamar.

Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. I: fam. Aetheogamiae.

DC. 1805. Franç. II. p. 415: fam. (5) Acotyledonum. Gen. ut Juss. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 866.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 67: fam. 5 plant., exclusis Homallophyllis restricta. Gen.: Anthoceros, Blandovia, etc.

Mart. 1817. Erlang. p. 127: ordo 6 Cryptogamiae. Gen.: Jungermannia, Marchantia, Anthoceros. (Distinguuntur Homalophyllae.)

Raddi 1820. Mem. soc. Modena XVIII. p. 17. Ed. Nees 1841. p. 3. Gen.: Metzgeria, Römeria, Pellia, Lunularia, Fegatella, Reboullia, Marchantia, Grimaldia, Targionia, Sphaerocarpos, Anthoceros, Blasia, Corsinia, Riccia. (Ad calcem Muscorum frondosorum ordinandae proponuntur: Bellincinia, Antoiria, Frullania, Candollea, Jungermannia, Fossombronia et Calypogeja.)

Leman 1821. Dict. v. 21. p. 5: fam. Cryptogamar. Gen. §. 1: Aytonia, Rupinia, Corsinia, Riccia, Sphaerocarpus (*Homalophyllae Spreng.*). §. 2: Targionia, Anthoceros, Blandowia, Marchantia, Jungermannia. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 33. Ordines: Marchantieae, Anthoceroteae, Riccieae, Jungermannieae, Sphagnoideae.

A. Braun 1821. Flora II. p. 751. Gen.: Jungermannia, Merkia, Blasia, Riccia, Ricciella.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 677: fam. plant. cellulosar. foliacear. Divis.: Ricciadeae, Targionideae, Anthocerideae, Marchantiadeae, Jungermannideae.

Agdh. 1822. Aphor. p. 104; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: ordo Muscoidear. Gen.: Riccia, Sphaerocarpus, Targionia, Güntheria, Anthoceros, Blandowia, Duvalia, Marchantia, Staurophora, Blasia, Jungermannia. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed. 1. (Ordo 268.)

Lindenb. 1829. Syn. Hepat. eur. (Nov. Act. Leop. VI. Suppl.) Gen.: Jungermannia, Lunularia, Marchantia, Grimaldia, Fimbriaria, Targionia, Sphaerocarpus, Anthoceros, Blandowia, Corsinia, Ricciella, Riccia.

Bartl. 1830. Ord. p. 11: ordo Muscor.

Hepaticae Adans. cont.

Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 6. Divis.: Jungermannideae, Cephalotheceae s. Marchantiaceae, Anthocerineae s. melius Carpocerineae, Targionideae, Ricciaceae.

Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 84. Tribus: Jungermannieae, Marchantieae, Targionieae, Anthoceroteae, Riccieae. — Par. Nees 1838. ibid. IV. p. XVII. (Monocleae loco Targioniear.)

Lindl. 1833. Nix. p. 37: ordo Muscalium restrictus. (Excluduntur Jungermannieae.

Bischoff 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 959: fam. Muscinar. Trib. ut Nees 1833. — Par. Leunis 1849. Schul-Naturg. II. p. 214.

Endl. 1836. Gen. p. 42; 1841. Ench. p. 24: class. Acrobryor. Anophytor. Ordines: Ricciaceae, Anthoceroteae, Targioniaceae, Marchantiaceae, Jungermanniaceae.

Brongn. 1843. En. genr. p. 3: fam. Muscinear. Trib.: Riccieae, Anthocereae, Targionieae, Marchantieae, Jungermannieae.

Gottsche, Lindenb. & Nees 1844. Syn. Hepat. p. XVII. Trib. ut Nees 1838. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 37.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 56: div. 1 Muscalium. Ord.: Ricciaceae, Marchantiaceae, Jungermanniaceae, Equisetaceae.

Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 1: div. Muscor. Fam. ut Lindl. (excepta ultima.)

Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 537: ordo plant. cellular. acotyledonum. Trib. ut Nees 1838.

Math. 1853. Belg. II. p. 73: fam. 2 Acotyledonear. Trib.: Jungermannieae, Homalophyllae.

Synon. Musci hepaticae Hedw.; Coleolissae et Sphaerospermar. pars Wigg.; Athrosophytum et Phryganophyti pars Neck.; Ecalyptrata Hoffm.; Hepatici Mönch; Eccalyptrocarpa et Ascidiocarpa Lühnem.; Thallobrya Rchb.; Peltopterides et Hepaticini Corda; Lichenastra Wallr.; Neurophyllosporae C. H. Schultz; Algarum gen. Linn.

Hepaticella*) Leman 1821. Dict. v. 21. p. 2: g. Hepaticar.

Conocephalus Hill.

Hepatici Mönch 1794. Meth. p. 42. 748: ordo Cryptostemonis.

= Hepaticae Juss.

Hepaticini Corda 1829 in Opiz Beitr. I; 1830 in Sturm Jungerm. p. 4. 6: class. Phaenogamar. Tribus: Sphagnoideae, Andreaeae, Jungermanniaceae.

Hüb. 1831. Hepat. germ. p. 32: fam. 3 Hepaticar. Ord.: Jungermannieae, Andreaeae.

Hepetis**) Swartz 1788. Prodr. p. 4. 56: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 798. n. 1741. — Gmel. 1791. Syst. p. 531.

Gis. 1792. Prael. p. 283: g. Coronariar.

Pitcairnia L'Herit.

*) Nomen *Fegatellae* latine versum.

**) *ἐπέτειος*, annuus. (?)

Hepetospermum „Wall." Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 188: g. Cucurbitear. minus notum. (Nomen.) *Cf. Herpetospermum Wall., Steud.*

Hephestionia Naudin 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 275 (nomen); 1849. ibid. XIII. p. 36: nov. g. Lasiandralium. (Chaetogastra strigosa DC.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 554.

Heppia Nägeli . . . .
Massal. 1854. Geneacaena Lich. p. 8.
Arnold 1858. Flora I. p. 110: g. Peltigerear.

Hepiiella*) Regel 1853. Gartenflora II. p. 353: nov. g. Gesneriacear., Diastemae aff. (Achimenes viscida *Lind.) *Cf.* Bot. Zeit. 1854. p. 289.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 203; 1858. ibid. XXIX. p. 504. 549: g. Brachylomatear.
Synon. Cheirisanthera Hort.

Heptaca**) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 657. Ed. Willd. p. 807: nov. g. Polygam. Monoec. (H. africana.) *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 13.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 602. n. 1936; 1830. Gen. I. p. 438. n. 2171: Polyandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 211. 263.
Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5556: inter genera vix cognita. — Simil. Endl. 1841. Gen. n. 6887. p. 1332; 1841. Ench. p. 685.
Meisn. 1843. Comm. p. 349: g. Homalinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 795: g. polypetalum incertae sedis.
Planch. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 296: sect. Oncobae. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 46. n. 5067*b*.
Synon. Ventenatia Palis.; Xylotheca Hochst.

*Heptandria****) Linn. 1737. Gen. p. 109, Syst., Spec., etc. (sequentibus scriptoribus Linnaeanis): class. VII. plantar. Ordo unicus: Monogynia, serius etiam Di-, Tetra-, Heptagynia.

Heptaneuron Decaisne 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 698: sect. Plantaginis.

Heptapleurum Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 472. t. 178. f. 3: nov. g. pl. (H. stellatum. — *Bukera* zeylon.)
Rchb. 1841. Nom. p. 143. n. 5552: g. Araliear.
Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 456: g. Araliacear.
Synon. Paratropia DC.; Trevesia Vis.; Heptoneurum Hassk.

Heptaptera Reuter 1838. Mém. soc. Genèv. VIII. p. 302. t. 5.
Endl. 1841. Spl. I. n. 4527/1. p. 1414; 1841. Ench. p. 380: g. Smyrnear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 919.
Rchb. 1841. Nom. p. 139. n. 5346: g. Smyrniear.

Heptaptera Reuter cont.
Meisn. 1843. Comm. p. 359: g. Pleurospermear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 14. n. 4526 *c*: sect. Prangos.
Boiss. 1856. Diagn. pl. nov. Ser. 2. Nr. 5. p. 103: Meliocarpo injungit.

Heptas Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 292 (203): g. Thunbergiear. obscurum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Acanthacear. dubium.
= Septas Lour.

Heptoneurum Hassk. Diagn. nov. p. 121: err. typ. pro *Heptapleurum*.

Heracantha Rupp. 1718. Fl. jen. p. 208. Ed. Hall. 1745. p. 212: g. pl. class. VIII.
„Tabern." DC. 1837. Pr. VI. p. 545: sect. Carlinae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2859*a*. p. 469; 1841. Ench. p. 246. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 674.
Synon. Carlina Cass.

Heracantha (Hoffmsg. &) Link 1820. Fl. Portug. II. p. 205; 1822. Enum. II. p. 304; 1829. Handb. I. p. 686: g. Acarnacear.
Kentrophyllum Neck.

Heraclea Hill 1769. Hort. kew. p. 54: g. Associatar., non definitum. (Centaurear.?)

Heracleum*) Linn. 1737. Gen. p. 81. n. 231; 1737. Cliff. p. 103; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 65; 1753. Sp. I. p. 249; 1759. Syst. ed. X. p. 958. n. 307; 1762. Sp. ed. II. p. 358; 1764. Gen. ed. VI. p. 137. n. 345; 1767. Syst. ed XII. p. 210. n. 342: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 233; 1784. Syst. p. 282. — Reich. 1778. Gen. p. 140. n. 375. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 186. n. 477. — Gmel. 1791. Syst. p. 480. — Pers. 1797. Syst. p. 298. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1421. n. 541; 1809. En. p. 311. — MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 222.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 213: g. Umbelliferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Crantz 1767. Cl. Umbell. p. 57; 1769. Stirp. Austr. p. 153. — Scop. 1777. Intr. p. 113. — Juss. 1789. Gen. p. 222. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 23. — Poir. 1804. Dict. v. 4. p. 31 (*Berce*). — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 473. — DC. 1805. Franç. IV. p. 314; 1815. V. p. 510. — Hedw. 1806. Gen. p. 193. n. 793. — Link 1821. En. I. p. 273. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 92. (Divis. 1.) — D. Don 1825. Nepal. p. 185. — Bartl. 1830. Ord. p. 235.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 97. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 314. n. 696. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 181. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 172. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 15. 315.

---

*) Dicat. Dr. Hepp, Turicensi.
**) ἑπτάχη, septifariam: a bacca in 7 loculos divisa.
***) ἑπτά, septem.

*) Synonymon Sphondylii apud Dioscoridem. Nomen ab Hippocratis patre Heracle.

Heracleum Linn. cont.

Gled. 1764. Syst. p. 52. n. 202: g. Thalamostemonum.

Neck. 1790. El. I. p. 180. n. 302: g. Scadiophytor.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 641: 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLVII. 572; 1825. Syst. I. p. 911. n. 1053; 1830. Gen. I. p. 226. n. 1184: g. Selinear. — Par. Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 89. — Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 366. Sect.: Sphondylium, Wendia. — Link 1829. Hdb. I. p. 355. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 299.

Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3682: g. Peucedanear. Sect.: Wendia, Heracleum, Sphondylium. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35. — DC. 1830. Pr. IV. p. 191. Sect.: Tetrataenium, Euheracleum, Sphondylium, Carmelia, Wendtia, Trichogonium — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 456 (sect.: Wendtia, Spondylium, Heraclidium); 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5476 (sect.: Heracleum, Heraclidium, Wendtia, Carmelia, Trichogonium, Tetrataenium). — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 341. Sect. ut DC. (Spondylium.) — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 372. — Tausch 1834. Flora I. p. 347. — Koch 1836. Syn. p. 307. Ed. II. p. 338. Sect.: Euheracleum, Wendia. — Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). — Kunth 1838. Berol. I. p. 280. — Endl. 1839. Gen. n. 4477. p. 781; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 10. Sect. ut DC. (exclusa 1850 Carmelia). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 971. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 170. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 632. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 112. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 320. Sect. ut Koch. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 695. Sect. ex DC. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 76.

Griseb. 1843. Rumel. I. p. 378: g. Diclidospermar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.

Synon. Sphondylium Tourn.; Sphondilium Rupp.

Heracleum Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 141: g. Umbelliferar., sejunctis Sphondylio, Wendia et Zosima restrict. (H. sibiricum L.)

Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3682 *b:* sect. Heraclei.

Euheracleum DC.

Heracleum Rchb. 1841. Nomencl. p. 141. n. 5476. 1: sect. Heraclei.

— Sphondylium Tourn.

Heraclidium Rchb. 1832. Fl. exc. p. 458; 1841. Nomencl. p. 141. n. 5476. 2: sect. Heraclei. (H. angustifolium, latifolium, flavescens, sibiricum.)

— Euheracleum DC.

Herba Paris Tourn. 1700. Inst. p. 233. t. 117: g. pl. class. V.

: Paris Linn.

Herbacéa Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 58. 59; 1816. Nereis brit. (*cf.* Leman 1821. Dict. v. 21. p. 16 et Spreng. 1820. N. Entd. I. p. 97): nov. g. Fucor. (H. ligulata.)

Desmia Post. & Rupr.

Herbae Hill 1769. Hort. kew. p. 1: div. plantar. Classes: 1. Radiatae, 2. Tubulatae, 3. Ligulatae, 4. Associatae, 5. Aggregatae, 6. Umbellatae, 7. Monopetalae, 8. Dipetalae, 9. Tripetalae, 10. Tetrapetalae, 11. Pentapetalae, 12. Hexapetalae, 13. Polypetalae, (7—13 regulares completae), 14. Monopetalae irregulares, 15. Dipet. irreg., 16. Tripet. irreg., 17. Tetrapet. irreg., 18. Pentapet. irreg., 19. Hexapet. irreg., 20. Polypet. irreg., 21. Monopetalae incompletae, 22. Dipet. incompl., 23. Tripetalae incompl., 24. Tetrapet. incompl., 25. Pentapet. incompl., 26. Hexapet. incompl., 27. Polypet. incompl., 28. Monophyllae, 29. Diphyllae, 30. Triphyllae, 31. Tetraphyllae, 32. Pentaphyllae, 33. Hexaphyllae, 34. Octophyllae, 35. Glumosae, 36. Stamineae, 37. 38. Dioiceae (37 Antheraceae, 38. Pistillaceae in tab.), 39. Filices, 40. Musci, 41. Fungi, 42. Fucus.

Herbertia*) Sweet .... Fl. gard. I. t. 222. (Ferraria pusilla Link & O.)

Endl. 1837. Gen. n. 1227. p. 166; 1841. Ench. p. 98: g. Iridear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1558. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 392 (294).

Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 3: g. Moraeacear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.

Herbertus Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 678. 705: nov. g. Jungermannidear. (Jung. juniperina adunca Hook.)

Schisma Dumort.

Herbertus Gray Arr. brit. pl. I. p. 684: err. pro *Pallavicinius Gray.* (Ex Corrigendis.)

Herbichia Zawadzky 1832. Arch. de bot. I. p. 450; 1835. Fl. galic. p. 198; nov. g. ex typo Senecionis? abrotanifolii Wahlenb.

Meisn. 1839. Comm. p. 145: g. Senecionear.?

Jacobaea DC.?

Hercospora**) Fries 1825. Pl. homon. p. 119: g. Cytisporeor. (Sphaeria Tiliae, atrovirens, etc.) *Cf.* Leman 1827. Dict. v. 48. p. 437.

Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 246: g. Phomaceor.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 30; 1842. Mycol. p. 126: g. Sphaeronemear. — Par. Preuss 1852 in Linnaea XXV. p. 730.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.

*) Dicat. W. Herbert, botanico anglico.

**) ἕρκος, rete.

Hercospora Fries cont.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 397: g. Sphaeriaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Sphaeronemeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 63: g. Ascosporeor.

Hercotheca Ehrenb. 1844. Ber. Berl. Ak. p. 262: nov. g. Naviculaceor., Gallionellae aff.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 27. n. 23: g. Melosirear.

Herculea Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 273.
Cauloglossum Grev.

Herderia Cassini 1829. Ann. sc. nat. XVII. p. . . .; 1830. Dict. v. 60. p. 586. 599: nov. g. Ethuliear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 13. — Endl. 1838. Gen. n. 2201. p. 357; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 175 (122). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3852. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39: g. Verniear. verar.

Herera Burger: g. Vitium, teste Bronner.

Heretiera G. Don vid. *Heritiera Dryand.*

Hericium Pers. 1797. Tent. disp. p. 29: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XVII. 563: sect. Hydni. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 108. — Nees 1816. Syst. p. 235; 1817. Ueberbl. p. 62. — Endl. 1836. Gen. n. 442 *d.* p. 39; 1841. Ench. p. 21.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 652: g. Hydnidear.
Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 150: g. Odontodermeor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 94: g. Orthomycetum. (Nees f. 249.)
Fries 1838. Epicr. p. 519: g. Hydneor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 472. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 404. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 168.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 328: g. Hydnaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 325: g. Hydnear.
Synon. Cerophora Raf.; Hectocerus Raf.; Medusina Chev.

Hericium Fries 1825. Pl. homon. p. 88: g. Pileolator. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 13. n. 306.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 41; 1842. Mycol. p. 172: g. Clavariacear.
= Martella Scop.

Hericius Juss. 1789. Gen. p. 4: nov. g. Fungor.
= Hydnum Linn.

Heringia*) J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 68: nov. g. Sphaerococcoidear. (Sphaerococcus rostratus et mirabilis.) — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360. (Flora 1843. p. 98.)

*) Dicat. phycologo Hering.

Heringia J. Agardh cont.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 103; 1843. Phyc. gener. p. 406: sect. Gelidii.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Sphaerococcear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Plocariear.
Gelidium Lamx.

Herissanthia Steud. Nomencl. I. p. 750: vid. *seq.*

Herissantia Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 244; 1789. Phil. Bot. I. p. 90: nov. g. ex typo Sidae crispae Cav.
— Abutilon Tourn.

Heriteria Schrank 1789. Fl. bavar. p. 580.
= Tofieldia Huds.

Heriteria Spreng., Dumort. vid. *Heritiera Dryand.*

Heriteria Dumort. vid. *Heritiera Gmel.*

Heritiera*) Dryand. 1789 in Ait. hort. kew. III. p. 546.
Schreb. 1791. Gen. I. p. 812. n. 1766: g. Monoec. Syngenes.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 971. n. 1880: g. Polygam. Monoec.
Pers. 1807. Ench. II. p. 591. n. 2154: g. Monoec. Monadelph.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 690 *(Heriteria)*: g. Samydear.
Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 58: g. Malvaceir aff.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 310 *(L'Heritiera)*: g. Sterculiacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV. — Bartl. 1830. Ord. p. 340. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 518 *(Heretiera)*. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 503. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 616. — Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. 5321/7.
DC. 1824. Pr. I. p. 484: g. Sterculiear. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 70. n. 2398; 1831. Gen. II. p. 544. n. 2668 *(Heriteria)*. — Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5285; 1841. Nom. p. 202. n. 7698. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46 *(Heriteria)*. — Schott & Endl. 1832. Melet. p. 32. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 63. — Meisn. 1837. Gen. p. 30 (25). — Endl. 1840. Gen. n. 5319. p. 993; 1841. Ench. p. 516. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 78. — R. Brown 1844 in Horsf. Pl. jav. rar. Pt. 3. p. 237. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 321.
Perrottet 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 126 *(Lheritieria)*.
Roxb. 1832. Ind. III. p. 142: g. Monadelph. Dodecandr.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Triphacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 362: g. Sterculear.
Synon. Samandura Linn.; Atunus Rumph.; Balanopteris Gärtn.; Sutherlandia Gmel.

*) Dicat. Ch. Louis L'Heritier de Brutelle.

Heritiera Retz. 1791. Obs. bot. VI. p. 17. t. 1.
= Hellenia Willd.

Heritiera Gmel. 1791. Syst. p. 113: g. Triandr. Monogyn. — Par. Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 20.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 150: g. Irideis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 355: g. Iridear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58 (*Heriteria* p. 80 corr. *Camderia*): g. Haemodoraceear.
= Lachnanthes Elliott.

Hermadactylus Kunth vid. *Hermodactylus R. Brown.*

Hermadeae Rchb. 1828. Consp. p. 144: sect. Bolacear. Gen.: Cogswellia, Trachymene, Hügelia, Hermas, Lichtensteinia.

Hermania Tourn. 1700. Inst. p. 656. t. 432. App.
= Hermannia Linn.

Hermanneae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 364: trib. Byttneriacear. Gen. Hermanniear. Endl.

Hermannella DC. 1824. Prodr. I. p. 494: sect. Hermanniae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5306 *a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 532.

Hermannia*) Linn. 1737. Gen. p. 203. n. 551; 1737. Cliff. p. 342; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 195; 1753. Sp. II. p. 673; 1759. Syst. ed. X. p. 1140. n. 742; 1763. Sp. ed. II. p. 941; 1764. Gen. ed. VI. p. 348. n. 828; 1767. Syst. ed. XII. p. 451; g. Monadelph. Pentandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 509; 1784. Syst. p. 610. — Reich. 1778. Gen. p. 348. n. 893. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 453. n. 1109. — Gmel. 1791. Syst. p. 1009. — Pers. 1797. Syst. p. 648. — Willd. 1800. Sp. III. p. 589. n. 1259; 1809. En. p. 692.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 234. n. 970: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Columniferor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Geranior. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 389.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 290. — Gis. 1792. Prael. p. 452.
Hill 1769. Ht. kew. p. 193: g. Pentapetalar.
Cavan. 1788. Diss. VI. p. 327. t. 178—181: g. Malvacear. Char. emend. *Cf.* Röm. & Ust. 1790. Mag. Bot. XI. p. 46. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 18.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 221; 1789. Phil. Bot. I. p. 67.
Juss. 1789. Gen. p. 289: g. Tiliacear. (dubium.) — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 206. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 91. — Pers. 1807. Ench. II. p. 216. n. 1593. — Link 1822. En. II. p. 179.

Hermannia Linn. cont.
Neck. 1790. El. II. p. 425. n. 1247: g. Comizophytor.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 26: g. Thalamostemonis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 821; 1826. Syst. III. p. 25. n. 2347; 1831. Gen. II. p. 535. n. 2627: g. Hermanniear. — Par. Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 65. — DC. 1824. Pr. I. p. 493. Sect.: Trionella, Hermannella. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 532. Sect. ut DC. — Meisn. 1837. Gen. p. 33 (26). — Endl. 1840. Gen. n. 5340. p. 1000; 1841. Ench. p. 519. — Brongn. 1843. En. genr. p. 78.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 313: g. Hermanniacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 60. — Bartl. 1830. Ord. p. 343. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 466 — Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. p. 40.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: g. Hermannidiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5306: g. Dombeyacear. Sect. ut DC.
Link 1831. Hdb. II. p. 351 (*Herrmannia*): g. Büttneriacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291; 1841. Nom. p. 201. n. 7675: g. Mahernicar.
Fisch. & Mey. . . . . Ind. sext. sem. h. Petrop. (Linnaea 1840. Litt. p. 149.) Accedit sectio Harnemia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: g. Hermannear.
Synon. Hermania Tourn.

Hermanniaceae Kunth 1821 in HBK. Nov. gen. V. p. 312 (Diss. Malv. p 11); sect. Büttneriacear. Gen.: Hermannia, Mahernia, Melochia, Mougeotia, Waltheria.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 46: fam. Malvariear. Trib.: Sterculieae, Buttnerieae, Lasiopetalae, Hermannieae, Dombeyaceae.
Bartl. 1830. Ord. p. 342: ordo (198) Columniferar. Gen.: Melochia, Riedlea, Waltheria, Altheria, Hermannia, Mahernia.
Spach 1834. Vég. phan. III. p. 460: fam. (49) Columniferar. Gen.: Waltheria, Melochia, Hermannia, Mahernia.

Hermanniae Vent. 1803. Malmais. p. 91; 1807. Mém. Inst. I. p. 2: nova fam. a Tiliaceis et Malvaceis sejuncta. Novum genus (1807) Riedlea.
A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 191: trib. Büttneriacear. Gen. cub.: Melochia, Waltheria.

Hermannidieae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: fam. Thalamisertiae. Gen.: Hermannia, etc.

Hermannieae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 821: div. Tiliacear. Gen.: Hermannia, Mahernia, Ridlea, Melochia, Hugonia, Strumpfia; Lophira; Bixa, Erythrospermum.
Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 65: ordo Hypopetalear. Gen. §. 1: Waltheria, Hermannia, Mahernia, Melochia, Hugonia,

*) Dicat. Paulo Hermanno, sedulo Africae et Zeylonae lustratori.

Hermannieae Spreng. cont.
Riedlea, Cheirostemon. §. 2: Abroma, Sterculia, Byttneria.
DC. (1823. Mém. Mus. X. p. 100); 1824. Pr. I. p. 490: trib. Byttneriacear. Gen.: Melochia, Riedleia, Waltheria, Altheria, Hermannia, Mahernia. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 527. Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 616. Gen. ut Endl. et Visenia.
St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 148: trib. Malvacear. Gen.: Waltheria, Melochia.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII (1832. Fl. exc. p. 775): div. Geraniacear. Gen. ut DC. excepta Altheria.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: trib. Hermanniacear. Gen. ead.
Meisn. 1837. Gen. p. 33 (26): trib. Büttneriacear. Gen.: Waltheria, Melochia, Visenia, Hermannia, Mahernia, Jürgensia. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 999; 1841. Ench. p. 519. Gen.: Waltheria, Melochia, Ridleia, Physodium, Hermannia, Mahernia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291; 1841. Nom. p. 201: subdiv. Sterculiariar. Sect.: Mahernieae, Walthericae, Dombeyeae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 78: trib. Buttneriacear. Gen. ut Endl.

Hermaphroditanthae Schott 1832. Melet. bot. p. 21: subordo Aracear. Trib.: Callaceae, Orontiaceae.

Hermas*) Linn. 1771. Mant. II. p. 163. n. 1332: g. Polygam. Monoec. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 767; 1784. Syst. p. 913. — Reich. 1778. Gen. p. 544. n. 1270. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 734. n. 1594. — Pers. 1797. Syst. p. 954. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 1002. n. 1897.
Scop. 1777. Intr. p. 109: g. Umbelliferis aff.
Juss. 1789. Gen. p. 225: g. Umbelliferar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 478. — Hedw. 1806. Gen. p. 192. n. 792. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 67. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 102. (Divis. 1.) — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Neck. 1790. El. I. p. 155. n. 261: g. Gitonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 465: g. Pentandr. Digyn. — Par. Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 184.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 30. t. 85.
Gis. 1792. Prael. p. 508: g. Umbellatar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 305. n. 679.
Thunb. 1805. Nov. Act. Ac. Petrop. XIV. p. 529. t. 11. 12: g. antea Bupleuro insertum restituit. *Cf.* Schrad. n. Journ. II. 1. p. 43.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 631: g. Bupleurear.

Hermas Linn. cont.
Spreng. 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXIV. 378; 1825. Syst. I. p. 883. n. 1041; 1830. Gen. I. p. 221. n. 1142: g. Bupleurinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3761: g. Hermadear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34.: g. Buplevrear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 241: g. Smyrnear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 376. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 354. — Endl. 1839. Gen. n. 4530. p. 790; 1841. Ench. p. 380. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 987.
Tausch 1834. Flora I. p. 347: g. Peucedanear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136.
Rchb. 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5349; g. Smyrniear.
Meisn. 1838. Gen. p. 150 (108): g. Cachrydear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 2. n. 4370_1: g. Mulinear.

Hermas Rchb. vid. *Hermes Salisb.*

Hermbstädtia*) Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4364: g. Gomphrenear.
Meisn. 1841. Gen. p. 319 (232): g. Celosiear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. n. 1977. p. 34; 1847. Spl. IV. p. 44. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511. — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 246.
Synon. Berzelia Mart.; Hyparete Raf.; Pelianthus E. Meyer; Langia Endl.

Hermes „Salisb." Benth. 1839 in DC. Prodr. VII. 2. p. 662: subsect. Euericae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4313 *d* 33. p. 1412; 1841. Ench. p. 370.
Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4887. 4 *g (Hermas)*: subsect. Ericae.
Synon. Diphilus Salisb.

Hermesia**) Willd. 1805. Spec. IV. p. 809. n. 1813: g. Dioec. Octandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 625. n. 2253.
Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 160. t. 46: g. Euphorbiar. (Dioec. Monadelph).
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 91: g. Euphorbiacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 70. — Kunth 1822. Syn. I. p. 407. — Agdh. 1823. Aphor. p. 193.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 372: g. Linozostear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 246. n. 1407: g. Tricoccar., 1827 (Cur. post. p. 146) Alchorneae injunctum.
Baill. 1858. Euphorb. p. 447: sect. Alchorneae.
Alchornea Sol.

Hermesias Löfling 1758. It. p. 278. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 69.
= Brownea Jacq.

---

*) Unde nomen? ἑρμάς, scopulus occultus in mari. (Beckmann.)

*) Dicat. Sigism. Fr. Hermbstädt, prof. Berolin.
**) Dicat. Hermes, Berolin.

Herminiera Guillem. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 201. t. 51.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 263: g. Galegear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6552. p. 1274; 1841. Euch. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5741. — Walp. 1846. Rep. V. p. 516. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Meisn. 1837. Gen. p. 87 (62): g. Clitoriear.?; p. 88 (63) g. Galegear.?

Herminium Linn. 1737. Fl. lapp. p. 247. Ed. Smith p. 256; 1737. Gen. p. 271. n. 684; 1737. Cliff. p. 429; 1740. Act. Upsal. p. 29; 1742. Gen. ed. II. p. 433. n. 826: g. Gynandr. Diandr, serius Ophrydi insertum
Gled. 1749. Berl. V. p. 133: g. Stylostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27: g. Orchidear. — Par. R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 191. (Verm. bot. Schr. II. p. 8.) — Rich. 1818. Mém. Mus. IV. p. 42. 49; 1818. Orch. eur. p. 27. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 207. — Link 1822. En. II. p. 368; 1829. Hdb. I. p. 245. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 695. n. 2933; 1831. Gen. II. p. 654. n. 3293. — Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 558. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1552. 1569; 1830. Fl. exc. p. 119. (genuinar.) — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 171.
Pers. 1807. Ench. II. p. 513: sect. Serapiadis.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529); 1832. Bot. Regist. t. 1499; 1835. Orchid. p. 304: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1476; 1841. Nom. p. 50. n. 1866. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1524. p. 210; 1841. Ench. p. 112. — Kunth 1838. Berol. II. p. 242. — Meisn. 1842. Gen. p. 380 (284). — Brongn. 1843. En. genr. p. 28. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 73. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 299.
Koch 1837. Syn. p. 693. Ed. II. p. 798: g. Ophrydinear.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 90: g. Coniorchidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Gymnadenidar.
Synon. Monorchis Mich.; Arachnites Hoffm.

Hermione Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 357: nov. g. Narcissear. (Narcissus Jonquilla L.) — Par. Herb. 1837. Amaryll. p. 63. 80. 319. (Injungitur Chloraster.) — Kunth 1850. Enum. V. p. 738.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 329. Ed. Schrank 1819. p. 362: g. Succulentar.
Haw. 1819. Suppl. pl. succ. p. 137: g. Narcissor.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 42: sect. Narcissi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 1268 *a*; 1841. Nom. p. 44. n. 1611. s. Subsect. (1841) ut Endl. — Schult. 1830. Syst. VII. p. 961. Subsect.: Jonquillae, Tazzettae. — Endl. 1837. Gen. n. 1289 *h*. p. 179; 1841. Ench. p. 103. Subsect.: Jonquillia, Tazetta. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1169. Subsect. ut Schult. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (297).
Haw. 1831. Mon. Narciss. p. 7: g. Narcissinear. Disjunguntur Jonquilla, Helena et Chloraster. — Par. Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 18. 214. Sect.: Ganymedes, Hermione, Helena.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 443: subg. Narcissi.

Hermodactyloides Spach 1846. Hist. vég. phan. XIII. p. 16; 1846. Ann. sc. nat 3e sér V. p. 91: subg. Iridis. (Iris reticulata MB.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 817.

Hermodactylos Rchb. vid. *Hermodactylus R. Brown.*

Hermodactylum Bartl. vid. *praeced.*

Hermodactylus*) Tourn. 1703. Coroll. p. 50: g. pl. class. IX.
Adans. 1763. Fam. II. p. 60: g. Iridum.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 304: g. Iridear. (Iris tuberosa L.) — Par. Parlat. 1854. Nuov. gen. monoc. p. 45. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 245.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 83: sect. Iridis.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 14; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 90: subg. Iridis. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 816.
= Iridis Linn. pars.

Hermodactylus R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 243 (Verm. bot. Schr. IV. p. 68): sect. Colchici. (C. Ritchii.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1086 *b*. p. 137; 1841. Ench. p. 79. — Kunth 1843. Enum. IV. p. 145 (*Hermadactylus*).
Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1037 (*Hermodactylos*); 1841. Nom. p. 47. n. 1720: g. Colchicear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 234.
Bartl. 1830. Ord. p. 52 (*Hermodactylum*): g. Colchicacear.

Hermupoa**) Löfling 1758. It. hisp. p. 307.
DC. 1824. Pr. I. p. 251: g. Capparear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4877. — Bartl. 1830. Ord. p. 266. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 286. — Meisn. 1837. Gen. p. 17 (16). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 296.(?) — Endl. 1839. Gen. n. 5008. p. 895; 1841. Ench. p. 456 (dubium). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358. (?)
Schult. 1829. Syst. VII. 1. p. IX. 52: g. Capparidear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 186. n. 7121: g. Cadabear.

Hernandezia Hoffmsg. ex Steud. Nomencl. I. p. 752.
= seq.

*) Mercurii digitus, quia radices digitorum similitudinem referunt. (Beckmann.)
**) Nomen vernaculum.

Hernandia*) Plumier 1703. Gen. p. 6. t. 40.
Linn. 1737. Cliff p. 485; 1742. Gen. ed. II. p. 516. n. 993: g. incertae sedis.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Tricoccor.
Linn. 1753. Sp. II. p. 981; 1759 Syst. ed. X. p. 1264. n. 931; 1763. Sp. ed. II. p. 1391; 1764. Gen. ed. VI. p. 484. n. 1049; 1767. Syst. ed. XII. p. 619: g. Monoec. Triandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 707; 1784. Syst. p. 847. — Aubl. 1775. Guian. II. p. 848. t. 329. — Reich. 1778. Gen. p. 479. n. 1141. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 627. n. 1411. — Pers. 1797. Syst. p. 891; 1807. Ench. II. p. 550. n. 2044. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 327. n. 1648; 1809. En. p. 963. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 577.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 373: in Appendice.
Adans. 1763. Fam. II. p. 355: g. Tithymalor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 240. — Gis. 1792. Prael. p. 474.
Gled. 1764. Syst. p. 11. n. 37: g. Thalamostemonum.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 193. t. 40. f. 3 (ovigera).
Juss. 1789. Gen. p. 81: g. Lauris aff. — Simil. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 74. — Link 1822. En. II. p. 382.
Neck. 1790. El. II. p. 345. n. 1141: g. Cyrtosiphytor. Disiungitur Hertelia.
Gmel. 1791. Syst. p. 95: g. Triandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 111: g. Laurinar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 191: g. Laurineis aff.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 343; 1826. Syst. III. p. 835. n. 3097; 1831. Gen. II. p. 689. n. 3476: g. Myristicear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1864.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 550: g. Hernandiear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 329 (241). — Rchb. 1841. Nom. p. 65. n. 2452. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531.
Dumort. 1829. Anal fam. p. 16: g. Hernandiacear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2108. p. 332; 1841. Ench. p. 210. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 120. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 886.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 436: g. Thymelear.

Synon. Hertelia Neck.?; Biasolettia Presl; Hernandezia Hffmsg.; Hertella Steud.

Hernandiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14. 16: fam. Laurrainiear. Gen.: Hernandia, Inocarpus.
Endl. 1838. Gen. p. 332: fam. Daphnoideis aff. Gen. ead. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1378 et Ench. p. 210) Sarcostigma et 1842 (Spl. II. p. 36) Phaleria. — Simil. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 576. Gen. ut Endl. 1838.

---

*) Consecrata Francisco Hernandez, ex historia pl. mexicanarum claro.

Hernandiaceae Dumort. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 120: fam. Daphnoidear. Gen.: Hernandia.
Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 886: subordo Thymelaeacear.? abludens. Gen. ut Endl. 1841.

Hernandieae Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 550: fam. plant. Gen.: Hernandia, Inocarpus. *Cf.* Blume 1833. Nov. fam. expos.; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 91.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (66) Apetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 23: ordo Daphnalium.
Meisn. 1841. Gen. p. 329 (241): ordo Daphnoidear. Gen. ut Blume et Sarcostigma.
Rchb. 1841. Nom. p. 65: subdiv. Daphnoidear. Gen: Hernandia, Sarcostigma.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: appendix Thymelacear. Gen. ut Meisn.

Herniaria*) Tourn. 1700. Inst. p. 507. t. 288: g. pl. class. XV. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 319.
Linn. 1737. Gen. p. 34. n. 93; 1737. Cliff. p. 41: g. Pentandr. Monogyn.
Linn. 1740. Syst. p. 20; 1742. Gen. ed. II. p. 98. n. 228; 1748. Ups. p. 54; 1753. Sp. I. p. 218; 1759. Syst. ed. X. p. 947. n. 272; 1762. Sp. ed. II. p. 317; 1764. Gen. ed. VI. p. 121. n. 308; 1767. Syst. ed. XII. p. 194. n. 305: g. Pentandr. Digyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 171. — Murr. 1774. Syst. p. 215; 1784. Syst. p. 261. — Reich. 1778. Gen. p. 126. n. 336. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 170. n. 434. — Gmel. 1791. Syst. p. 448. — Pers. 1797. Syst. p. 274; 1805. Ench. I. p. 292. n. 655. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1296. n. 496; 1809. En. p. 287. — Rebent. 1804. Neom. p. 124. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 178. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 13. 242.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 182: g. ord. 3 class. III.
Hall. 1745 in Rupp. fl. jen. p. 340: g. pl. class. XVI.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 46. n. 180: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 328.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Holeracear.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holoracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.
Hill. 1769. Ht. kew. p. 371: g. Monophyllar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 487: g. Polygonatar.
Scop. 1777. Intr. p. 336: g. Defloratar.
Juss. 1789. Gen. p. 89: g. Amaranthor.
Neck. 1790. El. II. p. 206. n. 933: g. Sysellophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 268: g. Amaranthoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 172: g. Oleracear.

*) Nomen officinale a sanandis herniis.

Herniaria Tourn. cont.
Cram. 1803. Disp. p. 44: in Tetrandr. Digyn.
Juss. 1805. Ann. Mus. II. p. 132: g. Amarantacear. sect. 2.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 208: g. Amaranthacear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 405; 1815. V. p. 375. — Hedw. 1806. Gen. p. 186. n. 768. — Link 1821. En. I. p. 247.
Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 389; 1825. Dict. v. 38. p. 9: g. Paronychiear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. XXVI. 294. — Lois. 1821. Dict. v. 21. p. 76. — Agdh. 1825. Aphor. p. 220. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI; 1832. Fl. exc. p. 564. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 417. — Webb. .... Canar. I. p. 167. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 215.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 318: g. Amarantear.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 547: g. Paronychidear. verar.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 156: g. Illecebrear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 367. — Bartl. 1830. Ord. p. 302. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 86. — Koch 1836. Syn. p. 254. Ed. II. p. 279. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 238. — Meisn. 1838. Gen. p. 132 (96). — Kunth 1838. Berol. I. p. 144. (legitimar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 104. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 611.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 929. n. 1096: g. Chenopodiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4269: g. Polycarpear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Illecebrinear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 228. n. 1200: g. Chenopodear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 998.
Link 1831. Hdb. II. p. 421: g. Paronychiacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 235: g. Herniariar.
Endl. 1839. Gen. n. 5198. p. 957; 1841. Ench. p. 504: g. Euparonychiear. — Par. Fenzl 1844 in Ledeb. Ross. II. p. 159.
Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6278: g. Herniariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebraceear.
Synon. Camphorata Hall.?

Herniariae Rchb. 1837. Handb. p. 235: sect. Illecebrear. Gen.: Herniaria, Gymnocarpum, Anychia, Illecebrum, Paronychia, Cardionema.

Herniarieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 162: sect. Illecebrear. Gen. Euparonychiear. Endl.

Herodieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 201: sect. Geraniear. genuinar. Gen.: Herodium, Geranium.

Herodium Rchb. 1841. Nomencl. p. 201. n. 7652; 1844. Fl. sax. p. 427: g. Herodiear.
= Erodium L'Herit.

Herorchis*) Lindl. 1835. Orchid. gen. p. 259. 266: sect. Orchidis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1507 *b.* p. 208; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1845. 2; 1844. Fl. sax. p. 83. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 356.
Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 284: subsect. Euorchidis.

Herpestes Link 1822. En. II. p. 142: g. Personatar.
Kunth 1823. Syn. II. p. 24: g. Scrophularinar. — Par. Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 18. (Flora Lit. I. p. 3.) Char. emend. — Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 106.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 801. n. 2173: g. Scrofularinar.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3155: g. Antirrhinear.
Cham. 1833. Linnaea VIII. p. 32: g. Scrofularinear. (*Synon. Bramia Mart.*)
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: g. Gratiolear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3940. p. 681; 1841. Ench. p. 339. Sect.: Matourea, Caconapea, Bramia. — Meisn. 1840. Gen. p. 311 (222). Sect. ut Endl. et Ranaria. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. (restrict.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 60. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 361. 517. — Walp. 1845. Rep. III. p. 278. Sect. ut Endl.
= Herpestis Gärtn. f.

Herpestis**) Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 186. t. 214. f. 6. (rotundifolia. — An Monniera rotundifolia Michx.?)
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 441. Ed. Nees p. 297: g. Scrophularinar. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 366. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 747.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 398; 1831. Gen. II. p. 480. n. 2415: g. Scrofularinar.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 42: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Roth 1821. Nov. spec. p. 289.
Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 97: g. Scrophulariar.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 218: g. Scrophularinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111: g. Gratiolear. — Par. Benth. 1835. Scroph. rev. p. 3; 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 55. Sect. (1836): Matourea, Caconapea, Bramia. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 544. — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4612. Sect.: Matourea, Caconapea, Herpestis.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 392; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Eugratiolear. Sect.: Mecardonia, Mimuloides, Euher-

*) ἥρως, heros, eques.
**) ἑρπηστής, serpens, repens.

Herpestis Gärtn. cont. pestis, Chaetodiscus, Bramia. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 684.

Synon. Herpestes Link; Moniera P. Browne; Monniera Pers.; (Monneria Steud.); Septas Lour.; Heptas Meisn.; Hydrotrida Willd. (Steud.)

Herpetacanthus*) Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 93; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 365: nov. g. Gendarussear.

Synon. Schultzia Nees.

Herpetica DC. 1825. Prodr. II. p. 492: sect. Cassiae. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 56. — Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4135*f*. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 360. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 438. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 287.
Vogel 1837. Linnaea XI. p. 665: subsect. Chamaefistulae. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6781*b* γ. p. 1316; 1841. Ench. p. 674.
Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6083. 6 *b*: subsect. Chamaecassiae.

Herpetium**) Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 101: g. Trichomanoidear. — Par. Nees 1838. ibid. III. p. 27; IV. p. XXIV. (Injungitur Mastigophora.) Sect.: Lepidozia, Mastigobryum. — Endl. 1841. Spl. I. n. $472/_{19}$. p. 1342; 1841. Ench. p. 28. Sect. eaed. — Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 818. Sect.: Herpetium, Lepidozia.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 92: g. Jungermanniear.
Lindl. 1847. Vég. kd. p. 60: g. Trichomanidar.

= Lepidozia et Mastigobryum Nees.

Herpetium Wittst. vid. *Erpetion DC.*

Herpetospermum Wall. ex Steud. Nomencl. I. p. 753: g. Cucurbitacear. (H. caudigerum.)

Conf. Hepetospermum Wall., Spach.

Herpetrichum Agardh vid. *Herpotrichum Fries.*

Herpicium Rchb. vid. *Hirpicium Cass.*

Herpochaeta Montagne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 305 (Voy. Bonite. Bot. p. 11): nov. g. pro Caulerpa flagelliformi Ag. et fastigiata Mont. conditum.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: g. Caulerpear. — Par. Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 494. n. 310. — Trevis. 1849. Linnaea XXII. p. 135.

Herpodium Wittst. vid. *Erpodium Brid.*

Herpodon „C. Müll." Montagne 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 403: g. Muscor. minus cognitum.

Herpolirion Hook. f. 1853. Fl. New-Zeal. I. p. 258: nov. g. Liliacear., Stypandrae aff. (H. Novae-Zelandiae.)

Herposiphonia Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 104; 1843. Phycol. gener. p. 417; 1845. Phycol. germ. p. 313; 1849. Sp. Alg. p. 804: sect. Polysiphoniae.

*) ἑρπετός, serpens.
**) ἕρπω, serpo, repo.

Herposteiron „Nägeli mss." Kütz. 1849. Spec. Alg. p. 424. n. 261: nov. g. Confervear.

Herpothricum Fries vid. *seq.*

Herpotrichum Fries 1819. Novit. fl. suec. V. p. 79 (*Herpothricum*): nov. g. Fungor.
Agdh. 1821. Aphor. p. 81 (*Herpetrichum*): g. Byssacear. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 1.; 1842. Mycol. p. 3.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 544: g. Byssinear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 55: g. Byssaceor. germinatorior.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.

Protonema Agdh.

Herpysma*) Lindl. 1833. Bot. Regist. XIX. n. 1618: nov. g. Neottiear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 215. n. 1568. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2135. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 506; 1847. Veg. kd. p. 183: g. Physuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1580.
Meisn. 1842. Gen. p. 387 (289): g. Physuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 21.

Herrania**) Goudot 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 229: nov. g. inter Guazumam et Theobromam intermedium. (H. albiflora et pulcherrima.)
Walp. 1846. Rep. V. p. 111: g. Büttneriear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 62. n. $5333/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: g. Byttnerear.
Karsten 1856. Linnaea XXVIII. p. 446. Char. emend.

Synon. Brotobroma Karst. & Tr.

Herraria Ritg. vid. *Herreria Ruiz & Pav.*

Herrera Adans. 1763. Fam. II. p. 158: g. Caprifolior.

= Erithalis P. Browne.

Herreria***) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 48. t. 35; 1802. Fl. peruv. III. p. 69. t. 303: nov. g. Hexandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 374. n. 822.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 103: g. Smilacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 242. n. 984. — Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1334. — Griseb. 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. IV. p. 23.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 230; 1825. Syst. II. p. 91. n. 1251; 1830. Gen. I. p. 260. n. 1356: g. Asphodelear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 163. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXIX. 363. — Bartl. 1830. Ord. p. 51. (descisc.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1113.
Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 101: g. Asparaginear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 132 (*Herraria*): g. Medeolear.

*) ἕρπυσμός, reptatio.
**) Dicat. generali Herran, Novae Granadae praesidenti.
***) Dicat. Ildefonso de Herrera, prof. Salamanc.

Herreria Ruiz & Pav. cont.
Endl. 1837. Gen. n. 1195. p. 156; 1841. Ench. p. 90: g. Herreriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1740. — Kunth 1850 in Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 43; 1850. Enum. V. p. 291.
Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306): g. Uvulariear.?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 19: g. Hyacinthinear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 200: g. Dioscoreis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Anthericear.
Synon. Salsa Feuill.

Herreriaceae „Kunth mss." Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 646: ordo Coronariar.

Herrerieae Endl. 1837. Gen. p. 156; 1841. Ench. p. 90: fam. Smilaceis aff. Gen.: Herreria.
Rchb. 1841. Nom. p. 48: subdiv. Convallariear. Gen. id.
Kunth 1850. Enum. V. p. 290: fam. Monocotyledonum. Gen.: Herreria, Clara.

Herrmannia Link vid. *Hermannia Linn.*

Herschelia Lindl. 1838. Orchid. gen. p. 362: nov. g. Ophrydear. (Disa graminifolia Ker.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1537/5. p. 1366; 1841. Ench. p. 112. — Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1887. — Meisn. 1842. Gen. p. 381 (285). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 180.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Disidar.

Herschellia Bowdich 1825. Mader. p. 252.
Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3301: g. Solanear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 57.
Bartl. 1830. Ord. p. 194: g. Solanacear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 389: sect. Physalidis. (Ph. pubescens L. et latifolia Lam.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 201: g. Physalidear. (serius in Nomencl. *Pentaphiltrum* nominatum.)
= Physalidis Linn. pars.

Hertelia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 345. n. 1140: nov. g. Cyrtosiphytor., ab Hernandia sejunctum.
= Hernandia Linn.?

Hertella Steud. Nom. I. p. 753: vid. *praeced.*

Hertia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 8. n. 11: nov. g. Actinophytor., ab Othonna L. separatum. *Cf.* Cass. 1821. Dict. v. 21. p. 103.
= Euryops Cass.?

Hertia Lessing 1831. Linnaea VI. p. 94; 1832. Syn. Compos. p. 88: g. Othonnear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 483. — Meisn. 1839. Gen. p. 222 (138). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 33.
Endl. 1838. Gen. n. 2828*c*. p. 463; 1841. Ench. p. 245: sect. Othonnae? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3232. 3.

Heruchea*) Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 579: sect. Heucherae. (H. pubescens Pursh.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4639*b*. p. 1416; 1841. Ench. p. 409; 1850. Spl. V. p. 22. — Rchb. 1841. Nom. p. 157. n. 6139. 3. — Walp. 1843. Rep. II. p. 369.

Herverus Gray Arr. brit. pl. I. p. 678: err. pro *Pallavicinius Gray.*

Herverus Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 685 (p. 679 err. *Papa*): nov. g. Jungermannidear. (Jung. furcata et pubescens.)
= Metzgeria Raddi.

Hesioda Flor. Flum. IV. t. 240. (*Hesiodia* perianthomega: g. Decandr. Monogyn. ex Steud. Nom. I. p. 753.)
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 27; 1841. Ench. p. 686: inter genera nondum descripta.

Hesiodia Mönch 1794. Meth. p. 391: nov. g. Petalostemonis. (Sideritis montana L.) *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 104.
DC. 1805. Franç. III. p. 530: sect. Sideritis. — Simil. Benth. 1834. Labiat. p. 582; 1848 in DC. Pr. XII. p. 445. — Koch 1837. Syn. p. 570. Ed. II. p. 656. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 839. — Endl. 1838. Gen. n. 3655*d*. p. 627; 1841. Ench. p. 308. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 145. — Walp. 1845. Rep. III. p. 854. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 695. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 401.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Sideritidear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 327; 1841. Nom. p. 105. n. 4091. 2: sect. Burgsdorfiae.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 166: g. Stachydear.
Rchb. 1844. Fl. sax. p. 204: g. Labiatar.
Synon. Burgsdorfia Mönch.

Hesperantha**) Bell.-Gawl. 1805 in Konig Ann. of bot. I. p. 224: nov. g. Ensatar. (Ixia cinnamomea Thunb., etc.)
Link 1821. En. I. p. 50: sect. Ixiae.
Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 105: g. Iridear. — Par. Ker 1827. Gen. Irid. p. 88. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Endl. 1837. Gen. n. 1245. p. 169; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 160. — Meisn. 1842. Gen. p. 292 (194). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 23.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 148. n. 150; 1830. Gen. I. p. 37. n. 162: g. Spathacear. (Triandr. Monogyn.)
Eckl. 1827. Verz. p. 22: g. Ixiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1205; 1841. Nom. p. 44. n. 1590: g. Ixiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 90.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Hesperanthus Salisb.

Hesperanthemum Endl. 1837. Gen. n. 4087*c*. p. 705; 1841. Ench. p. 344: sect. Eranthemi.
= Anthacanthus Nees.

*) Anagramma vocis Heucherae.
**) ἑσπέρα, vesper.

Hesperanthus Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 321: g. Gladiolear.
= Hesperantha Gawl.

Hesperethusa Römer 1846. Fam. nat. synops. I. p. 31. 38: nov. g. Limoniear. (Limonia mauritiana.)

Hesperideae Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: ordo 41 plant. Gen.: Citrus, Styrax, Garcinia.

Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 19 plant. Gen. §. 1: Eugenia, Psidium, Myrtus, Caryophyllus. §. 2: Philadelphus? — Par. Gis. 1792. Prael. p. 346. Gen. ead. et (ad §. 1) Calyptranthes, Legnotis.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 152: ordo 13 class. XIII. Gen. §. 1: Ximenia, Heisteria. §. 2: Murraya, Cookia, Citrus, Limonia. §. 3: Thea. *Cf.* Cassel 1810. Nat. fam. p. 150 et Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 107.

Batsch 1802. Tab. p. 53: fam. Adonariarum. Gen.: Chalcas, Bergera, Murraya, Coockia, Citrus, Limonia, Craspedum, Ternstromia, Tonabea, Thea, Camellia, Glabraria, Ximenia, Heisteria, Fissilia, Winterania, Symphonia, Myrodia, Vateria, Vatica, Allophylus, Tinus, Geruma, Aitonia, Quivisia, Turraea, Ticorea, Sandoricum, Portesia, Trichilia, Elcaja, Guarea, Ekebergia, Melia, Aquilicia, Swietenia, Cedrela.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 33. t. 77. Gen. §. 1: Ximenia, Heisteria, Fissilia, Triphasia. §. 2: Chalcas, Bergera, Murraya, Cookia, Citrus, Limonia. §. 3: Ternstromia, Tonobea, Thea, Camellia.

DC. 1805. Franç. IV. p. 859: fam. (88) Dicotyledonum. Gen.: Citrus.

DC. 1819. Théor. élém. p. 245: ordo Thalamiflorar.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: fam. Thalamisertiae.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LV: series Idiocarpicar. Fam.: Malpighiaceae, Guttiferae (p. LXVII Hypericineae), Aurantiaceae.

Rchb. 1828. Consp. p. 211; 1832. Fl. exc. p. 840: fam. Aurantiiflorar. Divis.: Leeaceae, Melieae, Aurantiaceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 312; 1841. Nom. p. 212. Divis.: Melieae, Humirieae, Aurantieae.

Brongn. 1843. Én. genr. p. XXIV. 85: class. Dialypetalar. hypogynar. Fam.: Aurantiaceae, Cedreleae, Meliaceae, Ximenieae, Nitrariaceae, Erythroxyleae.

Hesperides Nees & Mart. 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 38: ordo plant. Novum gen.: Helleria.

Endl. 1840. Gen. p. 1039; 1841. Ench. p. 542: class. Acramphibryor. Dialypetalor. Ord.: Humiriaceae, Olacineae, Balaniteae, Aurantiaceae, Meliaceae, Cedrelaceae.

Meisn. 1843. Gen. p. 439: class. X. Diplochlamydear. Ord.: Humiriaceae, Olacineae, Melioideae, Aurantiaceae, Ampelideae.

Hesperidium DC. 1824. Prodr. I. p. 188: sect. Hesperidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4806*a*. — Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 114. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 202. — Endl. 1839. Gen. n. 4903*a*. p. 874; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 171.
Synon. Hesperis Andrz., DC. syst.

Hesperidopsis DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 238; 1821. Syst. II. p. 484: sect. Sisymbrii.
= Dontostemon Andrz.

Hesperinae Rchb. 1837. Handb. p. 260: sect. Sisymbrear. Gen.: Malcolmia, Deilosma, Hesperis, Leptaleum; Heliophila, Chamira?

Rchb. 1841. Nom. p. 182: sect. Sisymbriear. Gen.: Hesperis, Malcolmia, Leptaleum, Deilosma, Plagioloba, Alliaria.

Hesperis*) Tourn. 1700. Inst. p. 222. t. 108: g. pl. class. V.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 70. Ed. Hall. 1745. p. 77: g. pl. class. IV.

Linn. 1737. Gen. p. 195. n. 538; 1737. Cliff. p. 335; 1740. Syst. p. 27; 1748. Ups. p. 187; 1753. Sp. II. p. 663; 1759. Syst. ed. X. p. 1134. n. 731; 1763. Sp. ed. II. p. 927; 1764. Gen. ed. VI. p. 340. n. 817; 1767. Syst. ed. XII. p. 442: g. Tetradynam. Siliquos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 501; 1784. Syst. p. 599. — Reich. 1778. Gen. p. 341. n. 881. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 443. n. 1093. — Gmel. 1791. Syst. p. 986. — Pers. 1797. Syst. p. 636. — Willd. 1800. Sp. III. p. 540. n. 1242; 1809. En. p. 683. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 69. — Link 1822. En. II. p. 167.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 563: g. Tetrapetalar. cruciatar.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 65. n. 270: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 256.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gmel. 1768. Sibir. III. p. 258. — Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 31. — Hill 1769. Ht. kew. p. 172[19]. — Scop. 1772. Carn. II. p. 29; 1777. Intr. p. 317. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 493. — Pers. 1807. Ench. II. p. 202. n. 1571. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 717; 1825. Syst. II. p. 899. n. 2320; 1831. Gen. II. p. 522. n. 2571. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 378. — Bartl. 1830. Ord. p. 265. — Link 1831. Hdb. II. p. 303. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 388. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 703. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 245.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 238. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 502. — DC. 1805. Franç. IV. p. 651; 1815. V. p. 589. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 122. (Verm. bot. Schr. V. p. 66.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 682. — Lois. 1822. Dict. v. 24. p. 266 (*Julienne*).

---

*) Nomen ex Plinis.

Hesperis Tourn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 418: g. Erucar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 331.
Neck. 1790. El. III. p. 78. n. 1403: g. Styridophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 102: g. Cheiranthoidear.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 237; 1821. Syst. II. p. 446; 1824. Pr. I. p. 188: g. Sisymbrear. Sect.: Hesperidium (1821 Hesperis), Deilosma. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 72. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1103. 1166; 1828. Consp. p. 185. n. 4806 (sect. ut DC. 1824); 1832. Fl. exc. p. 685 (sect. ut DC. 1821). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 202. Sect. ut DC. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 112. Sect. eaed. et Arabidium, Plagioloba. — Koch 1836. Syn. p. 46. Ed. II. p. 49. — Meisn. 1837. Gen. p. 13 (12). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 90.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Erysimear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 182. n. 7014: g. Hesperinar.
Endl. 1839. Gen. n. 4903. p. 874; 1841. Ench. p. 449: g. Sisymbriear. Sect. ut Meyer. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 171. Sect. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 91.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Sisymbridar.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 82: g. Cheiranthear.

Hesperis „Andrz. mss." DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 237; 1821. Syst. II. p. 447: sect. Hesperidis. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1166; 1832. Fl. exc. p. 685.
= Hesperidium DC.

Hesperocodon Webb & Berth. . . . . Phyt. Canar. III. p. 6: sect. Specularidae.
= Dysmicodon Endl.

Hesperocrinum Römer 1847. Fam. nat. synops. IV. p. 11. 77: sect. Crini. (C. cruentum Ker, etc.)

Hesperomeles Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. sub n. 1956: nov. g. Pomear.
Endl. 1840. Gen. n. 6348. p. 1238; 1841. Ench. p. 656: g. Pomacear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6533. — Meisn. 1843. Comm. p. 354. — Walp. 1843. Rep. II. p. 56. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 560. — Römer 1847. Fam. nat. III. p. 104. 225. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 670.

Hesperoscordium Kunth, Spach vid. *seq.*

Hesperoscordon Hook., Rchb. vid. *seq.*

Hesperoscordum Lindl. 1829. Bot. Regist. XV. n. 1293 not.: nov. g. ex typo Brodiaeae grandiflorae Nutt.
Endl. 1837. Gen. n. 1110. p. 142; 1841. Ench. p. 83: g. Agapanthear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1837 (*Hesperoscordon*).
Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 185 (*Hesperoscordon*): g. Asphodelear.

Hesperoscordum Lindl. cont.
Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302): g. Hemerocallidear.
Kunth 1843. Enum. IV. p. 464 (*Hesperoscordium*): g. Alliear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 255 (*Hesperoscordium*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Scillear.

Hesperothymus Benth. 1834. Labiat. p. 371; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 223: sect. Micromeriae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 776. — Endl. 1838. Gen. n. 3616 *a*. p. 618; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4122. 2. — Walp. 1845. Rep. III. p. 718.

Hessea*) Berg 1826. Linnaea I. p. 252: nov. g. ex typo Crini tenelli Jacq.
Eckl. 1827. Verz. p. 8: g. Spathacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1240: g. Amaryllear.
Bartl. 1830. Ord. p. 46: g. Amaryllidear. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. XLVII. 787. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 340.
= Carpolyza Salisb.

Hessea Herbert 1837. Amaryll. p. 78. 289: g. Amaryllidear. Amaryllidiformium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Amaryllear.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 7. 26: g. Galanthear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 630: g. Haemanthear.

Hetaeria**) Blume 1828. Fl. jav. Praef. p. VII: nomen emendat. pro *Etaeria Bl.*
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 725: g. Physuridar. Sect.: genuinae, Cystorchis, Vrydagzynea.

Hetaeria Endl. 1837. Gen. n. 1060. p. 133; 1841. Ench. p. 77; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 45: nov. g. Philydrear. (Philydrum pygmaeum R. Br.) — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 380. — Meisn. 1842. Gen. p. 406 (310).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 186: g. Philydracear.

Heteracea Steud. Nom. vid. *Heteracia F. & M.*

Heterachaena „Fres." Meisn. 1843. Comm. p. 363: g. Lactucear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 691.
Conf. Heterachena.

Heterachaena***) Zolling. 1846. Obs. phyt. II. p. 577: nov. g. Umbelliferar.
Anisometros Hassk.

Heterachaenium Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 164: sect. Microlonchi. (M. salmanticus DC. pt.)

*) Dicat. P. Hesse, peregrinatori.
**) ἑταιρία, consortium.
***) ἕτερος, alter, diversus.

Heterachena Fresen. . . . . Mus. Senkenb. III. p. 74.
Endl. 1842. Spl. II. p. 50. n. 3004/3: g. Lactucear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Conf. Heterachaena Meisn.

Heterachthia*) Kunze 1850. Bot. Zeit. p. 1: nov. g. Commelynacear. (H. pulchella.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 658 (*Heterachtia*).

Heteracia Fisch. & Meyer 1835. Ind. sem. h. Petrop. p. 29: nov. g. Lactucear. (H. Szovitsii). *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. V. 1836. p. 121; Linnaea X. Litt. p. 92 et Steud. Nom. I. p. 755 (*Heteracea*). — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 178. — Meisn. 1839. Gen. p. 236 (144). — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 830.
Endl. 1838. Gen. n. 3024. p. 501; 1841. Ench. p. 251: g. Hieraciear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6: g. Crepidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3724: g. Picridiear.

Heteractis DC. 1837. Prodr. VI. p. 468: nov. g. Othonnear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2826. p. 462; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 222 (138). — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3230. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32: g. Doronicear.

Heteractis Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 236; 1845. Phycol. germ. p. 186; 1849. Spec. Alg. p. 334. n. 228: nov. g. Rivulariear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 67: g. Nostochinar. genuinar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.

Heterandra Palis. . . . . Amer. phil. trans. IV. p. 173. (H. reniformis.)
= Heteranthera Ruiz & Pav.

Heterangium Corda 1845. Fl. d. Vorw. p. 22. t. 16: g. Sagenariacear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 95: g. Psaroniear.

Heterantha G. Don, Dietr. vid. *Heteranthia Nees & Mart.*

Heteranthelium Hochstett. 1843 in Kotschyi pl. Halep. (c. diagn.): nov. g. ex typo Elymi piliferi Russ.
Jaub. & Spach 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 358 (Ill. pl. or. IV. t. 318): g. Hordeacear. *Cf.* Hochstett. 1856. Flora I. p. 23. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 785.
Steud. 1854. Glum. I. p. 201: g. Pappophorear.

Heteranthemis Schott 1818 in Oken Isis p. 821.
= Pinardia Cass.

*) ἄχθος, moles, tristitia. (?)

Heteranthera Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 9. t. 2; 1798. Fl. peruv. I. p. 43. t. 71: nov. g. Triandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 108 et Poir. ibid. p. 109. — Par. Willd. 1801. Schr. Berl. nat. Fr. III. p. 438.
Pers. 1805. Ench. I. p. 56: sect. Leptanthi.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 140: g. Amaryllideis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 29. 356.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 265: g. Pontederear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 273. — Agdh. 1823. Aphor. p. 169. — Rasp. 1827. Mém. Mus. XIV. p. . . . . Char. reform. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 41. n. 188. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 176. — Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1524.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 170. n. 181: g. Hydrocharidear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1165: g. Ephemerear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: g. Pontederiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 51: g. Asphodelear. descisc., Commelinaceis aff.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Ornithogalear.
Endl. 1837. Gen. n. 1087 *b.* p. 138; 1841. Ench. p. 81: sect. Heterantherae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 206; g. Pontederacear.
Synon. Heterandra Palis.

Heteranthera Vahl. 1806. Enum. II. p. 42. n. 93: g. Triandr. Monogyn, latius circumscriptum.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 266: g. Hydrocharidum.
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 344. 487. n. 141: g. Amaryllidear.
Mart. 1824. Nov. gen. I. p. 7. t. 3: g. Pontederear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 257.
Endl. 1837. Gen. n. 1087. p. 138; 1841. Ench. p. 81: g. Pontederacear. Sect.: Leptanthus, Heteranthera.
Meisn. 1842. Gen. p. 398 (300): g. Pontederiacear. — Par. Kunth 1843. Enum. IV. p. 119. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 87.
Synon. Leptanthus Pers.; Buchozia Fl. Flum.

Heteranthesia Benth. 1834. Labiat. p. 425; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 414: sect. Scutellariae. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 436 (*Heteranthesis*). — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 792. — Endl. 1838. Gen. n. 3626 *b.* p. 621; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4167. 4. — Walp. 1845. Rep. III. p. 749.

Heteranthesis Wittst. vid. *praeced.*

Heteranthia Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 41. t. 3: nov. g. Primulear. (H. decipiens.) — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 284. n. 2389.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 219 (sph. *Hateranthia*): g. Scrophularinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3102: g. Buchnerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 171: g. Veronicear.

Heteranthia Nees cont.
Benth. 1835. Seroph. rev. p. 4: g. Gratiolear.? — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 501. 551 *(Heterantha)*. — Endl. 1839. Gen. n. 3955. p. 684; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Meisn. 1840. Gen. p. 311 (222). — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4595. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 361 (522 *Heterantha*). — Walp. 1845. Rep. III. p. 297.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: g. Brunsfelsiear. — Par. Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. 166.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 201; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Salpiglossidear.
Synon. Vrolikia Spreng.; Vrolickia Steud.

Heteranthus Bonpl. mss. teste Cassini 1821. Dict. v. 21. p. 110.
= Homoianthus DC.

Heterelytron Junghuhn 1840 in Hoev. & Vriese Tijdschr. VII. p. 294: nov. g. Graminear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 436 *(Heterelytrum)*. — Par Endl. 1842. Spl. II. p. 9 (dubium). — Meisn. 1843. Comm. p. 329.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: inter gen. Graminacear. dubia.
Steud. 1854. Glum. I. p. 403: g. Andropogonear.
Anderss. 1856. Nov. Act. Ups. ser. tert. II. 1. p. 232: sect. Anthistiriae. *Cf.* Flora 1857. p. 39.
Synon. Perobachne Presl.

Heterelytrum Wittst. vid. *praeced.*

Heterembelia A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 81; 1844. Prodr. VIII. p. 86: sect. Embeliae.

Heteroblemma Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. 2. p. 19: sect. Medinillae. (M. alternifolia Bl.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 604.

Heterocalyx G. Don, Rchb. vid. *Heterocylix Benth.*

Heterocanscora Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 155; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 65: sect. Canscorae.

Heterocarpaea Scheele 1848. Linnaea XXI. p. 467: nov. g. Phaseolear., Arachi aff.? (H. texana.)

Heterocarpeae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 99; 1843. Phycol. gener. p. 369; 1845. Phycol. germ. p. 282; 1849. Spec. Alg. p. 638: class. II. Algar. Trib.: Paracarpeae, Choristocarpeae.

Heterocarpella Bory 1825. Dict. class. VIII. p. 180. *Cf.* E. D. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 596.
Turp. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 313. *Cf.* Endl. 1836. Gen. p. 8.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 597: g. Desmidiacear. liberar.
= Cosmarium Corda, etc.

Heterocarpus Wight 1853. Icon. pl. Ind. VI. p. 29. t. 2067: nov. g. Commelynacear. (H. hirsutus et glaber.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 157.

Heterocaryum A. DC. 1846. Prodr. X. p. 144: nov. g. Cynoglossear. (Myosotis echinophora Pall.) — Par. Ledeb. 1849. Ross. III. p. 162.

Heterocentron Hook. & Arn. 1840. Beech. voy. Bot. p. 290.
Endl. 1840. Gen. n. 6202. p. 1211; 1841. Ench. p. 646: g. Rhexiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6710. — Walp. 1843. Rep. II. p. 127. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Meisn. 1843. Comm. p. 355: g. Lavoisierear.
Naud. 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 154: g. Lasiandralium. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 595.
A. Braun & Bouché 1851. Hort. Berol.; 1852. Linnaea XXV. p. 300. Char. emend. *Cf.* Schlechtend. 1852. ibid. p. 324.

Heterochaenia A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 441: nov. g. Wahlenbergiear. (Wahlenbergia? ensifolia A. DC.)
Meisn. 1839. Comm. p. 149: g. Lightfootiear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3079/1. p. 1392; 1841. Ench. p. 266.
Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4039: g. Canarinear. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691: g. Lightfootear.

Heterochaeta*) DC. 1836. Prodr. V. p. 282: nov. g. Erigerear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2330. p. 378; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 186 (126). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Asterear. genuinar.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3267: g. Erigeronear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.

Heterochilum Rchb. f. 1849. Linnaea XXII. p. 850; 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 560: sect. Odontoglossi. (O. nobile n. sp. An novum genus?)

Heterochlamys Turczan. 1843. Bull. soc. Mosc. XVI. (Bot. Zeit. 1844. p. 267 et Flora 1844. p. 121): nov. g. Crotonear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. — Endl. 1850. Spl. V. p. 91. n. 5828/1.
Baill. 1858. Euphorb. p. 374 ad Julocrotonem Mart. refert.

Heterochloa Endl. vid. *seq.*

Heterochroa Bunge 1830 in Ledeb. Fl. Alt. II. p. 131 (Ledeb. Ic. II. t. 158): nov. g. Caryophyllear. (H. petraea.)
Spach 1835. Vég. phan. V. p. 147: g. Silenear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 24 (21).
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Dianthear. genuinar.

---

*) ἕτερος, diversus; χαίτη, seta.

Heterochroa Bunge cont.

Endl. 1839. Gen. n. 5245 *b*. p. 972; 1841. Ench. p. 506; 1843. Spl. III. p. 92 *(Heterochloa)*: sect. Gypsophilae. — Par. Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 291. — A. Braun 1843. Flora p. 383. — Walp. 1843. Rep. II. p. 774.

Jaub. & Spach . . . . Illustr. pl. or. I. p. 25. t. 12. 13.

Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7812: g. Saponariear.

Walp. 1846. Rep. V. p. 79: g. Lychnidear.

Heterocladia Decaisne 1841. Arch. Mus. II. p. 178. t. 5: nov. g. Rhytiphlear. (Delesseria ruscifolia var. firmior Ag.)

Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): g. Heterocladiear.

Endl. 1843. Spl. III. p. 148. n. $122/_{70}$: g. Rhodomelear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 879. n. 584: g. Delesseriear.

Heterocladieae Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98): ordo Choristosporear. Gen.: Heterocladia.

Heterocladium Schimp. 1852. Bryol. eur. V: nov. g. Hypnacear. (Hypnum dimorphum.)

= Tamariscellae Müll. pars.

Heterocladus Turczan. 1847. Bull. soc. Mosc. XX. p. 152: nov. g. Zanthoxylear.? (*cf.* Flora 1848. I. p. 316 et Bot. Zeit. I. p. 436), serius *Heterophylleia* dictum. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 159.

= Coriaria Niss.

Heteroclineae Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 35: trib. Menispermacear. Gen.: Coscinium, Anamirta, Calycocarpum, Odontocarya, Tinospora, Jateorhiza, Burasaia, Chasmanthera, Fibraurea, Parabaena.

Heteroclitae Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 39: div. Cupulator. Gen.: Solenia, Cyphella.

Heterocodon Nuttall 1843. Amer. phil. trans. n. ser. VIII. p. 255: nov. g. Campanulacear. (H. ramiflorum.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1050.

Heterocoma DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 155. 191: nov. g. Carduacear. (Serratula alba et bifrons DC. ap. Pers.)

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 537; 1826. Syst. III. p. 393. n. 2657; 1831. Gen. II. p. 607. n. 2992: g. Cynarear.

Cass. 1821. Dict. v. 21. p. 114; 1828. v. 57. p. 341; 1830. v. 60. p. 586: g. Vernoniear. (1828 Archetypar. verar.) — Par. Less. 1829. Linnaea IV. p. 339; 1832. Syn. p. 146. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 136. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 39. (verar.)

Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2213: g. Eupatorinar.

Heterocoma DC. cont.

DC. 1836. Pr. V. p. 14: g. Heterocomear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2203. p. 357; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 176 (122). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.

Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3867: g. Pacourinear.

Heterocomeae DC. 1836. Prodr. V. p. 14: subdiv. Euvernoniear. Gen.: Pacourina, Heterocoma, Vernonia, Decaneurum, Cyanopsis, Centratherum, Bechium, Stokesia, Platycarpha, Odontocarpha, Webbia, Hoplophyllum, Piptocoma, Distephanus, Strophopappus, Blanchetia, Stilpnopappus, Dialesta, Monosis, Shawia. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 357; 1841. Ench. p. 232. Gen. ead. Accedit 1842 (Spl. II. p. 37) Symblomeria. — Meisn. 1838. Gen. p. 176 (122). Gen. ut DC.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709: subtrib. Vernoniacear. Gen. Heterocomear. et Albertiniear. Endl. et Leucopholis.

Heterocylix Benth. 1832. Labiat. p. 39; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 69: sect. Plectranthi. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 679 *(Heterocalyx)*. — Endl. 1838. Gen. n. 3575 *c*. p. 609; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4139. 3 *(Heterocalyx)*. — Walp. 1845. Rep. III. p. 506.

Heterodanaea Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 298: nov. g. Danaeacear. (Danaea stenophylla Kunze.)

Heterodendron Spreng. 1825. Syst. II. p. 356. n. 1672; 1830. Gen. I. p. 369. n. 1865: g. Terebinthear. (Decandr. Monogyn.) — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1516.

DC. 1825. Pr. II. p. 92: g. Terebinthacear. minus notum.

Rchb. 1828. Consp. p. 201. n. 5227: g. Dodonaeacear.?

G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 77: g. Terebinthaceis aff.

Meisn. 1838. Gen. p. 135 (99): g. Sapindacear.? — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5955. p. 1141; 1841. Ench. p. 604.

Rchb. 1841. Nom. (p. 145. n. 5628) p. 196. n. 7470: g. Cneorear.? — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.

Planch. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 261: g. Sapindacear., Cupaniae aff.

= Heterodendrum Desf.

Heterodendrum Desfont. 1818. Mém. Mus. IV. p. 8. t. 3: nov. g. Terebintacear., Cneoro aff. (H. oleaefolium.) — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 116.

Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 365: g. Sapindaceis aff.?

Synon. Heterodendron DC., Spreng., etc.

Heteroderis Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 208; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 384: sect. Barkhausiae. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 326.

Heterodon Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 167: nov. g. Muscor. indicat. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 21. p. 118.

Heterodon Meisn. 1837. Gen. pl. vasc. p. 72 (52): nov. g. Bruniacear. (Brunia superba Don.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4605. p. 808; 1841. Ench. p. 403 (*dubium*). — Walp. 1842. Rep. I. p. 545. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 785.

Synon. Rabenhorstia Rchb.

Heterodonta Nuttall 1841. Amer phil. trans. n. ser. VII. p. 361: sect. Diodontae. *Cf.* Endl. Spl. II. p. 43.

Walp. 1843. Rep. II. p. 615 (*Hederodonta*): sect. Diatontae.

Heterogenei Achar. 1810. Lich. univ. p. 19: div. Idiothalamor. Gen.: Graphis, Biatora; Verrucaria, Endocarpon, Trypethelium.

Achar. 1814. Syn. p. XI: ordo Idiothalamor. Gen.: Graphis, Verrucaria, Endocarpon.

Heterogonium Presl 1850. Epimel. bot. p. 502: nov. g. Polypodiear. (Stenosemia aurita Sm.) *Cf.* Fée 1852. Gen. Fil. p. 357.

= Gymnogramme Desv.?

Heterographa Fée 1825. Méth. lithenogr. p. 16 (Dict. class. VIII. p. 184.)

Rchb. 1841. Nom. p. 16. n. 543 *g:* sect. Opegraphae.?

= Dichaena Fries.

Heterogyne A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 105: sect. Zinniae. (Z. anomala.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 216.

Heterolaena Endl. 1838. Gen. n. 2098 *b.* p. 331; 1841. Ench. p. 209: sect. Pimeleae. — Simil. Endl. 1847. Spl. IV. p. 60. n. 2092 *b.* Subsect.: Euheterolaena, Phyllolaena.

Fisch. & Meyer 1845. Ind. sem. h. Petrop. (Ann. sc. nat. 3e sér. V. 1846. p. 373): g. Pimelear. — Par. C. A. Meyer 1846. Bull. Ac. Pet. IV. p. 72. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 586.

Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 497: subsect. Eupimeleae.

Heterolathus Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 561: nov. g. ab Aspalatho disjunctum. (A. involucrata E. Mey.)

Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 216: g. Genistear.

Heterolepis Cassini 1820. Bull. soc philom. Févr. p. 26; 1821. Dict. v. 21. p. 120; 1823. v. 29. p. 449; 1830. v. 60. p. 573: nov. g. Arctotidear. (Arctotypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2669; 1841. Nom. p. 84. n. 3239. — Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Less. 1832. Syn. p. 58. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. (verar.)

DC. 1837. Pr. VI. p. 496: g. Arctotear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2838. p. 464; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Synon. Heteromorpha Cass.

Heterolepis Bertero mss.

— Senecionis sp. Chilenses.

Heteroloma Desvaux 1813. Journ. bot. III. p. 123: sect. Hedysari. (*Synon. Pleurolobus St. Hil.*)

Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 1993: g. Onobrychear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 411. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 155.

Chaetotricha DC.

Heteroloma Benth. 1844 in Belch. voy. Sulph. Bot. p 83; 1852. Pl. Jungh. II. p. 224: sect. Desmodii. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 525. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 245. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 537.

Heteroloma Basiner 1846. Bull. Ac. Petersb. IV p. 310: trib. Hedysari.

Heterolophus Cassini 1827. Dict. v. 50. p. 247. 250; 1830. v. 60. p. 571: g. Jaceinear. verar. (Centaurea sibirica L.)

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11: subg. Centaureae.

= Psephelli DC. pars.

Heteromauria Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 99. n. 5903 *a:* sect. Mauriae.

Heteromeles Römer 1847. Fam. nat. synops. III. p. 100. 105: nov. g. Pomacear. (Photinia arbutifolia Lindl.)

Heteromelissa Duch. vid. *seq.*

Heteromelisson G. Don, Endl. vid. *seq.*

Heteromelysson Benth. 1834. Labiat. p. 395: sect. Melissae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 784 (*Heteromelisson*). — Endl. 1838. Gen. n. 3617 *g.* p. 619; 1841. Ench. p. 307 (*Heteromelisson*). — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4126. 3. — Walp. 1845. Rep. III. p. 733. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 91 (*Heteromelissa*).

Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 234: sect. Calaminthae.

Heteromerici Körb. vid. *Lichenes Körb.* 1855.

Heteromerineae Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 369: subdiv. Cistinear. Gen.: Crocanthemum, Heteromeris, Taeniostema.

Heteromeris Spach 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 290; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. VI. p. 370: nov. g. Heteromerinear. (Helianthemum ramuliflorum Michx., etc.)

Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 98: g. Cistinear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. III. p. 722.

Lechеoides Dunal pt.

Heteromorpha Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 12: nov. g. Arctotidear. (Arnica inuloides Vahl.)

= Heterolepis Cass.

Heteromorpha Chamisso & Schltd. 1826. Linnaea I. p. 385: nov. g. Umbelliferar. (Bupleurum arborescens L.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 236.

Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3741: g. Smyrniear.

DC. 1830. Pr. IV. p. 134: g. Amminear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 301. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 342. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220 (ge-

Heteromorpha Chamisso cont.
nuinar); 1841. Nom. p. 140. n. 5405. — Meisn. 1838. Gen. p. 142 (103). — Endl. 1839. Gen. n. 4415. p. 772; 1841. Ench. p. 378.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 139: g. Heterospermear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Amminidar.
Synon. Heterosperma Tausch?

Heteromyrtus Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. 5. p. 76: nov. g. Myrtear. (Myrtus umbilicata St. Hil.)

Heteronema Rchb. vid. *Heteronoma DC.*

Heteronemea Fries 1825. Pl. homon. p. 33: div. Nemeor. Classes: Filices et Musci Linn.

Heteronemeae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 82: div. plant. Class.: Filices, Musci, Algae, Fungi.

Heteroneuron Fée 1844. Acrost. p. 96; 1852. Gen. Fil. p. 59 (*Heteronevron*): g. Acrostichear. (1852 emend.) Subgen.: Campium, Poecilopteris.
Synon. Heteroneurum, Campium et Poecilopteris Presl.

Heteroneurum Presl 1850. Epimel. bot. p. 528: nov. g. Acrostichacear. (Nephrodii sp. Presl, Heteroneuri sp. Fée.)

Heteronevron Fée vid. *Heteroneuron Fée.*

Heteronoma DC. 1828. Prodr. III. p. 122; 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 219: nov. g. Rhexiear. *Cf.* Flora Lit. V. p. 118. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4587 (*Heteronema*); 1841. Nom. p. 173. n. 6709. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 747. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 205. — Meisn. 1838. Gen. p. 115 (82). — Endl. 1840. Gen. n. 6201. p. 1211; 1841. Ench. p. 646. Injungitur Pachyloma DC. — Walp. 1843. Rep. II. p. 127. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p. 140. t. 273: g. Melastomacear. (emend.) — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1275. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 118.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 308. n. 1571: g. Melastomear. (Octandr. Monogyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 329.
Naud. 1850. Ann. sc. nat. 3e sér. XIV. p. 151: g. Lasiandralium. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 594.

Heteropappeae DC. 1836. Prodr. V. p. 297: subdiv. Asterear. Gen.: Simblocline, Heteropappus, Phalacroloma, Minuria, Stenactis, Gymnostephium, Charieis, Chaetopappa, Boltonia, Sommerfeltia. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 379; 1841. Ench. p. 234. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 185 (126). Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Asteroidear. Gen. ead. et Perityle.

Heteropappus Lessing 1832. Syn. Compos. p. 189: nov. g. Asterear. (Aster hispidus Thunb.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30. (verar.)

Heteropappus Lessing cont.
DC. 1836. Pr. V. p. 297: g. Heteropappear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2336. p. 379; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 185 (126). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3254: g. Boltoniear.
Schultz Bip. 1843 in Walp Rep. II. p. 951: g. Erigerear.

Heteropectis A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 83: sect. Pectidis. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 212. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 147.

Heteropeziza Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 365: sect. Heterosphaeriae.

Heterophania Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 405: subg. Gnaphalii. (G. dimorphum.)

Heterophlebium Fée 1852. Gen. Filic. p. 139: nov. g. Pteridear. (Pteris grandifolia L.)
Hook. 1858. Sp. Fil. II. p. 201: sect. Pteridis. (*Litobrochia Sm.*)

Heterophragma DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 129 (Rev. Bignon. p. 13); 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 291; 1840 in Meisn. Gen. p. 300 (209); 1845. Prodr. IX. p. 210: nov. g. Catalpear.
Endl. 1841. Spl. I. n. $4118/_1$. p. 1406; 1841. Ench. p. 346: g. Tecomear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4555.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677: g. Bignoniacear.

Heterophycus Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 101: g. Ulvear.
Synon. Desmotrichum Kütz., non Lév.

Heterophylla J. Agardh 1848. Spec. Fuc. p. 296: trib. Arthrophyci.

Heterophylleia Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 1. p. 591: novum nomen pro *Heteroclado Turcz.* propositum. (ob Heterocladiam Decne.)
= Coriaria Niss.

Heterophyllum Bojer mss.
= Büttneria Löfl.

Heteropogon Pers. 1807. Ench. II. p. 533. n. 2031: g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 134. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 53. 835. n. 382. — Link 1829. Hdb. I. p. 93.
Trin. 1820. Fund. p. 203: g. Monoec. Triandr.
Link 1821. En. I. p. 106: g. Graminum.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 543: g. Triandr. Digyn.
Link 1827. Hort. I. p. 237: g. Villiflorar.
Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 969; 1830. Fl. exc. p. 33: g. Saccharinar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 183.
Gaud. 1828. Helv. I. p. 212: sect. Andropogonis. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 950 *d.* p. 108; 1841. Ench. p. 60. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1330. 1. — Steud. 1854. Glum. I. p. 367.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Andropoginear. — Par. Scheele 1844. Flora I. p. 51.

Heteropogon Pers. cont.
Nees 1829. Agrost. Bras. p. 361: g. Saccharinear.
Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. . . .: g. Andropogonear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 770. Ed. II. p. 890. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 474. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Hochst. 1856. Flora I. p. 27. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 492.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 253: g. Andropogineor.

Heteroporus Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 205: sect. Sistotrematis.

Heteropsis*) Kunth 1840. Ber. Ak. Berl. p. 44; 1841. Enum. III. p. 59: nov. g. Callear. (*Dracontium integerrimum* Fl. Flum.?) — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 360 (269). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 41.
Miq. 1844. Linnaea XVIII. p. 79: sect. Monsterae.
= Monstera Adans.

Heteroptera Margot & Reut. ex Steud. Nomencl. I. p. 756: g. Umbelliferar. Quid?

Heteropteris HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 163: nov. g. Malpighiacear. (Banisteria purpurea L.) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 182 — Bartl. 1830. Ord. p. 359. — A. Juss. 1832 in St. Hil. Fl. Bras. III. p. 23. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 149.
DC. 1824. Pr. I. p. 591: g. Banisteriear. Sect.: Heteropteris, Anomalopteris. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII; 1828. Consp. p. 207. n. 5371 (sect. ut DC.); 1837. Hdb. p. 299. — Meisn. 1837. Gen. p. 55 (39). — Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 217 (sect.: Peixotopteris, Chrysoheteropteris, Stenotorus, Stenophyllaria); 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 57. Sect.: Holopetalon, Ptycheteropteris, Euheteropteris. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 371.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48: g. Banisteriar.
Synon. Heteropterys A. Juss.

Heteropteris DC. 1824. Prodr. I. p. 591: sect. Heteropteridis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5371 *a*.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 646: g. Banisteriear.
= Euheteropterys Endl.

Heteropteris Fée 1842. Congr. scient. de Fr. I. p. 178: nov. g. Filicum.
= Paltonium Presl.

Heteropterys A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 273; 1843. Arch. Mus. III. p. 434. t. 14: g. Banisteriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7855. Sect: Peixotopterys, Heteropterys. — Walp. 1846. Rep. V. p. 254.

Heteropterys A. Juss. cont.
Endl. 1840. Gen. n. 5575. p. 1061; 1841. Ench. p. 557: g. Notopterygiar. Sect.: Peixotopterys, Euheteropterys.
A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 261: g. Banisteriar.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 86: g. Malpighiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Banisterear.
= Heteropteris HBK.

Heteroptilis „Meyer mss." Meisn. 1842 in Lond. journ. bot. II. p. 534.
Walp. 1843. Rep. II. p. 938; 1846. V. p. 872: g. Angelicear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 7. n. $4454/_1$.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Angelicidar.

Heteroptycha DC. 1830. Prodr. IV. p. 109: sect. Ptychotidis. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 284. — Endl. 1839. Gen. n. 4400 c. p. 770; 1841. Ench. p. 378. — Rchb. 1841. Nom. p. 140. n. 5384. 3.

Heterorgana Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524) div. 2 plant. Class.: Synorgana sporifera, gymnantha, coronantha, palmacea, dichorganoidea, Dichorgana lepidantha, perianthina, anthodiata, siphonantha, petalantha monocarpa, petalantha polycarpa.

Heterorhachis Schultz Bip. 1842. Flora XXVII. p. 775 (*nomen*); 1847 in Walp. Rep. VI. p. 278: nov. g. Gorteriear.

Heterosciadium DC. mss. olim.
= Petagnia Guss.

Heterosiphonia Mont. 1842. Prodr. Alg. antarct. p. 4; 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: nov. g. Rhodomelear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 46. n. $122/_{58}$. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 817: sect. Polysiphoniae.

Heterosmilax Kunth 1850. Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 36: nov. g. Smilacinear.

Heterosoma Guillem. Arch. bot. I. p. 550 (teste Meisn.) et. A. Juss. vid. *Heterotoma Zucc.*

Heterosperma Cavan. 1794. Icon. III. p. 34. t. 267: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. (*H. pinnata.*) *Cf.* Usteri n. Ann. XVIII. p. 72.
Heterospermum Willd.

Heterosperma Tausch 1834. Flora I. p. 357: g. Heterospermear.
Heteromorpha Cham.?

Heterospermae Tausch 1834. Flora I. p. 356: trib. Moricarpar. Subtrib. unica: Heterospermeae.

Heterospermeae Tausch 1834. Flora I. p. 357: subtrib. Heterospermar. Gen.: Dimetopia, Cranzia?, Heterosperma, Anesorhiza.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 139: trib. Umbelliferar. Gen.: Dimetopia, Heteromorpha, Anesorhiza.

*) ἕτερος, ὄψις: ob adspectum ab Aroideis alienum.

Heterospermum Willd. 1803. Spec. III. 3. p. 2129. n. 1503; 1809. Enum. p. 901: g. Syngenes. Superfl. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 459. n. 1874.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 564; 1826. Syst. III. p. 576. n. 2796; 1831. Gen. II. p. 633. n. 3160: g. Radiatar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 245. t. 583. 584: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 487. — Bartl. 1830. Ord. p. 142. — Brongn. 1843. En. genr. p. 41.
Cass. 1821. Dict. v. 21. p. 128; 1825. v. 38. p. 17: g. Coreopsidear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2612. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19.
Link 1822. En. II. p. 339: g. Corymbiferar.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 320; 1830. v. 60. p. 576: g. Synedrellear.
Less. 1832. Syn. p. 233: g. Verbesinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 632. — Endl. 1838. Gen. n. 2565. p. 417; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 199 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3171. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Synon. Heterosperma Cavan.

Heterosphace Benth. 1833 in Hook. Bot. Misc. III. p. 374; 1833. Labiat. p. 303; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 350: sect. Salviae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 754. — Endl. 1838. Gen. n. 3597 *l.* p. 615; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4144 8. — Walp. 1845. Rep. III. p. 672.

Heterosphaeria Greville .... Scot. t. 103.
Fries 1825. Pl. homon. p. 115: g. Dermeor. (Sphaeria pallida Tode.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 259; 1841. Nom. p. 7. n. 279. — Endl. 1836. Gen. n. 377. p. 32; 1841. Ench. p. 19.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 760. n. 3872: g. Myelomycetum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 35; 1842. Mycol. p. 145: g. Phacidieor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Phacidiaceor. — Par. Bail 1858. Syst. p. 57. t. 19.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 365: g. Patellariaceor. Sect.: Heteropeziza, Heterosphaeria.

Heterosporium Klotzsch 1832. Herb. viv. mycol. Cent. I. n. 67. 69: nov. g. Fungor. (H. maculatum et Ornithogali.)

Heterostalis Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 19: sect. Typhonii. (T. cuspidatum Bl., etc.)

Heterosteca Desvaux vid. *seq.*

Heterostega*) Desvaux 1810. Bull. soc. philom. Déc.; 1813. Journ. bot. III. p. 68 (*Heterosteca*): nov. g. Graminear. (Aristida americana Sw.) *Cf.* Isis 1823. p. 699.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 173; 1822. Syn. I. p. 232: g. Chloridear. — Par. Spreng.

*) ἕτερος, discrsus; στέγη, tectum.

Heterostega Desvaux cont.
1817. Anl. II. 1. p. 170. — Rchb. 1828. Consp. p. 49. n. 872.
Trin. 1820. Fund. p. 162: g. Triandr. Digyn.
Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 9: g. Graminum.
Endl. 1837. Gen. n. 847 *c.* p. 94; 1841. Ench. p. 58: sect. Eutrianae.
Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1321. 3: sect Atheropogonis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Chlorear.
Synon. Enteropogon Nees?

Heterostemma Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 42: nov. g. Asclepiadear. — Par. Decne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 268. (verar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 888.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 132: g. Hoyacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3505. p. 596; 1841. Ench. p. 299: g. Tylophorear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (177). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5045.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: g. Pergulariear.
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 211: g. Ceropegiear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 504.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 630: g. Ceropegiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.

Heterostemon Desfont. 1818. Mém. Mus. IV. p. 248: g. Leguminosar., Tamarindo aff. (H. mimosoides.) — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 129. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 158. n. 2480; 1831. Gen. II. p. 567. n. 2763. (Diadelph. Triandr.)
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 488. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 437. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (70). — Steud. 1840. Nom. I. p. 756 (*Heterostemum*).
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4117; 1841. Nom. p. 155. n. 6097: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88. — Endl. 1841. Gen. n. 6794. p. 1318; 1841. Ench. p. 674.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Amherstiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.

Heterostemon Nuttall mss.
. Primulopsis Torr. & Gray pt.

Heterostemum Nuttall (ubi?)
Onosuris Rafin.

Heterostemum „Juss." Steud. vid. *Heterostemon Desf.*

Heterostomum Fries 1825. Pl. homon. p. 108: subg. Valsae. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 56. p. 458.
Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 277 *a;* 1841. Nom. p. 7. n. 299. 1: sect. Valsae.

Heterostylus Hook. 1840. Fl. bor. Am. II. p. 171. t. 185: nov. g. Naiadum. (H. gramineus.)
= Lilaea Humb & Bonpl.

Heterotaenia Boissier 1840. Voy. Bot. t. 80: nov. g. ex typo Bunii thalictrifolii Boiss. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 375.
Rchb. 1841. Nom. p. 138. n. 5323: g. Scandicinar.
Endl. 1842. Spl. II. p. 69. n. 4517/$_1$: g. Scandicinear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 359. — Walp. 1843. Rep. II. p. 423.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Scandicidar.

Heterotaxis Lindl. 1826. Bot. Regist. XII. t. 1028.
Rchb. 1828. Consp. p. 67. n. 1445: g. Arethusear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 57.
Dicrypta Lindl.

Heterothalameae DC. 1836. Prodr. V. p. 216: subdiv. Amellear. Gen. unicum: Heterothalamus. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 372; 1841. Ench. p. 233. Gen. id. — Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125). Gen. id.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955: subdiv. Euamellear. Gen. id.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709: subtrib. Asteroidear. Gen. id.

Heterothalamus Lessing 1830. Linnaea V. p. 145; 1831. ibid. VI p. 149. 503; 1832. Syn. Compos. p. 205: nov. g. Baccharidear. (Melananthera aliena Spreng.)
DC. 1836. Pr. V. p. 216: g. Heterothalamear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2295. p. 372; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1839. Gen. p. 183 (125). — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 955. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 30: g. Asterear. verar.
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3308: g. Amellear.

Heterotheca Cassini 1817. Bull. soc. philom. Sept. p. 137; 1821. Dict. v. 21. p. 130: nov. g. Asterear. (Inula subaxillaris Lam.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 44.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 460; 1827. v. 51. p. 460; 1830. v. 60. p. 581: g. Solidaginear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 107. n. 2529. (genuinar.) — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29
DC. 1836. Pr. V. p. 316: g. Heterothecear. Sect.: Chaetactis, Gymnactis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2365. p. 383; 1841. Ench. p. 235. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 187 (127). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 251. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3320. Sect.: Chaetactis, Heterotheca. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 315: g. Chrysocomear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Diplostephiear.
Synon. Calycium Ell.; Diplocoma Don.

Heterotheceae DC. 1836. Prodr. V. p. 316: subdiv. Chrysocomear. Gen. unicum: Heterotheca. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 383; 1841. Ench. p. 235. Gen. id. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 39) Dieteria et

Heterotheceae DC. cont.
1843 (Spl. III. p. 67) Bradburia. — Meisn. 1839. Gen. p. 187 (127). Gen. id. — Rchb. 1841. Nom. p. 86. Gen. id.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710: subtrib. Asteroidear. Gen. ut Endl. 1843.

Heterothecium Flotow 1850. Bot. Zeit. p. 368. 382: nov. g. Lecidinar.
Synon. Megalospora Meyen.

Heterothecium Massalongo 1853. Alc. gen. di Lich. p. 7.
= Brigantiaea Trevis.

Heterotis Benth. 1849. Niger-Fl. p. 347: nov. g. Osbeckiear. Sect.: Heterotis, Cyclostemma, Leiocalyx, Wedeliopsis. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 602. Sect. eaed.

Heterotoma Zuccar. 1832. Flora Beibl. p. 100. *Cf.* Guillem. Arch. bot. I. p. 550 (*Heterosoma*)
Endl. 1838. Gen. n. 3062. p. 512; 1841. Ench. p. 264: g. Lobeliear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 240 (148). — A. DC. 1839. Pr. XII. 2. p. 350. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 416 (*Heterosoma*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Lobelear.
: Myopsia Presl.

Heterotrichum Marsch.-Bieb. 1819. Fl. taur. cauc. III. p. 551: nov. g. Syngenes. Aequal. (Serratula salsa MB. antea.)
Link 1822 En. II. p. 298: g. Acarnacear.
Saussurea DC.

Heterotrichum DC. 1828. Prodr. III. p. 173: nov. g. Miconiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 784. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 206. — Meisn. 1838. Gen. p. 113 (80). — Endl. 1840. Gen. n. 6245. p. 1218; 1841. Ench. p. 647. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1460. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6753. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4633: g. Blakeacear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 340. n. 1718: g. Melastomear. (Decandr. Monogyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 330.
Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 85: g. Clidemiear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 771.

Heterotropa*) Morren & Decaisne 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 314. t. 10; 1835. Bull. Ac. Brux. II. p. 205: nov. g. Aristolochiear. (Asarum virginicum Thunb.) *Cf.* A. Gray 1842. Lond. journ. bot. I. p. 225. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2161. p. 345; 1841. Ench. p. 218. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 26. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 115. — Dcne 1857. Fl. d. serr. II. 6. p. 99.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 560: g. Asarear.
Meisn. 1841. Gen. p. 334 (246): g. Asarinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 68. n. 2584: g. Asarinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 794: g. Aristolochiacear.

*) τρέπω, verto: ob stamina diverse sita.

Heteroxylon Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 169. 190: g. Cupressinear. foss. (H. Seyferti.)

Heterozonium „Presl" Griseb. Jahresber. f. 1850. p. 385: vid. *Heterogonium Presl.*

Heterozyges Wittst. vid. *seq.*

Heterozygis Bunge 1835. Verz. Alt. Pfl. p. 82 in not. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p 439 (*Heterozyges*).
= Kallströmia Scop.

Heteryta Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 170: nov. g. pro Polemonio dubio L. indicatum.
Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3026: g. Polemoniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 189.
= Eutoca R. Brown.

Hettlingeria Necker 1790. Elem. bot. II. p. 124. n. 803: nov. g. Plyrontophytor., a Rhamno L. disjunctum.
= . . .?

Heuchera*) Linn. 1737. Gen. p. 68. n. 196; 1737. Cliff p. 82; 1740. Syst. p. 20; 1753. Sp. I. p. 226; 1759. Syst. ed. X. p. 950. n. 283; 1762. Sp. ed. II. p. 328; 1764. Gen. ed. VI. p. 125. n. 320; 1767. Syst. ed. XII. p. 198. n. 317: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 220; 1784. Syst. p. 266. — Reich. 1778. Gen. p. 129. n. 349. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 174. n. 447. — Gmel. 1791. Syst. p. 459. — Pers. 1797. Syst. p 279; 1805. Ench. I. p. 290. n. 649. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1328. n. 509; 1809. En. p. 295. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 174.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132: g. Calycostemonis. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 674.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 244: g. Portulacar.
Gled. 1764. Syst. p. 37. n. 140: g. Thalamostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 193: g. Pentapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 229: g. Nomadear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p 177. t. 36. f. 2 (americana).
Juss. 1789. Gen. p. 308: g. Saxifragar.
Neck. 1790. El. II. p 388. n. 1206: g. Ypsoophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 279: g. Saxifragear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 29. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 129. — Hedw. 1806. Gen. p. 184. n. 759. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 647; 1825. Syst. I. p 866. n. 1016; 1830. Gen I. p. 216. n. 1116. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XXII. 215. — Poir. 1821. Dict v. 21. p. 139. — Haw. 1821. Saxifr. en. p. 61. — Link 1821. En. I. p. 287. — R. Brown 1823. App. to Frankl. journ. p. 765. (Verm. bot. Schr. I. p. 544.) — Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4198. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — DC. 1830. Pr. IV. p. 51. — Presl 1831. Rel. Hänk. II. 1. p 56. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 235. t. 79. (verar.) — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 229. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 66. (verar.) — Meisn. 1838. Gen. p. 136 (100). — Endl. 1839. Gen. n. 4639. p. 816; 1841. Spl. I. p. 1416; 1841. Ench. p 409; 1850. Spl. V. p. 22 (sphalm. *Keuchera*). Sect. (1841) ut Torr. & Gray. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 923. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 577. Sect.: Euheuchera. Heruchea, Holochloa, Heucherella. — Walp. 1843. Rep. II. p. 369. Sect. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 107. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 229. — Müll 1858. Ann. bot. V. p. 29.
Bartl. 1830. Ord. p. 312: g. Heucherear.
Rchb. 1837. Hdb. p 230; 1841. Nom. p. 157. n. 6139: g. Mitellear. Sect.: Heucherella, Calycianthe, Heruchea, Heuchera.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 568: g. Saxifragacear.

Heuchereae Bartl. 1830. Ord. nat. p. 312: div. Saxifragear. Gen.: Heuchera, Tellima, Mitella, Tiarella, Chrysosplenium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 229; 1841. Nom. p. 157: sect. Saxifragear. Subsect.: Chrysosplenieae, Mitelleae, Vahlieae.

Heucherella Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 581: sect. Heucherae. (H. hispida Hook. & Arn.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4639*d*. p. 1416; 1841. Ench. p. 409; 1850. Spl. V. p. 22. — Rchb. 1841. Nom. p. 157. n. 6139. 1. — Walp. 1843. Rep. II. p. 370.

Heudelotia Guillem. & Perr. 1832. Fl. Seneg. p. 150. t. 39; 1833. Guillem. Arch. bot. I. p. 420: nov. g. Terebinthacear.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 186: g. Sumachinear.
Meisn. 1837. Gen. p. 74 (54): g. Cassuviear.?
— Balsamodendrum Kunth.

Heudusa*) E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 153: nov. g. Genistear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 84 (60).
= Lathriogyna Eckl. & Zeyh.

Heurnia**) „R. Br." Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 488; 1825. Syst. I. p. 841. n. 968; 1827. Cur. post. p. 52; 1830. Gen. I. p. 209. n. 1063: g. Asclepiadear. (Pentandr. Digyn.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 887.
Rchb. 1827 ap Mössl. I. p. XL: g. Stapeliacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3527. p. 599; 1841. Ench. p. 300: g. Ceropegiear.

*) „Dicat. Joh. Heuchero, ex horto Wittenbergensi claro."

*) εὔδουσα, dormiens.

**) Dicat. Justo Heurnio.

Heurnia Spreng. cont.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: g. Pergulariear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 53.
Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5022: g. Stapeliear. genuinar.
= Huernia R. Brown.

Hevea*) Aublet 1775. Guian. II. p. 871. t. 335: nov. g. Monoec. Dodecandr. (H. guianensis.) *Cf.* Duchesne 1805. Dict. v. 6. p. 493 (*Caoutchouc*).
Vent. 1799. Tabl. III. p. 495: g. Tithymaloidear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 367: g. Euphorbiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 326: sect. Siphoniae.
= Siphonia Rich.

Hewardia**) J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 432. t. 16. 17; 1842. ibid. IV p. 161: nov. g Pteridiear., Adianto aff. (H. adiantoides) *Cf.* Hook. Gen. Fil. t. 89.
Meisn. 1843. Gen. p. 432 (332): g. Pteridear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Adiantear. — Par. Fée 1852. Gen. Fil p. 122.

Hewenia „Haw.“ Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3411 *a*: sect. Stapeliae.

Hewittia Wight 1837. Madras journ. ex Linnaea Litt. XII. p. 213: g. Convolvulacear., pro *Shutereia Choisy* (non Wight & Arn.) propositum.
Miq. 1857. Ind. bat II. p. 620: g. Convolvulinar.
= Palmia Endl.

Hexabolus Steud. vid. *Hexalobus A. DC.*

Hexacentris***) Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 78: 1847 in DC. Prodr. XI. p. 60: nov. g Thunbergiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 191; 1841. Nom. p. 110. n. 4305. — Endl 1839. Gen. n. 4029. p. 697; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 293 (202). — Spach 1840. Veg. phan. IX. p. 144. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 368. 583. — Brongn. 1843 En. genr. p. 63. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 769.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Thunbergear.

Hexachlamys Berg. 1855. Linnaea XXVII. p. 345; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 380: nov. g. Eugenioidear. (H. humilis.)

Hexactina Willd. mss.
= Amaioua Aubl.

Hexadesmia Brongn. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 44; 1843. Énum. genr. p. 26: nov. g. Epidendrear. (H. fasciculata.) *Cf.* Lindl. 1842. Bot. Regist. XX. Misc. p. 44.

Hexadesmia Brongn. cont.
Meisn. 1843. Comm. p. 371: g. Dendrobiear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 60. n. 1369. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Laeliadar.
Synon. Hexopia Batem.

Hexadica*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 562. Ed. Willd. p. 687: nov. g. Monoec. Pentandr. (H. cochinchinensis) *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 143.
A. Juss. 1824. Euphorb. p. 60: g. Euphorbiacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5109; 1841. Nom. p 195. n. 7452 (minus notum). — Endl. 1840. Gen. n. 5884. p. 1125; 1841. Ench. p. 589. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 851. n. 3111; 1831. Gen. II. p. 692. n. 3492: g. Tricoccar.
Meisn. 1841. Gen. p. 342 (254): g. Phyllanthear.?

Hexaglottis Vent. 1808. Dec. nov. gen. p. 6. Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 313: g. Witsenear.
= Montbretia DC.

Hexagona „Pollin. Pl. nov. p. 35“ Fries 1838. Epicr. p. 496; 1849. Summ. veg. Scand. II p. 324; 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 100: g. Polyporeor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n 478. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 379 (*Hexagonia*). — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 43; 1842. Mycol. p. 181. — Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 235. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41 (*Hexagonia*). — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 170. — Bail 1858. Syst p. 25. t. 30.
= Platyporus Pers.?

Hexagonia Mont., Lindl. vid. *praeced.*

Hexagonotheca Turczan. 1846. Bull. soc. Mosc. XIX. 2. p 505: nov. g. Tiliacear. (*Cf.* Flora 1848. I. p. 301 et Bot. Zeit. 1848. p. 356) — Par. Walp 1848. Ann. bot. I. p. 111.

Hexalobus A. DC. 1832. Mém. soc. Genèv. V. p. 212: nov. g. Anonacear. *Cf.* Flora Lit. III. p. 115. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 496. — Steud. 1840. Nom. I. p. 757 (*Hexabolus*) — St. Hil. & Tul. 1842. Ann. sc. nat. 2e ser. XVII. p. 133. Char. emend. — A Rich. 1842. Pl. vasc. cub. p. 43.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7301: g. Cardiopetalear.
Endl. 1839 Gen. n. 4718. p. 833; 1841. Ench. p 422: g. Xylopiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 80.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 422: g. Xylopear.

---

*) Nomen caribaeum *Herb.*
**) Dicat. Rob. Heward.
***) ἕξ, sex; κεντρίς, stimulus.

*) ἑξαδικός, senarius: a senis loculis pericarpii.

Hexameria R. Brown 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 26. t. 7: nov. g. Dendrobiear. (H. disticha.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1369/$_1$. p. 1362; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1960. — Meisn. 1842. Gen. p. 370 (278).
Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 656: g. Dendrobidar.
Synon. Blumia Meyer?

Hexandrae Link 1827. Hort. Berol. I. p. 107: fam. Graminear. Gen.: Oryza.

Hexandria Linn. Gen., Syst., Spec. pl. etc., sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. VI. plantar. Ordines: Mono-, Di-, Tri-, Tetra-, Hexa-, Polygynia.

Hexanthera Endl. 1839. Gen. n. 5060 *a a*. p. 917; 1841. Ench. p. 477; 1843. Spl. III. p. 90: subsect. Eucaseariae. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 189. n. 7195. 1. *a*.
Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 110: sect. Caseariae.

Hexanthus*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 195. Ed. Willd. p. 241: nov. g. Hexandr. Monogyn. (H. umbellatus. — An Tomex japonica Thunb.? Willd. in adnot.)
= Tetranthera Jacq.

Hexapetalae Hill 1769. Hort. kew. p. 218: class. 12 herbar. Typus: Lythrum.

Hexapetalae incompletae Hill 1769. Hort. kew. p. 350: class. 26 herbar. Typus: Bulbocodium.

Hexapetalae irregulares Hill 1769. Hort. kew. p. 317: class. 19 herbar. Typus: Commelina.

Hexapetaloideae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: div. Petaloidear. Tribus: Orchideae, Irideae, Burmannieae, Musaceae, Hypoxeae, Amaryllideae, Haemodoraceae, Dioscoreae, Melanthiaceae, Pontedereae, Palmae, Junceae, Asphodeleae, Gilliesieae, Liliaceae, Smilaceae, Restiaceae.

Hexaphyllae Hill 1769. Hort. kew. p. 386: class. 33 herbar. Typus: Scheuchzeria.

Hexapogon Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 329; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 505: sect. Iridis.

Hexaptera Hook. 1830. Bot. Miscell. I. p. 350. t. 72—74: nov. g. Lepidinear. (H. pinnatifida, spathulata et cuneata.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 14 (13). — Endl. 1839. Gen. n. 4935. p. 880; 1841. Ench. p. 450. — Walp. 1842. Rep. I. p. 180.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 796. n. 4125: g. Siliculosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 672.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6939: g. Lepidiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Lepididar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 36. n. 4893/$_1$: g. Cremolobear.
Synon. Dispeltophorus Lehm.?

*) Nomen a flosculis b, calyce b—phyllo inclusis.

Hexapteron Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 623: sect. Lagerströmiae. (L. hexaptera.)

Hexarepalum A. Juss. vid. *Hexasepalum Bartl.*

Hexarrhena Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. 326. t. 45: nov. g. Hordeacear. *Cf.* Flora 1830. II. Erg. Bl. p. 105.
Kunth 1833. Agrost. p. 30: g. Phalaridear. — Par. Meisn. 1843. Gen. p. 415 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Steud. 1854. Glum. I. p. 12.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 131. 237: g. Phalaroidear.
Hilaria HBK.?

Hexasepalum Bartl. 1825 in Reliq. Hänk.; 1830. Ord. nat. p. 210: g. Spermacocear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377. — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2771. (genuinar.) — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 253 (sphalm. *Hexarepalum*).
DC. 1830. Pr. IV. p. 561: g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 623. — Endl. 1838. Gen. n. 3122. p. 527; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119).
Dietr. 1839. Syn. I. p. 481: g. Rubiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Hexastemon Klotzsch 1838. Linnaea XII. p. 220: nov. g. Ericear. (Eleutherostemonum.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 244 (152). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 443.
Benth. 1839 in DC. Pr. VII. 2. p. 700: sect. Eremiae. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 753. n. 4306 *b*; 1841. Spl. I. p. 1411. n. 4306 *d*; 1841. Ench. p. 369. — Rchb. 1841. Nom. p. 126. n. 4892. 4.

Hexastemones Allion. 1761. Misc. Taur. II. p. 56, etc.: vid. *Plantae All.*

Hexisea Lindl. 1834 in Hook. journ. bot. I. p. 7: nov. g. Orchidear., Coelogynae proximum. (H. bidentata.)
Endl. 1837. Gen. n. 1348. p. 190; 1841. Ench. p. 109: g. Pleurothallear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1937. — Meisn. 1842. Gen. p. 368 (277). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 170.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Isochilidar.

Hexodon Duchartre 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 29: sect. Aristolochiae. (A. sericea Benth., etc.)

Hexopea Steud. Nom. vid. *seq.*

Hexopia Bateman mss. (Lindl. 1840. Bot. Regist. Misc. not. p. 46: nomen.) *Cf.* Meisn. Comm. p. 276.
Steud. 1840. Nom. I. p. 757 (*Hexopea*): g. Vandear.
Hexadesmia Brongn.

Hexorima Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 168; 1814. Neog.; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 262: nov. g. Uvulariae aff. (Streptopus roseus Michx.)
Synon. Hekorima Kunth; Hexorina Steud.

Hexorina Steud. Nom. vid. *praeced.*

Hexotrix Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 83): sect. Scirpi. (Sc. mucronatus, lacustris, etc.)

Hexuris Miers . . . . Linn. Trans. XXI. p. 44; 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 323: nov. g. pro *Peltophyllo Gardn.* male constituto.

Miers 1851. Ann. and Mag. VII. p. 327: g. Triuriear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 916.

Heydenia Fresen. 1852. Beitr. z. Mykol. H. II. c. tab.: nov. g. Cytisporeor.?

Heyderia*) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 492: subg. Mitrulae. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 434. 2.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Geoglosseor.

= Geoglossum Pers.

Heydia Dennstädt 1818. Schl. z. Ht. Malab. p. 30: nov. g. ex typo *Idou-Moulli Rheede* IV. t. 18.

= Briedelia Willd.

Heyfeldera Schultz Bip. 1853. Flora I. p. 35: nov. g. Hectorear.

Heylandia DC. 1825. Prodr. II. p. 123: nov. g. Genistear. (Hedysarum latebrosum L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4043; 1841. Nom. p. 151. n. 5888. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 133. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 180. — Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59). — Endl. 1840. Gen. n. 6470. p. 1262; 1841. Ench. p. 668. — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 458. 470.

Spreng. 1827. Cur. post. p. 263; 1831. Gen. II. p. 571. n. 2783: g. Leguminosar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553: g. Borboniear.

Synon. Goniogyna DC.

Heylygia G. Don vid. *Helygia Blume.*

Heymassoli**) Aublet 1775. Guian. I. p. 324. t. 125: nov. g. Octandr. Monogyn. (H. spinosa.) — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 629.

Ximenia Plum.

Heymia Dennstädt 1818. Schl. z. Ht. Malab. p. 35: nov. g. ex typo *Tsjeru-Manneli Rheede* IX. t. 39.

= Dentella Forst.

Heynea***) Roxb. 1813. Bot. Mag. t. 1738; 1819. Pl. Corom. III. p. 56. t. 260: nov. g. Meliacear. (H. trijuga.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 481. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 146. — Bartl. 1830. Ord. p. 356.

DC. 1824. Pr. I. p. 624: g. Trichiliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 212. n. 5515; 1841. Nom. p. 212. n. 8076. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — A. Juss. 1830. Mém. Mus. XIX. p. 234. t. 18. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 685. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 120. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 192. — Meisn. 1837. Gen. p. 49 (36). — Endl. 1840. Gen. n. 5540. p. 1051; 1841. Ench. p. 551. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 85. 107. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 464.

Spreng. 1826. Syst. III. p. 66. n. 2386; 1831. Gen. II. p. 542. n. 2656: g. Meliear. (Monadelph. Decandr.)

Roxb. 1832. Ind. II. p. 389: g. Decandr. Monogyn.

Rchb. 1837. Hdb. p. 313: g. Heyneear.

Heyneeae Rchb. 1837. Handb. p. 313: subsect. Trichiliear. genuinar. Gen.: Heynea, Trichilia, Moschoxylon, Ekebergia, Walsura; Odontandra.

Heynichia*) Kunth 1844. Ind. sem. h. Berol. adnot. p. 8; 1844. Linnaea XVIII. p. 503: nov. g. Malleae aff. (H. malleoides.)

Walp. 1846. Rep. V. p. 373: g. Meliacear.

Römer 1846. Fam. nat. I. p. 87. 116: g. Trichiliear.

Endl. 1850. Spl. V. p. 74. n. $5522/_1$: g. Meliear.

Hiatula Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 27: nov. subg. Agarici e serie Leucosporor.

Mont. 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 106: g. Agaricinor.

Synon. Leptomyces Mont.

Hibanthus Dietr. vid. *Hybanthus Jacq.*

Hibbertia**) Andrew 1800. Bot. Repos. t. 126.

DC. 1818. Syst. I. p. 425; 1824. Pr. I. p. 73: g. Dillenear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 75. — Meisn. 1837. Gen. p. 2 (5). — Endl. 1839. Gen. p. 841. n. 4753. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 424.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 814; 1825. Syst. II. p. 613. n. 1983; 1830. Gen. I. p. 446. n. 2209: g. Dilleniear. (Polyandr. Trigyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 250. — Endl. 1841. Ench. p. 431. n. 4753. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 273. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 35.

Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 151: g. Dilleniacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Link 1831. Hdb. II. p. 376. — Endl. 1837. En. pl. Hügel. p. 3. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 96. — Steud. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 266.

Link 1822. En. II. p. 79: g. Magnoliaceis aff.

Rchb. 1828. Consp. p. 193. n. 4987; 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7276: g. Hibbertiear. (genuinar.)

Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 420: g. Hibbertinear.

Synon. Burtonia Salisb.; Cistomorpha Caley.

*) Dicat. E. F. G. Heyder, pomologo.
**) Nomen caribaeum *Heymassoli.*
***) Dicat. Benj. Heyne, peregrinatori.

*) Dicat. cl. Heynich, Berolinensi.
**) Dicat. Georgio Hibbert.

Hibbertieae Rchb. 1828. Consp. p. 193: subdiv. Dilleniear. Gen.: Pachynema, Hemistemma, Pleurandra, Candollea, Adrastaea, Wormia, Hibbertia, Colbertia, Dillenia, Capellia. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 277. Sect.: *genuinae* (gen.: Hibbertia, Dasynema, Othlis, Wormia; Candollea), Adrastaeariae, Dillenieae genuinae. — Rchb. 1841. Nom. p. 192. Sect.: *genuinae* (gen.: Hibbertia, Schumacheria, Actinidia?, Reifferscheidia, Capellia, Wormia, Candollea), Pachynemeae, Dillenieae genuinae.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413. 419: trib. Dilleniacear. Sect.: Hibbertineae, Adrastaeariae, Dillenineae.

Hibbertineae Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 413: sect. Hibbertiear. Gen.: Burtonia, Hibbertia, Dasynema, Othlis, Wormia, Candollea.

Hibiscaceae Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 130: trib. Malvacear. Novum gen.: Kosteletzkya.

Hibisceae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LXIII: div. Malvacear. Gen.: Lagunaea, Lopimia, Senra, Fugosia, Redoutea, Gossypium, Thespesia, Hibiscus. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 202; 1832. Fl. exc. p. 774; 1837. Hdb. p. 287; 1841. Nom. p. 200. Subdivis.: Lagunaeeae, Ketmieae et (1837) Hymenocalyceae (1841 Thespesieae).
Meisn. 1837. Gen. p. 27 (23): trib. Malvacear. Gen.: Decaschistia, Thespesia, Paritium, Hymenocalyx, Abelmoschus, Hibiscus, Kosteletzkya, Lagunaria, Fugosia, Gossypium, Polychlaena. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 982; 1841. Ench. p. 511. Gen. ead. (exclusis Hymenocalyce et Polychlaena) et Malvaviscus, Serraea. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 77. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. Gen.: Kosteletzkya, Hibiscus, Cremontia, Sabdariffa, Polychlaena, Trionum, Bombycella, Malvaviscus, Fugosia, Serraea, Abelmoschus, Lagunaria, Paritium, Thespesia, Decaschistia, Gossypium. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 614. Gen. ut Endl. — Garcke 1849. Bot. Zeit. Nr. 47. p. 817.

Hibiscoides Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 203. n. 436: g. dubium. (Herm. zeyl. 27.)
= . . . ?

Hibiscus*) Linn. 1737. Gen. p. 207. n. 562; 1737. Cliff. p. 349; 1740. Syst. p. 27: g. Monadelph. Polyandr. — Par. (injuncto Triono) Linn. 1748. Ups. p. 205; 1753. Sp. II. p. 693; 1759. Syst. ed. X. p. 1148. n. 756; 1763. Sp. ed. II. p. 975; 1764. Gen. ed. VI. p. 356. n. 846; 1767. Syst. ed. XII. p. 463. — Murr. 1774. Syst. p. 522; 1784. Syst. p. 628. — Reich. 1778. Gen. p. 355. n. 911. — Lour. 1790. Coch. II. p. 418. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 468. n. 1139. — Gmel. 1791. Syst. p. 1062. — Pers. 1797. Syst. p. 666. — Roxb. 1798. Corom. II. p. p. 48. t. 190; 1832. Ind. III. p. 190. — Willd. 1800. Sp. III. p. 806. n. 1297; 1809. En. p. 735. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 82. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 165. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 49.

Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 232. n. 956: g. Petalostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Columniferor.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Malvar.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 451.

Cavan. 1787. Diss. III. p. 143. t. 50—70: g. Malvacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 273. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 187. — Batsch 1802. Tab. p. 18. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 63. — DC. 1805. Franç. IV. p. 836; 1816. V. p. 626. — Pers. 1807. Ench. II. p. 254. n. 1641. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 800; 1826. Syst. III. p. 100. n. 2441; 1831. Gen. II. p. 556. n. 2720. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 288. — Link 1822. En. II. p. 214; 1831. Hdb. II. p. 360. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 406 (*Ketmie*). — Kunth 1824. Syn. III. p. 255. — DC. 1824. Pr. I. p. 446. Sect.: Cremontia, Pentaspermum, Manihot, Ketmia, Furcaria, Abelmoschus, Bombicella, Trionum, Sabdariffa, Azanza, Lagunaria. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 476. Sect. eaed. exclusis 2 ultimis. — Endl. 1833. Norf. p. 73. — Koch 1836. Syn. p. 132. Ed. II. p. 144. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 235. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 135. — Miq. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 239. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 296. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 28. — Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 177. Nova sectio: Trionastrum.

Neck. 1790. El. II. p. 406. n. 1224: g. Omoplephytor. Sejungitur Petitia.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 250. t. 134.

A. Juss. 1827 in St. Hil. Fl. Bras. I. p. 242: g. Malvear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46 (*Hybiscus*). — Bartl. 1830. Ord. p. 346. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 371.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII; 1832. Fl. exc. p. 774: g. Hibiscear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 27 (23). — Endl. 1840. Gen. n. 5277. p. 982; 1841. Ench. p. 511. Sect.: Furcaria, Ketmia, Trionum, Bombicella. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 437. Sect. ex Endl. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 77. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. (restrict.) — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 173 (*Ketmie*). — Garcke 1849. Bot. Zeit. p. 819. (Revisio sectionum Candolleanar.)

*) Hibiscus veteribus erat herba radicis laudatissimae, de genere sylvestrium malvarum. (Beckmann.)

Hibiscus Linn. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5273; 1837. Hdb. p. 287: g. Ketmiear. Sect. (1828): Manihot, Ketmia, Furcaria, Abelmoschus, Bombycella, Trionum, Sabdariffa. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 200. n. 7642. Sect.: Trionum, Sabdariffa, Furcaria, Bombycella, Hibiscus, Cremontia.
Synon. Ketmia Tourn.

Hibiscus Medic. 1787. Malv. Fam. p. 48: g. Malvar. restrict. Typus: H. spinifex L. Disjunguntur Bombix, Ketmia, Abelmoschus, Trionum, Malvaviscus. *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 191; 1789. Phil. Bot. I. p. 37.
= Polychlaena Don.

Hicorites Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 95. n. $5892/_2$ *a*: sect. Juglanditis.

Hicorius*) Rafin. 1817. Fl. ludov. p. 109; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 260.
= Carya Nutt.

Hicriopteris**) Presl 1850. Epimel. bot. p. 386: nov. g. Gleicheniacear., Mertensiae aff.

Hidalgoa La Llave & Lexarza 1824. Nov. veg. descr. I. p. 15: nov. g. Polygam. Necessar. (Helianthear. — H. ternata.)
= Alcina Cavan.?

Hidalgoa Lessing 1831. Linnaea VI. p. 406; 1832. Syn. Compos. p. 213: nov. g. Silphiear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 511. — Endl. 1838. Gen. n. 2473. p. 401; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 197 (129). — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3021. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18: g. Coreopsidear.

Hidrosia***) E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 89: nov. g. Genistear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 84 (60).
Endl. 1840. Gen. n. 6528. p. 1271; 1841. Ench. p. 669: g. Galegear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5715. — Walp. 1842. Rep. I. p. 660. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 270 (*Hydrosia*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555: g. Rhynchosiear.

Hieraceae D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 306; 1830. Linn. Trans. XVI. 1. p. 174: trib. 1 Cichoracear. Gen.: Hieracium, Hapalostephium, Crepis, Prenanthes, Harpalyce, Chorisma, Andryala, Rothia, Lapsana. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 138.

Hieraceum Hoffm. vid. *Hieracium Tourn.*

Hierachium Hill vid. *praeced.*

Hieracia Rüling 1774. Ord. natur. Tab.: div. Compositar.

Hieracidium DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 247: sect. Dubyaeae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $3027/_1$ *a*. p. 1389; 1841. Ench. p. 251.

Hieracieae Cassini 1822. Dict. v. 25. p. 63: div. Lactucear. Gen.: Hieracium, Schmidtia, Drepania, Krigia, Arnoseris, Hispidella, Moscharia?, Rothia, Andryala. — Par. Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569. Accedunt Prenanthes, Nabalus et 1830 Apatanthus. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7. Gen.: Prenanthes, Lygodesmia, Nabalus, Rea, Schmidtia, Tolpis, Krigia, Fichtea, Microseris, Cynthia, Arnoseris, Apogon, Apatanthus, Andryala.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: subtrib. Cichoriear. Gen.: Hieracium, Drepania, Krigia, Arnoseris, Rothia, Andryala.
Less. 1832. Syn. p. 141: subtrib. Cichoracear. Sect.: *Hieracieae* (gen.: Hieracium, Andryala, Rothia), Picrosieae. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 198. Gen.: Hieracium, Nabalus, Rea, Andryala, Dubyaea, Mulgedium, Anisoramphus, Picrosia, Troximon. — Endl. 1838. Gen. p. 501. Gen.: Rothia, Heteracia, Andryala, Hieracium, Aracium, Mulgedium, Soyeria, Picrosia, Pinaropappus, Dendroseris. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1388 et Ench. p. 251) Dubyaea, Anisorhamphus, Agoseris, 1842 (Spl. II. p. 51) Leucoseris, Galathenium, Malacomeris et 1843 (Spl. III. p. 72) Apargidium. — Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). Gen. ut DC. (Dendroseris loco Reae) et Güntheria, Herbichia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. Gen. ut Endl. 1843. — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 397. Divis.: Tolpideae (p. 397 Hieracieae), Andryaleae.
Rchb. 1841. Nom. p. 95: subdiv. Lactucear. Sect.: Mulgedieae, *genuinae* (gen.: Hieracium, Andryala, Nabalus, Dendroseris, Picrosia, Crinissa, Pyrrhopappus).
Brongn. 1843. En. genr. p. 32: subtrib. Chicoracear. Gen. ex DC.

Hieracioides Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 188: g. Cichoracear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 750.
Mönch 1794. Meth. p. 547: g. Petalostemonis. (Hieracium sabaudum L.)

Hieracioides Frölich 1838 in DC. Prodr. VII. 1. p. 167: sect. Crepidis. (*Synon. Catonia Mönch, Rchb.*) — Par. Ledeb. 1846. Ross. II. p. 826.
Soyeria Monn.

Hieracium*) Tourn. 1700. Inst. p. 469. t. 267: g. pl. class. XIII, ab Auctoribus varie circumscriptum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 183. Ed. Hall. 1745. p. 197: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1721. Act. Ac. Paris. p. 182: g. Cichoracear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 742. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Juss. 1789. Gen. p. 169. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 485. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 374. — DC. 1805. Franç. IV. p. 17;

*) Nomen barbarum.
**) „ἰκρίον, furca."
***) ἱδρώς, desudo; ob totius plantae superficiem exsudantem.

*) ἱέραξ, accipiter. Nomen ex Plinio.

Hieracium Tourn. cont.
1815. V. p. 434. — HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 3. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 420. Sect.: Leontideae, Andryaloideae, Pilosellae, Pulmonariae. — Kunth 1823. Syn. II. p. 353. — D. Don 1825. Nepal. p. 165. — Link 1829. Hdb. I. p. 800. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 65. Sect.: Hieracia, Pseudo-Crepides. — Less. 1830. Linnaea V. p. 132. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 297. — Math. 1853. Belg. I. p. 315.

Linn. 1737. Gen. p. 240. n. 620; 1737. Cliff. p. 387; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 238; 1753. Sp. II. p. 799; 1759. Syst. ed. X. p. 1194. n. 818; 1763. Sp. ed. II. p. 1124; 1764. Gen. ed. VI. p. 402. n. 913; 1767. Syst. ed. XII. p. 522: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 597; 1784. Syst. p. 716. — Reich. 1778. Gen. p. 401. n. 992. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 529. n. 1238. — Hoffm. 1791. Bot. Tasch. p. 278 (*Hieraceum*). — Gmel. 1791. Syst. p. 1176. — Pers. 1797. Syst. p. 755; 1807. Ench. II. p. 370. n. 1773. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1559 n. 1411; 1809. En. p. 821. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 125. — Link 1822. En. II. p. 284.

Linn. 1747. Cl. pl. p. 355; 1751. Phil. bot. p. 29: g. Semiflosculosor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.

Gmel. 1749. Sibir. II. p. 19: g. Semiflosculosar. — Par. Linn. 1764. Ord. nat. — Scop. 1772. Carn. II. p. 104; 1777. Intr. p. 122. — GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 326. — Batsch 1802. Tab. p. 250. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 491.

Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 242. n. 993: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 546. Disjunguntur Catonia et Hieracioides.

Adans. 1763. Fam. II. p. 112: g. Lactucar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 43 (*Hierachium*): g. Ligulatar. — Par. Gärtn. 1791. Fr. II. p. 360. t. 158.

Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Pal. II. p. 463: g. Chicoracear.

Neck. 1790. El. I. p. 48. n. 86: g. Glossariphytor. Sejunguntur Aracium, Miegia, Plancia.

Rebent. 1804. Neom. p. 93: g. Pentandr. Monogyn.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 579; 1826. Syst. III. p. 638. n. 2879; 1831. Gen. II. p. 644. n. 3236: g. Cichorear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 127.

Cass. 1819. Dict. v. 15. p. 37 (*Epervière*): g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 146. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 474. Sect.: Hieracium, Stenotheca.

Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 63; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Hieraciear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Less. 1832. Syn. p. 141. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 198. Sect.: Copholepida, Oxylepida. — Endl. 1838. Gen. n. 3026. p. 501; 1841. Ench. p. 251. — Kunth 1838. Berol. I. p. 389. — Meisn. 1839. Gen. p.

Hieracium Tourn. cont.
237 (145). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 446. — Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3733. Sect.: Pilosella, Hieracium, Oxylepidium. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 32. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 855. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Fries 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 383; 1850. ibid. XIV. p. 1. Series: Pilosella, Aurella, Pulmonarea, Stenotheca, Accipitrina. *Cf.* Bot. Zeit. 1849. p. 803, Flora 1849. II. p. 628 et Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 981-1028. — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 118. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 526. — Griseb. 1853. Abh. Gött. Ges. f. 1852. V. p. 83. Sect.: Pilosella, Pulmonarea. Sejunguntur Chlorocrepis et Schlagintweitia.

Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 405.

Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2150; 1831. Fl. exc. p. 260: g. Crepidear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 443. Ed. II. p. 508.

Tausch 1828. Flora I. Erg. Bl. p. 49. Sect.: Pilosella, Aurella.

D. Don 1829. Edinb. n. phil journ. VI. p. 307; 1830. Linn. Trans XVI. 2. p. 175: g. Hieracear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 140.

Monnier 1829. Essay monogr. (Nancy.) *Cf.* Flora Lit. I. p. 49.

Griseb. 1844. Rumel. II. p. 269: g. Liguliflorar. Sect.: Pilosella, Aurelia, Aphyllopoda.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 6: g. Cichoriacear. Sect.: Accipitrina, Prenanthoidea, Aracium, Pulmonarea, Cerinthella, Pilosella.

Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 343: g. Crepoidear. Sect. ex Fries.

Sentn. 1854. Flora p. 321.

Synon. Pilosella Rupp.; Miegia et Plancia Neck.; Hieracioides et Catonia Mönch.

Hieranthemum*) Endl. 1839. Gen. n. 3752 *a.* p. 646; 1841. Ench. p. 320: sect. Tiaridii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4360. 2.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 31: g. Heliotropiear.

DC. 1845. Pr. IX. p. 555: sect. Heliophyti.

Hiericontis Adans. 1763. Fam. II. p. 421: g. Thlaspium.
= Anastatica Gärtn.

Hierochloa Palis. 1812. Agrost. p. 62: g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 29. 513. n. 284. — Link 1829. Hdb. I. p. 50.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Avenacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 731. — Agdh. 1823. Aphor. p. 149. — Link 1827. Hort. I. p. 126. — Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1039.

Link 182 . En. I. p. 80: g. Graminum. — Par. Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 52. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 92.

*) ἱερός, sanctus.

Hierochloa Palis. cont.
Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 547: g. Triandr. Digyn.
Kunth 1830. Gram. p. 20; 1833. Agrost. p. 35; 1838. Berol. I. p. 363: g. Phalaridear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 774. Ed. II. p. 894. — Endl. 1837. Gen. n. 755. p. 81; 1841. Ench. p. 57. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1 p. 26. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1237. — Brongn. 1843. En. genr. p. 11. — Meisn. 1843. Gen. p. 416 (318). — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 81. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Steud. 1854. Glum. I. p. 13. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 441.
Trin. 1839. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. Bot. p. 79: g. Phalarideor.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 238: g. Phalaroidear.
= Hierochloë Gmel.

Hierochloë*) Gmelin 1747. Fl. Sibir. I. p. 100: nov. g. Graminum. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 67. n. 325.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 208. Ed. Nees p. 64: g. Graminear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 274. n. 291. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 144. t. 23. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 300.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 161: g. Avenacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 53.
Trin. 1820. Fund. p. 120: g. Triandr. Digyn.
Bartl. 1830. Ord. p. 31: g. Saccharinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Avenear.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 406: g. Anthoxanthear.
Math. 1853. Belg. I. p. 600 (*Hierocloë*): g. Agrostidear. verar.
Synon. Hierochloa Palis.; Torresia Ruiz & Pav.; Toresia Pers.; Savastana Schrank; Disarrhenum Labill.; Disarrenum Poir.; Dimesia Rafin.

Hierochontis Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 51; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 40: nov. g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen:* Anastatica syriaca L.)
= Euclidium R. Brown.

Hierocimum Benth. 1836. Labiat. p. LII; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 37: sect. Ocimi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3569 *b*. p. 608; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4133. 2. — Walp. 1845. Rep. III. p. 488. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 939.
Conf. Hierocymum Benth.

Hierocloë Math. vid. *Hierochloë Gmel.*

Hierocymum Benth. 1832. Labiat. p. 11: sect. Ocymi. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 672.
Hierocimum Benth.

Hieronia Flora Flum. V. t. 116 (scabra).
Davilla Vell.

Hieronyma Baillon vid. *Hyeronima All.*

Hieropteris „Presl." Griseb. Jahresber. f. 1850. p. 385: err. pro *Hicriopteris.*

Hieroscymum G. Don Gen. syst. IV. p. 672: sphalm. pro *Hierocymum.*

Hiesingera Endl. vid. *Hisingera Hell.*

Higgensia Steud. Nom. vid. *seq.*

Higginsia Pers. 1805. Ench. I. p. 133. n. 266: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 55. n. 259.
Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 394: g. Rubiacear. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 767 (*Higgensia*).
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2095: g. Cinchonear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 255: g. Gardeniar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 399: g. Gardeniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 510. — Meisn. 1838. Gen. p. 163 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2944. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3288. p. 529; 1841. Ench. p. 274: g. Eugardeniear. — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 133.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.
Synon. Ohigginsia Ruiz & Pav.; O-Higgensia Steud.; Evosmiae sp. Spreng.; Nacibeae sp. Juss.

Higginsia Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 988: g. Rubiacear. (H. macrocarpa et glomerata Bl.)
= Petunga DC.

Hightea Bowerbank 1840. Foss. fruits I. p. 32.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 233; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIII; g. Malvacear. foss.

Hilacium Rchb. vid. *Hylacium Palis.*

Hilairia DC. mss. olim.
Isotypus Kunth.

Hilaria*) HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 116: nov. g. Panicear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 156. — Kunth 1822. Syn. I. p. 189. — Agdh. 1823. Aphor. p. 149.
Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 28. 497. n. 279: g. Graminear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 159. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 304. n. 320. — Rupr. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 247 (dubiae sedis).
Trin. 1820. Fund. p. 202: g. Monoec. Triandr.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 837: g. Cenchrinar.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 71. n. 344: g. Graminum. (Triandr. Digyn.)
Bartl. 1830. Ord. p. 29: g. Hordeacear.

*) Gramen sanctum.

*) Dicat. Aug. de St. Hilaire.

Hilaria HBK. cont.

Kunth 1830. Gram. p. 18; 1833. Agrost. p. 30: g. Phalaridear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 752. p. 81; 1841. Ench. p. 56. — Rchb. 1841. Nom. p. 36. n 1231. — Meisn. 1843. Gen. p. 415 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159. — Steud. 1854. Glum. I. p. 12.

Trin. 1835. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1838). p. 94: g. Andropogineor., post Sorghum inserendum.

Dietr. 1839. Syn. I. p. 131. 236: g. Phalaroidear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.

Synon. Hexarrhena Presl; Symbasiandra Willd. (Steud.)

Hilariana Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 449: sect. Talaumae. (T. Plumierii Sw.)

Hilbertia „Thouin" Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5557: inter genera vix cognita.

Hildbrandtia Nardo vid. *Hildenbrandtia.*

Hildebrandtia Fries, Aresch. vid. *praeced.*

Hildegardia*) Schott & Endl. 1832. Melet. bot. p. 33: nov. g. Sterculiear. (Sterculia populifolia Roxb.) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 31 (25). — R. Brown 1844 in Horsf. Pl. jav. rar. pt. 3. p. 235. — Walp. 1846. Rep. V. p. 104.

Spach 1834. Vég. phan. III. p. 515: g. Sterculiacear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 616. — Endl. 1850. Spl. V. p. 61. n. $5321/_1$.

Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Hildegardiear.

Endl. 1840. Gen. n. 5320 *h.* p. 994; 1841. Ench. p. 516: sect. Sterculiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7699. s.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 362: g. Sterculear.

Hildegardieae Rchb. 1837. Handb. p. 291: subsect. Sterculiear. genuinar. Gen.: Hildegardia.

Hildenbrandia Zanard., Lindl., Rupr.: vid. *seq.*

Hildenbrandtia**) Nardo 1834 in Oken Isis XXVII. p. 675 (err. *Hildbrandtia*): nov. g. Algar. (H. prototypus.)

Menegh. 1838. Cenni p. 42 (*Hildenbrantia*); 1841. Mem. riun. nat. Padov. p 10: g. Dictyotear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 770. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. p. 93.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 26. n. 101 (dubiae affinitatis).

Zanard. 1841. Alg. adriat. p. 135 (1843. Classif. Fic. p. 44: *Hildenbrandia*): g. Squamariear.

J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 32: g. Chordariear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 178.

Hildenbrandtia Nardo cont.

Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phyc. gener. p. 384; 1845. Phyc. germ. p. 294; 1849. Sp. Alg. p. 694. n. 463: g. Porphyrear.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 126 (*Hildebrandtia*): g. Corallinear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 20 (*Hildenbrandia*): g. Dictyotidear.? (*Synon. Ralfsia Berk.*)

Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 317 (*Hildebrandtia*): g. Cryptocarpear.

Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Phyllophoracear.

Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108: g. Hildenbrandtiear.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Spongiocarpear.

Rupr. 1855. Mém. Ac. Pet. 6e sér. VII. p. 50 (*Hildenbrandia*): g. Rhodophycear. (*Synon. Erythroclathrus Liebm., Rhododermis Harv.*)

Synon. Rhododermis Harv.; Rhodytapium Zanard.

Hildenbrandtieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 108: trib. Actinothalamar. Gen.: Hildenbrandtia.

Hildenbrantia Menegh. vid. *Hildenbrandtia Nardo.*

Hilleria Vellozo Fl. Flum. I. t. 122: g. Tetrandr. Monogyn. (elastica) ex Steud. Nom. I. p. 767.

Moq.-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 16: sect. Mohlanae.

Hillia*) Jacquin 1763. Stirp. Amer. hist. p. 96. t. 66: nov. g. Hexandr. Monogyn. (H. parasitica.) — Par. Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1662; 1764. Gen. ed. VI. p. 175. n. 444; 1767. Syst. ed. XII. p. 253. n. 440. — Murr. 1774. Syst. p. 283; 1784. Syst. p. 344. — Reich. 1778. Gen. p. 178. n. 479. — Swartz 1788. Prodr. p. 58; 1791. Obs. bot. p. 134. (Char. emend.) — Schreb. 1789. Gen. I. p. 233. n. 601. — Gmel. 1791. Syst. p. 576. — Pers. 1797. Syst. p. 367. — Willd. 1799. Sp. II. p. 239. n. 687.

Gled. 1764. Syst. p. 219. n. 913: g. Petalostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 143: g. Opulinar.

Juss. 1789. Gen. p. 102; 1820. Mém. Mus. VI. p. 388: g. Rubiacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 579. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 441. — Pers. 1805. Ench. I. p. 391. n. 860. — Hedw. 1806. Gen. p. 221. n. 900. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 160. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 127. n. 1312; 1830. Gen. I. p. 243. n. 1273. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XV. 83. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1038. 1051.

Neck. 1790. El. III. p. 377. n. 1815: g. Sphanidophytor.

Gis. 1792. Prael. p. 402: g. Contortar.

*) Dicat. St. Hildegard, abbatissae Bing.

**) „Dicat. clarissimo doct. Hildbrandt (potius Hildenbrandt) Vindobonensi, clinico illustri ac Botanico peritissimo."

*) Dicat. Joanni Hill, botanico.

Hillia Jacquin cont.
Batsch 1802. Tab. p. 234: g. Cinchonear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 612. — Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2070. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — Bartl. 1830. Ord. p. 211. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 287. — DC. 1830. Pr. IV. p. 350. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 473. — Meisn. 1838. Gen. p. 157 (113). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372. — Brongn. 1843. En. genr. p. 51.
Cram. 1803. Disp. p. 36: in Tetrandr. Monogyn.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 97. t. 197.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 201; 1834. ibid. IX. p. 260: g. Gardeniacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3277. p. 556; 1841. Ench. p. 274: g. Eucinchonear.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2913: g. Quinquinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.
Synon. Fereiria Vand.; Ferreiria Wittst.

Hilospermae Vent. 1799. Tabl. II. p. 433: ordo 18 class. VIII. Gen.: Jacquinia, Sideroxylum, Bassia, Imbricaria, Chrysophyllum, Achras. *Affine;* Myrsine.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60: fam. Thalamitubiae. Gen.: Jacquinia, Achras.

Hilsenbergia*) Tausch . . . . in Sieb. Fl. Maurit. II. n. 260.
Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2932: g. Verbenear.
Bartl. 1830. Ord. p. 180: g. Viticear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 226.
Meisn. 1840. Comm. p. 198: g. Verbenacear.? An Solanaceis affinius?
Endl. 1842. Spl. II. p. 60. n. 3874: g. dubium Solanacear. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 125. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 477: g. Atropinear.

Hilsenbergia Bojer (mss. olim ex Endl. Gen. p. 1002) 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 189: nov. g. Dombeyacear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 113.
Walp. 1848. Rep. II. p. 798: g. Büttneriacear.
= Astrapaea Lindl.

Himandactylius**) Trevisan 1849. Linnaea XXII. p. 134: nov. g. Caulerpear. (Caulerpa filiformis Her.)
= Phyllerpa Kütz.

Himanthalia***) Lyngbye 1819. Tent. hydroph. dan. p. 36: nov. g. Phycoidator. (Fucus loreus L.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 21 p. 161.

Himanthalia Lyngbye cont.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 389: g. Fucoidear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 44. — Harv. 1841. Brit. Alg. p. 22. — Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 784. — Endl. 1843. Spl. III. p. 29. n. 119. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 158.
Fries 1825. Pl. homon. p. 327: sect. Fuci. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 29. n. 513 *a.* — Endl. 1836. Gen. n. 119 *a.* p. 10; 1841. Ench. p. 8.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 135: g. Fucacear. — Par. Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 357. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. I. p. 93.) — J. Agdh. 1848. Spec. Fuc. p. 195. — Harv. 1852. Nér. bor. am. I. p. 71.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76 (*Hymanthalia*): g. Dictyotacear.
Grev. 1830. Synops. p. xxxv.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 351; 1845. Phyc. germ. p. 277; 1849. Sp. Alg. p. 587. n. 399: g. Fucear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 190. — Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 259. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 123: g. Cyclosporear.
Math. 1853. Belg. II. p. 494: g. Laminariear.
Synon. Lorea Stackh.; Xiphophora Mont.

Himanthoglossum Koch vid. *Himantoglossum Spreng.*

Himanthophyllum Dietr. vid. *Himantophyllum Spreng.*

Himantia Pers. 1797. Tent. disp. p. 42: g. Nematothecii. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 21. p. 161.
Pers. 1801. Syn. p. xix. 703: g. Naematothecior.
GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 28. 386: g. Fungor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 15. (spurior).
Rebent. 1804. Neom. p. 392: g. Byssor.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 22: g. Mucedinum? dubium.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 54: g. Eleutherocarpor.
Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 210; 1818. II. p. 283.
Mart. 1817. Erlang. p. 359: g. Inomycetum. (terrestr.) — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 559. n. 3576.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. 450: subg. Thelephorae.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 88: g. Byssoideor. veror.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 544: g. Byssinear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 477.
Fries 1828. Elench. I. p. 200: subtrib. Thelephorae.

---

*) Dicat. Hilsenberg, peregrinator botanico.
**) ἱμάς, lorum; δακτύλιος, annulus.
***) ἱμάς, ἱμάντος, lorum; ἅλς, mare.

Himantia Pers. cont.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 764: sect. Thelephorae. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 437*c*. p. 38; 1841. Ench. p. 21. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 389. — Bonord. 1851. Hdb. p. 162.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 92: g. Leptomycetum.
Fries 1838. Epicr. p. 559; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 334: sect. Corticii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 457*b*.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.
Synon. Fibrillaria Rouss. (Desv.)

Himantidium Ehrenb. 1840. Ber. Berl. Ak. p. 212: g. Bacillarior. (Eunotia Arcus Ehrenb.)
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 60; 1849. Sp. Alg. p. 8. n. 3: g. Eunotiear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 19. — Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 94.
Rabenh. 1853. Süssw. Diat.: g. Eunotiacear.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 11: g. Algar. polycytidear. homoeocytidear. synechocytidear.
Synon. Himantosoma Trevis.?

Himantochaete Nees 1841. Fl. Afric. p. 323.
Steud. 1854. Glum. I. p. 242: sect. Danthoniae. (D. pumila, tenella, lupulina etc.)

Himantoglossum*) Spreng. 1826. Syst. III. p. 675. 694. n. 2927; 1831. Gen. II. p. 653. n. 3286: g. Orchidear. (Satyrium hircinum L.) — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 244.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 120: sect. Himantoglossi. (Orchis secundiflora Bertol. et Satyrium hircinum L.)
Koch 1837. Syn. p. 689. Ed. II. p. 794 (*Himanthoglossum*): g. Ophrydinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 50. n. 1853: g. Ophrydear. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 364.
Synon. Loroglossum Rich.

Himantoglossum Rchb. 1830. Fl. exc. p. 119: g. ampliat. Orchidear. genuinar. Sect.: Streptogyne, Neottianthe, Himantoglossum.

Himantophyllum Spreng. 1830. Gen. I. p. 276. n. 1433: g. Spathacear. (*Imatophyllum Hook.* correct.) — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1186 (*Himanthophyllum*).
= Clivia Lindl.

Himantosoma Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 94: nov. g. Eunotiear. (Himantidium arcus Ehr.)

Himatanthus**) „Willd. mss." Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XIII. 221. n. 902: nov. g. Pentandr. Monogyn. (H. rigida.)
DC. 1830. Pr. IV. p. 621: g. Rubiacear. minus notum. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 664. — Endl. 1838. Gen. n. 3330. p. 566; 1841. Ench. p. 275. — Meisn. 1838. Comm. p. 113. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2987.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonacear.

Himenanthus Steud. vid. *seq.*

Himeranthus*) Endl. 1839. Gen. n. 3860. p. 666; 1841. Ench. p. 332: nov. g. Solanear. (Jaborosa runcinata Lk. & O.) — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 277 (184). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 57. — Steud. 1840. Nom. I. p. 768 (*Himenanthus*). — Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 344. Char. reform. — Walp. 1845. Rep. III. p. 105; 1847. VI. p. 613.
Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4749: g. Atropear.
Sendtn. 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 148: g. Solanacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Jaborosear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 479: g. Atropinear.

Hindersonia Lév. vid. *Hendersonia Berk.*

Hindsia**) Benth. 1844. Bot. Regist. t. 40. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 443 (*Hinsia*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 60: g. Rondeletiear.

Hingcha „Roxb. 1814 sine descript." DC. Prodr. V. p. 636 in synon. Enhydrae; vid. *Hingtsha Roxb.*

Hingstonia Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 171: nov. g. pro Sigesbeckia occidentali L. (*Hinghstonia Steud.* Nom. I. p. 768.)
Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2724: g. Millerieаr.?
= Verbesinae Less. sp.

Hingtsha***) Roxb. 1832. Fl. Ind. III. p. 448: nov. g. Syngenes. Segregat. (H. repens.)
= Enydra Lour.

Hinsia Wittst. vid. *Hindsia Benth.*

Hiorthia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 97. n. 176: nov. g. Siphoniphytor., ab Anacyclo L. sejunctum. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 170 (*Hiortia*).
Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2391*a*; 1841. Nom. p. 80. n. 3051. 3: sect. Anacycli. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 17. — Endl. 1838. Gen. n. 2643*c*. p. 430; 1841. Ench. p. 241.
Less. 1832. Syn. p. 258: g. Santolinear., species haud congruas complectens.

Hiortia Juss. vid. *praeced.*

Hipo Camell. 1704 in Ray Hist. App. III. p. 87.
= Antiaris Lesch.

---

*) Nomen correctum pro voce hybrida: *Loroglossum Rich.*
**) ἱμάτιον, vestis.

*) ἵμερος, amor, cupido.
**) Dicat. Hinds, peregrinatori.
***) *Hingtsha* Bengalensium.

Hipocrepis Desv. vid. *Hippocrepis Linn.*

Hippagrostis*) Rumph. 1750. Amboin. VI. t. 5. f. 2.
= Orthopogon R. Brown.

Hippeastreae Kunth 1850. Enum. pl. V. p. 478: subtrib. Amaryllinear. Gen.: Cooperia, Haylockia, Zephyranthes, Pyrolirion, Habranthus, Phaedranassa, Placea, Rhodophiala, Eucrosia, Callipsyche, Sprekelia, Phycella, Hippeastrum.

Hippeastrum Herbert 1821. Bot. Mag. App. p. 33; 1825. Bot. Mag. App. p. III; 1837. Amaryll. p. 71. 135: nov. g. Amaryllidear. (Hippeastriformium.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 46.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1257: g. Amaryllear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158. — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 13. 130.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 810: sect. Amaryllidis. — Par. Ench. 1837. Gen. n. 1273*e*. p. 176; 1841. Ench. p. 103. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1178. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1601. 5. — Meisn. 1842. Gen. p. 393 (296).
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 416: subg. Amaryllidis. — Par. Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 144.
Kunth 1850. Enum. V. p. 514: g. Hippeastrear.
Synon. Amaryllis Sweet; Coburgia Herb.; Leopoldia Herb.; Amarylliris Hoffmsg.

Hippia Linn. 1771. Mant. II. p. 158. n. 1324: g. Syngenes. Polygam. Necessar. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 661; 1784. Syst. p. 795. — Reich. 1778. Gen. p. 455. n. 1097. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 586. n. 1343. — Gmel. 1791. Syst. p. 1277. — Pers. 1797. Syst. p. 837; 1807. Ench. II. p. 497. n. 950. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2382. n. 1564; 1809. En. p. 939.
Scop. 1777. Intr. p. 131: g. Flosculosar.
Juss. 1789. Gen. p. 184: g. Corymbiferar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 406.
Neck. 1790. El. III. p. 377. n. 1816: g. Actinophytor.?
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 390. t. 164: g. Tubulosar.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 549; 1826. Syst. III. p. 487. n. 2729; 1831. Gen. II. p. 620. n. 3076: g. Eupatorinar.
Cass. 1821. Dict. v. 21. p. 173: g. Anthemidear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 141. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 39.
Link 1822. En. II. p. 365: g. Discoidear.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 117; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: g. Cotulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2372.

Hippia Linn. cont.
Less. 1832. Syn. p. 268: g. Hippiear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 144. — Endl. 1838. Gen. n. 2709. p. 441; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 213 (135). — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3447. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 23: g. Chrysanthemear.

Hippia HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 301: g. Anthemidear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 514.
= Leptinella Cass.

Hippieae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 267: div. Artemisiear. Gen.: Abrotanella, Blennosperma, Leptinella, Hippia, Soliva.
DC. 1837. Pr. VI. p. 141: div. Anthemidear. Gen.: Abrotanella, Leptinella, Plagiocheilus, Soliva, Hippia. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 440; 1841. Ench. p. 242. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 213 (135). Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 88: sect. Cotulear. genuinar. Gen. ead.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712: subtrib. Senecionidear. Gen. ead. et Trineuron, Ceratella.

Hippieae Griseb. 1839. Gen. et spec. Gent. p. 69. 129: trib. Gentianear. Gen.: Coutoubea, Hippion, Enicostema. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169). Gen. ead.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5: sect. Gentianear. verar. Gen. ead.

Hippioides DC. 1837. Prodr. VI. p. 134: sect. Tanaceti. — Par. Endl. 1838. Gen. n 2696*e*. p. 439; 1841. Ench. p. 242. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3454. 5 (*Hippiopsis*).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24: g. Chrysanthemear.

Hippion*) Schmidt 1796 in Röm. Arch. I. 1. p. 9: novum g. a Gentiana separatum.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 270: sect. Gentianae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3499*a*. — Link 1829. Hdb. I. p. 423.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 198: g. Gentianear. verar. (G. viscosa Ait.)
Conf. Ericoila Renealm.

Hippion Spreng. 1825. Syst. I. p. 505. 589. n. 640; 1830. Gen. I. p. 143. n. 716: nov. g. Gentianear. (Gentiana hyssopifolia L.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 648. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 133: g. Hippiear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5.
Endl. 1841. Spl. I. n. 3540/$_2$. p. 1399; 1841. Ench. p. 302: g. Chironiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5114: g. Erythraeariar.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 558: g. Chlorear.
Conf. Slevogtia Rchb.

*) *ἵππος*, equus; *ἄγρωστις*.

*) *Hippion* nomen antiquum Gentianae vernae.

Hippiopsis Rchb. vid. *Hippioides DC.*

Hippobroma*) G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 698. 717: nov. g. Lobeliacear. (Lobelia longiflora Jacq.)
Endl. 1838. Gen. p. 512. n. 3060*d*: sect. Laurentiae.
Meisn. 1839. Gen. p. 240 (148): g. Lobeliear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572.
= Solenanthis Kunth.

Hippobroma Lindl. vid. *seq.*

Hippobromus**) Ecklon & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. austr. p. 151: nov. g. Burseracear. (Rhus alatum Thunb.)
Meisn. 1837. Gen. p. 76 (55): g. Spondiacear.?
Endl. 1840. Gen. n. 5637. p. 1074; 1841. Ench. p. 562: g. dubium Dodonaeacear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 423.
Rchb. 1841. Nom. p. 199. n. 7609: g. Cupaniear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385 (*Hippobroma*): g. dubium Sapindacear.

Hippocastanaceae Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 250: ordo Dicotyledonum. Gen.: Aesculus, Ungnadia.

Hippocastaneae DC. 1819. Théor. élém. p. 244; 1824. Prodr. I. p. 597: ordo (41) Thalamiflorar. Gen.: Aesculus, Pavia. — Par. Lindl. 1830. Nat. syst. ed I. Clav. (syncarpar.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 651. Gen. ead.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 589: ordo Trihilatar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII: div. Sapindacear. Gen. ead. — Par. Blume 1850. Rumphia III.
Rchb. 1828. Consp. p. 200; 1832. Fl. exc. p. 768: subdiv. Zygophyllear. Gen. ut DC.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48 (*Hyppocastaneae*): trib. Malpighiacear. Gen. ead.
Bartl. 1830. Ord. p. 364: ordo (213) Malpighinar. Gen. ead. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 51 (37). Gen. ut Spach.
Link 1831. Hdb. II. p. 335: ordo 15 Allostemonum. Gen. ut DC.
Lindl. 1833. Nix. p. 19: ordo Aceralium.
Spach 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 50; 1834. Vég. phan. III. p. 16: fam. (34) Malpighinear. Gen.: Aesculus, Pavia, Macrothyrsus, Calothyrsus.
Mart. 1835. Consp. p. . . .: fam. Malpighinar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 285: subdiv. Sapindear. Gen. ut Spach. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 198. Gen.: Aesculus.
Endl. 1840. Gen. p. 1075; 1841. Ench. p. 564: fam. Acerum. Gen.: Ungnadia, Aesculus.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 87: fam. Aesculinear. Gen. ut DC.

Hippocastaneae DC. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385: subordo Sapindacear. Gen. ut Endl. et Pavia.
Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 620: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Gen. ut Lindl.
Synon. Aesculaceae Lindl.

Hippocastanum*) Tourn. 1700. Inst. p. 611. t. 382: g. pl. class. XXI.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 276. Ed. Hall. 1745. p. 291: g. pl. class. XII.
Adans. 1763. Fam. II. p. 383: g. Tiliar.
A. Spreng. 1848. Fl. Hall. p. 214: g. Hippocastanear.
Aesculus Linn.

Hippocastanum Mönch 1794. Meth. p. 65: g. Thalamostemonis, sejuncta Pavia restrict.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 133: g. Malpighiacear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 15: g. Acerацear.
Endl. 1840. Gen. p. 1075. n. 5641*a*: sect. Aesculi.
Synon. Aesculus Boerh.; Esculus Linn.; Aesculus et Paviae sect. 1 Spach.

Hippocentaurea Schult. 1794. Fl. austr. I. p. 389 (pulchella et Centaurium).
Endl. 1838. Gen. n. 3541*b*. p. 602; 1841. Ench. p. 302: sect. Cicendiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5110. 2.
= Erythraea Ren. (Griseb. in DC. Pr. IX. p. 57.)

Hippocentaurea „Rchb.“ Griseb. 1839. Gen. et sp. Gent. p. 157: sect. Cicendiae. (Gentiana pusilla Lem.)
Synon. Cicendia Griseb. 1845.

Hippochiron Endl. 1838. Gen. p. 601. n. 3536*a*: sect. Chironiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 132. n. 5116. 1. — Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 39.
Synon. Silenophyllum Griseb.

Hippocratea**) Linn. 1737. Gen. p. 363. n. 908; 1737. Ht. Cliff. p. 484; 1742. Gen. ed. II. p. 518. n. 998; 1753. Sp. II. p. 1191: nov. g. incertae sedis, pro *Coa Plum.* institutum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 53: g. Sarmentacear.?
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 988. n. 1098: g. Hexandr. Monogyn.
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 50; 1764. Gen. ed. VI. p. 25. n. 54; 1767. Syst. ed. XII. p. 75: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 75; 1784. Syst. p. 83. — Reich. 1778. Gen. p. 26. n. 60. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 34. n. 73. — Gmel. 1791. Syst. p. 107. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 27. Char. emend. — Pers. 1797. Syst. p. 84; 1805. Ench. I. p. 40. n. 92. — Willd. 1797. Sp. I. p. 193. n.

*) βρόμος, avena (?)
**) „Incolis *Paardepis*, inde nomen a graeco ἵππος et βρῶμος.“

*) κάσταvον, castanea.
**) Consecrata Hippocrati Coo.

Hippocratea Linn. cont.
89. — Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 44. t. 74. (reform.) — Roxb. 1798. Corom. II. p. 16. t. 130; 1819. III. p. 3. t. 205; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 169; ed. 1832. I. p. 165. — Vahl 1806. Enum. II. p. 26. n. 80. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 347. 543. n. 560.
Gled. 1764. Syst. p. 11. n. 35: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 254: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 251: g. Aceribus et Malpighiis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 29. 357.
Neck. 1790. El. II. p. 303. n. 1079: g. Synathrophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 51: g. Trihilatar.
Juss. 1804. Dict. v. 4. p. 278 (*Bejuque*): g. inter Acera et Banisterias intermedium.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 17: g. Aceraceis et Malpighiaceis aff.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 486; 1821. Dict. v. 21. p. 180: g. Hippocraticear. — Par. R. Brown 1818 in Tuck. Cong. App. V. p. 426. (Verm. bot. Schr. I. p. 187.)
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 693: g. Malpighiear.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 136: g. Hippocrateacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 169. — DC. 1824. Pr. I. p. 567. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI. — Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 102. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 380. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 626. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 103. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 399. — Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 120; 1847. Veg. kd. p. 585. — Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40). — Endl. 1840. Gen. n. 5700. p. 1091; 1841. Ench. p. 576. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 252. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 88.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 178. n. 195; 1830. Gen. I. p. 44. n. 201: g. Hippocratear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5382; 1837. Hdb. p. 301; 1841. Nom. p. 208. n. 7906. (genuinar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 177.
Guill. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 111. t. 25. 26.

Synon. Coa Plum; Bejuco Löfl.; Daphnikon Pohl; Pereskia Fl. Flum.

Hippocrateaceae HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 136: fam. plantar. Gen.: Hippocratea, Anthodon, Trigonia, Lacepedea. *Cf.* Link 1831. Hdb. II. p. 340. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 169.
DC. 1824. Pr. I. p. 567: ordo (37) Thalamiflorar. Gen.: Hippocratea, Anthodon, Raddisia, Salacia, Johnia. *Spuria:* Trigonia, Lacepedea. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 625. Gen. ead. (Calypso loco Anthodontis.)
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 589: ordo Trihilatar.

Hippocrateaceae HBK. cont.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI: div. Malpighiacear. Gen. ut DC. (excepta Raddisia.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 48: fam. Sapindariear. Gen.: Hippocratea, Anthodon, Johnia.
Bartl. 1830. Ord. p. 380: ordo (222) Tricoccar. Gen. ut DC.
Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo ad Celastrinas accedens.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 397: fam. (23) Tricoccar. Gen. ut DC.
Mart. 1835. Consp. p. . . .: fam. Malpighinar.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 120; 1847. Veg. kd. p. 584: ordo Rhamnalium. Gen. ut Endl. 1843.
Meisn. 1837. Gen. p. 56 (40): ordo Malpighinar. Gen.: Hippocratea, Tonsella, Raddisia, Salacia, Trigonia ?, Lacepedea?
Endl. 1840. Gen. p. 1090; 1841. Ench. p. 576: ordo Frangulacear. Gen.: Hippocratea, Tonsella, Salacia. *Affine:* Lacepedea. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 86) Trigonotheca et 1843 (Spl. III. p. 97) Diplesthes.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 88: fam. Celastroidear. Gen.: Hippocratea.
Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 621: fam. Dicotyledonear. polypetalar. Gen. ut Endl. 1840 (Tontelea loco Tonsellae).

Hippocrateae (Spreng. 1825. Syst.) Rchb. 1828. Consp. p. 207 (1832. Fl. exc. p. 827): div. Theacear. Gen.: Hippocratea, Anthodon, Raddisia, Salacia, Johnia; Trigonia, Lacepedea. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 301; 1841. Nom. p. 208. Subdivis.: *genuinae* (gen. Hippocratea, Raddisia [1841 exclusa]), Salacieae, Trigonieae.

Hippocraticeae Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 486; 1821. Dict. v. 21. p. 180: ordo plant., ab Acerineis sejunctus. Gen.: Hippocratea, Tontelea, Anthodon, Salacia.
R. Brown 1818 in Tuck. Cong. App. V. p. 426 (Verm. bot. Schr. I. p. 187): fam. Celastrineis aff. (Gen.: Hippocratea, Salacia.)
DC. 1819. Théor. élém. p. 244: g. Thalamiflorar.
= Hippocrateaceae Kunth.

Hippocrepis*) Linn. 1737. Gen. p. 226. n. 596; 1737. Cliff. p. 364; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 233; 1753. Sp. II. p. 744; 1759. Syst. ed. X. p. 1169. n. 791; 1763. Sp. ed. II. p. 1049; 1764. Gen. ed. VI. p. 381. n. 885; 1767. Syst. ed. XII. p. 492: g. Diadelph. decandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 74. — Murr.

*) κρηπίς, solea, soccus. Conf. Linn. crit. bot. p. 97.

Hippocrepis Linn. cont.
1774. Syst. p. 558; 1784. Syst. p. 670. — Reich. 1778. Gen. p. 380. n. 958. — Lour. 1790. Coch. II. p. 453. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 503. n. 1200. — Gmel. 1791. Syst. p. 1119. — Pers. 1797. Syst. p. 708; 1807. Ench. II. p. 315. n. 1731. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1158. n. 1369; 1809. En. p. 775.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 137. n. 575: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33; 1764. Ord. nat.: g. Papilionacear. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 429. — Gis. 1792. Prael. p. 415.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 308. — Juss. 1789. Gen. p. 361. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 422. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 237. — DC. 1805. Franç. IV. p. 604. — Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 124 (*Hipocrepis*). — Lois. 1821. Dict. v. 21. p. 181. — Link 1822. En. II. p. 245. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 323. n. 2601; 1831. Gen. II. p. 595. n. 2939. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 432. 564.
Adans. 1763. Fam. II. p. 328: g. Coronillar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 294: g. Tetrapetalar. irregular.
Neck. 1790. El. III. p. 20. n. 1223: g. Cyteophytor.
Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 173. t. 5. Revisio generis.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 759: g. Coronillear. — Par. Bronn 1822. Diss. p. 134. — DC. 1825. Pr. II. p. 312. — Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3981; 1832. Fl. exc. p. 540; 1841. Nom. p. 152. n. 5949. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 411. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 276. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 283. — Koch 1836. Syn. p. 189. Ed. II. p. 210. — Meisn. 1837. Gen. p. 90 (64). — Endl. 1840. Gen. n. 6588. p. 1280; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 697. — Webb 1846. Canar. II. p. 118. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 618: g. Ornithopodear.
Link 1831. Hdb. II. p. 211: g. Hedysarear. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 64. — Brongn. 1843. En. genr. p. 130. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 500.
Synon. Ferrum equinum Tourn.

Hippodamia Decaisne . . . .
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 195: g. Gesnerear.?

Hippodium Röhl. 1796. Fl. germ. III. p. 120.
= Buxbaumia Hall.

Hippodium Gaudich. mss. olim, teste ipso Auctore.
= Didymochlaena Desv.

Hippoglossum Hartm. 1820 ex Lilja 1841. Linnaea XV. p. 265; 1843. ibid. XVII. p. 111.
= Pneumaria Hill.

Hippolapathum Wallroth 1822. Sched. crit. I. p. 170: sect. Rumicis. (R. crispus, Hydrolapathum, etc.)
Synon. Hydrolapatha Fries.

Hippomane*) Linn. 1737. Gen. p. 368. n. 924; 1737. Ht. Cliff. p. 484; 1742. Gen. ed. II. p. 517. n. 994; 1753. Sp. II. p. 1191: nov. g. incertae sedis, pro *Mançanilla Plum.* institutum. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 183.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 351: g. Monoec. sect. 3.
Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1259. n. 1099: g. Monoec. Monandr.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Euphorbiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 391.
Jacq. 1763. Amer. p. 250. t. 159: g. Monoec. Monadelph. — Par. Linn. 1763. Sp. ed. II. p. 1431; 1764. Gen. ed. VI. p. 505. n. 1088; 1767. Syst. ed. XII. p. 637. — Murr. 1774. Syst. p. 724; 1784. Syst. p. 866. — Reich. 1778. Gen. p. 501. n. 1186. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 659. n. 1471. — Pers. 1797. Syst. p. 910. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 571. n. 1725.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 243. — Gis. 1792. Prael. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 169. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 805. n. 3086; 1831. Gen. II. p. 686. n. 3462. (Monoec. Diclin. Diandr.)
Gled. 1764. Syst. p 143. n. 600: g. Thalamostemonum.
Neck. 1790. El. II. p. 344. n. 1139: g. Cyrtosiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 1003: g. Monadelph. Diandr.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 501: g. Tithymaloidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 288: g. Euphorbiacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 589. n. 2148. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 66. — Kunth 1822. Syn. I. p. 393. — Link 1822. En. II. p. 407; 1831. Hdb. II. p. 438. — Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — Poir. 1823. Dict. v. 29. p. 2 (*Mancénillier*). — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 51. t. 16. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 738 (*Mancenillier*).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 374: g. Linozostear.
Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5024; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 193. n. 7341: g. Hippomanear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan.

---

*) *Hippomanes* et *Hippomane* vocabulum graecum, receptum ad exprimendum quid omnium maxime abominabile (per metaphoram ab Equis.) Nullum innotuit vegetabile magis venenatum. (Ht. Cliff.)

Hippomane Linn. cont.
II. p. 524. — Endl. 1840. Gen. n. 5777. p. 1110; 1841. Ench. p. 587. — Meisn. 1841. Gen. p. 337 (241). — Brongn. 1843. En. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Huracear.
A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 27: g. Euphorbiear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 539: g. Stillingiidear.
Synon. Mançanilla Plum.

Hippomaneae Rchb. 1828. Consp. p. 194 (1832. Fl. exc. p. 753): subdiv. Euphorbiacear. Gen.: Hecatea?, Omphalea, Maprounea, Styloceras, Commia, Excoecaria, Sebastiania, Hura, Hippomane, Homalanthus, Triadica, Stillingia, Sapium, Cnemidostachys.
Bartl. 1830. Ord. p. 372: div. Euphorbiacear. Gen. ead. excepta Hecatea.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 488. 522: trib. Euphorbiacear. Gen. ut Bartl. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1109; 1841. Ench. p. 587. Gen.: Maprounea, Adenopeltis, Colliguaja, Excoecaria, Styloceras, Commia, Synaspisma, Hura, Hippomane, Pachystemon, Omalanthus, Stillingia, Microstachys. — Klotzsch 1841. Arch. f. Naturg. I. p. 180. Nova gen.: Dactylostemon, Adenogyne, Actinostemon, Sarothrostachys. — Endl. 1842. Spl. II. p. 87. Generibus prioribus accedunt Klotzschiana et Gymanthes, Sebastiania, Gussonia, Sennefeldera, Caelebogyne et 1850 (Spl. V. p. 87) Psilostachys. — Meisn. 1841. Gen. p. 337 (251). Gen. ut Endl. 1840 et Sapium, Triadica, Homonoia?, Sebastiania? — Brongn. 1843. En. genr. p. 80. Gen. ex Endl. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. Gen. fere ut Endl.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: subsect. Ricinear. Gen. ut antea. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 193. Gen. ut Endl.
Conf. Stillingieae A. Juss.

Hippomanica Molina 1782. Saggio p. 126: nov. g. plant. *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 183 et Steud. Nom. I. p. 769.
Juss. 1789. Gen. p. 431: g. pl. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 306. n. 1212. — Endl. 1841. Gen. n. 6888. p. 1332; 1841. Ench. p. 685. — Meisn. 1843. Comm. p. 373.
Gmel. 1791. Syst. p. 674: g. Decandr. Monogyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 367.

Hippomarathroides DC. 1830. Prodr. IV. p. 144: sect. Seselios. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 308. — Endl. 1839. Gen. n. 4430*b*. p. 775; 1841. Ench. p. 378. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 273.
Synon. Stutomarathrum Rchb.

Hippomarathrum*) Rivin. 1699. Pentap. irreg. p. 67.
Hall. 1745 in Rupp Fl. jen. p. 280: g. pl. class. XII.
GMS. 1799. Fl. Wett. I. p. 249. 413: g. Pentandr. Digyn. (Seseli Hippomarathrum L.)
DC. 1830. Pr. IV. p. 144: sect. Seselios. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 466; 1841. Nom. p. 140. n. 5422. 1. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 308. — Koch 1836. Syn. p. 294. Ed. II. p. 324. — Endl. 1839. Gen. n. 4430*a*. p. 775; 1841. Ench. p. 378. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 272.
C. Koch 1842. Linnaea XVI. p. 357: g. Seselear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 14. n. $4525/_1$: g. Eusmyrnear. Sect.: Euhippomarathrum, Lophocachrys.

Hippomarathrum Link 1821. Enum. I. p. 271: g. Umbelliferar.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 136: g. Smyrnear. — Par. Boiss. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 73. Char. auct. — Walp. 1846. Rep. V. p. 914.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3747: g. Smyrniear.
Link 1829. Hdb. I. p. 348: g. Caucalidear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 409: g. Pleurospermar.
= Aegomarathrum Koch.

Hippomarathrum Duby 1828. Bot. gall. I. p. 234.
= Euseseli DC.

Hippomurathrum Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 184: sphalm. pro *Hippomarathrum*.

Hippoperdei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 488: sect. Coniogastror. Gen.: Hippoperdon.

Hippoperdon Montagne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 121: nov. g. Gasteromycetum, Bovistae proximum.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 319: g. Trichogasterum.
Corda 1842. Mycol. p. 189: g. Lycoperdacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Trichogastrum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 442: g. Lycoperdineor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. (VII. p. 505 Lycoperdeor.) VIII. p. 488: g. Hippoperdeor.

Hippophaë**) Linn. 1737. Gen. p. 301. n. 744; 1737. Cliff. p. 455; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. II. p. 1023; 1759. Syst. ed. X. p. 1289. n. 980; 1763. Sp. ed. II. p. 1452; 1764. Gen. ed. VI. p. 517. n. 1106; 1767. Syst. ed. XII. p. 651: g. Dioec.

*) *μάραθρον*, foeniculum. Conf. Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 184.

**) *Hippophaë* s. *Hippophaës* Dioscoridis. Conf. Beckmann Lex. bot. p. 108.

Hippophaë Linn. cont.

Tetrandr. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 189. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 740; 1784. Syst. p. 884. — Reich. 1778. Gen. p. 514. n. 1210. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 682. n. 1509. — Pers. 1797. Syst. p. 926; 1807. Ench. II. p. 614. n. 2207. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 227. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 743. n. 1778; 1809. En. p. 1010. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 902. n. 3174; 1831. Gen. II. p. 706. n. 3559. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 197. 278.

Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 30. n. 117: g. Thalamostemonum.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Thymelear.

Adans. 1763. Fam. II. p. 80: g. Elaeagnor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 75. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 176.

Rüling 1774. Ord. pl. p. 35: g. inter Rhamnos et Passerinas medium.

Scop. 1777. Intr. p. 101: g. Disparium.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 199. t. 42. f. 5 (rhamnoides).

Neck. 1790. El. III. p. 116. n. 1453: g. Daphonophytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 274: g. Tetrandr. Monogyn.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 233: g. Elaeagnoidear.

Batsch 1802. Tab. p. 103: g. Elaeagnear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 353. — Juss. 1819. Dict. v. 14. p. 296. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 264. — A. Rich. 1822. Mém. soc. h. n. Par. I. p. 387. — D. Don 1825. Nepal. p. 68. — Agdh. 1826. Aphor. p. 231. — Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1716; 1831. Fl. exc. p. 162; 1841. Nom. p. 64. n. 2420. — Link 1829. Hdb. I. p. 375. — Bartl. 1830. Ord. p. 114. — Koch 1837. Syn. p. 624. Ed. II. p. 719. — Endl. 1838. Gen. n. 2112. p. 334; 1841. Ench. p. 212. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 456. — Meisn. 1841. Gen. p. 329 (242). — J. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 625. — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 552. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 69.

Massey 1804. Dict. v. 3. p. 103 *(Argoussier)*: g. Osyridear.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 327: g. Thymelaear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 293.

Link 1822. En. II. p. 422: g. Elaeagnoidar.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 650: g. Veprecular.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Eleagnidear.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 121: g. Eleagnear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 257: g. Elaeagnacear. — Par. Schltd. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 607.

Synon. Rhamnoides Tourn.

Hippophaestum „Col." Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 443: nov. g. Cynarocephalear. (Centaurea Calcitrapa L.)

= Centaureae Less. pars.

Hippopodium Fabric. 1743. Prim. fl. Butisb. p. 31.

Ehrh. 1780. Phytophyl. Nr. 10; 1789. Beitr. IV. p. 146. (Buxbaumia aphylla L.)

= Buxbaumia Hall.

Hippopodium Harvey mss.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: sect. Ceratandrae.

= Euceratandra Lindl.

Hipposeris Cassini 1824. Dict. v. 33. p. 464; 1830. v 60. p. 584: g. Mutisiear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2273. — Bartl. 1830. Ord. p. 137. — Spach 1841. Veg. phan. X. p. 35.

Less. 1830. Linnaea V. p. 342: sect. Onoseridis. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 35. — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3421. 3.

Less. 1832. Syn. p. 119: subg. Onoseridis.

= Centroclinium Don.

Hippotis Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 33; 1799. Fl. peruv. II. p. 55. t. 201: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 118. n. 520.

Pers. 1805. Ench. I. p. 210. n. 473: g. Rubiacear.? — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XVII. 229. n. 918. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 393. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 193. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 761. n. 824; 1830. Gen. I. p. 176. n. 889. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 798.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 86: g. Coffeariae?

Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2088: g. Cinchonear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 211.

A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 255: g. Gardeniar.

DC. 1830. Pr. IV. p. 391: g. Gardeniear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2954.

Endl. 1838. Gen. n. 3297. p. 560; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Hippotrix Rafin. 1830 in Seringe Bull. bot. I. (Linnaea VIII. Litt. p. 83): sect. Scirpi. (Sc. quadrangularis, equisetoides, etc.)

Hippurideae Link (1821. Enum. I. p. 5) 1829. Handb. I. p. 211: ordo 25 Endogenear. (serius [Handb. II. 1831. p. 406] ad Apetalas translatus.) Gen.: Hippuris.

DC. 1828. Pr. III. p. 71: trib. Haloragear. Gen. id. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 705. Gen. id. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 443. Gen. id. — Meisn. 1838. Gen. p. 122 (87). Gen. id.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: fam. Santalariear. Gen. id.

Bartl. 1830. Ord. p. 315: div. Haloragear. Gen. id. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 632; 1837. Hdb. p. 244; 1841. Nom. p. 169. Gen. id.

Koch. 1836. Syn. 244. Ed. II. p. 270: ordo Calyciflorar. Gen. id.

Hippurina Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 59. 89 (1816. Ner. brit. Ed. alt.): nov. g. Fucor. (H. aculeata, caudata.) *Cf.* Spreng. 1820. N. Entd. I. p. 97 et Leman 1821. Dict. v. 21. p. 194.
= Desmarestiae Lamx. pars.

Hippuris*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 359: g. pl. class. XVI.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 88. t. 2: g. ab Equiseto sejungendum.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 350: g. Epiphyllospermar.
= Chara Linn.

Hippuris Linn. 1737. Gen. p. 1. n. 1; 1737. Cliff. p. 3; 1740. Syst. p. 16; 1753. Sp. I. p. 4; 1759. Syst. ed. X. p. 843. n. 11; 1762. Sp. ed. II. p. 6; 1764. Gen. ed. VI. p. 5. n. 11; 1767. Syst. ed. XII. p. 52: g. Monandr. Monogyn. *Cf.* Juss. et Lem. 1821. Dict. v. 21. p. 194. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 51; 1784. Syst. p. 53. — Reich. 1778. Gen. p. 5. n. 11. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 8. n. 15. — Lour. 1790. Coch. I. p. 16. — Gmel. 1791. Syst. p. 16. — Pers. 1797. Syst. p. 52; 1805. Ench. I. p. 5. n. 23. — Willd. 1797. Sp. I. p. 26. n. 23; 1809. En. p. 7. — Vahl 1805. Enum. I. p. 13. n. 11. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 2. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 3. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 279. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 1.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 1. n. 1: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Inundatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 326. — Batsch 1802. Tab. p. 161. — Wahlenb. 1824. Suec I. p. 2.
Gmel. 1768. Sibir. III. p. 7: g. Incompletar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 411: g. Staminear.
Scop. 1777. Intr. p. 100: g. Disparium.
Hellen. 1786. Diss. de Hippuride; 1793 in Usteri Delect. I. 10. t. 1.
Juss. 1789. Gen. p. 18: g. Naiadum. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 6. 41. n. 32. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 19. n. 31; 1830. Gen. I. p. 10. n. 32. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 111.
Neck. 1790. El. III. p. 378. n. 1817: g. Catabophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 24. t. 84.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 218: g. Hydrocharideis aff.
Juss. 1804. Ann. Mus. III. p. 323: g. Onagrariar.? An Elaeagnor.?
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 50: g. Fluvialium. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 6. 344.
DC. 1805. Franç. IV. p. 415: g. Onagrariis aff.
Rich. 1808. Anal. fr. p. 34. Ed. Voigt p. 29: g. Hygrobiar.

Hippuris Linn. cont.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 550 (Verm. bot. Schr. I. p. 44): g. Haloragear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 556. — Rchb. 1827 ap. Mössl I. p. LIII. — Torr. & Gray 1840. North-Am I. p. 531. — Endl. 1840. Gen. n. 6134. p. 1194; 1841. Ench. p. 640. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 117. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 723.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 119: g. Najadum. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 26.
Link 1821. En. I. p. 5; 1829. Hdb. I. p. 288: g. Hippuridear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 71. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13. — Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 7. — Cham. 1829. Linnaea IV. p. 506. — Bartl. 1830. Ord. p. 315. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 632; 1837. Hdb. p. 244; 1841. Nom. p. 169. n. 6542. — G. Don 1832. Gen. syst II. p. 705. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 217. — Spach 1833. Vég. phan. IV. p. 443. — Koch 1836. Syn. p. 245. Ed. II. p. 270. — Meisn. 1838. Gen. p. 122 (87). — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 119. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 589.
Lois. 1826. Dict. v. 39. p. 188 (*Pesse*): g. Elaeagnear.
Rchb. 1828. Consp. p. 169. n. 4480: g. Cercodear.
Kunth 1838. Berol. I. p. 172: g. Hygrobiear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 42: g. Halorrhagear.
Synon. Limnopeuce Vaill.; Pinastella Dill.; Caullinia Rafin.?

Hippurites Lindl. & Hutt. 1831. Foss. Fl. II. p. 89.
Unger 1844. Bot. Zeit. p. 181; 1845. Syn. p. 35; 1845. Chlor. prot. p. XXXIII: g. Asterophyllitar. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 101.

Hiptage*) Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 169. t. 116.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 138: g. Malpighiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 20. — Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 481 (*Hyptage*); 1823. Dict. v. 28. p. 456. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 197. — Bartl. 1830. Ord. p. 359. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 107. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 138. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 86.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 692; 1825. Syst. II. p. 329. n. 1606; 1830. Gen. I. p. 354. n. 1788: g. Malpighiear. (Decandr. Monogyn.). — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1374. 1428.
DC. 1824. Pr. I. p. 583: g. Hiptagear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII; 1837. Hdb. p. 299. — G. Don 1831. Gen.

*) οὐρά, cauda.

*) ἵπταμαι, volo.

Hiptage Gärtn. cont.
syst. I. p. 639. — Meisn. 1837. Gen. p. 54 (39). — Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 181.
Rchb. 1828. Consp. p. 207. n. 5372: g. Banisteriear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48 *(Hyptage)*: g. Hyptagear.
A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 268; 1843. Arch. Mus. III. p. 500. t. 16: g. Hirear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390.
Endl. 1840. Gen. n. 5572. p. 1060; 1841. Ench. p. 557: g. Pleuropterygiar. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 371.
Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7852: g. Triopteridear.
Walp. 1846. Rep. V. p. 293: g. Hiraeear.
Synon. Gärtnera Schreb.; Molina Cav.; Madablota Sonn.; Succowia Dennst.

Hiptageae DC. 1824. Prodr. I. p. 583: trib. Malpighiacear. Gen.: Hiptage, Tristellateia, Thryallis, Aspicarpa, Gaudichaudia, Camarea. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48 *(Hyptageae)*. Gen.: Hyptage, Gaudichaudia, Camarea. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 639. Gen. ut DC. — Meisn. 1837. Gen. p. 54. Gen. ead. (exclusa Thryallide) et Fimbriaria, Platynema. — Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 181. Gen.: Hiptage, Platynema, Camarea, Gaudichaudia, Fimbriaria.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII: subdiv. Malpighiear. Gen.: Hiptage, Gaudichaudia. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 299. Gen. ut DC. et Fimbriaria.

Hiraea*) Jacquin 1763. Amer. p. 137.
Linn. 1767. Syst. ed. XII. p. 315. n. 569: g. Decandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 356; 1784. Syst. p. 427. — Reich. 1778. Gen. p. 233. n. 623. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 307. n. 781. (II. p. 804.) — Gmel. 1791. Syst. p. 725. — Pers. 1797. Syst. p. 458. — Willd. 1799. Sp. II. p. 743. n. 904.
Scop. 1777. Intr. p. 254: g. Polycarpiar.
Neck. 1790. El. II. p. 329. n. 1119: g. Acascophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 357: g. Tribilatar.
Pers. 1805. Ench. I. p. 507. n. 1127: g. Malpighiacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 332. n. 1307. — Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 481. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 169. — Kunth 1824. Syn. III. p. 185. — Poir. 1828. Dict. v. 55. p. 335. — Bartl. 1830. Ord. p. 359. — A. Juss. 1832 in St. Hil. Fl. Bras. III. p. 13. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 108. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 139. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 86.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 692; 1825. Syst. II. p. 389. n. 1709; 1830. Gen. I. p. 378. n. 1906: g. Malpighiear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1384. (p. 1590 ad Monadelph. Decandr. remissum.)

Hiraea Jacquin cont.
DC. 1824. Pr. I. p. 585: g. Banisteriear. Sect.: Hiraea, Mascagnia. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII; 1828. Consp. p. 207. n. 5366; 1837. Hdb. p. 299. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 641. Sect. ut DC. — Meisn. 1837. Gen. p. 55 (39). — Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 239 (sect.: Hiraeanthele, Hiraeostachys, Pachyantaeris); 1849. ibid. XXII. p. 24 (sect.: Mascagnia, Trilophopteris, Euhiraea).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48: g. Banisteriar.
A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e. sér. XIII. p. 257; 1843. Arch. Mus. III. p. 548. t. 19: g. Hirear. Sect. ut DC. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390.
Endl. 1840. Gen. n. 5568. p. 1059; 1841. Ench. p. 557: g. Pleuropterygiar. Sect. ut DC. (1841 Euhiraea.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 370.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7489: g. Triopteridear. Sect. ut DC. et Aspidopteris, Triaspis, Tristellateia.
Walp. 1846. Rep. V. p. 320: g. Hiraeear. Sect. ut DC.
Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 98: g. Hiraeacear. (restrict.)

Hiraea DC. 1824. Prodr. I. p. 585: sect. Hiraeae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 641. — A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 259; 1843. Arch. Mus. III. p. 564. — Endl. 1840. Gen. p. 1059. n. 5568 *a*. — Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7849. 1.
= Euhiraea Endl.

Hiraea Roxb. 1832. Fl. Ind. II. p. 447: g. Decandr. Trigyn.
= Aspidopterys A. Juss.

Hiraeaceae Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 75: trib. Malpighiacear. Gen. bras.: Tetrapteris, Mascagnia, Hiraea, Diplopteris.

Hiraeanthele Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 239: sect. Hiraeae.

Hiraeeae Walp. 1846. Repert. V. p. 290: sect. Diplostemonum. *(Hireae A. Juss.)*
A. Juss. 1840 in Orb. Dict. VII. p. 610: trib. Diplostemonum. Gen. Hirear. A. Juss. 1843.

Hiraeostachys Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 242: sect. Hiraeae.

Hirculus Haworth 1821. En. Saxifr. p. 40: nov. g. Saxifragear. (Saxifraga hirculus L.)
Hirculi Tausch pars.

Hirculus Tausch 1823. Hort. Canal. fasc. I: sect. Saxifragae. (S. hirculus.) — Par. Gaud. 1828. Helv. III. p. 100. (S. hirculus et aizoides.) — Seringe 1830 in DC. Pr. IV. p. 44. — Sternb. 1831. Revis. Saxifr. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 557. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 211. — Koch 1836. Syn. p. 270. Ed. II. p. 298. — Endl. 1839. Gen. n. 4634 *i*. p. 815; 1841. Ench. p. 409. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 564. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 210. — Gren. (& Godr.)

*) Dicat. Jean Nic. de la Hire, medico gallico.

Hirculus Tausch cont.
1840. France I. p. 600.
Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6156. 1: sect. Robertsoniae.
Gren. 1853 in Bill. Fl. Gall. exsicc. Cent. XI: subsect. Saxifragae sect. 4.
Synon. Kingstonia Gray; Hirculus, Ciliaria et Leptasea Haw.

Hireae (s. Pleuropterygieae) A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 255; 1843. Arch. Mus. III. p. 493: subtrib. Diplostemonum. Gen.: Jubelina, Diplopterys, Hiraea, Tetrapterys, Triopterys, Aspidopterys, Triaspis, Hiptage, Tristellateia, et 1843 Dinemandra, Dinemagonum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p 390: trib. Malpighiacear. Gen. ut A. Juss. 1843.

Hirnelia Wittst. vid. *seq.*

Hirnellia Cassini 1820. Bull. soc. philom. Avr. p. 57; 1821. Dict. v. 21. p. 199; 1822. v. 23. p. 563: nov. g Gnaphaliear. *(H. cotuloides.) Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 445 *(Hirnelia).* — Par. Rchb. 1828. Consp p. 105. n. 2444.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Leontopodiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.
Less. 1832. Syn. p. 269: g. Craspediear.
= Angianthus Wendl.

Hirneola Fries 1825. Pl. homon. p. 93: nov. g. Cupularium. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 291. — Endl. 1836. Gen. n. 406. p. 35; 1841. Ench. p. 20.
Rchb. 1841. Nom. p 10. n. 424: g. Exidieor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 40; 1842. Mycol. p. 168: g. Tremellinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 340: g. Tremellineor. *Cf.* Fries 1851. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. 1. p. 117.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Tremelleor.?

Hirpicium Cassini 1820. Bull. soc. philom. Févr. p. 27; 1821. Dict. v. 19. p. 234; 1821. v. 21. p. 238; 1823. v. 29. p. 448; 1830. v. 60. p. 573: nov. g. Gorteriear. (Oedera alienata Thunb.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2674 *(Herpicium);* 1841. Nom. p. 93. n. 3643. — DC. 1837. Pr. VI. p. 502. — Endl. 1838. Gen. n. 2842. p. 465; 1841. Ench. p. 245. — Meisn. 1839. Gen. p. 223 (139). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 14. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Bartl. 1830. Ord. p. 143; g. Arctotidear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 53.

Hirschfeldia*) Mönch 1794. Meth. p. 264: nov. g. Thalamostemonis. *(Sinapis incana L.)*
DC. 1821. Syst. II. p. 618; 1824. Pr. I. p. 220: sect. Sinapios. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1182; 1828. Consp. p.

Hirschfeldia Mönch cont.
185. n. 4818 *a;* 1832. Fl. exc. p. 693. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 250. — Endl. 1839. Gen. n. 4950 *d.* p. 883; 1841. Ench. p. 451.
Presl 1826. Sicul. I. p. 96: g. Brassicear. — Par. (Gren. &) Godr. 1848 France I. p. 78.
Webb & Berth. 1836. Canar. I. p. 85: g. Enarthrocarpear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323: g. Siliquosar.
Rchb. 1841. Nom. p. 183. n. 7043: g. Sinapiear.

Hirtella*) Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 17; 1737. Coroll. p. 2. n. 939; 1740. Syst. p. 17; 1742. Gen. ed. II. p. 19. n. 40; 1753. Sp. I. p. 34; 1759. Syst. ed. X. p. 861. n. 44: g. Triandr. Monogyn. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 23.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Terebintor.
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 290; 1764. Gen. ed. VI. p. 110. n. 280; 1767. Syst. ed. XII. p. 183. n. 277: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 201; 1784. Syst. p. 242. — Aubl. 1775. Guian. II. p. 246. t. 98. — Reich. 1778. Gen. p. 133. n. 299. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 153. n. 388. — Gmel. 1791. Syst. p. 418. — Pers. 1797. Syst. p. 253; 1805. Ench. I. p. 249. n. 567. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1151. n. 442.
Adans. 1763. Fam. II. p. 447: g. Cistor.
Gled. 1764. Syst. p. 36. n. 135: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 230: g. Nomadear.
Juss. 1789. Gen. p. 340: g. Prockiar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 6.
Neck. 1790. El. III. p. 379. n. 1818: g. Osariphytor.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 191: g. Rosacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 150. n 643. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXII. 271. n. 938. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 242. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 766. n. 835.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 872: g. Rosaceis aff.
R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 433 (Verm. bot. Schr. I. p. 205): g. Chrysobalanear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 244. t. 565. — Kunth 1824. Syn. III. p. 484. — DC. 1825. Pr. II. p. 528. — Rchb. 1828. Consp. p. 171. n. 4518; 1841. Nom. p. 177. n. 6875. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40 *(Hirtellia).* — Bartl. 1830. Ord. p. 406. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 178. n. 898. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 479. — Zucc. 1832. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. I. p. 372. Char. reform. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 375. — Meisn. 1837. Gen. p. 102

*) Dicat. C. C. L. Hirschfeld, Holsato.

*) „Nomen ob ramorum tenellorum hirsutiem." (Ht. Cliff.)

Hirtella Linn. cont.
(72). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 803. — Endl. 1840. Gen. n. 6408. p. 1251; 1841. Ench. p. 664. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 517.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 212: g. Chrysobalanacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 543.
Synon. Causea Scop.; Cosmibuena Ruiz & Pav.; Balantium Desv.; Braya Fl. Flum.

Hirtellia Dumort. vid. *praeced.*

Hirtellina Cassini 1827. Dict. v. 47. p. 499. 511; 1830. v. 60. p. 570: nov. g. Stähelinear. (Stähelina fruticosa.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10.
Cass. 1827. Dict. v. 50. p. 441: subg. Stähelinae.
DC. 1837. Pr. VI. p. 544: sect. Stähelinae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2858 *b*. p. 469; 1841. Ench. p. 246. — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3666. 2.

Hisbanche Sparrm. ex Meisn. Comm. p. 275. = Cytinus Linn.?

Hisingera Hellen. 1792. Vet. Ac. n. Handl. p. 32. t. 2. *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 245.
Willd. 1805. Sp. IV. p. 835. n. 1834: g. Dioec. Polyandr. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 629. n. 2276.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 887: g. Linozostear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 193: g. Euphorbiacear. — Par. A. Juss. 1824. Euphorb. p. 34. — Cham. & Schltd. 1831. Linnaea VI. p. 363.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 906. n. 3193; 1831. Gen. II. p. 710. n. 3578: g. Tricoccar.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5053; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 194. n. 7372. (*genuinar.*) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 487.
Sieb. & Zucc. 1835. Fl. jap. I. p. 167. t. 88. 100: g. Flacourtianear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 75. n. $5080/_1$; 1850. Spl. V. p. 47 (*Hiesingera*). — Meisn. 1843. Comm. p. 342. — Walp. 1846. Rep. V. p. 57.
Endl. 1840. Gen. n. 5815. p. 1115; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear.
Meisn. 1841. Gen. p. 340 (252): g. Rottlerear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: g. Flacourtear.
Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 393; 1857. ibid. VIII. p. 220: g. Flacourtiear.

Hisingera Miquel . . . . Mon. Cycad. p. 61.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 159; 1846. Chlor. prot. p. LXIV: sect. Nilssoniae.
Synon. Cycaditis et Pterophylli sp. Auct.

Hispidella Barnades 1789 in Lam. Dict. III. p. 134.
Cass. 1821. Dict. v. 21. p. 247: g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 146.

Hispidella Barnades cont.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 63; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Hieraciear.
Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2125: g. Hyoseridear.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 258: inter gen. Compositar. incertae sedis. — Par. Meisn. 1839. Comm. p. 122.
Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3672: g. Lampsanear.?
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 411: g. Andryalear.
Synon. Soldevilla Lag.

Histerium DC. vid. *Hysterium DC.*

Histiopteris*) Agardh 1839. Rev. spec. Pter. p. 76: sect. Pteridis. — Par. Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 342.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 357: subg. Pteridis.

Hisutsua**) DC. 1837. Prodr. VI. p. 44: nov. g. Chrysanthemear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2664. p. 433; 1841. Ench. p. 241. — Meisn. 1839. Gen. p. 210 (134). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3073. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 245: g. Euchrysanthemear.

Hitchenia Wallich 1834. Trans. soc. Calc. VII. p. 215; 1836 in Lindl. Introd. ed. II. p. 324: g. Zingiberacear.? *Cf.* Endl. Gen. p. 225. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167.
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: g. Kämpferiear.
Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2231: g. Amomear.? — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 154.
Meisn. 1842. Gen. p. 388 (290): g. Zingiberear.?

*Hizospermae****)* Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 103: ordo Filicum. Gen. foss.: Spirelepidodendrum, Glossopteris, Sphaenopteris, Neuropteris, Pecopteris, Odontopteris, Alethopteris, Aspleniopteris, Hymenopteris. Gen. hodierna. §. 1: Onoclea, Lomaria, Struthiopteris, Allosurus, Onychium, Hymenolepis, Monogramme, Leptochilos, Vittaria, Antrophyum, Diplazium, Scolopendrium, Didymochlaena, Pteris, Lonchitis, Lindsea, Asplenium, Caenopteris, Blechnum, Woodwardia, Doodia, Sadleria, Allantodia, Aspidium, Pleopeltis, Adiantum, Cheilanthes, Cassebeeria, Davallia, Dicksonia; Marattia, Angiopteris, Danaea, Todea, Chnoophora, Trichopteris, Alsophila, Woodsia, Hemitelia, Cyathea, Cibotium, Peranema; Polybotrya, Acrostichum, Hemionitis, Gymnogramme, Meniscium, Grammitis, Taenitis, Nothochlaena, Xiphopteris, Niphobolus, Polypodium. §. 2: Gleichenia, Platyzoma, Ceratopteris, Mohria. §. 3. Trichomanes, Hymenophyllum.

---

*) ἱστίον, velum.
**) *Hi-su-tsu* Chinensium.
***) ἵζω, pono, sedeo.

Hladnickia Meisn. vid. *Hladnikia Rchb.*

Hladnikia*) Rchb. 1830. Ic. pl. crit. IX. p. 9. t. 825; 1832. Fl. exc. p. 476; 1837. Handb. p. 219; 1841. Nom. p. 140. n. 5386: g. Amminear. (H. pastinacaefolia.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 143 (104) *[Hladnickia].*
= Falcaria Riv.

Hladnikia Koch 1836. Flora I. p. 166: nov. g. Umbelliferar. (Athamanta Golaka Hacq.)
Koch 1836. Syn. p. 320: g. Smyrnear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 921.
Synon. Malabaila Tausch (nec Hoffm. 1814); Grafia Rchb.

Hlubechia Bronner vid. *seq.*

Hlubeckia**) Bronner 1857. Traub. d. Rheinth. p. 20 (p. 11 *Hlubechia*): g. Vitium class. II.

Hoarea***) Sweet 1820. Geran. n. 18: nov. g. Pelargoniear. — Par. Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. I. p. 60. — Rchb. 1837. Hdb. p. 290; 1841. Nom. p. 201. n. 7654.
DC. 1824. Pr. I. p. 649: sect. Pelargonii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5278 *a.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 725. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 307. — Endl. 1840. Gen. n. 6048 *a.* p. 1168; 1841. Ench. p. 620.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: g. Geraniear.

Hochbergia Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: novum g. plant. (Nomen.)

Hochstettera Spach vid. *seq.*

Hochstetteria†) DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 287: nov. g. Euinulear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 193 (129). — Endl. 1841. Spl. I. n. 2437/$_1$. p. 1381; 1841. Ench. p. 236.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 28 *(Hochstettera)*: g. Buphthalmear.
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3402: g. Inulear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 953: g. Geigeriear.

Hockea Lindl. vid. *Fockea Endl.*

Hockinia††) Gardner 1843. Lond. journ. bot. II. p. 12: nov. g. Gentianear. (H. montana.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Endl. 1843. Spl. III. p. 76. n. 3552/$_1$: g. Chironiear.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 70: g. Lisianthear.
Synon. Anacolus Griseb.

*) Dicat. Hladnik, prof. Labacensi.

**) Franc. Xav. Hlubek, scriptor de Vitium classificatione.

***) Dicat. Sir Rich. Hoare.

†) Dicat. Chr. Fr. Hochstetter, prof. Essling.

††) Dicat. John Hockin, Dominica.

Hocquartia*) Dumort. 1822. Comment. bot. p. 30: nov. g. ab Aristolochia sejunctum. (A. Sipho et tomentosa.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14: g. Aristolochiear.
Meisn. 1841. Gen. p. 334 (246): sect. Aristolochiae.
= Sipho Endl.

Hodgsonia Hook. f. 1855. Ill. Himal. pl. t. 3: nov. g. Cucurbitacear.

Höffnagelia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 68. n. 1394: g. Amorphophytor.
= Trigonia Aubl.

Hölselia „Neck." Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 269: vid. *seq.*

Hölzelia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 62. n. 1383: g. Amorphophytor.
= Possira Aubl.

Hoemodoraceae A. Rich. Sert. Astrol. p. 80: lege *Haemodoraceae.*

Hoferia Scopoli 1777. Introd. p. 194: nov. g. Speciosar. *(Mokof Kämpf.)*
= Cleyera Thunb.

Hoffmannia Löfling . . .
= Ellisia Linn. (DC. Pr. IV. p. 400.)

Hoffmannia**) Swartz 1788. Prodr. p. 30; 1797. Fl. Ind. occ. I. p. 241. t. 5: nov. g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 789. n. 1719. — Gmel. 1791. Syst. p. 245. — Willd. 1797. Sp. I. p. 613. n. 199. — Pers. 1805. Ench. I. p. 131. n. 255.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 436: g. Rubiacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 61. n. 290. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 10. 184. n. 459. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 383. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 270. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 416. n. 418; 1830. Gen. I. p. 95. n. 475. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 487.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 605 *(Hofmannia)*: g. Cinchonear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2048.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Genipariae.
Bartl. 1830. Ord. p. 210: g. Hedyotidear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 259: g. Gardeniar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 400: g. Gardeniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 510. — Meisn. 1838. Gen. p. 163 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2942.
Endl. 1838. Gen. n. 3287. p. 558; 1841. Ench. p. 274: g. Eugardeniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Hoffmannia Willd. . . . . in Usteri Bot. Mag. VI. p. 17. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 21. p. 271.
= Psilotum Swartz.

*) Dicat. Abbé Hocquart.

**) Dicat. G. F. Hoffmann, prof. tandem Mosq.

Hoffmannseggia*) Willd. 1809. Enum. p. 445: g. Decandr. Monogyn.
Bronn 1822. Diss. p. 130 (*Hoffmannsegia*): g. Cassiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 99 (70).
Spreng. 1825. Syst. II. p. 344. n. 1629 (*Hofmannseggia*); 1830. Gen. I. p. 361. n. 1820: g. Leguminosar. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1496.
Rchb. 1828. Consp. p. 156. n. 4145: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88. (verar.)
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
= Hoffmanseggia Cavan.

Hoffmannsegia Bronn vid. *praeced.*

Hoffmanseggia Cavan. 1797. Icon. IV. p. 63. t. 392. 393: nov. g. Decandr. Monogyn. (H. falcaria.)
Pers. 1805. Ench. I. p. 460. n. 1019: g. Leguminosar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 297. n. 1181. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 767 (anomal: *Hofmanseggia*). — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 271. — Link 1821. En. I. p. 410.
DC. 1825. Pr. II. p. 484: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 433. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 392. (ampliat.) Sect.: Hoffmanseggiaria, Pomaria.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Eucaesalpiniear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Endl. 1841. Gen. n. 6774. p. 1314; 1841. Ench. p. 674: g. Caesalpiniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6076. — Brongn. 1843. En. genr. p. 132. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 492.
Conf. Hoffmannseggia Willd.

Hoffmanseggiaria Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 393: sect. Hoffmanseggiae. (*Hoffmanseggia Cavan.*)

Hofmannia Spreng. vid. *Hoffmannia Swartz.*

Hofmannseggia Spreng. vid. *Hoffmannseggia Willd.*

Hofmanseggia Spreng. vid. *praeced.*

Hofmeistera**) Rchb. f. 1852. Pollin. gen. p. 30: nov. g. Vandear., Telipogoni et Trichoceroti aff. *Cf.* Flora 1853. II. p. 751.
= Hofmeisterella Rchb. f.

Hofmeisterella Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 563; 1854. Xen. Orchid. p. 41. t. 18: g. Vandear., mutato nomine ob *Hofmeisteriam Walp.* (H. eumicroscopica.)
Synon. Hofmeistera Rchb. f.

Hofmeisteria Walp. 1847. Repert. VI. p. 106: g. Ageratear. (*Helogyne Benth.*, non Nutt.)

*) Dicat. Franc. Cent, comiti de Hoffmannsegg.
**) Dicat. W. Hofmeister.

Hohenackeria*) Fisch. & Meyer 1835. Ind. sec. sem. Petrop. p. 38: nov. g. Saniculear. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 188 et Linnaea XI. Litt. p. 107. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 143. n. 5538. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103. 358). — Endl. 1839. Gen. n. 4389. p. 768; 1841. Ench. p. 378. — Walp. 1843. Rep. II. p. 391. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 240.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 166: g. Tetragonospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Saniculidar.
Gay 1848. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 154. Char. emend.
Cosson 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. V. p. 137. Char. emend. Sect.: Ackeria, Keracia.

Hohenbergia**) Schult. f. 1830. Syst. VII. p. LXXI. 1251. n. 1482: nov. g. Bromeliacear. (H. stellata, etc.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1303. p. 182; 1841. Ench. p. 106. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 148.
Rchb. 1841. Nom. p. 45. n. 1635: g. Ananassear. — Par. A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 740.
Meisn. 1842. Gen. p. 395 (298): g. Bromeliear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 399.
Beer 1857. Bromel. p. 17. 72: g. Hohenbergiar.

Hohenbergiae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 7. 17: div. Phylanthear. Gen.: Hohenbergia.

Hohenwartha***) Vest 1820. Flora I. p. 1: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. (Capitator.)
Cass. 1821. Dict. v. 21. p. 273; 1826. v. 41. p. 314. 337: g. Carduinear. dubium.
Cass. 1826. Dict. v. 44. p. 36. 40; 1827. v. 50. p. 247: g. Chryseidear.?
Rchb. 1828. Consp. p. 102. n. 2339: g. Carduinar. genuinar.?
Bartl. 1830. Ord. p. 144: g. Carduacear.?
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 365: sect. Carthami.
= Kentrophyllum Neck.

Hoheria†) A. Cunningh. 1839. Ann. nat. hist. III. Jul. p. 319: nov. g. Bombacear. (H. populnea.)
Endl. 1840. Gen. n. 5312. p. 991; 1841. Ench. p. 515: g. Myrodiear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 331. — Meisn. 1843. Comm. p. 343.
Rchb. 1841. Nom. p. 203. n. 7740: g. Quararibear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 361: g. Helictear.

*) Dicat. R. Fr. Hohenacker, botanico.
**) Dicat. principi de Würtemberg, qui nomine Hohenberg amabilem scientiam excoluit.
***) Dicat. episcopo Lincensi, Sigm. ab Hohenwarth.
†) *Hoheri* Nov. Zeland.

Hoheria A. Cuningh. cont.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 614: g. Sidear.
Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 30: g. Malvacear. Sect.: Euhoheria, Apterocarpa.

Hoiriri Adans. 1763. Fam. II. p. 67: g. Zingiberum.
= Bromelia Linn.?

Hoitzia*) Juss. 1789. Gen. p. 136: g. Polemonior. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 211. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXVII. 369. n. 719.
Gmel. 1791. Syst. p. 347: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Cavan. 1797. Ic. IV. p. 43. t. 365—367.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 313: g. Polemonacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 107. n. 479.
Pers. 1805. Ench. I. p. 187. n. 424: g. Polemonidear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 468; 1825. Syst. I. p. 626. n. 667; 1830. Gen. I. p. 153. n. 767: g. Polemoniear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 685. — Meisn. 1840. Gen. p. 273 (180).
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 162: g. Polemoniacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 274. — Kunth 1823. Syn. II. p. 258. — Don . . . . Edinb. n. phil. journ. VII. p. 288. — Rchb. 1828 Consp. p. 119. n. 3022. — Bartl. 1830. Ord. p. 189. — Endl. 1839. Gen. n. 3823. p. 658; 1841. Ench. p. 327. — Brongn. 1843. En. genr. p. 54. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 636.
Rchb. 1837. Hdb. p. 194; 1841. Nom. p. 113. n. 4394: g. Giliear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX p. 108.
= Löselia Linn.

Holacantha**) A. Gray 1854. Mem. Amer. Ac. n. ser. V. (Pl. Thurber. p. 310): nov. g. Simarubacear. *Cf.* Flora 1855. p. 586. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 419.

Holanthus Rchb. 1828. Consp. p. 93. n. 1962*a*: sect. Loranthi.

Holarges Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 75; 1789. Beitr. IV. p. 148. (Draba incana.)
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 233; 1821. Syst. II. p. 348; 1824. Pr. I. p. 170: sect. Drabae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4761c; 1841. Nom. p. 180. n. 6950. 2. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 185. — Koch 1836. Syn. p. 65. Ed. II. p. 70. — Endl. 1840. Gen. n. 4880*b*. p. 869; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 152.

Holargidium „Turczan. mss." Ledeb. 1842. Fl. Ross. I. p. 156: nov. g. Alyssinear. (H. Kusnetzowii.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 74. n. 4880/$_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 340. — Walp. 1843. Rep. II. p. 758.

Holargidium Turczan. cont.
Turczan. 1842. Bull. soc. Mosc. Nr. 2. p. 265: g. Tetrapomear. *Cf.* Linnaea XVI. Litt. p. 313. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 86. n. 4883/$_1$.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 654: g. Siliculosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Tetrapomidar.

Holarrhena R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 62 (Verm. bot. Schr. II. p. 399): nov. g. Apocynear. (Carissa mitis Vahl.) — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXIII. 400. n. 737. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 145. n. 726.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 635. n. 684: g. Contortar. (Pentandr. Monogyn.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 652.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3517; 1841. Nom p. 133. n. 5150: g. Echitear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Endl. 1838. Gen. n. 3412. p. 583; 1841. Ench. p. 294. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. — Meisn. 1840. Gen. p. 264 (172). — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 413. Sect.: Euholarrhena, Meiosiphon, Alepis. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 440.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 78: g. Echitiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Holböllia Wallich 1824. Tent. fl. Nepal. p. 23. t. 16. 17: nov. g. Menispermear. (verar.) *Cf.* Linnaea II. p. 537. — Par. Rchb. 1828 Consp. p. 86. n. 1890. (genuinar.) — Spreng. 1831. Gen. II. p. 802. n. 4153. (Hexandr. Trigyn.)
G. Don 1837. Gen. syst. I. p. 104: g. Lardizabalear. — Par. Decne 1839. Arch. Mus. I. p. 193. t. 12; 1839. Ann. sc. nat. 2e sér. XII. p. 105 — Endl. 1841. Spl. I. n. 4700 $_1$. p. 1417: 1841. Ench. p. 417. — Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2632. — Meisn. 1843. Comm. p. 339 — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 141.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 304: g. Lardizabalacear.
Endl. 1850. Spl. V. p. 25: g. Holböllicar.
Synon. Hollböllia Spreng.

Holböllia Wallich 1831 in Hook. Bot. Miscell. II. p. 144. t. 76: nov. g. Graminear., Asprellae aff.? (H. ornithocephala.)
Kunth 1833. Agrost. p. 170: g. Panicear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 86. n. 787. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 133. 298. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1295. — Meisn. 1843. Gen. p. 418 (320: *Hollböllia*). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160 (*Hollböllia*).
Trin. 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845) Bot. p. 32: g. Vilfear.
= Lopholepis Decne.

Holböllieae Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 25: trib. Lardizabalear. Gen.: Akebia, Holböllia, Stauntonia, Parvatia.

---

*) *Hoitzit* Mexicanorum.
**) ὅλος, solidus, integer.

Holcus*) Linn. 1737. Gen. p. 352. n. 883; 1737. Cliff. p. 468; 1740. Syst. p. 31; 1748. Ups. p. 301; 1753. Sp. II. p. 1047; 1759. Syst. ed. X. p. 1305. n. 1015; 1763. Sp. ed. II. p. 1483; 1764. Gen. ed. VI. p. 541. n. 1146; 1767. Syst. ed. XII. p. 669: g. Polygam. Monoec. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 366. — Scop. 1772. Carn. II. p. 275. — Murr. 1774. Syst. p. 759; 1784. Syst. p. 905. — Reich. 1778. Gen. p. 536. n. 1252. — Lour. 1790. Coch. II. p. 645. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 715. n. 1565. — Pers. 1797. Syst. p. 945. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 928. n. 1865; 1809. En. p. 1034.

Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 18. n. 70: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 183. Disjungitur Sorghum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 76. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael. p. 135. — Host 1801. Gram. Austr. I. p. 1. t. 1—4; 1805. III. p. 3. t. 3. — Link 1821. En. I. p. 80. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 51. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 70. 343. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 67. n. 326.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 407. — Juss. 1789. Gen. p. 30. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 101. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — DC. 1805. Franç. III. p. 97; 1815. V. p. 286. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 76. — Hedw. 1806. Gen. p. 42. 363. — Palis. 1812. Agrost. p. 87. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 39. 655. n. 326. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 482 (*Houque*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 292. n. 304. — Link 1829. Hdb. I. p. 50. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 692 (*Houque*).

Thunb. 1784. Fl. jap. p. 42; 1818. Fl. cap. I. p. 410: g. Triandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 172. — Pers. 1805. Ench. I. p. 78. n. 150. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 247. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 63. — Trin. 1820. Fund. p. 164. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 549. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. I. p. 320; ed. 1832. I. p. 318.

Neck. 1790. El. III. p. 233. n. 1619: g. Achyrophytor.

Swartz 1808 in Schrad. n. Journ. II. 2. p. 39. Char. emend.

R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 582 (Verm. bot. Schr. I. p. 114): g. Panicear.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 72: g. Avenacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 160. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 135. — Agdh. 1823. Aphor. p. 194. — Link 1827. Hort. I. p. 125. — Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1040; 1830. Fl. exc. p. 53. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Koch 1837. Syn. p. 793. Ed. II. p. 916. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 37. — Brongn. 1823. Én. genr. p. 8. — Scheele 1844. Flora I. p. 54. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 394. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 409.

Bartl. 1830. Ord. p. 28: g. Bromear.

Kunth 1830. Gram. p. 29; 1833. Agrost. p. 34; 1838. Berol. II. p. 361; g. Phalaridear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 754. p. 81; 1841. Ench. p. 56. — Meisn. 1843. Gen. p. 416 (318). — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 9; 1850 in Webb Canar. III. p. 376. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 180. — Steud. 1854. Glum. I. p. 14.

Trin. 1839. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. Bot. p. 85: g. Phalarideor.

Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 238: g. Phalaroidear.

Griseb. 1844. Rumel. II. p. 457: g. Avenear.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 78: g. Melicear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115: g. Phalarear.

Math. 1853. Belg. I. p. 600: g. Agrostidear. verar.

(Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 524: g. Trisetear.

Holcus „R. Br." Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 85: subg. Andropogonis.

Holderlinia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 106. n. 185: nov. g. Psydomorphytor., a Protea L. sejunctum.
= Serruria Salisb.

Holeraceae Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: ordo 53 plantar. Gen.: Spinacia, Blitum, Beta, Galenia, Atriplex, Chenopodium, Rivina, Petiveria, Herniaria, Illecebrum, Polycnemum, Axyris, Achyranthes, Amaranthus, Gomphrena, Celosia, Ceratocarpus, Corispermum, Callitriche, Salsola, Salicornia, Anabasis. *Cf. Holoraceae Linn.*

Holigarna*) Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 79. t. 282: nov. g. Pentandr. Trigyn. (H. longifolia.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 473. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 935. n. 1106.

DC. 1825. Pr. II. p. 63: g. Anacardiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3865; 1841. Nom. p. 146. n. 5687. — Bartl. 1830. Ord. p. 396. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 63. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 169. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 186.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 233. n. 1225: g. Terebinthacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1009.

Roxb. 1832. Ind. II. p. 80: g. Pentandr. Digyn.

*) Nomen ex Plinio. Graecis ὅλκος.

*) Nomen vernaculum.

Holigarna Roxb. cont.
Hamilt. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 157.
Meisn. 1837. Gen. p. 75 (55): g. Cassuviear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 924: g. Araliacear.
Endl. 1840. Gen. n. 5914. p. 1132; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.

Hollböllia Spreng. 1827. Cur. post. p. 342: g. Menispermear.
„Wall." Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1342: g. Dioscorear.?
Walp. 1842. Rep. I. p. 99: g. Lardizabalear. — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 214.
= Holböllia Wall. 1824.

Hollböllia Meisn. et Spach vid. *Holböllia Wall.* 1831.

Hollia Sieber 1826. Flora 1. p. 223: nov. g. Muscor. — Par. Brid. 1827. Bryol. II. p. 772 (incertae classis).
= Dicnemon Schwägr.

Hollia Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 103. n. $472/_6$: novum nomen pro *Blytia Endl.* propositum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 59: g. Diplomitridar.
= Pallavicinius Gray.

Holmskidia Dumort. vid. *seq.*

Holmskioldia*) Retz. 1791. Observ. VI. p. 31.
Willd. 1800. Sp. III. p. 360. n. 1193: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 144. n. 1444.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 422; 1825. Syst. II. p. 755. n. 2117; 1831. Gen. II. p. 478. n. 2360: g. Verbenear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 117. n. 2913.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22 (*Holmskidia*): g. Viticear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 696. (?)
Benth. 1834. Labiat. p. 642: g. Stachydear.? — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 856. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 216. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 356. 463. — Brongn. 1843. En. genr. p. 66.
Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 108. n. 4226: g. Platuniear.
Endl. 1838. Gen. n. 3670. p. 630; 1841. Ench. p. 308: g. Ballotear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 289 (197). — Walp. 1845. Rep. III. p. 894. 990.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Ballotidar.
Synon. Hastingia Smith; Platunium Juss.

Holoblepharum Dozy & Molk. 1846. Musc. frond. ined. t. 36: nov. g. ab Hookeria sejunctum. (Bot. Zeit. 1847. p. 939.)
= Euhypnellae Müll. pars.

Holobulbos C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 226: sect. Gageae. (G. lutea, etc.)

Holocarpha Rchb. vid. *Olocarpha DC.*

Holocheilos Wittst. vid. *seq.*

Holocheilus Cassini 1818. Bull. soc. philom. Mai p. 73; 1821. Dict. v. 21. p. 306: nov. g. Nassauviear. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 447 (*Holocheilos*).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34: g. Trixidear.
= Platycheilus Cass.

Holochiloma*) Hochstett. 1841. Flora p. 371: nov. g. Verbenacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664.
Endl. 1842. Spl. II. p. 58. n. $3701/_1$: g. Lantanear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 366. — Walp. 1843. Rep. IV. p. 97.
= Premna Linn.

Holochilus Dalzell 1852 in Hook. Kew gard. misc. IV. p. 290: nov. g. Ebenacear., Macreightiae aff. (H. micranthus.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 477.

Holochlaina Walp. vid. *Holoclaina G. Don.*

Holochloa „Nuttall mss." Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 580: sect. Heucherae. (H. cylindrica Dougl.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 4639c. p. 1416; 1841. Ench. p. 409; 1850. Spl. V. p. 22. — Walp. 1843. Rep. II. p. 369.
Synon. Calycianthe Rchb.

Holochrysa Lindl. . . . Journ. Proc. Linn. Soc. III. p. 7: sect. Dendrobii. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 635.

Holoclaina G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 420: sect. Solani. (S. bigeminatum, Neesianum et Blumianum.) — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 62 (*Holochlaina*).

Holocoryne Fries 1838. Epicr. p. 578; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 338: sect. Clavariae. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 319.
Bonord. 1851. Hdb. p. 166: g. Clavariacear.

Holocystis Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. 386.
Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 98: g. Micrasteriear.
= Euastrum Ehrenb.

Holodanaea Presl 1847. Suppl. Pterid. p. 297: sect. Danaeae.

Hologamium Nees . . . . in Edinb. n. phil. journ. XVIII. p. 185.
Endl. 1841. Spl. I. n. $948/_2$. p. 1355; 1841. Ench. p. 60: g. Andropogonear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1354. — Meisn. 1843. Gen. p. 428 (328). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 167. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116.
Steud. 1854. Glum. I. p. 370: sect. Andropogonis.

*) Dicat. Theod. Holmskiold.

*) ὅλος, integer; χείλωμα, labium.

Holographis Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 728: nov. g. Gendarussear, Hemigraphidi aff.

Hologymne Bartl. 1837. Ind. sem. h. Gotting. (Linnaea 1838. Litt. p. 81): nov. g. ex typo Lastheniae glabratae Lindl. *Cf.* Walp. 1843. Rep. II. p. 635 not.
Meisn. 1839. Gen. p. 205 (132): g. Euheleniear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 17: g. Heleniear.
Meyer 1843. Ind. non. sem. h. Petrop.; 1844. Linnaea XVIII. p. 190: sect. Monolopiae.
Synon. Lasthenia Lindl.; Xantho Remy.

Hologyne G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 172: sect. Mitrasacmes.
Synon. Holomitrium Endl. 1838.

Hololachna Ehrenb. 1827. Linnaea II. p. 273: nov. g. Reaumuriae aff. (Tamarix songarica Pall.)
Spreng. 1830. Gen. I. p. 376. n. 1897: g. Tamariscinear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 728. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1584.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 156: g. Reaumuriacear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5479. p. 1037 (sphalm. *Halolachna*); 1841. Ench. p. 542. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 137. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 407.
Rchb. 1837. Hdb. p. 240; 1841. Nom. p. 166. n. 6466: g. Reaumuriear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 129 (93).
Synon. Schanginia Siev.; Hololachne Rchb.

Hololachne Rchb. 1828. Consp. p. 166. n. 4415: g. Reaumuriear. — Par. Ledeb. 1831. Alt. III. p. 222.
Bartl. 1830. Ord. p. 287: g. Tamariscinear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 479.
Walp. 1846. Rep. V. p. 808: g. Reaumuriacear.
= Hololachna Ehrenb.

Hololaena Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 61. n. 2093 *A* β: subsect. Calyptridii.

Holole pis DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 155. 189: nov. g. Carduacear. (Serratula pedunculata DC. ap. Pers.)
Cass. 1821. Dict. v. 21. p. 307: g. Cassiniear.
Cass. 1828. Dict. v. 57. p. 342; 1830. v. 60. p. 586: g. Vernoniear. (Archetypar. verar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 136. — Spach 1841. Vég phan. X. p. 39. (verar.)
Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2214: g. Eupatorinar.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 607. n. 2990: g. Cynarear.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 626: sect. Vernoniae. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 16. — Endl. 1838. Gen. n. 2204*b*. p. 358; 1841. Ench. p. 232. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3868. 2. — Gardn. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 209.
Synon. Proteopsis Mart.

Holomeria Benth. 1846 in DC. Prodr. X. p. 350: sect. Nycteriniae.

Holomitria Wallroth 1831. Fl. crypt. I. p. 94: sect. Gymnostomi.
Eupottia C. Müll.

Holomitriaceae Hampe 1847. Linnaea XX. p. 70: fam. Acrocarpor. (?) Gen.: Holomitrium.

Holomitrium „Brid. emend." Endl. 1836. Gen. n. 494. p. 48; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 17.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 869: g. Calyptrobryor.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 70: g. Holomitriacear.
C. Müll. 1848 Syn. Musc. I. p. 349: g. Dicranacear.
Synon. Olomitrium Brid.; Sprucea Wils.

Holomitrium Endl. 1838. Gen. n. 3566*c*. p. 606; 1841. Ench. p. 303: sect. Mitrasacmes.
Hologyne Don.

Holonema Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 356: nov. g. Ceramiear., Hanoviae aff.? (H. Liebmanni.)

Holopeira Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 37. 42: nov. g. Platygonear. (Cocculus villosus DC.), a Hook. f. & Thoms. (1855. Fl. Ind. I. p. 191) Cocculo iterum insertum.

Holopetalon Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 199: sect. Banisteriae.
Rchb. 1841. Nom. p. 207. n. 7858: g. Banisteriear.?
Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 58: sect. Heteropteridis.

Holopetalum Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5281*a*: sect. Monsoniae. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 287. — Endl. 1840. Gen. n. 6047*b*. p. 1167; 1841. Ench. p. 620.
Vid. Olopetalum DC.

Holopetalum Turczan. 1843. Bull. soc. Mosc. XVI. 1. p. 51: nov. g. Resedacear. (*Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 265 et Flora 1844. p. 120.) — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 33. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 356. — J. Müll. 1857. Mon. Réséd. p. 208.
= Oligomeris Cambess.?

Holophylla G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 414: sect. Solani. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 51.

Holophylla J. Agardh 1848. Spec. Fucoid. p. 290; trib. Anthrophyci.

Holophyllaea DC. 1836. Prodr. V. p. 670: sect. Meyeriae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2614*a*. p. 425; 1841. Ench. p. 240 (*Holophyllea*).

Holophyllea Endl. 1841 vid. *praeced.*

Holophyllum Lessing 1830. Linnaea V. p. 272: sect. Mutisiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2917*d*. p. 484; 1841. Ench. p. 248. — Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3436. 4.
Less. 1832. Syn. p. 106: subg. Mutisiae.

Holophyllum Less. 1832. Syn. Compos. p. 262: nov. g. Athanasiear. (Athanasia capitata L.) — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 86. — Endl. 1838. Gen. n. 2690. p. 438;

Holophyllum Lessing cont. 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 211 (135). — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3847. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24: g. Anthemidear. verar.

Synon. Pristocarpha Meyer.

Holophyllum Meisn. vid. *Hoplophyllum DC.*

Holopleura Caspary 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. g. 216: nov. g. Nymphaeacear. foss. (H. Victoria.)

Holopteluea Planch. vid. *seq.*

Holoptelea Planchon 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 259 (p. 266 *Holoptelaea*): nov. g. Ulmear. (Ulmus integrifolia Roxb.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 423.

Holoraceae)* Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 12 plant. Gen. §. 1: Blitum, Spinacia, Atriplex, Chenopodium, Beta, Salsola, Anabasis, Salicornia, Basella, Rivina. §. 2: Calligonum, Petiveria, Ceratocarpus, Corispermum, Callitriche. §. 3: Axyris. §. 4: Illecebrum, Herniaria, Polycnemum, Camphorosma. §. 5: Begonia, Rumex, Rheum, Atraphaxis, Polygonum, Coccoloba. §. 6: Nyssa, Mimusops, Rhizophora, Bucida, Anacardium. §. 7: Laurus, Tinus, Winterania, Heisteria. — Par. Gis. 1793. Prael. p. 306. Gen. ead. et in §. 1 Microtea, Caroxylon, in §. 4 Achyranthes, Chenolea, Celosia, Amaranthus, Iresine, Gomphrena, Phytolacca, in §. 5 Telephium, Limeum, Corrigiola.

Holoregmia Nees . · . . in Neuwied Reise Bras. II. p. 239; 1821. Flora I. p. 300: nov. g. Bignoniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 186.

DC. 1838. Bibl. un. Genèv. XVII. p. 123: g. Bignoniear. minus cognitum.

— Craniolaria Linn.

Holoschoenus**) Link 1827. Hort. Berol. I. p. 293; 1829. Handb. I. 103: nov. g. Cyperoidear.

Rchb. 1829 ap. Mössl. III. p. 1806; 1830. Fl. exc. p. 76: g. Fimbristylear.

Dietr. 1839. Syn. I. p 129. 202: g. Cyperacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1479: g. Scirpear.

C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 619: sect. Scirpi.

= Isolepidis R. Brown pars.

Holosepalum Spach 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 357: sect. Hyperici. — Simil. Endl. 1840. Gen. p. 1032. n. 5464 *A b c*; 1841. Ench. p. 539. n. 5464 *B d a.* — Rchb. 1841. Nom. p. 210. n. $7994/_1$.

Holosetum Steud. 1850. Flora I. p. 228 (nomen); 1854. Syn. pl. glum. I. p. 118: nov. g. Panicear. (H. Philippicum.)

Miq. 1857. Ind. bot. III. p. 444: g. Eupanicear.

Holostea „Benth." Rchb. 1841. Nomencl. p. 205. n. 7796. 3: sect. Stellariae. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 36. (St. Holostea.)

Holostemma R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 42 (Verm. bot. Schr. II. p. 380): nov. g. Asclepiadear. (*Ada-Kodiea Rheede* IX. p. 9. t. 7.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 484; 1825. Syst. I. p. 851. n. 989; 1830. Gen. I. p. 213. n. 1094. — Schult. 1820. Syst. VI. p. XII. 95. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1054. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 55. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 908. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI; 1828. Consp. p. 131. n. 3439; 1841. Nom. p. 128. n. 4961: g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 149: g. Asclepiear.

Endl. 1838. Gen. n. 3460. p. 591; 1841. Ench. p. 298: g. Cynoctonear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175). — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 480.

Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 532: g. Cynoctonar.

Holosteum*) Dillen. 1719. Nov. gen. p. 130. t. 6: nov. g. herbae Enangiospermae Pentapetalae.

Linn. 1740. Syst. p. 21; 1742. Gen. ed. II. p. 130. n. 301: g. Pentandr. Trigyn. (*Cf.* Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 21.) — Par. Cram. 1803. Disp. p. 64.

Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 11. n. 38: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 226.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Carophylleor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 349.

Linn. 1753. Sp. I. p. 88; 1759. Syst. ed. X. p. 881. n. 98; 1762. Sp. ed. II. p. 130; 1764. Gen. ed. VI. p. 42. n. 104; 1767. Syst. ed. XII. p. 103: g. Triandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 110; 1784. Syst. p. 128. — Reich. 1778. Gen. p. 48. n. 110. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 57. n. 136. — Gmel. 1791. Syst. p. 207. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 24; 1818. Fl. cap. I. p. 441. — Pers. 1797. Syst. p. 133; 1805. Ench. I. p. 111. n. 205. — Willd. 1797. Sp. I. p. 488. n. 157; 1809. En. p. 136. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 415. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 89. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 725. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 72. 371.

*) „Sic vocantur plantae manducatione fragiles et concoctione faciles, et hujus ordinis pleraeque tales sunt." (Gis.)

**) Nomen ex Plinio: ὅλος, totus, σχοῖνος, juncus.

*) „Nomen κατ' ἀντίφρασιν, quia mollis est."

Holosteum Dill. cont.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Caryophyllear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 331. — Juss. 1789. Gen. p. 299. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 237. — Batsch 1802. Tabl. p. 33. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 110. — Hedw. 1806. Gen. p. 50. 365. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 56. 857. n. 391. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 839 (anomal.); 1825. Syst. I. p. 362. n. 362; 1830. Gen. I. p. 77. n. 378. — Lois. 1821. Dict. v. 21. p. 309. — Link 1821. En. I. p. 107. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 142. 415.
Hill 1769. Ht. kew. p. 202: g. Pentapetalar.
Neck. 1790. El. II. p. 150. n. 839: g. Catotaphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 231. t. 130.
Cram. 1803. Disp. p. 17 in Diandr. Trigyn. (H. diandrum.)
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 656: g. Alsinear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 393. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1828. Consp. p. 206. n. 5340. (antea p. 162. n. 4274 err. inter Sperguleas.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 305. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 423. — Koch 1836. Syn. p. 117. Ed. II. p. 129. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205. — Meisn. 1837. Gen. p. 25 (21). — Kunth 1838. Berol. I. p. 125. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 204. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 104. — Gay 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 23. (Monogr.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 81: g. Alsinacear.
Presl 1826. Sicul. I. p. 166: g. Stellariar.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 783: g. Stellarinar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Arenarinar.
Endl. 1840. Gen. n. 5289. p. 968; 1841. Ench. p. 505: g. Arenariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7788. — Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 378. — Gren. (& Godr.) 1841. France I. p. 265.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 38: g. Stellariear.
Synon. Meyera Adans.; Cerastium Huds.; Stellaria Debr.

Holostigma G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 698. 716: nov. g. Lobeliacear. (Lobeliae sect. 3 R. Brown.)
Endl. 1838. Gen. n. 3057*b*. p. 511; 1841. Ench. p. 263: sect. Monopsidis.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 352: g. Lobeliear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 240 (147). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572. — Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3982 (*Holostigmateia*).

Holostigma Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 163. 270 (Nouv. Ann. Mus. IV. p. 332): novum g. Gayophytinear., antea *Agassizia Spach.* (Oenothera dentata Cavan.)
= Sphaerostigma Ser.

Holostigma C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 629: sect. Echii. (E. rubrum Jacq., tenue Roth.)

Holostigmateia Rchb. vid. *Holostigma G. Don.*

Holostium Caesalp. 1583. De plant. lib. 8. (Linn. 1747. Class. pl. p. 17.)
= Plantaginis Linn. pars.

Holostyla „DC. emend." Endl. 1838. Gen. n. 3225. p. 546; 1841. Ench. p. 273: g. Hamelicar. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2922 (*Holostylis*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hamelidar.
Synon. Olostyla DC.; Stylocorina Labill.

Holostylis Rchb. vid. *praeced.*

Holostylis Duchartre 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. II. p. 33 (Flora 1855. p. 684): nov. g. Aristolochiear. (H. reniformis.)

Holotea Achar. 1803. Meth. Lich. p. 17: sect. Opegraphae. („Lirellae simplices distinctae.")

Holothrix Richard 1818. Orchid. eur. p. 33: nov. g. Orchidear. (Orchis hispidula L.)
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 12 (Linnaea II. p. 529); 1835. Orchid. p. 283: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1477; 1841. Nom. p. 50. n. 1855. — Bartl. 1830. Ord. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1513. n. 209; 1841. Ench. p. 112. — Meisn. 1842. Gen. p. 379 (284). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 179.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Holotrichidar.

Holotome Benth. 1838. Enum. pl. Hügel. p. 56: sect. Actinoti.
Endl. 1839. Gen. n. 4379. p. 766; 1841. Ench. p. 377: g. Saniculear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 142. n. 5532. — Walp. 1843. Rep. II. p. 387; 1846. V. p. 844.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 140: g. Actinotear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Saniculidar.

Holotrichidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Ophrear. Gen.: Holothrix, Saccidium, Monotris, Scopularia, Tryphia, Bucculina. *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 172.

Holoxerus Fries 1838. Epicr. p. 401: sect. Xeroti.

Holtzendorffia Klotzsch & Karst. 1847 in DC. Prodr. XI. p. 727: nov. g. Aphelandrear.

Homachaenium Spach 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 166: sect. Microlonchi. (M. salmanticus Webb.)

Homaeocladia Harv. vid. *Homoeocladia Agdh.*

Homaeonema Rchb. vid. *Homalonema Endl.*

Homaid Adans. 1763. Fam. II. p. 470: g. Arorum. (Arum tenuifolium L.)
= Biarum Schott.

Homalanthes Steud. vid. *seq.*

Homalanthus*) „A. Juss. emend." Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5025; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 193. n. 7343: g. Hippomanear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 488.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 538. n. 2641: g. Tricoccar.
Steud. 1840. Nom. I. p. 774 (*Homalanthes*): g. Euphorbiacear.
Synon. Omalanthus A. Juss.; Carumbium Reinw.

Homalanthus „Less." Wittst. Etym. Handw. p. 449: vid. *Omalanthus Less.*

Homalea Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 14: nov. g. Lecidinear. *Cf.* Flora 1854. p. 235.

Homalia Wittst. vid. *Omalia Brid.*

Homaliaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 55) 1847. Veg. kingd. p. 742: ordo Cactalium. Gen. Homalinear. Endl.
= Homalinae R. Brown.

Homalinae R. Brown 1818. Narr. exp. Congo. App. V. p. 438 (Verm. bot. Schr. I. p. 215): novus ordo plant. Gen.: Homalium, Astranthus, Napimoga, Nisa. *Cf.* Link 1831. Hdb. II. p. 122.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 20; 1826. Isis p. 592: ordo Peponiferar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. p. LIX: div. Samydear. Gen.: Homalium, Blakwellia, Astranthus, Nisa.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (70) Calyciflorar. syncarpar.
D. Don 1830. Edinb. n. phil. journ. X. p. 119: fam. inter Rosaceas et Prockiaceas media.
Lindl. 1833. Nix. p. 17: ordo Cucurbitalium.
Rchb. 1837. Hdb. p. 254: div. Amygdalacear. Gen. Acomear. Rchb. 1828.

Homalineae DC. 1825. Prodr. II. p. 53: ordo (59) Calyciflorar. Gen.: Homalium, Napimoga, Pineda, Blackwellia, Astranthus, Nisa, Myriantheia. *Affinia:* Asteropeia, Aristotelia. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 54. Gen. ead. et Azara, Illigera. Affinibus accedit Neillia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: trib. Samydacear. Gen.: Homalium, Blakwellia.
Bartl. 1830. Ord. p. 269: ordo (151) Peponiferar. Gen. ut DC.
Meisn. 1837. Gen. p. 73 (52): ordo 65 plant. (p. 438 Parietalium.) Gen. ut DC. et Eriudaphus, Adenobasium, Chaulmoogra?
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 285: fam. (96) Peponiferar. Gen. ut Meisn. excepto ultimo.
Endl. 1839. Gen. p. 922: ordo Parietalium. Gen.: Homalium, Blackwellia, Anetia, Eriudaphus, Myriantheia, Nisa; Asteropeia. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1421 et Ench. p. 481) Trimeria.

*) ὁμαλός, aequalis, similis.

Homalineae DC. cont.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 109: fam. Passiflorinear. Gen.: Homalium, Blackwellia.
Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 669: fam. Dicotyledonear. polypetalar. perigynar. Gen. ut Endl.
Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 56.

Homalium Jacq. 1763. Amer. p. 170. t. 183. f. 72.
Scop. 1777. Intr. p. 263: g. Polyandrar.
Swartz 1788. Prodr. p. 6. 86; 1800. Ind. occ. II. p. 988. t. 17: g. Polyandr. Trigyn. — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 366. n. 925. — Gmel. 1791. Syst. p. 836. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1225. n. 1060. — Pers. 1807. Ench. II. p. 82. n. 1326.
Juss. 1789. Gen. p. 343: g. Rosaceis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 195. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 868.
Cram. 1803. Disp. p. 127: in Icosandr. Trigyn.
St. Hil. 1804. Dict. v. 1. p. 233 (*Acomat*): g. Rosacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 79. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 612. n. 1981.
R. Brown 1818. Narr. exp. Cong. App. V. p. 438 (Verm. bot. Schr. I. p. 215): g. Homalinar. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 446. n. 2207. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 272.
DC. 1825. Pr. II. p. 53: g. Homalinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18. — Bartl. 1830. Ord. p. 269. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 54. — Meisn. 1837. Gen. p. 73 (52). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 286. — Endl. 1839. Gen. n. 5086. p. 923; 1841. Ench. p. 481. (ampliat.) Sect.: Napimoga, Racoubea. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 108.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 743: g. Homaliacear.
Synon. Acoma Adans.; Racoubea et Napimoga Aubl.; Marshallia Gmel. (Steud.)

Homallophyllae Willd. 1804 in Rebent. Fl. Neomarch. p. X: ordo 7 Cryptogamiae. Gen.: Blasia, Riccia.
Spreng. 1806. Fl. hal. (Römer Collect. bot. p. 278): ordo 6 Ateliae. Gen.: Targionia, Riccia.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 64: fam. 4 plant. Gen.: Riccia, Blasia, Sphaerocarpus.
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 22: fam. 2 Hepaticar. Divis.: Corsinieae, Riccieae.

Homallophylleae Rchb. 1837. Handb. p. 136: fam. Thallobryor. Divis.: Riccieae, Targionieae, Anthoceroteae.

Homallophylli Corda 1830 in Sturm Jungerm. p. 4. 6: class. Phaenogamar. Tribus unica: Ricciaceae.

Homalobus „Nuttall" Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 350: nov. g. Astragalear. Sect.: Ervoideae, Genistoideae, Drabellae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6575. p. 1278; 1841. Ench. p. 669 (dubium). — Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5764. (?) Sect.: Drabellia, Apodolobus,

Homalobus Nuttall cont.
Homalobus (*Ervoideae Torr. & Gr.*). — Walp. 1842. Rep. I. p. 711. Sect. ut Torr. & Gr. — Meisn. 1843. Comm. p. 351. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554 (*Homolobus*).

Homalocarpos Pritzel 1841. Linnaea XV. p. 684 (Flora 1842. Lit. p. 78): sect. Anemones. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 30.
= Omalocarpus DC.

Homalocarpus Gaudin 1828. Fl. Helv. III. p. 494: sect. Anemones. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 249. — Rchb. 1841. Nom. p. 190. n. 7231. 2. (serius *Sciadianemia Rchb.*) — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 299.
Endl. 1839. Gen. n. 4773 *b* :. p. 845; 1841. Ench. p. 434: subsect. Anemanthi.
= Omalocarpus DC.

Homalocarpus Hook. & Arn. 1833. Bot. Miscell. III. p. 348: nov. g. Mulinear. (H. bowlesioides.) — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 262. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103). — Endl. 1839. Gen. n. 4374. p. 766; 1841. Ench. p. 377. — Rchb. 1841. Nom. p. 142. n. 5523. — Walp. 1843. Rep. II. p. 387. — Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 3.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136: g. Tetragonospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Mulinidar.

Homalocaryum A. DC. 1846. Prodr. X. p. 135: sect. Echinospermi.

Homalocenchrus Mieg 1776 in Pollich. Palat. p. 56: . . . . Act. Helv. IV. p. 307. *Cf. Hamolocenchrus Scop.*
= Leersia Sol.

Homalochilus Benth. 1848 in DC. Prodr. XII. p. 565: sect. Hemigeniae.

Homalocline Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2148: g. Crepidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 146: g. Lactucear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Endl. 1838. Gen. n. 3022 *B.* p. 501; 1841. Ench. p. 251: sect. Crepidis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3716. 2.
= Omalocline Cass.

Homalogonata)* Lyngbye 1819. Tent. hydroph. dan. p. XXXI. 177: sect. 5 Hydrophytor. Gen.: Diatoma, Fragilaria.

Homalolepis Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 1. p. 575: nov. g. Zygophyllear. (H. Blanchetii.) *Cf.* Flora 1848. II. p. 709. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 245.
= Simaba Aubl. (Planch.)

Homalomena Schott 1832. Melet. bot. p. 20: nov. g. Richardiear. (Calla occulta Lour., etc.)
Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 117: g. Anaporinar.
Conf. seq.

Homalonema Endl. 1837. Gen. n. 1695. p. 238; 1841. Ench. p. 129; 1843. Gen. Spl. III. p. 62: g. Richardiear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 56. — Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1107 (*Homaeonema*). — Meisn. 1842. Gen. p. 361 (269). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 50.
Hassk. 1842. Flora Beibl. II. p. 10.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 129: g. Anaporear.
Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 210: g. Anaporinar.
Synon. Homalomena Schott; Zantedeschia Spreng.

Homaloneuron Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 354: sect. Asplenii. (A. trapezoides, salicifolium, etc.)

Homalophyllae Martius 1817. Crypt. Erlang. p. 196: ordo 7 Cryptogamiae. Gen.: Blasia, Riccia.
Link 1831 in Willd. Grdr. p. 236: ordo 9 Cryptogamiae.
Math. 1853. Belg. II. p. 80: trib. Hepaticar. Gen.: Sphaerocarpus, Riccia.
Conf. Homallophyllae Willd.; Homallophylli Corda.

Homalophyllum Klotzsch 1851 in Otto's Gartenz. p. 354: sect. Centradeniae. (C. ovata.)

Homalosche Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 39; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Lycopodium complanatum L.)

Homalospermae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: series Umbellatar. Trib.: Peucedaneae, Tordylieae, Silerineae.

Homalospermum Schauer 1843. Linnaea XVII. p. 242: nov. g. Leptospermear. (H. firmum.)
Walp. 1843. Rep. II. p. 923; 1846. V. p. 740: g. Euleptospermear. — Par. Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 119.

Homalotes Endl. 1838. Gen. n. 2686. p. 437; 1841. Ench. p. 241: g. Cotulear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 88. n. 3440. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 414: sect. Tanaceti.
Synon. Omalanthus Less.; Omalotes DC.

Homalotheca Endl. 1838. Gen. n. 2746*c*. p. 447; 1841. Ench. p. 243: sect. Gnaphalii. — Par. Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 429. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 610.
Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3478: g. Helichrysear.
Conf. Omalotheca Cass.

Homalothecium Bruch, Schimp. & Gümb. 1841. Bryol. eur. Fasc. 46. 47: nov. g. Hypnear. (Hypnum sericeum etc.), serius Pylaisaeacear.

Homanthis HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 12: nov. g. Onoseridar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 357.
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 64: sect. Homalanthi.
Synon. Homoeanthus Less.; Homoianthus Rchb.; Clarionea Cass.; Heteranthus Bonpl. (teste Cass.)

*) ὁμαλός, planus; γόνυ, genu, articulus.

Hombak Adans. 1763. Fam. II. p. 408: g. Capparidum.
= Sodada Forsk.

Hombronia Gaudich. . . . nov. g. Pandanear. indescriptum. (H. calatiphora.) *Cf.* Decaisne 1853. Bot. voy. Pol Sud II. p. 83 et Müll. Ann. bot. V. p. 862,

Homeoplitis „Trin." Endl. Gen. p. 107 in synon. Pogonatheri: vid. *Homoplitis Trin.*

Homera „Neck." Endl. Ench. p. 671 in synon. Mucunae: vid. *Hornera Neck.*

Homeria Ventenat 1808. Dec. nov. gen. p. 5.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 307: g. Iridear. (Moraea collina Jacq.)
Sweet . . . . Fl. gard. I. t. 152. 178.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Moraeacear.
Spach 1838. Vég. phan. XIII. p. 3: g. Ferrariear.
= Moraea Linn.

Homoblasteae A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: subdiv. Perispermear. Fam.: Juncaceae, Pontederiaceae, Gilliesiaceae; Liliaceae, Smilacineae, Melanthaceae; Dioscoreaceae, Taccaceae; Irideae; Amaryllideae, Hypoxideae, Haemodoraceae; Bromeliaceae, Musaceae; Cannaceae, Zingiberaceae.

Homocentria Naudin 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 308: nov. g. Dissochaetear. (Melastoma vagans Roxb.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 881.

Homochilus A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 383: sect. Lobeliae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3987. з.

Homochroanthus Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 409: sect. Cheiranthi. (Ch. Cheiri L.)
= Cheiri DC.

Homochroma DC. 1836. Prodr. V. p. 324: nov. g. Psiadiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2371. p. 384; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 189 (127). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 29: g. Solidaginear.
Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3311: g. Disparaginear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Homochroospermum Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 333: subg. Cardui. Sect.: Cormophorum, Eucarduus, Orocarduus?

Homocladia Rchb. vid. *Homoeocladia Agdh.*

Homocnemia Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 36. 40: nov. g. Cissampelidear. (Cissampelos umbellata E. Meyer.)

Homoeantherum Steud. vid. *Homoeatherum Nees.*

Homoeanthus Spreng. 1826. Syst. III. p. 503. n. 2746; 1831. Gen. II. p. 624. n. 3096: g. Perdiciear.
= Scolymanthus Willd.

Homoeanthus Lessing 1830. Linnaea V. p. 15; 1832. Syn. Compos. p. 408: subg. Pereziae.
= Homanthis Kunth.

Homoeatherum Nees 1836 in Beech. voy. Bot. Pt. V. p. 239: nov. g. Andropogonear. (H. chinense.) — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 774 (*Homoeantherum*); 1854. Glum. I. p. 411.

Homoeocladea Agardh vid. *seq.*

Homoeocladia Agardh 1827. Flora II. p. 629: nov. g. Diatomear.
Rchb. 1828. Consp. p. 212a. n. 483b (*Homocladia*): g. Ceramiacear.
Agdh. 1830. Consp. Diat. p. 24 (*Homoeocladea*): g. Cymbellear. — Par. Harv. 1841. Brit. Alg. p. 208 (*Homaeocladia*).
Spreng. 1831. Gen. II. p. 756. n. 3849: g. Tremellacear.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 590: g. Diatomacear. inclusar.
Endl. 1836. Gen. n. 15. p. 2; 1841. Ench. p. 2: g. Hydrolinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 644. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13.
Kütz. 1844. Bacill. p. 110; 1845. Phyc. germ. p. 99; 1849. Sp. Alg. p. 97. n. 55: g. Naviculear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 34.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 97: g. Homoeocladiear.
Bréb. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 418: g. Schizonemear.

Homoeocladieae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 97: sect. Bacillariear. Gen.: Rhaphidogloea, Berkeleya, Homoeocladia.

Homoeomerici Körb. vid. *Lichenes Körb.* 1855.

Homoeotes Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 331: nov. g. Trichomanear. (Trichomanes heterophyllum Humb. & Bonpl.)

Homoeotrichum Kütz. 1843. Phycol. gener. p. 371; 1845. Phycol. germ. p. 283; 1849. Sp. Alg. p. 638: sect. Callithamnii.

Homogenei Achar. 1810. Lich. univ. p. 19; 1814. Syn. p. XI: ordo Idiothalamor. Gen.: Spiloma, Arthonia, Solorina; Gyalecta, Lecidea, Gyrophora, Calicium, Opegrapha.

Homoglossum Salisbury 1812. Trans. hort. soc. I. p. 325: nov. g. Gladiolear. (Gladiolus praecox Kenn.)
Gladiolus Tourn.

Homogyne Cassini 1816. Bull. soc. philom. Déc. p. 198; 1821. Dict. v. 21. p. 412; 1823. v. 26. p. 226; 1830. v. 60. p. 585: nov. g. Adenostylear. (Tussilago alpina L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2244. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 136. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 36.
Gaud. 1829. Helv. V. p. 272: sect. Tussilaginis.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 278: g. Eupatoriear.
Less. 1832. Syn. p. 158: g. Tussilaginear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 349. Ed. II. p. 382. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 46.

Homogyne Cassini cont.
DC. 1836. Pr. V. p. 204: g. Petasitear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2284. p. 370; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1839. Gen. p. 181 (124). — Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3551. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 148.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 185: g. Eupatoriear.
Schnizl. 1847. Fl. v. Bayern p. 134: g. Corymbiferar.

Homoianthae Rchb. 1828. Consp. p. 97: trib. Compositar. Divis.: Lactuceae, Eupatorinae, Cynareae, Echinopeae. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 248. Divis.: Cichoriaceae, Eupatorinae, Carduaceae, Echinopeae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 182. Subdivis.: Cichoriaceae, Mutisieae (et Nassauvieae), Cynareae. — Rchb. 1841. Nom. p. 94. Divis.: Cichorieae, Lactuceae, Hypochaerideae; Cardopateae, Silybeae, Barnadesieae; Eupatorieae, Vernonieae, Cynareae.

Homoianthus „Bonpl. mss." DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 65: nov. g. Labiatiflorar.
Cass. 1817. Dict. v. 8. p. 395; 1821. v. 21. p. 413: g. Nassauviear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2284. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 137.
Cass. 1825. Dict. v. 34. p. 206; 1830. v. 60. p. 584: g. Trixidear. — Par. D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 209. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 172. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 63. Sect.: Homanthis, Stenophyllum, Clarionoides. — Meisn. 1839. Gen. p. 232 (143). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 34. — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3767. Sect.: Homoianthus, Stenophyllum, Clarionissa.
Endl. 1838. Gen. n. 2962*b*. p. 492; 1841. Ench. p. 249: sect. Pereziae. Subsect.: Asteroseris, Scolymanthus.

Homoioceltis Blume 1853. Mus. bot. Lugd. II. p. 58: nov. g. Celtidear. (Sponia nudiflora Sieb. & Zucc.)

Homolobus Lindl. Veg. kingd. p. 554: vid. *Homalobus Nutt.*

Homomallia C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 425: subsect. Rigodii. (Hypnum rusciforme Weis.)

Homomelis Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 416: corr. pro *Hamamelis.* (a ὅμος, similis; μηλίς, pomus.)

Homonemea Fries 1825. Pl. homon. p. 35. 37: trib. Nemeor. Class.: Fungi, Algae.
= Thallophyta Endl.

Homonoea Spreng. vid. *seq.*

Homonoia*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 636. Ed. Willd. p. 782: nov. g. Dioec. Polyadelph. (H. riparia.) *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 416.

*) ὁμονοια, concordia: ob stamina in varias tribus unita.

Homonoia Lour. cont.
Batsch 1802. Tab. p. 169: g. Tricoccar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 912. n. 3203; 1831. Gen. II. p. 712. n. 3592 (*Homonoea*).
A. Juss. 1824. Euphorb. p. 60: g. Euphorbiacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5110; 1841. Nom. p. 195. n. 7453 (minus cognitum). — Endl. 1840. Gen. n. 5885. p. 1125; 1841. Ench. p. 589 (dubium).
Meisn. 1841. Gen. p. 337 (251): g. Hippomanear.?

Homopappus Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 330: nov. g. Chrysocomear. Subgen.: Myrianthus, Actinaphoria.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 244: sect. Pyrrocomae.
Endl. 1842. Spl. II. p. 39. n. $2377/_1$: g. Solidaginear. Sect.: Myrianthus, Actinophoria. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Walp. 1843. Rep. II. p. 591. Sect. ut Endl. et Euhomopappus? — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Homoplitis*) Trinius 1820. Fund. Agrost. p. 166: g. Triandr. Digyn.
= Pogonatherum Palis.

Homopteris Ruprecht 1845. Beitr. Pfl. russ. R. 3te Lief. p. 48: nov. g. Filicacear., pro Allosoro Stelleri et gracili propositum.
Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 526: sect. Allosuri.

Homoranthus**) „A. Cunningh. mss." Schauer 1835. Linnaea X. p. 310; 1836 in Lindl. Nat. syst. p. 400: nov. g. Chamaelauciear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 107 (76). — Endl. 1840. Gen. n. 6281. p. 1225; 1841. Ench. p. 650. — Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6824. (genuinar.)
Schauer 1841. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. II. p. 191: g. Euchamaelauciear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 154; 1846. V. p. 719.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 721: g. Chamaelauciacear.
Synon. Enosanthes A. Cunn. (Euosanthes ex Endl.)

Homorgana Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 522): div. 1 plant. Class.: Rhizospora, Phyllospora, Caulospora, Florifera.

Homostylium Nees 1844. Del. sem. h. Vratisl.; 1844. Linnaea XVIII. p. 513: nov. g. ex typo Asteris cabulici Lindl.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 120: g. Euasterear.

*) ὁπλίτης, armatus. (?)
**) ὅμορος, affinis, conterminus: quia floris fabrica generum quorundam characteres conjungit.

Homothalameae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 277. 394: fam. Lichenum. Divis.: Collematideae, Usneadeae, Ramalinideae.

Homothalami Achar. 1810. Lich. univ. p. 19: ordo Lichenum. Divis.: Scutellati, Peltati. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 63.

Achar. 1814. Syn. p. XIII: classis Lichenum. Ordines iidem.

Homothalamii Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 88: ordo Choriophytor.

= Homothalami Achar.

Homothalictrum Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 27: sect. Thalictri. (Th. alpinum L.)

Homothecium Montagne 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 313: nov. genus? Collemacear., pro Collemate opulento propositum.

Homotropium Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 47; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 113: nov. g. Ruelliear.

Homoxylon Hartig 1848. Bot. Zeit. p. 188. 190: nov. g. Abietinear. foss. (H. Blasii.)

Honckeneja Maxim. vid. *Honkenya Ehrh.*

Honckeneya Steud. vid. *seq.*

Honckenia Pers., Hedw., Poir. vid. *seq.*

Honckenya Willd. 1790 in Cothen meth. pl. disp. p. 19; 1793 in Usteri Del. opusc. bot. II. p. 170; 1799. Spec. II. p. 325. n. 742: nov. g. Octandr. Monogyn. *Cf.* Usteri n. Ann. I. p. 92. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 609 *(Honkenya)*. — Pers. 1805. Ench. I. p. 416. n. 947 *(Honckenia)*. — Hedw. 1806. Gen. p. 261. n. 1056 *(Honckenia)*.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 685; 1825. Syst. II. p. 219. n. 1451: g. Meliear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1278.

Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 418 *(Honckenia)*: g. Tiliacear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 506. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 311. n. 1589. — Bartl. 1830. Ord. p. 339. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 544. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 3 *(Honckneya)*. — Steud. 1840. Nom. I. p. 774 *(Honckneya)*.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXV; 1828. Consp. p. 209. n. 5436: g. Tiliear.

= Clappertonia Meisn.

Honckenya Bartling 1830. Ord. p. 305: g. Alsinear. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205. — Meisn. 1837. Gen. p. 25 (21). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 176.

Rchb. 1832. Fl. exc. p. 568: g. Spergulear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 298: g. Arenarinar.

= Honkenya Ehrh.

Honckneya Spach vid. *Honckenya Willd.*

Hondbessen Adans. 1763. Fam. II. p. 158: g. Caprifolior. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 418.

= Paederia Linn.

Honkeneja Endl. 1840. Gen. n. 5229. p. 966; 1841. Ench. p. 505: g. Eualsinear. — Par. Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 357. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 255.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 104: g. Alsinear.

= Honkenya Ehrh.

Honkenya*) Ehrhart 1788. Beitr. II. p. 180: nov. g. plant. (H. Peploides.)

Link 1831. Hdb. II. p. 259: g. Alsinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498. — Maxim. 1858. Mém. sav. étr. Ac. Pet. IX. p. 56 *(Honckeneja)*.

Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7779: g. Minuartiear.

Synon. Ammonalia Desv.; Adenarium Rafin.; Hallia Dumort.; Honckenya Bartl.; Honkeneja Endl.; Halianthus Fries.

Honkenya Gmel. vid. *Honckenya Willd.*

Honopsis Endl. Gen. Suppl. II. p. 52: sphalm. pro *Monopsis Salisb.*

Honorius Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 177: nov. g. Asphodelear. (Ornithogalum nutans L.)

= Myogalum Link.

Honottia Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4549: g. Hydropityear. *(Hottonia Burm., non Boerh.)*

Meisn. 1838. Gen. p. 118 (84): g. Salicariear.?

Limnophila R. Brown.

Hoodia Sweet 1839. Hort. brit. p. 395: g. Stapeliae aff.? *Cf.* Endl. Gen. p. 598.

Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5018. 11: sect. Stapeliae?

Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 664: g. Ceropegiar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.

Synon. Monothylaceum Don; Scytanthus Neck.

Hookeria**) Smith 1808. Linn. Trans. IX. p. 275. t. 23: nov. g. Muscor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 21. p. 419. — Par. Gray 1821. Brit. pl. I. p. 751. — Schwägr. 1826. Suppl. II. vol. II. 1. p. 32. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 196. n. 3340; 1831. Gen. II. p. 734. n. 3727. (frondosor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 32.

Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 296: g. Hypnoidear. Sect.: Lophobryum, Hookeria, Cyathophorum, Dendroideae. — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60. — Hampe 1837. Linnaea XI. p. 57.

Rchb. 1828. Consp. p. 32. n. 545: g. Fontinaloideor.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: g. Hypnear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 11. — Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. Fasc. 46. 47. (restrict.)

*) Dicat. dom. Honkeny, auctori florae germanicae.

**) Dicat. W. J. Hooker, prof.

Hookeria Smith cont.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Muscol. germ. p. 592: g. Pleurocarpor. (diploperistomor.) — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 525.
Endl. 1836. Gen. n. 587. p. 56; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear. Sect.: Pterygophyllum, Chaetephora. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 61.
Rchb. 1841. Nom. p. 27. n. 965: g. Calyptrobryor. Sect. ut Endl.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 84: g. Leskeacear. Sect.: normales, Pterygophylla, Scleroneuron. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 256.
C. Müll. 1848. Linnaea XXI. p. 194: g. Hookeriacear. (restrict.: H. Merkelii, papillata, etc.) — Par. Spruce 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 290. — Bruch, Schimp. . . . . Bryol. eur. V. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 121. Sect.: Sauloma, Mniadelphus, Pterygophyllum, Eriopus.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 400: g. Neckerear.

Hookeria Salisb. 1809. Parad. t. 98. 117.
= Brodiaea Smith.

Hookeria „Schleich. mss." Schwägr. 1816. Suppl. I. 2. p. 340. t. 100: nov. g. Muscor. (H. splachnoides.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 21. p. 420. — Par. Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 222.
Brid. 1822. Meth. musc. p. 103: g. Peristomor. acrocarpor.
Brid. 1826. Bryol. I. p. 265: g. Acrocarpor. peristomor. (1827. ibid. II. p. XLIII g. Splachnoideor.)
= Tayloria Hook.

Hookeria „Smith" C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 178: g. emendat. Hypnacear. Sect.: Euhookeria, Lepidopilum, Eriopus, Hypnella, Callicostella.

Hookeriaceae C. Müll. 1848. Linnaea XXI. p. 190. 194: trib. Muscor. Gen.: Hookeria.
Spruce 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 290: trib. Pleurocarpor. Gen. id.
Bruch, Schimp. . . . . Bryol. eur. V: fam. Muscor. Gen.: Hookeria, Pterygophyllum, Daltonia.

Hookia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 70. n. 122: nov. g. Siphoniphytor., a Cnico L. disjunctum. *Cf.* Cass. 1821. Dict. v. 21. p. 421.
= Rhaponticum DC.

Hoorebeckia Steud. vid. *seq.*

Hoorebekia Corneliss. 1817 in Mussche Hort. Gand. p. 120. t. 1: nov. g. Compositar. (*Hoorebeckia* ex Steud. Nom. I. p. 774.)
= Leiachaenium DC.?

Hopea*) Linn. 1767. Mant. p. 14. n. 1270; 1767. Syst. ed. XII. p. 509: g. Polyadelph. Polyandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 582; 1784. Syst. p. 699. — Reich. 1778. Gen. p. 390. n. 979. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 516. n. 1222. — Gmel. 1791. Syst. p. 1155. — Pers. 1797. Syst. p. 737.
Scop. 1777. Intr. p. 276: g. Icosandrar.
Juss. 1789. Gen. p. 157: g. Guajacanar.
Neck. 1790. El. II. p. 397. n. 1215: g. Phalarsiphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 448: g. Ebenacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 350. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 422.
Batsch 1802. Tab. p. 204: g. Sapotar.
Michx. 1803. Fl. am. II. p. 42: g. Monadelph. Polyandr. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 83. — Elliott 1822. Sketch II. 2. p. 173.
Pers. 1807. Ench. II. p. 72. n. 1299: g. Polyandr. Monogyn.
Bartl. 1830. Ord. p. 160: g. Styracear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 250 (158), a Symploco vix diversum. — Benth. 1839. Linn. Trans. XVIII. 2. p. 229. (An Symploci sectio?) — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 420.
Endl. 1841. Ench. p. 364. n. 4259 *c*: sect. Symploci. — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 253.

Hopea „Willd." Vahl 1805. Enum. I. p. 3. n. 2: g. Monandr. Monogyn. *Cf. Hoppea Willd.* — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 5. 35. n. 23.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 160: sect. Cicendiae.
= Pladera Roxb.

Hopea Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 7. t. 210: nov. g. Dodecandr. Monogyn. (H. odorata.) *Cf.* Flora 1823. II. p. 483. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 447. n. 1745; 1830. Gen. I. p. 387. n. 1945. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 4.
Rchb. 1828. Consp. p. 138. n. 3654: g. Mimusopear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 814: g. Dipterocarpear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 85. — Meisn. 1837. Gen. p. 35 (27). — Rchb. 1837. Hdb. p. 304; 1841. Nom. p. 210. n. 7981. — Korth. . . . . Verhand. nat. Geschied. p. 74. — Endl. 1840. Gen. n. 5396. p. 1014 *(Hoppea)*; 1841. Ench. p. 525; 1842. Spl. II. p. 80. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 311. — Walp. 1846. Rep. V. p. 127. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 328.
Roxb. 1832. Ind. II. p. 609: g. Polyandr. Monogyn. (H. odorata, etc.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 394: g. Dipteracear.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 34: g. Shorear.

Hopkirkia Spreng. 1818. Nov. prov. p. 23; 1826. Syst. III. p. 356. 443. n. 2688; 1831. Gen. II. p. 615. n. 3044: nov. g. Eupatorinar. (Bidens scandens L.)
= Salmea DC.

*) Dicat. John Hope, prof. botan. Edin.

Hopkirkia*) DC. 1836. Prodr. V. p. 660: nov. g. Eubeleniear. (H. anthemoidea.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2597. p. 422; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 206 (133).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18: g. Heleniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3190. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Hoplismenus Hassk. vid. *Oplismenus Palis.*

Hoplophyllum DC. 1836. Prodr. V. p. 73: nov. g. Heterocomear. (Pteronia spinosa Linn. f.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2213. p. 359; 1841. Ench. p. 232. — Meisn. 1838. Gen. p. 176 (123 sphalm. *Holophyllum*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3877: g. Pacourinear.

Hoplophytae Beer 1857. Fam. Bromel. p. 9. 19. 22: div. Lepidanthear. Gen.: Hoplophytum, Streptocalyx.

Hoplophytum Beer 1854. Flora p. 348: nov. g. Bromeliacear. (Billbergia rhodocyanea Lem.) — Par. C. Koch 1856. Pl. nov. h. Berol.; 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. VI. p. 366.
Beer 1857. Bromel. p. 22. 129: g. Hoplophytar.
Synon. Pothuava Gaudich.

Hoplotheca Spreng. 1827. Cur. post. p. 52: g. Pentandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4360: g. Gomphrenear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 200. n. 1020: g. Amarantear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 870.
Bartl. 1830. Ord. p. 298: g. Amarantacear.
Mart. & Gal. . . . . Én. pl. mex. Amar. p. 10.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 420: sect. Frölichiae.
Vid. Oplotheca Nutt.

Hoppea**) Willd. 1801. Neue Schr. nat. Fr. Berl. III. p. 434: nov. g. Diandr. Monogyn., Globiferae Gmel. aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 10.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 889 (*Hoppia*): g. Primulear.
= Canscora Lam.

Hoppea Rchb. 1824. Flora 1. p. 245: nov. g. Labiatiflorar. (Cineraria sibirica L.)
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1350. 1508: g. Radiatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2252: g. Tussilaginear.
Bartl. 1830. Ord. p. 136: g. Adenostylear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 240: g. Asterear.
Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3353: g. Senecionear. genuinar.
= Ligularia Cass.

Hoppea „Linn.“ Endl. in synon. Symploci: vid. *Hopea Linn.*

Hoppea „Roxb.“ Endl. vid. *Hopea Roxb.*

Hoppia Spreng. vid. *Hoppea Willd.*

Hoppia Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 199. t. 30: nov. g. Caricear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119.
Meisn. 1843. Comm. p. 372: g. Caricinear.
Steud. 1855. Glum. II. p. 242: g. Caricinar.

Horan „Ad.“ Wittst. Etym. Handw. p. 451: sphalm. pro *Horau Adans.*

Horaninovia „Fisch. & Meyer“ Schrenk 1841. En. pl. Song. p. 11 in nota. (Salsola anomala Eichw.)
Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6399 (*Horaninowia*): g. Halimocnemidear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 104. n. $1944/_1$.
Meisn. 1843. Comm. p. 368: g. Salsolear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 170: g. Sodear. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 794 (*Horaninowia*). — Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 292; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 468 (*Horaninowia*).

Horaninowia Schrenk (?), Rchb., Fenzl, Bunge vid. *praeced.*

Horau Adans. 1763. Fam. II. p. 80: g. Elaeagnor.
Laguncularia Gärtn.

Hordeaceae Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74 (1815. Nov. gen. I. p. 179; 1822. Syn. I. p. 235): trib. 6 Graminear. Gen.: Aegylops, Triticum, Agropyron, Lolium, Elymus, Secale, Hordeum, Rottbölla, Ophiurus, Monerma, Lodicularia, Nardus, Zoysia, Chamaeraphis; Pariana?
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 173: ordo 6 Graminum. Gen.: Hordeum, Secale, Triticum, Lolium, Elymus, Aegilops, Spartina, Rottböllia, Lepturus, Microchloa, Monerma, Nardus, Zoysia.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 87: div. Graminear. Gen.: Nardus, Ophiurus, Hordeum, Zeocriton, Secale, Elymus, Lolium, Agropyrum, Triticum. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 48; 1830. Fl. exc. p. 17. (Schizogynar.) Gen.: Gymnostichum, Hordeum. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. Gen.: Oreochloa, Wangenheimia, Catapodium, Brizopyrum, Gaudinia, Trachynia, Brachypodium, Agropyrum, Triticum, Secale, Aegilops, Hordeum, Gymnostichum, Spinifex, Elymus, Aeluropus, Elytrophorus, Pterium, Hilaria, Trachyozus, Pariana, Tripsacum, Ischaemum, Anthephora, Cenchrus, Lolium, Thelepogon, Pholiurus, Lepturus, Lodicularia, Ophiurus, Oropetium, Hemarthria, Rottbölla, Psilurus, Lappago.
Agdh. 1823. Aphor. p. 151: trib. Graminear. Gen. fere ut Spreng. et Stegosia, Matrella.
Link 1827. Hort. I. p. 13: fam. Graminear. Gen.: Asprella, Elymus, Hordeum. — Par. Nees 1829. Agrost. Bras. p. 442. Gen.: Lolium, Triticum, Secale, Hordeum.

*) Dicat. Thom. Hopkirk, auctori Florae anomolae.
**) Dicat. Dav. Henr. Hoppe, Ratisbonensi.

Hordeaceae Kunth cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: subtrib. Triticear. Gen.: Gymnostichum, Elymus, Hordeum.
Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. . . .: subtrib. Saccharinar. Nov. gen.: Hexarrhena.
Kunth 1830. Gram. p. 142; 1833. Agrost. p. 435: trib. 11 Graminear. Gen.: Lolium, Triticum, Secale, Elymus, Asprella, Hordeum, Aegilops, Pariana. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 103. Gen. ead. (Gymnostichum loco Asprellae.) Accedit 1841 (Spl. I. p. 1354 et Ench. p. 59) Polyantherix. — Koch 1837. Syn. p. 823. Ed. II. p. 950. Gen.: Gaudinia, Triticum, Secale, Elymus, Hordeum, Lolium, Aegilops, Lepturus, Psilurus. — Meisn. 1843. Gen. p. 426 (326). Gen. ut Endl. et Crithodium. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 165. 235. Gen. ut Meisn.
Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 46: trib. 12 Graminear. Gen. europ.: Brachypodium, Lolium, Triticum, Secale, Aegilops, Elymus, Hordeum.
Rchb. 1841. Nom. p. 38: sect. Triticear. Gen.: Brachypodium, Agropyrum, Triticum, Secale, Elymus, Gymnostichum, Hordeum, Aegilops, Polyantherix, Pariana.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 10: trib. Graminum. Gen. ex Kunth et Nardus, Psilurus, Lepturus.
C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 430: div. Parallelanthar. Gen.: Hordeum, Elymus.
Steud. 1854. Glum. I. p. 339: trib. 12 Graminear. Gen.: Lolium, Castellia, Triticum, Secale, Elymus, Sitanion, Hordeum, Aegilops, Polyantherix, Lepidopironia.
Hordeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 116: trib. Graminacear. Gen. Hordeacear. Endl.
Hordeineae Miquel 1857. Fl. Ind. bat. III. p. 359: subtrib. Poacear. Gen.: Triticum.
Hordeum Tourn. 1700. Inst. p. 513. t. 295: g. pl. class. XV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 286: g. pl. class. XIV.
Mich. 1729. Nov. gen. p. 35: g. pl. class. XIV a.
Linn. 1737. Gen. p. 16. n. 45; 1737. Cliff. p. 24; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 22; 1753. Sp. I. p. 84; 1759. Syst. ed. X. p. 879. n. 93; 1762. Sp. ed. II. p. 125; 1764. Gen. ed. VI. p. 39. n. 98; 1767. Syst. ed. XII. p. 101; g. Triandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 107; 1784 Syst. p. 125. — Reich. 1778. Gen. p. 41. n. 104. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 54. n. 129. — Gmel. 1791. Syst. p. 198. — Pers. 1797. Syst. p. 130; 1805. Ench. I. p. 108. n. 196. — Willd. 1797. Sp. I. p. 472. n. 151. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 404. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 87. — Trin. 1820. Fund. p. 121. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 720. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. I. p. 358; ed. 1832. I. p. 358.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 204: g. Graminum. — Par. Gmel. 1747. Sibir. I. p. 124. — Linn. 1751. Phil. bot. p. 28;

Hordeum Tourn. cont.
1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 73. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael p. 135. — Host 1801. Gram. Austr. I. p. 25. t. 32—34; 1805. ibid. III. p. 23. t. 34—37. — Link 1821. En. I. p. 100. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 80. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 71. 205. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 123. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 52. n. 252.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 15. n. 53: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 197.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 395. — — Juss. 1789. Gen. p. 32. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 106. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos I. p. 83. — DC. 1805. Franç. III. p. 91; 1815. V. p. 286. — Hedw. 1806. Gen. p. 48. 364. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 48. 791. n. 361. Sect.: genuina, Zeocrita. — Lois. 1825. Dict. v. 36. p. 29 (*Orge*). — Spreng. 1825. Syst. I. p. 269. n. 278. — Link 1829. Hdb. I. p. 7.
Adans. 1763. Fam. II. p. 36: g. Triticor.
Scop. 1772. Carn. II. p. 276: g. Polygam. Monoec. — Par. Willd. 1809. En. p. 1037.
Neck. 1790. El. III. p. 225. n. 1606: g. Achyrophytor.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 180; 1822. Syn. I. p. 236; 1830. Gram. p. 148; 1833. Agrost. p. 454; 1838. Berol. II. p. 409: g. Hordeacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 173. — Agdh. 1823. Aphor. p. 151. — Link 1827. Hort. I. p. 19. — Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 845 (sect.: Zeocriton, Hordeum); 1830. Fl. exc. p. 18; 1841. Nom. p. 39. n. 1379. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Nees 1829. Agrost. Bras. p. 452. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Koch 1837. Syn. p. 827. Ed. II. p. 954. — Endl. 1837. Gen. n. 917. p. 104; 1841. Ench. p. 60. Sect. ut Rchb. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 47. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 140. 393. — Meisn. 1843. Gen. p. 426 (326). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 10. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 245. — C. Koch 1848 Linnaea XXI. p. 430. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 190 (*Orge*). — Parlat. 1850 in Webb Canar. III. p. 421. — Steud. 1854. Glum. I. p. 351. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 594.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 679): g. Chlorideor. Sect.: Zeopyrum, Hordeum.
Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 160: g. Triticear. — Par. Gris. 1844. Rumel. II. p. 426; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 327. — Math. 1853. Belg. I. p. 635. (verar.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Hordear.
Hordeum Palis. 1812. Agrost. p. 114: g. Graminear. restrict. Distinguitur Zeocriton.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 88: g. Hordeacear.

Hordeum Palis. cont.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 679): sect. Hordei. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 845 *b;* 1841. Nom. p. 39. n. 1379. 1. — Endl. 1837. Gen. n. 917 *b.* p. 104; 1841. Ench. p. 60.
Synon. Critesion Raf.

Horkelia*) Chamisso & Schltd. 1827. Linnaea II. p. 26: nov. g. Dryadear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 562. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 196. — Spach 1834. Veg. phan. I. p. 453. — Meisn. 1837. Gen. p. 104 (73).
Rchb. 1828. Consp. p. 167. n. 4434: g. Potentillear. — Par. Lindl. 1837. Bot. Regist. XXIII. t. 1997.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 434: p. Chamaerhodear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6364. p. 1242; 1841. Ench. p. 659. — Walp. 1843. Rep. II. p. 36. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 664.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1628: g. Rosacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 167. n. 6493: g. Sibbaldiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 564: g. Potentillidar.

Horkelia Rchb. 1830 ex Bartl. Ord. p. 116.
Wolffia Hork.

Hormiactis**) Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 127: nov. g. Arthrobotrydear. (H. fusca.) *Cf.* Preuss 1852. ibid. XXV. p. 160.

Hormidieae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 243: fam. Dermatosiphear. Gen.: Hormidium, Goniotrichum, Allogonium, Gloeotila, Schizogonium, Schizomeris, Bangia. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 25. Gen. ead. (exceptis secundo et tertio).
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 191: fam. Confervinar. (serius in alias familias dispersa.) Gen. ut antea.

Hormidium Lindl. 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 81; 1853. Fol. Orchid. 10 Jan. p. 27: subg. Epidendri. *Cf.* Endl. 1842. Spl. II. p. 16. n. 1371 *a.*

Hormidium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 89; 1843. Phycol. gener. p. 244; 1845. Phycol. germ. p. 192: nov. g. Hormidiear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 27.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 96: g. Myxonemear.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p . . .: g. Lyngbyear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: g. Bangiear.
Jessen 1848. Prasiolae mon. p. . . .: g. Blastosporear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 349: sect. Ulothricis.

Hormineae Endl. 1838. Gen. p. 616; 1841. Ench. p. 307: subtrib. Monardear. Gen.: Horminum. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 284 (193). Gen. id. — Walp. 1845. Rep. III. p. 687. Gen. id.

Horminidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 661: trib. Monardear. Gen.: Horminum.

Horminium Rchb. 1841. Nomencl. p. 107. n. 4144. 2: sect. Salviae.
Synon. Horminum Tourn.

Horminum Tourn. 1700. Inst. p. 178. t. 82: g. pl. class. IV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 215. Ed. Hall. 1745. p. 221: g. pl. class. IX.
Mönch 1794. Meth. p. 376: g. Petalostemonis.
DC. 1805. Franç. III. p. 510: sect. Salviae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2805 *a.* — Benth. 1833 in Hook. Bot. misc. III. p. 373; 1833. Labiat. p. 220; 1848 in DC. Pr. XII. p. 277. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 727. — Endl. 1838. Gen. n. 5397 *d.* p. 614; 1841. Ench. p. 307. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 109. — Walp. 1845. Rep. III. p. 610. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 359.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 388: g. Labiatar. (Salvia Verbenaca L.)
Horminium Rchb.

Horminum*) Linn. 1737. Coroll. p. 9. n. 962; 1737. Cliff. p. 309; 1740. Syst. p. 25; 1742. Gen. ed. II. p. 269. n. 567; 1753. Sp. II. p. 596; 1759. Syst. ed. X. p. 1105. n. 649; 1763. Sp. ed. II. p. 831; 1764. Gen. ed. VI. p. 299. n. 730; 1767. Syst. ed. XII. p. 401: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 455; 1784. Syst. p. 544. — Reich. 1778. Gen. p. 302. n. 788. — Gmel. 1791. Syst. p. 916. — Pers. 1797. Syst. p. 581.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 187. n. 778: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 161. — Gis. 1792. Prael. p. 495.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. Par. Juss. 1789. Gen. p. 116. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 345. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 267. — Pers. 1807. Ench. II. p. 132. n. 1409. — Link 1822. En. II. p. 117.
Hill 1769. Ht. kew. p. 247: g. Monopetalar. irregular.
Neck. 1790. El. I. p. 316. n. 497: g. Corythophytor.
Rchb. 1828. Consp. p. 115. n. 2823: g. Salviear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Prunellear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4150.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 6. 92: g. Bilabiatar.

---

*) Dicat. Joh. Horkel, prof. Berolin.
**) ὅρμος, funiculus, catena.

*) Ne Horminum vocabulum excluderetur, hujus loci hoc volui, cum Hormina botanicorum Salviae species sint. (Ht. Cliff.)

Horminum Linn. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 183: g. Thymear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 330: g. Nepetear.
Benth. 1835. Labiat. p. 727: g. Monardear. (H. pyrenaicum L.) — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 761. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163. — Brongn. 1843. En. genr. p. 68.
Koch 1837. Syn. p. 561. Ed. II. p. 645: g. Melissinear.
Endl. 1838. Gen. n. 3603. p. 616; 1841. Ench. p. 307: g. Horminear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 284 (193). — Walp. 1845. Rep. III. p. 687. 981.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Horminidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 259: g. Satureiear. anomalum.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 668: g. Melissear.
Synon. Pasina Adans.

Hormiscia*) Fries 1835. Fl. scan. p. 327; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 132: nov. g. Confervear. (Conferva hormoides Lyngb.) — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 15. n. 35. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 114. (genuinar.) — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Confervidar.
= Hormotrichum Kütz.

Hormiscinei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 495: subdiv. Arthrosporeor. Trib.: Coremiei, Aspergillei, Oidici, Septonemei, Torulacei.

Hormiscium Kunze 1817. Mykol. Hefte I. p. 12. t. 1. f. 7: nov. g. Fungor., inter Moniliam et Torulam Link medium. (H. expansum.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 21. p. 430.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 10: g. Moniliar.
Agdh. 1821. Aphor. p. 81: g. Byssacear.
Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 22: sect. Torulae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Moniliacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 186: g. Sporomycetum episporor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 32: g. Protomycetum.

Hormiscus Spreng. vid *Hormisus Targ.*

Hormiscus Rchb. vid. *Ormiscus DC.*

Hormisus**) „Targioni mss." Bertol. 1819. Amoen. ital. p. 316: nov. g. Algar. (Flabellaria Tuna Lam.)
Spreng. 1831. Gen. II. p. 751. n. 3810 (*Hormiscus*): g. Geophytar.
= Halimeda Lamx.

Hormocarpum Rchb. vid. *Ormocarpum Palis.*

Hormocarpus Spreng. vid. *praeced.*

*) ὁρμίσκος, collare, monile.
**) ὅρμος, fascia, monile; ἴσος, similis, aequalis.(?)

Hormoceras Kütz. 1841. Linnaea XV. p. 730. 732; 1843. ibid. XVII. p. 100; 1843. Phycol. gener. p. 378; 1845. Phycol. germ. p. 290; 1849. Sp. Alg. p. 674. n. 450: nov. g. Ceramiear.
Menegh. 1844 in Parlat. giorn. ital. I. p. . . . : subg. Ceramii.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 142: sect. Ceramii.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubias.

Hormococcaceae Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 715: fam. Myelomycetum. Gen.: Hormococcus, Sirococcus.

Hormococcus Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 738: nov. g. Melanconiacear. (H. Populi, Rosae et heterosporus.)
Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 715: g. Hormococcacear.

Hormocoleum Brébiss. mss.
Calothrix Agdh.

Hormocytium Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 63: g. Tetrasporear.

Hormodendrum Bonorden 1851. Handb. Mycol. p. 76 (p. 291 *Hormodendron*): nov. g. Torulaceor. (Penicillii sp. Corda.)

Hormogyne A. DC. 1844 Prodr. VIII. p. 176: nov. g. Sapotacear. (Mimusops cotinifolia A. Cunn.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 591.

Hormomyces Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 150: nov. g. Myxonemear.? An = *Phyllopta Fries?*

Hormophysa Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phycol. gener. p. 359; 1849. Sp. Alg. p. 603. n. 412: nov. g. Cystosirear.

Hormosciadium Endl. vid. *Ormosciadium Boiss.*

Hormosia Rchb. vid. *Ormosia Jack.*

Hormosiphon Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 87; 1847; Phycol. gener. p. 209; 1845. Phycol. germ. p. 171; 1849. Sp. Alg. p. 301. n. 208: nov. g. Nostocear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 44.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: g. Eunostocear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: g. Nostochinear.

Hormosira Endl. 1836. Gen. n. 120 *a.* p. 10; 1841. Ench. p. 8: sect. Cystoseirae.
Menegh. 1838. Cenni p. 44: g. Fucoidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 22. n. 783. — Endl. 1843. Spl. III. p. 29. n. 122/1. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 158.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 331 (Flora 1843. p. 93): g. Fucacear. — Par. J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 197. — Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 215.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 98; 1843. Phyc. gener. p. 350; 1849. Sp. Alg. p. 586. n. 396: g. Fucear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56. — Aresch. 1855. Nov. Act. Ups. ser. tert. I. p. 339.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Fucidar.
Synon. Monilia A. Rich., Moniliformia Bory.

Hormospora*) Brébiss. 1840. Mém. de Falaise; 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 25: nov. g. Pleurococcoidear. (H. mutabilis et transversalis.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Protococcidar.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 99: g. Anabaenear.
Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 77: g. Tetrasporear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 345. n. 236: g. Ulotrichear.
Math. 1853. Belg. II. p. 515: g. Rivulariear.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 11: g. Algar. polycytidear. homoeocytidear. schizocytidear. synoecobiar.

Hormospora „De Notaris" Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 404: g. Perisporicor. (Sphaeria stercoris.)

Hormotrichum Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 204; 1849. Spec. Alg. p. 381. n. 253: g. Confervear. — Par. Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 89.
Synon. Hormiscia Fries.

Hornemannia**) Willd. 1809. Enum. p. 653. n. 717: nov. g. Didynam. Angiosperm. (Gratiola goodenifolia Horn.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 396: g. Scrofularinar.
Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 431: g. Personatar. — Par. Link 1822. En. II. p. 143.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 771. n. 2148; 1831. Gen. II. p. 484. n. 2391: g. Primulear.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3170: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199; 1841. Nom. p. 118. n. 4620: g. Gratiolear
= Mazus Lour.

Hornemannia Vahl 1810. Danske Nat. Selsk. Skrivt. VI. p. 120: nov. g. plant. (H. racemosa.)
= Thibaudia Pav.

Hornemannia Link & Otto . . . . Ic. select. I. 9.
Vandellia Linn.

Hornemannia Benth. 1845 in Lindl. Veg. kingd. (1847) p. 685: nov. g. Sibthorpear. (Mazus pinnatus Wall.)
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 428: g. Sibthorpiear. (Ourisia pinnata Wall.)

Hornera Necker 1790. Elem. bot. III. p. 43. n. 1360: nov. g. Cyteophytor., a Dolicho Linn. sejunctum. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 431.
= Mucuna Adans.

Hornera Junghuhn 1840 in Hoev. & Vriese Tijdschr. VII. p. 314: nov. g. Thymelaeacear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 36. n. $2111/_1$: g. Aquilarinear. — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 549. — Meisn. 1843. Comm. p. 349.

Hornia*) DC. 1830. Prodr. IV. p. 500: sect. Coffeae. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 582. — Endl. 1838. Gen. n. 3152*b*. p. 533; 1841. Ench. p. 272. — Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2802. 2.

Hornschuchia**) Nees 1821. Flora I. p. 302; 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. 159: nov. g. Sapindear. *Cf.* Isis 1823. p. 860 et A. DC. Pr. VIII. p. 245. — Par. Nees & Mart. 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 22.
Nees 1822. Flora II. p. 494: g. Sapotear. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. XCI. 1478. — Meisn. 1839. Gen. p. 251 (159)?
Spreng. 1827. Cur. post. p. 131; 1830. Gen. I. p. 293. n. 1513: g. Hexandr. Trigyn. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1049. 1215.
Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5588: inter genera vix cognita.
Endl. 1839. Gen. n. 4257. p. 744; 1841. Ench. p. 363. n. 4256: g. dubium Ebenaceis aff.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 400: g. Ebenacear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5281: g. Styracear. genuinar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385: g. Sapindacear. dubium.
Mart. 1856. Münchn. gel. Anz. Nr. 6; 1856. Flora p. 394; 1856. Fl. Bras. fasc. XVII. p. 17: g. Lardizabalear.

Hornschuchia Spreng. 1822. Neue Entd. III. p. 64: nov. g. incertae sedis, class. XVIII.
Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5559: inter genera vix cognita.

Hornschuchia Blume 1823. Catal. hort. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 117: nov. g. Hypericinear.
Cratoxylon Blume.

Hornstedia Juss. vid. *seq.*

Hornstedtia***) Retz. 1791. Observ. VI. p. 18.
Willd. 1797. Sp. I. p. 9. n. 5; 1809. En. p. 4: g. Monandr. Monogyn.
Batsch 1802. Tab. p. 104: g. Scitaminear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 2. n. 5. — Hedw. 1806. Gen. p. 2. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 4. 33. — Agdh. 1823. Aphor. p. 184. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123. — Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341 (incertae sedis).
Juss. 1816. Dict. v. spl. 2. p. 20 (*Hornstedia*): g. Amomear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 433. — Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1596. — Bartl. 1830. Ord. p. 61.
Amomum Linn.

*) ὅρμος, monile; σπορά, semen.
**) Dicat. Jens Wilken Hornemann, prof. Hafn.

*) Dicat. Van Horn, Coffeae propagatori.
**) Dicat. Chr. Fr. Hornschuch, prof. Greifsw.
***) Dicat. C. F. Hornstedt, peregrinatori.

Hornungia*) Bernhardi 1840. Flora II. p. 390: nov. g. Tulipacear. (Ornithogalum circinatum Linn. f.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 204: g. Tulipear.
Hornungia Rchb. „1837. Deutschl. Fl. I. p. 33. Abbild. 4190" 1841. Nomencl. p. 179. n. 6921; 1844. Fl. sax. p. 367: nov. g. Thlaspidear. (H. petraea Rchb.)
Hutchinsiae sect. Petrocharmela Fenzl.
Horschfieldia Tausch vid. *Horsfieldia Blume.*
Horsfielda Pers. vid. *Horsfieldia Willd.*
Horsfieldia**) Willd. 1805. Spec. IV. p. 872. n. 1852: nov. g. Dioec. Monadelph. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 635. n. 2299 (*Horsfielda*). — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 435.
A. DC. 1856. Pr. XIV. 1. p. 200: sect. Myristicae.
= Pyrrhosae Blume pars.
Horsfieldia „Blume mss." DC. 1830. Prodr. IV. p. 87: g. Saniculear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 266. — Rchb. 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5536. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103). — Endl. 1839. Gen. n. 4387. p. 768; 1841. Spl. I. p. 1413; 1841. Ench. p. 378; 1850. Spl. V. p. 3. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 935.
Tausch 1834. Flora I. p. 343 (*Horschfieldia*): g. Azorellear.?
Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 123. t. 26: g. Umbelliferar., ad Araliaceas accedens. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 745.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136: g. Tetragonospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Saniculidar.
Synon. Schubertia Blume.
Horta (s. Hosta) Fl. Flum. I. t. 124: g. Tetrandr. Monogyn. (spinosa) ex Steud. Nom. I. p. 776.
= Theophrasta Juss.
Hortensia***) „Commers." Juss. 1789. Gen. p. 214: nov. g. Caprifolior. (antea *Peautia.*)
Gmel. 1791. Syst. p. 722: g. Decandr. Trigyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 505. n. 1123.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 281: g. Saxifragear. Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 436.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 24: g. Thalamostemonis.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 132: g. Saxifrageis aff.
Hedw. 1806. Gen. p. 331. n. 1304: g. Caprifoliacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4216 *b*: sect. Hydrangeae.
Hydrangeae Linn. pars.

*) Dicat. Hornung, pharmacopolae Aschersleb.
**) Dicat. Thom. Horsfield, botanico anglo.
***) Dicat. Astronomae Hortense Lepeaute.

Hortia Vandell. 1788. Dicc.; 1796 in Röm. Script. bras. p. 88: nov. g. Pentandr. Monogyn.
DC. 1824. Pr. I. p. 732: g. Rutaceis aff., minus notum.
St. Hil. 1825. Fl. Bras. I. p. 80: g. Rutacear. — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 51; 1830. Gen. I. p. 188. n. 948. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 834.
A. Juss. 1825. Mém. Mus. XII. p. 490: g. Diosmear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 796. — Meisn. 1837. Gen. p. 63 (45).
Rchb. 1828. Consp. p. 198. n. 5149; 1841. Nom. p. 196 n. 7501: g. Pilocarpear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 388 — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 346. — Endl. 1840. Gen. n. 6000. p. 1153; 1841. Ench. p. 612. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Hortonia „Wight mss." Arnott . . . . Mag. Zool. and Bot. II. p. 545.
Endl. 1842. Spl. II. p. 107. n. 4733/1: g. Schizandracear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 339. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 306.
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 166: g. Monimiacear.
Tul. 1855. Arch. Mus. VIII. p. 425: g. Monimiear. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 115.
Hortsmania Walp. vid. *seq.*
Hortsmannia Miquel 1850. Stirp. sel. Surin. p. 167: nov. g. Tabernaemontanear. (H. myrtifolia.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 35 (*Hortsmania*).
Hosackia*) „Dougl." Benth. 1829. Bot. Regist. XV. t. 1257.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 590. n. 2909: g. Leguminosar.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 200: g. Trifoliear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 85 (61). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 322. Sect.: Euhosackia, Drepanolobus, Microlotus, Psychopsis. — Endl. 1840. Gen. n. 6517. p. 1269; 1841. Ench. p. 669. Sect. eaed. — Walp. 1842. Rep. I. p. 648. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 477.
Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 134: g. Lotear.
Benth. 1836. Linn. Trans. XVII. p. 364. Char. emend. Disjungitur Microlotus.
Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5705: g. Trigonellear. Sect. fere ut Torr. & Gr.
Hosakia Graham ex Steud. Nom. I. p. 776.
= Westonia Spreng.
Hosangia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 225. n. 373: g. Dicroophytor.
= Majeta Aubl.
Hosea Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 31: nov. g. plant. (*Perin-Patsjotti Rheede* V. t. 6.)
= . . .?

*) Dicat. Dav. Hosack, prof. Newyork.

Hoslunda Röm. & Schult. vid. *seq.*

Hoslundia*) Vahl 1805. Enum. I. p. 212. n. 51: nov. g. Diandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 15. n. 74. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 57. 207. n. 92 (*Hoslunda*)

Palis. 1805. Owar. I. p. 53. t. 52.

Pers. 1807. Ench. II. p. 137. n. 1422: g. Labiatar. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 439. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 54. n. 90; 1830. Gen. I p. 19. n. 72. — Benth. 1835. Labiat. p. 706 (tribus incertae, 1836 [ibid. p. LIII] Ocimoideis insertum.) — Endl. 1838. Gen. n. 3682. p. 632; 1841. Ench. p. 309 (dubium). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 98. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. — Walp. 1845. Rep. III. p. 931. 992.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 424: g. Verbenear.

Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2845: g. Nepetear.

Bartl. 1830. Ord. p. 182: g. Salviear.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 677: g. Ocymoidear. — Par Rchb. 1837. Hdb. p. 189.

Meisn. 1840. Gen. p. 282 (191): g. Plectranthear.

Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4166: g. Teucriear.?

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Plectranthidar.

Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 54: g. Ocimear.

Hosta**) Jacq. 1797. Hort. Schönbr. I. p. 60. t. 114: nov. g. Didynam. Angiosperm. *Cf.* R. Brown 1810. Prodr. I. p. 211 not. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 143. n. 1438 (*Hostana*).

Juss. 1806. Ann. Mus. VII. p. 75: g. Verbenacear. — Par. HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 247. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 440. — Link 1822. En. II. p. 127. — Kunth 1823. Syn. II. p. 41. — Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 97. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Viticear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 180. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 100. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 227. — Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4198.

Endl. 1838. Gen. n. 3697. p. 635; 1841. Ench. p. 312: g. Lantanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 291 (199). — Walp. 1845. Rep. IV. p. 80.

Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 63. t. 269.

Synon. Cornutia Gärtn.

Hosta Trattin. 1812. Tabular. t. 89.

= Funkia Spreng.

Hosta Fl. Flum. I. t. 142: vid. *Horta Fl. Blum.*

Hostana Pers. vid. *Hosta Jacq.*

Hostea Willd. 1797. Spec. I. p. 1274. n. 491: g. Pentandr. Monogyn.

= Matelea Aubl.

Hostia Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 221: nov. g. Petalostemonis. (Crepis foetida L.)

Cass. 1821. Dict. v. 21. p. 442: g. Lactucear.

Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 62: g. Crepidear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30.

Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1410; 1831. Fl. exc. p. 256: sect. Barkhausiae.

= Anisoderis Cass.

Hostmannia Planchon 1845 in Hook. Ic. pl. IV. P. 1. t. 709: nov. g. Ochnacear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 400.

Planch. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 648: subg. Elvasiae. — Simil. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 179. — Endl. 1850. Spl. V. p. 99. n. 5961*b*.

Hostmannia Steud. (ubi? Non in Nomencl.)

= Comolia DC. (Naud.)

Hoteia*) Morren & Decaisne 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 316. t. 11; 1835. Bull. Ac. Brux. II. p. 205: nov. g. Astilbae Don aff. (H. japonica.)

Spach 1836. Vég. phan. V. p. 65: g. Saxifragear. (verar.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4644. p. 817; 1841. Ench. p. 409. (*Cf.* Spl. I. p. 1416.) — Decne 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 35. — Walp. 1843. Rep. II. p. 372. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 108.

Meisn. 1838. Gen. p. 138 (101): g. Cunoniacear.

Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1526: g. Decandr. Digyn.

Rchb. 1841. Nom. p. 157. n. 6145: g. Mitellear.

Astilbe Hamilt.?

Hottonia**) Boerh. 1720. Lugd. I. p. 207.

Linn. 1737. Gen. p. 43. n. 120; 1737. Cliff. p. 51; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 145; 1759. Syst. ed. X. p. 919. n. 186; 1762. Sp. ed. II. p. 208; 1764. Gen. ed. VI. p. 82. n. 203; 1767. Syst. ed. XII. p. 152: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 137. — Murr. 1774. Syst. p. 164; 1784. Syst. p. 194. — Reich. 1778. Gen. p. 84. n. 216. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 108. n. 265. — Lour. 1790. Coch. I. p. 105. — Gmel. 1791. Syst. p. 329. — Pers. 1797. Syst. p. 201; 1805. Ench. I. p. 171. n. 386. — Willd. 1797. Sp. I. p. 812. n. 301; 1809. En. p. 194. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 120.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 487: g. Dicotyledonum Isostemonum.

*) Dicat. Olao Hoslund, peregrinatori.

**) Dicat. Nic. Thom. Host, botanico Vindobon.

*) Dicat. botanico Japanensi Ho-tei, a Sieboldio laudato.

**) Dixit hanc Cel. Boerhaave in memoriam antecessoris sui Petri Hottonis. (Ht. Cliff.) Conf. Beckmann Lex. bot. p. 109.

Hottonia Boerh. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 207. n. 861: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Rotacear.?
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lysimachiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 95.
Adans. 1763. Fam. II. p. 230: g. Anagallidum.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Preciar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 347. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 126. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 7. 77. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 21.
Hill 1769. Ht. kew. p. 132: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 187: g. Speciosar.
Neck. 1790. El. II. p. 17. n. 631: g. Darinyphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 287: g. Primulacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 220. — DC. 1805. Franç. III. p. 436. — Hedw. 1806. Gen. p. 98. n. 441. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XVI. 176. n. 664. — Lois. 1821. Dict. v. 21. p. 444. — Link 1821. En. I. p. 159; 1829. Hdb. I. p. 406. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 301. — Bartl. 1830. Ord. p. 166. — Koch 1837. Syn. p. 591. Ed. II. p. 679. — Kunth 1838. Berol. II. p. 132. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 343.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 386; 1825. Syst. I. p. 582. n. 623; 1830. Gen. I. p. 142. n. 708: g. Primulear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 645. — Brongn. 1843. En. genr. p. 69.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXIX: g. Lysimachiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 127. n. 3325: g. Anagallidear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 398: g. Hottoniacear.
Endl. 1839. Gen. n. 4214. p. 734; 1841. Ench. p. 357: g. Hottoniear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). — Rchb. 1841. Nom. p. 124. n. 4832. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 33. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 7. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 446.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 646: g. Hottonidar.
Synon. Myriophyllum Riv., Rupp.; Stratiotes Vaill.

Hottonia Burm. 1737. Thes. Zeyl. p. 121. t. 55. f. 1.
= Limnophila R. Brown.

Hottonia Vahl 1791. Symb. II. p. 26.
= Myriophyllum Linn.? (DC. Pr. III. p. 69.)

Hottoniaceae Rchb. 1831. Fl. exc. p. 398: subdiv. Primulear. Gen.: Hottonia.

Hottonidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 646: trib. Primulacear. Gen.: Hottonia.

Hottonieae Endl. 1839. Gen. p. 734; 1841. Ench. p. 357: trib. Primulacear. Gen. unicum: Hottonia. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 254 (163). Gen. id. — Duby 1844 in DC. Pr. VIII. p. 33. Gen. id. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 466. Gen. id.
Rchb. 1841. Nom. p. 124: subdiv. Lysimachiear. Gen. id.

Hottuynia Cramer vid. *Houttuynia Thunb.*

Houlletia*) Brongn. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 37: nov. g. Orchidear., Stanhopeae aff.
Lindl. 1841. Bot. Regist. XXVI. Misc. 99: g. Vandear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 376 (282). — Endl. 1842. Spl. II. p. 17. n. $1421/_1$. — Brongn. 1843. En. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.
Rchb. f. 1858 Xen. Orchid. p. 110: g. Catasetear.

Houmiri**) Aublet 1775. Guian. I. p. 564. t. 225: nov. g. Polyandr. Monogyn. (H. balsamifera.)
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3595: g. Styracear.?
= Humirium Mart.

Houmiria Juss. 1789. Gen. p. 435: g. incertae sedis.
Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 480: g. Polyandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 209. n. 5441: g. Tiliear.
= Humirium Mart.

Houstonia***) Linn. 1737. Gen. p. 26. n. 70; 1737. Cliff. p. 35; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 105; 1759. Syst. ed. X. p. 891. n. 116; 1762. Sp. ed. II. p. 152; 1764. Gen. ed. VI. p. 51. n. 124; 1767. Syst. ed. XII. p. 117: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 126; 1784. Syst. p. 149. — Reich. 1778. Gen. p. 53. n. 131. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 68. n. 161. — Gmel. 1791. Syst. p. 236. — Pers. 1797. Syst. p. 154; 1805. Ench. I. p. 125. n. 240. — Willd. 1797. Sp. I. p. 583. n. 184; 1809. En. p. 156. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 94.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 165. n. 673: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Verbenar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 225: g. Jasminor.
Scop. 1777. Intr. p. 189: g. Speciosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 226. t. 49. f. 8 (longifolia).

---

*) Dicat. inventori Houllet.
**) Nomen caribaeum *Touri* s. *Houmiri*.
***) Dixit hanc plantam Gronovius a p. m. Houstono, cui tot nova debemus plantarum genera americana (Ht. Cliff.)

Houstonia Linn. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 197: g. Rubiacear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 232. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 432. — Hedw. 1806. Gen. p. 64. 873. — Link 1821. En. I. p. 139
Neck. 1790. El. I. p. 204. n. 341: g. Phyllastrophytor.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 475; 1825. Syst. I. p. 427. n. 446; 1830. Gen. I. p. 85. n. 417: g. Gentianear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 490. — Bartl. 1830. Ord. p. 201. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 442.
Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 13. 207. n. 479: g. Gentianar.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 81: g. Cinchonariae.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3483: g. Chironiear.
Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 29: Hedyotidi injungendam censet.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180: g. Hedyotidear.
Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 38: sect. Hedyotidis.
Walp. 1843. Rep. II. p. 495: subsect. Paneti.
Synon. Poiretia Gmel.; Amphiotis et Panetos DC.
Hedyotidis Lam. pars.

Houstonia Andrews . . . . Bot. Repos. t. 106.
= Bouvardia Salisb.

Houstonia *(fruticosa)* Willd. mss. 1818 in Röm. & Schult. Syst. III. p. 527.
Declieuxia HBK.

Houtouynia Pers. vid. *Houttuynia Thunb.*

Houttea*) Decaisne 1848. Rev. hortic. IX. (3e sér. II.) p. 462. c. ic.: g. Gesneriar. (Gesnera pardina Hook.)
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 205: g. Rhytidophyllear.
Oerst. 1858. Gesn. centroam.: g. Moussoniear.
Synon. Vanhouttea Lemaire.

Houttinia Steud. vid. *Hovttinia Neck.*

Houttouynia Thunb. 1784. Fl. japon. p. 12: nov. g. Polyandr. Polygyn.
Batsch 1802. Tab. p. 159: g. Aroidear.
= Houttuynia Thunb. emend. Juss.

Houttoynia Gmel. vid. *Houttuynia Thunb*

Houttuynia**) „Thunb. em." Juss. 1789. Gen. p. 25: g. Aroidear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 58. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 364. n. 371.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 614. n. 1389: g. Monoec. Monandr.
Gmel. 1791. Syst. p. 883 *(Houttoynia)*: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Pers. 1797. Syst. p. 556 *(Houtouynia)*; 1807. Ench. II. p. 108. n. 1370. — Cram. 1803. Disp. p. 141 *(Hottuynia)*.

*) Dicat. Lud. Van Houtte, Gandavensi, hortulano celeberrimo.

**) Dicat. Mart. Houttuyn, medico Amstelodam.

Houttuynia Thunb. cont.
Gis. 1792. Prael. p. 123: g. Piperitar.
Willd. 1799. Sp. II. p. 290. n. 722: g. Heptandr. Monogyn.
Wall. 1820 in Roxb. Ind. I. p. 360: g. Triandr. Trigyn. — Par. Schult. 1824. Mant. II. p. 38. 473. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 78. n. 387. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 142. 416.
Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 493: g. Aroidar.
Agdh. 1825. Aphor. p. 200: g. Begoniacear.
E. Meyer 1827. De Houtt. p. 1: g. Saururear. *Cf.* Flora 1828. II. Erg. Bl. p. 39. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 794; 1841. Nom. p. 68. n. 2557. — Bartl. 1830. Ord. p. 84. — Endl. 1837. Gen. n. 1825. p. 267; 1841. Ench. p. 152. — Meisn. 1841. Gen. p. 335 (248). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 5. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 98.
Rich. 1833 Guillem. Arch. bot. I. p. . . .: g. Orontiacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 521: g. Saururacear.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 387: g. Houttuyniear.
Synon. Houtuynia et Houttouynia Thunb.; Polypara Lour.

Houttuynia Houtt. . . . . Syst. XII. p. 448. t. 85.
= Montbretia DC.

Houttuynieae A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 387: trib. Saururear. Gen.: Houttuynia, Anemopsis, Gymnotheca.

Houtuynia Thunb. 1783. Act. Holm. p. 149. t. 5; 1784. Fl. jap. p. 234: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 519.
= Houttuynia Thunb. Juss.

Hovea R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 275 (Verm. bot. Schr. II. p. 479): nov. g. Leguminosar. (Poiretia linearis Sm.) — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 500. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 186. n. 2502; 1831. Gen. II. p. 572. n. 2787.
Bronn 1822. Diss. p. 132: g. Genistear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 115. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4057; 1841. Nom. p. 151. n. 5907. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 126. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 184. — Meisn. 1837. Gen. p. 82 (48); 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 78. — Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 36. Char. emend. — Endl. 1840. Gen. n. 6451. p. 1259; 1841. Ench. p. 667. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 127. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 458.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553: g. Hovear.
Synon. Physicarpos Poir.; Physicarpus Wittst.; Poiretia Smith.

Hoveae Benth. 1847 in Lindl. Veg. kingd. p. 553: div. Genistear. Gen.: Hovea, Plagiolobium, Lalage, Platychilum?, Platylobium, Bossiaea, Goodia, Templetonia, Scottia.

Hovenia*) Thunb. 1781. Diss. nov. gen. I. p. 7; 1784. Fl. jap. p. 7: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 240. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 148. n. 375. — Gmel. 1791. Syst. p. 410. — Pers. 1797. Syst. p. 251; 1805. Ench. I. p. 244. n. 542. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1141. p. 427. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 414; ed. 1832. I. p. 630.
Juss. 1789. Gen. p. 381: g. Rhamnor. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 71.
Neck. 1790. El. III. p. 357. n. 1786: g. Plyrontophytor.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 271: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 163. n. 690. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 660; 1825. Syst. I. p. 773. n. 842; 1830. Gen. I. p. 182. n. 922. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXIII. 429. n. 988. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 502. — DC. 1825. Pr. II. p. 40. — Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 367. — Bartl. 1830. Ord. p. 276. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p 35. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 456. — Meisn. 1837. Gen. p. 70 (50). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 818.
D. Don 1825. Nepal. p. 159: g. Rhamneacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3808: g. Ceanothear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41: g. Rhamnidear.
Sieb. & Zucc. 1835. Fl. jap. p. 135. t. 73. 74. Char. ampliat.
Endl. 1840. Gen. n. 5721. p. 1096; 1841. Ench. p. 581; 1842. Spl. II. p. 86; 1850. Spl. V. p. 84: g. Frangulear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5992. (genuinar.)
Brongn. 1843. Én. genr. p. 122: g. Phylicear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.

Hoverdenia**) Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 330: nov. g. Gendarussear.

Hovttinia Necker 1790. Elem. bot. III. p. 291. n. 1686: g. Emproophytor., a Calla L. sejunctum. (*Houttinia Steud.* Nom. I. p. 777.)

Howardia***) Weddell 1854. Ann. sc. nat. 4e sér. I. p. 65: g. Rondeletiear.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 129: g. Cinchonear.
Synon. Chrysoxylon Wedd.

Howittia†) F. Müll. 1856 in Hook. Kew gard. misc. VIII. p. 8: nov. g. Malvacear., Lagunaeae aff. (H. trilocularis.)

Hoya††) R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 26 (Verm. bot. Schr. II. p. 363); 1810. Prodr. I. p. 459. Ed. Nees p. 315: nov. g. Asclepiadear. (Asclepias carnosa L.) — Par. Haw. 1812. Syn. succ. p. 14. Ed. Schrank 1819. p. 14. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 486; 1825. Syst. I. p. 843. n. 972; 1830. Gen. I. p. 209. n. 1067. (Pentandr. Digyn.) — Schult. 1820. Syst. VI. p. VIII. 50. — Link 1821. En. I. p. 253; 1829. Hdb. I. p. 435. — D. Don 1825. Nepal. p. 130. — Blume 1826 Bijdr. Nr. 16. p. 1062. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 35. — Decne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 272. (verar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 579; II. p. 891.
Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 503: g. Apocinear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 130. n. 3416: g. Pergularinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Pergulariear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 555. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 53.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 125: g. Hoyacear.
Endl. 1838. Gen. n. 3501. p. 595; 1841. Ench. p. 299: g. Tylophorear. Sect.: Euhoya, Wattahaka et 1843 (Spl. III. p. 76) Codonanthus, Acanthostemma. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (177). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5038. Sect.: Schollia, Hoya.
Lindl. 1839. Bot. Regist. n. ser. XII. t. 18: g. Asclepiadacear.
Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212: g. Ceropegiear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 516. Sect.: Euhoya, Physostemma, Sperlengia, Otostemma, Cathetostemma, Placostemma.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 634: g. Ceropegiar. Sect.: verae, Wattahaka.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 43: g. Hoyear. Sect.: verae, Physostemma.
Synon. Schollia Vahl; Sperlingia Vahl: Pterygocarpus Hochst.

Hoyaceae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 107. 125: subtrib. Orthophuramiar. Gen.: Hoya, Pterostelma, Physostelma, Tylophora, Belostemma, Marsdenia, Cosmostigma, Heterostemma, Pergularia, Dischidia, Leptostemma, Triplosperma, Harrisonia; Conchophyllum, Gymnema, Sarcolobus.

Hoyeae Endl. 1838. Gen. p. 595; 1841. Ench. p. 299: subtrib. Pergulariear. Divis.: Sarcolobeae, Tylophoreae. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 270 (176). Divis. eaed. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 130. Sect. eaed.

Huanaca*) Cavan. 1801. Icon. VI. p. 18. t. 528: nov. g. Pentandr. Digyn. (H. acaulis.)

*) Dicat. Dav. ten Hoven, Amstelodam.
**) Dicat. comiti de Hoverden-Plencken.
***) Dicat. J. Elliott Howard.
†) Dicat. Dr. Godfrey Howitt.
††) Dicat. Thom. Hoy, hortulano.

*) Nomen vernaculum.

Huanaca Cavan. cont.
Pers. 1805. Ench. I. p. 317. n. 700: g. Umbellatar.
Hedw. 1806. Gen. p. 200. n. 821: g. Umbelliferar. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 505. — Bartl. 1830. Ord. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 143. n. 3732: g. Amminear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 80: g. Mulinear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 261. — Rchb. 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5522. — Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103). — Endl. 1839. Gen. n. 4373. p. 766; 1841. Ench. p. 377. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 934. — Hook. f. . . . . Fl. antarct. II. p. 286.
Tausch 1834. Flora I. p. 353: g. Azorellear.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136: g. Tetragonospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Mulinidar.
Fenzl 1850 in Endl. Spl. V. p. 3. n. 4376a: sect. Spananthes.

Huberia*) DC. 1828. Prodr. III. p. 167: nov. g. Miconiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 778. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 206.
Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4628: g. Blakeacear.
Mart. 1829. Nov. gen. III. p 146 in adnot.: g. Melastomacear. — Par. Cham. 1834. Linnaea IX. p. 373. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1376. 1456.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 339. n. 1716: g. Melastomear. (Decandr. Monogyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 330.
Meisn. 1838. Gen. p. 114 (81): g. Lavoisierear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6176. p. 1207; 1841. Ench. p. 646. — Rchb. 1841. Nom. p. 173. n. 6687. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 336: g. Clidemiear.

Hubertia Bory 1804. Veg. il. Afr. t. 14.
Cass. 1821. Dict. v. 21. p. 506; 1827. v. 48. p. 448. 457; 1830. v. 60. p. 583: g. Senecionear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2502. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32. (verar.)
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3365. c: sect. Senecionis.
Senecionis Less. sect. VI. (*Synon. Pithosillum et Synarthrum Cass.*)

Huchinsia G. Don Gen. syst. I. p. 148: sphalm. pro *Hutchinsia R. Brown.*

Hudsonia**) Linn. 1767. Mant. p. 11. n. 1263; 1767. Syst. ed. XII. p. 327: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 370; 1784. Syst. p. 445. — Reich. 1778. Gen. p. 246. n. 657. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 322. n. 822. — Gmel. 1791. Syst. p. 751. — Pers. 1797. Syst. p. 477; 1807. Ench. II. p. 6. n. 1175. — Willd. 1799. Sp. II. p. 858. n. 947.
Scop. 1777. Intr. p. 334: g. Defloratar.
Berg. 1778. Vet. Ac. Handl. p. 19.
Juss. 1789. Gen. p. 162: g. Ericis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 364. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 508.
Neck. 1790. El. II. p. 192. n. 914: g. Aclithrophytor.
Gis. 1792. Prael. p. 337: g. Bicornium.
Batsch 1802. Tab. p. 218: g. Ericariar.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 4: g. Polyandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 521: g. Epacridum.
DC. 1824. Pr. I. p. 284: g. Cistinear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 283. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 316. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 73. — Meisn. 1837. Gen. p. 19 (17). — Endl. 1839. Gen. n. 5031. p. 905; 1841. Ench. p. 467.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 452. n. 1761; 1830. Gen. I. p. 395. n. 1982: g. Cistear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4914; 1837. Hdb. p. 272; 1841. Nom. p. 188. n. 7188. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 25.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 113: g. Cistacear. (anomal.) — Par. Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 574. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 350.

Hudsonia Robins. 1814 in Lunan. Ht. jam. II. p. 310.
= Bucida Linn.

Hübneria Rchb. 1841. Nomencl. p. 232 (in Ind.): nomen pro *Webbia Spach*, non DC. propositum.

Hügelia*) Rchb. „Ic. exot. t. 201." 1828. Consp. p. 144. n. 3760c: g. Hermadear.
Bartl. 1830. Ord. p. 236: g. Umbelliferar. desciscens.
Rchb. 1837. Hdb. p. 221; 1841. Nom. p. 142. n. 5508: g. Hydrocotylear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 174.
Didiscus DC.

Hügelia Benth. 1833. Bot. Regist. XIX. n. 1622: nov. g. Polemoniacear. (H. densifolia, etc.) *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 20 et Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 84. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 243.
Collomioides DC.

Hügelia „R. Brown mss." Endl. 1840. Gen. n. 6013. p. 1156; 1841. Ench. p. 612: g. Boroniear. (non descript.) *Cf.* Meisn. 1843. Comm. p. 317. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 471.
Synon. Decadianthe Rchb.

*) Dicat. Francisco et filio Petro Huber.

**) Dicat. Will. Hudson, botanico Londin.

*) Dicat. Car. Alex. Ans. de Hügel, peregrinatori.

Hünefeldia*) Walpers 1840. Linnaea XIV. p. 407: nov. g. Asteroidear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 38. n. 2345/$_1$: g. Belliear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Walp. 1843. Rep. II. p. 584. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710 *(Hunefeldia)*.

Huernia**) R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 23 (Verm. bot. Schr. II. p. 359): nov. g. Asclepiadear., a Stapelia L. disjunctum. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. VI. 5. — Link 1829. Hdb. I. p. 433. — Bartl. 1830. Ord. p. 202.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 28. Ed. Schrank 1819. p. 29: g. Pentandr. Digyn.
Link 1821. En. I. p. 255: sect. Stapeliae.
Rchb. 1828. Consp. p. 130. n. 3409: g. Stapeliear. — Par. Dumort 1829. Anal. fam. p. 26. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 112.
Meisn. 1840. Gen. p. 271 (178): g. Ceropegiear. — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 211.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 650: g. Ceropegiar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 627: g. Stapeliar.
Synon. Heurnia Spreng., Endl.; Decodontia Haw.

Huerta St. Hil. vid. *seq.*

Huertea***) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 34. t. 6; 1802. Fl. peruv. III. p. 4. t. 227: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 357 *(Huerta)*. — Pers. 1805. Ench. I. p. 248. n. 558.
Hedw. 1806. Gen. p. 158. n. 674: g. Aralioidear.?
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXVII. 332. n. 961: g. Araliis aff.
Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 510: g. Terebinthaceis aff.? — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 90. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 77 *(Huertia)*.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 779. n. 851; 1830. Gen. I. p. 179. n. 901: g. Rhamnear.? — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 804.
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3860: g. Lentiscear.?
Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56): g. Burseracear.?
Rchb. 1837. Hdb. p. 224: g. Pistaciear.
Endl. 1840. Gen. n. 5923. p. 1134; 1841. Ench. p. 599: g. Anacardiacear. dubium. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 467.
Rchb. 1841. Nom. p. 146. n. 5677: g. Spondiear.?

Huertia G. Don vid. *praeced.*

Huetia†) Boissier 1856. Diagn. pl. nov. or. III. Ser. 2. p. 103: nov. g. Scandicinear., Conopodio et Heterotaeniae aff. (H. pumila.)

*) Dicat. prof. Hünefeld, Gryphico.
**) Dicat. Justo Huernio.
***) Dicat. Hieron. Huerta.
†) Dicat. fratribus Huet du Pavillon.

Hufelandia*) Nees 1833. Progr. gratul. p. 11; 1836. Laurin. p. 187. 674: nov. g. Persear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 2031. p. 317; 1841. Ench. p. 197. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1331. 1341. — Meisn. 1841. Gen. p. 325 (238). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 470. — Rchb. 1841. Nom. p. 71. n. 2682.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 537: g. Lauracear.

Hugelia Auctorum vid. *Hügelia.*

Hugelroea Steud. 1840. Nomencl. I. p. 778: g. Podalyriear. (Roea linophylla Hüg.)
Roea Hüg., Benth.

Hugonia**) Linn. 1737. Gen. p. 134. n. 378; 1740. Syst. p. 23; 1742. Gen. ed. II. p. 203. n. 456: g. Decandr. Pentagyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 138. n. 581: g. Thalamostemonum.
Linn. 1753. Sp. II. p. 675; 1759. Syst. ed. X. p. 1141. n. 745; 1763. Sp. ed. II. p. 944; 1764. Gen. ed. VI. p. 349. n. 831; 1767. Syst. ed. XII. p. 452: g. Monadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 510; 1784. Syst. p. 612. — Reich. 1778. Gen. p. 349. n. 896. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 457. n. 1117. — Gmel. 1791. Syst. p. 1014. — Pers. 1797. Syst. p. 650. — Willd. 1800. Sp. III. p. 694. n. 1269.
Adans. 1763. Fam. II. p. 344: g. Pistaciar.
Scop. 1777. Intr. p. 286: g. Columniferar.
Cavan. 1787. Diss. III. p. 177. t. 73.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 281. t. 58. f. 7 (Mystax).
Juss. 1789. Gen. p. 275: g. Malvacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 192. — Batsch 1802. Tab. p. 18. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 67. — Pers. 1807. Ench. II. p. 237. n. 1608. — Poir. 1821. Dict. v. 21. p. 511.
Neck. 1790. El. II. p. 428. n. 1253: g. Comizophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 822: g. Hermanniear. — Par. Juss. 1821. Dict. v. 21. p. 66.
DC. 1824. Pr. I. p. 522: g. Chlenaceis aff.? — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 562.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 69. n. 2395; 1831. Gen. II. p. 544. 2665: g. Chlaenacear.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXII: g. Paulliniear.
Rchb. 1828. Consp. p. 204. n. 5318: g. Dombeyacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 344. (?) — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 444.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 72: g. Hugoniacear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 35 (27). — Endl. 1840. Gen. n. 5404. p. 1016; 1841. Ench. p. 529.

*) Dicat. Archiatro Hufeland.
**) Dicat. J. Hugon, botanico anglo.

Hugonia Linn. cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: g. Dombeyear.? Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7696: g. Hugoniear. — Par. Planch. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 593; 1838. ibid. VII. p. 524. — Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 96.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 489: g. Oxalidacear.
Synon. Ugona Adans.

Hugoniaceae Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 71: ordo pl. Gen.: Hugonia.
Meisn. 1837. Gen. p. 35 (27): trib. Büttneriacear.? Gen. id.
Endl. 1840. Gen. p. 1016; 1841. Ench. p. 528: fam. Guttiferar. Gen. id.

Hugonieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 202: subsect. Dombeyear. Gen.: Hugonia.
Planch. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 593; 1848. ibid. VII. p. 524: sect. Linear. Gen.: Hugonia, Durandea, Roucheria. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 96. Gen. ead.

Hugueninia Rchb. 1832. Fl. exc. p. 691; 1837. Handb. p. 260: nov. g. Sisymbrear. — Par. Koch 1836. Syn. p. 49. Ed. II. p. 53. — Meisn. 1837. Gen. p. 13 (12).
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 323: g. Siliquosar.
Rchb. 1841. Nom. p. 183. n. 7036: g. Sisymbriear. genuinar.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 97: g. Cheiranthear.
= Descurea Guett.

Huidobria Gay 1846. Fl. Chil. II. p. 438: nov. g. Loasear. (H. chilensis). — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 656.

Hultemia Rchb. vid. *seq.*

Hultenia Rchb. vid. *seq.*

Hulthemia*) Dumort. 1824. Notice sur un nouveau genre Hulthemia; 1829. Anal. fam. p. 39: nov. g. Rosear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 243 (*Hultenia*); 1841. Nom. p. 168. n. 6527 (*Hultemia*). (genuinar.) — Endl. 1840. Gen. n. 6358. p. 1241; 1841. Ench. p. 659. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 125 (*Hulthenia*). — Walp. 1843. Rep. II. p. 13. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 72. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 208 (*Hultemia*).
Synon. Lowea Lindl.; Rhodopsis Bunge.

Hulthenia Brongn. vid. *praeced.*

Humaria Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 67: tribus Aleuriae. (Octosporae sp. Hedw.)
Endl. 1836. Gen. n. 430 *C k.* p. 37; 1841. Ench. p. 21: subsect. Aleuriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 3 *b.* — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 368.

Humata Cavan. 1801. Praelect. p. 130.
Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 323: g. Filicum.
Presl 1836. Pterid. p. 128: sect. Davalliae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 643 *c α.* p. 1350; 1841. Ench. p. 37. — Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1032. 3 *a.*

*) Dicat. Ch. Jos. Emman. van Hulthem.

Humata Cavan. cont.
J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 416; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 425: g. Davalliear.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 152: subg. Davalliae.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Dicksoniear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 322: g. Nephrolepidear.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 102: g. Davalliacear.

Humbertia „Commers. mss." (Lam. Illustr. t. 103.) teste Juss. 1789. Gen. p. 133; 1821. Dict. v. 22. p. 37.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 462; 1825. Syst. I. p. 589. n. 642; 1830. Gen. I. p. 137. n. 682: g. Convolvulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3007; 1841. Nom. p. 114. n. 4421. (genuinar.) — Endl. 1839. Gen. n. 3812. p. 655; 1841. Ench. p. 324. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 95. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 632.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXI. 205. n. 688: g. Convolvulor.
Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 431 (*cf.* Flora Lit. VI. p. 126); 1845 in DC. Pr. IX. p. 344: g. Argyreiear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 257. — Meisn. 1840. Gen. p. 275 (182).
Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 633: g. Convolvulacear.
Synon. Endrach Flac.; Endrachium Juss.; Thouinia Smith; Thouina Schreb.; Smithia Gmel.

Humboldia Rchb. vid. *Humboldtia Vahl.*

Humboldtia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 16. n. 630: g. Darinyphytor.
= Voyria Aubl.

Humboldtia*) Vahl 1794. Symb. III. p. 106: nomen pro *Batschia Vahl* substitutum.
Willd. 1797. Sp. I. p. 1147. n. 435: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 248. n. 557.
Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 205: g. Leguminosar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 158. n. 675. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 767 (anomal.); 1825. Syst. I. p. 794. n. 884; 1830. Gen. I. p. 193. n. 976. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXI. 406. n. 977. — Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 37. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 849.
Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 488. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 436. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 284. — Meisn. 1837. Gen. p. 100 (71).
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4118 (*Humboldia*); 1841. Nom. p. 155. n. 6095: g. Caesalpiniear. — Par. R. Brown 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 17. t. 233. (Verm.

*) Dicat. Alex. de Humboldt.

Humboldtia Vahl cont.
bot. Schr. V. p. 391.) — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6792. p. 1318; 1841. Ench. p. 674.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Amherstiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p 556. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 85.
Synon. Batschia Vahl.

Humboltia Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 121. t. 27: nov. g. Gynandr. Diandr.
= Stelis Swartz.

Humea*) Smith 1804. Exot. bot. p. 1. t. 1: nov. g. Syngenes. Polygam. Aequal. (H. elegans.) — Par. Willd. 1809. Enum. p. 851.
Spreng. 1818. Anl. II. 2 p. 547; 1826. Syst. III. p. 459. n. 2721; 1831. Gen. II. p. 618. n. 3066: g. Eupatorinar.
Cass. 1821. Dict. v. 22. p. 38: g. Anthemidear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 141.
Link 1822. En. II. p. 311: g. Corymbiferar.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 177; 1827. v. 50. p. 497; 1830. v. 60. p. 578: g. Artemisiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2370.
Less. 1832. Syn. p. 272: g. Helichrysear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p 157. — Endl. 1838. Gen. n. 2727. p. 444; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 218 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3508. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Fenzl 1839. Flora II. p. 726: g. Humear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 172: g. Chrysanthemear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 39: g. Gnaphaliear.
Synon. Calomeria Vent.; Agathomeris Delaun.; Razumovia Spreng.; Oxypheria Hortul.

Humea Roxb. 1832. Fl. Ind. II. p. 640: nov. g. Polyandr. Monogyn. (Malvacear. — H. elata.)
= Brownlowia Roxb.

Humeae Fenzl 1839. Flora II. p. 726: subdiv. Helichrysear. Gen.: Humea, Syncephalum.

Humida Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 281: nov. g. Oscillatoridear. (Conferva muralis Roth, decorticans Dillw. et cyanea E. B.)
= Ulothrix Kütz.? etc.

Humiria Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. II. p. 374: g. Polyandr. Monogyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 70. n. 1292.
DC. 1824. Pr. I. p. 619: g. Meliear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 562. n. 2748. (in Monadelph. Polyandr.)
Bartl. 1830. Ord. p. 356: g. Meliacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 314: g. Humiriear.
= Humirium Mart.

Humiriaceae Martius 1827. Nov. gen. II. p. 142: ordo Meliaceis aff., absque nomine indicatus. Gen.: Humirium, Sacoglottis, Helleria.
A. Juss. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 87. Gen.: Humirium, Helleria.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (107) Thalamiflorar. (syncarpar.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 675. Gen.: Humirium, Helleria, Sacaglottis.
Lindl. 1833. Nix. p. 20: ordo Melialium.
Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 104) 1847. Veg. kd. p. 447: ordo Ericalium. Gen. ut Endl. et Vantanea.
Meisn. 1837. Gen. p. 47 (34): ordo 37 plant. (p. 439 Hesperidum.) Gen.: Sacoglottis, Humirium, Helleria.
Endl. 1840. Gen. p. 1039; 1841. Ench. p. 544: ordo Hesperidum. Gen.: Saccoglottis, Humirium, Helleria.
Spach 1846. Vég. phan XIII. p. 297: fam. (232) incertae sedis. Gen. ut Endl.
Römer 1846. Fam. nat. I. p. 3: fam. Hesperidum. Gen. ut Meisn.
Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 713: fam. Dicotylodonear. polypetalar. hypogynar. Gen. ut Endl.
Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. IX. p. 128: ordo Styraceis aff. — Simil. Benth. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 97. Gen.: Vantanea, Humirium, Sacoglottis.

Humirieae Rchb. 1837. Handb. p. 314: div. Hesperidear. Gen.: Humiria, Sacoglottis, Helleria. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 213. Gen. Humiriacear. Endl.

Humirium Martius 1827. Nov. gen. II. p. 142. t. 198. 199: g. inter Styracinas et Meliaceas medium.
A. Juss. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 88: g. Humiriacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 676. — Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 104; 1847. Veg. kd. p. 447. — Meisn. 1837. Gen. p. 47 (34). — Endl. 1840. Gen. n. 5486. p. 1040; 1841. Ench. p. 545. — Walp. 1842. Rep. I. p. 425. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 298. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 4. 5. — Benth. 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 100. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 383.
Rchb. 1841. Nom. p. 213. n. 8095: g. Humiriear.
Synon. Houmiri Aubl.; Houmiria Juss.; Humiria St. Hil.; Wernisekia Scop.; Myrodendrum Schreb.; Myrodendron Spreng.

Humulineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: trib. Urticacear. Gen.: Humulus.

Humulus*) Linn. 1737. Gen. p. 304. n. 750; 1737. Cliff. p. 458; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. II. p. 1028; 1759. Syst. ed. X. p. 1291. n. 989; 1763. Sp. ed. II. p. 1457; 1764. Gen. ed. VI. p. 522. n. 1116; 1767. Syst. ed. XII. p. 653: g. Dioec. Pentandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p.

*) Dicat. Lady Amelia Hume.

*) Nomen veteribus non usitatum, originis incertae.

Humulus Linn. cont.
742; 1784. Syst. p. 886. — Reich. 1778. Gen. p. 518. n. 1221. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 689. n. 1523. — Pers. 1797. Syst. p. 929; 1807. Ench. II. p. 618. n. 2230. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 769. n. 1795; 1809. En. p. 1014. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 237. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 198. 282.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Scabridar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 593. — Batsch 1802. Tab. p. 178. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 651.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Amentaceis aff.

Gled. 1764. Syst. p. 59. n. 243: g. Thalamostemonum.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 105: g. Incompletar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 421: g. Dioicear.

Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 492: g. Castanear.

Thunb. 1784. Fl. jap. p. 113: g. Pentandr. Digyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 451. — Rebent. 1804. Neom. p. 124.

Juss 1789. Gen. p. 404: g. Urticar.

Neck. 1790. El. II. p. 215. n. 951: g. Sysellophytor.

Vent. 1799. Tabl. III. p 535: g. Urticear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 310. — DC. 1805. Franç. III. p. 321. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 360; 1831. Gen. II. p. 707. n. 3568. — Lois. 1821. Dict. v. 21. p. 445 (*Houblon*). — Link 1822. En. II. p. 424. — Agdh. 1825. Aphor. p. 204. — Rchb. 1828. Consp. p. 84. n. 1810.

Spreng. 1826. Syst. III. p. 903. n. 3177: g. Urticeis aff. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 293.

Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 508: g. Cannabinear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 636. Ed. II. p. 733. — Endl. 1837. Gen. n. 1891. p. 286; 1841. Spl. I. p. 1376; 1841. Ench. p. 172. — Kunth 1838 Berol. II. p. 189. — Meisn. 1841. Gen. p. 348 (259). — Rchb 1841. Nom. p. 67. n. 2509. — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 33. — Brongn. 1843. En. genr. p. 99. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 329. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 679 (*Houblon*). — Ledeb. 1851. Ross. III. p. 634. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 112.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Humulinear.

Bartl. 1830. Ord. p. 106: g. Cannabinar.

Link 1831. Hdb. II. p. 443: g. Lupulinar. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 179; 1837. Hdb. p. 172.

Schleid. 1839 in Wiegm. Arch. f. Naturg. I. p. 229.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 265: g. Cannabinaceear.

Synon. Lupulus Tourn.

Hunefeldia Lindl. vid. *Hünefeldia Walp.*

Hunnemannia A. Juss. vid. *seq.*

Hunnemania G. Don vid. *seq.*

Hunnemannia*) Sweet . . . . Brit. fl. gard. III. t. 276.

G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 129. 135 (*Hunnemania*): g. Papaveracear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 7 (9). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 223. — Brongn. 1843. En. genr. p. 94. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 431.

Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 464: g. Hunnemanniear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4828. p. 857; 1841. Ench. p. 443. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 45. — Walp. 1842. Rep. I. p. 116. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 455 (*Hunemannia*).

Rchb. 1837. Hdb. p. 264: g. Chelidoniear.

Rchb. 1841. Nom. p. 184. n. 7092: g. Eschscholtziear.

Hunnemannieae Bernhardi 1833. Linnaea VIII. p. 464; 1838. ibid. XII. p. 659: trib. Papaveracear. Gen.: Eschscholtzia, Hunnemannia et (1838) Dendromecon. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 857; 1841. Ench. p. 433. Gen. ead. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 6. 44. Gen. ead.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 455: div. Eschscholtziear. Gen. ead.

Hunteria**) Roxb. 1824. Fl. Ind. ed. Wall. II. p. 531; ed. 1832. I. p. 695: nov. g. Pentandr. Monogyn. (H. corymbosa.) — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 50.

Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3637: g. Mimusopear.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 131. n. 653: g. Sapotear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 162. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 623.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 105: g. Carandiear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 214: g. Chrysophyllear.

Endl. 1838. Gen. n. 3394. p. 581: 1841. Ench. p. 294: g. Plumeriear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. — Meisn. 1840. Gen. p. 263 (172).

Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5179: g. Vincear.

A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 349: g. Tabernaemontanear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 409.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.

Hunteria Fl. mexic. ined. (ex DC. Pr. V. p. 649 sub Porophylli sect. 2.)

Endl. 1838. Gen. n. 2582 *a* ,γ. p. 420; 1841. Ench. p. 239: subsect. Euporophylli. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3217. ♀ *h*.

Porophylli Vaill. pars.

*) Dicat. J. Hunnemann, botanico anglo.

**) Dicat. Dr. Will. Hunter, Bengal.

Huntleya*) Bateman 1837. Bot. Regist. XXIII. n. 1991; 1839. ibid. XXV. (n. ser. XII.) t. 14: nov. g. Vandear. (H. sessiliflora.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1407/$_2$. p. 1363; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 53. n. 2012. — Meisn. 1842. Gen. p. 378 (283). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 177.

Lindl. (Sert. Orchid. p. 26) 1847. Veg. kd. p. 182: g. Maxillaridar.

Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 665; 1858. Xen. Orchid. p. 183. t. 65. Char. reform.

Huperzia**) Bernhardi 1800 in Schrad. Journ. II. p. 126: nov. g. Filicum agyratar.

Rchb. 1841. Nom. p. 60. n. 2315. 2: sect. Lycopodii.

Synon. Plananthus Palis.; Selago Hook. & Grev.; Lycopodium Brongn.; Arachyobrium Ritg.

Hura***) Linn. 1737. Gen. p. 377. n. 933; 1737. Cliff. p. 486; 1742. Gen. ed. II. p. 533. n. 1013: g. pl. incertae sedis.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128: g. Petalostemonis.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Tricoccor.

Linn. 1753. Sp. II. p. 1008; 1759. Syst. ed. X. p. 1277. n. 965; 1763. Sp. ed. II. p. 1431; 1764. Gen. ed. VI. p. 504. n. 1087; 1767. Syst. ed. XII. p. 638: g. Monoec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 724; 1784. Syst. p. 867. — Reich. 1778. Gen. p. 502. n. 1189. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 660. n. 1475. — Pers. 1797. Syst. p. 911. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 592. n. 1733; 1809. En. p. 996.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Euphorbiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 391.

Adans. 1763. Fam. II. p. 357: g. Tithymalor.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 169. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 884. n. 3141; 1831. Gen. II. p. 699. n. 3526.

Gled. 1764. Syst. p. 146. n. 607: g. Thalamostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 98: g. Disparium.

Neck. 1790. El. III. p. 108. n. 1437: g. Daphonophytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 1035: g. Monadelph. Icosandr.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 503: g. Tithymaloidear.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 288: g. Euphorbiacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 588. n. 2147. — Link 1822. En. II. p. 409; 1831. Hdb. II. p. 438. — Agdh. 1823. Aphor. p. 195. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 51. — Poir. 1827. Dict. v. 46. p. 510 *(Sablier)*.

*) Dicat. J. T. Huntley, Orchidearum cultori.
**) Dicat. Huperz.
***) *Hura* nomen barbarum ex Guiana.

Hura Linn. cont.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 375: g. Linozostear.

Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5023; 1837. Hdb. p. 281; 1841. Nom. p. 193. n. 7340: g. Hippomanear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 372. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 525. — Endl. 1840. Gen. n. 5776. p. 1110; 1841. Ench. p. 587. — Meisn. 1841. Gen. p. 337 (251). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. — J. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 281 *(Sablier)*.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Huracear.

A. Juss. 1832. Ann. sc. nat. XXV. p. 27: g. Euphorbiear.

A. Rich. 1849 in Orb. Dict. V. p. 505: g. Stillingiear.

Baill. 1858. Euphorb. p. 541: g. Huridear.

Hura „König" Retz. 1783. Observ. III. p. 49.

= Colebrookia Don.

Huraceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: trib. Euphorbiacear. Gen.: Hura, Omphalea, Hippomane, Sapium, Stillingia, Exoecaria.

Hurideae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 541: div. Euphorbiacear. uniovulatar. Gen.: Hura.

Husangia „Neck." Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 59: vid. *Hosangia*.

Husseia*) Berkeley 1827. Lond. journ. bot. VI. p. 508: nov. g. Ascomycetum, Mitremyceti simile. (H. insignis.)

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 440: g. Diplodermeor.

Hussonia**) Boissier 1849. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 8. p. 46: nov. g. Anchoniear. (H. uncata.) *Cf.* Flora 1850. p. 42. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 53.

Huszia***) Klotzsch 1855. Begon. p. 137: nov. g. Begoniacear. (Begonia octopetala Her.)

Hutchinia†) Wight & Arn. 1834. Contrib. p. 34: nov. g. Asclepiadear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 579 *(Hutschinia)*; 1840. II. p. 888.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 123: g. Stapeliear.

Endl. 1838. Gen. n. 3522. p. 598; 1841. Ench. p. 299: g. Ceropegiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 271 (178). — Rchb. 1841. Nom. p. 130. n. 5024. — Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 211.

Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 540: g. Pergulariear.

= Boucerosia Wight.

*) Dicat. Hussey.
**) Dicat. Husson, professori Kahir.
***) Dicat. Car. Husz.
†) Dicat. Hutchin, Norwich.

Hutchinsia*) R. Brown 1812 in Act. h. kew. ed. sec. IV. p. 52 (Verm. bot. Schr. V. p. 17): nov. g. Cruciferar. (Iberis rotundifolia W.)
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 235; 1821. Syst. II. p. 284; 1824. Pr. I. p. 177: g. Thlaspidear. Sect: Iberidella, Nasturtiolum (1824 correct. Nasturtioides). — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 62. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 192. Sect. ut DC. — Meisn. 1837. Comm. p. 11. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 114.
Link 1822. En. II. p. 152: g. Tetradynam. Siliquos.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 863. n. 2285; 1831. Gen. II. p. 515. n. 2529: g. Siliculosar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 658.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1124 *(Hutschinsia)*: sect. Lepidii. Subsect.: Nasturtiolum, Noccaea.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Biscutellear.
Gaud. 1829. Helv. IV. p. 218: sect. Thlaspios.
Koch 1836. Syn. p. 73. Ed. II. p. 78: g. Lepidinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4931. p. 879; 1841. Ench. p. 450; 1843. Spl. III. p. 87. Sect. (1843 ex Fenzl Pug. pl. Syr. 14): Petrochamela, Oreochamela, Psammochamela, Chrysochamela. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 200. — Meisn. 1843. Comm. p. 341. — Brongn. 1843. En. genr. p. 92. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 212.
Meisn. 1837. Gen. p. 12: g. Iberidear. — Par. (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 147.
Rchb. 1841. Nom. p. 180. n. 6934: g. Lepidiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Lepididar. *Synon.* Nasturtiolum Gray; Leptophyllum Gaud.; Noccaea Rchb.; Hornungia Rchb.

Hutchinsia Agardh 1817. Syn. Alg. p. XXVI. 53; 1821. Aphor. p. 98: nov. g. Confervoidear. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 60.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 108: g. Stereogonator.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 334: g. Hutchinsidear.
Agdh. 1824. Syst. Alg. p. XXIX. 156; 1828. Spec. II. 1. p. 55: g. Ceramiear.
Bory 1828 in Duper. voy. Crypt. p. 224 *(Hutchintia)*: g. Ceramiariar.
Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 396: g. Phlomidear.
Polysiphonia Grev.

Hutchinsideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 331: div. Thalassiophytar. Gen.: Cladostephus, Sphacelaria, Ellisius, Hutchinsia, Vertebrata.

Hutchintia Bory vid. *Hutchinsia Agdh.*

Hutschinia Dietr. vid. *Hutchinia Wight & Arn.*

Hutschinsia Rchb. vid. *Hutchinsia R. Brown.*

Huttia Preis mss.
= Calectasia R. Brown.

Huttia*) „Drumm.“ Harvey 1855 in Hook. Kew gard. misc. VII. p. 51: nov. g. Dilleniacear. (H. conspicua.)
Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 37: g. Delimear.

Huttonia Sternb. 1837. Verh. Ges. vat. Mus. Böhm. p. 69.
Unger 1844. Bot. Zeit. p. 181; 1845. Syn. p. 31; 1846. Chlor. prot. p. XXXII: g. Asterophyllitar.

Huttum Adans. 1763. Fam. II. p. 88: g. Myrtor.
= Butonica Lam.

Hyacintheae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 60: trib. Liliacear. Gen.: Hyacinthus, Lachenalia, Muscari, Aletris, Polyanthes, Veltheimia, Tritoma, Millea, Uropetalum, Massonia, Aloe, Pachydendron, Gasteria, Haworthia, Apicra, Phormium. — Par. Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 175. 185. Gen. §. 1: Scilla, Adenoscilla, Ornithogalum, Gagea, Allium, Nothoscordium, Erythronium. §. 2: Endymion, Hyacinthus, Bellevalia, Muscari.
Endl. 1837. Gen. p. 144: trib. Asphodelear. Gen.: Muscari, Bellevalia, Hyacinthus, Veltheimia, Uropetalum, Agraphis, Lachenalia, Drimia, Massonia, Daubenya, Eucomis, Cyanotris (1841 Camassia), Scilla, Urginea, Ornithogalum, Albuca, Myogalum, Puschkinia, Barnardia, Allium. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1358 et Ench. p. 83) Nectarcoscordum et 1842 (Spl. II. p. 13) Eratobotrys. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302). Gen. 10 prima Endlicheri. — Kunth 1842. Abh. Berl. Ak. p. 15; 1843. Enum. IV. p. 281. Gen.: Veltheimia, Coelanthus, Lachenalia, Periboea, Polyxena, Massonia, Daubenya, Eucomis, Hyacinthus, Eratobotrys, Bellevalia, Botryanthus, Muscari, Scilla, Urginia, Ledebouria, Barnardia, Puschkinia, Drimia, Idothea, Camassia, Chlorogalum, Myogalum, Ornithogalum, Albuca, Uropetalum. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 369. Gen. ut Endl. 1841.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 254. 290: sect. Asphodelear. Gen. ut Kunth.

Hyacinthi Adans. 1763. Fam. II. p. 52: sect. Liliacear. Gen.: Unifolium, Convallaria, Polygonatum, Cordyline, Aloë, Narukila, Aletris, Burmannia, Hyacinthus, Muscari, Abumon, Abandium, Colchicum.

*) Dicat. Miss Hutchins, Belfast.

*) Dicat. John Hutt.

Hyacinthinae Batsch 1802. Tab. affin. p. 136: fam. Campanalium. Gen.: Hyacinthus, Phormium, Lachenalia, Uvularia, Oncus, Convallaria, Medeola, Philesia, Callixene, Ripogonum, Asparagus, Ruscus, Smilax, Cissampelos, Dioscorea, Tamnus, Rajania.
Link 1829. Hdb. I. p. 160: subordo Liliacear. Gen.: Ornithoxanthum, Ornithogalum, Myogalum, Scilla, Agraphis, Adamsia, Lachenalia, Uropetalum, Hyacinthus, Muscari, Phormium, Veltheimia, Tritomium, Polyanthes, Eucomis, Funkia, Hemerocallis, Anthericum, Liliastrum, Narthecium, Bulbine, Asphodelus, Eremurus, Agapanthus, Pontederia.

Hyacinthineae Brongn. 1843. Énum. genr. p. 18: trib. Liliacear. Gen. ex Hyacintheis et Anthericeis Endl.

Hyacinthoides Rchb. 1830. Fl. exc. p. 105: sect. Agraphidis. (A. cernua et nutans.)

Hyacinthorchis Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. 3. p. 48: nov. g. Vandear., Cremastrae aff. (H. variabilis.) — Par. Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 547.

Hyacinthus*) Tourn. 1700. Inst. p. 344. t. 180: g. pl. class. IX.
Adans. 1763. Fam. II. p. 54: g. Hyacinthor.
Medic. 1790. Act. Theod. Palat. Phys. VI. p. 431. (H. orientalis.)
Mönch 1794. Meth. p. 632: g. Petalostemonis. (Distinguuntur Muscari et Dipcadi.)
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 129: g. Asphodelear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 237. n. 961. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 176. — Agdh. 1823. Aphor. p. 163. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XXXVII. 580.
DC. 1805. Franç. III. p. 206; 1815. V. p. 314: g. Asphodelor.
Willd. 1809. Enum. p. 377: g. Hexandr. Monogyn.
Link 1821. En. I. p. 331: g. Liliacear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 65. n. 1215; 1830. Gen. I. p. 257. n. 1340. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1108.
Rchb. 1828. Consp. p. 65. n. 1362; 1830. Fl. exc. p. 105; 1841. Nom. p. 48. n. 1775: g. Scillear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 105. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Link 1829. Hdb. I. p. 168: g. Hyacinthinar.
Dumort. 1829. Anal. fam p. 60: g. Hyacinthear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1120. p. 144; 1841. Ench. p. 83. — Meisn. 1842. Gen. p. 399 (302). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 303. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 304. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 155. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 215.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 129: g. Liliear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 18: g. Hyacinthinear.
Synon. Hyacinthi Linn. pars.

Hyacinthus Rupp. 1718. Fl. jen. p. 35. Ed. Hall. 1745. p. 35: g. pl. class. I.
Hyacinthus et Polianthes Linn.

Hyacinthus Linn. 1737. Gen. p. 96. n. 273; 1737. Cliff. p. 125: 1740. Syst. p. 21; 1748. Ups. p. 85; 1753. Sp. I. p. 316; 1759. Syst. ed. X. p. 984. n. 385; 1762. Sp. ed. II. p. 453; 1764. Gen. ed. VI. p. 170. n. 427; 1767. Syst. ed. XII. p. 247. n. 423: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 252 (*Hyacynthus*). — Murr. 1774. Syst. p. 276; 1784. Syst. p. 335. — Reich. 1778. Gen. p. 172. n. 461. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 225. n. 577. — Gmel. 1791. Syst. p. 560. — Pers. 1797. Syst. p. 357; 1805. Ench. I. p. 374. n. 828. — Willd. 1799. Sp. II. p. 166. n. 652. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 314.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 223. n. 928: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXIV. 524. 569. Sect.: Hyacinthus, Muscari.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Lilior.
Hill 1769. Ht. kew. p. 331: g. Monopetalar. incompletar.
Scop. 1777. Intr. p. 85: g. Liliacear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 234. — Eckl. 1827. Verz. p. 1.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 37. t. 12. f. 4 (serotinus).
Juss. 1789. Gen. p. 52: g. Asphodelor.
Neck. 1790. El. III. p. 185. n. 1544: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 173: g. Aloidear.
Batsch 1802. Tab. p. 136: g. Hyacinthinar.
Lois. 1822. Dict. v. 24. p. 92 (*Jacinthe*): g. Asphodelear.
= Hyacinthus et Muscari Tourn., Uropetalum Ker et Agraphis Link

Hyacynthus Scop. vid. *Hyacinthus Linn.*

Hyaenanche Lambert 1797. Cinchon. p. 52. t. 10.
Pers. 1807. Ench. II. p. 627. n. 2263: g. Dioec. Dodecandr.
Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 64: g. Euphorbiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 194. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 40.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5067: g. Ricinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 518.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 710. n. 3580: g. Tricoccar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 282; 1841. Nom. p. 195. n. 7444: g. Buxear. (genuinar.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5876. p. 1124; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 344 (255). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Euphorb. p. 565: g. Hyaenanchear.
Synon. Toxicodendrum Thunb.: Toxicodendron Spreng.

*) Conf. Beckmann Lex. bot. p. 110.

Hyaenancheae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 565: div. Euphorbiacear. biovulatar. Gen.: Hyaenanche.

Hyala L'Herit. mss.
= Polycarpaea Lam.

Hyalaea*) DC. 1837. Prodr. VI. p. 565: sect. Centaureae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871*a*. p. 472; 1841. Ench. p. 246 (*Hyalea*). — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 685 (*Hyalea*).
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 1 *a*: subsect. Haplolepideae.

Hyalaena Müll. vid. *Hyalolaena Bunge*.

Hyalea Endl., Ledeb. vid. *Hyalaea DC.*

Hyalea Jaub. & Spach 1847. Ill. pl. or. t. 214: nov. g. a Centaurea disjunctum. (C. Olivieri DC.)
C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 422: g. Centauriear.

Hyalina Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 58. 88: nov. g. Fucor. (H. mutabilis.)
Desmarestia Lamx.

Hyalis Salisbury 1812. Trans. hort. soc. I. p. 317: nov. g. Gladiolear. (Ixia capillaris, lancea, etc.)
Ixia Linn.

Hyalis Don 1835 in Hook. Bot. Mag. Comp. I. p. 108: nov. g. Mutisiear. (H. argentea.)
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 28: g. Eumutisiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2919. p. 484; 1841. Ench. p. 248. — Meisn. 1839. Gen. p. 230 (142).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 10: g. Stāhelinear.
Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3788: g. Chuquiragear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: g. Barnadesiear.

Hyalisma Champion 1846. Calcutta journ. VII. p. 466.
Miers . . . . Linn. Trans. XXI. p. 49; 1851. Ann. and Mag. 2d. ser. VII. p. 327: g. Sciaphilear. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 918.

Hyalochlamys A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 101: nov. g. Angianthear. (H. globifera.) — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 263.

Hyalodiscus Ehrenb. 1845. Ber. Berl. Akad. p. 71. 78: nov. g. Naviculaceor., Craspedodisco aff.
Cyclotella Kütz.?

Hyalolaena Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 128; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 304: nov. g. Angelicear.
Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 70 (*Hyalaena*): g. Seselinear.

Hyalolepis DC. 1837. Prodr. VI. p. 149: nov. g. Angianthear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2712. p. 442; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 217 (137). — Fenzl 1839. Flora II. p. 726. — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3518. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712. — A. Gray 1851 in Hook. Kew gard. misc. III. p. 97.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 25: g. Gnaphaliear.

Hyalolepis Kunze 1850. Linnaea XXIII. p. 258: nomen aptius pro *Hymenolepide* propositum.

Hyalopus Corda 1838. Icon. Fung. II. p. 16; 1840. IV. p. 29; 1842. V. p. 15; 1842. Mycol. p. 58: nov. g. Stilbinor. — Par. Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 76.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Stilbaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Stilbeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 80: g. Acmosporiaceor.

Hyalosira Kütz. 1844. Bacill. p. 25; 1845. Phycol. germ. p. 109; 1849. Sp. Alg. p. 115. n. 66: g. Striatellear. — Par. Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 95.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 41: g. Achnanthear.

Hyalosperma Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 476: nov. g. Helichrysear. (H. strictum.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 242.

Hyalostemma Wallich 1831. Catal. n. 6434: nov. g. Miliusae proximum.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 439.
Meisn. 1837. Gen. p. 4 (6): g. Anonacear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4729. p. 835; 1841. Ench. p. 423 (dubium). — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 496. — Walp. 1842. Rep. I. p. 91.
Rchb. 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7303: g. Cardiopetalear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 302: g. Myristicacear.
= Miliusa Lesch.

Hyalotheca Ehrenb. 1840. Ber. Ak. Berl. p. 212: g. Bacillarior. (Desmidium cylindricum et mucosum.)
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 140; 1849. Sp. Alg. p. 187. n. 137: g. Desmidiear. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 58.
Synon. Gloeoprium Ralfs.

Hyas Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 61: g. Nayear., pro *Caulinia* substitutum.
Caulinia Willd.

Hybantheae Rchb. 1837. Handb. p. 261; 1841. Nomencl. p. 187: sect. Ionidiear. Gen.: Hybanthus.

Hybanthera*) Endl. 1833. Prodr. fl. Norf. p. 59: nov. g. Asclepiadear. (H. biglandulosa.) — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verur.)
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 159: g. Asclepiear.

*) ὕαλος, crystallum, vitrum.

*) ὑβός, gibbus.

Hybanthera Endl. cont.
Endl. 1838. Gen. n. 3444. p. 589; 1841. Ench. p. 298: g. Astephanear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 266 (174). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4994. (genuinar.)
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear.
Decne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 612: g. Pergulariar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Stapeliar.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 490: g. Pergulariear.

Hybanthus*) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 77. t. 75: nov. g. Pentandr. Monogyn. (H. havanensis.) *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 84.
Scop. 1777. Intr. p. 291: g. Columniferar.
Neck. 1790. El. III. p. 64. n. 1386: g. Axonophytor.
Spreng 1818. Anl. II. 2. p. 827; 1825. Syst. I. p. 805. n. 897: g. Ionidior.
R. Brown 1818 in Tuck. Congo p. 440 (Verm. bot. Schr. I. p. 220): g. Violear. — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 385. — Kunth 1824. Syn. III. p. 304. — DC. 1824. Pr. I. p. 311. — Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4889. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 191. n. 966. — Bartl. 1830. Ord. p. 284. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 339. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 497. — Meisn. 1837. Gen. p. 20 (18). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575 (*Hibanthus*). 838.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Ionidiear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187. n. 7142: g. Hybanthear.
A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 100: g. Violariear.
= Ionidium Vent.? (Endl.)

Hybiscus Dumort. vid. *Hibiscus Linn.*

Hybothya Endl. 1847. Syn. Conif. p. 275; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 12. n. 1816/$_{11}$: g. Cupressinear. foss.

Hybotropis**) E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 14: sect. Pelecynthidis. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6460 *b*. p. 1261; 1841. Ench. p. 667. — Rchb. 1841. Nom. p. 151. n. 5898. 2. — Walp. 1842. Rep. I. p. 580.

Hybridella Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 12; 1821. Dict. v. 22. p. 86; 1825. v. 38. p. 17: nov. g. Milleriear. (Anthemis globosa Ort.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2709. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 237; 1830. v. 60. p. 577: g. Sigesbeckiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 141: g. Helianthear.
= Chiliophyllum DC.

*) Nomen a florum gibbo.
**) ὕβος, gibber.

Hydastylis Salisbury 1812. Trans. hort. soc. I. (1815) p. 310: nov. g. Witsenear. (Marica californica Ker.)
= Cipura Aubl.?

Hydatica*) Necker 1790. Elem. bot. II. p. 387. n. 1205: nov. g. Ypsoophytor., a Saxifraga L. disjunctum.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 530: g. Saxifragear. (S. stellaris L.)
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: g. Dicerocarpear.
Tausch 1823. Hort. Canal. fasc. I: sect. Saxifragae. (S. punctata, sarmentosa, umbrosa.) — Par. Seringe 1830 in DC. Pr. IV. p. 41. — Koch 1836. Syn. p. 271. Ed. II. p. 299. — Endl. 1839. Gen. n. 4634 *g*. p. 815; 1841. Ench. p. 408. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 567. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 215. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 638.
Synon. Sekika Kämpf., Med.; Robertsonia Haw.; Aulaxis Haw.; Diptera Borckh.; Ligularia Duval; Gynopera G. Don.

Hydatica Artis 1825. Antedil. Phyt. t. 1: nov. g. pl. foss. *Cf.* Flora 1827. I. p. 131.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 259; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIX: g. incertae sedis.
= Bechera Sternb.?

Hydatiphora Agardh 1821. Aphor. g. 98: g. Confervoidear.

Hydna Linn. 1737. Gen. p. 327. n. 807: g. Fungor.
= Hydnum Linn.

Hydnacei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 325 (p. 271 *Hydnei*): ordo Hymenomycetum. Gen. Hydneor. Fries 1838. (Mucronia loco Kneiffiae.)

Hydnangium Wallr. mss. . . . . in Dietr. Fl. boruss. p. 465.
Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 336: g. Hymenogasterum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 28; 1842. Mycol. p. 114: g. Hymenangiaceor.
L. R. &. Ch. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 376: g. Lycoperdaceor.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 249: g. Hymenogastereor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 242.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Hypogaeor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 436: g. Hymenogastreor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: g. Hysterangieor.
Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 36: sect. Octavianiae.
Bail 1858. Syst. p. 9. t. 27: g. Euhymenogastreor.

Hydneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: trib. Agaricinear. Gen.: Hydnum, Sistotrema.
Math. 1853. Belg. II. p. 321: sect. Agaricear. Gen. ead.

*) ὕδωρ, ὕδατος, aqua.

Hydnei Fries 1825. Pl. homon. p. 80: subordo Pileator. Gen.: Fistulina, Hydnum, Sistotrema, Irpex, Radulum.
Rchb. 1828. Consp. p. 13: div. Hymeninor. Subdivis.: Auricularii, Radularii.
Endl. 1836. Gen. p. 39; 1841. Ench. p. 21: trib. Pileator. Gen. ut Fries 1825 et Gyrolophium.
Fries 1838. Epicr. p. 504. 605: ordo Hymenomycetum. Gen.: Fistulina, Hydnum, Hericium, Sistotrema, Irpex, Radulum, Phlebia, Grandinia, Odontia, Kneiffia. *Cf. Hydnacei Fries.*
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 51: fam. Hymenomycetum. Gen.: Hydnum. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 167. Gen.: Grandinia, Radulum, Irpex, Sistotrema, Hericium, Odontia, Hydnum. — Bail 1858. Syst. p. 22 Gen. ex Bonord.
Rchb. 1841. Nom. p. 11: subdiv. Agaricinor. Gen. ut Endl. et Hypochnus, Cyphella, Guepinia, Corticium, Midotis, Cora, Auricularia, Stereum, Thelephora, Craterella.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 42; 1842. Mycol. p. CV. 176: fam. Basidiophoror. Gen.: Grandinia, Odontia, Irpex, Radulum, Hydnum, Systotrema.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 400: subsect. Pileator. Gen. ut Corda 1842 et Hericium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: subordo Hymenomycetum. Gen. ut Fries 1838.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: sect. Idiomycetum. Gen. ex Fries et Cymatoderma.

Hydnideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 597. 650: div. Hymenothecear. Gen.: Hydnum, Dentinum, Auriscalpium, Steccherinum, Odontia, Hericium.

Hydnobolites L. R. & Ch. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 378: nov. g. Lycoperdaceor. (H. cerebriformis.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Tuberaceor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491. — Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 60. (genuinar.) — Bail 1858. Syst. p. 44.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 438: g. Tubercor.

Hydnocarpus Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 288. t. 60. f. 3: nov. g. pl. flore incognito. (H. venenata.)
Vahl 1794. Symb. III. p. 100. (Char.)
Willd. 1805. Sp. IV. p. 1105. n. 1909: g. Polygam. Dioec.
Pers. 1807. Ench. II. p. 616. n. 2217: g. Dioec. Pentandr.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 665; 1825. Syst. II. p. 792. n. 878: g. Rhamnear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 90.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXV. 325. n. 955: g. Pentandr. Monogyn.
DC. 1824. Pr. I. p. 257: g. Kiggelariear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 280. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 293. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). — Rchb. 1837. Hdb. p. 267. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 133.

Hydnocarpus Gärtn. cont.
Juss. 1825. Dict. v. 38. p. 50: g. Passiflorear.?
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX: g. Flacourtianear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 30.
Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4884: g. Flacourtiear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 189. n. 955. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 574 (*Hydrocarpus*). 835.
Blume 1833. Nov. fam. expos. (Tijdschr. v. nat. Geschied. I. p. 132); 1848. Rumphia IV. p. 21; 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 14: g. Pangiear. — Par. Benn. 1838 in Horsf. Pl. jav. rar. p. 207. — Rchb. 1841. Nom. p. 186. n. 7136. — Walp. 1846. Rep. V. p. 58b. — Clos 1855. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 364; 1857. ibid. VIII. p. 267. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 230.
Endl. 1838. Gen. n. 5085. p. 922; 1841. Ench. p. 480; 1850. Spl. V. p. 47: g. Pangiacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 324.
Synon. Marotti Rheede; Munnicksia Dennst.

Hydnocaryon Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 860: g. Pyrenomycetum astomor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 27; 1842. Mycol. p. 112: g. Tuberacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
= Genea Vittad.?

Hydnocystis Tulasne 1845. Giorn. bot. it. ann. I. Vol. I. P. 1. p. 59.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 438: g. Tubercor.
Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 54: g. Tuberaceor. (genuinor.) — Par. Bail 1858. Syst. p. 43.

Hydnoideae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): fam. Hymenosporangiar. Sect.: Telephorea, Hydnoidea.

Hydnoidei Pers. 1801. Syn. Fung. p. XVII: div. Hymenothecior. Gen.: Sistotrema, Hydnum.
Leman 1817. Dict. v. 8. p. 105: subsect. Hymenothecar. Gen. ead.

Hydnophytum Jack 1823. Linn. Trans. XIV. 1. p. 124: nov. g. Rubiacear. (H. formicarum.) *Cf.* Flora 1823. II. Beil. p. 96 (*Hydrophytum*), Isis 1825. p. 77 et Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 472 (sub *Mirmecodia*). — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 955. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 91. n. 448 (*Hydrophytum*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 459 (*Hydrophytum*).
Schult. 1827. Mant. III. p: 7. 114: g. Tetrandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2018 (*Hydrophytum*): g. Coffeacear.
DC. 1830. Pr. IV. p. 450: g. Guettardear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 547. — Meisn. 1838. Gen. p. 165 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2835. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3185. p. 539; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear.

Hydnophytum Jack cont.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Guettardidar.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 308: g. Coffeinear.
Synon. Nidus germinans formicarum nigrarum. (Rumph.)

Hydnora Thunb. 1775. Vetensk. Ac. Handl. p. 69. t. 2; 1777. ibid. p. 144. t. 4; 1781. Nov. gen. I. p. 22: nov. g. Monadelph. Monogyn. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 91.
Thunb. 1800. Prodr. II. p. 110. 192: g. Monadelph. Triandr.
Agdh. 1821. Aphor. p. 88: g. Hydnorinar.
Seringe 1825. Mém. Genèv. III. 1. p. 25: g. Cucurbitaceis aff.
E. Meyer 1833. Nov. Act. Leop. XVI. 2. p. 773. 781. t. 58. 59: g. Asarinear.
Endl. 1836. Gen. n. 724. p. 75; 1841. Ench. p. 53: g. Cytinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 60. n. 2327. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 367 (275). — Griff. 1842. Linn. Trans. XIX. p. . . . . (Ann. sc. nat. 3e sér. VII. p. 320.)
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 551: g. Eucytinear.
R. Brown 1842. Linn. Trans. XIX. p. 245 (Flora 1848. II. p. 539): g. Hydnorear. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 513.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 91: g. Cytinacear.
Synon. Aphyteia Linn.

Hydnoreae Rchb. 1837. Handb. p. 164: div. Cytinear.
R. Brown 1842. Linn. Trans. XIX. p. 244: trib. Rafflesiacear. Gen.: Hydnora. *Cf.* Flora 1848. II. p. 539. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 698. Gen. id. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 513. Gen. id.

Hydnorinae Agardh 1821. Aphor. p. 88; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: ordo Fungor. Gen.: Hydnora. Accedit 1826 (Aphor. p. 243) Rafflesia.

Hydnostachyon Liebm. 1850. Vid. Medd. nat. Foren. p. 23: nov. g. Orontiacear.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 502: g. Orontiear.

Hydnotrema Link 1833. Handb. III. = Sistotrema Pers.

Hydnotria Tulasne 1851. Fungi hypogaei p. 127.
Zobel 1854 in Corda Ic. Fung. VI. p. 61. t. 15: g. Tuberaceor. (genuinor). — Par. Bail 1858. Syst. p. 45.
Conf. seq.

Hydnotrya Berkeley & Broom 1846. Ann. and. Mag. n. h.
Conf. praeced.

Hydnum*) Linn. 1740. Syst. p. 32; 1742. Gen. ed. II. p. 509. n. 968; 1753. Sp. II. p. 1178; 1759. Syst. ed. X. p. 1350. n. 1076; 1763. Sp. ed. II. p. 1647; 1764. Gen. ed. VI. p. 568. n. 211; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 724: g. Fungor. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 471. — Murr. 1774. Syst. p. 822; 1784. Syst. p. 978. — Reich. 1778. Gen. p. 563. n. 1327. — Roth 1788. Germ. I. p. 539. — Juss. 1789. Gen. p. 4. — Lour. 1790. Coch. II. p. 693. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 769. n. 1676. — Gmel. 1791. Syst. p. 1438. — Gis. 1792. Prael. p. 618. — Mönch 1794. Meth. p. 775. — Pers. 1797. Syst. p. 1017. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 22. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 25. 350. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 10. — Link 1809. Berl. Mag. III. p. 39 (primae seriei). — Leman 1821. Dict. v. 22. p. 91.
Scop. 1777. Intr. p. 361: g. Fungoidear. — Par. Wigg. 1780. Holsat. p. 104.
Pers. 1797. Tent. p. 29: g. Hymenothecii.
Pers. 1801. Syn. p. XVII. 554: g. Hydnoideor. Sect.: Odontia, Hericium. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 377. — Leman 1817. Dict. v. 8. p. 105.
Batsch 1802. Tab. p. 269: g. Fungoideor.
DC. 1805. Franç. II. p. 107; 1815. V. p. 35: g. Gymnocarpor. Sect.: Hericium, Odontia, Hydnum, Systotrema.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 51: g. Hymenothecior.
Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 131; 1818. II. p. 269.
Nees 1816. Syst. p. 231; 1817. Ueberbl. p. 60: g. Pileator. Sect.: Gymnopus, Russula, Omphalium, Mycena, Pleuropus et Apus, Resupinatum, Hericium. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 454. — Fries 1821. Syst. myc. I. p. 397; 1828. Elench. I. p. 129. Tribus: Mesopus, Pleuropus, Merisma, Apus, Resupinatus. — Agdh. 1821. Aphor. p. 86. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 961. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 479. n. 3474; 1831. Gen. II. p. 764. n. 3903.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 19: g. Boletor.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 650: g. Hydnidear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 83: g. Hymenacear.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 578: g. Agaricear.
Pers. 1825. Myc. eur. II. p. 155: g. Odontodermeor. Sect.: Tremellodon, Apus, Odontia.
Fries 1825. Pl. homon. p. 81; 1838. Epicr. p. 505: g. Hydneor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 442. p. 39; 1841. Ench. p. 21. Sect.: Erinaceus, Apus, Hericium, Bidona. — Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 51; 1842. V. p. 42. 82; 1842. Mycol. p. 178. — — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 473. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 404. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 168. — Bail 1858. Syst. p. 23. t. 29.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 182: g. Agaricinor.

*) ὕδνον Graecis tuber terrae.

Hydnum Linn. cont.

Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 333: g. Radularior.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: g. Hydnear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 322. Sect.: Radulum, Hypnois.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 94: g. Orthomycetum.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 610: g. Hymenomycetum gymnosporor.

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 326 g. Hydnaceor.

Synon. Hydna Linn. 1737: Echinus Hall.; Martela Adans. pt.; Somion Adans.; Hericius Juss.; Dentinum et Auriscalpium Gray; Steccherinum Mich.; Steecherina Gray.

Hydracanthus Kütz. 1847. Flora II. p. 774: nov. g. Ulvacear. (in Spec. Alg. 1849 non commemoratum.)

Hydrales Lindl. 1833. Nix pl. p. 34: nixus Epigynar. Ordo: Hydrocharideae.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 140: nixus Endogenar. Ord.: Hydrocharidaceae, Naiadaceae, Zosteraceae.

Hydrangea*) „Gronov." Linn. 1737. Coroll. p. 7. n. 956; 1740. Syst. p. 23; 1742. Gen. ed. II. p. 193. n. 435; 1753. Sp. I. p. 397; 1759. Syst. ed. X. p. 1025. n. 492; 1762. Sp. ed II p. 568; 1764. Gen. ed. VI. p. 222. n. 557 (*Hydrangia*); 1767. Syst. ed. XII. p. 302. n. 551: g. Decandr. Monogyn. — Par. Gron. 1743. Fl. Virg. p. 50. — Murr. 1774. Syst. p. 341; 1784. Syst. p. 410. — Reich. 1778. Gen. p. 227. n. 604. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 299. n. 760. — Gmel. Syst. p. 703. — Pers. 1797. Syst. p. 439; 1805. Euch. I. p. 486. n. 1107. — Willd. 1799. Sp. II p. 633. n. 883; 1809. En. p. 457. — Elliott 1817. Sketch I. p. 509. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 284.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 94. n. 387: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 105.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.

Adans. 1763. Fam. II. p. 244: g. Portulacar.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Succulentar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 315.

Scop. 1777. Intr. p. 224: g. Nomadear.

Walt. 1788. Carol. p. 54. 251. n. 408: g. Polygam. Monoec.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 150. t. 30. f. 7 (arborea).

Juss. 1789. Gen. n. 310: g. Saxifragis aff. Sejungitur Hortensia. — Simil. St. Hil. 1805 Expos. II p. 132. — Court 1828. Syll. Ratisb II. p. 38

Neck. 1790 El. II. p. 386. n 1202: g. Ypsoophytor.

*) ὕδωρ, aqua; ἄγγος, vas.

Hydrangea Gronov. cont.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 280: g. Saxifragear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 29. — Hedw. 1806. Gen. p. 327. n. 1289. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 649; 1825. Syst. II. p. 360. n. 1690; 1830. Gen. I. p 374. n. 1890 — Poir. 1821 Dict. v. 22. p. 99. — Link 1821. En. I. p. 411; 1831. Hdb. II. p. 40. — D. Don 1825. Nepal. p. 211. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 920. — Sieb. 1829. Nov. Act. Leop. XIV. p. 686. (Spec. japan.) — Dietr. 1840. Syn. II. p 1382. 1525.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L; 1828. Consp. p. 159. n. 4216: g. Cunoniacear. Sect. (1828): Hydrangea, Hortensia. — Par. Nees 1828. Syll. Ratisb. II. p. 47.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Hydrangeacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 313. — Meisn. 1838. Gen. p. 137 (100). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 570. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 720.

DC. 1830. Pr. IV. p. 13: g. Hydrangeear. — Par. Sieb & Zucc. 1835. Fl. japon. I. p. 101. t. 51—64. — Rchb. 1837. Hdb. p. 230. — Duch 1849 in Orb. Dict. VI. p. 734.

G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 232: g. Hydrangear. — Par. Spach 1835. Vég. phan. V. p. 21. — Endl. 1839. Gen. n. 4668. p. 820; 1841. Ench. p. 409. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 591. — Rchb. 1841 Nom. p. 158. n. 6164. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 101.

Synon. Peautia Comm.; Hortensia Juss.; Primula Lour.

Hydrangeaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 38: fam. Saxifragariear. Gen.: Hydrangea, Deutzia.

Bartl. 1830. Ord. p. 313: div. Cunoniacear. Gen.: Hydrangea.

Meisn. 1838. Gen. p. 137 (100): trib. Saxifragacear. Gen.: Hydrangea, Cornidia, Cyanitis, Adamia, Broussaisia.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 569: ordo Saxifragalium. Gen. Hydrangear. Endl. 1841.

Hydrangeae Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 53: trib. Saxifragacear. Gen.: Sarcostyles. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 206. 232. Gen. Hydrangeear. DC. (Cornidia loco Sarcostylis) exclusa Deutzia. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p 398. Gen. ut Endl. 1841.

Spach 1836. Vég. phan. V. p. 5. 19: trib. Cunoniacear. Gen.: Decumaria, Hydrangea, Sarcostyles, Cyanitis, Adamia, Broussaisia?

Endl. 1839. Gen. p. 820: subordo Saxifragacear. Gen.: Hydrangea, Platycrater, Schizophragma, Cornidia, Adamia; Broussaisia. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1416 et Ench. p. 409) Cardiandra, Jamesia.

Rchb. 1841. Nom. p. 158: subdiv. Saxifragariar. Gen. ut Endl. 1841.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 107: trib. Saxifragear. Gen.: Hydrangea.

Hydrangeeae DC. 1830. Prodr. IV. p. 13: trib. Saxifragacear. Gen.: Hydrangea, Sarcostyles, Cianitis, Adamia, Deutzia, Broussaisia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 230: subdiv. Saxifragariar. Gen. ead.

Hydrangia Linn. 1764 vid. *Hydrangea Linn.*

Hydrangieae Sieb. & Zuccar. 1835. Fl. japon. I. p. 17. 58. 62.
= Hydrangeeae DC.

Hydranthelium*) HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 202. t. 646: nov. g. Scrophularinar. (H. callitrichoides.) — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 225.
Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 383. 415: g. Triandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3148: g. Antirrhinear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 43. n. 195: g. Personatar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 177.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 552: g. Gratiolear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3956. p. 684; 1841. Ench. p. 339. — Meisn. 1840. Gen. p. 309 (220). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4595. (genuinar.) — Walp. 1845. Rep. III. p. 297. 966.
Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 75. t. 287.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 425: g. Sibthorpiear.
Benth. 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Sibthorpear.
Conf. Willichia Mutis.

Hydranthema „Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol." Leman 1821. Dict. v. 22. p. 101: nov. g. a Conferva separatum. (C. atropurpurea, fucicola, ericetorum, setacea, aurea.)

Hydrastideae Torrey & A. Gray 1838. Fl. North-Am. I. p. 40: trib. Ranunculacear. Gen.: Hydrastis.

Hydrastis**) „Ell." Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1088. 1374. n. 1153; 1762. Sp. ed. II. p. 784; 1764. Gen. ed. VI. p. 283. n. 704; 1767. Syst. ed. XII. p. 381: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 432; 1784. Syst. p. 519. — Reich. 1778. Gen. p. 288. n. 762. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 379. n. 958. — Gmel. 1791. Syst. p. 883. — Pers. 1797. Syst. p. 556; 1807. Ench. II. p. 107. n. 1369. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1339. n. 1091. — Michx. 1803. Fl. am. I. p. 317. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 21. — Elliott 1821. Sketch II. p. 55.
Adans. 1763. Fam. II. p. 365: g. Anonar.
Gled. 1764. Syst. p. 122. n. 504: g. Thalamostemonum.

*) ἀνθήλιον, flosculus.

**) Nomen a similitudine cum Hydrophyllo, cui a Linnaeo primum adscripta erat.

Hydrastis Ell. cont.
Scop. 1777. Intr. p. 257: g. Polycarpiar.
Juss. 1789. Gen. p. 232: g. Ranunculacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 103. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 217. 338.
Neck. 1790. El. II. p. 311. n. 1086: g. Acascophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 47: g. Multisiliquosar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 486: g. Ranunculear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 732; 1827. Cur. post. p. 202; 1830. Gen. I. p. 461. n. 2273. — Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4936.
DC. 1818. Syst. I. p. 217; 1824. Pr. I. p. 23: g. Anemonear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 253. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 22. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (3). — Endl. 1839. Gen. n. 4777. p. 846; 1841. Ench. p. 434. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX (*Hydrostis*): g. Calthear.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452: g. Podophyllear.? — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 6 (8).
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7255: g. Actaeariar.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 40: g. Hydrastidear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 383: g. Actaeariear.
Synon. Warneria Mill.

Hydrastylis Steud. Nom. I. p. 780: lege *Hydastylis Salisb.*

Hydrelis Webb & Berth. 1836. Phyt. Canar. I. p. 6: sect. Leucobatrachii, generice forsan a Ranunculo distinguenda. (R. aquatilis.)
= Batrachium DC.

Hydrilla Rich. 1811. Mém. Inst. II. p. 61: nov. g. Hydrocharidear. — Par. Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 121. — Agdh. 1822. Aphor. p. 127.
Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 802: g. Stratiotear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: g. Elodeacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 112: g. Anacharidear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1208. p. 161; 1841. Ench. p. 95. — Rchb. 1841. Nom. p. 34. n. 1153. — Meisn. 1842. Gen. p. 366 (274). — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 81. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 234.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 142: g. Vallisnerear.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 509: g. Hydrocharacear.
Caspary 1857. Monatsber. Berl. Ak. p. 39; 1858. Ann. wiss. Bot. I; 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 425: g. Hydrillear.
Synon. Hydrospondylus Hassk.; Epigynanthus Blume.

Hydrilleae Caspary 1857. Monatsber. Berl. Ak. p. 39; 1858. Ann. wiss. Bot. I. H. 3; 1858. Ann. sc. nat. 4e sér. IX. p. 323: trib. Hydrocharidear. Gen.: Hydrilla, Elodea, Lagarosiphon.

= Anacharideae Endl.

Hydrobiae Rchb. 1828. Consp. p. 169: div. Haloragear. Gen.: Myriophyllum, Proserpinaca; Trapa.

Hydrobryum Endl. 1841. Gen. Suppl. I. n. 1831/₁. p. 1375; 1841. Ench. p. 155: nov. g. Podostemmear.

Rchb. 1841. Nom. p. 59. n. 2309: g. Podostemonear. — Par. Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 103; 1852. Arch. Mus. VI. p. 137. Sect.: Zeylanidium, Euhydrobryum. — Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 438. Sect. eaed. (*Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 785.)

Meisn. 1843. Comm. p. 356: g. Podostemear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 12.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 483: g. Podostemacear. — Par. Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 34. t. 1918.

Synon. Sphaerothylax Bisch.

Hydrocallis Planchon 1853. Ann. sc. nat. 3e sér. XIX. p. 47: sect. Nymphaeae. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 154.

Hydrocalyx Triana mss. olim.

Sarcophysa Miers.

Hydrocarides Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. I. p. 269. t. 26: fam. plant. Gen.: Vallisneria, Stratiotes, Hydrocharis, Nymphaea, Proserpinaca, Pistia.

Conf. Hydrocharides Juss.

Hydrocarpus Dietr. vid. *Hydnocarpus Gärtn.*

Hydrocaryes Link (1821. Enum. I. p. 141) 1831. Handb. II. p. 53: ordo 17 Perigynar. Gen.: Trapa.

DC. 1828. Pr. III. p. 63: trib. 6 Onagrear.? Gen. id. — Par. Koch 1836. Syn. p. 243. Ed. II. p. 269. Gen. id. — Meisn. 1838. Gen. p. 121 (87). Gen. id.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (50) Calyciflorar. (syncarpar.) — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 700. Gen. id.

Hydrocera Blume 1825. Bijdr. Nr. 5. p. 241: nov. g. Hydrocerear. (Impatiens angustifolia Bl. olim.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46.

Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 140: g. Balsaminear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 58 (42). — Rchb. 1837. Hdb. p. 294; 1841. Nom. p. 203. n. 7723. — Endl. 1840. Gen. n. 6061. p. 1174; 1841. Ench. p. 626. — Walp. 1842. Rep. I. p. 476. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 271.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 492: g. Balsaminacear.

Synon. Tytonia Don.

Hydroceratophyllon Vaillant 1719. Act. Ac. Paris. p. 16: nov. g. plant.

= Ceratophyllum Linn.

Hydroceratophyllum Wittst. vid. *praeced.*

Hydrocereae Blume 1825. Bijdr. Nr. 5. p. 241: fam. Geraniaceis, Balsamineis et Tropaeoleis aff. Gen.: Hydrocera. *Cf.* Blume 1833. Nov. fam. expos.; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 90.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: trib. Balsaminacear. Gen. id.

Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (125) Thalamiflorar. syncarpar.

Lindl. 1833. Nix. p. 16: ordo Geranialium.

Hydrochaeris GMS. vid. *Hydrocharis Linn.*

Hydrocharaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 335.

Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 507: ordo Helobiar. Gen.: Anacharis, Apalanthe, Nechamandra, Hydrilla, Egeria, Ottelia.

Hydrochareae Rchb. 1828. Consp. p. 46; 1837. Handb. p. 144; div. Hydrocharidear. Gen.: Hydrocharis, Cabomba, Hydropeltis, Flörkea. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 34. Subdivis.: Anacharideae, Vallisnerieae, Stratiotideae.

Hydrochariae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: ordo Calytepalar. Fam.: Hydrocharideae, Elodeaceae, Vallisneriaceae.

Hydrocharidaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 141: ordo Hydralium. Trib.: Vallisnereae, Stratioteae.

Hydrocharideae Vent. 1799. Tabl. II. p. 212: ordo 4 class. IV. Gen.: Stratiotes, Hydrocharis, Nymphea, Nelumbium. *Affinia:* Vallisneria, Hippuris.

Rchb. 1828. Consp. p. 45; 1830. Fl. exc. p. 13: fam. Helobiar. Divis.: Stratioteae, Hydrochareae, Nymphaeaceae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 144. Divis.: Stratioteae, Nepentheae, Nymphaeaceae. — Rchb. 1841. Nom. p. 34. Divis.: Hydrochareae, Nepentheae, Nymphaeaceae.

Hydrocharideae DC. 1805. Fl. franç. III. p. 265: fam. (23) emend. Monocotyledonum phanerogamar. Gen.: Hydrocharis, Stratiotes, Vallisneria. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 745. Trib. ut Endl.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 344. Ed. Nees p. 200: ordo Monocotyledonum. Gen.: Damasonium, Vallisneria. *Affinia:* Najas, Lemna, Chara. — Par. Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 268. Novum gen.: Hymenotheca.

Rich. 1811. Mém. Inst. II. p. 1. 55. Gen.: Elodea, Anacharis, Hydrilla, Vallisneria, Blyxa; Stratiotes, Enhalus, Ottelia, Limnobium, Hydrocharis. *Cf.* Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 119.

DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Endogenar. phanerogamar. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 219. Gen.: Hydrocharis, Stratiotes.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 65: fam. Caliciflorae. Gen.: Stratiotes, etc.

Agdh. 1822. Aphor. p. 127; 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 584: ordo Macropodar. Gen. §. 1: Trapa. §. 2: Elodea, Anacha-

Hydrocharideae DC. cont.
ris, Hydrilla, Vallisneria, Blyxa. §. 3: Stratiotes, Evhalus, Ottelia, Limnobium, Hydrocharis.
Link 1829. Hdb. I. p. 282: ordo (23) Endogenear. Gen.: Hydrocharis. — Par. Koch 1837. Syn. p. 668. Ed. II. p. 770. Gen.: Stratiotes, Hydrocharis, Udora et 1844 Vallisneria.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: fam. Hydrochariar. Trib.: Limnobieae, Stratioteae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed I. Clav.: ordo (231) Tripetaloidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 74: class. (XVIII.) Monocotyledonear. Ordo unicus (52): *Hydrocharideae*. Gen.: Hydrocharis, Limnobium, Damasonium, Stratiotes, Blyxa, Vallisneria, Anacharis, Elodea, Udora. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 2. Gen. ead. et Euhalus, Boottia, Saivala.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Homorganor. floriferor.
Lindl. 1833. Nix. p. 84: ordo unicus Hydralium.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 354.
Endl. 1837. Gen. p. 160; 1841. Ench. p. 94: ordo Ensatar. Trib.: Anacharideae, Vallisnerieae, Stratiotideae.
Meisn. 1842. Gen. p. 365 (273): ordo Helobiar. Trib. ut Endl.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 29: fam. Fluvialium. Gen. ut DC. 1805.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 416: fam. Aperispermear.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 185: fam. (139) Hydrocharidinar.

Hydrocharides Juss. 1789. Gen. p. 67: ordo 4 class. IV. Gen.: Vallisneria, Stratiotes, Hydrocharis, Nymphaea, Nelumbium, Trapa, Proserpinaca, Pistia.
Batsch 1802. Tab. p. 123: fam. Dialium. Gen.: Stratiotes, Vallisneria, Hydrocharis, Nymphaea, Nelumbium, Sarracenia, Nepenthes.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 262: fam. 21 plant. Gen.: Vallisneria, Hydrocharis, Stratiotes, Sagittaria; Nectris, Serpicula, Heteranthera, Proserpinaca, Alisma, Butomus, Damasonium, Actinocarpus, Limnocharis; Nymphaeeae.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. LXX: div. Tripetaloidear. Gen.: Stratiotes, Vallisneria, Hydrocharis, Trapa, Nymphaea.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 111: ordo Macropodar. Trib.: Trapeae, Anacharideae, Stratioteae.

Hydrocharidinae Leunis 1849. Schul-Naturg. II. p. 185: ordo (45) Symphysogynar. Fam.: Hydrocharideae.

Hydrocharis*) Linn. 1737. Gen. p. 308. n. 757; 1737. Cliff. p. 460; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. II. p. 1036; 1759. Syst. ed. X. p. 1295. n. 999; 1763. Sp. ed. II. p. 1466; 1764. Gen. ed. VI. p. 527. n. 1126; 1767. Syst. ed. XII. p. 657: g. Dioec. Enneandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 746; 1784. Syst. p. 890. — Reich. 1778. Gen. p. 523. n. 1231. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 695. n. 1535. — Pers. 1797. Syst. p. 932; 1807. Ench. II. p. 625. n. 2255. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 812. n. 1815; 1809. En. p. 1018. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 241. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 200. 296.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 301: g. Dicotyledonum Polystemonum.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 89. n. 366: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Musar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 76: g. Aristolochiar.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Palmis aff. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 31.
Hill 1769. Ht. kew. p. 418: g. Dioicear.
Scop. 1777. Intr. p. 96: g. Disparium.
Juss. 1789. Gen. p. 67: g. Hydrocharidum. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 123. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 170. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 264; 1825. Syst. II. p. 273. n. 1535.
Neck. 1790. El. III. p. 379. n. 1819: g. Daphonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 654: g. Enneandr. Hexagyn. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 178.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 214: g. Hydrocharidear. — Par. DC. 1805. Franç. III. p. 265. — Rich. 1811. Mém. Inst. II. p. 67; 1811. Ann. Mus. XVII. p. 248. — Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 121. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 220. — Link 1822. En. II. p. 429; 1829. Hdb. I. p. 282. — Agdh. 1822. Aphor. p. 127. — Lois. 1824. Dict. v. 32. p. 564 (*Morène*). — Spreng. 1830. Gen. I. p. 330. n. 1678. — Rchb. 1830. Fl. exc. p. 14. — Bartl. 1830. Ord. p. 76. — Koch 1837. Syn. p. 668. Ed. II. p. 771. — Kunth 1838. Berol. II. p. 233. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 29. — Spach 1846. Vég. phan. X. p. 4.
GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 400. 432 (*Hydrochaeris*).
Bosc 1807. Ann. Mus. IX. p. 396 c. ic. (H. spongia.)
Wahlenb. 1806. Suec. II. p. 655: g. Tripetaloidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 46. n. 810: g. Hydrocharear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: g. Limnobiear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 112: g. Stratiotear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 365 (273). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 142. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 238.
Endl. 1837. Gen. n. 1216. p. 163; 1841. Ench. p. 45: g. Stratiotidear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 34. n. 1161. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 45. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 306.
Synon. Microleuconymphaea Boerh.; Morsus ranae Tourn.; Stratiotes Dill.

*) ὑδροχαρής, aquis gaudens.

Hydrochloa Palis. 1812. Agrost. p. 135: nov. g. Graminear. (Zizania natans Michx.)
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 75: g. Olyrear.
Trin. 1820. Fund. p. 205: g. Monoec. Hexandr.
Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 958; 1841. Nom. p. 36. n. 1252: g. Oryzear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Endl. 1836. Gen. n. 731. p. 78; 1841. Ench. p. 56. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Oryzaceur.
Trin. 1839. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. Bot. p. 185: g. Oryzeor.
Synon. Hydropyrum Link; Melinum Link.

Hydrochloa Hartm. 1819. Gram. suec. p. 8.
= Glyceria R. Brown.

Hydrochloa Link 1827. Hort. Berol. I. p. 173; 1829. Handb. I. p. 70: g. Glycerinar.
Endl. 1837. Gen. n. 878*b*. p. 99; 1841. Ench. p. 59: sect. Glyceriae. (Poa aquatica L.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1385. 2. — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 77.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 434: sect. Festucae. (Glyceria distans et maritima.) — Par. C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 410.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Conf. Exydra Endl.

Hydroclathrus Bory 1826. Dict. class. VIII. p. 419.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 144; 1849 in Orb. Dict. X. p. 56: g. Dictyotear. — Par. Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 138; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 330. (Flora 1843. p. 93.)
Endl. 1843. Spl. III. p. 26. n. 98*c*.: sect. Asperococci. — Par. J. Agdh. 1848. Sp. Fuc. p. 75.
Zanard. 1843. Classif. p. 10: g. Asperococcear.
Harv. 1852. Ner. bor. am. I. p. 119: g. Dictyotacear.
= Encoelium Agdh.

Hydrocleis*) Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 797: g. Alismear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: g. Butomear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 74. — Kunth 1841. Enum. III. p. 165. — Rchb. 1841. Nom. p. 34. n. 1147. — Meisn. 1842. Gen. p. 365 (273). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 29. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 8.

Hydrocleis Rchb. cont.
Endl. 1837. Gen. n. 1045. p. 129; 1841. Ench. p. 73: g. Butomacear. — Par. A. Rich. 1842 in Orb. Dict. II. p. 787. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 208. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 115.
Hydrocleys Comm.

Hydrocleys „Comm. mss." Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 373: nov. g. Butomear. (H. Commersonii.)
Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 154: g. Alismacear.
Synon. Hydrocleis Rchb.; Vespuccia Parlat.

Hydrococceae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 85; 1843. Phycol. gener. p. 159. 177; 1845. Phycol. germ. p. 154: fam. Chamaephycear. Gen.: Actinococcus, Entophysalis, Hydrococcus, Hydrurus, Palmodactylon. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 59. Gen.: Hydrococcus, Hydrurus. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 231. Gen.: Palmophyllum, Hydrococcus, Hydrurus, Gomphosphaeria, Palmodictyon, Palmodactylon, Gloiodictyon?
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 16. 71: subtrib. Hydrurear. Gen.: Actinococcus, Entophysalis, Hydrococcus.
Math. 1853. Belg. II. p. 521: trib. 24 Algar. Gen.: Hydrurus.

Hydrococcus Link 1833. Handb. III. p. 268.
= Undina Fries.

Hydrococcus Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 380: nov. g. Algar. (H. rivularis.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 366.
Menegh. 1838. Cenni p. 26: g. Nostochinear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 584: g. Nostochinar. genuinar.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 85; 1843. Phyc. gener. p. 177; 1845. Phyc. germ. p. 154; 1849. Sp. Alg. p. 231. n. 175: g. Hydrococcear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 60. — Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 73.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 70: g. Hydrurear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: g. Coccochlorear.
= Oncobyrsa Agdh. pt.

Hydrocoleum Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 86; 1843. Phycol. gener. p. 196; 1845. Phycol. germ. p. 164; 1849. Sp. Alg. p. 258. n. 184: g. Oscillariear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 78: g. Oscillatorinar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.

Hydrocoryne „Schwabe" Spreng. 1827. Syst. IV. p. 373. n. 3446: nov. g. Tremelloidear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 86.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 13: g. Myxophysalidum.
Endl. 1836. Gen. n. 35. p. 4; 1841. Ench. p. 3: g. Nostochinar.

*) ὑδρίς, clavis.

Hydrocoryne Schwabe cont.
Menegh. 1838. Cenni p. 27: g. Rivulariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 597.
Endl. 1843. Spl. III. p. 16. n. 41: g. Chaetophorear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Chaetophoridar.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 70: g. Hydrurear.

Hydrocotile Necker vid. *seq.*

Hydrocotyle*) Tourn. 1700. Inst. p. 328. t. 173: g. pl. class. VII.
Linn. 1737. Gen. p. 70. n. 200; 1737. Cliff. p. 88; 1740. Syst. p. 20; 1753. Sp. I. p. 234; 1759. Syst. ed. X. p. 953. n. 288; 1762. Sp. ed. II. p. 338; 1764. Gen. ed. VI. p. 127. n. 325; 1767. Syst. ed. XII. p. 202. n. 322: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 224; 1784. Syst. p. 270. — Reich. 1778. Gen. p. 132. n. 355. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 178. n. 457. — Gmel. 1791. Syst. p. 467. — Pers. 1797. Syst. p. 287. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1360. n. 519; 1809. En. p. 299. — Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 23. t. 245—248. (reform.) — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 187. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 88.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 425: g. Umbelliferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Crantz 1767. Cl. Umbell. p. 119. (deliquesc.) — Scop. 1777. Intr. p. 116. — Juss. 1789. Gen. p. 226. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 36. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 481. (anomalar.) — DC. 1805. Franç. IV. p. 357. (anomalar.) — Lois. 1821. Dict. v. 22. p. 156. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 101. (Divis. 1.) — Link 1821. En. I. p. 261. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 507. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 21. — Kunth 1824. Syn. III. p. 101. — D. Don 1825. Nepal. p. 182. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 882. — Bartl. 1830. Ord. p. 236. (descisc.) — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 639. — Molkenb. 1851. Pl. Jungh. I. p. 89. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 82.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 275: g. pl. class. XII.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 51. n. 196: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Lour. 1790. Coch. I. p. 177. — Gis. 1792. Prael. p. 508. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 301. n. 672. — Hedw. 1806. Gen. p. 190. n. 783. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 176. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 163. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 14. 297.

Hydrocotyle Tourn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 100: g. Sphondylior.
Hill 1769. Ht. kew. p. 76: g. Aggregatar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 95. t. 22. f. 5 (asiatica et Solandra).
Neck. 1790. El. I. p. 178. n. 298 (*Hydrocotile*): g. Scadiophytor.
Thunb. 1798. Diss. de Hydroc. *Cf.* Schrad. Journ. 1799. II. p. 143.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 629; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXII. 344; 1825. Syst. I. p. 874. n. 1034; 1830. Gen. I. p. 220. n. 1134: g. Hydrocotylinar. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 315.
A. Rich. 1820. Ann. sc. phys. VI. p. 145. (Monogr.)
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 144: g. Hydrocotylinear. — Par. Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 412.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3763; 1832. Fl. exc. p. 481; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 142. n. 5502: g. Hydrocotylear. Sect. (1841) ex DC. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34. — DC. 1830. Pr. IV. p. 59. Sect.: Euhydrocotyle, Centella. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 248. Sect. eaed. — Tausch 1834. Flora I. p. 354. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 366. — Koch 1836. Syn. p. 279. Ed. II. p. 307. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 330. — Meisn. 1838. Gen. p. 140 (102). — Kunth 1838. Berol. I. p. 260. — Endl. 1839. Gen. n. 4355. p. 763; 1841. Ench. p. 377. Sect. ut DC. et (1850. Spl. V. p. 1) Diposis. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 926. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 173. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 599. — Brongn. 1843. En. genr. p. 110. — Walp. 1843. Rep. II. p. 381. — Bunge 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 282. — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 234. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 751. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 731. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 58.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Hydrocotylidar.

Hydrocotyleae Rchb. 1828. Consp. p. 144: sect. Bolacear. Gen.: Hydrocotyle, Chondrocarpus, Crantzia, Erigenia, Trisanthus?, Spananthe, Bowlesia, Drusa?, Micropleura, Pozoa, Asteriscus?, Siebera, Mulinum, Bolax, Azorella, Pectophytum, Fragosa?
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: trib. Didiscospermar. Gen.: Hydrocotyle, Trachymene, Didiscus.
DC. 1830. Pr. IV. p. 58: trib. Orthospermar. Gen.: Hydrocotyle, Crantzia?, Dimetopia, Erigenia, Micropleura, Didiscus, Trachymene, Astrotricha, Xanthosia, Bowlesia, Fragosa, Azorella, Pectophytum. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 248. Gen. ead. — Koch 1836. Syn. p. 279. Ed. II. p. 307. Gen.: Hydrocotyle. — Meisn. 1838. Gen. p. 140 (102). Gen. ut DC. — Endl. 1839. Gen. p. 763; 1841. Ench. p. 377. Gen. ead. et Cesatia.

---

*) κοτύλη, vas.

Hydrocotyleae Rchb. cont.
Accedunt 1843 (Spl. III. p. 81) Pritzelia et 1850 (Spl. V. p. 1) Platysace, Schoenolaena, Pentapeltis, Microsciadium, Haplosciadium. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 95. Gen. ut Endl.
Hook. 1830. Bot. Miscell. I. p. 324: subtrib. Hydrocotylinear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 481: subdiv. Platyspermar. Gen.: Hydrocotyle. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 220. Gen. ut DC. (Hügelia loco Didisci) et Catepha. — Rchb. 1841. Nom. p. 142. Gen. ut 1837 et Cesatia, Xanthosia.
Tausch 1834. Flora I. p. 354: subtrib. Disaspidospermar. Gen.: Hydrocotyle, Erigenia, Didiscus, Trachymene.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 137. 173: sect. Disaspidospermear. Gen.: Hydrocotyle, Crantzia, Cesatia, Erigenia, Hügelia, Trachymene.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 110: trib. Orthospermear. Gen.: Hydrocotyle, Didiscus, Trachymene, Leucolaena, Bowlesia.
Hydrocotylidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 778: trib. Apiacear. Gen. Hydrocotylear. Endl. 1843 et Leucolaena, Schaenolaena.
Hydrocotylinae Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 628: ordo Umbelliferar. Gen.: Hydrocotyle, Bolax, Trachymene, Drusa, Bowlesia, Spananthe.
Spreng. 1820 in Schult. Syst. VI. p. XXXII; 1825. Syst. I. p. 529; 1830. Gen. I. p. 220: trib. Umbelliferar. Gen. ead. et (1830) Didiscus.
Link 1829. Hdb. I. p. 314: subordo Umbellatar. Gen.: Echinophora, Hydrocotyle, Spananthe, Dondia, Astrantia, Sanicula.
Hydrocotylineae Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 141: trib. 15 Umbelliferar. Gen.: Spananthe, Bowlesia, Bolax, Trachymene, Hydrocotyle.
Hook. 1830. Bot. Miscell. I. p. 324. Subtrib.: Hydrocotyleae, Mulineae.
Hydrocybe Fries 1838. Epicr. p. 303: sect. Cortinarii (p. 601 *Hygrocybe*).
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 488: subsect. Cortinarii.
Hydrocytium A. Braun 1855. Alg. unicell. gen. p. 10. 24: nov. g. Algar. monocytidear. genuinar. eremobiar. (Ascidium acuminatum A. Braun antea.) *Cf.* Flora 1855. p. 571.
Hydrodictidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 18: trib. Confervear. Gen. Hydrodictyear. Endl.
Hydrodiction Bonnem. vid. *Hydrodictyon Roth.*
Hydrodictyae Ch. Morren 1841. Mém. Ac. Brux. XIV. p. 16: trib. Confervacear. Gen.: Hydrodictyon. *Cf. seq.*
Hydrodictyeae Decaisne 1841. Arch. Mus. II. p. 115; 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92): trib. Zoosporear. Gen.: Hydrodictyon, Microdictyon.
Rchb. 1841. Nom. p. 19: div. Confervacear. Gen.: Hydrodictyon, Dictyonema.

Hydrodictyeae Decaisne cont.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 466): trib. Confervoidear. Gen. ut Decne. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 14. Gen. ead. et Talarodictyon.
Zanard. 1843. Classif. Fic. Tab.: trib. Gonidiophycear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phyc. gener. p. 281: fam. Dermatosiphear. Gen. unicum: Hydrodictyon. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 12. Gen. id.
Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 226; 1849. Sp. Alg. p. 448: fam. Confervinar. Gen. id.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 123: sect. Confervacear. Gen. id.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 100: trib. Confervinar.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: trib. Zoospermear. Gen. ut Endl. 1843.
Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 94: ordo Chlorospermear. Gen.: Hydrodictyon.
Hydrodictyneae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71: fam. Granuliniae. Gen.: Hydrodictyon.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: fam. Confervariear. Gen. id.
Hydrodictyon Roth 1800. Tent. fl. germ. III. p. 501: nov. g. Algar. (Conferva reticulata L.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 177. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 60 (*Hydrodyction*). — Mart. 1817. Erlang. p. 291. (vegetantium.)
Agdh. 1817. Syn. Alg. p. XXXI. 97; 1821. Aphor. p. 98: g. Confervoidear. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 909.
Lyngb. 1819. Hydroph. dan. p. 169: g. Siphonigonator.
Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 5: g. Confervar. *Cf.* Flora 1821. II. p. 511.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 300: g. Hydrodictyonidear.
Bonnem. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 195 (*Hydrodiction*): g. Confervear. — Par. Agdh. 1824. Syst. p. XXVI. 84. — Endl. 1836. Gen. n. 55. p. 5 (*Hydrodyction*); 1841. Ench. p. 4. — Harv. 1841. Brit. Alg. p. 140.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 71; 1829. Anal. fam. p. 77: g. Hydrodictynear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 339: g. Ulvacear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 360. n. 3423; 1831. Gen. II. p. 753. n. 3825: g. Confervinar. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 85.
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 463: g. Zygnemear. — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 132.
Rudolphi 1829. Flora I. p. 368: g. Conjugatar.
Wallr. 1833. Krypt. II. p. 50: g. Gryphonematum.
Menegh. 1838. Cenni p. 31: g. Lemaniear.
Morren 1841. Mém. Ac. Brux. XIV. p. 16: g. Hydrodictyar.

Hydrodictyon Roth cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 666: g. Hydrodictyear. — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327. (Flora 1843. p. 92.) — Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 466.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 14. n. 27. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 92; 1843. Phyc. gener. p. 281; 1845. Phyc. germ. p. 226; 1849. Sp. Alg. p. 448. n. 280. — Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 12. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 123. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52. — Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 95.
Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . .: g. Hydrodictyonear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Hydrodictidar.
Math. 1853. Belg. II. p. 505 (*Hydrodyction*): g. Hydrodyctiear.
A. Braun Alg. unicell. gen. p. 10. 55: g. Algar. monocytidear. genuinar. coenobiar.

Hydrodictyoneae Hassall 1845. Brit. freshw. Alg. p. . . .: fam. Algar. filiformium. Gen.: Hydrodictyon.

Hydrodictyonideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 300: div. Hydrophytar. Gen.: Hydrodictyon.

Hydrodyctieae Mathieu 1853. Fl. Belg. II. p. 505: trib. 16 Algar. Gen.: Hydrodyction.

Hydrodyction DC., Endl., Math. vid. *Hydrodictyon Roth.*

Hydrofissidens C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 44: sect. Fissidentis.
= Octodiceras Brid.

Hydrogastreae Endl. 1843. Gen. Suppl. III. p. 19: trib. Vaucheriear. Subtrib.: Vaucherieae verae, Spongodieae.

Hydrogastridae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 22: trib. Vaucheriear. Gen. Hydrogastrear. Endl.

Hydrogastrum Desv. . . . . Fl. Ang. p. 19: nov. g. Ulvacear.
Bory 1826. Dict. class. VIII. p. 423.
Endl. 1836. Gen. n. 78. p. 7; 1841. Ench. p. 5: g. Siphonear.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 465): g. Vaucheriear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 19. n. 60. (verar.) — Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 130. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55. — Math. 1853. Belg. II. p. 501.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 22: g. Hydrogastridar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Valoniacear.?
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 101: g. Bryopsidear.
Synon. Botrydium Wallr.; Rhizococcum Desmaz.

Hydrogera Wiggers 1780. Prodr. fl. Holsat. p. 110: nov. g. Fungoidear.
Roth 1788. Germ. I. p. 556: g. Fungor.
= Pilobolus Tode.

Hydrogeton*) Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 244. Ed. Willd. p. 300: nov. g. Octandr. Tetragyn. (H. heterophyllum.)
= Potamogeton Linn.

Hydrogeton Pers. 1805. Enchir. I. p. 400. n. 894: g. Hexandr. Trigyn.
Hedw. 1806. Gen. p. 254. n. 1031: g. Fluvialium.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 879: g. Hydrocharidum.
Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 240: g. Najadum.
Agdh. 1822. Aphor. p. 126: g. Alismear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 162. n. 1388; 1830. Gen. I. p. 291. n. 1506. — Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 800. — Bartl. 1830. Ord. p. 74. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 113.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1214: g. Alismacear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 10: g. Alismaceis aff.?
= Uvirandra St. Hil.

Hydrogetones Link 1829. Handb. I. p. 282: ordo 24 Endogenear. Gen.: Potamogeton, Ruppia, Zannichellia. (Najas, Zostera, et Cymodocea serius p. 820 ad ordinem Najadear. transferuntur.)

Hydroglossum Willd. 1802. Act. Ac. Erford. p. 24: nov. g. Filicum exannulatar. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 240.
Willd. 1809. En. p. 1066; 1810. Sp. V. p. 77. n. 1949: g. Schismatopteridum.
Link 1822. En. II. p. 456: g. Osmundinar.
Presl 1847 Suppl. Pterid. p. 372: g. Lygodiacear.
Synon. Lygodictyon Smith.

Hydrolaea Dumort. vid. *Hydrolea Linn.*

Hydrolaeaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 25: fam. Convolvulariear. Gen.: Hydrolaea, Nama, Wigandia.

Hydrolapatha Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 54. 67: nov. g. Fucor. (H. sanguinea, sinuosa, quercifolia, etc.)
= Delesseria Lamx.

Hydrolapatha Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 51: subsect. Lapathi.
= Hippolapathum Wallr.

Hydrolea**) Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 328; 1764. Gen. ed. VI. p. 324. n. 318; 1767. Syst. ed. XII. p. 198. n. 315: g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 220; 1784. Syst. p. 265. — Reich. 1778. Gen. p. 129. n. 347. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 173. n. 445. — Lour. 1790. Coch. I. p. 172. — Gmel. 1791. Syst. p. 458. — Pers. 1797. Syst. p. 279. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1327. n. 507. — Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 21. t. 243. 244. (reform.) — Nutt. 1818. Gen. I. p. 173.
Scop. 1777. Intr. p. 191: g. Speciosar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 263. t. 55. f. 9 (speciosa).

---

*) *γείτων*, proximus.
**) Vox hybrida? Olea?

Hydrolea Linn. cont.
Juss. 1789. Gen. p. 134: g. Convolvulor.
Neck. 1790. El. II. p. 32. n. 660: g. Darinyphytor.
Cram. 1803. Disp. p. 63 in Pentandr. Trigyn.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 309: g. Convolvulear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 466.
Pers. 1805. Ench. I. p. 289. n. 642: g. Convolvulacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 182. n. 749. — Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 288 (*Coutarde*). — Link 1821. En. I. p. 249.
R. Brown 1818. Narr. exp. Cong. App. 5. p. 451 (Verm. bot. Schr. I. p. 257): g. Hydrolear. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 865. n. 1011; 1830. Gen. I. p. 215. n. 1110. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 581; II. p. 922. — Choisy 1846 in DC. Pr. X. p. 180. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 633.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 125: g. Hydroleacear. — Par. Schult. 1820. Syst. VI. p. XVIII. 191. — Kunth 1823. Syn. II. p. 234. — Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3020. — Bartl. 1830. Ord. p. 190. — Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 107; 1833. Ann. sc. nat. XXX. p. 236. *Cf.* Flora Lit. V. p. 115 et Isis 1836. p. 473. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 249. — Endl. 1839. Gen. n. 3833. p. 661; 1841. Ench. p. 330. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (180). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 105.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 725: g. ad Convolvulaceas accedens.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25 (*Hydrolaea*): g. Hydrolaeacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 194; 1841. Nom. p. 113. n. 4399; g. Hydroleear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 639: g. Hydrophyllacear.
Synon. Udrolea Adans.; Steris Burm.; Sagonea Aubl.; Reichelia Schreb.

Hydroleaceae HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 125: ordo plant. Gen.: Hydrolea, Wigandia, Nama. *Cf.* Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 752. — Par. Kunth 1843. Syn. II. p. 234. Gen. ead.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 11; 1826. Isis p. 586: div. Convolvulacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 119. Gen. ead.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (201) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 189: ordo (114) Tubiflorar. Gen. ut Kunth et Sagonea. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 660; 1841. Ench. p. 329. Gen. ut Kunth et Romanzoffia, Codon. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (180). Gen. ead. et Rochefortia?
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo Volvalium.
Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 95; 1833. Ann. sc. nat. XXX. p. 225: fam. Personatis et Solaneis aff. Gen.: Hydrolea, Hydrolia, Nama, Wigandia, Romanzoffia? *Cf.* Flora Lit. V. p. 114 et Isis 1836. p. 472.

Hydroleaceae HBK. cont.
D. Don 1833. Edinb. n. phil. journ. XV. p. 53. Adnumeratur Codon.
Mart. 1835. Consp. p. 23: ordo 128.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 234.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 249: ordo Corollaeflorar. Gen. ut Choisy. (Codon loco Romanzoffiae.)
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 104: fam. (136) Tubiflorar. Gen. ut Choisy et Codon?, Cervia?
Brongn. 1843. Én. genr. p. 57: fam. Asperifoliear. Gen.: Wigandia, Ramondia?
Choisy 1846 in DC. Pr. X. p. 179: ordo (140) Corolliflorar. Trib.: Hydroleae, Nameae.

Hydroleae R. Brown 1818. Narr. exp. Congo App. 5. p. 451 (Verm. bot. Schr. I. p. 257): novus ordo plant., jam 1810. Prodr. I. p. 482. Ed. Nees p. 338 pro Hydrolea, Nama et Sagonea indicatus.
Hydroleaceae Kunth.

Hydroleae Choisy 1846 in DC. Prodr. X. p. 180: trib. Hydroleacear. Gen.: Hydrolea, Hydrolia.

Hydroleeae Rchb. 1837. Hand. p. 194; 1841. Nomencl. p. 113: div. Convolvulacear. Gen.: Wigandia, Sagonea (1841 Romanzoffia), Nama, Hydrolea, Codon.

Hydrolia Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 29 in Römer Collect. bot. p. 202: nov. g. Convolvulor., Hydroleae aff.
Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 111; 1833. Ann. sc. nat. XXX. p. 241: g. Hydroleacear. *Cf.* Flora Lit. V. p. 116 et Isis 1836. p. 474. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 250. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 105.
Choisy 1846 in DC. Pr. X. p. 182: g. Hydrolear.

Hydrolineae Endl. 1836. Gen. p. 2; 1841. Ench. p. 2: trib. Diatomear. Gen.: Encyonema, Hydrolinum, Homoeocladia, Gloiodictyon, Hydrurus, Micromega. — Simil. Rchb. 1841. Nom. p. 19. Gen. ead. emisso Hydruro.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: subordo Diatomacear. Gen. ut Endl.

Hydrolinum Link 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 5: nov. g. a Conferva L. disjunctum. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 242.
Endl. 1836. Gen. n. 14. p. 2; 1841. Ench. p. 2: g. Hydrolinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 643. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13.
Synon. (ex Endl.) Schizonema Agdh.; Monema Grev.; Monnema Trev.; Berkeleya Grev.; Girodella Gaill.; Spermogonia Bonnem.

Hydrolopatha Stackh. in Mém. soc. Mosc. II. p. 54: sphalm. pro *Hydrolapatha*.

Hydromestus Scheidw. 1842 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 36. p. 245: nov. g. Acanthacear. (H. maculatus.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 638. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680 (minus notum.)
Hook. . . . . Bot. Mag. t. 4556.

Hydromistria Bartl. vid. *Hydromystria Meyer.*

Hydromyces Rchb. vid. *seq.*

Hydromycus Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 178: nov. g. Tremellae aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 15 *(Hydromyces):* g. Fungor. minus cognitum.
= Dacrymyces Nees?

Hydromystria*) G. F. W. Meyer 1818. Fl. esseq. p. 152: nov. g. Hydrocharidear. (H. stolonifera) *Cf.* Bull. soc. philom. 1820. p. 7. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. CIV. 1590. (?)
Spreng. 1825. Syst. II. p. 145. n. 1365: g. Juncor. (Hexandr. Trigyn.)
Rchb. 1828. Consp. p. 45. n. 798: g. Alismear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 74 *(Hydromistria).* — Spreng. 1830. Gen. I. p. 291. n. 1505.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1214: g. Alismacear. — Par. A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 280.
Limnobium Rich.

Hydronastes Rchb. 1844. Fl. sax. p. 47: sect. Caricis. *(C. Buxbaumii.)*

Hydronema Carus 1823. Nov. Act. Leop. XI. p. 493. 506: nov. g. Fungor.? An Algar.?
Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 128: g. Hydronemateor.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 101: g. Hydronemear.
= Saprolegnia Nees.

Hydronemateae Nees 1823. Nov. Act. Leop. XI. 2. p. 509: fam. a Fungis ad Algas transiens. Gen.: Nostoc, Syncollesia, Bacillaria, Oscillatoria, Diatoma, Saprolegnia, Achlya, Pythium; Zoocarpea, Ectosperma, Vaucheria, Zygnema.

Hydronematei Rchb. 1828. Consp. p. 7: subdiv. Mucorinor. Gen.: Hydronema.

Hydronemeae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 101: trib. Siphonothallar. Gen.: Mycocoelium, Hydronema.

Hydropeltideae DC. 1821. Syst. II. p. 36: trib. Podophyllear. Gen.: Cabomba, Hydropeltis.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 64: fam. Thalamifloriae. Gen.: Cabomba.
Agdh. 1822. Aphor. p. 128; 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 584: div. Nymphaeacear. Gen. ut DC. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 112. Gen. ead.
DC. 1824. Pr. I. p. 112: trib. Podophyllacear. Gen. ead.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53: fam. Nymphaeariear. Gen. ead.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (7) Thalamiflorar. (syncarpar.) — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 121. Gen. ut DC.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Homorganor. floriferor.
Lindl. 1833. Nix. p. 14: ordo ad Nymphaeaceas accedens.

Hydropeltideae DC. cont.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 13: subordo Nymphaeacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 6 (8): ordo 8 plant. (p. 437 Nymphaeoidear.) Gen. ead.
= Cabombeae Rich.

Hydropeltideae Bartl. 1830. Ord. nat. p. 86: class. (XXI.) Chlamydoblastor. Ord.: Cabombeae, Nymphaeaceae, Nelumboneae.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 157: class. (18) Dicotyledoneor. Fam.: Cabombeae, Nymphaeaceae, Nelumbiaceae.

Hydropeltis*) Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 323. t. 29: nov. g. Polyandr. Polygyn. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 107. n. 1368.
Salisb. 1806 in Konig Ann. of Bot. II. p. 74: g. Nymphaeear.
Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 248: g. Hydrocharidear.
DC. 1821. Syst. II. p. 37; 1824. Pr. I. p. 112: g. Hydropeltidear. — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 128. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 122. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 112. — Meisn. 1837. Gen. p. 6 (8). — Schleid. 1839 in Wiegm. Arch. Nat. I. p. 231.
Rchb. 1828. Consp. p. 46. n. 812: g. Hydrocharear.
Bartl. 1830. Ord. p. 88: g. Cabombear. — Par. Spach 1837. Vég. phan. VII. p. 162.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 413: g. Cabombacear.
= Brasenia Schreb.

Hydrophaca Hall. . . . . nr. 1898—1901 ex Steud. Nomencl. I. p. 783.
= Lemna Linn.

Hydrophila Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 14; 1789. Beitr. IV. p. 146. *(Tillaea aquatica L.)*
= Bulliarda DC.

Hydrophilax A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 158: g. Putoriear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 576. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 633. — Meisn. 1838. Gen. p. 172 (120).
= Hydrophylax Linn. f.

Hydrophora Tode 1790. Fung. meckl. II. p. 5. t. 8: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 261. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1486.
Pers. 1797. Tent. p. 14: g. Dermatocarpi.
Agdh. 1821. Aphor. p. 80: g. Mucedinum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 81: g. Mucorear.
Rchb. 1828. Consp. p. 7. n. 139 *c:* sect. Mucoris.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Mucorinear.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 313: g. Mucorinor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 253. p. 22; 1841. Ench. p. 15. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43.

---

*) *μυστρίον*, cochlear parvum.

*) *ὕδωρ*, aqua; *πέλτη*, pelta.

Hydrophora Tode cont.

Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 229: g. Mucoroideor.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 17; 1842. Mycol. p. 68: g. Mucoroidear. verar.

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 487: g. Mucoreor

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Mucorineor.

Bonord. 1851. Hdb. p. 121: g. Mucorum.

Hydrophorus Batarr. 1759. Fung. hist. p. 54.
= Hygrophorus Fries.

Hydrophycae Fries 1825. Pl. homon. p. 320: cohors 4 Algar. Ord.: Fucaceae, Florideae, Ulvaceae, Batrachospermeae.

Hydrophylax*) Linn. f. 1781. Suppl. p. 14. n. 1361: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr 1784. Syst. p. 160. — Schreb. 1789. Gen. I. p 68. n. 159. — Gmel. 1791. Syst. p. 260. — Pers. 1797. Syst. p. 166; 1805. Ench. I. p. 125. n. 237. — Willd. 1797. Sp. I. p. 581. n. 181. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 29. t. 233; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 380; ed. 1832. p. 373. — Schult. 1827. Mant. III. p. 11.

Juss. 1789. Gen. p. 210; 1820. Mém. Mus. VI. p. 372: g. Rubiacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 432. — Hedw. 1806. Gen. p. 63. n. 300. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 12. 202. n. 471. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 410. n. 404; 1830. Gen. I. p. 91. n. 450. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 459.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 602: g. Coffeacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2002.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87 (*Hydrophyllax*): g. Chenocaspiae.

Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 274: g. Rubiaceis aff.

Bartl. 1830. Ord. p. 210: g. Spermacocear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 328.

Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 441: g. Putoriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3113. p. 526; 1841. Ench. p. 271. — Rchb. 1841. Nom. p. 74. n. 2761.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.

Synon. Sarissus Gärtn.; Hydrophilax A. Rich.

Hydrophylla Stackhouse 1816. Nereis brit. Ed. alt.: g. Algar. *Cf.* Spreng. 1820. N. Entd. I. p. 95 et Leman 1821. Dict. v. 22. p. 275.

. . . ?

Hydrophyllaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II.) 1847. Veg. kingd. p. 638: ordo Cortusalium. Gen. Hydrophyllacear., Hydrolear. et Namear. A. DC. et Codon?, Lonchostoma?

A. DC. 1845. Pr. IX. p. 287: ordo (136) Corolliflorar. Gen.: Hydrophyllum, Nemophila, Ellisia, Microgenetes, Eutoca, Miltitzia, Cosmanthus, Phacelia, Emmenanthe. *Cf.* Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 760.

Hydrophyllax Rafin. vid. *Hydrophylax Linn. f.*

Hydrophylleae R. Brown (Bot. Regist. t. 242) 1823. App. to Frankl. journ. p. 764 (Verm. bot. Schr. I. p. 540): novus ordo a Boragineis sejunctus, jam 1810 in Prodr. I. p. 492 indicatus. Gen.: Hydrophyllum, Phacelia, Ellisia, Nemophila, et (1823) Eutoca.

Schrad. 1820. Comm. Gott. rec. IV. p. 192: fam. Boraginear. Gen.: Ellisia, Hydrophyllum, Phacelia.

Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15: div. Boraginear. — Par. Cham. 1829. Linnaea IV. p. 493. Gen.: Phacelia.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXVII: div. Asperifoliar. Gen.: Ellisia, Nemophila, Hydrophyllum, Phacelia, Tournefortia, Messerschmidtia, Ehretia, Cordia.

Rchb. 1828. Consp. p. 118 (1831. Fl. exc. p. 347): div. Asperifoliacear. Gen. ead. et Rotula, Rapourea?, Eutoca, Beureria, Patagonula, Varronia, Cordiopsis, Rhabdia, Saccellium?

Link 1829. Hdb. I. p. 570: subsect. Cordiacear. Gen.: Hydrophyllum.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25 (*Hydrophyllideae* p. 20): fam. Boraginariear. Gen. ut R. Brown.

Lindl. 1830. Nat. syst. éd. I. Clav.: ordo (226) Monopetalar.

Bartl. 1830. Ord. p. 195: ordo (118) Tubiflorar. Gen. ut R. Brown. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 658; 1841. Ench. p. 327. Gen. ut Benth. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (180). Gen. ead.

Lindl. 1833. Nix. p. 29: ordo Echialium.

Benth. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 267. Gen. ut R. Brown et Emmenanthe.

Mart. 1835. Consp. p. 22: ordo 123.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 393: ordo Corollaeflorar. Gen. ut Benth.

Rchb. 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 112: subdiv. Capsularium. Gen.: Phacelia, Hydrophyllum.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 47: fam. (132) Tubiflorar. Gen. ut Benth. et Decemium, Cosmanthus.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 57: fam. Asperifoliear. Gen. ex R. Brown.

Hydrophyllideae Dumort. vid. *praeced.*

Hydrophyllon*) Tourn. 1700. Inst. p. 81. t. 16: g. pl. class. I.
Hydrophyllum Linn.

*) ὑδροφύλαξ, aquarum custos.

*) Cur Morinus plantam sic appellarit, obscurum, cum non aquatica sit. (Tourn.)

Hydrophyllum Linn. 1737. Gen. p. 41. n. 124; 1737. Cliff. p. 49; 1740. Syst. p. 19; 1753. Sp. I. p. 146; 1759. Syst. ed. X. p. 919. n. 187; 1762. Sp. ed. II. p. 208; 1764. Gen. ed. VI. p. 83. n. 204; 1767. Syst. ed. XII. p. 152: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 164; 1784. Syst. p. 195. — Reich. 1778. Gen. p. 85. n. 217. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 109. n. 267. — Gmel. 1791. Syst. p. 330. — Pers. 1797. Syst. p. 201; 1805. Ench. I. p. 168. n. 375. — Willd. 1797. Sp. I. p. 814. n. 303; 1809. En. p. 194. — Michx. 1803. Fl. am. I. p. 133. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 117.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 205. n. 849: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 428.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Borraginear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 129. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 297. — Hedw. 1806. Gen. p. 94. n. 425. — Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 275. — Link 1821. En. I. p. 174.

Adans. 1763. Fam. II. p. 179: g. Borraginum.

Hill 1769. Ht. kew. p. 139: g. Monopetalar.

Scop. 1777. Intr. p. 159: g. Asperifoliar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 451. (anomalar.)

Neck. 1790. El. I. p. 278. n. 488: g. Trachytophytor.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 133. t. 110.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 381: g. Sebestenar.

Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XII. 113. n. 649: g. Boraginear.

Schrad. 1820. Comm. Gott. rec. IV. p. 192: g. Hydrophyllear. — Par. R. Brown 1823. App. to Frankl. journ. p. 764. (Verm. bot. Schr. I. p. 542.) — Spreng. 1825. Syst. I. p. 569. n. 605; 1830. Gen. I. p. 633. n. 661. — Rchb. 1828. Consp. p. 118. n. 2977; 1837. Hdb. p. 193; 1841. Nom. p. 112. n. 4378. — Link 1829. Hdb. I. p. 570. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25. — Bartl. 1830. Ord. p. 196. — Benth. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 272. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 393. — Hook. . . . . Fl. bor. am. II. p. 78. — Endl. 1839. Gen. n. 3827. p. 659; 1841. Ench. p. 328. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 625. — Meisn. 1840. Gen. p. 274 (180). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 49. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 57.

Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II.) 1847. Veg. kd. p. 639: g. Hydrophyllacear. — Par. A. DC. 1845. Pr. IX. p. 288.

Synon. Hydrophyllon Tourn.

Hydrophyta Lyngbye 1819. Tent. Hydroph. dan. p. XXVIII. Sect.: Phycoidata, Soleniata, Stereogonata, Siphonigonata, Homalogonata, Tremelloidata. *Cf.* Spreng. Neue Entdeck. I. p. 317.

= Algae Roth.

Hydrophytae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 278: fam. Algar. Divis.: Oscillatorideae, Bangideae, Lemanideae, Vaucherideae, Diatomideae, Conjugatideae, Hydrodictyonideae, Confervidae.

Hydrophytae Link 1831. Handb. II. p. 442: subclass. Exogenear. Ord.: Hydrocaryes, Nymphaeaceae.

Hydrophytae loculatae Bonnemais. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 138. Gen.: *A.* Vaginaria, Linckia, Trichophora, Percursaria, Cyclosperma, Rivularia, Dudresnaya, Batrachospermum, Draparnaldia, Thorea. *B.* Dasytrichia, Dictiderma, Grammita, Ptilota, Grateloupia, Sphacelaria. *C.* Ceramieae. *D.* Conferveae. *E.* Lemanea, Nostoch.

Bonnem. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 49. Fam.: Epidermeae, Ceramieae.

Hydrophytum „Jack" Flora 1823. II. Beil. p. 96, Rchb., Spreng., Dietr. vid. *Hydnophytum Jack.*

Hydropiper Buxbaum 1728. Cent. II. t. 37. f. 2.

Pilularia Vaill. (Hall.)

Hydropiper Endl. 1840. Gen. n. 5475 *b.* p. 1036; 1841. Ench. p. 541; 1850. Spl. V. p. 70: sect. Elatines.

Synon. Birolia Bellardi; Elatinella Seub.

Hydropisphaera Dumort. 1822. Comm. bot. p. 89: g. Sphaeriear. (Sphaeria Peziza.)

Hydropityeae Rchb. 1828. Consp. p. 172: div. Lythrariar. Gen.: Hydropityon, Honottia.

Hydropityon Gärtn. f. 1805. Fruct. III. p. 19. t. 183. f. 2.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 834: g. Stellarinar.?

Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 278: g. Caryophyllear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 330. n. 1609; 1830. Gen. I. p. 355. n. 1792. (Decandr. Monogyn.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1470. — Steud. 1840. Nom. I. p. 783 (*Hydropityum*).

Seringe 1824 in DC. Pr. I. p. 422: g. Alsinear.? — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 448.

Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4548: g. Hydropityear.

Bartl. 1830. Ord. p. 317: g. Salicariear.? Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 419. — Meisn. 1838. Gen. p. 118 (84)?

= Limnophila Brown? (Conf. Endl. Gen. p. 680.)

Hydropityum Steud. Nom. vid. *praeced.*

Hydropogon Brid. 1826. Bryol. I. Suppl. p. 769: g. Acrocarpor. peristomor. (Grimmia fontinaloides Hook.)

Brid. 1827. Bryol. II. p. XLIII: g. Grimmioideor.

Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 590: g. Grimmiaceor.

Endl. 1836. Gen. n. 491. p. 48; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 49.

Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 866: g. Calyptrobryor.

Schwägr. 1842. Suppl. IV. t. 307. Char. emend.

Hydropogon Brid. cont.
Müll. 1843. Linnaea XVII. p. 598: g. Hydropogonear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 81: g. Ripariacear.
Pilotrichi Palis. sp.

Hydropogoneae C. Müll. 1843. Linnaea XVII. p. 598: nova tribus Muscor. Gen.: Hydropogon, Cryptangium. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 762.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 401: trib. Acrocarpor. Gen. ead.

Hydropterides Willd. 1802. Bem. selt. Farrenkr. p. . . .: ordo 3 Cryptogamar. Gen.: Pilularia, Salvinia, Marsilea, Isoëtes.
Willd. 1804 in Rebent. Neom. p. x: ordo 4 Cryptogamiae. Gen. ead. et Azolla.
Willd. 1810. Spec. V. p. 634: ordo 6 Cryptogamiae. Gen. ead. *Cf.* Willd. Grundr. ed. Link 1831. p. 236.
Endl. 1836. Gen. p. 67; 1841. Ench. p. 44: class. Acrobryor. protophytor. Ord.: Salviniaceae, Marsileaceae.
Kunth 1838. Berol. II. p. 428: fam. Filicoidear. Divis. ut Endl.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 112; 1846. Chlor. prot. p. LII: class. plant. foss. Ordo: Marsilaeaceae.
Synon. Rhizospermae Roth; Rhizocarpae Batsch; Marsileaceae R. Brown; Salvinieae Juss.; Rhizospermeae Corda; Rhizopterides Wallr.; Rhizocarpeae Schleid.

Hydropuntia Montagne 1842. Prodr. Alg. antarct. p. 7; 1845 in D'Urv. voy. Pol Sud p. 166.
Endl. 1843. Spl. III. p. 53. n. 122/90: g. Floridear. dubiae affinitatis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Delesseriar.?
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54: g. Coccocarpear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 752. n. 500: g. Gigartinear.

Hydropyrum Link 1827. Hort. Berol. I. p. 252: g. Diclinar.
Kunth 1830. Gram. p. 7; 1833. Agrost. p. 9: g. Oryzear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 130. 231. — Meisn. 1843. Gen. p. 414 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 170. — Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 466. — Steud. 1854. Glum. I. p. 4.
Trin. 1839. Mém. Ac. Pet. 6e sér. III. Bot. p. 183: g. Oryzeor.
Hydrochloa Palis.

Hydropyxis Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 19: g. Portulacear. (H. palustris) ex Steud. Nom. I. p. 783. *Cf.* Meisn. Comm. p. 357. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 364. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 84.
Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 279: g. Personatis aff.?
Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4317: g. Talinear.?

Hydropyxis Rafin. cont.
Endl. 1841. Gen. n. 6864. p. 1330; 1841. Ench. p. 685: inter genera gamopetala dubiae sedis.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 795: g. monopetalum minus notum.

Hydroschoenus Zolling. & Moritzi 1846. Syst. Verz. p. 95: nov. g. Cyperacear. (H. kyllingioides.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 900: g. Cyperear. — Par. Steud. 1855. Glum. II. p. 71. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 296.

Hydrosia A. Juss. vid. *Hidrosia E. Meyer.*

Hydrosolen Martius 1825. Fl. Bras. I. p. 10.
: Enteromorpha Link.

Hydrospondylus Hasskarl 1842. Flora II. Beibl. p. 33: nov. g. Proserpinacam inter et Myriophyllum collocandum.
Meisn. 1843. Comm. p. 355: g. Cercodianar.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 255: g. Halorageear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 671.
= Hydrilla Rich.

Hydrostachyeae Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 91; 1852. Arch. Mus. VI. p. 1: trib. Podostemacear. Gen.: Hydrostachys. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 431. Gen. id. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 772

Hydrostachys Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 5 in Römer Collect. bot. p. 196: nov. g. Naiadum.
Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 281: g. Najadum.
Rchb. 1828. Consp. p. 77. n. 1675; 1841. Nom. p. 60. n. 2314: g. Podostemonear.
A. Juss. 1837 in Deless. Ic. sel. III. p. 55. t. 91—94: g. Podostemear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 122 (88). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 12.
Endl. 1837. Gen. n. 1836. p. 270; 1841. Spl. I. p. 1375; 1841. Ench. p. 155: g. dubium Podostemmear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 483: g. Podostemacear.
Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 91; 1852. Arch. Mus. VI. p. 47: g. Hydrostachyear. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 431. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 774.

Hydrostis Rchb. vid. *Hydrastis Linn.*

Hydrotaenia Lindl. 1838. Bot. Regist. Misc. not. p. 67. n. 128; 1842. ibid. n. ser. XV. t. 39; 1847. Veg. kingd. p. 161: nov. g. Iridacear. (H. Meleagris.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 1228/1. p. 1359; 1841. Ench. p. 98: g. Iridear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1562. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). — Schltd. 1844. Linnaea XVIII. p. 664.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 3: g. Ferrariear.

Hydrothrombium „Kütz. mss." Endl. Gen. Suppl. III. p. 11 in synon. Micraloae: vid. *Sphaerothrombium Kütz.*

Hydrotiche A. Juss. vid. *Hydrotriche Zucc.*

Hydrotremellinae Meyen 1827. Linnaea II. p. 441: nov. fam. Fungor. Gen. unicum: Actinomyce.

Hydrotremellini Rchb. 1828. Consp. p. 12: div. Tremellinor. Gen.: Actinomyces.

Hydrotriche Zuccar. 1832. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. I. p. 309: nov. g. Scrophularinar.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 7: g. Scrophularinear. minus notum.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 111: g. Gratiolear. — Par. Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 59. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 538. — Endl. 1839. Gen. n. 3945. p. 682; 1841. Ench. p. 339. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269. — Meisn. 1840. Gen. p. 309 (220). — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4606. (genuinar.) — Walp. 1845. Rep. III. p. 285. 965.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 508; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Gerardiear. — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 459 (*Hydrotiche*).

Hydrotrida Willd. mss. ex Steud. Nomencl. I. p. 753. 783. (H. Beccabunga.)
= Herpestis Gärtn. (obovata.)

Hydrureae Meneghini 1838. Cenni org. Alghe p. 26: fam. Algar. Gen.: Gloionema, Hydrurus.
Rchb. 1841. Nom. p. 18: subdiv. Nostochinar. genuinar. Gen. ead.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 69: sect. Nostochinar. Gen.: Hydrurus, Hydrococcus, Hydrocoryne.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 16. 71. 99: trib. Coccothallar. Subtrib.: Hydrococceae, Euhydrureae. *Cf.* Flora 1849. p. 613.

Hydrurus Agardh 1824. Syst. Alg. p. XVIII. 24: nov. g. Nostochinar.
Fries 1825. Pl. homon. p. 349; 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 130: g. Undinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 25. n. 426.
Schübl. 1828. Flora I. p. 65 c. ic.
Agdh. 1830. Consp. Diat. p. 26: g. Cymbellear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 756. n. 3845: g. Tremellacear.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 12: g. Myxophysalidum.
Endl. 1836. Gen. n. 17. p. 3; 1841. Ench. p. 2: g. Hydrolinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13.
Menegh. 1838. Cenni p. 26: g. Hydrurear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 599. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 70.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 180: g. Ulvacear. — Par. Hass. 1845. Brit. freshw. Alg. p. 302.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 327 (Flora 1843. p. 92): g. Chaetophoroidear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 16. n. 40: g. Chaetophorear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 56.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 85; 1843. Phyc. gener. p. 177; 1845. Phyc. germ. p. 154; 1849. Sp. Alg. p. 232. n. 176: g.

Hydrurus Agardh cont.
Hydrococcear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 60. — Math. 1853. Belg. II. p. 521.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 74: g. Euhydrurear.
Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 63: g. Tetrasporear.
A. Braun 1855. Alg. unicell. p. 11: g. Algar. polycytidear. homoeocytidear. schizocytidear. synoecobiar.
Harv. 1858. Ner. bor. am. III. p. 118: g. Palmellacear.
Synon. Cluzella Bory; Carrodorus Gray.

Hyeronima*) Allemao 1848 ex Bot. Zeit. 1854. p. 456: nov. g. Euphorbiacear. — Par. Baill. 1858. Euphorb. p. 652 (*Hieronyma*).

Hygea Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 209: g. Hypocyrtear. (H. barbigera.)

Hygrobeae Agardh vid. *seq.*

Hygrobiae Rich. 1808. Anal. d. fr. p. 34. Ed. Voigt 1811. p. 29. Gen.: Hippuris, Proserpinaca, Haloragis, Myriophyllum.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 19; 1826. Isis p. 592 (*Hygrobeae*): div. Onagrariar.
= Halorageae R. Brown.

Hygrobieae Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 250: ordo plant. Gen.: Serpicula, Myriophyllum.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 443: trib. Haloragear. Gen.: Trapa, Myriophyllum, Mejonectes, Proserpinaca, Cercodia, Haloragis, Serpicula.
Kunth 1838. Berol. I. p. 170: fam. Polypetalar. staminibus perigynis. Gen.: Myriophyllum, Hippuris, Callitriche.

Hygrocharis**) Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 147 adnot.: nov. g. Fissistylar. (Rhynchospora Kunthii.) *Cf.* Steud. 1855. Glum. II. p. 145.

Hygrocharis Hochstett. Pl. abyssin.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 632: g. Dichondrear.?
= Nephrophyllum Rich.

Hygrochroma DC. 1817. Mém. Mus. III. p. 334. 339: sect. Stilbosporae. (St. uredo.)

Hygrocrocinae Rchb. 1837. Handb. p. 135: subdiv. Oscillatorinar.

Hygrocrocis*) Agardh 1824. Syst. Alg. p. XXIII. 45: nov. g. Leptomitear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 37. p. 4; 1841. Ench. p. 3. — Menegh. 1838. Cenni p. 28. (emend.) — Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 606. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 83; 1843. Phyc. gener. p. 150; 1845. Phyc. germ. p. 120; 1849. Sp. Alg. p. 148. n. 105. — Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 70. — Math. 1853. Belg. II. p. 530.

---

*) Dicat. Jeronimo Serpa.
**) ὑγρός, humidus.
***) κροκίς, lana, floccus, tomentum.

Hygrocrocis Agardh cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 25. n. 416: g. Chaodinar.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 19: g. Myxonematum.
Harv. 1841. Brit. Alg. p. 192: g. Byssoidear.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467): g. Lyngbyear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 18: g. Confervidar.
Synon. Typhoderma Gray.

Hygrocybe Fries 1838. Epicr. p. 329; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 308: subg. Hygrophori. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 495. 1. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 563.

Hygrocybe Fries 1838. Epicr. p. 601; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 305: sect. Cortinarii. (*Conf. Hydrocybe Fries.*) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 498. 1 (*Hygrocybia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41.

Hygrocybia Rchb. vid. *praeced.*

Hygromitra Nees 1816. Syst. p. 157; 1817. Ueberbl. p. 40: stirps Tremellae. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 305.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.

Hygromitra Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 28: trib. Leotiae.
Endl. 1836. Gen. n. 432*a*. p. 38; 1841. Ench. p. 21: sect. Leotiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 450*a*.
Synon. Cucullaria Pers.

Hygrophila R. Brown 1810. Prodr. I. p. 479. Ed. Nees p. 335: nov. g. Acanthacear. (Ruellia ringens L.) — Par. Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 306. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 803. — Bartl. 1830. Ord. p. 185.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 410; 1825. Syst. II. p. 828. n. 2221; 1831. Gen. II. p. 501. n. 2464: g. Acanthear. (Didynam. Angiosperm.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3129.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Ruellicar.
Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 80; 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 19; 1847 in DC. Pr. XI. p. 85: g. Hygrophilear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 109. n. 4236. — Endl. 1839. Gen. n. 4039. p. 698; 1841. Ench. p. 343. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 777.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 368. 584: g. Echmatacanthor.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 63: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p 679: g. Hygrophilidar.
Synon. Eberlca Ridd

Hygrophila Mackay 1836. Fl. hibern. II. p. 58.
= Dumortiera Nees.

Hygrophileae Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 75: subtrib. Echmatacanthor. Gen.: Hemiadelphis, Hygrophila. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 698; 1841. Ench. p. 343. Gen. ead. et Physichilus, Nomaphila. Accedit 1842 (Spl. II. p. 62) Polyechma. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204). Gen. ut Endl.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 144: sect. Echmatacanthor. Gen. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 109: div. Esmatacanthar. Gen. ead.
Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 19: trib. Acanthacear. Gen.: Hygrophila.
Nees 1847 in DC. Pr. XI. p. 79: trib. Echmatacanthear. Gen.: Hemiadelphis, Physichilus, Polyechma, Glossochilus, Nomaphila, Hygrophila, Gymnostachyum, Cryptophragmium, Belantheria, Leucorhaphis, Petracanthus: Sautiera.

Hygrophilidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 679: trib. Echmatacanthor. Gen. Hygrophilear. Endl. 1842.

Hygrophorus Fries 1838. Epicr. p. 320; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 307: nov. g. Agaricinor. Trib. (subgen.): Limacium, Camarophyllus, Hygrocybe. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 495. Sect. eaed. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Bonord. 1851. Hdb. p. 183. 187. — Bail 1858. Syst. p. 33. t. 34.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 563: subsect. Leucospori. Divis. ut Fries.
Synon. Hydrophori Bat. pars.

Hygrophytozoa Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 115: ordo annexus Algar. Divis.: Temachina, Placunthia.

Hygropyla Taylor 1836. Linn. Trans. XVII. 3. p. 390. t. 15: nov. g. Marchantiear. (H. irrigua et nepalensis.) *Cf.* Isis 1839. p. 56.
= Dumortiera Nees.

Hygroryza Nees 1833. Edinb. n. phil. journ. XV. p. 380: nov. g. Graminear. (Pharus aristatus Retz.)
Endl. 1836. Gen. n. 733. p. 78; 1841. Ench. p. 56: g. Oryzear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 36. n. 1254. — Meisn. 1843. Gen. p. 414 (317). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 158. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115. — Steud. 1854. Glum. I. p. 4.

Hylacium Palis. 1807. Fl. Owar. II. p. 83.
Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 307: g. Rubiacear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 619 (minus notum).
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2031 *f* (*Hilacium*): sect. Psychotriae.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 559: g. Guettardear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 167 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2863. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3213. p. 544; 1841. Ench. p. 270: g. Euguettardear.

Hylacium Palis. cont.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Guettardidar.

Hylaea*) Griseb. 1844. Spicil. fl. Rumel. II. p. 167: sect. Asperulae. (*A. arvensis L.*) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 23. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 462.

Hylas Bigelow mss.
= Ptilophyllum Nutt.

Hylebia**) Koch 1836. Syn. p. 118. Ed. II. p. 129: sect. Stellariae. (St. nemorum L.)

Hylethale Link 1829. Handb. I. p. 788: nov. g. Cichoracear. (*Prenanthes purpurea L.*)
= Euprenanthes Endl.

Hyline Herbert . . . . Bot. Mag. t. 3779: nov. g. Amaryllidear. (H. Gardneriana.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1605.
Kunth 1850. Enum. V. p. 584: g. Crinear.

Hylocomium Schimp. 1852. Bryol. eur. V: nov. g. Hypnacear. (*Hypnum triquetrum, loreum*, etc.)
= Anacamptophyllum C. Müll.

Hylogyne Knight & Salisb. 1809. Proteac. p. 126.
= Telopea R. Brown.

Hylomecon Maxim. 1858. Ac. Pet. Mém. sav. étr. IX. p. 36; nov. g. Papaveracear. (*H. vernalis.*)

Hylonome Webb & Berth. 1850. Phytogr. Canar. III. p. 320: nov. g. Smilacear. (Ruscus reticulatus Thunb.)

Hylophila Lindl. 1831 in Wall. Cat. n. 7396; 1833. Bot. Regist. XIX. n. 1618: nov. g. Neottiear. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 214. n. 1561. — Rchb. 1841. Nom. p. 55. n. 2128. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 181.
Lindl. 1840. Orchid. p. 490; 1847. Veg. kd. p. 182: g. Physuridar. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1570. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 745.
Meisn. 1842. Gen. p. 386 (289): g. Physuridear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 20.

Hylora Griseb. 1844. Spicil. fl. Rumel. II. p. 156: sect. Galii. (*G. glaucum, aristatum, sylvaticum L.*, etc.) — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 12. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 464.

Hyloxyla Stackhouse 1809. Mém. soc. Mosc. II. p. 52: ordo 7 Cryptogamiae. Gen.: Peziza, Clavaria, Reticularia, Sphaeria, etc.

Hymanthalia Dumort. vid. *Himanthalia Lyngb.*

*) ὑλαῖος, sylvestris.
**) ὕλη, sylva.

Hymenaceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 70. 82: fam. Nudigraniae. Gen.: Hydnum, Systotrema, Fistulinia, Boletus, Merulius, Daedalea, Schizophyllum, Agaricus, Cantharellus, Sterbeeckia.

Hymenachne*) Palis. 1812. Agrost. p. 48: nov. g. Graminear. (Agrostis myuros Lam.) — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 25. 468. n. 263.
Trin. 1820. Fund. p. 176: g. Graminum.
Rchb. 1828. Consp. p. 48. n. 859: g. Chloridear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Panicear. (genuinar.) — Par. Nees 1829. Agrost. Bras. p. 275. — Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Steud. 1854. Glum. I. p. 101.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 265: g. Paspalear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 457: g. Eupanicear.
= Panici Linn. pars?

Hymenaea**) Linn. 1737. Gen. p. 366. n. 918; 1737. Ht. Cliff. p. 484; 1742. Gen. ed. II. p. 521. n. 1006; 1753. Sp. I. p. 1192: nov. g. incertae sedis, pro *Courbaril Plum.* institutum.
Linn. 1748. Ht. Upsal. p. 305: g. Cryptogamiae indeterminatum. (?)
R. Browne 1756. Jamaic. p. 221: g. Decandr. Monogyn. — Par. Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1016. n. 1100; 1762. Sp. ed. II. p. 537; 1764. Gen. ed. VI. p. 206. n. 512; 1767. Syst. ed. XII. p. 288. n. 507. — Murr. 1774. Syst. p. 326; 1784. Syst. p. 392. — Reich. 1778. Gen. p. 210. n. 555. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 276. n. 698. — Gmel. 1791. Syst. p. 667. — Pers. 1797. Syst. p. 420; 1805. Ench. I. p. 455. n. 1011. — Willd. 1799. Sp. II. p. 512. n. 811.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 296 (sphalm. *Hemenaea*). — Juss. 1789. Gen. p. 350. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 379. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 209. — Hedw. 1806. Gen. p. 296. n. 1177. — Poir. 1818. Dict. v. 11. p. 225 (*Courbaril*). — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 765 (anomal.); 1825. Syst. II. p. 345. n. 1634; 1830. Gen. I. p. 359. n. 1812. — Link 1821. En. I. p. 405. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1378. 1472.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Lomentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 429. — Batsch 1802. Tab. p. 98.
Gled. 1764. Syst. p. 91. n. 374: g. Thalamostemonum.

*) ὑμήν, membrana.
**) Nomen ab Hymenaeo deo conjugii veteribus celebrato, cum duo folia paria conjuncta sint, quae omni nocte connivent, simulque dormiunt approximata. (Ht. Cliff.)

Hymenaea Linn. cont.

Neck. 1790. El. II. p. 446. n. 1277: g. Chorisophytor.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 305. t. 144.

Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Cassiear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 511. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 507.

HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 322: g. Caesalpiniear. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 41. — Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4128; 1841. Nom. p. 155. n. 6090. Sect. (1841): Hymenaea, Trachylobium. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 122. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6788. p. 1317; 1841. Ench. p. 674. Sect.: Courbaril, Trachylobium. — Brongn. 1843. En. genr. p. 132. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 602.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX: g. Tamarindear.

Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.

Link 1831. Hdb. II. p. 141: g. Cassiacear.

Synon. Courbaril Plum; Courbari Adans.; Hymenaea et Trachylobium Hayne.

Hymenaea Hayne 1827. Flora II. p. 737: g. sejuncto Trachylobio restrictum.

G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 458: g. Cassiear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 99 (71).

Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Amherstiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 81.

Rchb. 1841. Nom. p. 155. n. 6090. 1: sect. Hymenaeae.

Courbaril Endl.

Hymenandra A. DC. 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 126; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 297: sect. Ardisiae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 19. — Endl. 1839. Gen. n. 4222*b*. p. 736; 1841. Ench. p. 359. — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4587. 2.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 374: g. Ardisiear. — Par. A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 79. 83; 1844. Pr. VIII. p. 91. — Meisn. 1843. Comm. p. 365. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648.

Endl. 1842. Spl. II. p. 67. n. $4222/_4$: g. Euardisiear.

Hymenangiaceae Corda 1842. Icon. Fung. V. p. 28; 1842. Anl. Mycol. p. LXXXIII. 113: fam. Dermatogasterum. Gen.: Gautiera, Hymenangium, Hydnangium.

Hymenangium Klotzsch . . . . in Dietr. Fl. boruss. p. 382.

Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 337: g. Hymenogasterum.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 28; 1842. Mycol. p. 114: g. Hymenangiacear.

Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 209: g. Hymenogastereor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 242.

Hymenangium Klotzsch cont.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Hypogaeor.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 429: g. Hysterangieor.

Synon. Lycoperdon Dicks.

Hymenanthe Fenzl 1840 in Endl. Gen. n. 5249*a*. p. 973; 1841. Ench. p. 506: sect. Viscariae.

Hymenanthera R. Brown 1818 in Tuck. Cong. p. 442 (Verm. bot. Schr. I. p. 232): nov. g. Alsodinar.

Ging. (1823. Mém. soc. Genèv. II.) 1824 in DC. Pr. I. p. 314: g. Alsodinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 189. n. 4900. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 342. — Meisn. 1837. Gen. p. 21 (18).

Spreng. 1825. Syst. I. p. 805. n. 896: g. Ionidior.

Bartl. 1830. Ord. p. 285: g. Violarieis aff. — Par. Spach 1836. Vég. phan. V. p. 497.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 180. n. 913: g. Violear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 805.

Endl. 1833. Norf. p. 70: g. Violariear. — Par. Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 17.

Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187. n. 7158: g. Hymenantherear.

Endl. 1839. Gen. n. 5049. p. 911; 1841. Ench. p. 471: g. Alsodineis aff.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 339: g. Alsodear. (p. 378 Polygalacear.?)

Synon. Solenantha G. Don? (Planch. in Ann. sc. nat. 1854. II. p. 261.)

Hymenanthereae Rchb. 1837. Handb. p. 269; 1841. Nomencl. p. 187: subdiv. Alsodinear. Gen.: Hymenanthera.

Hymenanthes Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 862: nov. g. Ericear., Befariae proximum. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 2 (21 *Hymenanthus*).

G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 849: g. Rhodorear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 444.

DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 721: sect. Rhododendri. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4341*e*. p. 759; 1841. Ench. p. 371. — Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4948. 3.

Meisn. 1839. Gen. p. 247 (155): g. Clethrear.

Hymenanthus Dietr. vid. *praeced.*

Hymenatherum Cassini 1817. Bull. soc. philom. Janv. p. 12; 1818. ibid. Déc. p. 153; 1821. Dict. v. 22. p. 318; 1825. v. 38. p. 203; 1829. v. 59. p. 62; 1830. v. 60. p. 574: nov. g. Tagetinear. (1829 Archetypar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143. — Less. 1832. Syn. p. 236. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 16.

Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2361; 1841. Nom. p. 83. n. 3211: g. Tagetear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 641. — Endl. 1838. Gen. n. 2579. p. 419; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 204 (132). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Hymenatherum Cassini cont.
A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 215. Char. reform. Sect.: Aciphyllaea, Dysodiopsis, Hymenatherum, Gnaphalopsis.
Synon. Belenidium Arnott.

Hymenea „Bory, Decne" Flora 1843. p. 99: vid. *Hymenena Grev.*

Hymenelia Krempelhuber 1852. Flora p. 17. (H. Prevostii.)
Massal. 1854. Geneacaena Lich. p. 12.
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 327: g. Hymenelicar. — Par. Arnold 1858. Flora p. 330.

Hymenelieae Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 327: fam. Kryoblastor. Gen.: Hymenelia, Petractis, Thelotrema.
Arnold 1858. Flora I. p. 330: trib. Urceolariacear. Gen.: Hymenelia, Stenhammara?

Hymenella Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 233: g. Tremellinar., serius *Hymenula* dictum.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 568: g. Tremellinear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 260.
= Leioderma Pers.

Hymenella „Moç. & Sess. Fl. mex. ined." DC. 1824. Prodr. I. p. 389: nov. g. Alsinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 206. n. 5343. — Bartl. 1830. Ord. p. 305. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 420. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 205. — Meisn. 1837. Gen. p. 25 (22).
Spreng. 1825. Syst. I. p. 494. n. 557; 1830. Gen. I. p. 116. n. 586: g. Caryophyllear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 552.
Schult. 1827. Mant. III. p. 18. 330: g. Tetrandr. Trigyn.
= Triplateia Bartl.

Hymenema Menegh., Rchb. vid. *seq.*

Hymenena Greville 1830. Synops. p. XLVIII.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 398: g. Floridear. — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 37 (*Hymenema*). — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 745 (*Hymenema*): g. Plocamiear.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 68: g. Delesseriear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 52. n. $122/_{86}$. — Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 872. n. 572. — Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 101.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 361 (Flora 1843. p. 99: *Hymenea*): g. Gasterocarpear. — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 28: g. Delesseriar.

Hymeneria „Lindl. Journ. Proc. Linn. soc. III. p. 663" Miquel 1858. Fl. Ind. bat. III. p. 663: sect. Eriae.

Hymenidium Lindl. 1835 in Royle Himal. p. 233.
Meisn. 1838. Gen. p. 145 (105): g. Seselinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4437. p. 776; 1841. Ench. p. 379. — Rchb. 1841.

Hymenidium Lindl. cont.
Nom. p. 140. n. 5429. — Walp. 1843. Rep. II. p. 403.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.

Hymenini Fries 1821. Syst. mycol. I. p. LVI: ordo Hymenomycetum. Gen. §. 1. *Clavati:* Pistillaria, Typhula, Spathularia, Clavaria. §. 2. *Pileati:* Thelephora, Hydnum, Polyporus, Agaricus.
Rchb. 1828. Consp. p. 13; 1832. Fl. exc. p. L: fam. Hymenomycetum. Divis.: Hydnei, Polyporei, Agaricini.
Rchb. 1837. Hdb. p. 130: fam. Dermatomycetum. (*Synon. Hymenomycetes Rchb. olim.*) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 10. Divis.: Tremellini, Morchellini, Agaricini. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 308. Sect.: Tremellini, Clavariaceae, Helvellacei, Pileati.

Hymeniophori Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 151: fam. Tremellinor. Gen.: Tremella, Septocolla, Naematelia, Calocera, Exidia, Guepinia, Auricularia, Laschia.

Hymenobolus Montagne 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. IV. p. 359: nov. g. Fungor., Ascobolo analogum. (H. Agaves.)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 366: g. Patellariaceor.

Hymenobrychis DC. 1825. Prodr. II. p. 346: sect. Onobrychidis. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 152. n. 4004*b*; 1841. Nom. p. 152. n. 5952. 2. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 306. — Endl. 1841. Gen. n. 6619*b*. p. 1286; 1841. Ench. p. 670. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 711. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 68.

Hymenocallis Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 338: nov. g. Narcissear. (Pancratium littorale Jacq., etc.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158.
Herb. 1821. App. p. 43; 1825. Bot. Mag. App. p. III; 1837. Amaryll. p. 75. 209: g. Amaryllidear. (Pancratiformium.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 46.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1263: g. Narcissoinar.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 911: sect. Pancratii. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1288*a*. p. 179; 1841. Ench. p. 103. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1171. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (297).
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 430: subg. Pancratii. — Par. Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 161.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 16. 166: g. Narcissinear.
Kunth 1850. Enum. V. p. 664: g. Pancratiear.

Hymenocalyceae Rchb. 1837. Handb. p. 287: subdiv. Hibiscear. Gen.: Hymenocalyx.

Hymenocalyx Zenker 1835. Pl. Ind. p. 8. t. 10: nov. g. Malvacear. (H. variabilis.) *Cf.* Flora Lit. VI. p. 64 et Linnaea X. Litt. p. 162.
Meisn. 1837. Gen. p. 27 (23): g. Hibiscear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 287: g. Hymenocalycear.
= Abelmoschus Medic.

Hymenocardia Wallich 1831. Catal. n. 6816.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 441; 1847. Veg. kd. p. 283: g. Scepacear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1899. p. 288; 1841. Ench. p. 174. — Meisn. 1841. Gen. p. 347 (258).
Rchb. 1841. Nom. p 67. n. 2514: g. Scepear.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 25: g. Urticeis aff.
Tulasne 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 256: g. Antidesmear.?
Baill. 1858. Euphorb. p 599: g. Wielandiidear.

Hymenocarpa Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 50: class. XII. Cryptogamor. Ord.: Lytothecia, Hymenothecia, Dermatothecia.

Hymenocarpi G. F. W. Meyer 1825. Entw. Flecht. p. 330: ordo 3 Lichenum. Gen.: Graphis, Asterisca, Leucogramma, Platygramma, Glyphis, Lecidea, Patellaria, Cladonia, Stereocaulon, Parmelia, Sticta, Peltigera.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 185: subordo Lichenum. Gen.: Conioloma, Opegrapha, Antherisca, Leucogramma, Platygramma, Glyphis, Graphidium, Urceolaria, Patellaria, Psoroma, Gyrophora, Lecanora, Parmelia, Euernia, Cetraria, Ramalina, Cornicularia, Sticta, Peltidea, Cenomyce, Sphaerophorus, Alectoria, Usnea, Collema, Coenogonium.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 238; 1831. Gen. II. p. 743: subdiv. Lichenum Angiosporor. Gen. Meyeriana et 1831: Diorygma, Fissurina, Collema.
= Hymenothalami Fries.

Hymenocarpoides Griseb. 1843. Spicil. fl. Rumel. I. p. 16: sect. Medicaginis. (M. radiata L.)
Synon. Lunaria Godr.

Hymenocarpos Savi 1798. Fl. pis. II. p. 205. *Cf. seq.*
Link 1822. En. II. p. 267: g. Leguminosar.
Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 171: sect. Medicaginis. — Par. Koch 1836. Syn. p. 160. Ed. II. p. 176.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 173: g. Trifoliear.
= Circinus Medic.

Hymenocarpus „Savi" Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3877*a:* sect. Medicaginis. *Cf. praeced.*
Link 1831. Hdb. II. p. 195: g. Galegoidear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 514: g. Genistear.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 15: g. Anthyllidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Trifoliear. — Par. Bernh. 1847. Allg. Thür. Gartenz. Nr. 1. p. 10.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 382: g. Vulnerariear.
Circinus Medic.

Hymenocentron Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1828. v. 55. p. 351; 1830. v. 60. p. 571: g. Cyanear. (Centaurea diluta Ait.)
DC. 1836. Pr. V. p. 591: sect. Centaureae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *v.* p. 474; 1841. Ench. p. 246.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11. 71: subg. Centaureae.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 3 *h:* subsect. Cyani.

Hymenocephalus Jaub. & Spach 1847. Ill. pl. or. III. p. 12. t. 209: nov. g. Centauriear. (H. rigidus.) *Cf.* Flora 1852. p. 712. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 450.

Hymenochaeta Schult. vid. *seq.*

Hymenochaete „Palis. mss." Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 26 et Schult. Mant. II. p. 2: *Hymenochaeta*): nov. g. Scirpear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1124. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 293; 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 264.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
Pterolepis Schrad.

Hymenochaete Léveillé 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 150; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487 (sphalm. *Hymmochaete*): nov. g. Thelephoreor. (Thelephora undulata Fr., etc.)
Synon. Sterei et Corticii sp. Auct.

Hymenocharis Salisbury 1812. Trans. hort. soc. I. (1815.) p. 276: nov. g. Cannear. (Maranta obliqua Rudge.)

Hymenocladia „J. Agdh. Spec. II. 1. p. 772" Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 695: g. Chondriear. (Fucus Usnea Turn.)

Hymenoclea Torrey & A. Grey 1848 apud Emory p. 142: nov. g. Ambrosiear. (H. (Salsola et monogyra.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 850.
A. Gray 1849. Pl. Fendl. p. 79. *Cf.* Flora 1850. p. 710.

Hymenocrater Fisch. & Meyer 1835. Ind. sec. h. Petrop. p. 39: nov. g. Labiatar., Holmskioldiae et Roylеae proximum. (H. bituminosus.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. V. 1836. p. 300 et Linnaea 1837. Litt. p. 108.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 856: g. Stachydear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 167. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 356. 463.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 107. n. 4168: g. Scutellariear.
Endl. 1838. Gen. n. 3669. p. 630; 1841. Ench. p. 308: g. Ballotear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 289 (197). — Walp. 1845. Rep. III. p. 894. 990.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 662: g. Ballotidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 406: g. Nepetear.
Synon. Sestinia Boiss.

Hymenocybe Fries 1836. Epicr. p. 178; sect. Hebelomae.

Hymenocystis C. A. Meyer 1831. Verz. cauc. Pfl. p. 229: nov. g. Filicum. (H. caucasica: antea *Hymenolaena.*)
Endl. 1841. Spl. I. n. 648/1. p. 1350; 1841. Ench. p. 37: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1037.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Physematium Kaulf. (Ledeb. Ross. IV. p. 512.)

Hymenodea Benth. . . . . sect. Ingae.
Synon. Hymenaeodeae DC.

Hymenodes Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 38; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 459: sect. 5 Muscor. Gen.: Atrichum (1822 Catharinea), Pogonatum, Polytrichum.

Hymenodictyon Wallich 1824 in Roxb. Fl. ind. II. p. 148: nov. g. Rubiacear. (Cinchona excelsa et thyrsiflora Roxb.)
Rchb. 1828. Consp. p. 212c. n. 5560: inter genera vix cognita.
D. Don 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 142. Char. emend.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 480: g. Cinchonear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 157 (113).
Endl. 1841. Ench. p. 274. n. 3270: g. Eucinchonear.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2906: g. Quinquinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.
Synon. Hymenodyction DC.; Kurria Hochst.

Hymenodium Fée 1844. Acrost. p. 90; 1852. Gen. Fil. p. 58: nov. g. Acrostichear. (H. crinitum, etc.)
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 428: sect. Acrostichi.
Presl 1850. Epimel. bot. p. 536: sect. Anetii.

Hymenodon Hook f. & Wils. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 548: nov. g. Muscor. (H. piliferus.)
C. Müll. 1847. Bot. Zeit. p. 802: g. Rhizogoniacear. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 117.
C. Müll. 1848. Syn. Musc. I. p. 178: g. Mniacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: g. Rhizogoniear.

Hymenodyction „Wallich" DC. 1830. Prodr. IV. p. 358: g. Cinchonear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 392. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 392. — Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 15. t. 1159. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 153.
Endl. 1838. Gen. p. 555. n. 3270; 1843. Spl. III. p. 73: g. Eucinchonear.
= Hymenodictyon Wall.

Hymenogaster Vittadini 1831. Tuberac. p. 30: nov. g. Hymenogastereor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 353. p. 30; 1841. Ench. p. 17. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 250. — Bonord. 1851. Hdb. p. 242.
Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 338: g. Hymenogasterum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 26; 1842. Mycol. p. 108: g. Splanchnomycetum.

Hymenogaster Vittadini cont.
L. R. & Ch. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX. p. 373: g. Lycoperdaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 436: g. Hymenogastreor.
Bail 1858. Syst. p. 9. t. 27: g. Euhymenogastreor.
Synon. Argylium Wallr.; BullardiaJungh.; Buliiardia Wittst.

Hymenogasterei Vittadini 1831. Tuberac. p. 11.
Endl. 1836. Gen. p. 30; 1841. Ench. p. 17: subtrib. Tuberaceor. restricta. Gen.: Hymenogaster, Gautiera.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 249: subsect. Tuberaceor. Gen.: Hydnangium, Hymenangium, Hymenogaster, Sphaerosoma, Gautiera.
Bonord. 1851. Hdb. p. 240: fam. Trichogastrum. Gen. ut Rabenh. (excepta Sphaerosoma) et Octaviania, Splanchnomyces.

Hymenogasteres Rchb. 1841. Nomencl. p. 8: sect. Tuberaceor. Gen.: Hydnangium, Hymenangium, Hymenogaster, Sphaerosoma, Octaviania, Gautiera.

Hymenogastrei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 435: div. Tuberaceor. Gen.: Gautiera, Rhizopogon, Hymenogaster, Mylitta, Hydnangium, Octaviania, Hyperrhiza, Hysterangium.
Bail 1858. Syst. p. 8: fam. Hymenomycetum. Divis.: Gautieriei, Euhymenogastrei, Melanogastrei.

Hymenoglossum Presl 1844. Hymenophyll. p. 127: nov. g. Hymenophylloidear. (Hymenoph. cruentatum Cav.)

Hymenogramme Mont. & Berk. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 329. t. 14: nov. g. Hymenomycetum, Lenziti aff. (H. javensis.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: g. Agaricinor. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 315.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Polyporeor.

Hymenogyne Haworth 1821. Revis. pl. succ. p. 192: nov. g. Icosandr. Pentagyn. (Mesembryanthemum glabrum Ait.)
Rchb. 1841. Nom. p. 166. n. 6461. 2: sect. Mesembryanthemi.
= Mesembryanthemi Linn. pars.

Hymenolacis Tulasne 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XI. p. 99: sect. Apinagiae. (Lacis pygmaea et membranacea Bong.)

Hymenolaena DC. 1830. Prodr. IV. p. 244: nov. g. Smyrnear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 378. — Endl. 1839. Gen. n. 4538. p. 791; 1841. Ench. p. 380. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 988.
Tausch 1834. Flora I. p. 345: g. Angelicear.? — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 134.
Rchb. 1837. Hdb. p. 219; 1841. Nom. p. 139. n. 5357: g. Smyrniear.

Hymenolaena DC. cont.
Meisn. 1838. Gen. p. 151 (108): g. Pleurospermear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1850. Spl. V. p. 15: g. Eusmyrnear.

Hymenolaena C. A. Meyer olim (Fée Gen. Fil. p. 358). vid. *Hymenocystis Meyer.*

Hymenolepis Cassini 1817. Bull. soc. philom. Sept. p. 138; 1821. Dict. v. 22. p. 315; 1824. v. 33. p. 61: nov. g. Anthemidear. (Athanasia parviflora et crithmifolia.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 141. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 24. (verar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 39.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 179; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 579: g. Santolinear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 104. n. 2385.
Less. 1832. Syn. p. 263: g. Athanasiear. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 85. Sect.: Microrachis, Planorachis, Coenorachis. — Meisn. 1839. Gen. p. 211.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 293; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 210: g. Euanthemidear. Subgen.: Pentodon.
Synon Metagnanthus Endl.

Hymenolepis Kaulfuss 1824. Enum. Fil. p. 146: g. Polypodiacear. (Acrostichum spicatum L.) — Par. Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 200. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.)
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262: g. Blechnear.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 66. n. 3249; 1831. Gen. II. p. 722. n. 3642: g. Filicum verar.
Rchb. 1828. Consp. p. 38. n. 707: g. Blechnoidear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Rizospermar.
Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 987. 7 a: subsect. Gymnopteridis.
Presl 1850. Epimel. bot. p. 518: g. Acrostichacear.?
Fée 1852. Gen. Fil. p. 50: g. Pseudo-lomariear. (includens Macroplethum Presl.)
Gymnopteris Bernh.

Hymenolobium Benth. (ubi?) ex Steud. Nomencl. I. p. 784; II. p. 412: g. Dalbergiear. (Pterocarpus luteus Arrab.)

Hymenolobus „Nuttall" Torrey & A. Gray 1838. Fl. North-Am. I. p. 117: nov. g. Lepidinear. (H. divaricatus et erectus.) — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 74. n. 4927/$_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 341. — Walp. 1843. Rep. II. p. 761. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 212.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 664: g. Siliculosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Lepididar.

Hymenolytrum „Schrad." Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 174: nov. g. Scleriear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 372.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g. Sclerear.

Hymenomena Less. vid. *Hymenonema Cass.*

Hymenomycetes Fries 1821. Syst. mycol. I. p. LIII: class. Fungor. Ord.: Sclerotiacei, Tremellini, Uterini, Hymenini. Ordines ibid. p. 2: Pileati, Clavati, Mitrati, Cupulati, Tremellini, Sclerotiaceae. *Cf.* Isis 1823. p. 615. — Par. Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 233. Subclass.: Exospori, . . .
Agdh. 1821. Aphor. p. 85; 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: ordo Fungor. Divis.: Cupulaeformes, Clavati, Pileati.
Fries 1825. Pl. homon. p. 50. 63: cohors Ascomycetum. Ord.: Pileati, Elvellacei, Clavati, Tremellini.
Rchb. 1828. Consp. p. 1. 12; 1832. Fl. exc. p. L: formatio Dermatomycetum. Fam.: Tremellini, Morchellini, Hymenini.
Bartl. 1830. Ord. p. 7: ordo Fungor. — Par. Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 407. Divis.: *H. angiospori* (gen. 291—310) et *gymnospori* (gen. 311—350). — Endl. 1836. Gen. p. 34; 1841. Ench. p. 20. Subord.: Tremellini, Clavariei, Helvellacei, Pileati. — Corda 1842. Mycol. p. XCIII. 149. Subord.: Ascophori, Basidiophori. — Brongn. 1843. En. genr. p. XII. 2. Fam.: Agaricineae, Pezizeae. — Bonord. 1851. Hdb. p. 157. Fam.: Auricularini, Clavariacei, Hyduei, Polyporei, Agaricini. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 146. Subord. ut Corda.
Fries 1836. Epicr. p. 2. 595; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 267: fam. prima Fungor. Ord.: Agaricini, Polyporei, Hydnei; Auricularini, Clavariei, Tremellini.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: ordo Fungalium. Subord.: Agaricini, Polyporei, Hydnei, Auricularini, Clavati, Tremellini.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 218: fam. (172) Funginar.
Bail 1858. Syst. p. 7: ordo Basidiosporear. Trib.: Hymenogastrei, Clathracei, Lysuroidei, Phalloidei, Tremellini, Clavariacei, Auricularini, Hydnei, Polyporei, Agaricini.
Synon. Agaricaceae Lindl.

Hymenomyci Wahlenb. 1826. Fl. suec. II. p. 918: div. Fungor. Subdivis.: Pileati, Clavati, Cupulati. *Anomali* (gen.: Auricularia, Tremella, Dacrymyces, Agyrium, Sclerotium, Rhizoctonia, Spermoedia).

Hymenonema Cassini 1817. Bull. soc. philom. Févr. p. 34; 1821. Dict. v. 22. p. 316: nov. g. Lactucear. (Catananche graeca L.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 146.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 66: g. Scorzonerear. (anomal.) — Par. Less. 1832. Syn. p. 133 (*Hymenomena*). — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 116. — Endl. 1838. Gen. n. 2996. p. 497; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 235 (144). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 8. — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3694. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.

Hymenonema Cassini cont.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 586: g. Catanancear.
Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2132: g. Hyoseridear.

Hymenonema Hook. 1833. Fl. bor. Am. I. p. 300: g. Cichoracear. (H.? glaucum et laciniatum.)
= Calais DC.

Hymenopappeae Cassini 1828. Dict. v. 55. p. 265; 1830. v. 60. p. 575: subdiv. Heleniear. Gen.: Cephalophora, Hymenoxys, Polypteris, Hymenopappus, Florestina.

Hymenopappus L'Herit. 1798. Diss.
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1776. n. 1458: g. Syngenes. Aequal. — Par. Michx. 1803. Fl. bor. Am. II. p. 103. — Pers. 1807. Ench. II. p. 403. n. 1824. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 139.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 420: g. Corymbiferar. — Par. Link 1822. En. II. p. 309.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 260: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 494. — Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Cass. 1821. Dict. v. 20. p. 348; 1821. v. 22. p. 318; 1825. v. 38. p. 16: g. Heleniear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2589; 1841. Nom. p. 83. n. 3185. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 316. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 449. n. 2701; 1831. Gen. II. p. 613. n. 3035: g. Eupatorinar.
Cass. 1828. Dict. v. 55. p. 266. 279; 1830. v. 60. p. 575: g. Hymenopappear. (restrict.)
Less. 1831. Linnaea VI. p. 520; 1832. Syn. p. 238: g. Galardiear.
DC. 1836. Pr. V. p. 658: g. Euheleniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2592. p. 422; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 206 (133). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 371.
Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 374: g. Gaillardiear.
Synon. Rothia Lam.

Hymenophallus Nees 1816. Syst. p. 251; 1817. Ueberbl. p. 65: g. Fungor. pistillarium. (Phallus Hadriani Pers.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 321.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 16: g. Phallor.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 282: trib. Phalli. — Simil. Hook. & Arn. 1832. Beech. voy. Bot. Pt. II. p. 78.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 580: g. Phalloidar.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 498. n. 3486; 1831. Gen. II. p. 766. n. 3917: g. Utrinor.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 94: g. Orthomycetum.
Endl. 1836. Gen. n. 358*e*. p. 31; 1841. Ench. p. 18: sect. Phalli.

Hymenophallus Nees cont.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 29. 73; 1842. Mycol. p. 120: g. Phalloidear. — Par. Zobel 1854 in Corda Ic. VI. p. 20.
Bonord. 1851. Hdb. p. 259: g. Phalloideor. — Par. Bail 1858. Syst. p. 15. t. 24.
Synon. Dictyophora Desv.; Dictyopeplos Hass.; Sophronia Pers.; Retigerus Raddi; Junia Dumort.

Hymenopholis Gardner 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 88: nov. g. Tarchonanthear. (H. imbricata.)

Hymenophoreae Presl 1836. Pterid. p. 64: cohors Cathetogyratar. Trib.: Peranemaceae, Aspidiaceae, Aspleniaceae, Davalliaceae, Dicksoniaceae, Adiantaceae.

Hymenophylla Stackhouse 1816. Ner. brit. Ed. alt.: nov. g. Algar. *Cf.* Spreng. 1820. Neue Entd. I. p. 96 et Leman 1821. Dict. v. 22. p. 323.
. . . ?

Hymenophyllaceae Gaudich. 1826 in Freyc. voy. Bot. p. 262: trib. Gyratear. Subtrib.: Dicksonieae, Davallieae, Hymenophylleae, Schizolomeae.
Presl 1836. Pterid. p. 6: ordo Filicinear.
Presl. 1844. Hymenoph. in Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 93: ordo Filicum. Trib.: Trichomanoideae, Hymenophylloideae. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 577.
Presl 1848. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge V. p. 330: ordo Pleurogyratar. Gen. novum: Homoeotes.

Hymenophyllaceites Sternb. 1838. Vers. II. p. 108: ordo plant. foss. Gen.: Hymenophyllites, Rhodea, Schizopteris, Aphlebia.

Hymenophylleae „Bory" Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262: subtrib. Hymenophyllacear. Gen.: Trichomanes, Didymoglossum, Feea, Hymenostachys, Hymenophyllum.
Rchb. 1828. Consp. p. 37: subdiv. Polypodiacear. indusiatar. Gen.: Hymenophyllum, Trichomanes.
Endl. 1833. Norf. p. 16; 1836. Gen. p. 64: ordo Filicum. Gen. ut Rchb. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1351 et Ench. p. 40) Loxsoma. — Par. Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 15. 112. Gen. ead.
Rchb. 1837. Hdb. p. 139: div. Pteroidear.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 152: ordo unicus Thecaspermar. Gen. ut Rchb.
Rchb. 1841. Nom. p. 27: div. Polypodiacear. Gen. ut 1828 et Loxosoma.
Brongn. 1843. En. genr. p. 5: trib. Filicum. Gen.: Hymenophyllum. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. Gen. ut Endl. 1841 et Hymenostachys, Feea. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 10.
Meisn. 1843. Gen. p. 435 (335): trib. Polypodiacear. Gen. ut Endl. 1841.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: subordo Polypodiacear. Gen. ead.
Kunze 1847. Bot. Zeit. p. 183. Gen. ut Rchb.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 309: fam. Filicum. Gen.: Hymenophyllum.

Hymenophyllites Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 173. 251; 1841. Gatt. foss. Fil. p. 53: g. Sphenopteridum. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 69; 1846. Chlor. prot. p. XLII.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 108: g. Hymenophyllaceitum.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 69: g. Filicum foss.
Synon. Rhodea Sternb.

Hymenophylloideae Presl 1844. Hymenoph. p. 118: trib. Hymenophyllacear. Gen.: Leptocionium, Myrmecostylum, Ptychophyllum, Hymenophyllum, Sphaerocionium, Hymenoglossum.

Hymenophyllon Miquel 1844. Syst. Piperac. II. p. 529; 1852 in Mart. Fl. Bras. fasc. XI. p. 62: sect. Artanthes. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 18. n. 1823/$_{11}$ *k*.

Hymenophyllum Smith 1797 in Römer Arch. I. 2. p. 56; 1799 in Usteri n. Ann. XVII. p. 106; 1804. Fl. Brit. III. p. 1141: nov. g. Filicum. (dorsiferar.) — Par. Bernh. 1799 in Schrad. Journ. I. p. 302. — Swartz 1800 in Schrad. Journ. II. p. 7. 98 (annulatar.); 1806. Syn. p. 145. (gyratar.) — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 47. — DC. 1805. Franç. II. p. 547. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 253. — Leman 1821. Dict. v. 22. p. 323. — Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 331. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 131. n. 3283; 1831. Gen. II. p. 726. n. 3677. (desc isc.)
Bernh. 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 17: g. Helicogyratar.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 32: g. Gyrator.
Willd. 1810. Sp. V. p. 516. n. 1982: g. Schismatopteridum.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 159. Ed. Nees p. 15: g. Polypodiacear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 26. — Kunth 1822. Syn. I. p. 89. — Agdh. 1822. Aphor. p. 117. — Kaulf. 1824. En. Fil. p. 267. — Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 69. — D. Don 1825. Nepal. p. 11. — Blume 1830. En. pl. Jav. II. p. 220. — Bartl. 1830. Ord. p. 17. (indusiatar.) — Math. 1853. Belg. II. p. 17.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 18: g. Cyathear.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 374: g. Hymenophyllear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 37. n. 674; 1841. Nom. p. 27. n. 982. — Endl. 1836. Gen. n. 657. p. 64; 1841. Ench. p. 40. — Link 1841. Fil. h. Berol. p. 153. — Meisn. 1843. Gen. p. 435 (335). — Brongn. 1843. En. genr. p. 5; 1849 in Orb. Dict. V. p. 694. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 308. — Webb 1850. Canar. III. p. 446. — Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 10. — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 112. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 642.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67: g. Trichomanear. — Par. J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 418; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 432.

Hymenophyllum Smith cont.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 104: g. Hizospermar.
Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 28: g. Cnemipteridum.
Kunze 1834. Linnaea IX. p. 107: g. Trichomanoidear.
Hook. 1844. Spec. Fil. I. p. 86: g. Eudicksoniear. *Cf.* Kunze 1847. Bot. Zeit. p. 183.
Synon. Ptychomanes Hedw.

Hymenophyllum Presl 1844. Hymenoph. p. 121: g. restrict. Hymenophylloidear. Sect.: Sphaerodium, Euhymenophyllum, Cycloglossum, Craspedophyllum.

Hymenophysa C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Fl. Alt. III. p. 180 (Ic. pl. II. t. 165): nov. g. Lepidinear. (H. pubescens.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4933. p. 580; 1841. Ench. p. 450. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 208. — Walp. 1842. Rep. I. p. 179.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 513. n. 2513: g. Synclistar.
Meisn. 1837. Gen. p. 13 (13): g. Camelinear.? — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 260.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6937: g. Lepidiear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325: g. Carcerulosar.
Dietr. 1841. Syn. III. p. 631. 672: g. Siliculosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Lepididar.

Hymenophyton Dumort. 1835. Rec. obs. Jung. p. 25: nov. g. Dilaenear. (Jung. flabellata et Hymenophyllum Hook.)
Synon. Symphyogyna Nees & Mont.; Viviania Raddi; Amphibiophytum Karst.; Symphyogyne Wittst.

Hymenopodium Corda 1837. Ic. Fung. I. p. 7. t. 2. f. 121; 1842. V. p. 4; 1842. Mycol. p. 16: nov. g. Phragmidiacear. (H. sarcopodioides.)
Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 28: g. Phragmidiaceor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 33.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Torulaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 492: g. Phragmidieor.

Hymenopogon Wallich 1824 in Roxb. Fl. Ind. II. p. 156: nov. g. Pentandr. Monogyn., Cinchonae aff. (H. parasiticus.) — Par. Spreng. 1827. Cur. post. p. 50.
Rchb. 1828. Consp. p. 95. n. 2054: g. Cinchonear. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 282. — DC. 1830. Pr. IV. p. 351. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 473. — Meisn. 1838. Gen. p. 157 (113). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 154.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 165. n. 830: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 724.

Hymenopogon Wallich cont.
Endl. 1838. Gen. n. 3276. p. 536; 1841. Ench. p. 274: g. Eucinchonear.
Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2912: g. Quinquinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonidar.

Hymenopogoni Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: series Muscor. Trib.: Polytricheae.

Hymenopogum*) Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 29: nov. g. Entopogoneor. (Buxbaumia foliosa Hedw.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 325.
= Diphyscium Ehrh.

Hymenopsorae Rchb. 1828. Consp. p. 21 (1832. Fl. exc. p. L): formatio Ascopsorar. Fam.: Graphideae, Parmeliaceae, Cladoniaceae.
= Hymenothalami Fries.

Hymenopteris „R. Br." Sternb. 1825. Vers. I. p. XXII: g. Filicum verar.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 103: g. Hizospermar.
= . . .?

Hymenopteris Mantell 1827. Ill. geol. Sussex p. 55.
= Sphenopteris Brongn.

Hymenopteris „Kaulf." Link 1841. Fil. h. Berol. p. 73: g. Aspleniacear. (Nomen.)

Hymenopus Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 212: sect. Licaniae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 6.

Hymenopyramis Wallich 1831. Catal. n. 774: g. Verbenacear. *Cf.* Endl. Gen. p. 638. — Par. Walp. 1845. Rep. IV. p. 33 (dubium). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 664. (?)
Rchb. 1841. Nom. p. 108. n. 4221: g. Aegiphilear.?
Griff. 1843 in M'Clell. Calc. journ. III. p. 365.
Schauer 1847 in DC. Pr. XI. p. 626: g. Caryopteridear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 903.

Hymenoria Achar. mss.
= Thelotrema Achar.

Hymenoscyphus Nees 1817. Syst. Ueberbl. p. 71: fam. Pezizar. pedicellatar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 673: g. Pezizadear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 117 (*Hymenoscyphae*): trib. Phialeae. Sect.: Ciborioideae, Cyathoideae, Volutelleae.
Endl. 1836. Gen. n. 430 *A d.* p. 37; 1841. Ench. p. 21: subsect. Phialae. Divis.: Volutellaria, Capula, Ciborium. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 448. 1 *d.* Divis. eaed. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 351.

*) ὑμήν, membrana; πώγων, barba.

Hymenospermum „Benth. in Wall. Catal." Steud. 1840. Nomencl. I. p. 784: g. Scrophularinar. (H. dentatum.)

Hymenosphace Benth. 1833 in Hook. Bot. Misc. III. p. 373; 1833. Labiat. p. 214; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 271: sect. Salviae. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 725. — Endl. 1838. Gen. n. 3597*b.* p. 614; 1841. Ench. p. 307. — Rchb. 1841. Nom. p. 107. n. 4144. 7. — Walp. 1845. Rep. III. p. 604.
Synon. Schraderia Mönch.

Hymenosporangiae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 523): ordo Homorganor. rhizosporor. Fam.: Helvelloideae, Hydnoideae, Boletoideae, Agaricineae.

Hymenosporae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72: series Mycosporar. Ord.: Fungarieae, Clathrarieae, Tremellarieae.

Hymenospron*) Spreng. 1827. Cur. post. p. 264. 283; 1831. Gen. II. p. 586. n. 2880: nov. g. Leguminosar.
= Dioclea Kunth.

Hymenostachys Bory 1826. Dict. class. VIII. p. 462: g. Filicum a Trichomane sejunctum. *Cf.* Leman 1828. Dict. v. 55. p. 232.
Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 262: g. Hymenophyllear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Rchb. 1828. Consp. p. 37. n. 675*b*: sect. Trichomanis.
J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 431: g. Trichomanear. — Par. Presl 1844. Hymenoph. p. 103.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 114: subg. Trichomanis.

Hymenostegia J. Smith 1842. Lond. journ. bot. I. p. 666: sect. Alsophilae. (A. australis R. Br., etc.)

Hymenostephus Jaub. & Spach 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XX. p. 85: subg. Gailloniae. (G. hymenostephana Jaub. & Sp.) — Simil. Walp. 1847. Rep. VI. p. 33.

Hymenostigma Hochstett. 1844. Flora I. p. 24: nov. g. Iridear., Vieusseuxiae proximum. (Iris diversifolia Steud.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.

Hymenostomia Wittst. vid. *Hymenotomia Gaudich.*

Hymenostomum R. Brown 1819. Linn. Trans. XII. 2. p. 572 (Verm. bot. Schr. II. p. 722): nov. g. Muscor. (Gymnostomum microstomum.) — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 147. n. 3293; 1831. Gen. II. p. 728. n. 3689. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 112. (anoplostomor.)
Nees & Hornsch. 1823. Bryol. germ. I. p. 188: g. Acrocarpor. peristomor. — Par. Brid. 1827. Bryol. II. p. 73. (et ibid. p. XLII g. Gymnostomoideor.)

*) ὄσπριον, legumen.

Hymenostomum R. Brown cont.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 58: g. Weissioidear. — Par. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 80.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 107: g. Orthobryor.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 66: g. Gymnostomor.
Endl. 1836. Gen. n. 484. p. 48; 1841. Euch. p. 30: g. Bryacear. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 6.
Genth 1836. Nass. I. p. 159: g. Bryoideor.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 859: g. Calyptrobryor.
Bruch, Schimp. & Gümb. 1846. Bryol. eur. fasc. 33—36 (I. p. VII): g. Weissiacear. Sect.: Microstoma, Tortilia. — Par. Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 123. — Bayrh. 1849. Taun. p. 6.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 96: g. Dicranear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissieae.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 660: sect. Weisiae.

Hymenostylium Brid. 1827. Bryol. II. p. 81: nov. g. Acrocarpor. peristomor. (ibid. p. XLII Gymnostomoideor.)
Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 585: g. Gymnostomeor.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 59: g. Zygodontoidear.
Endl. 1836. Gen. n. 485. p. 48; 1841. Euch. p. 30: g. Bryacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 860: g. Calyptrobryor.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 562: sect. Weisiae.

Hymenota DC. 1825. Prodr. II. p. 110: sect. Pultenaeae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4061*b*. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 122.
Pultenaea Smith emend.

Hymenothalamae Wahlenb. 1826. Fl. suec. II. p. 795: div. Algar. terrestr. Gen.: Lichen, Peltidea, Usnea, Baeomyces, Stereocaulon.

Hymenothalameae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 50: div. Lichenalium. Trib.: Ephebidae, Lecideidae, Parmeliadae, Usneidae.

Hymenothalami Fries 1821. Kongl. Vet. Ac. Handl. II. p. 322. 324: ordo (4) Lichenum. Series, Discoidei, Cephaloides. — Par. Fries 1825. Pl. homon. p. 233 (ordo 1). Trib.: Usneaceae, Parmeliaceae, Lecidinae, Collemaceae. — Bartl. 1830. Ord. p. 8. — Endl. 1836. Gen. p. 14; 1841. Ench. p. 10 Trib. ut Fries 1825.
Synon. Hymenocarpi Meyer; Hymenopsorae Rchb.

Hymenothalli Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 100: subordo Ulvacear. Trib.: Ulveae, Phycoserideae, Ileinae.

Hymenotheca Salisb. 1812 in Trans. hort. soc. I. (1815) p. 268: nov. g. Hydrocharidear. (Damasonium indicum Ker.)
= Ottelia Pers.

Hymenothecae Leman 1817. Dict. v. 8. p. 105: sect. Gymnocarpor. Subsect.: Helvelloidei, Claviformes, Gymnodermates, Hydnoidei, Boletoidei, Agaricoidei.

Hymenotheceae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 595: fam. Fungor. Divis.: Agaricideae, Myccnadeae, Pratellideae, Asterophorideae, Merulideae, Daedalideae, Boletideae, Suillideae, Sistotremideae, Hydnideae, Thelephorideae, Clavarideae, Geoglossideae, Helvellideae, Pezizadeae, Ascobolideae.

Hymenothecia Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 51: ordo Hymenocarpor. Gen.: Amanita, Agaricus, Merulius, Daedalea, Boletus, Sistotrema, Hydnum, Thelephora, Merisma.

Hymenothecii Pers. 1801. Syn. Fung. p. XVI: ordo Gymnocarpor. Divis.: Agaricoidei, Boletoidei, Hydnoidei, Gymnodermata, Clavaeformes, Helvelloidei.
Rebent. 1804. Neom. p. 364: div. 2 Fungor. Subdivis. eaed.

Hymenothecium Pers. 1797. Tent. disp. p. 17. 62: ordo Gymnothecii. Gen.: Agaricus, Cantarellus, Merulius, Boletus, Sistotrema, Poria, Fistulina; Hydnum, Hericium, Odontia; Stereum, Corticium, Tremella; Helotium, Craterella, Peziza, Ascobolus, Solenia, Morchella, Helvella, Spathularia, Mitrula, Geoglossum, Clavaria, Puccinia, Ascophora, Stilbum, Aegerita; Coprinus, Lactaria, Russula, Amanita, Gomphus, Acrospermum, Merisma.

Hymenothecium Lagasca 1816. Nov. gen. et spec. p. 4: nov. g. Triandr. Digyn. (Cynosurus tenellus Cav.)
Pleuraphis Torr.

Hymenothrix A. Gray 1849. Pl. Fendl. (Mem. Amer. Ac. IV. 1.) p. 102 adnot. (Flora 1850. II. p. 712): nov. g. Helenicar. (H. Wislizeni.)
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 877: g. Euheleniear.

Hymenotomia Gaudich. 1826. Freyc. voy. Bot. p. 378: g. Filicum indicat. (*Hymenostomia Wittst.* Etym. Handw. p. 462.)
Stenoloma Fée?

Hymenotrichi Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLVII: sect. Byssaceor. Gen.: Ozonium, Rhizomorpha, Xylostroma.

Hymenoxis Endl., Spach, Rchb. vid. *seq.*

Hymenoxys Cassini 1828. Dict. v. 55. p. 265. 278; 1830. v. 60. p. 575: nov. g. Hymenopappear. (Hymenopappus anthemoides Juss.)
Less. 1832. Syn. p. 240: subg. Cephalophorae.
DC. 1836. Pr. V. p. 661: g. Euheleniear. Sect.: Euhymenoxys, Oxypappus. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2598. p. 423; 1841. Ench. p. 240 (*Hymenoxis*). Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 206 (133). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 380.

Hymenoxys Cassini cont.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18 (*Hymenoxis*): g. Heleniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3191 (*Hymenoxis*). Sect.: Hymenoxys, Oxypappus. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Hymenula Fries 1825. Pl. homon. p. 94: g. Hymenulor. (antea *Hymenella Fr.*) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 281.

Fries 1828. Elench. II. p. 37: g. Tremellinor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 525: g. Hymenomycetum gymnosporor.

Fries 1838. Epicr. p. 593: g. Tremellinar.

Corda 1838. Ic. Fung. II. p. 31; 1839. II. p. 33: g. Tubercularinor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 64. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 50.

Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 414: g. Tremelleor.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 38; 1842. Mycol. p. 160: g. Tuberculariacear.

Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 471: g. Hymenulaceor.

Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Tubercularieor.

Bonord. 1851. Hdb. p. 142: g. Hymenularior.

= Leioderma Pers.?

Hymenulacei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 470: ordo Gymnomycetum. Gen.: Apyrenium, Dacrymyces, Epidochium, Catinula, Hymenula, Sarcopodium, Periola, Pactilia, Fusarium, Fusisporium.

Hymenularii Bonorden 1851. Handb. Mykol. p. 142: fam. Mycetinor. Gen.: Hymenula, Myrothecium, Melanostroma, Tricholeconium, Cyphella.

Hymenuli Fries 1825. Pl. homon. p. 94: trib. Tremellinor. Gen.: Phyllopta, Agyrium, Hymenula. — Par. Endl. 1836. Gen. p. 34; 1841. Ench. p. 20. Gen.: Leioderma, Agyrium.

Rchb. 1828. Consp. p. 12: div. Tremellinor. Gen. ut Fries et Amphiphytum?

Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 308: subsect. Tremellinor. Gen.: Pyronema, Agyrium.

Hymmochaete Lév. vid. *Hymenochaete Lév.*

Hyobanche*) „Thunb." Linn. 1771. Mant. II. p. 155. n. 1317: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 480; 1784. Syst. p. 574. — Reich. 1778. Gen. p. 324. n. 842. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 421. n. 1046. — Gmel. 1791. Syst. p. 955. — Pers. 1797. Syst. p. 611. — Willd. 1800. Sp. III. p. 354. n. 1187.

*) An contractum ex ὗς, sus, et Orobanche? (Beckmann.)

Hyobanche Thunb. cont.

Scop. 1777. Intr. p. 174: g. Personatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.

Juss. 1789. Gen. p. 101: g. Pedicularibus aff.

Neck. 1790. El. I. p. 338. n. 527: g. Chasmatophytor.

Vent. 1799. Tabl. II. p. 292: g. Orobanchoidear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 182. n. 1536.

St. Hil. 1805. Expos. 1. p. 233: g. Rhinanthaceis aff.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 403; 1825. Syst. II. p. 818. n. 2207; 1831. Gen. II. p. 498. n. 2449: g. Orobanchear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 121. n. 3059; 1841. Nom. p. 119. n. 4667. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28. — Bartl. 1830. Ord. p. 174. — D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 113. — Endl. 1839. Gen. n. 4191. p. 728; 1841. Ench. p. 353. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 261. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 624. — Walp. 1845. Rep. III. n. 482. 975.

Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 337: g. Pedicularium.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 635: g. Orobanchiear.

Meisn. 1840. Gen. p. 314 (224): g. Aeginetiear.

Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 505; 1847 in Lindl. veg. kd. p. 685: g. Buchnerear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 611: g. Orobanchacear.

Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 4: g. Hyobancheear.

Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 206: g. Hyobanchear.

Hyobancheae Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 206: sect. Orobanchear. Gen. Hyobancheear. Wight et Haematobanche.

Hyobancheeae Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 3. 4: subordo Orobanchacear. Gen.: Hyobanche, Campbellia, Christisonia, Harveya, Aulaya.

Hyocomium*) Bruch & Schimp. 1853. Bryol. eur. V. (fasc. 48): nov. g. Hypnacear. (Hypnum flagellare.)

Hyogeton Spach, Steud., vid. *Ilyogeton Endl.*

Hyophila Brid. 1826. Bryol. I. Suppl. p. 760: novum nomen pro *Rottlera Brid.* propositum.

Brid. 1827. Bryol. II. p. XLII: g. Gymnostomoideis aff.

Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 584*c*: sect. Gymnostomi.

Endl. 1836. Gen. n. 487. p. 48; 1841. Ench. p. 30: g. Bryacear.

Rchb. 1841. Nom. p. 25. n. 862: g. Calyptrobryor.

*) ὕειν, pluere?

Hyophila Brid. cont.
Hampe 1846. Bot. Zeit. p. 266; 1847. Linnaea XX. p. 68: g. Hyophilacear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 402: g. Weissiear.
C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 558: sect. Pottiae.

Hyophilaceae Hampe 1846. Bot. Zeit. p. 266: nova fam. Muscor., Pottiaceis aff. Gen.: Hyophila, Calymperes, Syrrhopodon, Orthotheca.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 68: fam. Acrocarpor.

Hyophiladelphus C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 604: sect. Barbulae.
Synon. Tortula Hook., Mont.

Hyophilidium C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 528: sect. Syrrhopodontis.

Hyophilina C. Müll. 1849. Syn. Musc. I. p. 523: sect. Calymperis.

Hyophorbe*) Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 186. t. 120. f. 2: nov. g. Palmar. (H. indica.)
Mart. . . . . Palm. p. 164. t. 143. t. 154: g. Arecinar. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1723. p. 246; 1841. Ench. p. 135. — Kunth 1841. Enum. III. p. 175. — Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. *2251. — Meisn. 1842. Gen. p. 355 (265).
Brongn. 1843. Én. genr. p. 15: g. Arecinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 60.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.
= Sublimia Comm.

Hyophyllocarpi Brid. Bryol. II. p. XL: sphalm. pro *Hypophyllocarpi.*

Hyosciamus Hill 1769. Hort. kew. p. 137: g. Monopetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 181: g. Luridar.
Roth 1788. Germ. I. p. 92; 1789. II. p. 237: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Hoffm. 1791. Bot. Taschenb. p. 77.
Mönch 1794. Meth. p. 462: g. Petalostemonis.
DC. 1805. Franç. III. p. 607: g. Solanear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 58.
= Hyoscyamus Tourn.

Hyoscyameae Rchb. 1837. Handb. p. 201; 1841. Nomencl. p. 121: subdiv. Luridar. Gen.: Hyoscyamus, Scopolina et 1841 Physochlaina, Anisodus.
Endl. 1839. Gen. p. 664; 1841. Ench. p. 331: trib. Solanacear. Gen.: Hyoscyamus, Anisodus, Scopolia. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 276 (183). Gen. ead. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 57. 72. Gen. ead. et Physochlaina. — Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148. Gen. ut Endl. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 661. Gen. ead.

Hyoscyameae Rchb. cont.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 166: trib. Atropacear. Gen.; Hyoscyamus, Scopolia, Physoclaena, Cacabus, Thinogeton.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 546: subtrib. Solanear. Gen.: Hyoscyamus, Scopolia.

Hyoscyamidium Walpers 1845. Repert. III. p. 19: sect. Hyoscyami.
Synon. Hyoscyamus G. Don; Euhyoscyamus Ledeb.

Hyoscyamus*) Tourn. 1700. Inst. p. 117. t. 41: g. pl. class. II.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 242. Ed. Hall. 1745. p. 248: g. pl. class. IX.
Linn. 1737. Gen. p. 48. n. 136; 1737. Cliff. p. 56; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 44; 1753. Sp. I. p. 179; 1759. Syst. ed. X. p. 932. n. 219; 1762. Sp. ed. II. p. 257; 1764. Gen. ed. VI. p. 98. n. 247; 1767. Syst. ed. XII. p. 170. n. 246: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 158. — Murr. 1774. Syst. p. 184; 1784. Syst. p. 220. — Reich. 1778. Gen. p. 100. n. 264. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 133. n. 333. — Gmel. 1791. Syst. p. 397. — Pers. 1797. Syst. p. 229. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1010. n. 378; 1809. En. p. 227. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 131. — Wall. 1824 in Roxb. Ind. II. p. 237.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 512: g. Solanacear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 217. n. 494. — Bartl. 1830. Ord. p. 194. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 51. — Sendtn. 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 164. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 162 (*Jusquiame*).
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 208. n. 867: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31 (sphalm. *Hyoscyanus*); 1764. Ord. nat.: g. Luridar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 384. — Batsch 1802. Tab. p. 196. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 141. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 8. 112.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Solanear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 124; 1827. Dict. v. 49. p. 408. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 368. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 285. — Hedw. 1806. Gen. p. 103. n. 462. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 459; 1825. Syst. I. p. 615. n. 650; 1830. Gen. I. p. 150. n. 748. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXIII. 308. n. 698. — Link 1821. En. I. p. 177; 1829. Hdb. I. p. 558. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 329. — Lois. 1822. Dict. v. 24. p. 293 (*Jusquiame*). — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 227. — Nees 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 77. — Koch 1837. Syn. p.

*) ὗς, sus; φορβή, nutrimentum.

*) ὗς, sus; κύαμος, faba.

Hyoscyamus Tourn. cont. 509. Ed. II. p. 585. — Kunth 1838. Berol. II. p. 54. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 661. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 546.

Adans. 1763. Fam. II. p. 214: g. Personatar.

Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 93: g. Oligantherar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 369. t. 75. f. 8 (albus et Scopolia).

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 225; 1789. Phil. Bot. I. p. 72.

Neck. 1790. El. II. p. 38. n. 672: g. Darinyphytor.

Dumort. 1827. Belg. p. 38; 1829. Anal. fam. p. 24: g. Nicotianear.

Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3279; 1831. Fl. exc. p. 388; g. Daturear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 669.

Rchb. 1837. Hdb. p. 201: g. Hyoscyamear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3847. p. 664; 1841. Ench. p. 331; 1843. Spl. III. p. 78. Sect. (1843): Hyoscyamus, Belenia. — Meisn. 1840. Gen. p. 276 (183). — Walp. 1845. Rep. III. p. 19. 954. Sect.: Hyoscyamidium, Physochlaina. — Miers 1846. Lond. journ. bot. V. p. 148. — Rchb. f. . . . . in Webb Canar. III. p. 116. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 182. Sect.: Euhyoscyamus, Physochlaena. — Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 546.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 621: g. Curvembryar.

Synon. Hyosciamus Hill, etc.; Hyoscyamus et Physochlaina Don.

Hyoscyamus G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 471: g. Nicotianear., sejuncta Physochlaina restrictum.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 72; g. Hyoscyamear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4729. — Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 166.

= Hyoscyamidium Walp.

Hyoscyanus Linn. 1751 vid. *Hyoscyamus Tourn.*

Hyserideae Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: subdiv. Scorzonerear. Gen.: Agoseris, Troximon, Hyoseris, Hedypnois.

Rchb. 1828. Consp. p. 97: subdiv. Lactucear. Gen.: Lapsana, Rhagodiolus, Kölpinia; Arnoseris, Hispidella, Moscaria, Krigia, Hyoseris, Aposeris, Hedypnois, Troximon, Agoseris?, Hymenonema, Catananche, Cichorium.

Less. 1832. Syn. p. 127: subtrib. Cichoracear. Gen.: Arnoseris, Hyoseris, Hedypnois, Aposeris, Catananche, Acanthophyton, Cichorium, Tolpis, Schmidtia, Krigia, Cynthia. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 78. Gen.: Apogon, Arnoseris, Hyoseris, Hedypnois, Aposeris, Hänselera, Catananche, Cichorium, Calais, Tolpis, Fichtea, Krigia, Microseris, Cynthia. — Endl. 1838. Gen. p. 494. Gen. Lessingiana et Microseris. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1387 et Ench. p. 249) gen. Candolleana

Hyoserideae Cassini cont. et 1842 (Spl. II. p. 49) Calodonta et Scorzonella. — Meisn. 1839. Gen. p. 234 (143). Gen. ut DC. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 478. Gen.: Hyoseris, Hedypnois. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. Gen. ut Endl. 1842.

Koch 1837. Syn. p. 416: trib. Cichoracear. Gen.: Cichorium, Hyoseris, Hedypnois.

Rchb. 1841. Nom. p. 94: subdiv. Cichoriear. Gen.: Apogon, Monoseris, Hyoseris, Hedypnois, Hänseleria, Catananche, Cichorium, Calais, Tolpis, Fichtea, Krigia, Microseris, Luthera.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 34: subtrib. Chicoracear. Gen. ut Endl.

Hyoseris*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 204. Ed. Hall. 1745. p. 210: g. pl. class. VIII.

Dill. 1719. Nov. gen. p. 144. t. 8: nov. g. a Rajo adoptatum.

Arnoseris Gärtn.

Hyoseris**) Linn. 1737. Gen. p. 239. n. 619; 1737. Cliff. p. 386; 1740. Syst. p. 28; 1753. Sp. II. p. 808; 1759. Syst. ed. X. p. 1196. n. 821; 1763. Sp. ed. II. p. 1137; 1764. Gen. ed. VI. p. 404. n. 916; 1767. Syst. ed. XII. p. 525: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 600; 1784. Syst. p. 720. — Reich. 1778. Gen. p. 402. n. 995. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 531. n. 1242. — Gmel. 1791. Syst. p. 1181. — Pers. 1797. Syst. p. 759; 1807. Ench. II. p. 369. n. 1770. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1612. n. 1417; 1809. En. p. 830.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Semiflosculosor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cichoracear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 49.

Gled. 1764. Syst. p. 243. n. 999: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 540.

Hill 1769. Ht. kew. p. 47: g. Ligulatar.

Scop. 1777. Intr. p. 122: g. Semiflosculosar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 250.

Neck. 1790. El. I. p. 56. n. 103: g. Glossariphytor. Disjunguntur Achyrastrum et Aposeris.

= Hedypnois Tourn. et Hyoseris Juss.

Hyoseris Juss. 1789. Gen. p. 169: g. Cichoracear. restrict. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 487. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 373. — Link 1829. Hdb. I. p. 809.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 578; 1826. Syst. III. p. 670. n 2900; 1831. Gen. II. p. 647. n. 3258: g. Cichorear.

---

*) Hyosiris Plinio planta Intubo similis.

**) ὗς, sus; σέρις, intybus.

Hyoseris Juss. cont.
Cass. 1821. Dict. v. 22. p. 338: g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 146.
Link 1822. En. II. p. 292: g. Syngenes. Aequal.
Cass. 1822. Dict. v. 26. p. 65: g. Scorzonerear. (verar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 8.
Wahlenb. 1826. Succ. II. p. 496: g. Semiflosculosar.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Hyoseridear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2128; 1841. Nom. p. 94. n. 3675. Sect. (1841): Hyoseris, Aposeris. — Koch 1837. Syn. p. 416. Ed. II. p. 478. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 79. — Endl. 1838. Gen. n. 2974. p. 494; 1841. Ench. p. 249. — Meisn. 1839. Gen. p. 234 (144.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 34. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 289.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1346. 1412; 1831. Fl. exc. p. 250: g. Cichoriacear. Sect.: Hyoseris, Aposeris.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307: g. Taraxacear.
Synon. Taraxaconastrum Vaill.; Trinciatella Adans.; Achyrastrum Neck.; Hedypnois Gärtn.
Hyoseris Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 362. t. 160: g. Ligulatar.
Less. 1832. Syn. p. 127: g. Hyoseridear.
= Hedypnois Tourn.
Hyospathe Martius 1823. Gen. Palm. bras. p. 1. t. 1. 2; 1824. Palm. fam p. 14: nov. g. Arecinar. *Cf.* Isis 1825. p. 869. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1720. p. 245; 1841. Ench. p. 135. — Kunth 1841. Enum. III. p. 173. — Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2248. — Meisn. 1842. Gen. p. 355 (265).
Spreng. 1825. Syst. II. p. 139. n. 1344; 1830. Gen. I. p. 284. n. 1472: g. Palmar. (Hexandr. Trigyn.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1203.
Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1638: g. Arecacear.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 60: g. Arecinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.
Hypaelyptum Vahl 1806. Enum. II. p. 283. n. 118: g. Triandr. Monogyn. — Par. Schult. 1824. Mant. II. p. 135 (potius *Hypaelytrum*).
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 219. Ed. Nees p. 75: g. Cyperacear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 5. 231. n. 185. — Gaudich. 1826. Freyc. voy. bot. p. 415.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153: g. Scirpear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 136: g. Scirpinar.
= Lipocarpha Nees.

Hypaelytrum „Rich." Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 340: g. Cyperacear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 141: g. Cyperear. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 119.
Hypolytrum Rich.
Hypanthae Link 1829. Handb. I. p. 398: subclass. 5 Exogenear. Ordines: Nyctagineae, Plumbagineae, Primulaceae, Gentianeae, Apocyneae, Asclepiadeae, Strychnaceae, Jasmineae, Oleinae, Viticeae, Verbenaceae, Labiatae, Personatae, Solaneae, Cordiaceae, Borragineae, Convolvulaceae, Polemoniaceae, Ebenaceae, Sapoteae, Myrsineae, Ericeae, Polygalinae.
Hypanthera Silva Manso 1836. Cataract. Bras. p. 37.
Endl. 1843. Spl. III. p. 90. n. $5122/_1$: g. Nhandirobear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 758. — Römer 1846. Fam. nat. II. p. 113. 116. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Hypaphorus*) Hasskarl 1858. Hort. Bogor. I. p. 197: nov. g. Erythrinear.? (Erythrina lithosperma Miq., non Blume.)
Hyparete Rafin. 1836. Fl. Tell. p. 43.
Hermbstädtia Rchb.
Hypecoëae Dumort. 1827. Fl. Belg. p. 130: trib. Papaveracear. Gen.: Hypecoum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: trib. Papaverinear. Gen. id.
Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 465; 1838. ibid. XII. p. 662: trib. Fumariacear. Gen. id. et Chiazospermum. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 59. Gen. ead. — Endl. 1839. Gen. p. 858; 1841. Ench. p. 443. Gen. ead. Accedit 1843 (Spl. III. p. 85) Pteridophyllum. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436. Gen. ead.
Hypecoinae Rchb. 1837. Handb. p. 264; 1841. Nomencl. p. 184: subdiv. Papaveracear. Gen.: Hypecoum, Chiazospermum.
Hypecoon**) Tourn. 1700. Inst. p. 230. t. 115: g. pl. class. V.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Corydalinm. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 371.
Hypecoum Linn.
Hypecoum Linn. 1737. Gen. p. 32. n. 87; 1737. Cliff. p. 39; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 31; 1753. Sp. I. p. 124; 1759. Syst. ed. X. p. 901. n. 157; 1762. Sp. ed. II. p. 180; 1764. Gen. ed. VI. p. 66. n. 171; 1767. Syst. ed. XII. p. 130: g. Tetrandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 140; 1784. Syst. p. 167. — Reich. 1778. Gen. p. 69. n. 183. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 90. n. 228. — Gmel. 1791. Syst. p. 285. — Pers. 1797. Syst. p. 173; 1805. Ench. I. p. 150. n. 334. — Willd. 1797. Sp. I. p. 704. n. 268; 1809. En. p. 171. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 832.

*) ὑπό, subtus; ἄφορος, sterilis: ob legumina inferne sterilia.

**) ὑπήκοον apud Dioscoridem et Plinium.

Hypecoum Linn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 26. n. 100: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 217.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Corydalium.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Papaveracear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 236. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 94. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 497. — DC. 1805. Franç. IV. p. 640; 1821. Syst. II. p. 101; 1824. Pr. I. p. 123. — Hedw. 1806. Gen. p. 80. n. 373. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 32. 481. n. 588. — Lois. 1821. Dict. v. 22. p. 342. — Link 1821. En. I. p. 146; 1831. Hdb. II. p. 280. — Presl 1826. Sicul. I. p. 34. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 154. — Bartl. 1830. Ord. p. 261. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 138. — Koch 1836. Syn. p. 31. Ed. II. p. 33. — Meisn. 1837. Gen. p. 7 (9). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 549. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 93. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 62.
Adans. 1763. Fam. II. p. 431: g. Papaverum.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 69: g. Leguminosar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172[7]: g. Tetrapetalar.
Scop. 1777. Intr. p. 315: g. Anomalar.
Neck. 1790. El. III. p. 83. n. 1411: g. Styridophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 164. t. 115.
Batsch 1802. Tab. p. 87: g. Rhoeadear.
Cram. 1803. Disp. p. 147: g. Tetradynam. Siliquos.
Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 490: g. Siliquosar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 725; 1825. Syst. I. p. 491. n. 544; 1830. Gen. I. p. 113. n. 572: g. Papaverear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4849; 1832. Fl. exc. p. 699.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Chelidoniacear.
Dumort. 1827. Belg. p. 130; 1829. Anal. fam. p. 51: g. Hypecoëar. — Par. Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 465. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 62. — Endl. 1839. Gen. n. 4833. p. 858; 1841. Ench. p. 443. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 436. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 176.
Rchb. 1837. Hdb. p. 264; 1841. Nom. p. 184. n. 7066: g. Hypecoinar.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 290: g. Fumariear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 94: g. Fumariacear. — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 274.
Synon. Hypecoon Tourn.; Mnemosilla Forsk.

Hypelate*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 208: nov. g. Octandr. Monogyn. *Cf.* Hook. 1844. Lond. journ. bot. III. p. 226. — Par. Swartz 1788. Prodr. p. 4. 61; 1801. Ind. occ. II. p. 650. t. 14. — Gmel. 1791. Syst. p. 613.
Schreb. 1791. Gen. II. p. 730. n. 1588: g. Polygam. Monoec. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 981. n. 1889.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 477: g. Sapindacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1279.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 698; 1825. Syst. II. p. 220. n. 1455; 1830. Gen. I. p. 311. n. 1591: g. Sapindear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 343. — DC. 1824. Pr. I. p. 614. — Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 671. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 64. — Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38). — Endl. 1840. Gen. n. 5619. p. 1071; 1841. Ench. p. 561. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 294. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.
Rchb. 1828. Consp. p. 200. n. 5209; 1837. Hdb. p. 285: g. Cupaniear.
Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7571: g. Cardiospermear.
Synon. Exothea Macfad.?; Sphaerococca DC.?

Hypelate Smith . . . . in Rees Cyclop. XIX.
= Moringa Burm.

Hypelythrum Dietr. vid. *Hypoelytrum Kunth.*

Hypelytrum Link, Dietr. vid. *praeced.*

Hypelytrum Spreng. vid. *Hypolytrum Rich.*

Hypenanthe*) Blume 1831. Flora II. p. 517: sect. Medinillae. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 777. — Endl. 1840. Gen. n. 6236c. p. 1217; 1841. Ench. p. 647. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6744. 3. — Walp. 1843. Rep. II. p. 143.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 21: g. Medinillear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XV. p. 298: g. Dissochaetear.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 605: g. Miconiear.

Hypenantron Corda 1829 in Opiz Beitr. I. p. 648; 1830 in Sturm Jungerm. p. 5: nov. g. Marchantiacear. (H. ciliatum.) *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 75.
= Fimbraria Nees.

Hypenia „Martius mss." Benth. 1833. Labiat. p. 136; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 135: sect. Hyptidis. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 705. — Endl. 1838. Gen. n. 3583 *t.* p. 611; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. 19. — Walp. 1845. Rep. III. p. 556.

Hypeothrix Römer vid. *Hypheothrix Kütz.*

---

*) *Hypelate* nomen Rusci apud Plinium. (Sw.)

*) ὑπήνη, labrum superius.

Hypepidermidocarpa Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 44: class. X. Cryptogamor. Gen.: Fucus, Conferva, Ulva, Rivularia, Ditmaria, Tremella.

Hyperanthera*) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 67: nov. g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 408. — Cram. 1803. Disp. p. 58.
Scop. 1777. Intr. p. 297: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 768 (anomal.); 1825. Syst. II. p. 327. n. 1589. — Link 1821. En. I. p. 409.
Vahl 1790. Symb. I. p. 30. Char. auct.
Willd. 1799. Sp. II. p. 535. n. 817: g. Decandr. Monogyn. — Par. Roxb. 1832. Ind. II. p. 368.
Batsch 1802. Tab. p. 98: g. Lomentacear.
= Moringa Burm.

Hyperanthereae Link 1831. Handb. II. p. 130: ordo 39 Perigynar. Gen.: Moringa.

Hyperbaena Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 37. 44: nov. g. Platygonear.

Hyperhiza Lindl., Bonord. vid. *Hyperrhiza.*

Hyperica Juss. 1789. Gen. p. 254: ordo 8 class. XIII. Gen.: Ascyrum, Brathys, Hypericum.

Hypericaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 77) 1847. Veg. kingd. p. 405: ordo Guttiferalium. Trib.: Hypericeae, Elodeae.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 335; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 349: fam. (80) Guttiferar. Trib.: Desmostemoneae, Hypericeae.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 155: ordo Dicotyledonum.
Conf. Hypericineae DC.

Hypericarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43: ordo Toropetalar. Fam.: Hypericineae, Camelliaceae, Rhizoboleae, Guttiferae, Marcgraviaceae, Pyrolaceae, Chlenaceae.

Hypericeae Jaume St. Hilaire 1805. Expos. fam. II. p. 23. t. 75: fam. plant Gen.: Ascyrum, Brathys, Hypericum, Elodea, Androsaemum, Eucryphia. *Cf.* Juss. 1813. Ann. Mus. XX. p. 459. (Isis 1826. p. 696.)
DC. 1805. Franç. IV. p. 860: fam. (89) Dicotyledonum. Gen.: Androsaemum, Hypericum.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 787: div. Guttiferar. Gen.: Hypericum, Ascyrum, Martia, Haemocarpus, Adenostemon.
Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 344: ordo Hypopetalear. Gen.: Ascyrum, Hypericum,

Hypericeae Jaume cont.
Carpodontos, Eucryphia, Vismia, Androsaemum, Knifa, Elodea, Brathys, Harungana, Sarothra, Marila; Godoya?, Palava?
Choisy 1821. Prodr. Hyper. p. 37; 1824 in DC. Pr. I. p. 543: trib. Hypericinear. Gen.: Androsaemum, Hypericum, Lancretia, Ascyrum. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47. Gen. ead. (Elodes loco Lancretiae.) — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 601. Gen. ead. et Elodea, Sarothra. — Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33). Gen. ut Don et Vismia, Haronga.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII: div. Hypericinear. Gen.: Eucryphia, Carpodontos; Ascyron, Lancretia, Hypericum, Androsaemum; Vismia, Haronga. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 210; 1832. Fl. exc. p. 836. Subdivis.: Eucryphieae, Ascyreae, Vismieae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 307; 1841. Nom. p. 210. Subdivis.: Ascyreae, *genuinae* (sect.: Drosantheae, Androsaemeae, Brathydeae [1841 Sarothreae]), Vismieae.
Conf. Hypericineae DC.

Hypericeae Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 341. 373; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 354: trib. Hypericacear. Sect.: Drosanthineae, Hyperineae, Androsaemineae, Brathydineae, Ascyrineae. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406. Gen.: Ascyrum, Hypericum, Eucryphia, Carpodontos.
Endl. 1840. Gen. p. 1031; 1841. Ench. p. 539: trib. Hypericinear. Gen.: Ascyrum, Hypericum. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 781. Gen. ead.

Hypericinae (Pers. 1807. Ench. II. p. 86) Link 1822. Enum. II. p. 275; 1831. Handb. II. p. 341: ordo 20 Allostemonum. Gen.: Androsaemum, Hypericum, Ascyrum.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: ordo Centrisporar.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (36) Thalamiflorar. syncarpar.
Lindl. 1833. Nix. p. 19: ordo Guttalium.

Hypericineae DC. 1813. Théor. élém. p. 214. Ed. II. 1819. p. 244: ordo Thalamiflorar. — Par. Choisy 1824 in DC. Pr. I. p. 541. Subord.: *verae* (trib.: Vismieae, Hypericeae), *anomalae* (gen.: Carpodontos, Eucryphia). — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 599. Trib.: Vismieae, Hypericeae, Eucryphieae.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 631: fam. Thalamiflorar. Gen.: Androsaemum, Hypericum.
Choisy 1821. Prodr. Hyper. p. 32. Gen.: Haronga, Vismia, Androsaemum, Hypericum, Ascyrum, Carpodon, Eucryphia.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 62: fam. Thalamisortiae.
Dumort. 1827. Belg. p. 118: fam. Thalamunguliae. Gen. ut Gray.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 47: fam. Hypericariear. Trib.: Hypericeae, Carpodonteae.

*) ὑπό, ὑπέρ.

Hypericineae DC. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 291: ordo (167) Guttiferar. Gen.: Ascyrum, Lancretia, Cratoxylon, Hypericum, Sarothra, Triadenium, Androsaemum, Vismia, Haronga. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1031; 1841. Ench. p. 538. Trib.: Hypericeae, Elodeae.
Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33): ordo 34 plant. (p. 439 Lamprophyllar.) Trib. ut Dumort.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 74: fam. Guttiferar. Gen.: Ascyrum, Hypericum, Elodea, Ancistrolobus.
Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 780: fam. Dicotyledonear. polypetalar. hypogynar. Trib. ut Endl.
Conf. Hyperica Juss.; Hypericoideae Vent.; Hypericeae St. Hil.; Hypericinae Link; Hypericaceae Spach, Lindl.
Hypericineae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LXVII: fam. Hesperidear. Divis.: Lineae, Hypericeae, Guttiferae.
Rchb. 1828. Consp. p. 210; 1832. Fl. exc. p. 830; 1837. Hdb. p. 304; 1841. Nom. p. 210: fam. Aurantiiflorar. Divis.: Lineae, Hypericeae, Chlaenaceae.
Hypericoideae Vent. 1799. Tabl. III. p. 141: ordo 11 class. XIII. Gen.: Ascyrum, Brathys, Hypericum, Elodea, Androsaemum, Kniffa.
Hypericoides Plumier 1703. Nov. gen. p. 51. t. 7.
Adans. 1763. Fam. II. p. 443: g. Cistor. = Ascyrum Link.
Hypericon Gmel. vid. *Hypericum Tourn.*
Hypericopsis Boissier 1845. Diagn. pl. or. nov. I. Nr. 6. p. 25: nov. g. Frankeniacear. (Frankenia persica K.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 78. — Endl. 1850. Spl. V. p. 45. n. $5053/_1$.
Hypericum*) Tourn. 1700. Inst. p. 254. t. 131: g. pl. class. VI, ab Auctoribus varie circumscriptum.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 111. Ed. Hall. 1745. p. 123: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 231. n. 606; 1737. Cliff. p. 380; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 236; 1753. Sp. II. p. 783; 1759. Syst. ed. X. p. 1183. n. 808; 1763. Sp. ed. II. p. 1101; 1764. Gen. ed. VI. p. 392. n. 902; 1767. Syst. ed. XII. p. 509: g. Polyadelph. Polyandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 91. — Murr. 1774. Syst. p. 582; 1784. Syst. p. 699. — Aubl. 1775. Guian. II. p. 784. t. 311. 312. — Reich. 1778. Gen. p. 391. n. 981. — Lour. 1790. Coch. II. p. 471. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 517. n. 1224. — Gmel. 1791. Syst. p. 1156 (*Hypericon*). — Pers. 1797. Syst. p. 738. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1437. n. 1397; 1809. En. p. 808. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 625. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 399.

*) Nomen ex Plinio et Dioscoride.

Hypericum Tourn. cont.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 360: g. Multilocularium. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 96.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 140. n. 588: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 128.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 35: g. Perforatar.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rutar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 444: g. Cistor. (restrict.)
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Rotacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 346.
Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 178: g. Polyantherar.
Hill 1769. Ht. kew. p. 205: g. Pentapetalar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 483: g. Ascyroidear.
Scop. 1777. Intr. p. 255: g. Icosandrar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 300. t. 62. f. 11 (perforatum).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 512. *Cf. Androsaemum et Caopia Medic.*
Juss. 1789. Gen. p. 255: g. Hypericor.
Neck. 1790. El. II. p. 395. n. 1212: g. Phalarsiphytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 143: g. Hypericoidear.
Batsch 1802. Tabl. p. 63: g. Hyperionear.
Cram. 1803. Disp. p. 139 in Polyandr. Trigyn. (H. hircinum.) — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 223.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 24: g. Hypericear. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 861; 1815. V. p. 630. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 787; 1826. Syst. III. p. 341. n. 2631; 1831. Gen. II. p. 599. n. 2954. — HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 185. Sect.: Brathys, Hypericum. — Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 345. — Choisy 1821. Prodr. Hyper. p. 37; 1824 in DC. Pr. I. p. 543. Sect.: Ascyreia, Tridesmos, Elodea, Perforaria, Brathys. — Lois. 1824. Dict. v. 31. p. 73 (*Millepertuis*). — Kunth 1824. Syn. III. p. 195. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVII; 1832. Fl. exc. p. 836. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 601. Sect. ut Choisy (exclusa Elodea). — Ledeb. 1831. Alt. III. p. 363; 1842. Ross. I. p. 445. Sect.: Ascyria, Perforaria. — Meisn. 1837. Gen. p. 44 (33). — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 157. — Endl. 1840. Gen. n. 5464. p. 1032; 1841. Ench. p. 539. Sect.: Eremosporus, Drosanthe, Webbia, Hypericum, Olympia, Campylopus, Psorophytum, Androsaemum, Eremanthe, Campylosporus, Norysca, Roscyna, Myriandra, Brathydium, Brathys. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 406.
Pers. 1807. Ench. II. p. 86. n. 1338: g. Hypericinar. — Par. Link 1822. En. II. p. 275; 1831. Hdb. II. p. 342. — D. Don 1825. Nepal. p. 217. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 215 (*Millepertuis*).

Hypericum Tourn. cont.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 16: g. Polyandr. Di— Pentagyn. — Par. Elliott 1821. Sketch I. p. 23.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 631: g. Hypericinear. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 191. Sect.: Ascyreia, Perforaria. — St. Hil. 1827. Fl. Bras. I. p. 328. — Bartl. 1830. Ord. p. 292. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 99. — Koch 1836. Syn. p. 133. Ed. II p. 146. Sect. (1843): Perforaria, Elodes. — Webb & Berth. 1836. Canar. I. p. 43. — Kunth 1838. Berol. I. p. 69. — A. Rich. 1842. Pl. vasc. Cub. p. 236. — Brongn. 1843. En. genr. p. 74. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 221. Sect.: Perforaria, Ascyria. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 314. Sect.: Euhypericum, Androsaemum. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 36. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 357.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 475: g. Columniferis aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 210. n. 5471: g. Ascyrear. Sect.: Brathys, Hypericum, Tridesmos, Ascyreia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 307: g. Androsaemear.
Synon. Androsaemum Tourn.; Androsemum Neck., Link; Sarothra Linn.; Caopia, Knifa et Komana? Adans.; Pancalum Ehrh.

Hypericum Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 383; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 356: g. Hyperinear. valde restrict. Sect.: Holosepalum, Milleporum, Adenosepalum, Drosocarpium, Coridium, Crossophyllum.
Endl. 1840. Gen. p. 1032. n. 5464 *A b*; 1841. Ench. p. 539. n. 5464 *B d*: sect. Hyperici. Subsect. ut Spach.
Rchb. 1841. Nom. p. 210. n. 7994: g. Androsaemear. Sect. ut Spach.
Blume 1852. Mus. bot. Lugd. II. p. 24: g. Hypericear.

Hyperineae Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 342. 382; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 355: sect. Hypericear. Gen.: Hypericum, Olympia, Webbia.

Hyperioneae Batsch 1802. Tab. affin. p. 63: fam. Multisetariar. Gen.: Ascyrum, Hypericum, Sauvagesia, Parnassia.

Hyperogenei Pers. 1814. Syn. Alg. p. XII: ordo Idiothalamor. Gen.: Trypethelium, Glyphis, Chiodecton.

Hyperomyxa*) Corda 1839. Icon. Fung. III. p. 34. t. 6. f. 89; 1842. V. p. 40; 1842. Anl. Mycol. p. 166: nov. g. Tremellinar. (H. stilbosporoides.)
Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 421: g. Tremelleor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 312.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Melanconieor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 507: g. Stilbosporeor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 150: g. Myxonemeor.

Hyperrhiza Bosc emend. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 416. n. 3466; 1831. Gen. II. p. 762. n. 3890: g. Angiogasterum.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 56: g. Sclerodermeor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 329. p. 28; 1841. Ench. p. 17. — Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 389. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 292.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 23; 1842. Mycol. p. 94: g. Sclerodermacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42 (*Hyperhiza*): g. Hypogaeor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 505; VIII. p. 488: g. Podaxineor. (VIII. p. 489 Hysterangieor.?)
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 437: g. Hymenogastreor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 239 (*Hyperhiza*): g. Pisocarpiaceor.
Synon. Uperhiza Bosc; Uperrhiza Fries; Melanogaster Corda; Hysterangium Vitt.?, Octaviania Vitt.?

Hypertelis*) „E. Meyer mss." Fenzl 1836. Ann. Wien. Mus. I. p. 352: subg. Mollugin is.
Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 162. n. 6298: g. Mollugine ar. (genuinar.) — Par. Fenzl 1839. Ann. Wien. Mus. II. p. 261. 299. — Endl. 1839. Gen. n. 5188. p. 953; 1841. Ench. p. 501. — Meisn. 1843. Comm. p. 357. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498

Hyperum**) Presl 1850. Epimel. bot. p. 571 (211): nov. g. Ledocarpear. (H. trifidum.) — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 838.
Wendtia Meyen.

Hypha***) Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 63: nov. g. Byssoideor. veror.
Link 1824. Spec. I. p. 141: g. Hyphomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 318: g. Byssacear. spuriar.
Rchb. 1828. Consp. p. 5. n. 53; 1841. Nom. p. 3. n. 80; g. Byssaceor. meteoricor. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 59.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Byssinear.
Endl. 1836. Gen. p. 20; 1841. Ench. p. 15: g. Byssor. meteoricor.
Synon. Mesenterica Pers.

---

*) *ὑπομυξα*, pilum. (?)

---

*) *ὑπερτελής*, major solito.
**) *ὕπερον*, clava.
***) *ὑφή*, textura, tela.

Hyphaene*) Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 28. t. 10. f. 2 (coriacea); 1791. ibid. II. p. 13. t. 82: nov. g. Palmar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 43. — Pers. 1807. Ench. II. p. 623. n. 2245. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 205 (anomal.); 1825. Syst. II. p. 39. n. 1342; 1830. Gen. I. p. 284. n. 1470. (Hexandr. Trigyn.) — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1203.

Mart. 1824. Palm. fam. p. 14; . . . . Palm. p. 227: g. Borassear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 73. n. 1660. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139.

Endl. 1837. Gen. n. 1748. p. 251; 1841. Ench. p. 136: g. Borassinar. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 226. — Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2300. — Brongn. 1843. En. genr. p. 16.

Meisn. 1842. Gen. p. 357 (266): g. Lataniear.

Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 98: g. Borassinear.

Synon. Douma Lam.; Cucifera Delile.

Hyphasma**) Rebent. 1804. Fl. neomarch. p. 396: nov. g. Byssor. (Dematium bombycinum Pers., etc.) *Cf.* Schrad. n. Journ. I. p. 148 et Leman 1821. Dict. v. 22. p. 348.

Math. 1853. Belg. II. p. 208: g. Sphaeriacear.

= Byssus Linn.

Hyphelia Fries 1825. Pl. homon. p. 149: nov. g. Trichodermeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 175; 1841. Nom. p. 9. n. 374. — Endl. 1836. Gen. n. 298. p. 25; 1841. Ench. p. 16. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 287. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 447. Sect.: Geohypha, Xylohypha. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489. (?)

Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 211: g. Trichodermear. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 769. n. 3942.

Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 243: g. Sporomycetum perisporor.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 21; 1842. Mycol. p. 82: g. Trichodermacear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.

Bonord. 1851. Hdb. p. 146: g. Trichodermaceor.

Math. 1853. Belg. II. p. 397: g. Fuliginear.

Hypheothrix***) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 88; 1843. Phycol. gener. p. 229; 1845. Phycol. germ. p. 182: g. Calotrichear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 33 (*Hypeothrix*).

*) ὑφαίνω, texo.
**) ὕφασμα, textum.
***) ὕπειμι, subsum? ex Römer. An ὑφή?

Hypheothrix Kütz. cont.

Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 266. n. 189: g. Leptotrichear.

Hyphoderma Wallroth 1833. Fl. crypt. II. p. 576: g. Hymenomycetum gymnosporor.

· Thelephorae Ehrh. pars.

Hyphoderma Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 447: g. Trichodermeor. (H. roseum.)

Hypho-entomycetes Wallroth 1844. Beitr. z. Bot. II. 1. p. 159: sect. Entomophytor. Gen.: Isaria.

Hypholoma Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 287: trib. Pratellae.

Fries 1825. Pl. homon. p. 75: subsect. Pratelli. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *B. c.*

Fries 1836. Epicr. p. 221; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 295: subg. Pratelli. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 354.

Endl. 1836. Gen. n. 453 *III d.* p. 40; 1841. Ench. p. 21: subsect. Pratellae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 502. 2 *c.* — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 465. — Bail 1858. Syst. p. 36. t. 35.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: sect. Agarici.

*Hyphomycetes**) Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 334: ordo 11 Cryptogamiae. Sect.: Mucedines, Inomycetes, Mucores.

Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLI: class. Fungor. Ord.: Phylleriaceae, Inomycetes, Stilboidei, Cephalotrichi. — Par. Fries 1832. ibid. III. 2. p. 261. Ord.: Cephalotrichei, Mucorini, Dematiei, Mucedines, Sepedoniei.

Link 1824. Spec. I. p. V. 1: ordo Cryptophytor. Gen. §. 1.: Sporotrichum, Capillaria, Alytosporium, Colletosporium, Coccotrichum, Racodium, Acrothamnium, Trichothecium, Sepedonium, Mycogone, Fusisporium, Menispora, Gonytrichum, Epochnium, Helicotrichum, Bactridium, Scolicotrichum, Circinotrichum, Myxotrichum. §. 2: Acladium, Chloridium, Cladosporium, Oedemium, Polythrincium, Arthrinium, Camptoum, Goniosporium, Sporophleum, Conoplea, Coelosporium, Helminthosporium, Actinocladium, Helicosporium. §. 3: Haplotrichum, Haplaria, Botrytis, Polyactis, Diplosporium, Aspergillus, Penicillium, Coremium, Campsotrichum, Phycomyces. §. 4: Acremonium, Verticillium, Dactylium, Stachylidium, Spondylocladium. §. 5: Eurotium, Mucor, Sporodinia, Syzygites, Pilobolus, Thamnidium, Thelactis, Didymocrater, Diamphora, Erysibe, Antennaria, Rhizoctonia. §. 6: Oidium, Tetracolium, Monilia, Alternaria, Torula, Amphitrichum. §. 7: Helicomyces, Dematium, Ozonium, Erineum.

*) ὑφή, tela; μυκής, fungus.

Hyphomycetes Martins cont.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 380; 1831. Gen. II. p. 778: ordo Mycetum. Divis.: Cephalotrichi, Byssoidei, Inomycetes.
Rchb. 1828. Consp. p. 1. 5; 1832. Fl. exc. p. L: formatio Gymnomycetum. Fam.: Byssacei, Mucedinei.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 271: ordo (3) Fungor. Divis.: Hyph. *epispori* (gen. 221—231), *synspori* (gen. 232—248), *entospori* (gen. 249—264). — Par. Endl. 1836. Gen. p. 18; 1841. Ench. p. 14. Subord.: Sepedoniei, Mucedines, Dematiei, Mucorini, Cephalotrichei. — Rchb. 1837. Hdb. p. 129; 1841. Nom. p. 3. Fam. ut 1828 et Mucorini. — Corda 1842. Mycol. p. LVII. 23. Fam.: Sporotrichaceae, Cephalocladia, Bactridiaceae, Helminthosporiaceae, Psiloniaceae, Sporodeae, Ceratocladia, Polyactideae, Arthrobotrydeae, Stilbini, Aspergillini, Dendryphiaceae. — Brongn. 1843. Én. genr. p. XII. 2. Fam.: Mucedineae, Mucoreae, Uredineae. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 59. Fam. ut Rchb. — Bonord. 1851. Hdb. p. 65. Fam.: Torulacei, Acmosporiacei, Psiloniacei, Pleurosporiacei, Dendrini, Polyactidei, Basidiophori.
Fries 1836. Epicr. p. 1: fam. quinta Fungor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: ordo Fungalium. (*Synon. Botrytaceae.*) Subord.: Isariacei, Stilbacei, Dematiei, Mucedines, Sepedoniei.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 486: series Haplomycetum. Ord.: Mucorinei, Mucedines, Sepedoniacei.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 221: fam. (174) Funginar.
Bail 1858. Syst. p. 5: ordo Basidiosporear. (Injungendi Stilbini Bonord.)

Hyphopsorae Rchb. 1828. Consp. p. 19; 1832. Fl. exc. p. L: formatio Gymnopsorar. Fam.: Crateroideae, Sphaerophoreae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 131: ordo Lichenum. Subord.: Crateropsorae, Cephalopsorae.
— Coniothalami Fries.

Hyphosporae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: series Mycosporar. Ord.: Mucorarieae, Mucedinarieae, Byssarieae.

Hyphydra*) Schreb. 1791. Gen. II. p. 666. n. 1484: g. Monoec. Gynandr. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 629. n. 1746. — Pers. 1807. Ench. II. p. 596. n. 2168.
Vahl 1794. Symb. III. p. 99.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 188: g. Restiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor p. 157. — Rtg. 1831. Marb. II. p. 120.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 891. n. 3156; 1831. Gen. II. p. 701. n. 3538: g. Monoec. Monadelph.
: Tonina Aubl.

*) ὑπό, sub; ὕδωρ, aqua.

Hypna Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: div. Hypnoideor. Gen.: Hypnum, Stereodon.

Hypnaceae Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 118: ordo Pleurocarpor. Trib.: Neckereae, Fabronieae, Leskieae.
C. Müll. 1848. Bot. Zeit. p. 779; 1850. ibid. p. 658; 1850. Syn. Musc. II. p. 186: subtrib. Hypnoidear. Gen.: Hookeria, Hypnum.
Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 270: trib. Pleurocarpor. Gen.: Hypnum.
Bayrh. 1849. Taun. p. 25: fam. Muscor. frondosor. Gen.: Leucodon, Pterogonium, Leskea, Isothecium, Climacium, Anomodon, Hypnum.
Bruch, Schimp. & Gümb. . . . . Bryol. eur. V. VI: fam. Muscor. Gen.: Pseudoleskea, Heterocladium, Thuidium, Hylocomium, Plagiothecium, Rhynchostegium, Thamnium, Hyocomium, Isothecium, Brachythecium, Scleropodium, Camptothecium, Myurella, Amblystegium, Limnobium, Hypnum.

Hypnaea Bory, J. Agdh. vid. *Hypnea Lamx.*

Hypnarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: ordo Mitrogynar. Fam.: Musci, Sphagnideae, Andraeaceae.

Hypnea*) Lamx. 1813. Ann. Mus. XX. p. 131: nov. g. Floridear. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 350. — Par. Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 363. — A. Cunn. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 330. — Menegh. 1838. Cenni p. 40. — Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 399. — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. . . . — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 60.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 372: sect. Gigartinae.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 156 (*Hypnaea*): g. Gigartinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 28. n. 497c: sect. Sphaerococci.
Decne 1841. Arch. Mus. II. p. 182: g. Gasterocarpear.
Rchb. 1841. Nom. p. 21. n. 722: g. Plocamiear.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 67. 148; 1848. Flora II. p. 414 (*Hypnaea*): g. Sphaerococcoidear. — Par. Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 360. (Flora 1843. p. 99.) — Endl. 1843. Spl. III. p. 50. n. 122/7a. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 189. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 170.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Sphaerococcear.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Gracilariear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: g. Plocariear.

*) Nomen ab habitu Hypno simili.

Hypnea Lamx. cont.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 758. n. 508: g. Cystocloniear.
Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 683: g. Hypneacear. — Par. Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 122.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 244: g. Gelidiacear.
Synon. Lasios Targ.; Hypnophycus Kütz.

Hypnea Rchb. 1828. Consp. p. 33: sect. Hypnoideor. Gen.: Hypnum, Stereodon.

Hypneaceae „J. Agdh." Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 683: fam. Floridear. Gen.: Acanthococcus, Hypnea.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 115: subordo Gelidiacear. Gen.: Hypnea.

Hypneae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75: sect. Muscear. Gen.: Hypnum, Meesia, etc.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: trib. Dichopogonor. Gen.: Fontinalis, Hypnum, Hookeria, Daltonia, Anacamptodon, Neckera, Leucodon, Pterogonium, Fabronia.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 3: trib. Muscor. Gen.: Hypnum, Hookeria, Leskia, Daltonia, Neckera, Anomodon, Astrodontium, Leucodon, Leptodon, Pterigynandrum.
Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 84: div. Bryacear. Gen.: Hypnum, Pterigophyllum, Neckera, Leskia, Leucodon, Climacium, Anomodon, Pterogonium.
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: trib. Pleurocarpor. Gen.: Hypnum, Leskia, Isothecium, Trachyloma?, Climacium, Eriodon, Leucodon, Pterigynandrum, Symphyodon, Leptodon, Lasia, Campylodontium, Dicnemon, Astrodontium, Pylaisaea, Sclerodontium, Clasmatodon.

Hypnella C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 208: sect. Hookeriae. Subsect.: Omaliadelphus, Enhypnella, Cupressinadelphus.

Hypnites Endl. 1836. Gen. n. 600*b*. p. 58; 1841. Ench. p. 32: sect. Muscitis.

Hypnodendron C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 496: sect. Hypni. Subsect.: Flabellaria, Comatulina.
Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 105: sect. Isothecii.

Hypnoidea Rchb. 1828. Consp. p. 32: subdiv. Maschalocarpior. Sect.: Pleuridia, Climacioidea, Leucodontina, Neckeriacea, Leskeacea, Hypnea.

Hypnoideae Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 287: trib. 11 Muscor. Gen.: Fabronia, Pterogonium, Sclerodontium, Leucodon, Macrodon, Dicnemum, Astrodontium, Neckera, Anacamptodon, Daltonia, Spiridens, Hookeria, Hypnum, Fontinalis.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: fam. 16 Muscor. Gen.: Fabronia, Anacamptodon, Daltonia, Lepidopilum, Hookeria; Hedwigia, Pterogonium, Leptodon, Leucodon, Sclerodontium, Dicnemum, Cryptopodia, Cryphaea, Pilotrichum, Neckera, Anomodon, Astrodontium, Actinodontium, Regmatodon, Leskea, Hypnum, Climacium, Spiridens.
Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): div. Pleurocarpiar. Sect.: Hypnea, Leskeacea, Neckeracea, Sciurodea, Climaciea, Pleuridiea.
Hüb. 1833. Musc. germ. p. 543: vid. *Pleurocarpi Hüb.*
Müll. 1850. Syn. Musc. II. p. 28; 1850. Bot. Zeit. p. 658: trib. Pleurocarpor. Subtrib.: Neckeraceae, Hypnaceae.

Hypnoidei Wahlenb. 1826. Fl. suec. II. p. 695: div. Muscor. frondosor. Gen. suec.: Hypnum, Leskea, Neckera, Fontinalis, Fissidens, Pterogonium.
Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: fam. Pleurocarpor. Divis.: Hypna, Leskiae, Neckerae, Sciurodei, Climacia.
Genth 1836. Nass. I. p. 141. 256: ordo Muscor. Gen.: Leucodon, Leptohymenium, Anomodon, Anacamptodon, Neckera, Leskea, Hookeria, Climacium, Isothecium, Hypnum, Fontinalis.

Hypnois Mathieu 1853. Fl. Belg. II. p. 322: sect. Hydni. *(Hydnum et Irpex Fries.)* Subsect.: Mesopus, Tremellodon, Hericium, Apus, Odontia.

Hypnon Dillen. 1719. Nov. gen. p. 85. t. 1: nov. g. plant.
= Hypnum Linn.

Hypnophycus Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phycol. gener. p. 404; 1845. Phycol. germ. p. 305: g. Cystocloniear.
= Hypnea Lamx.

Hypnothalia Greville mss.
= Spyridia Harv.?

Hypnoticon Rchb. vid. *seq.*

Hypnoticum „Rod. mss." Pauquy 1824. Diss. de Bellad. (vid. Walp. Rep. III. p. 104.)
Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4753 (*Hypnoticon*): g. Physalidear.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 179: g. Physalear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 453: sect. Withaniae.

Hypnum*) Linn. 1737. Gen. p. 323. n. 788; 1740. Syst. p. 32; 1751. Phil. bot. p. 35; 1753. Sp. II. p. 1153; 1759. Syst. ed. X. p. 1335. n. 1085; 1763. Sp. ed. II. p. 1587; 1764. Gen. ed. VI. p. 564. n. 1195; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 702: g. Muscor. — Par. Dill. 1741. Hist. musc. p. 261. t. 34—43. — Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 97. — Gled. 1749. Berl. V. p. 134. — Neck. 1771. Meth. musc. p. 151. 262 (gemmascentium). — Scop. 1772. Carn. II. p. 327. (calyptrator.) — Murr. 1774. Syst. p. 799; 1784. Syst. p. 949. — Reich. 1778. Gen. p. 559.

---

*) Ratio nominis in Dillen. Hist. musc. p. 261.

Hypnum Linn. cont.
n. 1312. — Hedw. 1782. Fund. p. 94; 1801. Spec. p. 236. (frondosor.) — Thunb. 1784. Fl. japon. p. 342. — Roth 1788. Germ. I. p. 464; 1800. ibid. III. p. 263. — Juss. 1789. Gen. p. 11. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 762. n. 1656. — Gmel. 1791. Syst. p. 1338. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Mönch 1794. Meth. p. 740. — Pers. 1797. Syst. p. 989. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 51. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 314. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 37. — DC. 1805. Franç. II. p. 518; 1815. V. p. 227. — Mart. 1817. Erlang. p. 14. — Leman 1821. Dict. v. 22. p. 351. — Gray 1821. Brit. pl. I. p. 752. — Agdh. 1822. Aphor. p. 109. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 199. n. 3341; 1831. Gen. II. p. 736. n. 3735. (frondosor.) — Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 235. (odontostomor.) — Math. 1853. Belg. II. p. 32.

Gled. 1764. Syst. p. 296. n. 1197: g. Muscosar. (calyptratar.) — Par. Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 452.

Scop. 1777. Intr. p. 357: g. Muscoidear.

Neck. 1790. El. III. p. 329. n. 1740: g. Phryganophytor. Sejunguntur Acylosis, Pterocladia, Pancovia.

Hoffm. 1795. Crypt. p. 55: g. Calyptrator.

Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 169; II. 2. p. 49; 1812. Suppl. II. p. 85: g. Diploperistomator.

Batsch 1802. Tab. p. 264: g. Muscoideor.

Rebent. 1804. Neom. p. 264: sect. Hypni.

Palis. 1805. Prodr. Aethéog. p. 34; 1822. Mém. soc. Linn. Par. I. p. 465: g. Diplopogonor. *Cf.* Desv. 1825. Mém. soc. Linn. Par. III. p. 226.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 38: g. Mitrocarpor.

Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 74: sect. Bryi.

Brid. 1822. Meth. musc. p. 152: g. Peristomor. pleurocarpor.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 75; 1829. Anal. fam. p. 68: g. Hypnear. — Par. Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 3; 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399. — Angstr. 1846 in Fries Summ. veg. Scand. I. p. 84.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 696: g. Hypnoideor. — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 272.

Brid. 1827. Bryol. II. p. 388: g. Pleurocarpor. (peristomor.) Sect.: Hypnum, Stereodon. — Par. Hüb. 1833. Musc. germ. p. 605. (diploperistomor.) — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 527.

Brid. 1827. Bryol. II. p. XLV: g. Hypnor.

Arnott 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 301: g. Hypnoidear. — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60. — Hampe 1837. Linnaea XI. p. 87.

Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 577: g. Hypnoor.

Hypnum Linn. cont.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Orthobryor.

Endl. 1836. Gen. n. 566. p. 55; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear. Sect. ut Brid. — Par. Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 74.

Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 944: g. Calyptrobryor. Sect. eaed.

Hampe 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 119: g. Leskiear.

Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 257: g. Leskeacear.

Bayrh. 1849. Taun. p. 27: g. Hypnacear. — Par. Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 270. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 106.

Hampe 1852. Bot. Zeit. p. 70. Sect.: Dendrohypnum, Rigodium, Chrysohypnum, Ptychohypnum, Drepanohypnum, Rhynchohypnum, Cylindrohypnum, Cochliohypnum, Serpohypnum, Platyhypnum.
Synon. Hypnon Dill.

Hypnum Willd. 1799 in Schrad. Journ. II. p. 16: g. Muscor. frondosor., complectens Bryum, Mnium et Weberam. — Par. Rebent. 1804. Neom. p. 261. Sect.: Brya, Mnia, Weberae, Hypna.
Conf. Bryum Schrank.

Hypnum C. Müll. 1848. Bot. Zeit. p. 779; 1851. Syn. Musc. II. p. 223: g. Hypnacear., injunctis Leskea et Isothecio ampliat. Sect.: Dendroglossophyllum, Glossophyllum, Omalia, Mallacodium, Rigodium, Theliphyllum, Hypnodendron.

Hypnum Schimp. . . . . Bryol. eur. VI: g. Hypnacear. valde restrict.

Hypnum Sulliv. 1856. Musc. Un. Stat. p. . . .: sect. Hypni.
= Cupressina Müll.

Hypobathreae Miquel 1856. Fl. Ind. bat. II. p. 236: subtrib. Gardeniear. Gen.: Hypobathrum.

Hypobathrum*) Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1007: nov. g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 496.

A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 198: g. Coffeacear.

DC. 1830. Pr. IV. p. 451: g. Guettardear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 547. — Meisn. 1838. Gen. p. 167 (117). — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2836. (genuinar.)

Endl. 1836. Gen. n. 3186. p. 539; 1841. Ench. p. 272: g. Euguettardear.

Spach 1830. Vég. phan. VIII. p. 375: g. Guettardacear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Guettardidar.

Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 236: g. Hypobathrear.

*) ὑπόβαθρον, fulcrum, fundamentum.

Hypoblyttia Gottsche 1857. Linnaea XXVIII. p. 560.
= Podomitrium Mitten.

Hypobrichia*) „Curtis mss. 1836" Torrey & Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 479: nov. g. Lythracear. (Peplis? diandra Nutt.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 464 (*Hypobrychia*).
Endl. 1841. Spl. I. n. 6143/$_1$. p. 1427; 1841. Ench. p. 643: g. Eulythrariear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 101.
Rchb. 1841. Nom. p. 172. n. 6638: g. Saliceariear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 575: g. Lythrear.
Synon. Ptilina Nutt.; Didiplis Rafin.?

Hypobrychia Wittst. vid. *praeced.*

Hypocalymma**) Endl. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 51: sect. Leptospermi.
Endl. 1840. Gen. n. 6306. p. 1230; 1841. Ench. p. 650: g. Leptospermear. — Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6841. — Walp. 1843. Rep. II. p. 166 (p. 922 (*Hypocalymna*); 1846. V. p. 736. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 737.
Schauer 1843. Linnaea XXII. p. 241: g. Bäckear.
Meisn. 1843. Comm. p. 354 (*Hypocalymna*): g. Euleptospermear.
Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 110: g. Bäckeear. Sect.: Eucalymma, Astrocalymma, Cardiomyrtus.

Hypocalymna Meisn. vid. *praeced.*

Hypocalyptus Thunb. 1800. Prodr. II. p. 124. 193; 1800. Nov. gen. XI. p. 151: nov. g. Diadelph. Decandr. (Sophora capensis.)
DC. 1825. Pr. II. p. 135: g. Genistear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 153. n. 4040; 1841. Nom. p. 151. n. 5880. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 142. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 153. — Meisn. 1837. Gen. p. 83 (59). — Endl. 1840. Gen. n. 6477. p. 1263; 1841. Ench. p. 668. — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 459.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 579. n. 2836: g. Leguminosar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Lotononidear.

Hypocalyptus Thunb. Fl. cap. p. 570.
= Virgilia Lam.

Hypocarpha Endl. vid. *Kyphocarpa Fenzl.*

Hypocarpus A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 245 not.: nov. g. Olacinear. (Olax pauciflora Benth.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444: g. Olacear.
= Liriosma Pöpp. (A. DC. Pr. VIII. p. 673.)

Hypochaena Fries 1825. Pl. homon. p. 151: nov. g. Pilacrinor.? *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 464 (*Hypochnaena* a γνοῦς), lanugo.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9 n. 169.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491: g. Onygeneor.?
Onygena Pers.?

Hypochaerideae Cassini 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: subdiv. Scorzonerear. Gen.: Robertia, Piptopogon, Seriola, Porcellites, Hypochaeris
Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 475: subtrib. Cichoracear. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 90. Gen.: Hypochaeris, Achyrophorus, Seriola, Robertia, Metabasis, Phalacroderis. — Endl. 1838. Gen. p. 495. Gen. 4 priora et Oreophila. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1387 et Ench. p. 250) Metabasis, Phalacroderis et 1843 (Spl. III. p. 71) Cycnoseris. — Meisn. 1839. Gen. p. 233 (143). Gen. ut DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. Gen. ut Endl. 1843.
Rchb. 1841. Nom. p. 96: div. Homoianthar. Subdivis.: Rodigieae, *Hypochaerideae* (gen. ut Endl. 1841 et Henselera), Scolymeae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 34: subtrib. Chicoracear. Gen. ex DC.
Conf. Hypochoerideae D. Don.

Hypochaeris*) Linn. 1737. Ht. Cliff. p. 385; 1740. Syst. p. 28; 1748. Ups. p. 240; 1753. Sp. II. p. 810; 1759. Syst. ed. X. p. 1197. n. 822; 1763. Sp. ed. II. p. 1140; 1767. Syst. ed. XII. p. 526: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 601; 1784. Syst. p. 721. — Reich. 1778. Gen. p. 403. n. 997. — Pers. 1797. Syst. p. 760. — Link 1822. En. II. p. 294.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Semiflosculosor. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 538.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cichoracear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 270. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 491. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 378. — DC. 1805. Franç. IV. p. 46; 1815. V. p. 451. Sect.: Achyrophorus, Hypochaeris. — HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 1. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 427. — Kunth 1823. Syn. p. 352. — Math. 1853. Belg. I. p. 318.
Hill 1769. Ht. kew. p. 43: g. Ligulatar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 464: g. Chicoracear.
Neck. 1790. El. I. p. 51. n. 91: g. Glossariphytor.
Mönch 1794. Meth. p. 549: g. Petalostemonis.
GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 151: g. Semiflosculosar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 250. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 488.

---

*) ὑποβρύχιος, infra superficiem. (?)
**) ὑπό, sub; in compositis inferus.

*) Dioscoridi ὑποχοιρίς, similiter Plinio.

Hypochaeris Linn. cont.
Rebent. 1804. Neom. p. 98: g. Pentandr. Monogyn.
Cass. 1821. Dict. v. 22. p. 366: g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 145.
Cass. 1822 Dict. v. 25. p. 64: g. Scorzonerear. (verar) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 79 — Spach 1841. Veg. phan. X. p. 7.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Hypochaeridear. — Par DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 90. Sect.: Arachnites, Euhypochaeris, Porcellites. — Endl. 1838. Gen. n. 2985. p. 495; 1841. Ench. p. 250. — Kunth 1838. Berol. I. p. 374 — Meisn. 1839. Gen. p. 233 (143). — Rchb. 1841. Nom. p. 96, n. 3746. Sect. ut DC. — Brongn. 1843. En. genr. p. 34. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 488. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 775. Sect. ex DC. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1346. 1413: g. Cichoriacear. Sect.: Hypochaeris, Porcellites.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n 2153; 1831. Fl. exc. p. 268: g. Andryalear. Sect. (1831) ut DC. 1805.
Regel 1842. Linnaea XVI. p. 49. Sect.: genuinae, Arachnites, Eriothrix.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 259: g. Liguliflorar. Sect.: Euhypochaeris, Achyrophorus.
= Hypochoeris Vaill.

Hypochlaena Spreng. vid. *Hypolaena R. Brown.*

Hypochlamys Fée 1852. Gen. Fil. p. 200: nov. g. Asplenıear. (Asplenium ambiguum Schk., etc.)

Hypochnaea „Fries" Endl. Gen. p. 25 in synon. Onygenae: vid. *Hypochaena Fries.*

Hypochnaena Wittst. vid. *praeced.*

Hypochni Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLV: sect. Mucedinum. Gen.: Oidium, Hypochnus, Geotrichum.

Hypochnus*) Fries 1818. Obs. mycol. II. p. 278: nov. g. Fungoc. (Thelephora serea Pers.) *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 368.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 12: g. Dematior.
Fries 1821. Syst. myc. I. p. XLV: g. Hypochnor.
Agdh. 1821. Aphor. p. 80: g. Mucedinum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 304: g. Racodiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 5 n. 82: g. Racodiaceor.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Cephalosporear.

Hypochnus Fries cont.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 781. n. 4040: g Byssoideor.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 289: g. Cephalotricheor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 266. p. 22; 1841. Ench. p. 15.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 309: g. Hyphomycetum synsporor.
Fries 1838. Epicr. p. 569; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 336: g. Auricularinor. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 41; 1842. Mycol. p. 174. — Mont. 1842 Pl. cell. Cub. p. 367. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 385. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42. — Bonord. 1851. Hdb. p. 158. Sect.: Athelia, Hypochnus.
Rchb. 1841. Nom. p. 11. n. 454: g. Hydneor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Thelephoreor.
Synon. Triclinium Fée?

Hypochoerideae D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 307; 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 77: trib. (3) Cichoracear. Gen.: Hypochoeris, Achyrophorus, Seriola, Ageuora, Soldevilla. — Par. Koch 1837. Syn. p. 426. Gen.: Hypochoeris.
Less. 1832. Syn. p. 130: subtrib. Cichoracear. Gen.: Hypochoeris, Achyrophorus, Seriola, Robertia. — Par. Koch 1844 Syn. ed. II. p. 490. Gen.: Hypochoeris.
Schultz Bip. 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 87; . . . . in Webb Canar. II. p. 472: subtrib. Cichoriacear. Divis.: *legitimae* (gen: Achyrophorus, Fabera, Hypochoeris), Piptopogoneae.

Hypochoeris*) Vaillant 1721. Act. Ac. Paris. p. 214: g. Cichoracear. — Par. Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 759. — Link 1829. Hdb I. p. 792. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 2. 144.
Linn. 1737. Gen. p. 238. n. 615; 1737. Fl. lapp. p. 231; 1764. Gen. ed. VI. p. 405. n. 918: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Schreb. 1791. Gen. II p. 533. n. 1246. — Gmel. 1791. Syst. p. 1183. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1620. n. 1421; 1809. En. p. 831. — Pers. 1807. Ench. II. p. 378. n. 1779.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 38: g. Semiflosculosar. — Par. Linn. 1764. Ord. nat. — Scop. 1777. Intr. p. 123.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 243. n. 1002: g. Petalostemonum.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 581; 1826. Syst. III. p. 668. n. 2898; 1831. Gen. II. p. 646. n. 3256: g. Cichorear. — Par. Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 164.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 442.
D. Don 1829. Edinb. n. phil. journ. VI. p. 310: g. Hypochoeridear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 143. — Par. Less. 1832. Syn. p.

*) χνόος, χνοῦς, lanugo.

*) Vid. Hypochaeris Linn.

H y p o c h o e r i s Vaillant cont. 130. — Koch 1837. Syn. p. 426. Ed. II. p. 490. Sect.: Euhypochoeris (1844 genuinae), Achyrophorus. — Schultz Bip. 1845. Nov. Act. Leop. XXI. p. 139 (legitimar.); . . . . in Webb Canar. II. p. 472. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 339. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 292. Sect. ut Koch.

Synon. Hypochaeris Linn.; Arachnospermum Bory.

H y p o c i s t i s*) Tourn. 1700. Coroll. p. 46. t. 477: g. pl. class. I.

Adans. 1763. Fam. II. p. 76: g. Aristolochiar.

= Cytinus Linn.

H y p o c o p r a**) Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 397: subg. Massariae. (H. fimeti P.)

Hypocorolleae Juss. 1824. Dict. v. 30. p. 463: class. VIII. Dicotyledonum.

H y p o c r e a Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 323: series Cordycipitis. (Sphaeria capitata, etc.)

Fries 1825. Pl. homon. p. 104: g. Sphaerinor. Sect.: Cordyceps, Hypocrea, Hypomyce, Nectria. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 279; 1841. Nom. p. 7. n. 301. Sect. eaed. — Endl. 1836. Gen. n. 397. p. 34; 1841. Ench. p. 20.

Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 82; 1842. Pl. cell. Cub. p. 334: g. Pyrenomycetum.

Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 134: g. Sphaeriaceor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 383. Subg.: Hypomyce. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 421.

Synon. Episporangium Bertero?; Kentrosporium Wallr.; Claviceps Tul.

H y p o c y r t a***) Martius 1829. Nov. gen. III. p. 48. t. 220—220: nov. g. Gesnerear. Sect.: Codonanthe, Oncogastra. *Cf.* Flora Lit. I. p. 10. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 652: g. Beslerïear. Sect. eaed. — Par. A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 540. Sect. eaed. — Meisn. 1840. Gen. p. 304 (214). — Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4688. Sect.: Hypocyrta, Oncogastra. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 578. — Benth. 1846. Lond. journ. V. p. 359.

Endl. 1839. Gen. n. 4159. n. 720; 1841. Ench. p. 349: g. Beslerear. Sect. ut Mart.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 257: g. Gesneriear.

Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 2. t. 202. Sect. ut Mart.

Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 209: g. Hypocyrtear. (restrict.)

*) Nomen ex Dioscoride et Plinio.

**) κόπρος, stercus.

***) ὑπό, sub; κυρτός, gibbosus, quia omnes gibbum in inferiore tubi parte exhibent sat conspicuum.

Hypocyrteae Hanstein 1853. Linnaea XXVI. p. 199: subtrib. Besleriear. Gen.: Alloplectus, Erythranthus, Collandra, Calanthus, Stenanthus, Polythysania, Ortholoma, Stygnanthe, Gasteranthus, Hypocyrta, Codonanthes, Besleria, Hygea.

Oersted 1858. Gesn. centroam. p. . . .: div. Eubesleriear. Gen. ead. et Tussacia. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 432.

H y p o d a e u r u s Hochst. 1841 in sched. pl. Schimp. abyss. 22. 71. (Nomen.) *Cf. Hypudaeurus.*

= Anthephora Nees. (Hochst. in Flora 1844. p. 101. 249.)

H y p o d e m a*) Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1577*b*: sect. Cypripedii.

Rchb. 1841. Nom. p. 56. n. 2198: g. Cypripediear.

H y p o d e m a t i u m Kunze 1833. Flora II. p. 689: nov. g. Polypodiacear. (H. onustum.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 44.

Link 1841. Fil. h. Berol. p. 98: g. Aspidiacear.

Meisn. 1843. Gen. p. 433 (334): g. Dicksoniear.

Fée 1852. Gen. Fil. p. 297: subg. Aspidii?

H y p o d e m a t i u m Rich. 1847. Fl. Abyssin. I. p. 348: nov. g. Rubiacear. (Mitracarpi sp. Hochst.)

Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 743: g. Spermacocear.?

H y p o d e m a t i u m Rich. 1850. Fl. Abyssin. II. p. 286: nov. g. Orchidear.

= Lissochilus R. Brown.

H y p o d e r m a DC. 1805. Fl. franç. II. p. 304; 1815. V. p. 164: nov. g. Hypoxylor. (Hysterium pinastri, conigenum, etc. Pers.)

DC. 1817. Mém. Mus. III. p. 316: g. Xylomor.

Leman 1821. Dict. v. 22. p. 369. 384: g. Xylomear. *Cf.* Dict. v. 59. p. 163.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 509: g. Hysteridear.

Chevall. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 31. Disjungitur Lophoderma.

H y p o d e r m a Nestl. mss. (ex Link Spec. II. p. 88.)

= Schizoderma Kunze.

Hypodermia Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: cohors Fungor. Gen.: Stilbospora, Cryptosporium, Puccinia, Hypodermium, Naemaspora.

Fries 1821. Syst. myc. I. p. xxxix: subordo Entophytar. Gen.: Caeoma, Spilocaea, Phragmidium, Podisoma.

Hypodermii Fries 1825. Pl. homon. p. 196: trib. Entophytor. Gen.: Puccinia, Phragmidium, Triphragmium, Dicaeoma, Accidium, Spilocaea. — Simil. Rchb. 1828. Consp. p. 3. Gen.: Spilocoea, Uredo, Aecidium, Dicaeoma, Triphragmium, Phragmidium, Xenodochus.

*) ὑπόδημα, ungula equina.

Hypodermii Fries cont.
Fries 1832. Syst. myc. III. 2. p. 460: ordo Coniomycetum. Gen.: Gymnosporangium, Podisoma, Puccinia, Epitea, Aecidium, Uredo, Ustilago. — Par. Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 509. Divis.: Aecidinei, Uredinei, Ustilaginei.

Hypoderminus Fries 1836. Epicr. p. 211: sect. Crepidoti.

Hypodermium Link 1816. Berl. Mag. VII. p. 26: g. Mucedinum entophytar. (antea *Caeoma*). Subgen.: Ustilago, Uredo, Uromyces, Aecidium, Peridermium, Röstelia. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 371.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 9: g. Hypodermior.
Link 1825. Spec. II. p. 88: g. Gymnomycetum.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Stilbosporeor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 2. n. 52.
Rchb. 1828. Consp. p. 3. n. 9*b*: sect. Aecidii.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 2; 1842. Mycol. p. 7: g. Caeomacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 49: g. Tubercularinor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Conf. Schizodermium Kunze.

Hypoderrideae Hook. 1844. Spec. Fil. I. p. 57: subtrib. Dicksoniear. Gen. unicum: Hypoderris.

Hypoderris*) R. Brown 1829 in Wall. Pl. As. rar. I. p. 16 in adnot. *Cf.* Hook. Gen. Fil. I.
Endl. 1841. Spl. I. n. 648/$_2$. p. 1350; 1841. Ench. p. 37: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 29. n. 1038.
J. Smith 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 182: g. Aspidiear.
Meisn. 1843. Gen. p. 434 (335): g. Dicksoniear. — Par. Fée 1852. Gen. Fil. p. 337.
Hook. 1844. Sp. Fil. I. p. 57: g. Hypoderridear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694: g. Woodsiear.

Hypodicarpae Agardh 1825. Class. plant. p. 16; 1826. Isis p. 590: class. Phanerocotyledonear. completar. perigynar. Ord.: Lorantheae, Rhizophoreae, Caprifoliaceae, Hederaceae, Ampelideae, Rubiaceae, Umbellatae, Araliaceae, Viburneae, Cunoniaceae, Saxifrageae, Grossulariae.

Hypodiscus Nees 1836 in Lindl. Nat. syst. ed. II. p. 450: nov. g. Restiacear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 451. — Meisn. 1842. Gen. p. 409 (313). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 121. — Steud. 1855. Glum. II. p. 265.

*) δέῤῥις, tegumentum coriaceum.

Hypodiscus Nees cont.
Endl. 1837. Gen. n. 1012*b*. p. 121; 1841. Ench. p. 67: sect. Willdenowiae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 42. n. 1501. a.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139: g. Restionear.

Hypodrys Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 148: nov. g. Porodermeor. (Boletus hepaticus Schäff.)
Fistulina Bull.

Hypoëlytreae Presl fratr. 1828. Reliq. Hänk. I. 3. p. . . .: trib. Cyperacear. genuinar. Gen.: Hypoelytrum, Albikia, Fuirena.

Hypoëlytrum HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 218: g. Scirpear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 149.
Link 1827. Hort. I. p. 327 (*Hypelytrum*): g. Cyperoidear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 130 (*Hypelythrum*). 227 (*Hypelytrum*): g. Cyperacear.
= Lipocarpha R. Brown.

Hypoëlytrum Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. p. 20 et Schult. 1824. Mant. II. p. 4): g. Cyperear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1083.
Presl fr. 1828. Reliq. Hänk. I. 3. p. . . .: g. Hypoëlytrear.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Cyperinar.
Hypolytrum Kunth.

Hypoëstes „Soland. mss." R. Brown 1810. Prodr. I. p. 474. Ed. Nees p. 330: nov. g. Acanthacear. — Par. Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 371. — Blume 1826. Bijr. Nr. 14. p. 782. — Bartl. 1830. Ord. p. 184. — Hook. & Arn. 1836. Beech voy. Bot. Pt. V. p. 207 (*Hypoestis*).
Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 55. 140. n. 78: g. Diandr. Monogyn.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 411; 1825. Syst. I. p. 87. n. 108; 1830. Gen. I. p. 23. n. 97: g. Acanthear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3115.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Justiciear.
Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 114; 1841. Linnaea XV. p. 375; 1847 in DC. Pr. XI. p. 501: g. Dicliplerear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 190; 1841. Nom. p. 110. n. 4290. — Endl. 1839. Gen. n. 4097. p. 707; 1841. Ench. p. 344. — Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 850.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 81: g. Acanthacear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 64: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 680: g. Diclipteridar.
Synon. Micranthus Wendl.; Phaylopsis Willd.; Phaulopsis Spreng.

Hypoestis Hook. & Arn. vid. *praeced.*

Hypogaei „Berk." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 42: subordo Gasteromycetum. Gen.: Gautieria, Splanchnomyces, Hymenangium, Octaviana, Melanogaster, Hyperhiza, Hydnangium, Hysterangium.

Hypogaeum Gray vid. *seq.*

Hypogeum Pers. 1797. Tent. disp. p. 7: g. Dermatocarpi.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 566. 582 (*Hypogaeum*): g. Lycoperdonidear.
= Elaphomyces Nees

Hypoglossum Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phycol. gener. p. 444; 1845. Phycol. germ. p. 333; 1849. Spec. Alg. p. 875. n. 578: g. Delesseriear. Sect.: genuina, Pteridium. — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 173.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 96: subg. Delesseriae.
Synon. Wormskioldia Spreng.; Hemineura Harv.

Hypogynae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 34: cohors Endogenar. Nixus: Palmales, Liliales, Commelales, Alismales, Juncales.

Hypogynium Nees 1829. Agrost. Bras. p. 364: nov. g. Sacchariuear. (Anatherum domingense R. & Sch.)
= Anatherum Palis.

Hypolaena R. Brown 1810 Prodr. I. p. 251. Ed. Nees p. 107: nov. g. Restiacear. (H. fastigiata et exsulca.) — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 157. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 188. n. 213. (Triandr. Monogyn.) — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 272. — Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41. — Nees 1830. Linnaea V. p. 663; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 69. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Endl. 1837. Gen. n. 1011. p. 121; 1841. Ench. p. 67. — Kunth 1841. Enum. p. 450. — Rchb. 1841. Nom. p. 42 n. 1500. — Meisn. 1842. Gen. p. 409 (313). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 121. — Steud. 1855. Glum. II. p. 264
Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 374: g. Juncear.
Palis. mss. ex Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 39: g. Elegiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1143: g. Restionear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62. — Bartl. 1830. Ord. p. 36. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 139.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 48. n. 222 (*Hypochlaena*): g. Restiear.
Synon. Cucullifera Nees?

Hypolepia Rafin. 1809 in Desv. journ. bot. II. p. 178: nov. g. Fungor.
= Dacrymyces Nees?

Hypolepideae Fée 1852. Gen. Fil. p. 36. 145: subtrib. Cheilanthear. Gen.: Adiantopsis, Hypolepis.

Hypolepis Bernhardi 1806 in Schrad. n. Journ. I. 2. p. 34: nov. g. Cathetogyratar. (Lonchitis tenuifolia Forst.)
Presl 1836. Pterid. p. 161: g. Lonchitidear.
Endl. 1841. Spl. I. n. 618*b*. p. 1347; 1841. Ench. p. 36: sect. Cheilanthis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 1006. 2.
Link 1841. Fil. h. Berol. p. 67: g. Pteridear. — Par. Hook. 1851. Sp. Fil. II. p. 59.

Hypolepis Bernhardi cont.
J. Smith 1841. Hook. journ. bot. III. p. 404; 1842. ibid. IV. p. 157: g. Pteridiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 79: g. Polypodear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 146: g. Hypolepidear.
Hook. f. 1855. N. Zeal. II. p. 22: g. Polypodiear.
Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 80: g. Aspidiacear.
Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p 280: g. Pteroidear.

Hypolepis Pers. 1807. Ench. II. p. 598. n. 2175: g. Dioec. Monandr. *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 375.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 19. n. 35; 1830. Gen. I. p. 11. n. 38: g. Monandr. Monogyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 212ª n. 1682ᵇ: g. Balanophorear.
Schott 1832. Melet. p. 13: g. Cytineis aff.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 92: g. Cytinacear.
= Cytinus Linn.?

Hypolepis „Palis." Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 22 et Schult. Mant. II. p. 4): nov. g. Cyperear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1096. — Nees 1832. Linnaea VII. p. 521. *Cf.* Nees 1832. ibid. VIII. p. 93.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.
= Melancranis Vahl.

Hypolyssus Pers. 1825. Mycol. eur. II. p. 6: nov. g. Merulinor. (Helvella infundibuliformis Sow.) *Cf.* Leman 1825. Dict. v. 38. p. 517.
= Leotia Hill.

Hypolyssus „Berk." Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 41: g. Auricularinor. (Nomen.)

Hypolytreae Nees 1834. Linnaea IX. p. 287; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 61; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 73: trib. Cyperacear. Gen. §. 1: Anosporum, Melancranis. §. 2: Hemicarpha, Lipocarpha, Hypolytrum, Diplasia, Fuirena. — Par. Endl. 1837. Gen. p. 116. Gen.: Lipocarpha, Hypolytrum, Diplasia. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1355 et Ench. p. 64) Platylepis. — Kunth 1837. Cyper. p. 265. Gen.: Lipocarpha, Hemicarpha, Platylepis, Hypolytrum, Diplasia, Mapania. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). Gen. ead. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145. Gen. ead. — Steud. 1855. Glum. II. p. 129. Gen. ead. et Lyprolepis, Pandanophyllum.
Rchb. 1841. Nom. p. 41: subdiv. Scirpinar. Gen. ut Endl. 1841.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: subordo Cyperacear. Gen. ut Kunth (excepta Mapania).

Hypolytrum Rich. 1805 in Pers. Ench. I. p. 70. n. 128: nov. g. Triandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 36.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 232. n. 230: g. Cyperacear.

Hypolytrum Rich. cont.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 50. n. 239 (*Hypelytrum*): g. Cyperear.
Nees 1834. Linnaea IX. p. 287; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 65; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 73: g. Hypolytrear. — Par. Kunth 1837. Cyper. p. 269. — Endl. 1837. Gen. n. 988. p. 116; 1841. Ench. p. 64. — Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1482. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — Steud. 1855. Glum. II. p. 131. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 332.
Synon. Beera Palis.; Albikia Presl; Hypoelytrum Lestib.; Hypaelytrum Poir.; Tungae sp. Roxb.

Hypomonopetalae Wilbrand 1837. Handb. p. LVIII: class. (XIII.) Dicotyledonum.

Hypomyce Fries 1825. Pl. homon. p. 105: sect. Hypocreae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 279*b*; 1841. Nom. p. 7. n. 301. 2.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 383: subg. Hypocreae.

Hypopeltis Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. Am. II. p. 266: nov. g. Filicum, a Polypodio L. sejunctum.
= Polystichum Roth.

Hypoperigonicae Wilbrand 1837. Hdb. p. LVIII: class. (V.) Monocotyledonum.

Hypopetaleae Juss. 1824. Dict. v. 30. p. 463: class. XIII. Dicotyledonum.

Hypophialium Nees in Sieb. Agrostoth.: novum genus in Linnaea VII. p. 530 tamquam synonymum Hemichlaenae citatum, 1838 (ibid. VIII. p. 89) ad Acrolepidem Schrad. relatum.

Hypophoestum „Gray" DC. Prodr. VI. p. 565 in synon. Centaureae: vid. *Hippophaestum Gray*.

Hypophylla Stackhouse 1816. Ner. brit. ed. alt.: nov. g. Algar. *Cf.* Spreng. n. Entd. I. p. 97 et Leman 1821. Dict. v. 22. p. 378.
= . . .?

Hypophyllarion Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 250: sect. Byrsonimae.

Hypophyllina Rchb. 1828. Consp. p. 30: div. Jungermannieor. Gen.: Targionia, Rupinia, Grimaldia.

Hypophyllocarpa Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 28: class. III. Cryptogamor. Ordines: Gyrata, Agyrata.
= Filices Bernh.

Hypophyllocarpi Brid. 1827. Bryol. II. p. XL. 709: class. 6 Muscor. Gen.: Helicophyllum; Hypopterygium, Cyathophorum, Racopilum.
Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60: fam. 18. Muscor. Gen. ead.
Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 92: series Bryacear. Gen.: Racopilum, Hypopterygium.
Hampe 1847. Linnaea XX. p. 94: subdiv. Acromitrior.

Hypophyllocarpia Rchb. 1828. Consp. p. 31: div. Bryoideor. Gen. Hypophyllocarporum Brid.

Hypophyllocarpiae Schulz 1832. Nat. Syst. (Isis 1834. p. 524): fam. Homorganor. caulosporor. Gen.: Anoectangium.

Hypophyllocarpodendron Boerh. 1720. Lugd. Bat. II. p. 206.
= Mimetes Salisb.

Hypophysca Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 305: sect. Tococae. *Cf.* Walp. Rep. II. p. 141.

Hypopithieae Klotzsch 1851. Linnaea XXIV. p. 12: ordo Bicornium.

Hypopithydes Link 1831. Handb. II. p. 403: ordo 33 Allostemonum. Gen.: Monotropa.

Hypopithys Scop., Nutt., etc. vid. *Hypopitys Dill.*

Hypopitis Rupp. 1718. Fl. jen. p. 80. Ed. Hall. 1745. p. 91; g. pl. class. IV.
Hypopitys Dill.

Hypopitys*) Dillen. 1719. Nov. gen. p. 134. t. 7: nov. g. herbae Enangiospermae Hexapetalae.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 411: g. Dicotyledonum Diplostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 443: g. Cistor.
Scop. 1772. Carn. I. p. 285 (*Hypopithys*): g. Decandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 270 (*Hypopithys*).
Ehrh. 1780. Phytophyl. Nr. 44; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Monotropa Hypopitys Linn.)
Mönch 1794. Meth. p. 306: g. Thalamostemonis.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 404: g. Monotropar.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 866: g. Monotropear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 780. — Endl. 1839. Gen. n. 4352. p. 761 (*Hypopithys*); 1841. Ench. p. 375. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 445 (*Hypopythis*). 520 (*Hypopithys*). — Rchb. 1841. Nom. p. 125. n. 4872. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 934. — Turcz. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 509. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 338.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 452 (*Hypopithys*): g. Monotropacear.
Synon. Orobanchoides Tourn.; Hypopitis Rupp.

Hypoplasta Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 712: nov. g. Sphaeronemear. (H. hysteriaeforme.)

Hypopogon Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 246: nov. g. Laplaceae simile. (H. brevipes.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VII. p. 376. (g. Bonnetieur.)

Hypopolypetalae Wilbrand 1837. Handb. p. LVIII: class. XII. Dicotyledonum.

Hypoporum Nees 1834. Linnaea IX. p. 302; 1834. Edinb. n. phil. journ. XVII. p. 266; 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 169; nov. g. Sclerear. (Scleria verticillata W.) *Cf.* Steud. 1855. Glum. II. p. 174.

*) πίτυς, pinus.

Hypoporum Nees cont.
Endl. 1837. Gen. n. 964*c*. p. 112; 1841. Ench. p. 63; sect. Scleriae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1443. 3.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119: g Sclerear.

Hypopteris Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 387: subg. Dothideae. (D. Pteridis.)

Hypopteron Hasskarl 1838. Dec. 202 (citat. in Cat. Bogor. 1844. p. 154).
= Liebigia Endl.

Hypopterygiaceae C. Müll. 1850. Bot. Zeit. p. 653 (antea *Hypopterygieae*); 1851. Syn. Musc. II. p. 3: trib. Pleurocarpor. Gen.: Hypopterygium, Cyathophorum; Helicophyllum? *Cf. Hypophyllocarpi Brid.*

Hypopterygieae C. Müll. 1848. Bot. Zeit. p. 767: vid. *praeced.*
Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: trib. Pleurocarpor. Gen. Hypophyllocarpor. Brid. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 117. Gen.: Hypopterygium, Lopidium, Catharomnion, Cyathophorum.

Hypopterygium Brid. 1827. Bryol. II. p. 709: nov. g. Hypophyllocarpor. (ibid. p. XLVI Jungermannoideor.) — Par. Fürnr. 1829. Flora II. Erg. Bl. p. 60. — Hornsch. 1840 in Mart. Fl. Bras. fasc. I. p. 94. — Hampe 1847. Linnaea XX. p. 95.
Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 536: g. Hypophyllocarpior.
C. Müll. 1848. Bot. Zeit. p. 767: g. Hypopterygiear. — Par. Mont. 1849 in Orb Dict. VIII. p. 399. — Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 117.
C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 3: g. Hypopterygiacear. Sect.: Euhypopterygium, Rhacopilum.

Hypopterygium Schlechtend. 1843. Linnaea XVII. p. 635: nov. g. novi ordinis. (H. adstringens.)
Juliania Schltd.

Hypopythis Spach vid. *Hypopitys Dill.*

Hyporhamma Corda 1854. Icon. Fung. VI. p. 13. t. 2. f. 34: nov. g. Trichiaceor. (Trichia reticulata Pers.)

Hyporhodius Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 10; 1825. Pl. homon. p. 68: series Agarici. Tribus; Mouceron, Clitopilus, Leptonia, Nolanea, Eccilia. — Par. Fries 1836. Epicr. p. 138; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 285. Subgen.: Volvaria, Pluteus, Entoloma, Clitopilus, Leptonia, Nolanea, Eccilia. — Bail 1858. Syst. p. 38 (*Hyporrhodii*). Subgen. ead. excepto ultimo.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *G*; 1841. Nom. p. 12. n. 502. 4 (*Hyporrhodius*): sect. Agarici. Subsect. ut Fries 1821 (excepto Mouceron) et 1841 Entoloma. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 453. *VI.* p. 41; 1841. Ench. p. 22. Subsect. ut Fries. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 102. Subsect. ut Rchb. et Pluteus. — Math. 1853. Belg. II. p. 362 (*Hyporrhodius*). Subsect. ex Fries.

Hyporhodius Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 394; 1838. Epicr. p. 425; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 318: sect. Boleti. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 448*b*. p. 40; 1841. Ench. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 483. 3. — Math. 1853. Belg. II. p. 332.
Phaiosporus Strauss.

Hyporrhodius Rchb., Math. vid. *Hyporhodius Fries* (sect. Agarici).

Hypospila Fries 1825. Pl. homon. p. 109: nov. g. Dichaeneor. (Spiloma inustum Achar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 274. — Endl. 1836. Gen. n. 392. p. 34; 1841. Ench. p. 19.
Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 297: g. Hypospileor.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 133: g. Sphaeriaceor. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491. (?)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium minus notum.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 421: g. Phyllosticteor.

Hypospilei Rchb. 1841. Nomencl. p. 7: subdiv. Sphaeriaceor. genuinor. Gen.: Gibbera, Ostropa, Hypospila.

Hypostamineae Juss. 1824. Dict. v. 30. p. 463: class. VII. Dicotyledonum.

Hypostomi Brid. 1822. Meth. musc. p. XVIII. 204: class. Muscor. frondosor. Gen.: Dawsonia.

Hypothronia*) Schrank 1824. Syll. Ratisb. I. p. 85: nov. g. Hyptidear.
Walp. 1845. Rep. III. p. 521. 977: g. Plectranthear.
= Hyptis Jacq. (Benth. in DC. Pr. XII. p. 85.)

Hypoxanthus Richard mss. teste DC.
Rchb. 1841. Nom. p 174. n. 6767. 2: sect. Miconiae.
= Eriosphaera DC.

Hypoxerus Fries 1838. Epicr. p. 400: sect. Xeroti.

Hypoxidaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 154: ordo Narcissalium. Gen.: Curculigo, Forbesia, Hypoxis, Pauridia.

Hypoxideae R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 576 (Verm. bot. Schr. I. p. 101): novus ordo plant., ab Asphodeleis sejunctus. Gen.: Hypoxis, Curculigo. *Cf.* Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 21.
Agdh. 1823. Aphor. p. 164; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 585: trib. Asphodelear. Gen. ead.
Rchb. 1828. Consp. p. 60: subdiv. Haemodoracear. Gen.: Gethyllis, Hypoxis, Campynema, Compsoa, Curculigo.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. 58: fam. Iridariear. Trib.: Curculigineae, Gethyllideae.

---

*) Quod stamina quasi sub throni umbella recondantur.

Hypoxideae R. Brown cont.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (235) Hexapetaloidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 42: ordo (30) Ensatar. Gen. ut R. Brown et Compsoa. — Par. Endl. 1837. Gen. p 173. Gen. Browniana. Accedit 1841 (Spl. I. p. 1360 et Ench. p. 101) gen. dubium Pauridia. — Meisn. 1842. Gen. p. 397 (300). Gen. ead
Lindl. 1833. Nix. p. 33: ordo Narcissalium.
Mart. 1835. Consp. p. 9: ordo 44.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 329: sect. Amaryllidear.
Herb. 1837. Amaryll. p. 64. 83: subordo Amaryllidacear. Gen.: Weldenia?, Curculigo, Molineria, Hypoxis, Coelanthus; Lanarieae, Alströmerieae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 151; 1841. Nom. p. 45: subdiv. Haemodorear. Gen.: Pauridia, Hypoxis, Forbesia, Curculigo.
Bernh. 1840. Flora II. p. 426: trib. Alliacear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 22: fam. Lirioidear. Gen. Browniana.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 114: fam. (116) Ensatar. Gen. ut Rchb. et Niobaea, Coelanthus.
Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 49. Gen.: Hypoxis.
Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 788: fam. Monocotyledonum. Gen. ut Endl.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 417: fam. Homoblastear.
Synon. Curculigineae Dumort.

Hypoxis Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 986. 1366. n. 1127; 1762. Sp. ed. II. p. 439; 1764. Gen. ed. VI. p. 166. n. 417; 1767. Syst. ed. XII. p. 242. n. 413: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 270; 1784. Syst. p. 326. — Reich. 1778. Gen. p. 169. n. 450. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 221. n. 565. — Lour. 1790. Coch. I. p. 200. — Gmel. 1791. Syst. p. 548. — Pers. 1797. Syst. p. 347; 1805. Ench. I. p. 362. n. 801. — Willd. 1799. Sp. II. p. 106. n. 637; 1809. En. p. 367. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 266. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 215.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Musar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 57: g. Narcissor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 85
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Coronariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 283.
Gled. 1764. Syst. p. 222. n. 922: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 86: g. Liliacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 324.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 33. t. 11. f. 6.
Neck. 1790. El. III. p. 159. n. 1504: g. Ymnodiphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 185: g. Narcissoideis aff.
Batsch 1802. Tab. p. 132: g. Alliacear.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 107: g. Thalamostemonis.

Hypoxis Linn. cont.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 139: g. Amaryllideis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 232. n. 945.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 288. Ed. Nees p. 144: g. inter Asphodeleas et Amaryllideas medium.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 576 (Verm. bot. Schr. I. p. 101): g. Hypoxidear. — Par. HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 286. — Kunth 1822. Syn. 1. p. 291. — Agdh. 1823. Aphor. p. 164. — D. Don 1825. Nepal. p. 53. — Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1215; 1841. Nom. p. 45. n. 1651. — Bartl. 1830. Ord. p. 42. — Herb. 1837. Amaryll. p. 65. 84. — Endl. 1837. Gen. n. 1264. p. 174; 1841. Ench. p. 102. — Meisn. 1842. Gen. p. 397 (300). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 22. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 115. — Lehm. 1847. Pl. Preiss. II. p. 14. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 49. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 252. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 586.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 249; 1825. Syst. II. p. 59. n. 1206: g. Spathacear. — Par. Eckl. 1827. Verz. p. 9. — Schult. 1830. Syst. VII. p. XLVI. 759.
Poir. 1821. Dict. v. 23. p. 380: g. Narcissear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Curculiginear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 277. n. 1438: g. Asphodelear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1045. 1188.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 158: g. Crocear.
Lallem. 1845. Ind. sem. h. Petrop. (Ann. sc. nat. 3e sér. V. 1846. p. 374.) Sect.: Platyzyga.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 154: g. Hypoxidacear.
Synon. Niobea Willd.; Niobaea Spach; Schnizleinia Steud.; Franquevillea Zoll.

Hypoxyla DC. 1805. Fl. franç. II p. 280 (1819. Théor. élém. p. 250): fam. tertia Acotyledonum. Gen. §. 1: Rhizomorpha, Sphaeria, Naemaspora, Xyloma, Hypoderma. §. 2: Hysterium, Opegrapha, Verrucaria, Pertusaria.

Hypoxyla lichenoidea Chevall. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 29. Gen.: Hysterium, Polymorphum, Opegrapha, Arthonia, Verrucaria, Pertusaria.

Hypoxyleae Mirbel 1815. Élém. I. p. 414. II. p. 863: div. 3 Acotyledonum. Gen.: Verrucaria, Opegrapha, Sphaeria.
Mass. 1818. Dict. v. 12 p. 118: div. Cryptogamar.
Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384: fam. Cryptogamar., intermedia inter Fungos et Lichenes. Divis.: Pseudofungi, Pseudolichenes.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 582: fam. 5 Fungor. Trib.: Sphaeriaceae, Phacidiaceae, Cytisporeae.

Hypoxyleae Mirbel cont.
Brongn. 1843. En. genr. p. 2: fam. Scleromycetum.
Math. 1853. Belg. II. p. 158: fam. 4 Acotyledonear. Trib.: lichenoideae (gen.: Verrucaria, Pertusaria), Sphaeriaceae, Phacidiaceae, Cytisporeae.

Hypoxylon Adans. 1763. Fam. II. p. 9: g. Fungor. (*Mentz.* t. 6; *Clavaria Vaill.* Bot. t. 7. f. 4; *Lichenagaricus Mich.* t. 54. 55. Ordo 1. fig. 1. 2. 4. 5.)
Varia.

Hypoxylon Bulliard 1798. Champ. p. 316: nov. g. Fungor. *Cf.* Leman 1821. Dict. v. 22. p. 385. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 17. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 7.
DC. 1805. Franç. II. p. 282: sect. Sphaeriae.
Fries 1818. Obs. myc. II. p. 317: sect. Cordyliae.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 512: g. Spheridear.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 325: series Cordycipitis.
Chevall. 1824. Graphidées.
Fries 1825. Pl. homon. p. 10 5: g. Sphaerinor. Sect.: Xylaria, Poronia, Hypoxylon, Diatrypa. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 12. n. 278; 1841. Nom. p. 7. n. 300. Sect. eaed. — Endl. 1836. Gen. n. 396. p. 34; 1841. Ench. p. 20. — Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. 1. p. 241. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 222.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 181: g. Sphaeriaceor. — Par. Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 32; 1842. Mycol. p. 135. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 383. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 491. — Bonord. 1851. Hdb. p. 273. — Bail 1858. Syst. p. 54. (stromaticorum, includens Xylariam Pers.)
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 82; 1842. Pl. cell. cub. p. 337: g. Pyrenomycetum. (reform.)
Math. 1853. Belg. II. p. 166: g. Sphaeriacear.
Synon. Hypoxylum Juss.?; Poronia Willd.; Xylaria Pers.; Peripherostoma et Nemania Gray; Lichen-Agaricus Mich. pt.

Hypoxylum Juss. 1789. Gen. p. 6: g. Lichenum.
= praeced.?

Hyppocastaneae Dumort. vid. *Hippocastaneae DC.*

Hypsanthus*) Endl. 1838. Gen. n. 2122*b.* p. 337; 1841. Ench. p. 215: sect. Isopogonis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2379. 2.

Hypsela*) Presl 1836. Prodr. mon. Lobel. p. 45: nov. g. Clintoniear. (Lysipomia reniformis Kunth.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 186. — Endl. 1838. Gen. n. 3054. p. 510; 1841. Ench. p. 263. — Meisn. 1839. Gen. p. 240 (147). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572. — Walp. 1843. Rep. II. p. 706.
DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 350: sect. Lysipomatis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3978. 2.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Clintonear.

Hypseocharis**) Rémy 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 238: nov. g. Geraniacear. (H. pimpinellifolia), [a Griseb. (Arch. f. Naturg. 1848. II. p. 320) ad Ledocarpeas relatum]. — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 141.

Hypserpa Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 36. 40: nov. g. Eleutharrhenear. (Cocculus cuspidatus Wall.)
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 189 Limaciae injungunt. *Cf.* Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 136.

Hyptage Juss., Dumort. vid. *Hiptage Gärtn.*

Hyptageae Dumort. vid. *Hiptageae DC.*

Hyptianthera***) Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 399: nov. g. Gardeniear. (Randia stricta Roxb.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 163 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2960. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3303. p. 561; 1841. Ench. p. 274: g. Eugardeniear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 518.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Hyptidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 661: trib. Ocimear. Gen. Hyptidear. Endl., excluso primo.

Hyptideae Endl. 1838. Gen. p. 610; 1841. Ench. p. 310: subtrib. Ocimoidear. Gen.: Syncolostemon, Peltodon, Marsypianthes, Hyptis, Eriope. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (191). Gen. ead. — Walp. 1845. Rep. III. p. 522. Gen. ead. et Rhaphiodon. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 75. Gen. ut Endl. (excepto primo.)
Rchb. 1841. Nom. p. 106: sect. Ocimoidear. Gen. ut Endl.

Hyptis Jacquin 1786. Collect. I. p. 101: nov. g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 388. n. 969. — Gmel. 1791. Syst. p. 898. — Willd. 1800. Sp. III. p. 84. n. 1104; 1809. En. p. 612.
Juss. 1789. Gen. p. 449: g. Labiatar. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 334. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 260. — Poit. 1806. Ann. Mus. VII. p. 459. (Monogr.) — Pers. 1807. Ench. II. p. 120. n. 1384. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 317. — Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 387. — Link 1822. En. II. p. 306. — Kunth 1823. Syn. II. p. 91. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 730. n. 2096; 1831. Gen. II. p. 474. n. 2338.

---

*) ὕψος, cacumen, vertex.

*) ὑψηλός, altus.

**) ὕψεος χάριτι: cacuminis ornamento.

***) ὕπτιος, supinus, recurvatus.

Hyptis Jacquin cont.

Batsch 1802. Tab. p. 190: g. Verticillatar.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 432: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2877. — Bartl. 1830. Ord. p. 183.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Ocymear.

Benth. 1833. Labiat. p. 64: g. Ocymoidear. Sect.: Gymneia, Spicaria, Apodotes, Plagiotis, Cyrta, Cyanocephalus, Eriosphaeria, Oocephalus, Trichosphaeria, Xanthiophaea, Cephalohyptis, Polydesmia, Mesosphaeria, Pectinaria, Minthidium, Buddleioides, Umbellaria, Siagonarrhen, Hypenia. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 686. Sect. eaed. — Rchb. 1837. Hdb. p. 189. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 351. 385. Sect. eaed.

Endl. 1838. Gen. n. 3583. p. 610; 1841. Ench. p. 306: g. Hyptidear. Sect. ut Benth. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 283 (191). — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4131. Sect. eaed. (Pectinia, Hyptis, Buddleiothamnus loco Pectinariae, Minthidii et Buddleioidis.) — Walp. 1845. Rep. III. p. 524. 978. Sect. ut Benth. — Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 80.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 68: g. Ocimoidear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Hyptidar.

Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 85: g. Ocimear. Sect. ut antea (emissis Cyanocephalo et Umbellaria) et Myriocephala, Leucocephala, Turbinaria. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 958.

Synon. Condea Adans.; Hypothronia Schrank.

Hyptis Rchb. 1841. Nomencl. p. 106. n. 4131. [15]: sect. Hyptidis.

= Minthidium Benth.

Hypudaeurus Rchb. 1841. Nomencl. p. 37. n. 1290: g. Panicear. (*Hypodaeurus Hochst.*) — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 318. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 159.

= Anthephora Nees.

Hyrtanandra Miquel 1851. Pl. Jungh. Fasc. I. p. 25: nov. g. Urticear. (Urtica pentandra Roxb., etc.)

= Memorialis Hamilt. (Wedd.)

Hyssopeae Rchb. 1831. Fl. exc. p. 315: div. Schizogynar. Gen.: Elsholzia, Hyssopus.

Endl. 1838. Gen. p. 617; 1841. Ench. p. 307: subtrib. Satureinear. Gen.: Hyssopus. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 284 (193). Gen. id. — Walp. 1845. Rep. III. p. 711. Gen. id.

Rchb. 1841. Nom. p. 104: subdiv. Origanear. Gen. id.

Hyssopi Rüling 1774. Ord. nat. Tab.: div. Verticillatar.

Hyssopidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 661: trib. Saturear. Gen.: Hyssopus.

Hyssopifolia „C. Bauh. 1623. Pin. p. 218" DC. 1826. Mém. Genèv. III. 2. p. 78; 1828. Prodr. III. p. 81: sect. Lythri. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 172. n. 4558 *b*; 1841. Nom. p. 172. n. 6648. [1]. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 711. — Endl. 1840. Gen. n. 6149 *b* p. 1201; 1841. Ench. p. 643. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 111. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 9. — Ledeb. 1844. Ross. II. p. 126.

Synon. Salica Hill; Pentaglossum Forsk.; Pythagorea Rafin.; Mozula Rafin.

Hyssopus*) Tourn. 1700. Inst. p. 200. t. 95: g. pl. class. IV.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 231. Ed. Hall. 1745. p. 236: g. pl. class. IX.

Linn. 1737. Gen. p. 169. n. 470; 1737. Cliff. p. 304; 1740. Syst. p. 25; 1748. Ups. p. 162; 1753. Sp. II. p. 569; 1759. Syst. ed. X. p. 1096. n. 628; 1763. Sp. ed. II. p. 796; 1764. Gen. ed. VI. p. 289. n. 709; 1767. Syst. ed. XII. p. 389: g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 441; 1784. Syst. p. 529. — Reich. 1778. Gen. p. 293. n. 767. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 385. n. 963. — Gmel. 1791. Syst. p. 898. — Pers. 1797. Syst. p. 564. — Willd. 1800. Sp. III. p. 47. n. 1096; 1809. En. p. 599. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 27.

Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 184. n. 757: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 387.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Verticillatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 163. — Gis. 1792. Prael. p. 495. — Batsch 1802. Tab. p. 190.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Labiatar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 192. — Juss. 1789. Gen. p. 113. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 333. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 259. — DC. 1805. Franç. III. p. 525. — Pers. 1807. Ench. II. p. 114. n. 1376. — Lois. 1821. Dict. v. 22. p. 396. — Link 1822. En. II. p. 101; 1829. Hdb. I. p. 460. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 721. n. 2088; 1831. Gen. II. p. 473. n. 2331. — D. Don 1825. Nepal. p. 110. — Bunge 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 398.

Gmel. 1768. Sibir. III. p. 244: g. Gymnospermar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 250: g. Monopetalar. irregular.

Neck. 1790. El. I. p. 313. n. 491: g. Corythophytor.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 433: g. Nepetear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2867. — Bartl. 1830. Ord. p. 183.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Catariear.

Gaud. 1829. Helv. IV. p. 2. 21: g. Bilabiatar.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 316; 1841. Nom. p. 104. n. 4062: g. Hyssopear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3612. p. 617; 1841. Ench. p. 307. — Meisn. 1840. Gen. p. 284 (193). — Walp. 1845. Rep. III. p. 711. 982.

Benth. 1834. Labiat. p. 356: g. Satureinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 773. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p.

*) *ὕσσωπος* Graecorum.

Hyssopus Tourn. cont.
195. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 413. — Brongn. 1843. En. genr. p. 67.
Koch 1837. Syn. p. 561. Ed. II. p. 645: g. Melissinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189: g. Teucriear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Hyssopidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 251: g. Satureiear. anomalar.
Ledeb. 1849. Ross. III. p. 356: g. Melissear.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 659: g. Thymear.
Synon. Rhuyschiana Adans.?

Hysterangiei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489: trib. Entobasidum. Gen.: Gauthiera, Splanchnomyces, Hymenangium, Octaviana, Melanogaster, Hyperrhiza?, Hydnangium, Hysterangium, Bromicolla?

Hysterangium*) Vittadini 1831. Tuberac. p. 13.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 26; 1842. Mycol. p. 109: g. Tuberacear.
L. R. & Ch. Tulasne 1843. Ann. sc. nat. 2e sér. XIX, p. 375: g. Lycoperdaceor.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Hypogaeor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 437: g. Hymenogastreor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 482: g. Hysterangieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 239: g. Pisocarpiaceor.
Bail 1858. Syst. p. 10: g. Euhymenogastreor.
= Hyperrhizae Bosc pars?

Hysteria Ehrenb. 1818. Sylv. mycol. Berol. p. 17: cohors Fungor. Gen.: Placuntium, Hysterium, Solenarium, Triblidium, Phacidium.

Hysteria**) Reinw. 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 102; 1825. Syll. Ratisb. II. p. 5: nov. g. Orchidear.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 11 (Linnaea II. p. 229): g. Gastrodiear.? — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 68. n. 1458. — Endl. 1837. Gen. p. 212. n. 1546.
Lindl. 1840. Orchid. p. 439: g. Vanillear.? — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 384 (287).
Endl. 1841. Ench. p. 113. n. 1546: g. Ophrydear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 51. n. 1901.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 182: g. Arethusear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 183: g. Orchidacear. minus notum.
= Corymbis Pet.-Th. (Miq.)

Hysteriaceae Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 34; 1842. Anl. Mycol. p. XCI. 142: fam. Sclerogasterum. Sect.: Stegiaceae, *Hysteriaceae* (gen.: Ailographum, Hysterium, Sporomega, Lophium), Gloniaceae, Cliostomei, Phacidiei.

Hysteriacei Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 151: subtrib. Phacidiaceor. Gen.: Excipula, Hysterium, Phacidium, Rhytisma, Actidium, Lophium.
Bonord. 1851. Hdb. p. 261: fam. Pyrenomycetum. Gen.: Rhytisma, Hysterium, Sporomega, Hysterographium, Phacidium, Eustegia, Lophium, Actidium, Glonium.

Hystericina Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 35: nov. g. Paniceear.

Hysterideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 508: div. Sarcothalamear. Gen.: Actidium, Hypoderma, Hysterium.

Hysteriei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: sect. Rhegmostomeor. Gen.: Glonium, Hysterium, Hysterographium, Lophium, Aylographum, Dichaena, Ostropa, Sporomega, Endotrichum, Schizothecium, Cheilaria, Rhytisma.

Hysterina Achar. 1810. Lich. univ. p. 244; 1814. Syn. Lich. p. 70: sect. Opegraphae. — Par. Chevall. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 37. — Fries 1825. Pl. homon. p. 273. — Rchb. 1828. Consp. p. 21. n. 386*d*; 1841. Nom. p. 16. n. 543. 2. — Endl. 1836. Gen. n. 135*a*. p. 12; 1841. Ench. p. 10.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 504: g. Opegraphidear.
Synon. Opegrapha Eschw.

Hysterineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73. 75: fam. Sphaeriariear. Gen.: Hysterium, Phacidium.

Hysterionica Willd. 1807. Berl. Mag. I. p. 140: nov. g. Syngenes. Necessar. (H. jasionoides.) *Cf.* Cass. 1821. Dict. v. 22. p. 398.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 898: g. Cynarear.
Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2593: g. Heleniear.?
DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 258: inter genera Compositar. incertae sedis. — Par. Meisn. 1839. Comm. p. 122. — Endl. 1841. Spl. I. p. 1391; 1841. Ench. p. 251 (*Hysteronica*).

Hysterites Unger 1841. Chlor. protog. I. p. 1. t. 1 (1846. p. XXIX); 1845. Syn. pl. foss. p. 17: g. Fungor. foss.

Hysterium Tode 1790. Fung. meckl. II. p. 4: . . . . Schr. Berl. Ges. Nat. V. p. 53: nov. g. Fungor. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1480. — Pers. 1796. Obs. mycol. I. p. 83. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 248.
Pers. 1797. Tent. p. 5: g. Sclerocarpi.
Pers. 1801. Syn. p. XIII. 97: g. Sclerocarpor. — Simil. Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 46.
Willd. 1804 in Rebent. Neom. p. XI: g. Xylomycor.
Rebent. 1804. Neom. p. 389: g. Cupulaeformium.
Fries 1815. Obs. mycol. I. p. 192; 1818. II. p. 354: g. Sphaerioideor. — Par. Spreng. 1827. Syst. IV. p. 412. n. 3459; 1831. Gen. II. p. 761. n. 3879.
Nees 1816. Syst. p. 280; 1817. Ueberbl. p. 72: g. Myelomycor.

---

*) ὑστέρα, uterus; ἀγγεῖον, vas.
**) ὕστερος, posticus.

Hysterium Tode cont.
Mart. 1817. Erlang. p. 472: g. Myelomycetum.
Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 17; 1820 in Nees Hor. phys. Berol. p. 101: g. Hysterior.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 510: g. Hysteridear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 83: g. Sphaeriacear.
Chevall. 1822. Journ. Phys. XCIV. p. 30: g. Hypoxylor. lichenoideor.
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 579; 1828. Elench. II. p. 137; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 368: g. Phacidiaceor. — Par. A. Lib. 1837. Ann. sc. nat. 2e sér. VII. p. 123. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Bail 1858. Syst. p. 57. t. 18.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 585: g. Phacidiacear. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 233.
Fries 1825. Pl. homon. p. 117: g. Phacidieor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 11. n. 251; 1841. Nom. p. 7. n. 272. Sect. (1841) ut Endl. — Endl. 1836. Gen. n. 370. p. 32; 1841. Ench. p. 19. Sect.: Lophodermium, Hysterium.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 1020: g. Sclerogastrum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Hysterinear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 95: g. Orthomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 434: g. Hymenomycetum angiosporor.
Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 359: g. Discomycetum.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 34. 75; 1842. Mycol. p. 142: g. Hysteriacear.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 153: g. Hysteriaceor.
Lév. 1845. Ann. sc. nat. 3e sér. III. p. 57: g. Sphaeriaceor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 262.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Hysterieor.

Hysterium DC. 1805. Fl. franç. II. p. 306: g. Hypoxylor. restrict. (Hypoxylon ostraceum Bull.)
DC. 1817. Mém. Mus. III. p. 316 (*Histerium*): g. Xylomor.

Hysterium DC. cont.
Leman 1821. Dict. v. 22. p. 384. 399: g. Xylomear. *Cf.* Dict. v. 59. p. 164.
Endl. 1836. Gen. n. 370*b*. p. 32; 1841. Ench. p. 19: sect. Hysterii. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 7. n. 272. 2.

Hysterocarpus Langsd. mss.
= Didymochlaena Desv.

Hysterographium Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 34. 77. t. 9. f. 61. 62; 1842. Anl. Mycol. p. 143: nov. g. Gloniacear. (Hysterium pulicare.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Phacidiaceor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 490: g. Hysterieor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 262: g. Hysteriaceor.
Preuss 1854. Linnaea XXVI. 6. p. 723: g. Hysteriacear.

Hysterolichenes Arnold 1858. Flora p. 691: ser. III. Lichenum. Ordo: Opegraphaceae.

Hysteromyces Vittad. ined. (Fries Summ. veg. Scand. p. 435.)
= Rhizopogon Fries.

Hysteronica Endl. vid. *Hysterionica Willd.*

Hysterophorus Vaillant 1720. Act. Ac. Paris. p. 335: g. Corymbiferar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 128: g. Calthar.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 89: g. Parthenidiae.
= Parthenium Linn.

Hysterophyta Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 20.
Endl. 1836. Gen. p. 16; 1841. Ench. p. 12: sect. altera Thallophytor. Classis unica: Fungi. — Par. Unger 1838. Aphor.; 1845. Syn. pl. foss. p. 17; 1846. Chlor. prot. p. XXIX.

Hysterophyta Endl. 1836. Gen. p. 42: vid. *Acrobrya*.

Hystricapsa Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 140: nov. g. Physariaceor. (H. trochiformis.) *Cf.* Preuss 1852. ibid. XXV. p. 161.

Hystrix Mönch 1794. Meth. p. 294: g. Thalamostemonis. (Elymus hystrix L.)
= Gymnostichum Schreb.

I.

Iacaranda R. Brown Verm. bot. Schr. V. p. 325: vid. *Jacaranda Juss.*

Ian-Raiu*) Plumier 1703. Nov. gen. p. 33. t. 29.
= Rajania Linn.

Iantha**) Hook. 1825. Exot. fl. t. 113: nov. g. Orchidear. *Cf.* Flora 1825. II. Erg. Bl. p. 36. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 803. n. 4158.
= Ionopsis HBK.

*) Dicat. Joanni Raio, Anglo.

**) Nomen a similitudine cum Viola.

Ianthe*) Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. II. p. 181: sect. Diplopappi. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 577.
Synon. Diplopappi §. Amelloidei DC., Amellia Rchb.

Ianthe Griseb. 1844. Spicil. fl. Rumel. II. p. 40 (*Janthe*): nov. g. Euscrophularinear. (Verbascum bugulifolium Lam.)

*) ἴανθον, viola.

Ianthe Griseb. cont.
Walp. 1845. Rep. III. p. 446. 957: g. Verbascear. — Par. Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 243; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684.

Iasione Auct. vid. *Jasione*.

Ibati Marcgr. 1648. Brasil. p. 19 c. ic. = seq.?

Ibatia*) Decaisne 1844 in DC. Prodr. VIII. p. 599: nov. g. Gonolobar. (Cynanchum maritimum L.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626: g. Gonolobear.

Ibbertsonia Steud. Nom. I. p. 800 (in synon. Cyclopiae p. 459 *Ibettsonia*): vid. *seq.*

Ibbetsonia Sims . . . . Bot. Mag. t. 1259.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 67; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 433: sect. Cyclopiae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6422*b*. p. 1255; 1841. Ench. p. 667. — Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5915. 2.

Iberidastrum DC. 1824. Prodr. II. p. 181: sect. Iberidis. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 66. — Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4744*b*; 1832. Fl. exc. p. 660; 1841. Nom. p. 180. n. 6923. 2. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 195. — Endl. 1839. Gen. n. 4887*b*. p. 871; 1841. Ench. p. 449.

Iberideae Webb & Berth. 1836. Phyt. Canar. I. p. 92: div. Cruciferar. Gen.: Jondraba, Senebiera, Coronopus, Cynocardamum, Capsella.
Meisn. 1837. Gen. p. 12: subtrib. Thlaspidear. Gen.: Hutchinsia, Thlaspi, Teesdalia, Iberis. — Simil. Rchb. 1837. Hdb. p. 259. Gen. ead. excepto primo.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 133: trib. Cruciferar. Gen.: Isatis, Biscutella, Iberis, Teesdalia, Aethionema, Thlaspi, Hutchinsia, Lepidium.

Iberidella DC. 1821. Syst. II. p. 385; 1824. Prodr. I. p. 177: sect. Hutchinsiae. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 192.
Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4751*g*: sect. Lepidii.
Boiss. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 381: g. Cruciferar.
Boiss. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 188: g. Lepidinear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 88. n. 4931/$_1$. — Meisn. 1843. Comm. p. 341.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Lepididar.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 146: sect. Thlaspios. = Noccaea Mönch.

Iberidendron Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 561: sect. Iberidis. (I. sempervirens et semperflorens L.)

*) Nomen a voce caribaca *Ibati*.

Iberidium DC. 1824. Prodr. I. p. 179: sect. Iberidis. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 63. — Rchb. 1828. Consp. p. 182. n. 4744*a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 193. — Endl. 1839. Gen. n. 4887*a*. p. 871; 1841. Ench. p. 449.

Iberion Spach 1838. Hist. vég. phan. VI. p. 564: sect. Iberidis. (I. umbellata et amara L.)

Iberis „Matth." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 77. Ed. Hall. 1745. p. 86: g. pl. class. IV.
Adans. 1763. Fam. II. p. 422: g. Thlaspium. = Lepidii R. Brown sp.

Iberis Dillen. 1719. Nov. gen. p. 123. t. 6: nov. g. pro *Thlaspidio Riv.* constitutum. = Teesdalia R. Brown.

Iberis*) Linn. 1737. Gen. p. 192. n. 529; 1737. Cliff. p. 329; 1740. Syst. p. 26; 1748. Ups. p. 184; 1753. Sp. II. p. 648; 1759. Syst. ed. X. p. 1121. n. 721; 1763. Sp. ed. II. p. 904; 1764. Gen. ed. VI. p. 335. n. 804; 1767. Syst. ed. XII. p. 435: g. Tetradynam. Siliculos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 492; 1784. Syst. p. 589. — Reich. 1778. Gen. p. 336. n. 868. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 438. n. 1080. — Gmel. 1791. Syst. p. 975. — Pers. 1797. Syst. p. 606. — Willd. 1800. Sp. III. p. 452. n. 1229; 1809. En. p. 669. — Link 1822. En. II. p. 154.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 542: g. Tetrapetalar. cruciatar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 64. n. 258: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 269.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 240. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 507. — DC. 1805. Franç. IV. p. 713; 1815. V. p. 597. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. IV. p. 83. (Verm. bot. Schr. V. p. 218). Sejungitur Teesdalia. — Desv. 1813. Journ. bot. III. p. 166. — Lois. 1821. Dict. v. 22. p. 407. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 693.
Hill 1769. Ht. kew. p. 172[14]: g. Siliculosar. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 15. — Smel. 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 488. — Pers. 1807. Ench. II. p. 186. n. 1552. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 720; 1825. Syst. II. p. 864. n. 2286; 1831. Gen. II. p. 515. n. 2530. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 141. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 405. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 127. 228. — Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 559. Sect.: Iberidendron, Iberion. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 630. 659.

*) Nomen ex Dioscoride (ἰβηρίς), Plinio.

Iberis Linn. cont.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 337; 1792. Pflanzengatt. I. p. 79; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 44: g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen.*)
Neck. 1790. El. III. p. 91. n. 1417: g. Brachytophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 279. t. 141.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 109: g. Alyssoidear.
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 235; 1821. Syst. II. p. 393; 1824. Pr. I. p. 178: g. Thlaspidear. Sect. (1824): Iberidium, Iberidastrum. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 63. Sect. eaed. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 193. Sect. eaed. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 659; 1841. Nom. p. 180. n. 6923. (genuinar.) Sect.: Iberis, Iberidastrum. — Koch 1836. Syn. p. 70. Ed. II. p. 75. — Endl. 1839. Gen. n. 4887. p. 871; 1841. Ench. p. 449. Sect. ut DC. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 165. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 91. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 1. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 202.
Gay 1826. Ann. sc. nat. VII. p. . . . (Isis 1834. p. 853.) Char. emend.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 182. n. 4744: g. Thlaspidiear. Sect. ut DC.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: g. Biscutellear.
Link 1831. Hdb. II. p. 290: g. Lepidinear.
Meisn. 1837. Gen. p. 12 (12): g. Iberidear. Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 259. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 136.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 282: g. Angustiseptar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Thlaspidar.
Synon. Pseudo-Thlaspi Magnol.; Thlaspidium Rupp.; Arabis Adans.

Iberis Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 20: g. Siliculosar. (I. Bursa pastoris et ruderalis.)
= Capsella Medic. (et Lepidii sp. Linn.)

Iberis Rchb. 1832. Fl. exc. p. 659; 1841. Nom. p. 180. n. 6923. 1: sect. Iberidis.
= Iberidium DC.

Ibettsonia Steud. vid. *Ibbetsonia Sims.*

Ibidium Salisb. 1812. Trans. hort. soc. I. p. 291: nov. g. Orchidear. (Satyrium elatum Sw., Neottia speciosa et orchioides Sw.)
= Stenorhynchus Rich.

Ibira Marcgr. 1648. Brasil. p. 99 c. ic.
= Xylopia Linn.

Icacina A. Juss. 1821. Descr. d'un nouv. genre; 1823. Mém. soc. h. n. Par. I. p. 174: nov. g. plantar.
DC. 1824. Pr. I. p. 584: g. Olacineis aff. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 582.
Spreng. 1827. Cur. post. p. 51; 1830. Gen. I. p. 179. n. 902: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 572. 804.

Icacina A. Juss. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3617: g. Olacinar. genuinar.?
Guillem. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 105: g. Olacinear. (?) — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 45 (33). — Endl. 1840. Gen. n. 5488. p. 1041; 1841. Ench. p. 546. — Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5258. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 263.
Benth. 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 679; 1841. Ann. and Mag. VII. p. 215: g. Icacinear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 82. n. 5488. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 9. 15. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444. — Miers 1852. Ann. and Mag. 2d. ser. IX. p. 222. 224.

Icacinaceae Miers 1852. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. IX. p. 218: ordo Dryalium. Tribus: Icacineae, Sarcostigmeae, Emmoteae.

Icacineae Benth. 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 679; 1841. Ann. and Mag. n. h. VII. p. 215: trib. Olacinear. Gen.: Gomphandra, Icacina, Apodytes, Leretia, Pogopetalum. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 82. Gen. ead. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 8. 14. Gen. ead. et Emmotum.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 444: trib. Olacacear. Gen. ut Benth.
Miers 1852. Ann. and Mag. 2d. ser. IX. p. 222: trib. Icacinacear. Gen.: Icacina, Apodytes, Raphiostylis, Mappia, Desmostachys, Leretia, Poraqueiba.

Icaco*) Plumier 1703. Gen. p. 43. t. 5.
Adans. 1763. Fam. II. p. 305: g. Zizyphor.
= Chrysobalanus Linn.

Icacorea**) Aublet 1775. Guian. II. Suppl. p. 1. t. 368: nov. g. pl. flore incognito. (I. guianensis.)
A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 79. 94; 1844. Pr. VIII. p. 119: g. Ardisiear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 66. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648.
Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 283: sect. Ardisiae.
Synon. Ardisiae sp. HBK.; Cybianthi sp. A. DC.

Icaranda Pers. vid. *Jacaranda Juss.*

Icarus Webb 1850. Phytogr. Canar. III. p. 338: sect. Scillae. (Sc. iridifolia n. sp.)

Ichnanthus***) Palis. 1812. Agrost. p. 56. t. 12. f. 1: nov. g. Graminear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 28. 497. n. 277 (*Ischnanthus*). — Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 431. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 274. n. 290; 1830. Gen. I. p. 67. n. 324. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 118. t. 18.

---

*) Nomen americanum.
**) Nomen caribaeum *Icacore-catinga.*
***) ἴχνος, vestigium.

Ichnanthus Palis. cont.
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.)? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 28.
Trin. 1820. Fund. p. 130: g. Triandr. Digyn. — Par. Schult. 1824. Mant. II. p. 281 (*Ischnanthus*).
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1026: g. Poacear.
Kunth 1830. Gram. p. 41; 1833. Agrost. p. 134: g. Panicear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 771. p. 83; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 285. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1272. — Meisn. 1843. Gen. p. 418 (319). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835.) p. 320: sect. Panici. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 93.
Synon. Naviculariae sp. Raddi; Panici sp. Nees, Trin., etc.

Ichnocarpus R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 61 (Verm. bot. Schr. II. p. 399): nov. g. Apocynear. (Apocynum frutescens L.) *Cf.* Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 437. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXII. 398. n. 736. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 145. n. 725.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 635. n. 683: g. Contortar. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 650.
Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3515; 1841. Nom. p. 133. n. 5147: g. Echitear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Endl. 1838. Gen. n. 3410. p. 583; 1841. Ench. p. 294. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. — Meisn. 1840. Gen. p. 264 (172). — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 434. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 448.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 78: g. Echitiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Ichthiothere Spach vid. *Ichthyothere Mart.*

Ichthyomethia*) P. Browne 1756. Jamaic. p. 276: nov. g. Diadelph. Decandr.
= Piscidia Linn.

Ichthyosma Schlechtend. 1827. Linnaea II. p. 671: nov. g. Balanophorear. *Cf.* Schltd. 1828. ibid. III. p. 194.
Lehm. 1831. Flora I. p. 33: g. Dioec. Triandr.
= Sarcophyte Sparrm.

Ichthyothera Wittst. vid. *seq.*

Ichthyothere**) Martius (1824?) Arzneipfl. p. 27. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 471 (*Ichthyothera*).
DC. 1836. Pr. V. p. 504 (*Ichtyothere*): g. Milleriear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2461. p. 399; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 196 (129). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 21 (*Ichthiothere*). — Rchb. 1841. Nom. p. 79. n. 3002. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Field & Gardn. 1844. Sert. pl. t. 8. 9. (*Ichthyothera* Bot. Zeit. 1844. p. 600.)

Ichtyosma Steud. Nom. I. p. 801: leg. *Ichthyosma.*

Ichtyothere DC. vid. *Ichthyothere Mart.*

Icica*) Aublet 1775. Guian. I. p. 337. t. 130—135: g. Octandr. Monogyn. (I. heptaphylla, etc.) — Par Gmel. 1791. Syst. p. 619.
Scop. 1777. Intr. p. 322: g. Disciferar.
Juss. 1789. Gen. p. 370: g. Terebintacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 252. — Hedw. 1806. Gen. p. 272. n. 1095.
Cram. 1803. Disp. p. 99 in Enneandr. Monogyn. et p. 109 in Decandr. Monogyn.
Pers. 1805. Ench. I. p. 414: sect. Amyridis.
Poir. 1821. Dict. v. 22. p. 555: g. Terebinthacear.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 349; 1825. Syn. IV. p. 161: g. Burseracear. — Par. HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 32. — DC. 1825. Pr. II. p. 77. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 41. — Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 601. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 237. — Meisn. 1837. Gen. p. 77 (56.) — Endl. 1840. Gen. n. 5932. p. 1136; 1841. Ench. p. 602. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 384. (Injungitur Hedwigia Sw.) — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 449.
Rchb. 1828. Consp. p. 147. n. 3839; 1841. Nom. p. 145. n. 5638: g. Burserear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 394. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 177. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 13. p. 207.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 82: g. Burseriacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 460: g. Burseridar.
Synon. Ritinophora Neck.; Burserae sp. Colebr.

Icicariba Pison. 1648. Brasil. p. 59.
= praeced.?

Icmadophila**) Ehrhart 1780. Phytophyl. Nr. 40; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Lichen Icmadophila.)
Körb. 1855. Syst. Lich. Germ. p. 151: g. Lecanorinar.
Rabenh. 1857. Lich. eur. exsicc. fasc. VIII.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 330: sect. Biatorae.
Arnold 1858. Flora p. 322: g. Lecanorear.

*) *ἰχθύς*, piscis; *μέθη*, ebrietas.
**) *θηράω*, capio.

*) *Icica* Brasiliensibus ex Marcgr.
**) *ἰκμάς*, humiditas.

Icosandra Philippi 1858. Linnaea XXIX. p. 39: nov. g. Laurinear., Bellotae Rich. (*Beldu Nees*) aff. (I. rufescens.)

Icosandrae Scopoli 1777. Introd. p. 275: trib. XXIV. plant. Gentes: 1. *Involucro floris duplici*. Gen.: Hypericum, Androsaemum, Hopea, Melaleuca, Citrus, Caspia, Blakstonia. 2 *Invol. floris triplici*. Gen.: Glabraria, Loasa, Zygophyllum, Mahernia, Polemonium, Plumbago, Melycytus, Aquilicia, Rinorea, Conohoria.

Icosandrae Agardh 1825. Class. plant. p. 20; 1826. Isis p. 592: class. Phanerocotyledonear. completar. perigynar. Ord.: Potentilleae, Rosaceae, Spiraeoideae, Calycantheae, Myrtoideae, Pomaceae, Amygdaleae, Chrysobalaneae.

Icosandria Linn. Gen., Syst., Spec., etc. sequentibus auctoribus Linnaeanis: class. XII. plant. Ordines: Mono-, Di-, Tri-, Tetra-, Penta-, Polygynia.

Icotorus Rafin. 1830 in Seringe Bull. Bot. I. p. . . . .: nov. g. ex typo Spiraeae monogynae Torr. (*Icoturus* ex Wittstein.)

= Spiraeae sect. Physocarpos Camb.? (Endl. Gen. p. 1247.)

Ictinus Cassini 1818. Bull. soc. philom. Sept. p. 142; 1821. Dict. v. 19. p. 234; 1821. v. 22. p. 559; 1823. v. 29. p. 448: g. Gorteriear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2676.

Bartl. 1830. Ord. p. 143: g. Arctotidear.

Gorteria Gärtn.

Ictodes Bigelow 1819. Med. Bot. II. p. 41. t. 24.

. Symplocarpus Salisb. (Endl. Gen. p. 240.)

Ideleria*) Kunth 1837. Cyperogr. p. 310: nov. g. Rhynchosporear. (Carpha hexandra Nees.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 4447. (verar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 145. — Steud. 1855. Glum. II. p. 155.

Endl. 1841. Spl. I. n. 968/$_1$*b*. p. 1365; 1841. Ench. p. 63: sect. Cyathocomae.

Idesia Scopoli 1777. Introd. p. 199. n. 878: g. Speciosar.

Neck. 1790. El. II. p. 55. n. 696: g. Arcythophytor.

Ropourea Aubl

Idicium Necker 1790. Elem. bot. I. p. 28. n. 51: nov. g. Actinophytor., a Perdicio L. sejunctum. *Cf.* Cass. 1821. Dict. v. 22. p. 563.

Anandria Siegesb.? (Less. Syn. p. 438.)

*) Dicat. memoriae Ed. Ideler, discipuli.

Idiocarpicae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LV: ordo Thalamanthar. Series: Capsulares, Hesperideae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 206; 1832. Fl. exc. p. 651. 782; 1837. Hdb. p. 256; 1841. Nom. p. 204. Formationes: Tiliiflorae, Aurantiiflorae.

Idiocarpicae Rchb. 1837. Handb. p. 193; 1841. Nomencl. p. 112: div. Asperifoliacear. Subdivis.: Heliotropiceae (1841 Heliotropieae), Tournefortieae, Cordieae.

Idiomycetes Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 486: trib. Ectobasidum. Sect.: Agaricinei, Phlebophorei, Polyporei, Hydnei, Thelephorei, Clavariei, Tremellei.

Idiophyta Rchb. 1832. Fl. exc. p. XLIX: sect. plant. Classes: Chlorophyta, Acroblastae, Synchlamydeae, Synpetalae, Calycanthae, Thalamanthae.

Idiopsis Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 279: sect. Banaliae.

Idiothalamae Wahlenb. 1826. Fl. suec. II. p. 795: div. Algar. terrestr. Gen.: Gyromium, Opegrapha, Lecidea, Calicium.

Idiothalameae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 486: fam. Lichenum. Divis.: Rhizomorphidae, Variolaridae, Porinidae, Verrucaridae, Opegraphidae.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: div. Lichenalium. Tribus: Graphidae, Glyphidae, Limboridae, Pyxinidae.

Idiothalami Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXX: ordo Lichenum. Gen.: Opegrapha, Lecidea, Calicium; Gyrophora, Bathelium, Verrucaria, Endocarpon. — Par. Achar. 1810. Lich. univ. p. 19; 1814. Syn. p. XI. Divis.: Homogenei, Heterogenei, et 1814 Hyperogenei. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 55. — Fries 1825. Pl. homon. p. 265. Tribus: Pyxineae, Limborinae, Glyphideae, Graphideae. — Endl. 1836. Gen. p. 12; 1841. Ench. p. 9. Trib. ut Fries.

Idiothalamia Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 40: ordo Aspidocarpor. Gen.: Opegrapha, Lecidea, Urceolaria, Gyrophora, Bathelium.

Idiothalamii Ritgen 1831. Schr. Marb. Ges. II. p. 88: ordo Choriophytor.

Idiothalami Achar.

Idothea*) Kunth 1843. Enum. plant. IV. p. 341: nov. g. Hyacinthear. (Drimia media Jacq., etc.) — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 316.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205: g. Scillear.

Ifdregea**) Steud. 1840. Nomencl. bot. p. 801: nomen pro *Dregea Eckl. & Zeyh.* (non Meyer) propositum.

Sciothamnus Endl.

Ifloga***) Cassini 1819. Bull. soc. philom. Sept. p. 142; 1822. Dict. v. 23. p. 13. 561: nov. g. Gnaphaliear. (Gnaphalium

*) Idothea filia Protei.

**) Compos. ex J. F. Drege.

***) Anagramma vocis *Filago*.

Ifloga Cassini cont.
cauliflorum Desf.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2420. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27.
Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Cassiniear.
Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.
Less. 1832. Syn. p. 332: g. Helichrysear.
DC. 1837. Pr. VI. p. 265: sect. Trichogynes. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2763*b*. p. 450; 1841. Ench. p. 243. — Rchb. 1841. Nom. p. 89. n. 3471. 2.
Fenzl 1839. Flora II. p. 729. 747: g. Filaginear. restitutum. — Par. Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 309.

Ignatia*) Linn. f. 1781. Suppl. p. 20. n. 1370: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 227. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 135. n. 340. — Gmel. 1791. Syst. p. 388. — Pers. 1797. Syst. p. 237. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1053. n. 386.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 477. t. 179.
Gis. 1792. Prael. p. 384: g. Luridar.
Batsch 1802. Tab. p. 203: g. Colubrinar.
Pers. 1805. Ench. I. p. 264. n. 600: g. Apocynear.
Hedw. 1806. Gen. p. 112. n. 498: g. Apocinear.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 496: g. Carissear.
Rchb. 1828. Consp. p. 135. n. 3579: g. Cerberear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: g. Strychnear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 497. — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5213. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 604. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 424.
Endl. 1838. Gen. n. 3360. p. 575; 1841. Ench. p. 288: g. Eustrychnear. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 258 (167). — DC. 1845. Pr. IX. p. 18.
Synon. Ignatiana Lour.; Strychnos sp. Berg., Lam.

Ignatiana Lour. 1790. Fl. Cochinch. I. p. 125. Ed. Willd. p. 155: g. Pentandr. Monogyn.
= Ignatia Linn. f.

Iguanara Rchb. vid. *seq.*

Iguanura Blume 1838. Bull. Neerl. p. 66; 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. X. p. 376: nov. g. Palmar. (I. leucocarpa.)
Endl. 1841. Spl. I. n. $1752/_1$. p. 1372; 1841. Ench. p. 136: g. Borassinar. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 643.
Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2287 (*Iguanara*): g. Manicariear.
Meisn. 1842. Gen. p. 356 (266): g. Geonomear.

*) Genus test. Bentham et Miquel (Ind. bat. II. p. 381) e fructu cujusdam Strychni (fabae St. Ignatii Pharmacopolarum) et e floribus Rubiaceae cujusdam guianensis exstructum ideoque expugnandum.

Iguanura Blume cont.
Blume 1843. Rumphia II. p. 106. t. 117: g. Arecinear. *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 661. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 467. — Miq. 1855. Ind. bot. III. p. 43.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.

Ilaea Dumort. vid. *Ilea Fries.*

Ilatrum Caesalp. 1583. Plant. lib. II. cap. 36.
= Phillyrea Tourn. (DC. Pr. VIII. p. 292.)

Ildefonsia*) Gardner 1842. Lond. journ. bot. I. p. 184: nov. g. Gratiolear., Herpesti et Sphaerothecae aff. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 368. — Endl. 1843. Spl. III. p. 79. n. 3939.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 402; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Eugratiolear.

Ilea Fries 1825. Pl. homon. p. 336: g. Ulvacear. (*Synon. Solenia Agdh.*, non *Hoffm.*, *Pers.*, etc.) — Par. Gaill. 1828. Dict. v. 53. p. 373. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77 (*Ilaea*).
Rchb. 1828. Consp. p. 27. n. 478; 1841. Nom. p. 20. n. 690: g. Ulvear. (genuinar.) — Par. Menegh. 1838. Cenni p. 36.
Endl. 1836. Gen. n. 86 *a*. p. 7; 1841. Ench. p. 6: sect. Ulvae. — Par. Math. 1853. Belg. II. p. 502.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 124: g. Dictyotear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Upsal. XIII. p. 353. (?)
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 101: g. Ileinar.
= Enteromorpha Link?

Ileinae Trevisan 1848. Alghe coccot. p. 101: trib. Hymenothallar. Gen.: Ilea, Zignoa, Meneghinia, Hämmerlenia.

Ileocarpus Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 40: nov. g. Cissampelidear. (ab Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 195 Stephaniae insertum.)

Ileodictyon**) Tulasne 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. II. p. 114: nov. g. Fungor., Clathro proximum. (I. cibarium.)
Lév. 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 160: g. Lytocarpior.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 42: g. Phalloideor.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487: g. Clathraceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 435: g. Clathreor.
Corda 1854. Ic. Fung. VI. p. 26. t. 5. f. 57: g. Clathracear. (I. gracile.)

Ilex Plukenett 1696. Almagest. p. 197. t. 196. f. 3.
= Valentinia Swartz.

*) Dicat. Dr. Ildefonso Gomez, Rio Janeiro.
**) εἰλεόν, intestinum; δίκτυον, rete.

Ilex Tourn. 1700. Inst. p. 583. t. 350: g. pl. class. XIX.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 25. n. 1845 *A* * *: subsect. Lepidobalani. Sect.: Suber, Coccifera. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 382.
= Quercus Linn. pars.

Ilex Linn. 1737. Gen. p. 33. n. 91; 1737. Cliff. p. 40; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 32; 1753. Sp. I. p. 125; 1759. Syst. ed. X. p. 901. n. 158; 1762. Sp. ed. II. p. 181; 1764. Gen. ed. VI. p. 67. n. 172; 1767. Syst. ed. XII. p. 130: g. Tetrandr. Tetragyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 140; 1784. Syst. p. 168. — Reich. 1778. Gen. p. 70. n. 184. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 91. n. 232. — Lour. 1790. Coch. I. p. 91. — Gmel. 1791. Syst. p. 287. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 32; 1812. Fl. cap. I. p. 577. — Pers. 1797. Syst. p. 173; 1805. Ench. I. p. 151. n. 339. — Willd. 1797. Sp. I. p. 707. n. 267; 1809. En. p. 172. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 109. — Wall. 1820 in Roxb. Ind. I. p. 473. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 833. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 377. 461.
Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 167. n. 682; g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Dumosar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 499.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rhamnor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 379. — Batsch 1802. Tab. p. 70.
Scop. 1777. Intr. p. 198: g. Speciosar.
Walt. 1788. Carol. p. 51. 241. n. 390: g. Dioec. Tetrandr. — Par. Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 228.
Neck. 1790. El. II. p. 50. n. 687: g. Arcythophytor.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 467: g. Rhamnoidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 268: g. Rhamnear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 83. n. 383. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 902. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 661; 1825. Syst. I. p. 494. n. 558. — Lois. 1821. Dict. v. 21. p. 494 (*Houx*). — Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1148.
DC. 1805. Franç. IV. p. 621: g. Frangulacear. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 35. 486. n. 598.
Link 1821. En. I. p. 147: g. Caprifoliacear.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 491: g. Aquifoliacear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 13. — Rchb. 1828. Consp. p. 137. n. 3624; 1831. Fl. exc. p. 435; 1841. Nom. p. 135. n. 5248. — Bartl. 1830. Ord. p. 377. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 424. — Koch 1837. Syn. p. 481. Ed. II. p. 553. — Meisn. 1839. Gen. p. 252 (161). — Webb . . . . Canar. II. p. 135. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 598. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 85.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59; 1827. Belg. p. 104; 1829. Anal. fam. p. 27: g. Ilicear.

Ilex Linn. cont.
HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 69: g. Celastrinar. — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 187. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 117. n. 593. — Link 1831. Hdb. II. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 554.
D. Don 1825. Nepal. p. 188: g. Rhamneacear.
Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 329; 1843. Én. genr. p. 73: g. Ilicinear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 16. — Endl. 1840. Gen. n. 5705. p. 1092; 1841. Ench. p. 577. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 151. — Unger 1846. Chlor. prot. p. 148. t. 50. f. 8—14. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 333. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 694 (*Houx*). — Tulasne 1857. Ann. sc. nat. 4e sér. VIII. p. 111. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 428.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI: g. Celastrinear. — Par. A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 351.
Synon. Agrifolium Caesalp.; Aquifolium Tourn.; Macoucoua Aubl.; Macucua Gmel.; Labatia Scop.; Paltoria Ruiz & Pav.; Burglaria Wendl.; Chomelia Fl. Flum.; Cassena Catesb.?

Iliceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 59: fam. Thalamitubiae. Gen.: Ilex.
Dumort. 1827. Belg. p. 104: fam. Caliculunguliae. Gen. id.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21 (p. 27 *Illiceae*): fam. Jasminariear. Gen.: Cassine, Hartogia, Curtisia, Myginda, Ilex, Prinos, Nemopanthes.

Ilicinae Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (166) Monopetalar.
Lindl. 1833. Nix. p. 28: ordo Primulalium.

Ilicinae Rchb. 1837. Handb. p. 214: div. Sapotacear. Subdivis.: Aquifoliaceae, Olacinae, Brexieae.

Ilicineae Brongn. 1827. Ann. sc. nat. X. p. 329: ordo plant., a Rhamneis disjunctus.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 14: ordo Calyciflorar. Gen.: Myginda, Lepionurus, Ilex, Prinos, Strombosia, Leucoxylon, Rhaptostylum.
Endl. 1840. Gen. p. 1091; 1841. Ench. p. 577: ordo Frangulacear. Gen.: Cassine, Ilex, Prinos, Nemopanthes, Byronia, Villaresia; Jodina?; Monetia? Accedit 1850 (Spl. V. p. 84) Siphonodon.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 73: fam. Diospyroidear. Gen. ex Endl.
Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 25: fam. Dicotyledonum. Gen. ut Endl.
Conf. Aquifoliaceae Gray, Ilicinae Lindl., Iliceae Dumort.

Ilicineae Rchb. 1841. Nomencl. p. 135: div. Sapotacear. Subdivis. Ilicinar. Rchb. 1837.

Ilicioides Dumont-Cours. 1802. Bot. cult. ed. 1. IV. p. 127.
= Nemopanthes Rafin.

Iliodeae „Beauv. in Mém. Inst. inéd." Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 124: sect. Algar. Gen.: Coccodea, Lutaria, Rivularia, Polycoma, Batrachospermum, Codium, Trichophorus, Oscillatoria. *Cf.* Lemar. 1823. Dict. v. 23. p. 29.

Iliogeton Benth. in DC. Prodr. X. p. 412 in synon. Vandelliae: vid. *Ilyogeton Endl.*

Illa Adans. 1763. Fam. II. p. 446: g. Cistor.
= Tomex Linn.

Illairea*) Lenné & C. Koch 1853. Verh. Berl. Gart. Ver. Neue Reihe I. p. 397; 1854. Bot. Zeit. p. 904: nov. g. Loasear.

Illecebra Hall. vid. *Illecebrum Rupp.*

Illecebraceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 127) 1847. Veg. kingd. p. 499: ordo Silenalium. Gen. Paronychiear. Endl.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 169. Trib.: Illecebreae, Sperguleae.

Illecebreae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 413. Ed. Nees p. 269: nov. ordo plant. (Amaranthacear. Juss. sect. tertia.)
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 156: sect. Holoracear.
Bartl. 1825. Beitr. II. p. 156; 1830. Ord. p. 301: div. Paronychiear. Gen. (1830) ut DC. et Pentacaena, Pollichia.
Dumort. 1827. Belg. p. 86: fam. Calicunguliae. Trib.: Corrigioleae, Paronychieae.
DC. 1828. Pr. III. p. 367: trib. Paronychiear. Gen.: Herniaria, Gymnocarpum, Anychia, Illecebrum, Paronychia, Cardionema. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 86. Gen. ead. et Pentacaena. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 238. Gen. ut Bartl. — Meisn. 1838. Gen. p. 132 (96). Gen. ead. et Plottzia, Winterlia?, Lithophila? — Endl. 1839. Gen. p. 956; 1841. Ench. p. 504. Subtrib.: Corrigioleae, Euparonychieae. — Brongn. 1843. En. genr. p. 104. Gen.: Pollichia, Scleranthus, Paronychia, Illecebrum, Anychia, Herniaria. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 492. Gen. Endlicheriana.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (150) Calyciflorar. syncarpar.
Lindl. 1833. Nix. p. 21: ordo Silenalium.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 357: subordo Paronychiacear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 235; 1841. Nom. p. 162: subdiv. Paronychiear. Sect.: Herniariae (1841 Herniarieae), Polycarpeae, Löfflingieae.
Kunth 1838. Berol. I. p. 141: fam. Polypetalar. staminibus perigynis. Divis.: Telephieae, *legitimae* (gen.: Illecebrum, Herniaria), Sclerantheae.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 169: trib. Illecebracear. Gen.: Paronychia, Anychia, Siphonychia.

*) Dicat. Illaire, Berolin.

Illecebrina C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 373: subsect. Mallacodii. (Hypnum illecebrum L.)

Illecebrineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 18: fam. Amaranthariear. Gen.: Illecebrum, Paronychia, Herniaria, Gymnocarpum, Anychia.

Illecebrum*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 89. Ed. Hall. 1745. p. 99 (*Illecebra*): g. pl. class. V.
Linn. 1737. Cliff. p. 492; 1737. Coroll. p. 4. n. 947; 1740. Syst. p. 20; 1742. Gen. ed. II. p. 98. n. 229: g. Pentandr. Digyn.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123: g. Petalostemonis.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 33: g. Holeracear.
Linn. 1753. Sp. I. p. 206; 1759. Syst. ed. X. p. 943. n. 256; 1762. Sp. ed. II. p. 298; 1764. Gen. ed. VI. p. 114. n. 290; 1767. Syst. ed. XII. p. 187. n. 287: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 205; 1784. Syst. p. 247. — Reich. 1778. Gen. p. 118. n. 313. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 159. n. 407. — Lour. 1790. Coch. I. p. 162. — Gmel. 1791. Syst. p. 426. — Pers. 1797. Syst. p. 259; 1805. Ench. I. p. 260. n. 589. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1203. n. 465; 1809. En. p. 271. — Gmel. 1826. Fl. Bad. IV. p. 182.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Polygonear.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Holeracear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 306.
Gled. 1764. Syst. p. 45. n. 175: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 118. Distinguitur Paronychia.
Hill 1769. Ht. kew. p. 381: g. Pentaphyllar.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 35: g. Atriplices et Polygona conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 333: g. Defloratar.
Medic. 1787. Malv. p. 93: g. Monadelph. Pentandr. *Cf.* Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 70. — Par. Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 34.
Juss. 1789. Gen. p. 89: g. Amaranthor.
Neck. 1790. El. II. p. 188. n. 906: g. Aclithrophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 267: g. Amaranthoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 172: g. Oleracear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 207: g. Amaranthacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 173. n. 726. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 875.
= Illecebrum Gärtn., Paronychia Juss., Alternanthera et Aerva Forsk.

Illecebrum Juss. 1803. Ann. Mus. II. p. 131: g. Amarantacear. valde restrict.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 36. t. 184. (I. verticillatum L.)

*) Latinis dicitur illecebra omne blanditiarum genus, quibus aliquis allicitur, et sic etiam Scribonio herba quaedam dicta est. (Beckmann Lex. bot. p. 118.)

Illecebrum Juss. cont.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 416. Ed. Nees p. 272: g. Illecebrear. — Par. DC. 1828. Pr. III. p. 369. — Bartl. 1830. Ord. p. 302. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 88. — Koch 1836. Syn. p. 254. Ed. II. p. 280. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 238. — Meisn. 1838. Gen. p. 132 (96). — Kunth 1838. Berol. I. p. 143. (legitimar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 104. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 611. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 492.

Juss. 1815. Mém. Mus. II. p. 388; 1825. Dict. v. 38. p. 9: g. Paronychiear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XLII. 514. n. 1027. — Lois. 1822. Dict. v. 23. p. 29. — Agdh. 1825. Aphor. p. 220. — Dumort. 1827. Belg. p. 86. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LI; 1832. Fl. exc. p. 563. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 201. n. 1023. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 871.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 317; 1825. Syst. I. p. 818. n. 927: g. Amarantear.

Link 1821. En. I. p. 151: g. Paronychinar.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 546: g. Paronychidear. verar.

Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4266: g. Polycarpear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Illecebrinear.

Link 1831. Hdb. II. p. 421: g. Paronychiacear.

Lindl. 1836. Nat. syst. p. 127; 1847. Veg. kd. p. 499: g. Illecebracear.

Rchb. 1837. Hdb. p. 235: g. Herniariar.

Endl. 1839. Gen. n. 5199. p. 957; 1841. Ench. p. 504: g. Euparonychiear. — Par. Fenzl 1844 in Ledeb. Ross. II. p. 161.

Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6279: g. Herniariear.

Synon. Paronychia Gaud.

Illiceae Dumort. vid. *Iliceae Dumort.*

Illicieae DC. 1824. Prodr. I. p. 77: trib. Magnoliacear. Gen.: Illicium, Temus, Drimys, Tasmannia. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. Gen.: Illicium, Drymis. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 78. Gen. ut DC. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 432. 435. Sect.: Winterineae, Illicineae. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 96. Gen. ex DC. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 589. Gen. ut Endl.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX: subdiv. Magnoliacear. Gen.: Illicium, Drymis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 192. Sect.: *genuinae* (gen.: Illicium, Cymbostemon, Tasmannia), Trochodendreae, Wintereae.

Rchb. 1828. Consp. p. 192: subdiv. Dillenicar. Gen. ut DC.

Bartl. 1830. Ord. p. 249: div. Magnoliacear. Gen. ead.

Rchb. 1837. Hdb. p. 278: subdiv. Magnoliear. Sect.: *genuinae* (gen.: Illicium), Tasmannieae, Wintereae.

Illicieae DC. cont.

Endl. 1839. Gen. p. 838; 1841. Ench. p. 428: subordo Magnoliacear. Gen. ut DC. et Trochodendron.

Synon. Wintereae R. Brown; Winteraceae Lindl.

Illicineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 433. 439: sect. Illiciear. Gen.: Illicium, Cymbostemon.

Illicium*) Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1050. 1370. n. 1142; 1764. Gen. ed. VI. p. 244. n. 611: g. Dodecandr. Pentagyn.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Anonar.

Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 664; 1767. Syst. ed. XII. p. 335. n. 611: g. Dodecandr. Octogyn.

Gled. 1764. Syst. p. 107. n. 439: g. Thalamostemonum.

Hill 1769. Ht. kew. p. 227: g. Polypetalar.

Ellis 1770. Phil. Trans. LX. p. 524.

Linn. 1771. Mant. II. p. 167: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 422; 1784. Syst. p. 507. — Reich. 1778. Gen. p. 282. n. 746. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 372. n. 940. — Lour. 1790. Coch. I. p. 353. — Gmel. 1791. Syst. p. 867. — Pers. 1797. Syst. p. 543. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1254. n. 1072. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 17. — Elliott 1821. Sketch II. p. 35.

Scop. 1777. Intr. p. 252: g. Polycarpiar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 338. t. 69. f. 6 (anisatum et floridanum).

Juss. 1789. Gen. p. 280: g. Magnoliar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 116. — Pers. 1807. Ench. II. p. 93. n. 1345. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 682.

Neck. 1790. El. II. p. 287. n. 1049: g. Synathrophytor.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 70: g. Tulipiferar. — Par. Desport. 1804. Dict. v. 3. p. 393 (*Badiane*).

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 75: g. Magnoliacear. — Par. DC. 1818. Syst. I. p. 440. — Link 1821. En. I. p. 86; 1831. Hdb. II. p. 373. — Sieb. & Zucc. 1835. Fl. jap. I. p. 5. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 310.

R. Brown 1818 mss. ex DC. Syst. I. p. 548: g. Winterear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 3 (5). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 419. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 73.

DC. 1824. Pr. I. p. 77: g. Illiciear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX; 1828. Consp. p. 192. n. 4966; 1837. Hdb. p. 278; 1841. Nom. p. 192. n. 7294. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830.

*) Incitamentum. Seminibus cibos condiunt Chinenses.

Illicium Linn. cont.
Ord. p. 249. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 78. — Vriese 1834. Tijdschr. v. natuurl. Geschied. I. p. 31. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 42. — Endl. 1839. Gen. n. 4743. p. 839; 1841. Ench. p. 428. — Orb. 1842. Dict. II. p. 416 (*Badiane*). — Brongn. 1843. En. genr. p. 96. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 42.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 643. n. 2032; 1830. Gen. I. p. 458. n. 2259: g. Magnoliear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 439: g. Illicinear. Sect.: Badiana, Euillicium.
Synon. Badianifera Linn.; Cymbostemon Spach.

Illigera*) Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1153: nov. g. Rhamneis et Laurineis aff.
G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 57: g. Homalinear.
Blume 1833. Nov. fam. exp. p. 14; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 96: g. Illigerear. — Par. Nees 1836. Laurin. p. 703. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1094.
Endl. 1838. Gen. n. 2069. p. 324; 1841. Ench. p. 205: g. Gyrocarpear. (Anne Asarineis aff.?) — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 327 (239). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 474. — Rchb. 1841. Nom. p. 62. n. 2344. — Walp. 1843 in Pl. Meyen. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718.

Illigeraceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 202.
= Gyrocarpeae Dumort.

Illigereae Blume 1833. Nov. fam. expos. p. 12; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 95: nova fam. plant., Laurineis aff. Gen.: Illigera, Gyrocarpus. — Par. Nees 1836. Laurin. p. 695. Gen. ead.
= Gyrocarpeae Dumort.

Illosporiacei Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 480: ordo Gymnomycetum. Gen.: Diaphanium, Pionnotes, Illosporium, Coccospora, Sphaerosporium, Achitonium, Myriophysa, Schizoderma, Strumella, Phylloedia.

Illosporium**) Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 325: nov. g. Coniomycetum elementarium. (I. roseum.) *Cf.* Leman 1822. Dict. v. 23. p. 35.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 524: g. Fusidiear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 156: g. Apiosporior. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 8. n. 154.
Fries 1829. Syst. myc. III. 1. p. 258: g. Apiosporiar.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 775. n. 3992: g. Cytisporear.

Illosporium Martius cont.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 236: g. Sporomycetum perisporor.
Endl. 1836. Gen. n. 271. p. 23; 1841. Ench. p. 16: g. Apiosporeor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 8. n. 302. (genuinor.) — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 225.
Corda 1839. Ic. Fung. III. p. 1; 1842. V. p. 3; 1842. Mycol. p. 11: g. Caeomacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: g. Stilbaceor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 481: g. Illosporiaceor.
Bonord. 1851. Hdb. p. 59: g. Naemasporeor.
Preuss 1852. Linnaea XXV. p. 72: g. Caeomaceor.
Math. 1853. Belg. II. p. 414: g. Apiosporear.
Synon. Lichen roseus Schreb.; Palmellae sp. Lyngb.

Illus Haworth 1831. Mon. Narciss. p. 4: nov. g. Narcissinear. (Narcissus cernuus Sol.) *Cf.* Kunth Enum. V. p. 717.
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 437: subg. Narcissi.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 17. 203: sect. Queltiae.
= Ganymedes Herb. pt.

Ilmu Adans. 1763. Fam. II. p. 497: g. Iridum. (*Synon. Bulbocodium Tourn.*; *Sisyrinchium Col.* Ecphr. t. 7. f. 1.)
= Crocus Linn.?

Ilogeton A. Juss. in Orb. Dict. XI. p. 459 in synon. Vandelliae: vid. *seq.*

Ilyogethos Hasskarl vid. *seq.*

Ilyogeton*) Endl. 1839. Gen. n. 3957. p. 684; 1841. Ench. p. 339: g. Gratiolear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 269 (sphalm. *Hyogeton*). — Steud. 1840. Nom. I. p. 785 (*Hyogeton*). — Meisn. 1840. Gen. p. 311 (222). — Rchb. 1841. Nom. p. 118. n. 4593. (genuinar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 361. 522. — Walp. 1845. Rep. III. p. 297. 966.
Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 146 (*Ilyogethos*): g. Scrophularinear.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 415: sect. Vandelliae. — Simil. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XI. p. 459 (*Ilogeton*). — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 693.
Synon. Lindernia R. Brown; Vriesea Hassk.

Ilysanthes Rafin. 1820. Ann. of nat. Nov. n. I. p. 13: nov. g. ab Endl. (Suppl. II. p. 61) cum dubio ad Gratiolam relatum.
Meisn. 1840. Gen. p. 310 (221): g. Gratiolear.

*) Dicat. Joh. C. Wilh. Illiger, prof. Berolin.
**) εἰλέω, ἕλλω, ἴλλω, circumvolvo.

*) ἰλύς, limus; γείτων, vicinus.

Ilysanthes Rafin. cont.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 418; 1847 in Lindl. veg. kd. p. 685: g. Linderniear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 695.
Synon. Linderniae americanae et capenses, et Bonnayae brachycarpae Auct.

Imalcola Griseb. 1845 in DC. Prodr. IX. p. 94: sect. Gentianae.

Imatophyllum Hook. 1828. Bot. Mag. t. 2856. *(Cf. Himantophyllum Spreng.)*
Rchb 1828. Consp. p. 61. n. 1236b: g. Cyrtanthear.
Bartl. 1830. Ord. p. 46: g. Amaryllidear. — Par. Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 338.
Clivia Lindl.

Imbea Schott 1856. Syn. Aroid. I. p. 97: grex Philodendri. (Ph. imbé Schott.)

Imbricaria „Comm. mss." Juss. 1789. Gen. p. 152: nov. g. Sapotar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 204.
Gmel. 1791. Syst. p. 612: g. Octandr. Monogyn.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 436: g. Hilospermar.
Duchesne 1804. Dict. v. 4. p. 60 *(Bardottier)*: g. Saputear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 343. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 531. Ed. Nees p. 387 in adnot. ad Mimusopem. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 498. — Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 38. — Bartl. 1830. Ord. p. 162. — Meisn. 1839. Gen. p. 251 (160). — Spach 1830. Vég. phan. IX. p. 384. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 73.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 133. t. 206.
Rchb. 1828. Consp. p. 138. n. 3649 (sph. 3638); 1837. Hdb. p. 215; 1841. Nom. p. 137. n. 5308: g. Mimusopear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Sapotacear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 35. — Endl. 1839. Gen. n. 4244. p. 741; 1841. Ench. p. 361. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 199. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 591.
Synon. Mimusopis sp. Willd.; Binectaria Forsk.?

Imbricaria Schreb. 1791. Gen. II. p. 567: sect. Lichenis. (Squamaria Hoffm.)
Achar. 1798. Lich. suec. p. 107: g. Lichenum. (foliaceor.) *Cf.* Leman 1822. Dict. v. 23. p. 39. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 385; 1815. V. p. 186.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 322: g. Lichenacear.
Fries 1825. Pl. homon. p. 242; 1831. Lich. p. 3. 57: sect. Parmeliae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 402*g*. — Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 229. — Meyen & Flot. 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 217. — Schär. 1850. En. Lich. eur. p. 35. — Babingt. 1855 in Hook. f. N.-Zeal. II. p. 284.
Fries 1825. Pl. homon. p. 245: sect. Zeorae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 22. n. 400*c*.

Imbricaria Schreb. cont.
Endl. 1836. Gen. n. 172 *C β*. p. 15; 1841. Ench. p. 11: subsect. Lobariae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 17. n. 570. 3 *c*.
Körb. 1846. Lich. germ. sp. p. 8; 1855. Syst. Lich. Germ. p. 68: g. Parmeliacear., praecedente DC. restitutum et emendat.
Theob. 1858. Abh. Geb. Wett. p. 357: g. Imbricariear.
Arnold 1858. Flora I. p. 104: g. Parmeliear.
Conf. Platisma Hoffm.; Platysma Nyl.

Imbricaria Smith . . . Linn. Trans. III. p. 259.
Pers. 1805. Ench. I. p. 234. n. 521: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Hedw. 1806. p. 154. n. 657.
= Schidiomyrtus Schauer.

Imbricarieae Theobald 1858. Nat. Abh. Geb. Wett. p. 357: fam. Parmeliacear. Gen.: Imbricaria, Sticta, Lobaria, Parmelia.

Imbricatae Rchb. 1828. Consp. p. 78; 1831. Fl. exc. p. 145. 152; 1837. Handb. p. 161; 1841. Nomencl. p. 60: formatio Enerviar. Fam.: Lycopodiaceae, Balanophoreae, Cytineae.

Imhofia*) Herbert 1821. App. p. 18; 1825. Bot. Mag. App. p. II; 1837. Amaryll. p. 79. 290: nov. g. Amaryllidear. *(Amaryllidiformium.)* — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 46.
Rchb. 1828. Consp. p. 61. n. 1245: g. Amaryllear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 841: sect. Brunsvigiae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1274*a*. p. 177; 1841. Ench. p. 103. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1602. 1. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (296).
Spach 1846. Vég. phan. VII. p. 421: subsect. Brunswigiae.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 7. 27. g. Galanthear. (Herb. Amaryll., non App.) — *Cf. Elisena Röm.*
Kunth 1850. Enum. V. p. 625: g. Haemanthear.

Impatiens Rivin. 1691. Tetrap. IV. p. 146.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 258. Ed. Hall. 1745. p. 269: g. pl. class. XI.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 132.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 505: g. Dicotyledonum Isostemonum.
Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Pal. II. p. 481: g. Rhaeadum.
Rebent. 1804. Neom. p. 123: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gaud. 1828. Helv. II. p. 11. 219.

*) Dicat. Imhof, botanophilo Brunswic.

Impatiens Rivin. cont.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 630: g. Balsaminear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 687. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1837. Hdb. p. 294; 1841. Nom. p. 203. n. 7721. — Dumort. 1827. Belg. p. 112; 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 423. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 750. — Link 1831. Hdb. II. p. 326. — Koch 1836. Syn. p. 143. Ed. II. p. 156. — Kunth 1838. Berol. I. p. 83. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 325.

Rchb. 1828. Consp. p. 186. n. 4834: g. Bocconiear.

Rchb. 1832. Fl. exc. p. 702: sect. Impatientis.

Synon. Balsaminae Tourn. s. Impatientis Linn. pars.

Impatiens Linn. 1737. Gen. p. 268. n. 680; 1737. Cliff. p. 428; 1748. Ups. p. 276; 1753. Sp. II. p. 937; 1759. Syst. ed. X. p. 1239. n. 899; 1763. Sp. ed. II. p. 1328; 1764. Gen. ed. VI. p. 458. n. 1008; 1767. Syst. ed. XII. p. 586: g. Syngenes. Monogam. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 669; 1784. Syst. p. 804. — Reich. 1778. Gen. p. 452. n. 1093. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 327. — Lour. 1790. Coch. II. p. 511. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 597. n. 1365. — Pers. 1797. Syst. p. 846. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 452; ed. 1832. I. p. 651. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 845.

Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p 147. n. 609: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Corydalium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 371.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Papaveracear.

Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 102: g. Oligantherar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 314: g. Pentapetalar. irregular.

Scop. 1777. Intr. p. 291: g. Columniferar.

Neck. 1790. El. III. p. 64. n. 1387: g. Amorphophytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 415: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Thunb. 1794. Prodr. I. p. 41; 1818. Fl. cap. II. p. 54. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1173. n. 447; 1809. En. p. 266. — Pers. 1805. Ench. I. p. 256. n. 583. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 145.

Batsch 1802. Tab. p. 57: g. Violariar.

Desport. 1804. Dict. v. 3. p. 485 (*Balsamine*): g. Geranieis aff. — Par. DC. 1805. Franç. IV. p. 854; 1815. V. p. 629. — Hedw. 1806. Gen. p. 163. n. 692. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 191. n. 969.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 796: g. Geranior.

Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXX. 347. n. 972: g. Geraniacear.

Link 1821. En. I. p. 243: g. Geranioidear.

Spreng. 1825. Syst. I. p. 807. n. 903: g. Geraniear.?

Impatiens Linn. cont.

D. Don 1825. Nepal. p. 203: g. Balsaminear. — Par. Ledeb. 1829. Alt. I. p. 264; 1842. Ross. I. p. 481. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 702. Sect.: Impatiens, Balsamina. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 135. — Meisn. 1837. Gen. p. 58 (42). — Endl. 1840. Gen. n. 6060. p. 1174; 1841. Ench. p. 626. — Brongn. 1843. En. genr. p. 81. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 271. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 398.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 548: g. Gruinalium.

Kunth 1827. Mém. soc. h. n. Par. III. p. 387.

DC. 1827. Mém. soc. Genèv. V. t. 1.

R. Wight 1837. Madras journ. Nr. 14. p. 1. (Linnaea 1838. Litt. p. 201.)

Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 208: g. Balsaminacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 492.

= Balsamineae A. Rich.

Impatineae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 61: fam. Thalamisertiae. Gen.: Balsamina.

Imperata*) Cyrill. 1792. Pl. rar. Neap. II. t. 11: nov. g. Diandr. Monogyn. (Lagurus cylindricus L.) *Cf.* Usteri n. Ann. VII. p. 60. (Host Gram. t. 40.)

Pers. 1805. Ench. I. p. 103: sect. Sacchari. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 35.

R. Brown 1810. Prodr. I. p. 203. Ed. Nees p. 59: g. Graminear. — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 7. — Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 47. — Link 1829. Hdb. I. p. 90. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 100.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Saccharinar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 177. — Rchb. 1828. Consp. p. 52. n. 987; 1830. Fl. exc. p. 34. — Bartl. 1830. Ord. p. 31. — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 183.

Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 13. 288. n. 214: g. Triandr. Digyn. — Par. Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 535.

Trin. 1820. Fund. p. 168: g. Graminum. — Par. Link 1821. En. I. p. 65.

Link 1827. Hort. I. p. 236: g. Villiflorar.

Dumort. 1827. Belg. p. 149; 1829. Anal. fam. p. 64: g. Saccharinear.

Kunth 1830. Gram. p. 159: g. Andropoginear.

Kunth 1833. Agrost. p. 477: g. Andropogonear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 940. p. 107; 1841. Ench. p. 60. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 474. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 20. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 399. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1355. — Meisn. 1843. Gen. p. 428 (327). — Brongn.

---

*) Dicat. Ferrante Imperati, italo.

Imperata Cyrill. cont.
1843. Én. genr. p. 10. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 167. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 441. — Steud. 1854. Glum. I. p. 405.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 329: g. Andropogineor.
Koch 1837. Syn. p. 775. Ed. II. p. 895: g. Phalaridear.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 472; 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 474: g. Saccharear.
(Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 471: g. Imperatear.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 514: g. Eusaccharear.

Imperateae (Gren. &) Godr. 1856. Fl. France III. p. 434. 471: trib. Graminear. Gen.: Imperata.

Imperatia Mönch 1794. Meth. p. 60: nov. g. Thalamostemonis. (Gypsophila saxifraga L.)
Jaub. & Spach 1842. Ill. pl. or. (Flora 1842. Lit. p. 66): subg. Tunicae.
= Tunica Scop.

Imperatoria*) Tourn. 1700. Inst. p. 316. t. 168: g. pl. class. VII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 263. Ed. Hall. 1745. p. 276: g. pl. class. XII.
Imperatoriae et Angelicae sp. Linn.

Imperatoria Linn. 1737. Gen. p. 80. n. 230; 1737. Cliff. p. 103; 1740. Syst. p. 20; 1748. Ups. p. 65; 1753. Sp. I. p. 259; 1759. Syst. ed. X. p. 961. n. 321; 1762. Sp. ed. II. p. 371; 1764. Gen. ed. VI. p. 143. n. 359; 1767. Syst. ed. XII. p. 215. n. 356; g. Pentandr. Digyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 238; 1784. Syst. p. 289. — Reich. 1778. Gen. p. 146. n. 389. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 193. n. 491. — Gmel. 1791. Syst. p. 488. — Pers. 1797. Syst. p. 306. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1458. n. 555; 1809. En. p. 319.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 445: g. Umbelliferar. — Par. B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1772. Carn. I. p. 200; 1777. Intr. p. 112. — Juss. 1789. Gen. p. 220. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 14. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 468. — DC. 1805. Franç. IV. p. 286; 1815. V. p. 504. — Hedw. 1806. Gen. p. 202. n. 830. — Lag. 1821. Amen. nat. II. p. 90. (Divis. I.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 518. — Lois. 1822. Dict. v. 23. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 235.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 57. n. 232: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Umbellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 50*. — Batsch 1802. Tab. p. 41. — Pers. 1805. Ench. I. p. 321. n. 715. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 180. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 183. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 17. 336.

*) Nomen a summis viribus, quasi planta Imperatore digna.

Imperatoria Linn. cont.
Adans. 1763. Fam. II. p. 100: g. Sphondylior.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 90. t. 21. f. 9.
Neck. 1790. El. I. p. 187. n. 316: g. Scadiophytor.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 642; 1820 in Schult. Syst. VI. p. XLIX. 608; 1825. Syst. I. p. 916. n. 1087; 1830. Gen. I. p. 227. n. 1188: g. Selinear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 360.
Dumort. 1827. Belg. p. 82; 1829. Anal. fam. p. 35: g. Peucedanear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3675; 1832. Fl. exc. p. 456; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5459. — DC. 1830. Pr. IV. p. 183. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 335. — Koch 1836. Syn. p. 306. Ed. II. p. 336. — Meisn. 1838. Gen. p. 146 (106). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 969. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 166. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 629. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 112.
Endl. 1839. Gen. n. 4462*g*. p. 780; 1841. Ench. p. 379: sect. Peucedani. — Par. Ledeb. 1845. Ross. II. p. 315. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 691.
Synon. Ostruthium Link; Angelicae sp. Hoffm.; Peucedani sp. Koch.

Imperatoria Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 95: g. Selinear. (Angelica verticillaris L.)
Peucedani sect. Angelicoides DC.

Imperatoria Tausch 1834. Flora I. p. 347: g. Peucedanear., injunctis Angelicoide et Selinoide DC. dilatatum.

Imperfectae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 35: cohors Endogenar. Nixus: Pandales, Arales, Typhales, Smilales, Fluviales.

Imperialis Adans. 1763. Fam. II. p. 48: g. Lilior. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 49.
Mönch 1794. Meth. p. 304: g. Thalamostemonis.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 169: g. Gloriosar.
Batsch 1802. Tab. p. 141: g. Tulipacear.
Juss. 1823. Dict. v. 26. p. 414: g. Liliacear.
Petilium Linn.

Impia Dodon. 1616. Pempt. p. 67.
Bluff & Fing. 1825. Comp. II. p. 342: g. Eupatorinear. (Filago germanica L.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: g. Gnaphaliear.
Filaginis sect. Gifola DC.

Imricaria Vent. Tabl. II. p. 436|: sphalm. pro *Imbricaria Comm.*

Inactis*) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 86; 1843. Phycol. gener. p. 202; 1845. Phycol. germ. p. 168; 1849. Sp. Alg. p. 273. n. 194: nov. g. Leptotrichear. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 48. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 81.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 53: inter Zoospermeas dubias.

Incarvillaea Orb. vid. *seq.*

*) *ἴς, ἰνός*, tendo, fibra.

Incarvillea*) Juss. 1789. Gen. p. 138: nov. g. Bignoniar.
Lam. 1789. Dict. III. p. 243. (Illustr. t. 537.)
Willd. 1800. Sp. III. p. 289. n. 1156: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Roxb. 1819. Corom. III. p. 88. t. 291; 1832. Ind. III. p. 112.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 316: g. Bignonear.
Correa 1806. Ann. Mus. VIII. p. 391. t. 4. f. 2 (sinensis).
Pers. 1807. Ench. II. p. 170. n. 1509: g. Bignoniacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 186. — Bunge 1832. En. pl. Chin. bor. p. 45; 1835. Mém. étr. Ac. Pet. II. p. 119. Char. emend. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 677. — Orb. 1849. Dict. VII. p. 28 (*Incarvillaea*).
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 414; 1831. Gen. II. p. 503. n. 2475: g. Bignoniear. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 52. — Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3265. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 230. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 567.
Endl. 1839. Gen. n. 4110. p. 710; 1841. Ench. p. 346: g. Incarvillear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130. — Meisn. 1840. Gen. p. 302 (211). — Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4542. — Brongn. 1843. En. genr. p. 62. — A. DC. 1845. Pr. IX. p. 236.

Incarvillea Spreng. 1825. Syst. II. p. 836. n. 2231: g. Bignoniear.
= Tecomae Juss. sp.

Incarvilleae Endl. 1839. Gen. p. 710; 1841. Ench. p. 346: subordo Bignoniacear. Gen.: Amphicome, Incarvillea.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130: sect. Bignoniacear. Gen. ead.
Meisn. 1840. Gen. p. 302 (211): subtrib. Didymocarpear. Gen.: Tromsdorffia, Babactes; Incarvillea.
Rchb. 1841. Nom. p. 117: subsect. Bignoniear. pterospermar. Gen. ut Endl.
Brongn. 1843. En. genr. p. 62: trib. Bignoniacear. Gen. ead. et Calampelis.
DC. 1845. Pr. IX. p. 236: subtrib. Bignoniear. Gen. ut Endl.

Inciliaria Fries 1825. Pl. homon. p. 281: nov. g. Coniothalamor. (Graphis deformis et incileata Ach.)
Synon. Incillaria Rchb.

Incillaria Rchb. 1828. Consp. p. 19. n. 354: g. Coniocarpicar.
Endl. 1836. Gen. n. 124. p. 12; 1841. Ench. p. 9: g. Pulverariear.
Rchb. 1841. Nom. p. 13. n. 506: g. Arthoniacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 50: g. Pulveraridar.
= Inciliaria Fries.

Incompletae Gmel. 1768. Fl. Sibir. III. p. 7: class. IX. plant. Gen.: Hippuris, Salicornia, Corispermum, Callitriche, Ceratocarpus, Empetrum, Asarum, Blitum, Axyris, Daphne, Stellera, Atraphaxis, Chrysosplenium, Urtica, Parietaria, Potamogeton, Myriophillum, Chara, Thesium, Scleranthus, Polygonum, Atriplex, Chenopodium, Spinacia, Salsola, Pharnaceum, Cannabis, Humulus, Ulmus, Rhamnus, Menispermum, Rumex, Camphorata, Alchemilla.

Incompletae Scopoli 1777. Introd. p. 60: trib. I. plant. Gentes: Crustaceae, Filamentosae, Fuci.

Incompletae (Les Incomplètes) De la Marck 1785. Act. Ac. Paris. p. 445: class. IV. plant. Divis.: *Thalamiflores*, *Caliciflores*, *Diclynes*, *Gynandres*.

Incompletae Batsch 1802. Tab. affin. p. 150: class. V. plant. Ordines: Culmales, Agrostales, Spadicales, Juliferae, Cocciferae, Seminiferae, Nuciferae.

Incompletae Rchb. 1828. Consp. p. 83; 1831. Fl. exc. p. 145. 165: formatio Venosar. Fam.; Amentaceae, Urticaceae, Nyctagineae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 161; 1841. Nom. p. 65. Fam.: Myricaceae, Amentaceae, Urticaceae.

Incompletae Lindl. 1833. Nix. pl. p. 22: subclass. II. Exogenar. Cohortes: Tubiferae, Curvembryae, Rectembryae, Achlamydeae, Columniferae.

Incompletae Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 52: series IV. Dicotyledonear. Classes: Bracteiflorae, Juliflorae, Nudiflorae.

Inconspicuae Rchb. 1828. Consp. p. 79: formatio Rigidifoliar. Fam.: Equisetaceae, Taxeae, Santaleae. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 145. 153; 1837. Hdb. p. 161; 1841. Nom. p. 61. Fam.: Equisetaceae, Taxineae, Santalaceae.

Incrustantes Nardo 1835. Consid. gen. Alghe (Isis 1837. p. 91): fam. Titanoidear. Gen.: Nullipora.

Indigo Adans. 1763. Fam. II. p. 326: g. Phaseolor.
= Indigofera Linn.

Indigofera Linn. 1737. Hort. Cliff. p. 487: g. indefinitum. (*Anil Moris.* etc.)
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 124. n. 172 (Nov. gen. zeyl. p. 13. n. 1065); 1747. Amoen. ac. I. Ed. 1749. p. 135; 1748. Ups. p. 208; 1753. Sp. II. p. 751; 1759. Syst. ed. X. p. 1171. n. 794; 1763. Sp. ed. II. p. 1061; 1764. Gen. ed. VI. p. 383. n. 889; 1767. Syst. ed. XII. p. 496: g. Diadelph. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 563; 1784. Syst. p. 677. — Reich. 1778. Gen. p. 382. n. 962. — Lour. 1790. Coch. II. p. 457. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 506. n. 1205. — Gmel. 1791. Syst. p. 1127. — Pers. 1797. Syst. p. 715; 1807. Ench. II. p. 325. n. 1741. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 50. t. 195; 1832. Ind. III. p. 370. — Willd. 1800. Sp. III. p. 1220. n. 1376; 1809. En. p. 779. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 118.

*) Dicat. Jesuitae d'Incarville.

Indigofera Linn. cont.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat. (*Indigophera*): g. Papilionacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 415. — HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 454. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 107. — D. Don 1825. Nepal. p. 244.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Leguminosar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 309. — Juss. 1789. Gen. p. 359. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 414. — Batsch 1802. Tab. p. 95. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 231. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 756; 1826. Syst. III. p. 272. n. 2578; 1831. Gen. II. p. 589. n. 2899. — Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 402. — Link 1822. En. II. p. 250.

Gled. 1764. Syst. p. 134. n. 559: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 156.

Hill 1769. Ht. kew. p. 295: g. Tetrapetalar. irregular.

Neck. 1790. El. III. p. 14. n. 1314: g. Cyteophytor.

Gärtn. 1791. Fr. II. p. 317. t. 148.

Bronn 1822. Diss. p. 134: g. Galegear. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 298. — Endl. 1840. Gen. n. 6530. p. 1271; 1841. Ench. p. 669. — Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5713. — Brongn. 1843. En. genr. p. 128. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 88. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 299. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 486.

DC. 1825. Pr. II. p. 221 (Lég. mém. VI.): g. Clitoriar. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 205. — E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 92. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 402.

Rchb. 1828. Consp. p. 151. n. 3975: g. Glycinear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: g. Clitoriear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 410. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 198. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 234. — Eckl. & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. II. p. 232. — Meisn. 1837. Gen. p. 86 (62). — — Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 519.

Link 1831. Hdb. II. p. 195: g. Galegoidear.

Benth. 1839. Ann. nat. hist. III. p. 431: g. Indigoferar.

Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 55: g. Indigoferear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.

Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 31 (*Indigotier*): g. Lotear.

Synon. Astragalus Burm.; Indigo Adans.; Sphaeridiophorum Desv.; Hemispadon Endl.; Diplonyx Rafin.?

Indigoferae Benth. 1839. Ann. nat. hist. III. Aug. p. 430: subtrib. Lotear. Gen.: Indigofera, Cyamopsis?

Indigofereae Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 55: subtrib. Lotear. Gen.: Indigofera. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554. Gen.: Cyamopsis, Amecarpus, Indigofera, Acanthonotus, Carmichaelia?

Indigophera Linn. 1764. vid. *Indigofera Linn.*

Indubitaria Dunal 1852 in DC. Prodr. XIII. 1. p. 123: subsect. Anthopleuridis §. Oppositifoliar.

Infantea Rémy 1849 in Gray Fl. Chil. IV. p. 257. t. 48. f. 1: nov. g. Heleniear. (*Cf.* Philippi Fl. Atacam. p. 31.)

Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 876: g. Euheleniear.

Infundibuliformes Linn. 1747. Class. pl. p. 325: nomen class. II. Tournefortianae. Gen.: Ipomoea, Menyanthes, etc.

Inga*) Maregr. 1648. Brasil. p. 111. 112 c. ic.

Plumier 1703. Gen. p. 13. t. 19.

Scop. 1777. Intr. p. 298: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 771 (anomal.); 1826. Syst. III. p. 127. n. 2470; 1831. Gen. II. p. 564. n. 2754. — Link 1822. En. II. p. 441. — Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 421.

Willd. 1805. Sp. IV. p. 1004. n. 1898; 1809. En. p. 1046: g. Polygam. Monoec. — Par. Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 61.

Vent. 1807. Mém. Inst. I. p. 6.

Bronn 1822. Diss. p. 130: g. Mimosear. — Par. HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 283. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 21. (Mimos. p. 35.) — DC. 1825. Pr. II. p. 432. (Lég. mém. XII.) Sect.: Ingae, Hymenaeodeae, Samaneae. — Rchb. 1828. Consp. p. 157. n. 4164 (sphalm. *Iuga*). — Bartl. 1830. Ord. p. 417. — Link 1831. Hdb. II. p. 131. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 387. Sect. ut DC. et Annesleya. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 54. — Meisn. 1837. Gen. p. 96 (69).

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLIX; g. Acaciear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 268. — Endl. 1841. Gen. n. 6837. p. 1326; 1841. Ench. p. 683. Sect.: Stryphnodendron, Euinga, Pithecolobium, Enterolobium. — Rchb. 1841. Nom. p. 156. n. 6134. Sect. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 134.

A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 470: g. Mimosar.

Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 77. t. 289. 290.

Synon. Amosa Neck.; Mimosae sp. Linn.

Inga Martius 1837. Herb. Brasil. p. 113: g. restrictum.

Benth. 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 577: g. Acaciear. Sect.: Leptinga, Diadema, Burgonia, Pseudinga, Euinga. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 622. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 635.

Synon. Euinga Endl.; Mimosae sp. Fl. Flum.

*) Nomen vernaculum.

Ingenhousia Spach, Rchb. vid. *Ingenhouzia Moç. & Sess.*

Ingenhousia Endl. Gen. p. 1415 in synon. Cissi: vid. *Ingenhoussia Dennst.*

Ingenhoussia*) Dennstädt 1818. Schl. z. Ht. Malabar. p. 33: nov. g. plant. (*Meriampulli Rheede* VII. t. 48.)
= Cissus Linn.

Ingenhoussia E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 20: nov. g. Genistear. (Priestleya ericifolia DC.)
= Amphithalea Eckl. & Zeyh.

Ingenhoussia Rchb. vid. *seq.*

Ingenhouszia Meisn. vid. *seq.*

Ingenhouzia „Moç. & Sess. ined." DC. 1824. Prodr. I. p. 474: nov. g. Malvacear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 505. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 343 (*Ingenhousia*).
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII (*Ingenhoussia*): g. Sidear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 27 (24: *Ingenhouszia*). — Endl. 1840. Gen. n. 5296. p. 987; 1841. Ench. p. 512. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. (?)
Rchb. 1828. Consp. p. 202. n. 5268; 1837. Hdb. p. 287; 1841. Nom. p. 200. n. 7460 (*Ingenhoussia*): g. Lagunaeear.

Ingenhouzia Bertero mss.
= Balbisia DC.

Inglandeae Lindl. Nix. Ed. germ. p. 25: sphalm. pro *Juglandeae.*

Inocarpeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 137: sect. Sapotear. genuinar. Gen.: Inocarpus.

Inocarpus**) Forst. 1776. Char. gen. p. 65. t. 33: g. Decandr. Monogyn. — Par. Linn. f. 1781. Spl. p. 35. n. 1391. — Thunb. 1782. Nov. gen. II. p. 45. — Murr. 1784. Syst. p. 408. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 297. n. 754. — Gmel. 1791. Syst. p. 698. — Pers. 1797. Syst. p. 437; 1805. Ench. I. p. 484. n. 1096. — Willd. 1799. Sp. II. p. 624. n. 875. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 59. t. 263; 1832. Ind. II. p. 416.
Scop. 1777. Intr. p. 201: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 152: g. Sapotis aff.
Neck. 1790. El. I. p. 226. n. 375: g. Dicroophytor.
Batsch 1802. Tab. p. 204: g. Sapotar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 344: g. Sapoteis aff.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 144. t. 199. 200.
Hedw. 1806. Gen. p. 318. n. 1256: g. Hilosporar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 341: g. Laurinar. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 228.
Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 427: g. Sapotear. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 285. n. 1538; 1830. Gen. I. p. 335. n. 1692.

Inocarpus Forst. cont.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 11. p. 551; g. Hernandiear. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 329 (241). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII: g. Lucumear.
Rchb. 1828. Consp. p. 138. n. 3651; 1837. Hdb. p. 215: g. Mimusopear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16: g. Hernandiacear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2107. p. 332; 1841. Ench. p. 210. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 887.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 34: g. Sapotacear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 452: g. Thymelear.
Rchb. 1841. Nom. p. 137. n. 5295: g. Inocarpear.
Synon. Aniotum Sol.

Inochorion*) Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 106; 1843. Phycol. gener. p. 443; 1845. Phycol. germ. p. 332; 1849. Sp. Alg. p. 873. n. 573: nov. g. Delesseriear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55: inter Florideas dubias.

Inoconia A. Libert 1827. Mém. soc. Linn. Par. V. p. 402 (Crypt. Ardenn. Fasc. I. nr. 96): nov. g. Algar., Trentepohliae Mart. aff. (Byssus. nr. 19 Mich.) *Cf.* Linnaea III. Litt. p. 62.
Rchb. 1828. Consp. p. 15: g. Fungor. minus cognitum. (Racodiaceor.?)
Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 617: g. Leptomitear.
Drilosiphon Kütz.

Inocromyon C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 632; 1853. N. Verh. Berl. Gart. I. p. 399: sect. Croci. (C. sativus, aureus, etc.)

Inocybe**) Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 254; 1828. Elench. I. p. 31: tribus Dermini.
Fries 1825. Pl. homon. p. 73: subg. Agarici.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349 *E*: sect. Agarici.
Endl. 1836. Gen. n. 453 IV *e*. p. 40; 1841. Ench. p. 22: subsect. Dermini. — Par. Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 481. — Math. 1853. Belg. II. p. 359.
Fries 1838. Epicr. p. 171: sect. Hebelomae.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 290: subg. Dermini.

Inoderma Achar. 1810. Lich. univ. p. 294; 1814. Syn. Lich. p. 96: sect. Verrucariae. (V. byssacea, epigea, rubens.)
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 498: g. Verrucaridar.

---

*) Dicat. Joh. Ingenhous, medico batavo.
**) ἴς, ἰνός, fibra.

*) ἴς, fibra; χόριον, corium.
**) κυβή, caput, cupa.

Inoderma Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 362 (Alg. aq. dulc. Germ. Dec. IV. nr. 40): nov. g. Algar. (I. lamellosum.) *Cf.* Flora 1833. p. 697 et Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 227.
Menegh. 1838. Cenni p. 29: g. Oscillariear. (?) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 18. n. 623.
Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 167): g. Lyngbyear.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 84; 1843. Phyc. gener. p. 172; 1845. Phyc. germ. p. 150: g. Palmellear. — Par. Röm. 1845. Alg. Deutschl. p. 64.
Nägeli 1849. Gatt. einzell. Alg. p. 63: g. Tetrasporear.
Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 52: g. Coccochlorear.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 471. n. 293: g. Protodermacear.

Inodisum Necker 1790. Elem. bot. III. p. 348. n. 1768: nov. g. Athrosophytor., a Lichene L. sejunctum.
= . . .?

Inoloma Fries 1821. Syst. mycol. I. p. 216: tribus Cortinariae.
Fries 1825. Pl. homon. p. 72: subsect. Cortinarii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 349*F.b*; 1841. Nom. p. 12. n. 498.4. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 496. — Math. 1853. Belg. II. p. 361.
Endl. 1836. Gen. n. 453. IVc. p. 41; 1841. Ench. p. 22: subsect. Cortinariae.
Fries 1838. Epicr. p. 278; 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 302: sect. Cortinarii. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41.

Inomeria*) Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 191; 1849. Spec. Alg. p. 343. n. 234: nov. g. Rivulariear. (I. Römeriana.) — Par. Röm. 1845. Alg. Deutschl. p. 28. t. 6. f. 117.

Inomycetes Martius 1817. Fl. crypt. Erlang. p. 346: sect. Hyphomycetum. Gen. §. 1: Erineum, Rubigo; Circinotrichum, Chloridium, Helmisporium, Cladosporium, Trentepohlia, Antennaria; Spondylocladium, Racodium, Monilia, Alternaria, Torula, Dematium. §. 2: Ozonium, Himantia, Rhizomorpha.
Fries 1821. Syst. mycol. I. p. XLII: ordo Hyphomycetum. Trib: Mucedines, Byssacei.
Spreng. 1827. Syst. IV. p. 381: div. Hyphomycetum. Gen.: Torula, Acrosporium, Sarcopodium, Amphitrichum, Rhacodium, Monilia, Antennaria, Alternaria, Byssus, Dematium, Himantia, Helicomyces, Erineum. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 782. Gen.: Dactylium, Acrosporium, Helmisporium, Helicosporium, Cladosporium, Torula, Monilia, Alternaria, Antennaria, Amphitrichum; Sarcopodium; Ozonium, Byssus; Erineum.

*) *ἰνέω*, evacuo.

Inophyllum*) Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 130. t. 60. (*Kalophyllodendron Vaill.*) Rumph. 1741. Amboin. II. t. 71.
= Calophyllum Linn.

Inopsidium „Rchb. Ic. VII. p. 26. t. 649" Walp. Rep. I. p. 675: vid. *Ionopsidium DC.*

Inopsis Poir. vid. *Ionopsis HBK.*

Insilella**) Ehrenb. 1845. Ber. Berl. Ak. p. 357: nov. g. Naviculaceor., Biddulphiae aff.
Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 32. n. 25: g. Melosirear.

Insolitegmia Dumort 1822. Comm. bot. p. 66: stirps Decorticaliae. Ordines: Glumacia, Spadicia.

Institale Fries 1825. Pl. homon p. 150: nov. g. Trichodermeor. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 9. n. 172 (*Institiale*). — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 489.
Fries 1829. Syst. mycol. III. 1. p. 210: g. Trichodermacear. subcapitatar.
Endl. 1836. Gen. n. 300. p. 25; 1841. Ench. p. 16 (*Institiale*): g. Onygeneor. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 9. n. 376 (*Institiale*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 44: g. Fungalium spurium.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 447: g. Trichocomeor.
Synon. Lycoperdi sp. Sow.

Institiale Rchb., Endl. vid. *Institale Fries.*

Intestineae Dumort 1822. Comm. bot. p. 69. 79: fam. Tectigraniae. Gen.: Röstelia, Aecidium, Urena, Puccinia, Podisoma.

Intricatae Nyland. 1854. Mém. soc. Cherb. II. p. 11: series Lichenacear. Tribus: Roccelleae, Usneae, Ramalineae, Cetrarieae. *Cf.* Flora 1854. p. 234.

Intsi Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 547: vid. *seq.*

Intsia***) Petit-Thouars 1809. Gen. Madag. n. 75 in Römer Collect. bot. p. 212: nov. g. Leguminosar. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 547. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 177.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 509: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 456. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (70).
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4115; 1841. Nom. p. 155. n. 6100: g. Caesalpiniear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 88. (verar.) — Endl. 1841. Gen. n. 6798. p. 1319; 1841. Ench. p. 674. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 610.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 74: g. Amherstiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 80.

*) *ἴς*, fibra; *φύλλον*, folium „quia folia ita sunt striata, ac si essent fibrae musculi longitudinaliter dissecti."
**) Nomen ab insilis forma.
***) *Intsi* incolarum.

Intsieae Bronn 1822. Diss. Legum. p. 135: trib. Curvembryar. Gen.: Tachigalia, Aloëxylon, Afzelia, Anthonotha, Eperua, Touchiroua, Copaifera, Detarium, Palovea, Intsia, Jonesia, Outea, Vouapa, Codarium, Dialium, Possira, Tounatea, Coublandia?

Intybellia Cassini 1821. Bull. soc. philom. p. 124; 1822. Dict. v. 23. p. 548: nov. g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 145. — Less. 1832. Syn. p. 144. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 180. — Meisn. 1839. Gen. p. 237 (145). — Brongn. 1843. En. genr. p. 33. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 831.

Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 62; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: g. Crepidear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6. — Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3719.

Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2157: g. Andryalear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715 in synon. Lagoseridis.

Synon. Myoseris Link; Crepinia Rchb.; Trichocrepis Vis., Endl.; Lagoseridis et Crepidis sp. MB.

Intybellia Monnier 1829. Hierac. p. 78: nov. g. ab Hieracio sejunctum. (Hieracium incarnatum Jacq.) *Cf.* Flora Lit. I. p. 74. = Crepidis sect. Intybellioides Fröl.

Intybellioides Fröl. 1838 in DC. Prodr. VII. 1. p. 164: sect. Crepidis. — Par. Ledeb. 1846. Ross. II. p. 824 (*Intybelloides*).

Synon. Intybellia Monn.; Intybus Fries; Geracii sp. Rchb.

Intybelloides Ledeb. vid. *praeced.*

Intybus s Endivia „C. Bauh." Herm. 1687. Hort. Lugd. Bat. cat. p. 338. = Cichorium Tourn.

Intybus Fries . . . . Novit. ed. II. p. 244; 1842. Bot. Notis. (Botan. Zeit. 1846. p. 364); 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 8: nov. g. ex typo Hieracii praemorsi L.

Endl. 1838. Gen. n. 3022 *A* 1. p. 501; 1841. Ench. p. 251: subsect. Eucrepidis. = Intybellioides Fröl.

Inula*) Linn. 1747. Amoen. ac. I. Ed. 1749. p. 136: nov. g. plant.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferor.

Linn. 1753. Sp. II. p. 881; 1759. Syst. ed. X. p. 1218. n. 860; 1763. Sp. ed. II. p. 1236; 1764. Gen. ed. VI. p. 426. n. 956; 1767. Syst. ed. XII. p. 557: g. Syngenes. Polygam. Superfl. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 637; 1784. Syst. p. 766. — Reich. 1778. Gen. p. 422. n. 1037. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 557. n. 1295. — Gmel. 1791. Syst. p. 1240. — Pers. 1797. Syst. p. 807; 1807. Ench. II. p. 450. n. 1857. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2089. n. 1489; 1809. En. p. 895. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 149. Sect.: Inula (I. Helenium), Chrysopsis.

*) Nomen e Columella.

Inula Linn. cont.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 181. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 539. — Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 399. — DC. 1805. Franç. IV. p. 147; 1815. V. p. 470. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 463. — Link 1822. En. II. p. 335. — Math. 1853. Belg. I. p. 277. Sect.: Corvisartia, Bubonium, Limbarda.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539.

Gled. 1764. Syst. p. 253. n. 1047: g. Petalostemonum.

Hill 1769. Ht. kew. p. 14: g. Radiatar. — Par. Gärtn. 1791. Fr. II. p. 449. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 560; 1826. Syst. III. p. 520. n. 2761; 1831. Gen. II. p. 627. n. 3116. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 526. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1350. 1502. Sect.: Limbarda, Pulicaria, Inula, Corvisatica. — Gaud. 1829. Helv. V. p. 10. 318. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 92.

Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Pal. II. p. 468: g. Solidaginear.

Rebent. 1804. Neom. p. 112: g. Pentandr. Monogyn.

Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 550. 564; 1827. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Inulear. (Archetypar.) (restrict.) — Par. Dumort. 1827. Belg. p. 68 (sect. Inulotypus, Corvisartia); 1829. Anal. fam. p. 31. — Rchb 1828. Consp. p. 105. n. 2457; 1841. Nom. p. 87. n. 3396. (genuinar.) Sect. (1841): Limbarda, Cappa, Inula, Corvisartia. — Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Less. 1832. Syn. p. 198. — Koch 1837. Syn. p. 358. Ed. II. p. 392. Sect.: Corvisaria, Enula. — Kunth 1838. Berol. I. p. 336. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 267. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 220. — Brongn. 1843. En. genr. p. 44. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 954. (legitimar.) — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 189. Sect. ut Rchb. 1831. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 174. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 62.

Link 1829. Hdb. I. p. 734: g. Asteroidear.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 236: g. Asterear. Sect.: Limbarda, Inula, Corvisartia.

DC. 1836. Pr. V. p. 463: g. Euinulear. Sect.: Corvisartia, Bubonium, Cappa, Limbarda. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2426. p. 393; 1841. Ench. p. 236. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 500. Sect. ex DC. et Plusiocoma. — Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 219. — C. Koch 1850. Linnaea XXIII. p. 707. Sect.: Corvisartia, Britanica, Bubonium.

Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 3: g. Asteracear.

Synon. Helenium Adans.; Enula Neck.; Conyzae sp. Linn.

Inulaceae C. B. Presl 1822. Delic. Prag. I: div. Compositiflorar. Gen.: Pulicaria, Gnaphalium, Filago.

Inulaster „Schultz Bip. mss." A. Rich. 1847. Fl. Abyssin. I. p. 400.

Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 843: g. Euinulear.

Inuleae Cassini 1812. Bull. soc. philom. Déc. p. 190 *(les Inules)*; 1813. Journ. Phys. Févr.—Apr; 1813. Journ. bot. Avr.; 1815. Bull. soc. philom. p. 173; 1821. Dict. v. 20. p. 374; 1822. v. 23. p. 559; 1827. v. 49. p. 223; 1830. v. 60. p. 579: trib. 12 Synantherear. Divis. (1823): Gnaphalieae, *Archetypae* (gen. 1822. §. 1: Filago, Gifola, Logfia, Micropus, Oglifa. §. 2: Conyza, Inula, Limbarda, Duchesnia, Pulicaria, Tubilium, Jasonia, Myriadenus, Carpesium, Denekia?, Columellea?, Pentanema, Iphiona. §. 3: Rhanterium, Cylindrocline, Molpadia, Neurolaena? — Subdivis. 1827 et 1830: Filagineae, *Archetypae verae* [gen.: Conyza, Inula, Limbarda, Francoeuria, Pulicaria, Tubilium, Jasonia, Chiliadenus, Carpesium, Denekia?, Columellea, Pentanema, Iphiona, Pegolettia et 1830 Vicoa, Allagopappus], Rhanterieae), Buphthalmeae. — Par. A. Rich. 1832. Voy. Astrol. Bot. p. 236. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 25. 199. Sect. ut Cassini.

Dumort. 1827. Belg. p. 67: subtrib. Jacobacear. Sect.: *Archetypae* (gen.: Carpesium, Pulicaria, Inula, Limbarda, Conyza), Filagineae, Gnaphalieae. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. Gen. Archetypar. 1827 et Buphthalmum.

Rchb. 1828. Consp. p. 104: div. Amphigynanthar. Subdivis.: Gnaphalieae, *genuinae* (gen. Inulear. Archetypar. Cass. 1822 et Corvisartia, Nestlera, Cylindrachne [loco Cylindroclines], Telekia,) Buphthalmeae, Senecioneae.

Bartl. 1830. Ord. p. 139: div. Synantherear. Gen.: Buphthalmum, Pallenis, Nauplius, Cernana, Egletes, Grangea, Centipeda, Sphaeranthus, Gymnarrhena, Neurolaena, Telekia, Cylindrocline, Rhanterium, Iphiona, Pentanema, Nestlera, Denekia, Carpesium, Myriadenus, Jasonia, Tubilium, Pulicaria, Duchesnia, Limbarda, Inula, Conyza, Oglifa, Micropus, Logfia, Gifola, Filago, Leontopodium, Leontonyx, Craspedia, Leucophyta, Calocephalus, Angianthus, Gnephosis, Hirnellia, Siloxerus, Elytropappus, Oedera, Disparago, Stoebe, Seriphium, Perotriche, Shawia, Endoleuca, Metalasia, Petalolepis, Ozothamnus, Antennaria, Podolepis, Helichrysum, Astelma, Argyrocome, Edmondia, Anaxeton, Lepiscline, Ammobium, Ixodia, Cassinia, Piptocarpha, Ifloga, Lasiopogon, Gnaphalium, Phagnalon, Faustula, Syncarpha, Podosperma, Facelis, Lucilia, Chevreulia, Longchampia, Leptophytus, Leysera, Lapeirousia?, Rosenia?, Relhania.

Inuleae Cassini cont.

Koch 1837. Syn. p. 356: trib. Corymbiferar. Gen.: Telekia, Buphthalmum, Asteriscus, Pallenis, Inula, Pulicaria, Conyza, Carpesium, Micropus, Filago, Gnaphalium, Helichrysum.

Rchb. 1841. Nom. p. 87: div. Asterear. Subdivis.: Buphthalmeae, *genuinae* (gen. Euinulear. Endl. et Vieria, Amblyocarpum), Caesulieae.

Inuleae Lessing 1832. Syn. Compos. p. 197: subtrib. Asteroidear. Gen.: Tubilium, Pulicaria, Jasonia, Allagopappus, Pentanema, Francoeuria, Inula, Vicoa, Donia, Rhanterium, Geigera, Pegolletia, Caesulia. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 462. Divis.: Euinuleae, Caesulieae. — Endl. 1838. Gen. p. 393; 1841. Ench. p. 236. Divis. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128). Divis. eaed. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 392. Gen.: Inula, Pulicaria. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. Gen. Euinulear. Endl. et Viraea.

Brongn. 1843. En. genr. p. 43: subtrib. Asteracear. Gen. ex Endl.

Inuleae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 953: subtrib. Asteroidear. Divis.: Amblyocarpeae, Geigerieae, Euinuleae.

Inuleae legitimae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 953: subdiv. Euinulear. Gen.: Pentanema, Klenzea, Inula, Sprunnera, Vicoa.

Inulopsis DC. 1836. Prodr. V. p. 394: sect. Aplopappi?

Endl. 1838. Gen. n. 2381 *f.* p. 386; 1841. Ench. p. 235: sect. Haplopappi. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3335. [6].

Inundatae Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: ordo 48 plantar. Gen.: Hippuris, Elatine, Proserpinaca, Myriophyllum, Ceratophyllum, Potamogeton, Zanichellia, Ruppia, Zostera, Sparganium, Typha.

Linn. 1764. Ord. nat.: ordo 15 plantar. Gen.: Zanichellia, Ruppia, Potamogeton, Myriophyllum, Ceratophyllum, Proserpinaca, Elatine, Hippuris. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 326. Gen. §. 1: Linnaeana et Aponogeton, Serpicula. §. 2: Chara, Najas.

Scop. 1777. Intr. p. 64: gens Obsoletar. Gen. §. 1: Lemna, Marsilea, Riccia, Pilularia, Isoëtes, Chara. §. 2: Naias, Ceratophyllum, Myriophyllum, Callitriche, Zannichelia, Potamogeton, Ruppia, Sparganium.

Batsch 1802. Tab. p. 161: fam. Spadicalium. Gen.: Lemna, Hippuris, Chara, Ceratophyllum, Myriophyllum, Trapa, Najas, Aponogeton, Potamogeton, Zannichelia, Zostera, Callitriche.

Involucraria Seringe 1825. Mém. soc. Genèv. III. 1. p. 25. t. 5; 1828 in DC. Prodr. III. p. 318: nov. g. Cucurbitear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2763. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 42. — Meisn. 1838. Gen. p. 127 (91). — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 188. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.

Bartl. 1830. Ord. p. 275: g. Cucurbitacear.

Involucraria Seringe cont.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 350: subg. Trichosanthis.
Endl. 1839. Gen. n. 5140 c. p. 939; 1841. Ench. p. 491: sect. Trichosanthis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 101. n. 3961. 3. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 677.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 16. 97: g. Cucumerinar.
Synon. Mukia Arn.?; Muckia Hassk.; Modeccae sp. Lam.

Involucrarium „Hook." Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Am. I. p. 317: sect. Trifolii. (T. microcephalum, fimbriatum, involucratum, etc.)

Iochroma Benth. 1845. Bot. Regist. n. ser. XVIII. t. 20: nov. g Solanacear. (Habrothamnus cyaneus Lindl.) *Cf.* Flora 1846. I. p. 220.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 621: g. Rectembryar.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 629; 1852. Ann. bot. III. p. 176: g. Cestrinear.
Miers 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 343; 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Iochromear. Sect.: Iochroma, Chaenesthes.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 489: g. Lycinear.
Synon. Cleochroma Miers; Chaenesthes Miers.

Iochromeae Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 178: trib. Solanacear. Gen.: Iochroma, Cleochroma, Lycioplesium, Paecilochroma, Hebecladus, Dunalia, Acnistus, Phrodus.

Iodanthus*) Torrey & A. Gray 1838. Fl. North-Amer. I. p. 72: sect. Cheiranthi. An genus? (Hesperis pinnatifida Mich.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4848 c. p. 863; 1841. Ench. p. 448.
Rchb. 1841. Nom. p. 181. n. 6994: g. Cheiranthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Arabidar.

Iodes Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1892: g. Menispermear. (genuinar.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 243 (desciscens). — Meisn. 1837. Gen. p. 5 (7). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 7.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 113: g. Menispermaceis aff.
Planch. 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 256: g. Phytocrenear. — Par. R. Brown 1852. Pl. jav. rar. IV. p. 243. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 795.
= Ioedes Blume.

Iodina Hook. & Arn. 1833. Bot. Miscell. III. p. 172 in nota: nov. g. pro Celastro rhombifolia propositum.
Meisn. 1837. Gen. p. 68 (48): g. Evonymear.

*) ἰώδης, violaceus.

Iodina Hook. & Arn. cont.
Endl. 1840. Gen. n. 5710. p. 1093; 1841. Ench. p. 578: g. Dubium Ilicinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5254.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 598: g. Aquifoliacear.?

Iodopappus Schultz Bip. 1844. Flora p. 781; 1847 in Walp. Repert. VI. p. 316: subsect. Lasiopodis.

Ioedes Blume 1825. Bijdr. Nr. 1. p. 29: nov. g. Menispermeis aff. *Cf.* Linnaea I. p. 499.
Endl. 1839. Gen. n. 4689. p. 826; 1841. Ench. p. 415: g. Menispermacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 309.
Rchb. 1841. Nom. p. 70. n. 2620: g. Menispermear. genuinar.
Miers 1851. Ann. and Mag. 2d. ser. VII. p. 37: g. Phytocrenear.
Synon. Iodes Rchb., etc.

Ion*) Medic. 1787. Malv. p. 102: nov. g. Monadelph. Pentandr. (Viola tricolor L.)
= Melanium Ging.

Iondraba Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 27; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 37: nov. g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen*: Biscutella auriculata L.)
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 235; 1821. Syst. II. p. 407; 1824. Pr. I. p. 181: sect. Biscutellae. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 67. — Dumort. 1827. Belg. p. 118. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1116; 1828. Consp. p. 183. n. 4745 *b*; 1832. Fl. exc. p. 661; 1841. Nom. p. 180. n. 6925. 2. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 196. — Endl. 1839. Gen. n. 4889 *a*. p. 871; 1841. Ench. p. 449. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 134.
Webb 1836. Canar. I. p. 93: g. Iberidear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325: g. Siliculosar.

Ione Lindl. 1853. Fol. Orchidac. Fasc. II. 10 Jan.: nov. g. Orchidear.

Ionidia Vent. 1803. Malmais. p. 27.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 827: fam. 91 plant. Gen.: Viola, Hybanthus, Burcardia, Salmasia, Gynopleura, Frankenia, Alsodea, Paropsia.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 521. Gen.: Viola, Solea, Hymenanthera, Hybanthus, Corynostylis, Noisettia, Glossarrhen, Alsodea.
Conf. Violarieae Bartl.

Ionidieae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LVIII: div. Violear. Gen. Violear. Ging.
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187: subdiv. Violear. Sect.: Hybantheae, Pombalieae, Amphirrhogeae.

Ionidiopsis Presl 1845. Abh. Böhm. Ges. 5te Folge III. p. 443: nov. g. Violear. (I. fruticulosa.) — Par. Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 69.
= Noisettia HBK.

*) ἴον, viola.

Ionidium*) Vent. 1803. Malmais. t. 27: nov. g. Ionidior.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 100: g. Cisteis aff. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 164. n. 694.
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXX. 392. n. 974: g. Violar.
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 373: g. Violear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 300. — DC. 1824. Pr. I. p. 307. — Mart. 1825. Mat. med. Bras. in Denkschr. Münchn. Ak. IX. p. 89. — Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4888. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 284. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 336. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 519. — Meisn. 1837. Gen. p. 20 (18). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 339. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 234.
Link 1821. En. I. p. 242: g. Violinar.
Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 601: g. Violacear. — Par. A. St. Hil. 1829. Fl. Bras. II. p. 141. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 144. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 89.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII: g. Ionidiear. (ibid. I. p. 391 sect. Violae.)
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 32: g. Violariear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 269; 1841. Nom. p. 187. n. 7145: g. Pombaliear.

Ionidium Endl. 1839. Gen. n. 5041. p. 909; 1841. Ench. p. 470; 1850. Spl. V. p. 44: g. Violear. ampliat.
Synon. Calceolar Löfl.; Pombalia Vand.; Hybanthus Jacq.; Solea Spreng.; Pigea DC.; Vlamingia Vriese.

Ioniris Spach 1846. Hist. vég. phan. XIII. p. 35; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 98: subg. Iridis. (I. humilis MB.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 821.

Ionium Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4885*d*: sect. Violae.
= Chamaemelanium Ging.

Ionopsidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 182: sect. Vandear. Gen.: Rodriguezia, Scelochilus, Burlingtonia, Ionopsis, Diadenium, Comparettia, Trichocentrum. *Cf.* Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 171.

Ionopsidium DC. 1824. Prodr. I. p. 174: sect. Cochleariae. (C. acaulis Desf.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4763*a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 190.
Rchb. 1829. Icon. VII. p. 26. t. 649: genus.
Meisn. 1837. Gen. p. 14 (13): g. Lepidinear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4928. p. 879; 1841. Ench. p. 450. — Walp. 1842. Rep. I. p. 175 (*Inopsidium*).
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6931: g. Lepidiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 354: g. Lepididar.
Synon. Ionopsis DC.

Ionopsis HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 348. t. 83: nov. g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 335. — Bartl. 1830. Ord. p. 58.
Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 430 (*Inopsis*): g. Orchidear.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Massulatar.
Lindl. 1826. Orch. scel. p. 14 (Linnaea II. p. 530); 1833. Orchid. p. 193; 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1904; 1852. Fol. Orchid. 1 Oct.: g. Vandear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1512; 1841. Nom. p. 54. n. 2056. — Endl. 1837. Gen. n. 1452. p. 202; 1841. Ench. p. 111. — Meisn. 1842. Gen. p. 374 (281). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 27. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 178.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 126: g. Ceropagar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 182: g. Ionopsidar.
Synon. Iantha Hook.; Cybelion Spreng.

Ionopsis DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 234; 1821. Syst. II. p. 371: sect. Cochleariae. (C. acaulis Desf.)
= Ionopsidium DC.

Ionopsis Hook. f. 1845. Voy. of Terr. and Ereb. p. 34: sect. Celmisiae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 118.

Ionthlaspi*) Tourn. 1700. Inst. p. 210. t. 99: g. pl. class. V. *Cf.* Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 243.
Adans. 1763. Fam. II. p. 423: g. Raphanor.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 190. (Clypeola Ionthlaspi L.)
DC. 1821. Syst. II. p. 326; 1824. Pr. I. p. 165: sect. Clypeolae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 183. n. 4758*a*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 181. — Endl. 1839. Gen. n. 4877*a*. p. 869; 1841. Ench. p. 449.
Link 1831. Hdb. II. p. 296: g. Alyssinear.
Synon. Jonthlaspi Auct.; Fosselinia Scop.

Ioxylon Rafin. 1817. Amer. monthl. mag.; 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 260.
Maclura Nutt.

Ipecacuanha Pison. 1648. Brasil. p. 101 c. ic.
Arruda . . . . Diss. p. 44.
= Cephaëlis Swartz.

Ipex Rabenh. vid. *Irpex Fries.*

Iphigenia**) Kunth 1843. Enum. pl. IV. p. 212: nov. g. Uvulariear. (Melanthium indicum L.) — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 552.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 204: g. Tulipear.

---

*) *ἰωνίδιον*, viola.

*) *ἴον*, viola; Thlaspi: quod ad utrumque genus affinitate accedat.

**) Iphigenia, filia Agamemnonis.

Iphiona Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 153; 1822. Dict. v. 23. p. 565. 609; 1827. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: nov. g. Inulear. (Archetypar.: Conyza pungens Lam.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2469; 1841. Nom. p. 87. n. 3389. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27. (verar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
DC. 1836. Pr. V. p. 475: g. Euinulear. (emend.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2432. p. 394; 1841. Ench. p. 236. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128).
Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 953: g. Iphionear.
Synon. Chrysocomae sp. Forsk.; Conyzae et Stähelinae sp. Auct.

Iphioneae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 953: subdiv. Euconyzear. Gen.: Iphiona, Pterocaulon.

Iphisia Wight 1834. Contrib. p. 52: nov. g. Asclepiadear. — Par. Decne 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar., 1844 in DC. Pr. VIII. p. 610 ad Tylophoram reductum.)
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 144: g. Asclepiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4980. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3480. p. 593; 1841. Ench. p. 299: g. Euasclepiear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 269 (176).
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539: g. Cynanchear.

Ipo „Camell. 1704 in Rai Hist. App. III. p. 87" Pers. 1807. Ench. II. p. 566. n. 2098: g. Monoec. Polyandr.
= Antiaris Lesch.

Ipomaea Hill, Jacq., Juss. etc.: vid. *Ipomoea Linn.*

Ipomaea Choisy 1833 vid. *Ipomoea Choisy.*

Ipomea All., Rchb. vid. *Ipomoea Linn.*

Ipomeria*) Nuttall 1818. Gen. Am. I. p. 124: g. Pentandr. Monogyn.
= Ipomopsis Rich.

Ipomoea**) Linn. 1737. Gen. p. 47. n. 133; 1737. Cliff. p. 66; 1740. Syst. p. 19; 1748. Ups. p. 39; 1753. Sp. I. p. 159; 1759. Syst. ed. X. p. 924. n. 199; 1762. Sp. ed. II. p. 227; 1764. Gen. ed. VI. p. 87. n. 216; 1767. Syst. ed. XII. p. 158. n. 215: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 171; 1784. Syst. p. 204. — Reich. 1778. Gen. p. 89. n. 232. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 116. n. 288. — Lour. 1790. Coch. I. p. 111. — Gmel. 1791. Syst. p. 345. — Pers. 1797. Syst. p. 211; 1805. Ench. I. p. 182. n. 417. — Willd. 1797. Sp. I. p. 879. n. 325; 1809. En. p. 206. — Michx. 1803. Fl. am. I. p. 140. (Disjungitur Ipomopsis.) — Nutt. 1818. Gen. I. p. 124. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 19. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 87; ed. 1832. I. p. 497. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 25.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Campanaceor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Convolvulor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 134. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXI. 205. n. 689.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Campanacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 393.
Gled. 1764. Syst. p. 209. n. 874: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 166.
Hill 1769. Ht. kew. p. 128: g. Monopetalar.
Allion. 1773. Misc. Taur. V. p. 62 (*Ipomea*): g. Pentastemonum monostylar. diangiar.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 229. 338; 1789. Phil. Bot. I. p. 83.
Neck. 1790. El. II. p. 25. n. 646: g. Darinyphytor. Segregantur Apomaea et Milhania.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 396: g. Convolvulacear. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 210. — Hedw. 1806. Gen. p. 102. n. 457. — — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 484. Ed. Nees p. 340. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 110. — Link 1821. En. I. p. 198; 1829. Hdb. I. p. 592. — Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 611. — Kunth 1823. Syn. II. p. 224. — — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 708. — D. Don 1825. Nepal. p. 98. — Bartl. 1830. Ord. p. 192. — Zucc. 1832. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. I. p. 293. — Endl. 1833. Norf. p. 52. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 184.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 308: g. Convolvulear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 461. — Rchb. 1828. Consp. p. 119. n. 3015 (*Ipomea*).
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Convolvulinear.
Synon. Ipomaea Hill, etc.; Apomaea et Milhania Neck.?; Convolvuli pars Spreng.

Ipomoea Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 404. 444 (*Ipomaea*): g. Convolvulear., sejunctis Calonyctio, Exogonio, et Jacquemontia restrict. Sect.: Erpipomaea, Orthipomaea, Strophipomaea. *Cf.* Flora Lit. V. p. 129. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 265. Sect.: Erpipomoea, Orthipomoea, Strophipomoea. — Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4408. (genuinar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 55. — Choisy 1845 in DC. Pr. IX. p. 348. Sect. ut Don. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 86.
Endl. 1839. Gen. n. 3803c. p. 654; 1841. Ench. p. 324: sect. Convolvuli. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 275 (182).
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 601: g. Convolvulinar. Sect. ut G. Don.
Synon. Convolvuli et Ipomoeae sp. Auct.; Spirantherae sp. et Elytrostamna Bojer; Operculina Silva Manso; Piptostegia Hoffm.; Leptocallis Don.

---

*) Nomen Richardianum unice euphoniae causa mutatum.

**) ἴψ, convolvulus, ὅμοιος, similis. (Hort. Cliff.) Conf. Beckmann Lex. bot. p. 120.

Ipomopsis Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. I. p. 141: nov. g. Pentandr. Monogyn. (Ipomoea rubra L.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: g. Polemonear.
Benth. 1833. Bot. Regist. n. 1622: sect. Giliae. *Cf.* Linnaea X. Litt. p. 23. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 244. — Endl. 1839. Gen. n. 3821 *f.* p. 657; 1841. Ench. p. 327. — Meisn. 1840. Gen. p. 273 (179).
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 118: g. Giliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4392.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 636: g. Polemoniacear.
Synon. Ipomeria Nutt.; Brickellia Rafin.; Spogopsis Michx.? (Rchb.)

Ipphia Noronh. 1811 in Petit-Thouars Mélang. (teste Meisn.)
= Psilotum Swartz.

Ipsea Lindl. 1831. Orchid. gen. p. 124: nov. g. Epidendrear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1386. p. 195; 1841. Ench. p. 110. — Rchb. 1841. Nom. p. 52. n. 1983. (genuinar.) — Meisn. 1842. Gen. p. 372 (279). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Bletidar.
= Pachystoma Blume. (Miq.)

Irasekia Gray vid. *Jirasekia Schmidt.*

Iraupalos Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 87: g. Lentaginiae. (Viburni sp. stigm. 1, fructu non coronato.)
Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1953 (*Trapaulos*): g. Viburnear.?

Ireneis Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 349: nov. g. Gomphrenear. (Iresine interrupta Benth.)

Ireon „Burm." Scopoli 1777. Introd. p. 229. n. 1031: g. Nomadear. (Lobelia parviflora Berg.)
Lightfootia L'Herit.

Iresinastrum Moquin-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 344: sect. Iresines. (*Synon. Iresine HBK.*)

Iresine P. Browne 1756. Jamaic. p. 358: nov. g. Dioec. — Par. Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 1291. 1381. n. 1174; 1763. Sp. ed. II. p. 1456; 1764. Gen. ed. VI. p. 521. n. 1113; 1767. Syst. ed. XII. p. 653. (Pentandr.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 741; 1784. Syst. p. 885. — Reich. 1778. Gen. p. 517. n. 1217. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 687. n. 1519. — Pers. 1797. Syst. p. 928; 1807. Ench. II. p. 617. n. 2226. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 764. n. 1791; 1809. En. p. 1014. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 236.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Jalapar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 268: g. Amaranthor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 88.
Gled. 1764. Syst. p. 43. n. 168: g. Thalamostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 346: g. Seminudar.
Neck. 1790. El. II. p. 177. n. 884: g. Aclithrophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 463: g. Pentandr. Digyn.

Iresine P. Browne cont.
Gis. 1792. Prael. p. 306: g. Holoracear.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 266: g. Amaranthoidear.
Batsch 1802. Tab. p. 174: g. Amaranthinar.
Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 244: g. Dioec. Monadelph.
Juss. 1803. Ann. Mus. II. p. 131: g. Amarantacear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 206: g. Amaranthacear. — Par. Link 1822. En. II. p. 424. — Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 619. — Agdh. 1825. Aphor. p. 220. — Bartl. 1830. Ord. p. 298.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 317; 1825. Syst. I. p. 820. n. 928; 1830. Gen. I. p. 200. n. 1018: g. Amarantear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 870.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LII: g. Amaranthear.
Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4355: g. Gomphrenear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18. — Endl. 1837. Gen. n. 1954. p. 301; 1841. Ench. p. 185. Sect.: Iresine, Philoxerus. — Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6420. Sect. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 102. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 511. — Moq-Tand. 1849 in DC. Prodr. XIII. 2. p. 339. Sect: Philoxerus, Rosea, Iresinastrum.
Synon. Xerandra Rafin.

Iresine HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 198: g. restrict. Amaranthacear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 4. — Mart. 1826. Nov. gen. II. p. 55. t. 153. 154; 1826. Nov. Act. Leop. XIII. 1. p. 306. *Cf.* Flora 1827. I. p. 110. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 270.
Endl. 1837. Gen. n. 1954 *a*. p. 301; 1841. Ench. p. 185: sect. Iresines. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 165. n. 6420.2.
Meisn. 1841. Gen. p. 318 (231): g. Gomphrenear.
Iresinastrum Moq.-Tand.

Iresines „Browne" Linn. Gen. ed. VI. p. 521: vid. *Iresine P. Browne.*

Ireum „Burm." Steud. Nom II. p. 465: vid. *Iridion.*

Iria Rich. 1805 in Pers. Ench. I. p. 65.
Hedw. 1806. Gen. p. 360: g. Cyperacear.
Abildgaardia Vahl.

Iriartea*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 149. t. 32: nov. g. Palmar. (Monoec. Polyandr.) — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 576. n. 2122. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 623. n. 1991; 1830. Gen. I. p. 449. n. 2217. (Polyandr. Trigyn.) — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136.
Mart. 1824. Gen. Palm. bras. fasc. II. p. 35. t. 33—37; 1824. Palm. fam. p. 17: g. Arecinar. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1733. p. 248; 1841. Ench. p. 135. — Kunth 1841. Enum. III. p. 194. — Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2264. — Meisn. 1842. Gen. p. 356 (266).

*) Dicat. Bernardo Iriarte.

Iriartea Ruiz & Pav. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1646: g. Arecacear.
Mart. . . . . Palm. p. 189; 1846. Palmet. Orbign.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 15: g. Arecinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 72.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear. *Synon.* Ceroxylon Humb. & Bonpl.?; Ceroxylum Link.

Iridaceae Lindl. (1836. Nat. syst. ed. II. p. 332) 1847. Veg. kingd. p. 159: ordo Narcissalium. Gen. Iridear. Endl. et Orthrosanthus, Solenomelus, Symphyostemon, Eleutherine, Psythirisma, Echthronema, Eriphilema, Calydorea, Glumosia, Tecophilaea, Hymenostigma, Plantia, Trimezia, Phalocallis, Alophia, Trifurcaria, Beatonia, Acidanthera, Antholyza, Morphixia, Nemastylis, Gelasine.

Iridaea Bory 1826. Dict. class. IX. p. 19: nov. g. Laminariear.
Bory 1828 in Duperr. voy. Crypt. p. 100. t. 11—t. 13 bis: p. Laminariar.
Grev. 1830. Alg. brit. p. 158 (Syn. p. XLI): g. Gastrocarpear. — Par. Harv. 1833 in Beech. voy. Bot. Pt. IV. p. 165; 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 397; 1841. Brit. Alg. p. 53. — Menegh. 1838. Cenni p. 36 *(Iridea).* — Post. & Rupr. 1840. Ill. Alg. p. 17. *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 496.
Rchb. 1841. Nom. p. 20. n. 716 *(Iridea)*: g. Halymeniear.
J. Agdh. 1842. Alg. medit. p. 90: sect. Nemostomae.
Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 361 *(Iridea; cf.* Flora 1843. p. 99): g. Gasterocarpear.
Endl. 1843. Spl. III. p. 37. n. $122/_{33}$: g. Nemastomear. *(Synon. Nemastoma J. Agdh., Dilsea Stackh.)* — Par. Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 46. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54.
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102; 1843. Phyc. gener. p. 395; 1845. Phyc. germ. p. 301; 1849. Sp. Alg. p. 724. n. 484: g. Gigartinear.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 127: g. Cryptocarpear. — Par. Aresch. 1847. Nov. Act. Ups. XIII. p. 311.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 24: g. Nemastomidar.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . . : g. Chondrear.
Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 178: g. Eugigartinear.
Harv. 1855 in Hook f. N.-Zeal. II. p. 252: g. Cryptonemiacear.

Iridaps Comm. mss. (An *Tridaps?* ex Endl. Spl. IV. p. 36.)
= Artocarpi sect. Jaca Endl.

Iridarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57: ordo Gynochlamydar. Fam.: Irideae, Alströmeriaceae, Hypoxideae, Campynemaceae.

Iridea Stackhouse 1816. Nereis brit. ed. alt. (Spreng. n. Entd. I. p. 97): g. Algar., teste Rchb. ab Iridaea Bory diversum.

Iridea Menegh., Rchb., Decne vid. *Iridaea Bory.*

Irideae Vent. 1799. Tabl. II. p. 188: ordo 8 class. III. Gen. §. 1: Sisyrinchium, Tigridia, Ferraria. §. 2: Iris, Moraea, Ixia, Gladiolus, Crocus. *Cf.* Juss. 1822. Dict. v. 23. p. 623.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 143. t. 22. Sect. ut Vent. Accedunt ad §. 1: Galaxia, ad §. 2: Cipura, Aristea, Watsonia, Antholysa, Witsenia, Tapeinia, et *affinia:* Xiphidium, Wachendorfia, Dilatris, Heritiera, Angolasia.
DC. 1805. Franç. III. p. 235: fam. (21) Monocotyledonum phanerogamar. Gen.: Iris, Gladiolus, Ixia, Crocus. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 107. Gen. ut Endl. 1841.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 302. Ed. Nees p. 158: ordo Monocotyledonum. Novum gen.: Patersonia. — Par. Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 302. Gen.: Iris, Evansia, Xiphium, Thelysia, Hermodactylus, Diaphane, Helixyra, Morea, Dietes, Homeria, Marica, Trimeza, Cipura.
Cassel 1810. Nat. Fam. p. 87.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 320: ordo plant. Sect.: *Irideae* (gen.: Cipura, Moraea), Witseneae.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 256: fam. 20 plant. Gen.: Iris, Moraea, Ovieda, Wachendorfia, Pardanthus, Marica, Tigridia, Patersonia, Diplarrhena, Gladiolus, Antholyza, Babiana, Diasia, Watsonia, Anomatheca; Burmannia, Tripterella.
DC. 1819. Théor. élém. p. 248: ordo Endogenar. phanerogamar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 193: fam. plant. endogenar. phanerogamar. Gen.: Crocus, Trichomema, Iris.
Schrank 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. 165. Divis.: Irideae *verae* (gen.: Iris, Xiphium, Galaxia, Moraea, Ixia, Gladiolus, Antholyza) et *adscitae* (gen.: Aristea, Dilatris, Schinnongia). *Cf.* Isis 1823. p. 861.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66; 1827. Belg. p. 137: fam. Fructauliae. Trib. (1827): Mariceae, Gladioleae, Ixieae.
Agdh. 1823. Aphor. p. 171; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 585: ordo Liliiflorar. Gen. §. 1: Galaxia, Aristea, Antholyza, Diasia, Gladiolus, Diplarhena, Ixia, Crocus, Patęrsonia, Renealmia, Moraea, Vieusseuxia, Sisyrinchium, Tigridia, Ferraria, Iris, Marica. §. 2: Burmannia, Tripterella, Vellozia. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 127. Gen. ead. et Ovieda, Wachendorfia, Pardanthus, Babiana, Watsonia, Anomatheca.
Ker 1827. Gen. Irid. (Bruxell.)
Eckl. 1827. Verz. p. 11: ordo Ensatar. Gen. cap.: Vieusseuxia, Freuchenia, Moraea, Marica, Sisyrinchium, Wredowia, Aristea, Galaxia, Wachendorfia, Ferraria. — Par.

Irideae Vent. cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 44. Gen.: Diasia, Diplarrhena, Gladiolus, Montbretia, Watsonia, Antholyza, Ovieda, Anomatheca, Tritonia, Sparaxis, Babiana, Galaxia, Crocus, Trichonema, Geissorrhiza, Hesperantha, Ixia, Aristea, Genlisia, Belemcanda, Witsenia, Libertia, Patersonia, Cipura, Sisyrinchium, Tigridia, Cypella, Ferraria, Moraea, Vieusseuxia, Iris. — Endl. 1837. Gen. p. 164. Gen.: Sisyrinchium, Libertia, Cipura, Vieusseuxia, Moraea, Diplarrhena, Iris, Herbertia, Cypella, Tigridia, Ferraria, Pardanthus, Aristea, Witsenia, Patersonia, Galaxia, Ovieda, Anomatheca, Babiana, Gladiolus, Watsonia, Sparaxis, Montbretia, Ixia, Diasia, Hesperantha, Geissorrhiza, Trichonema, Crocus. Accedunt 1841 (Spl. I. p. 1359 et Ench. p. 97) Hydrotaenia et Rigidella. — Meisn. 1842. Gen. p. 391 (293). Gen. ead. et Alophia, Tecophilaea?
Rchb. 1828. Consp. p. 59; 1830. Fl. exc. p. 80; 1837. Hdb. p. 149; 1841. Nom. p. 43: fam. Ensatar. Divis.: Ferrarieae (1841 Irideae genuinae), Gladioleae, Ixieae.
Link 1829. Hdb. I. p. 208: ordo (9) Endogenear. Gen.: Iris, Vieusseuxia, Marica, Sisyrinchium, Pardanthus, Tigridia, Diasia, Antholyza, Gladiolus, Tritonia, Watsonia, Ixia, Trichonema, Crocus. — Par. Koch 1837. Syn. p. 697. Ed. II. p. 804. Gen.: Crocus, Trichonema; Gladiolus, Iris.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57: fam. Iridariear. Trib.: Ferrarieae, Moraeaceae, Gladioleae, Ixieae, Crocineae.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (239) Hexapetaloidear.
Lindl. 1833. Nix. p. 33: ordo unicus Ixialium.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 22: fam. Lirioidear. Gen. ex Endl.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 1: fam. (214) Ensatar. Trib.: Ferrarieae, Moraeaceae, Gladioleae, Ixieae, Crocineae.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Homoblastear.
Synon. Irides Juss.; Ensatae Gawl.; Iridaceae Lindl.

Irides B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 10 plant. Gen.: Sisyrinchium, Ferraria, Ixia, Gladiolus, Antholyza, Meriana, Watsonia, Iris, Crocus; Gethyllis.
Adans. 1763. Fam. II. p. 58: sect. 8 Liliacear. Gen.: Bermudiana, Belam-Canda, Tekel, Kotsjiletti, Iris, Hermodactylus, Chamoletta, Sisyrinchium, Ilmu, Meriana, Gladiolus, Crocus.
Juss. 1789. Gen. p. 57: ordo 8 class. III. Gen. §. 1: Galaxia, Sisyrinchium, Tigridia, Ferraria. §. 2: Iris, Moraea, Ixia, Cipura, Watsonia, Gladiolus, Antholyza, Witsenia, Tapeinia, Crocus. §. 3: Xiphidium, Wachendorfia, Dilatris, Argolasia.
= Irideae Vent.

Iridion Burm. . . . . Prodr. p. 6. (*Ireum* ex Steud. Nom. II. p. 465.)
= Roridula Linn.

Iridotypus Dumort. 1827. Fl. belg. p. 137: sect. Iridis. (I. pseudacorus, graminea, etc.)

Irillium Raf. ex Steud. Nomencl. I. p. 821; II. p. 710.
Trillium Mill.

Irina Blume 1825. Bijdr. Nr. 5. p. 229: nov. g. Sapindacear. — Par. Hassk. 1844. Cat. Bogor. alt. p. 223; 1848. Pl. jav. rar. p. 283 (*Irine*).
Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 24: g. Sapindear. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 664. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 40. — Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38). — Endl. 1840. Gen. n. 5607. p. 1069; 1841. Ench. p. 561. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385.
Rchb. 1837. Hdb. p. 285; 1841. Nom. p. 199. n. 7588: g. Cupaniear.

Irine Hassk. vid. *praeced.*

Irio DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 238; 1821. Syst. II. p. 463; 1824. Prodr. I. p. 191: sect. Sisymbrii. — Par. Dumort. 1827. Belg. p. 124. — Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4810 *d*; 1832. Fl. exc. p. 690. — Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 131. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 205. — Koch 1836. Syn. p. 47. Ed. II. p. 51. — Endl. 1839. Gen. n. 4906 *d*. p. 875; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 178. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 256.
Webb 1836. Canar. I. p. 73: sect. Descurainiae.
Synon. Leptocarpaea DC.

Iripa Adans. 1763. Fam. II. p. 508: g. Zizyphor.
= Cynometra Linn.

Iris Tourn. 1700. Inst. p. 358. t. 186—188: g. pl. class. IX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 31. Ed. Hall. 1745. p. 31: g. pl. class. I.
Adans. 1763. Fam. II. p. 60: g. Iridum.
Salisb. 1812. Hort. Trans. I. p. 302: g. Iridear. — Par. Schrank 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. (verar.)
Schrank 1824. Flora II. Beil. p. 15: g. Triandr. Monogyn.
= Iridis Linn. pars.

Iris Linn. 1737. Gen. p. 11. n. 29; 1737. Cliff. p. 18; 1740. Syst. p. 17; 1748. Ups. p. 16; 1753. Sp. I. p. 38; 1759. Syst. ed. X. p. 863. n. 57; 1762. Sp. ed. II. p. 55; 1764. Gen. ed. VI. p. 27. n. 59; 1767. Syst. ed. XII. p. 77: g. Triandr. Monogyn. ampliat. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 38. — Murr. 1774. Syst. p. 78; 1784. Syst. p. 88. — Reich. 1778. Gen. p. 28. n. 65. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 36. n. 79. — Gmel. 1791. Syst. p. 113. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 11; 1818. Fl. cap. I. p. 284. — Pers. 1797. Syst. p. 89; 1805. Ench. I. p. 50. n. 107. — Willd. 1797. Sp. I. p. 224. n. 97; 1809. En. p. 62. — Vahl 1806. Enum. II. p. 125. n. 101. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 102. — Nutt. 1818. Gen. I.

Iris Linn. cont.
p. 22. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 411. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 174; ed. 1832. I. p. 170. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 63. 90.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 279: g. Liliacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 88.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 26: g. Palmar.
Gled. 1749. Berl. V. p. 127; 1764. Syst. p. 159. n. 652: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 527.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27; 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170. — Batsch 1802. Tab. p. 143. — Gawl. 1805 in Kon. Ann. bot. I. p. 242. — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 20.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Iridum. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 57.
Hill 1769. Ht. kew. p. 325: g. Monopetalar. incompletar.
Neck. 1770. Act. Theod. Palat. II. p. 461: g. Liliatar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 38. t. 13. f. 1 (sibirica et persica).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 219. 248. 317; 1790. Act. Theod. Palat. Phys. VI. p. 416. *Cf. Chamaeiris* et *Xiphion Med.*
Neck. 1790. El. III. p. 166. n. 1516: g. Ymnodiphytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 191: g. Iridear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 144. — DC. 1805. Franç. III. p. 236; 1815. V. p. 328. — Hedw. 1806. Gen. p. 25. 353. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 343. 456. n. 133. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 257; 1825. Syst. I. p. 159. n. 165; 1830. Gen. I. p. 39. n. 177. — Link 1821. En. I. p. 57; 1829. Hdb. I. p. 208. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 196. Sect.: Iris, Xyphium. — Lois. 1822. Dict. v. 23. p. 629. — Agdh. 1823. Aphor. p. 172. — D. Don 1825. Nepal. p. 54. — Eckl. 1827. Verz. p. 11. — Bunge 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 55. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 127. — Koch 1837. Syn. p. 700. Ed. II. p. 807. — Endl. 1837. Gen. n. 1226. p. 166; 1841. Ench. p. 98. — Kunth 1838. Berol. II. p. 253. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 142. — D. Don 1840. Linn. Trans. XVIII. 3. p. 309. Sect.: Euiris, Xiphioides. — Rchb. 1841. Nom. p. 43. n. 1555. Sect.: Iris (Pogonirion), Lophiris. — Meisn. 1842. Gen. p. 392 (294). — Brongn. 1843. En. genr. p. 22. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 369. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 636. Sect.: Cromyophora, Apogon, Pogonirion. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 110. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 816. Subgen. ex Spach. — Webb 1850. Canar. III. p. 314. — Bunge 1852. Reliq. Lehm. p. 329; 1854. Ac. Pet. Mém. sav. étr. VII. p. 505. Nova sect.: Hexapogon. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 92. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 239. Sect.: Euiris, Xiphion.
Dumort. 1827. Belg. p. 137: g. Maricear. Sect.: Pogoniris, Iridotypus.

Iris Linn. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1187; 1830. Fl. exc. p. 80: g. Ferrariear. Sect.: Pogonirion, Lophiris, Limniris, Xyridion, Spathula, Xiphium.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Moraeacear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 12; 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 89. Subgen.: Hermodactylus, Hermodactyloides, Scorpiris, Xiphium, Xyridion, Graminiris, Spathula, Eremiris, Ioniris, Limniris, Phaeiris, Pogoniris, Psammiris, Susiana, Crossiris.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 332; 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Sisynrichium Herm., Burm.?; Chamaexyris Lob.; Iris, Xiphion, Hermodactylus et Sisyrinchium Tourn.; Iris, Xyphium et Chamaeiris Hall.; Chamoletta Adans.; Beverna Adans.?; Biris et Gattenhofia (?) Medic.; Isis et Juno Tratt.; Iris et Xiphium Schrank.
Irlbachia*) Martius 1827. Nov. gen. II. 2. p. 101. t. 179: nov. g. Gentianear. (I. elegans.) *Cf.* Flora 1827. I. p. 373. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 201. — Griseb. 1836. Obs. Gent. p. 36. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 614.
Rchb. 1828. Consp. p. 133. n. 3490: g. Chironiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3551. p. 604; 1841. Ench. p. 302.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 210: g. Lisianthear. — Par. Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 71.
Rchb. 1837. Hdb. p. 211; 1841. Nom. p. 132. n. 5102: g. Erythraeariar.
Griseb. 1839. Gent. gen. p. 194: g. Lisyanthear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 5. — Meisn. 1840. Gen. p. 261 (169).
Synon. Lisianthi sp. Aubl., etc.; Claytoniae sp. Willd.
Irmischia Schlechtend. 1847. Linnaea XIX. 6. p. 738: nov. g. Asclepiadear. (I. floribunda.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 506.
Iron P. Browne 1756. Jamaic. p. 179. t. 12. f. 3: nov. g. Pentandr. Monogyn.
= Sauvagesia Linn.
Iroucana Aublet 1775. Guian. I. p. 329. t. 127: nov. g. Octandr. Monogyn. (I. guianensis.) *Cf.* Juss. 1822. Dict. v. 23. p. 643.
Rchb. 1828. Consp. p. 177. n. 4695 *b*: sect. Caseariae. — Par. Benth. 1842 in Hook. journ. bot. IV. p. 110.
= Anavinga Rheede.
Irpex Fries 1825. Pl. homon. p. 81; 1838. Epicr. p. 521: nov. g. Hydneor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 440. p. 39; 1841. Ench. p. 21. — Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 470. — Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 42; 1842. Mycol. p. 177. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 402 (sphalm. *Ipex*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in

---

*) Nomen dominatus comitis De Bray.

Irpex Fries cont.
Orb. Dict. VIII. p. 487. — Bonord. 1851. Hdb. p. 167. — Bail 1858. Syst. p. 23. t. 29.
Fries 1828. Elench. I. p. 142: g. Pileator. — Par. Spreng. 1831. Gen. II. p. 763. n. 3902.
Rchb. 1828. Consp. p. 14. n. 330: g. Radularior.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 619: g. Hymenomycetum gymnosporor.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 328: g. Hydnaceor.
Synon. Xylodon Pers.; Sistotrematis sp. Alb. & Schw.; Hydni sp. Fries syst.

Irsiola P. Browne 1756. Jamaic. p. 147. t. 4. f. 2: nov. g. Tetrandr. Monogyn.
= Cissus Linn.

Irya Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 159: sect. Myristicae. — Par. A. DC. 1856. Prodr. XIV. 1. p. 202.

Iryanthera A. DC. 1856. Prodr. XIV. 1. p. 201: sect. Myristicae.

Isacanthus*) Nees 1847 in DC. Prodr. XI. p. 278: nov. g. Acanthear.

Isachne R. Brown 1810. Prodr. I. p. 196. Ed. Nees p. 52: nov. g. Graminear. — — Par. Palis. 1812. Agrost. p. 52. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 26. 476. n. 268. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 1. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 126. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 291.
R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 582 (Verm. bot. Schr. I. p. 114): g. Panicear. — Par. Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 71; 1830. Gram. p. 42. t. 33. 117; 1833. Agrost. p. 135. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 156. — Agdh. 1823. Aphor. p. 149. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 30. — Endl. 1837. Gen. n. 773. p. 84; 1841. Ench. p. 57. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 285. — Rchb. 1841. Nom. p. 37. n. 1274. — Meisn. 1843. Gen. p. 418 (320). — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 170. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 160. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 115.
Trin. 1820. Fund. p. 191: g. Graminum.
Roth 1821. Nov. sp. p. 57: g. Triandr. Digyn.
Rchb. 1828. Consp. p. 51. n. 937: g. Panicariar.
Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. I. (1835) p. 328: sect. Panici. — Par. Steud. 1854. Glum. I. p. 94.
Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 458: g. Eupanicear.
Synon. Meneritaria Herm.

Isadis Batsch vid. *Isatis Tourn.*

Isanthera Nees 1834. Linn. Trans. XVII. 1. p. 82: nov. g. Verbascinar. (I. permollis.) *Cf.* Flora 1836. II. Beibl. p. 8. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 499.

*) ἴσος, aequalis.

Isanthera Nees cont.
Rchb. 1837. Hdb. p. 199: g. Verbascear.
Endl. 1839. Gen. n. 3871. p. 668; 1841. Ench. p. 332: g. dubium Solanacear.? (An Cyrtandracear.?)
Meisn. 1840. Gen. p. 276 (184): g. Daturear.?
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4694: g. Henckeliear.?
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 279: g. dubium Didymocarpear.

Isanthina Rchb. 1828. Consp. p. 59. n. 1167b: sect. Commelinae.

Isanthium Lindl. 1852. Fol. Orchid. 14 Oct.: sect. Odontoglossi.

Isanthus Rich. 1803 in Michx. Fl. bor. am. II. p. 3. t. 30: nov. g. Didynam. Gymnosperm. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 27.
Pers. 1807. Ench. II. p. 113. n. 1374: g. Labiatar. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 2. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 719. n. 2084; 1831. Gen. II. p. 472. n. 2327.
Rchb. 1828. Consp. p. 116. n. 2861: g. Nepetear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 182.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: g. Menthear.
Benth. 1833. Labiat. p. 166: g. Menthoidear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 715. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 163. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 352. 404.
Rchb. 1837. Hdb. p. 188; 1841. Nom. p. 104. n. 4047: g. Menthear. (genuinar.) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3592. p. 613; 1841. Ench. p. 306. — Meisn. 1840. Gen. p. 283 (192). — Walp. 1845. Rep. III. p. 585. 979.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661: g. Menthidar.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 572: g. Ajugear.

Isanthus DC. mss. in herb. Humb.
= Homoianthus DC.

Isanthus Lessing 1830. Linnaea V. p. 338; 1832. Syn. Compos. p. 119: subg. Onoseridis.
= Berniera DC.

Isaria Pers. 1797. Tent. disp. p. 41: nov. g. Nematotheciі. (1799. Ic. et descr. t. 8. f. 1.) *Cf.* Leman 1822. Dict. v. 24. p. 3.
Pers. 1801. Syn. p. XIX. 687: g. Naematothecior.
Link 1809. Berl. Mag. III. p. 19: g. Mucedinum. — Par. Agdh. 1821. Aphor. p. 80. — Pers. 1822. Mycol. eur. I. p. 44.
Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 54: g. Eleutherocarpor.
DC. 1815. Franç. V. p. 12: g. Gymnocarpor.
Nees 1816. Syst. p. 85; 1817. Überbl. p. 23: g. Cephalotrichor. — Par. Mart. 1817. Erlang. p. 364. — Simil. Ehrenb. 1818. Sylv. myc. Berol. p. 13. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 544. n. 3547; 1831. Gen. II. p. 779. n. 4015.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 562: g. Isariadear.

Isaria Pers. cont.
Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 547: g. Isariear. — Par. Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 47; 1842. V. p. 40; 1842. Mycol. p. 169. — Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 126. — Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 150.
Link 1825. Spec. II. p. 112: g. Gymnomycetum.
Fries 1825. Pl. homon. p. 169; 1832. Syst. myc. III. 2. p. 270: g. Cephalotricheor. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 270. p. 22; 1841. Ench. p. 15. — Rchb. 1841. Nom. p. 6. n. 226.
Link 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: g. Isariaceor. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43. — Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 464.
Rchb. 1828. Consp. p. 4. n. 51: g. Cephalotrichior.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: g. Cephalosporear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 91: g. Leptomycetum.
Wallr. 1833. Fl. crypt. II. p. 306: g. Hyphomycetum. (synsporor.) — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 309.
Wallr. 1844. Beitr. z. Bot. I. H. 2. p. 160: g. Hypho-entomycetum.
Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: g. Isarieor. — Par. Bonord. 1851. Hdb. p. 144.
Math. 1853. Belg. II. p. 415: g. Tuberculariear.

Isariacei Link. 1826. Abh. Berl. Ak. f. 1824. p. 180: div. Epiphytor. Gen.: Isaria, Ceratium.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 43: subordo Hyphomycetum. Gen.: Isaria, Podosporium, Ceratocladium, Anthina, Pterula, Scorias, Dacrina, Ceratium, Byssocaulon.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 464: ordo Gymnomycetum. Gen.: Isaria, Amphichorda, Anthina, Byssocaulon, Peribotryon, Ceratium; Scoriadei; Podosporei?

Isariadeae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 562 (p. 549 *Isarideae*): div. Nematomycear. Gen.: Ceratium, Isaria, Coremium, Cephalotrichum.

Isariaeae Corda vid. *Isarieae.*

Isarideae Gray vid. *Isariadeae.*

Isarieae Brongn. 1824. Dict. v. 33. p. 546: trib. Mucedinear. Gen.: Athelia, Epichysium, Dacryomyces, Ceratium, Isaria, Coremium, Periconia, Cephalotrichum, Stilbum?, Tubercularia?, Atractium, Calicium.
Corda 1840. Ic. Fung. IV. p. 47 *(Isariaeae)*: fam. Hymenomycetum. Gen.: Isaria, Ceratium.
Corda 1842. Ic. Fung. V. p. 40; 1842. Mycol. p. CII. 169: fam. Basidiophoror. Gen.: Ceratium, Isaria, Byssocaulon, Dacrina, Scorias, Anthina, Peribotryon, Pterula, Amphichorda. — Par. Preuss 1851. Linnaea XXIV. p. 150. Gen.: Isaria, Pterula.
Rabenh. 1844. Krypt. I. p. 125: subsect. Mucorinor. genuinor. Gen.: Ceratium, Epichysium, Dacrina, Anthina, Isaria.

Isariei Léveillé 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 493: trib. Aleurineor. Gen.: Isaria, Amphichorda, Peribotryon?, Triclinium?
Bonord. 1851. Hdb. p. 144: fam. Mycetinor. Gen.: Isaria, Ceratium, Peribótryon, Anthina, Pterula, Tilachlidium.

Isartia Dumort. vid. *Isertia Schreb.*

Isatidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 355: trib. Notorhizear. Gen.: Isatis, Pachypterygium, Tauscheria, Chartoloma, Texieria, Boreava, Neslia, Myagrum, Traillia, Lachnoloma.

Isatideae DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 241; 1821. Syst. II. p. 151. 563; 1824. Prodr. I. p. 209: trib. Notorhizear. Gen.: Tauscheria, Isatis, Myagrum, Sobolewskia, et (1824) Aphragmus. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 223. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 14 (13). Gen. ead. et Tetrapterygium, Thysanocarpus. — Endl. 1839. Gen. p. 880. Gen.: Dipterygium, Tetrapterygium, Isatis, Tauscheria, Thysanocarpus, Sobolewskia, Neslia, Myagrum. Accedunt 1841. (Spl. I. p. 1419 et Ench. p. 450) Traillia, 1843 (Spl. III. p. 88) Pachypteris, Texiera, Boreava, Spirorhynchus, et 1850 (Spl. V. p. 39) Lachnoloma, Oxystylis.
Dumort. 1827. Belg. p. 121: trib. Siliquastrear. Gen.: Myagrum, Isatis.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 182; 1832. Fl. exc. p. 657: sect. Siliculosar. Gen. ut DC. 1824.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: trib. Siliquastrar. Gen. ut 1827.
Koch 1836. Syn. p. 75. Ed. II. p. 81: trib. Nucamentacear. Gen.: Isatis, Myagrum, Neslia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 258: subdiv. Synclistar. Gen.: Tetrapterygium, Isatis, Thysanocarpus, Tauscheria; Sobolewskia, Myagrum; Bunias.
Rchb. 1841. Nom. p. 179: sect. Nucamentacear. Gen. ut Endl. et subsect.: Buniadeae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 92: trib. Cruciferar. Gen. ut Koch et Tauscheria.

Isatis*) Tourn. 1700. Inst. p. 211. t. 100: g. pl. class. V.
Linn. 1737. Gen. p. 199. n. 549; 1737. Cliff. p. 341; 1748. Ups. p. 193; 1753. Sp. II. p. 670; 1759. Syst. ed. X. p. 1137. n. 738; 1763. Sp. ed. II. p. 936; 1764. Gen. ed. VI. p. 344. n. 824; 1767. Syst. ed. XII. p. 446: g. Tetradynam. Siliquos. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 505; 1784. Syst. p. 604. — Reich. 1778. Gen. p. 344. n. 888. — Gmel. 1791. Syst. p. 992. — Pers. 1797. Syst. p. 641.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 535: g. Tetrapetalar. cruciatar.

---

*) Nomen ex Plinio.

Isatis Tourn. cont.

Linn. 1747. Class. pl. p. 341: g. Cruciformium.

Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 67. n. 279: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 221.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Siliquosar. — Par. Gmel. 1768. Sibir. III. p. 250. — Gis. 1792. Prael. p. 481. — Batsch 1802. Tab. p. 82 (*Isadis*). — Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 428.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Cruciferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 242. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 511. — DC. 1805. Franç. IV. p. 722; 1815. V. p. 598. — R. Brown 1812 in Ait. h. kew. IV. p. 78. (Verm. bot. Schr. V. p. 12.) — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 690. — Lois. 1825. Dict. v. 38. p. 51 (*Pastel*).

Adans. 1763. Fam. II. p. 423: g. Raphanor.

Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 5: g. Siliculosar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 172[16]. — Scop. 1777. Intr. p. 320. — Smel 1805. Nov. Act. Petrop. XIV. p. 484. — Pers. 1807. Ench. II. p. 193. n. 1583. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 722. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 185. 199. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 675.

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 338 (I. armena); 1789. Phil. bot. I. p. 191.

Neck. 1790. El. III. p. 97. n. 1426: g. Brachytophytor.

Schreb. 1791. Gen. II. p. 435. n. 1072: g. Tetradynam. Siliculos. — Par. Willd. 1800. Sp. III. p. 420. n. 1221; 1809. En. p. 663. — Cram. 1803. Disp. p. 147. — Link 1822. En. II. p. 149.

Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 21; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 37: g. Cruciflorar. (*Kreuzblüthen*.)

Vent. 1799. Tabl. III. p. 116: g. Myagroidear.

DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 241; 1821. Syst. II. p. 564; 1824. Pr. I. p. 210: g. Isatidear. Sect.: Sameraria, Glastum. — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. 87. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVI; 1828. Consp. p. 182. n. 4734; 1832. Fl. exc. p. 657; 1841. Nom. p. 179. n. 6896. Sect. ut DC. — Dumort. 1827. Belg. p. 121; 1829. Anal. fam. p. 51. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 223. Sect. eaed. — C. A. Meyer 1831 in Ledeb. Alt. III. p. 202. — Koch 1836. Syn. p. 75. Ed. II. p. 81. — Meisn. 1837. Gen. p. 14 (13). — Endl. 1839. Gen. n. 4938. p. 880; 1841. Ench. p. 450. Sect. ut DC. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 210. 766. Sect. eaed. — Brongn. 1843. En. genr. p. 92. — Duch. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 504 (*Pastel*).

Spreng. 1825. Syst. II. p. 856. n. 2277; 1831. Gen. II. p. 514. n. 2521: g. Synclistar.

Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Nucamentacear.

Link 1831. Hdb. II. p. 284: g. Buniadear.

Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 578: g. Carcerulosar.

Isatis Tourn. cont.

Griseb. 1843. Rumel. I. p. 286: g. Angustiseptar.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 355: g. Isatidar.

(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 133: g. Iberidear.

Synon. Glastum Rupp.

Isaura „Comm." Poiret 1813. Suppl. III. p. 85; 1822. Dict. v. 24. p. 5: g. Apocinear.

= Stephanotis Pet.-Thouars.

Isauxis*) Arnott 1839. Ann. nat. hist. III. p. 155: sect. Vateriae. (V. lanceolata.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5394*b*. p. 1014; 1841. Ench. p. 525.

Rchb 1841. Nom. p. 210. n. 7979: g. Dipterocarpear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 394: g. Dipteracear.

Synon. Seidlia Kostel.

Ischaemeae Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. . . . : subtrib. Saccharinar. Gen.: Ischaemum.

Ischaemon Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 205 (absque nomine) et Praef. p. 32: g. Graminum.

Hill 1769. Ht. kew. p. 408: g. Graminear.

= Ischaemum Linn.

Ischaemum Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 35: g. pl. class. XIVa (non descriptum).

= seq.?

Ischaemum**) Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 525. n. 1018: nov. g. ex *Schoenantho Scheuchz.* adumbratum.

Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 18. n. 71: g. Thalamostemonum.

Linn. 1753. Sp. II. p. 1049; 1759. Syst. ed. X. p. 1306. n. 1016; 1763. Sp. ed. II. p. 1487; 1764. Gen. ed. VI. p. 542. n. 1148; 1767. Syst. ed. XII. p. 670: g. Polygam. Monoec. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 760; 1784. Syst. p. 906. — Reich. 1778. Gen. p. 537. n. 1254. — Lour. 1790. Coch. II. p. 646. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 718. n. 1569. — Pers. 1797. Syst. p. 947. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 939. n. 1868.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Graminear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 30. — Batsch 1802. Tab. p. 156. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 78 (*Ischoemum*). — Hedw. 1806. Gen. p. 44. n. 206. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 201 Ed. Nees p. 60. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 6. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 297. n. 311; 1830. Gen. I. p. 66. n. 320. — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 67. Sect.: Distachya, Polystachia.

---

*) αὔξις, incrementum.

**) Nomen ex Plinio: ἴσχω, cohibeo, reprimo; αἷμα, sanguis.

Ischaemum Linn. cont.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Graminum. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 76. (legitimor.) — Gis. 1792. Prael. p. 135.

Neck. 1790. El. III. p. 233. n. 1620: g. Achyrophytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 177: g. Triandr. Digyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 105. n. 189. — Thunb. 1818. Fl. cap. I. p. 418. — Trin. 1820. Fund. p. 173. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 321; ed. 1832. I. p. 319.

R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 582 (Verm. bot. Schr. I. p. 114): g. Panicear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 155.

HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 194: g. Saccharinar. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 247.

Agdh. 1823. Aphor. p. 152: g. Sacharinar.

Link 1827. Hort. I. p. 247: g. Villiflorar.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Andropoginear. — Par. Kunth 1830. Gram. p. 167. t. 98—100.

Bartl. 1830. Ord. p. 129: g. Hordeacear.

Kunth 1833. Agrost. p. 511: g. Andropogonear. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 951. p. 108; 1841. Ench. p. 60. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 476. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 412. — Rchb. 1841. Nom. p. 38. n. 1332. — Meisn. 1843. Gen. p. 429 (328). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 167. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116. — Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 495.

Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. . . .: g. Ischaemear.

Trin. 1833. Mém. Ac. Pet. 6e sér. II. p. 290: g. Andropogineor.

Steud. 1854. Glnm. I. p. 368: sect. Andropogonis. — Par. (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 465.

Griseb. 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 266: g. Saccharear.

Synon. Schoenanthus Scheuchz.; Ischaemon Hall.; Sehima Forsk.; Colladoa Cavan.; Ischaemum et Meoschium Palis.; Spodiopogon Trin.; Goldbachia Trin.; Riedelia Trin.; Calamochloë Rchb.; Thysanachne Presl.

Ischaemum Palis. 1812. Agrost. p. 107: g. Graminear., disjuncto Meoschio restrict. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 45. 780. n. 352.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 74: g. Saccharinar.

Rchb. 1828. Consp. p. 47. n. 831: g. Cenchrinar.

Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 200: g. Rottbölliear.

Hochst. 1856. Flora I. p. 90: g. Andropogonear.

Ischaleon Ehrhart. 1780. Phytophyl. Nr. 43; 1789. Beitr. IV. p. 147. (Gentiana filiformis L.)
= Cicendia Adans.

Ischarum Blume 1835. Rumphia I. p. 112: sect. Biari. (Species orientales.) — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1675*b*. p. 235; 1841. Ench. p. 128. — Kunth 1841. Enum. III. p. 22. — Boiss. 1853. Diagn. pl. or. II. Nr. 13. p. 6.

Rchb. 1841. Nom. p. 32. n. 1086: g. Aroidear. genuinar.

Schott (& Kotschy 1854. Oestr. bot. Woch. p. 81) 1856. Syn. Aroid. I. p. 6: g. Biarinar. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 866.

Ischina Walp. vid. *Ischnia DC.*

Ischnanthus Röm. & Schult. vid. *Ichnanthus Palis.*

Ischnia*) „DC." Meisn. 1840. Gen. pl. vasc. p. 298 (206): nov. g. Pedaliear.

Endl. 1841. Ench. p. 351. n. 4177/1: g. Pedalinear. (Spl. II. p. 58 ad Tamoneam Aubl. reductum.) — Par. DC. 1845. Pr. IX. p. 257. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 520 (*Ischina*).

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670: g. Pedalear.
Synon. Maceria DC.

Ischoemum St. Hil. vid. *Ischaemum Linn.*

Ischurochloa**) Büse 1854. Pl. Jungh. Fasc. III. p. 389: nov. g. Bambusacear (Bambusa spinosa Roxb.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 1045.

Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 422: g. Bambusear.

Ischyranthera Steud. . . .
= Bellucia Neck.

Ischyrolepis Steud. 1850. Flora I. p. 229 (nomen); 1855. Syn. pl. glum. II. p. 249: nov. g. Restiacear. (Restio ferrugineus Kunth ex parte.)

Iseilema Anderss. 1856. Nov. Act. Upsal. ser. tert. II. 1. p. 250: nov. g. Anthistiriear. (Andropogon prostratum L.) *Cf.* Bot. Zeit. 1857. p. 206.

Iserta Batsch vid. *seq.*

Isertia***) Schreb. 1789. Gen. I. p. 234. n. 602: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 567. — Willd. 1799. Sp. II. p. 240. n. 688.

Vahl 1796. Eclog. p. 27. t. 15.

Batsch 1802. Tab. p. 235 (*Iserta*): g. Guettardear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 613. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32 (*Isartia*).

Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 60. t. 191.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 447: g. Rubiacear. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 392. n. 862. — Hedw. 1806. Gen. p. 224. n. 911. — Juss. 1820. Mém. Mus. VI. p. 399. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 7. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 126. n. 1307; 1830. Gen. I. p. 242. n. 1268. — Schult. 1829. Syst. VII. p. XVI. 92. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1038. 1051.

---

*) ἰσχνός, macer.
**) ἰσχυρός, fortis, validus.
***) Dicat. Paulo Erdm. Isert, peregrinatori danico.

Isertia Schreb. cont.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 415: g. Hameliacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 64. — Rchb. 1828. Consp. p. 96. n. 2112.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: g. Hamellidiae.
Bartl. 1830. Ord. p. 211: g. Hedyotidear.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 235: g. Isertiar.
DC. 1830. Pr. IV. p. 437: g. Isertiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 538. — Endl. 1838. Gen. n. 3234. p. 547; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Gen. p. 164 (116). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374. — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2931. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 50.
Rchb. 1837. Hdb. p. 180: g. Gardeniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Isertidar.
Synon. Phosanthus Rafin.; Guettardae sp. Aubl.

Isertiae A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 108. 235: trib. 9 Rubiacear. Gen.: Isertia, Gonzalea, Metabolus, Anthocephalus.

Isertidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 765: trib. Cinchonear. Gen.: Isertiear. Endl. 1843.

Isertieae DC. 1830. Prodr. IV. p. 435: trib. Rubiacear. Gen.: Metabolos, Gonzalea, Isertia. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 536. Gen. ead. — Meisn. 1838. Gen. p. 164 (116). Gen. ead. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 50. Gen.: Isertia.
Endl. 1838. Gen. p. 574; 1841. Ench. p. 273: trib. Cinchonacear. Gen. ut DC. et Anthocephalus. Accedunt 1843 (Spl. III. p. 73) Bruinsmania, Rhyssocarpus.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374: sect. Rubiacear. Gen. ut Endl.
Rchb. 1841. Nom. p. 77: subsect. Gardeniariar. Gen.: Isertia, Gonzalagunea, Buena, Cephalidium, Metabolus.

Isias De Notaris 1844. Mem. Acc. Torino ser. II. Vol. VI. p. 413: nov. g. Orchidear. Rchb. f. 1853 in Walp. Ann. bot. III. p. 591: sect. Serapiadis. (S. triloba.)

Isica Mönch vid. *Isika Adans.*

Isidieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 14: fam. Cephalopsorar. Gen.: Isidium, Siphula.
Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 6: div. Lichenum imperfector. Gen.: Isidium.

Isidium*) Achar. 1798. Lich. suec. p. 87: g. Lichenum. (crustaceor.) *Cf.* Leman 1822. Dict. v. 24. p. 9 et Fries 1825. Pl homon. p. 278. — Par. DC. 1805. Franç. II. p. 326; 1815. V. p. 177. — Mart. 1817. Erlang. p. 276. (capitator.)
Achar. 1803. Meth. Lich. p. XXXIII. 136: g. Coenothalamor.

Isidium Achar. cont.
Achar. 1810. Lich. univ. p. 110. 575; 1814. Syn. Lichen. p. 281: g. Cephaloideor.
Fries 1821. Kongl. Vet. Ak. Handl. II. p. 323: g. Leprariar.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 411: g. Baeomycidear.
Agdh. 1821. Aphor. p. 91: g. Leprosar.
Eschw. 1824. Syst. Lich. p. 22: g. Plocariar.
Rchb. 1828. Consp. p. 19. n. 359: g. Coniocarpicar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: g. Sphaerophorear.
Rchb. 1841. Nom. p. 14. n. 516: g. Isidiear. — Par. Rabenh. 1845. Krypt. II. 1. p. 6.
Bayrh. 1849. Taun. p. 99: g. Anamorphosium.
= Lichenum varior. stat. imperfect.

Isidora Burger: g. Vitium, teste Bronner.

Isidorea*) A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 284. t. 25. f. 1: nov. g. Cinchonear. (Ernodea pungens Lam.)
DC. 1830. Pr. IV. p. 405: g. Rondeletiear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 514. — Endl. 1838. Gen. n. 3256. p. 552; 1841. Ench. p. 274. — Meisn. 1838. Gen. p. 159 (114). — Rchb. 1841. Nom. p. 77. n. 2892.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 373: g. Hedyotidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.

Isidrogalvia**) Ruiz & Pav. 1802. Fl. peruv. III. p. 69. t. 302: nov. g. Hexandr. Monogyn. (Anthericum calyculatum L.) *Cf.* Schrad. n. Journ. III. 3. p. 149.
= Tofieldia Huds.

Isika Adans. 1763. Fam. II. p. 501: g. Caprifolior. (Lonicera alpigena et caerulea L.)
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 126.
Mönch 1794. Meth. p. 504 (*Isica*): g. Petalostemonis.
Gaud. 1828. Helv. II. p. 192: sect. Lonicerae. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 201.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 449: subsect. Xylostei. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3337 *Bd.* p. 569; 1841. Ench. p. 282.
Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2735. 4: sect. Xylostei.
Chamaecerasus Linn.

Isis Trattinick 1812. Tabular. p. 668. (I. ruthenica.)
= Iris Linn.

Ismelia Cassini 1826. Dict. v. 41. p. 40; 1827. v. 50. p. 498; 1830. v. 60. p. 578: nov. g. Chrysanthemear. verar. (Chrysanthemum carinatum Schousb.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 179.
DC. 1837. Pr. VI. p. 65: sect. Chrysanthemi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2671*c*. p. 435; 1841. Ench. p. 241. — Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3070. 3.
= Euismelia Schultz Bip.

---

*) Ἶσις, εἶδος, forma: ob similitudinem cum Isido, Corallii genere Linn.

*) Dicat. Isidor Geoffroy-St. Hilaire.
**) Dicat. Isidoro Galvez, pictori botanico.

Ismelia Lessing 1832. Syn. Compos. p. 255: g. Chrysanthemear.
= Ismelioides DC.

Ismelia Schultz Bip. . . . . in Webb & Berth. Phyt. Canar. II. p. 271; 1847 in Walp. Rep. VI. p. 201: g. emendat. Euchrysanthemear. Sect.: Euismelia, Sphenismelia, Grammismelia.

Ismelioides DC. 1837. Prodr. VI. p. 65: sect. Chrysanthemi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2671*d*. p. 435; 1841. Ench. p. 241.
Synon. Ismelia Less.; Pinardia Less.; Miselia Rchb.; Arctotidis et Chrysanthemi sp. Thunb.

Ismene Herbert 1835. Bot. Mag. App. p. III; 1837. Amaryll. p. 76. 222: nov. g. Amaryllidear. (Pancratiformium.) *Cf.* Bot. Mag. n. 2685. 3675. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 46.
Rchb. 1828. Consp. p. 62. n. 1269: g. Narcissoinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: g. Pancratiear. — Par. Kunth 1850. Enum. V. p. 681.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 929: sect. Pancratii. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1288*c*. p. 179; 1841. Ench. p. 103. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1173. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1612. 2. — Meisn. 1842. Gen. p. 394 (297).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Narcissear.
Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 161: subg. Pancratii.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 16. 184: g. Narcissinear.

Isnarda Linn. 1751 vid. *Isnardia Linn.*

Isnardia*) Linn. 1737. Gen. p. 337. n. 842; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 120; 1759. Syst. ed. X. p. 898. n. 145; 1762. Sp. ed. II. p. 175; 1764. Gen. ed. VI. p. 61. n. 156; 1767. Syst. ed. XII. p. 126: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. P. Browne 1756. Jamaic. p. 148. — Murr. 1774. Syst. p. 136; 1784. Syst. p. 162. — Reich. 1778. Gen. p. 63. n. 164. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 84. n. 207. — Gmel. 1791. Syst. p. 265. — Pers. 1797. Syst. p. 168; 1805. Ench. I. p. 146. n. 309. — Willd. 1797. Sp. I. p. 680. n. 242; 1809. En. p. 167. — Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 66. (reform.) — Nutt. 1818. Gen. I. p. 98. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 821. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 376. 452.
Gled. 1749. Berl. V. p. 132; 1764. Syst. p. 262. n. 1083: g. Calycostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31 (*Isnarda*): g. Calycanthemor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Salicariar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 333. — Batsch 1802. Tab. p. 79.

*) Dicat. Ant. Danti d'Isnard, prof. Paris.

Isnardia Linn. cont.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Calycanthemar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 332. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 304.
Scop. 1777. Intr. p. 229: g. Nomadear.
Neck. 1790. El. II. p. 172. n. 874: g. Aclithrophytor.
Juss. 1804. Ann. Mus. III. p. 473: g. Onagrariar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 151. — DC. 1805. Franç. IV. p. 419. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 31. 476. n. 581. — Link 1831. Hdb. II. p. 54.
Hedw. 1806. Gen. p. 79. n. 368: g. Onagrear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 702: g. Onagrar. — Par. Link 1821. En. I. p. 141.
Lois. 1822. Dict. v. 24. p. 15: g. Lythrariar.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: g. Isnardiear.
Dumort. 1827. Belg. p. 90: g. Jussidiear.
Rchb. 1828. Consp. p. 170 n. 4490; 1832. Fl. exc. p. 634; 1837. Hdb. p. 246: g. Jussieuear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39.
Koch 1836. Syn. p. 243. Ed. II. p. 268: g. Jussiear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 508: sect. Ludwigiae. — Par. Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 525.
Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6555. 1: sect. Isnardiae.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 585: g. Jussievear.
= Isnardiae sect. Dantia DC.

Isnardia DC. 1828. Prodr. III. p. 59: g. emendat. Jussiear., Ludwigiam L. complectens. Sect.: Ludwigiaria, Dantia. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 319. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 697. Sect. ut DC. — Meisn. 1838. Gen. p. 120 (86).
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 337: g. Jussievear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6111. p. 1189; 1841. Ench. p. 637. Sect. ut DC.
Rchb. 1841. Nom. p. 170. n. 6555: g. Jussieuear. Sect.: Isnardia, Ludwigiaria. — Par. Ledeb. 1844. Ross. II. p. 112.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 118: g. Oenotherear.
A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 536: g. Onagrariar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Jussiaear.
Synon. Isnardia et Ludwigia Linn.; Ludwigia Ell., Spreng.; Dantia Pet.-Th.; Tiphogeton Ehrh.

Isnardieae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LIII: div. Onagrear. Gen.: Isnardia, Ludwigia, Goniocarpus, Trapa.

Isocalyx Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 306: sect. Comespermae. — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 84. — Endl. 1850. Spl. V. p. 81. n. 5649*b* (sphalm. *Bocalyx*).

Isocarpeae Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 82; 1843. Phycol. gener. p. 145: class. I. Algar. Trib.: Gymnospermeae, Angiospermeae. — Par. Kütz. 1845. Phyc. germ. p. 54; 1849. Sp. Alg. p. 1. Subclass.: Diatomeae, Malacophyceae (1845 Chlorophyceae).

Isocarpha R. Brown 1816. Linn. Trans. XII. 1. p. 110 (Verm. bot. Schr. II. p. 550): nov. g. Compositar. (Calea oppositifolia L.)
Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 18; 1825. v. 38. p. 117: g. Helianthear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2630. (genuinar.?) — Bartl. 1830. Ord. p. 142.
Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 138; 1830. v. 60. p. 576: g. Spilanthear.?
Less. 1830. Linnaea V. p. 141; 1831. ibid. VI. p. 405: g. Eupatoriear. (I. echioides.)
Less. 1832. Syn. p. 154: g. Alomiear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 106. — Endl. 1838. Gen. n. 2257. p. 366; 1841. Ench. p. 233. — Meisn. 1838. Gen. p. 179 (124). — Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3812. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37: g. Ageratear.
Synon. Bidentis, Spilanthis sp. Linn.

Isocarpheia Rchb. 1841. Nomencl. p. 97. n. 3814. 1: sect. Coelestiniae.
= seq.

Isocarphoides DC. 1836. Prodr. V. p. 107: sect. Coelestinae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2258*a*. p. 367; 1841. Ench. p. 233.
Synon. Isocarpheia Rchb.

Isochilidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 181: sect. Epidendrear. Gen.: Isochilus, Hexisea, Diothonea, Gastropodium. *Cf.* Duchart. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 170.

Isochilos Spreng. vid. *seq.*

Isochilus R. Brown 1813 in Ait. h. kew. ed. sec. V. p. 209 (Verm. bot. Schr. II. p. 34): nov. g. Orchidear. (Cymbidium lineare W.) — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 21. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 734. n. 3019; 1831. Gen. II. p. 671. n. 3389 (*Isochilos*).
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 339. t. 78: g. Epidendrear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 328. — Lindl. 1826. Orch. scel. p. 16 (Linnaea II. p. 531); 1831. Orchid. p. 112. Subgen.: Elleanthus? — Rchb. 1828. Consp. p. 69. n. 1549; 1841. Nom. p. 52. n. 1970. (genuinar.) — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. — Endl. 1837. Gen. n. 1375. p. 193; 1841. Ench. p. 110. — Meisn. 1842. Gen. p. 371 (279). — Brongn. 1843. En. genr. p. 26. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 176.
Agdh. 1823. Aphor. p. 188: g. Mussulatar.
Ritg. 1731. Marb. II. p. 125 (*Izochilus*): g. Ceropagar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 181: g. Isochilidar.
Synon. Leptothrium Kunth (Steud.) Elleanthus Presl; Eleanthus Wittst.; Epidendri sp. Auct.

Isochoenus Lindl. vid. *Isoschoenus Nees.*

Isochoriste Miquel 1857. Fl. Ind. bat. II. p. 822: nov. g. Gendarussear. (I. javanica.)

Isocoma Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 320: nov. g. Chrysocomear., Lessingiae aff. (I. vernonioides.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 40. n. $2383/_1$: g. Solidaginear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 361. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Isodendrion A. Gray 1852. Proc. Amer. Ac. II. p. 224: nov. g. Violacear., Alsodeiae aff.

Isoderis Griseb. 1844. Spic. fl. Rumel. II. p. 276: sect. Barkhausiae. (Crepis scariosa Wahl., Cr. hispida Kit.)

Isodesmia Gardn. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 339: nov. g. Hedysarear. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 143. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.
Walp. 1846. Rep. V. p. 523: g. Euhedysarear.

Isodon „Schrad. mss.“ Benth. 1832. Labiat. p. 40; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 55: sect. Plectranthi. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 679. — Endl. 1838. Gen. n. 3575*e*. p. 609; 1841. Ench. p. 306. — Rchb. 1841. Nom. p. 106. n. 4159. 5. — Walp. 1845. Rep. III. p. 507. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 944.
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 162: g. Ocymoidear.

Isodontia G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 459: sect. Lycii. — Par. Walp. 1845. Rep. III. p. 108.
Synon. Lyciobatos Endl.

Isoëteae (Rich.?) Rchb. 1828. Consp. p. 43; 1830. Fl. exc. p. 5; 1837. Handb. p. 141; 1841. Nomencl. p. 31: fam. Limnobiar. Gen.: Isoëtes.
Bartl. 1830. Ord. p. 16: ordo Rhizocarpar. Gen. id.
Endl. 1836. Gen. p. 68; 1841. Ench. p. 46: ordo Selaginum. Gen. id. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 114; 1846. Chlor. prot. p. LIII. Gen.: Solenites, Isoëtites.
Meisn. 1843. Gen. p. 436 (338): subordo Rhizocarpear. Gen.: Isoëtes.
Koch 1845. Syn. III. p. 969: trib. Marsileacear. Gen. id.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 331: fam. Lycopodiacear. Gen. id.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 89: div. Lycopodiacear. Gen. id.
Gren. (& Godr. 1856. France III. p. 649: ordo Filicinear. Gen. id.

Isoëtes*) Linn. 1751. Amoen. acad. III. Ed. 1787. p. 25; 1753. Sp. II. p. 1100; 1759. Syst. ed. X. p. 1330. n. 1048; 1763. Sp. ed. II. p. 1563; 1764. Gen. ed. VI. p. 561. n. 1184; 1764. Ord. nat.; 1767. Syst. ed. XII. p. 697: g. Filicum. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 481. — Murr. 1774. Syst. p. 792; 1784. Syst. p. 942. — Reich. 1778.

*) Nomen ex Plinio 25, 13.

Isoëtes Linn. cont.
Gen. p. 557. n. 1301. — Gmel. 1791. Syst. p. 1322. — Gis. 1792. Prael. p. 594. — Pers. 1797. Syst. p. 982. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 49. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 253.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Muscor.

Adans. 1763. Fam. II. p. 469: g. Arorum.

Gled. 1764. Syst. p. 292. n. 1186: g. Filicinar. radicalium.

Scop. 1777. Intr. p. 65: g. Inundatar.

Wigg. 1780. Holsat. p. 74: g. Rhizospermar. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 111; 1827. Syst. IV. p. 9. n. 3212; 1831. Gen. II. p. 717. n. 3605. — Leman 1827. Dict. v. 45. p. 397. (?) — Ritg. 1831. Marb. II. p. 105.

Juss. 1789. Gen. p. 17: g. Filicibus aff.

Neck. 1790. El. III. p. 282. n. 1678 (*Isotes*): g. Catabophytor.

Schreb. 1791. Gen. II. p. 755. n. 1620: g. Miscellanear. — Par. Roth 1800. Germ. III. p. 25.

Hoffm. 1795. Crypt. p. 2: g. Radicalium.

Bernh. 1800 in Schrad. Journ. II. p. 134: g. Periaedoeatar.

Willd. 1802. Bem. Farrenkr.; 1810. Sp. V. p. 534. n. 1983: g. Hydropteridum.

Batsch 1802. Tab. p. 261: g. Rhizocarpar. — Par. Agdh. 1822. Aphor. p. 112.

DC. 1805. Franç. II. p. 576: g. Lycopodiacear. — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 23. — Schleid. 1843. Grdz. II. p. 80. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 6.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 35: g. Rhizocarpor.

Mirb. 1815. Élém. I. p. 385: g. Salviniear.

Wahlenb. 1815. Nov. Act. Ups. VII. p. 178: g. Tetradidymar.

Mart. 1817. Erlang. p. 9: g. Rhizopteridum. — Par. Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 2.

Tausch 1819. Flora II. p. 501.

Leman 1822. Dict. v. 24. p. 22: g. dubii ordinis.

Kaulf. 1824. En. Fil. p. 270: g. Marsileacear. — Par. Desv. 1827. Mém. soc. Linn. Par. VI. p. 179. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 73.

Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 686: g. Filicoidear. muscosar.

Delile 1827. Mém. Mus. XIV. p. 100. t. 6. 7.

DC. 1827. Organogr. II. p. 140. t. 56. 57.

Bisch. 1828. Crypt. p. 95. t. 9.

Rchb. 1828. Consp. p. 43. n. 753; 1830. Fl. exc. p. 5; 1841. Nom. p. 31. n. 1069: g. unicum Isoëtear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 16. — Endl. 1836. Gen. n. 693. p. 69; 1841. Ench. p. 46. — Meisn. 1843. Gen. p. 436 (338). — Koch 1845. Syn. III. p. 969. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 331. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 495. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 650.

Isoëtes Linn. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: g. Isoëtinear.

Link 1841. Fil. h. Berol. p. 7: g. Salviniacear.

A. Braun 1846. Flora Nr. 12. 13.

Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 125: g. Selaginellear.

Synon. Subularia Rai; Calamaria Dill.

Isoëtineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 67. 68: fam. Lycopodariear. Gen.: Isoëtes.

Isoëtites Münst. . . . . Beitr. V. p. 107. t. 4. f. 4.

Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 115; 1846. Chlor. prot. p. LIII: g. Isoëtear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 89.

Isoëtopsis Turczan. 1850. Bull. Mosc. XXIII. p. 75; 1851. ibid. I. p. 174: nov. g. Belliear. (monoicum: I. graminifolia.) — Par. Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 479. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 185.

Isoglossa Oersted 1855. Centralam. Acanth. p. 43 adnot.: nov. g. Acanthacear. (Rhytiglossae spec. cap.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 642.

Isogonium Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 90; 1843. Phycol. gener. p. 255; 1849. Spec. Alg. p. 367: sect. Oedogonii. — Par. Römer 1845. Alg. Deutschl. p. 23.

Isolepis R. Brown 1810. Prodr. I. p. 221. Ed. Nees p. 77: nov. g. Cyperacear. — Par. Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 3. 105. n. 176. — D. Don 1825. Nepal. p. 39. — C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 63. — Endl. 1833. Norf. p. 22. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 193. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 270.

Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 219; 1822. Syn. I. p. 150; 1837. Cyperogr. p. 187; 1838. Berol. II. p. 325: g. Scirpear. — Par. Lestib. 1819 Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 25 et Schult. Mant. II. p. 2.) — Agdh. 1823. Aphor. p. 142. — Presl fr. 1828 in Reliq. Hänk. I. p. . . . — Brongn. 1829 in Duperr. voy. Bot. p. 180; 1843. Én. genr. p. 12. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 290; 1835. ibid. X. p. 147; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 87; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 73. — Endl. 1837. Gen. n. 999. p. 118; 1841. Ench. p. 64. Sect.: Isolepis, Trichelostylis, Nemum. — Rchb. 1841. Nom. p. 41. n. 1478. Sect. eaed. et Heleogiton. — Meisn. 1842. Gen. p. 411 (314. 371). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 255. — Steud. 1855. Glum. II. p. 90. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 308.

Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 135: g. Scirpinar.

Gray 1821. Brit. pl. II. p. 78: g. Scirpidear.

Isolepis R. Brown cont.

Link 1821. En. I. p. 42: sect. Scirpi. — Par. Spreng. 1825. Syst. I. p. 206. — Dumort. 1827. Belg. p. 143. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 417; 1857. Abh. Gött. Ges. VII. p. 270. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 619. — Math. 1853. Belg. I. p. 577. — (Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 375.

Schrad. 1821. Gött. gel. Anz. p. 2068; 1832. Comm. Gott. VII. p. 114 (Analect. p. 14. t. 1): g. Cyperear.

Rchb. 1828. Consp. p. 57. n. 1117; 1829 ap. Mössl. III. p. 1806; 1830. Fl. exc. p. 75: g. Fimbristylear.

Bartl. 1830. Ord. p. 34: g. Cyperinar.

Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 88: g. Ficiniear.

Synon. Chamaeschoenus Ehrh.; Holoschoenus Link; Eleogiton Link.

Isolepis Bluff & Fing. 1825. Comp. I. p. 166: g. Triandr. Monogyn., varia complectens. = Scirpi, Heleocharidis, Holoschoeni sp.

Isolobus A. DC. 1839. Prodr. VII. 2. p. 352: nov. g. Lobeliear.

Endl. 1841. Spl. I. n. 3057*c*. p. 1391; 1841. Ench. p. 263: sect. Monopsidis.

Rchb. 1841. Nom. p. 102. n. 3983: g. Lysipomear.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 31: g. Lobeliacear.

Synon. Lobeliae sp. Auct.; Pratiae sp. G. Don; Monopsis et Rapuntii sp. Presl.

Isoloma J. Smith (1838 in Hook. & Bauer Gen. Fil. t. 102) 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 414; 1842. Lond. journ. bot. I. p. 421: nov. g. Lindsaear. (Lindsaea lanuginosa et divergens.) *Cf.* Bot. Zeit. 1843. p. 357.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.

Presl 1850. Epimel. bot. p. 461: g. Dicksoniear.

Fée 1852. Gen. Fil. p. 107: g. Lindsayear.

Isoloma Benth. 1846. Pl. Hartweg. p. 230: sect. Gesneriae. — Par. Walp. 1847. Rep. VI. p. 396.

Synon. Kohleria Regel 1848; Brachyloma Hanst.

Isoloma Basiner 1846. Bull. Ac. Pet. IV. p. 310: trib. Hedysari. Sect.: Eleutherotion, Gamotion.

Isolophus Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 112: nov. g. Polygalear. verar. (Polygala saxatilis Desf.)

Duch. 1849 in Orb. Dict. X. p. 381: p. 381: subg. Polygalae.

Isomeria Presl 1837 in E. Meyer Comm. pl. Afr. II. p. 293: sect. Cyphiae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3041*b*. p. 507; 1841. Ench. p. 261.

Isomeria Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 574: sect. Saxifragae. (S. Jamesii, Richardsonii, elata, ranunculifolia, etc.)

Isomeria Don mss

Vernoniae sect. Tephrodes DC.

Isomeris „Nuttall mss.“ Torrey & A. Gray 1838. Fl. North-Amer. I. p. 124: nov. g. Cleomear. (I. arborea.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4990. p. 891; 1841. Ench. p. 456. — Meisn. 1843. Comm. p. 342. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 358.

Rchb. 1841. Nom. p. 185. n. 7109: g. Corynandrear.

Isomerium R. Brown 1830. Fl. Nov. Holl. suppl. p. 11 (Verm. bot. Schr. V. p. 87): sect. Conospermi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2132*c*. p. 339; 1841. Ench. p. 215. — Rchb. 1841. Nom. p. 64. n. 2408. 3. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 526; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 324.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 401: g. Conospermear.

Isomisia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 82: subordo Polyspiae. Fam.: Polarnia, Caprifolia.

Isonandra*) Wight 1840. Ic. pl. Ind. II. 1. p. 4. t. 359. 360: nov. g. Sapotacear. (I. lanceolata et villosa.) — Par. A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 187. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 591. — Miq. 1852. Pl. Jungh. II. p. 201; 1857. Ind. bat. II. p. 1037.

Meisn. 1843. Comm. p. 364: g. Sapotear.

Synon. Sideroxyli sp. Wall.

Isonema R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 63 (Verm. bot. Schr. II. p. 400): nov. g. Apocynear. — Par. Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XXXIII. 401. n. 738.

Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3518; 1841. Nom. p. 133. n. 5153: g. Echitear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 204. — Endl. 1838. Gen. n. 3414. p. 584; 1841. Ench. p. 295. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. — Meisn. 1840. Gen. p. 264 (173). — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 415.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 78: g. Echitiear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.

Isonema Cassini 1817. Bull. soc. philom. p. 152; 1819. Dict. v. 15. p. 488; 1822. v. 24. p. 25; 1828. v. 57. p. 340; 1830. v. 60. p. 586: nov. g. Ethuliear. (Conyza chilensis Linn.?)

Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2215: g. Eupatorinar.

Bartl. 1830. Ord. p. 136: g. Vernoniear.

= Cyanopis Blume.

Isopappus Torrey & A. Gray 1841. Fl. North-Amer. II. p. 239: nov. g. Solidaginear. (Chrysopsis divaricata Nutt.) — — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 67. n. 2377/2. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710. — Walp. 1847. Rep. VI. p. 129.

Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Erigerear.

Synon. Heterothecae sp. DC.

Isopetaloidea DC. 1824. Prodr. I. p. 659; subdiv. Pelargii. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1169. n. 6408 *m β*.

= seq.

*) Nomen a staminibus omnibus perfectis.

Isopetaloides Endl. 1841. Ench. p. 620. n. 6048 *m* ♀: subsect. Pelargii.
Synon. Isopetaloidea DC.; Isopetalum, Cortusina, Eumorpha Eckl. & Zeyh.; Calliopsis Sweet; Geranii sp. Linn.

Isopetalum Sweet 1820. Geran. n. 126: g. Pelargoniear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 290; 1841. Nom. p. 201. n. 7661.
DC. 1824. Pr. I. p. 655: sect. Pelargonii. Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5278 *m.* — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 732. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 318. — Endl. 1840. Gen. n. 6048 *g.* p. 1168; 1841. Ench. p. 620.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: g. Geraniear.

Isopetalum Ecklon & Zeyh. 1835. Enum. pl. Afr. I. p. 76: g. Pelargoniear.
= Isopetaloides Endl.

Isophlis Rafin. 1810. Caratt. piant. Sicil. t. 20: g. Algar., teste Leman 1822. Dict. v. 24. p. 26.

Isophyllon Miquel 1844. Syst. Piperac. II. p. 501; 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 467; 1852 in Mart. Fl. Bras. fasc. XI. p. 55: sect. Artanthes. — Par. Endl. 1847. Spl. IV. p. 18. n. $1823/_{11}g$.

Isophyllon C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 628: sect. Junci. (I. bufonius, Gerardi, etc.)

Isophyllum Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 115: nov. g. Umbelliferar. (Bupleurum falcatum, etc.) — Par. Presl 1826. Sicul. I. p. XXI.
Dumort. 1827. Belg. p. 76: sect. Buplevri.
Rchb. 1828. Consp. p. 144. n. 3740 *d*: sect. Bupleuri.
= Bupleuri Tourn. pars.

Isophyllum Spach 1836. Hist. vég. phan. V. p. 432; 1836. Ann. sc. nat. 2e sér. V. p. 367: nov. g. Brathydinear. (I. Drummondii.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 308: g. Brathydear.
Endl. 1840. Gen. n. 5463 *b.* p. 1032; 1841. Ench. p. 539: sect. Ascyri.
Rchb. 1841. Nom. p. 210. n. 7990: g. Ascyrear.

Isoplexis Lindl. 1821. Digit. mon. p. 2. 25: sect. Digitalis. (An genus proprium?) *Cf.* Flora 1822. II. p. 504. — Par. Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1090; 1828. Consp. p. 124. n. 3198 *b.* — Endl. 1839. Gen. n. 3915 *b.* p. 678; 1841. Ench. p. 339.
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 3; 1846 in DC. Pr. X. p. 448; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 685: g. Digitalear. — Rchb. 1837. Hdb. p. 198. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 506: g. Scrophulariear.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4512: g. Cheloniear.
Webb . . . . Canar. III. p. 144: sect. Callianassae. (Digitalis canariensis L.)
Conf. Callianassa Webb.

Isopogon*) R. Brown 1809. Linn. Trans. X. (1811) p. 70 (Verm. bot. Schr. II. p. 134); 1810. Prodr. I. p. 365. Ed. Nees p. 221: nov. g. Proteacear. (Protea anethifolia Sal., etc.) — Par. Knight & Salisb. 1809. Prot. p. 93. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 21. 339. n. 526. — Link 1821. En. I. p. 111. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 26. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 460. n. 499; 1830. Gen. I. p. 102. n. 509. (Tetrandr. Monogyn.) — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 513. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 503. (II. p. 247.)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 332: g. Ceclismenar. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 236.
Rchb. 1828. Consp. p. 81. n. 1741; 1841. Nom. p. 63. n. 2379: g. Proteear. (genuinar.) Sect. (1841): Isopogon, Hypsanthus. — Par. Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 276.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Protear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 121.
Endl. 1838. Gen. n. 2122. p. 337; 1841. Ench. p. 115; 1847. Spl. IV. p. 76: g. Proteinar. Sect.: Eustrobilus, Hypsanthus.
Meisn. 1841. Gen. p. 331 (244): g. Proteinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Proteidar.
Synon. Atyli sp. Salisb.

Isopterideae Klotzsch Begon. p. 136: vid. *Isopterygeae.*

Isopterides Kunth 1825. Syn. IV. p. 214: sect. Begoniae. (B. umbellata, ferruginea.)

Isopteris Wallich 1831. Catal. n. 7261.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 28: inter genera nondum descripta.

Isopterygeae Klotzsch 1855. Begon. (Abh. Berl. Ak. f. 1854) p. 246: trib. Gymnocarpear. Gen: Casparya, Stibadotheca, Isopteryx, Sassea, Putzeysia.

Isopteryx Klotzsch 1855. Begon. p. 251: nov. g. Isopterygear. (Begonia umbellata HBK.)

Isopyreae Rchb. 1827 in Mössl. Handb. I. p. LX: subdiv. Helleborear. Gen.: Thalictrum; Isopyrum, Coptis, Cimicifuga, Actaea. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 744. Sect.: Caltheae, Helleborinae, Aquileginae, Nigellariae. — Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. Gen.: Leptopyrum, Enemion, Isopyrum, Aquilegia.

Isopyrineae Spach 1839. Hist. vég. phan. VII. p. 291. 326: sect. Helleborear. Gen.: Isopyrum, Leptopyrum, Enemion, Aquilegia.

Isopyrum**) Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 245. n. 533: g. Polyandr. Digyn.
Linn. 1748. Ups. p. 157; 1753. Sp. I. p. 557; 1759. Syst. ed. X. p. 378. n. 955; 1762. Sp. ed. II. p. 783; 1764. Gen. ed. VI. p. 282. n. 701; 1767. Syst. ed. XII.

---

*) ἴσος et πώγων: ob nuces undique aequaliter barbatas.

**) Nomen ex Dioscoride et Plinio.

Isopyrum Linn. cont.
p. 380: g. Polyandr. Polygyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 401. — Murr. 1774. Syst. p. 431; 1784. Syst. p. 518. — Reich. 1778. Gen. p. 287. n. 759. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 1088. n. 621. — Gmel. 1791. Syst. p. 881. — Pers. 1797. Syst. p. 556; 1807. Ench. II. p. 106. n. 1365. — Willd. 1799. Sp. II. p. 1334. n. 1088; 1809. En. p. 591.

Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 121. n. 497: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 312.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Multisiliquar. — Par. Crantz 1769. Stirp. Austr. p. 135. — Gis. 1792. Prael. p. 376.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Ranunculor.

Gmel. 1769. Sibir. IV. p. 191: g. Polyantherar.

Hill 1769. Ht. kew. p. 343: g. Pentapetalar. incompletar.

Scop. 1777. Intr. p. 260: g. Polycarpiar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 312. t. 65. f. 5 (*fumarioides*).

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 214; 1789. Phil. Bot. I. p. 62.

Juss. 1789. Gen. p. 233: g. Ranunculacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. III. p. 60. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 28. — Link 1822. En. II. p. 98. — Gaud. 1828. Helv. III. p. 422. 561. — C. A. Meyer 1830 in Ledeb. Alt. II. p. 298. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 4. 35.

Neck. 1790. El. II. p. 290. n. 1055: g. Synathrophytor.

Batsch 1802. Tab. p. 46; g. Multisiliquosar.

Cram. 1803. Disp. p. 138: in Polyandr. Monogyn.

Salisb. . . . . Linn. Trans. VIII. p. 306.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 490: g. Ranunculear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 734 (desciso.); 1825. Syst. II. p. 469. n. 1811; 1830. Gen. I. p. 401. n. 2013.

DC. 1818. Syst. I. p. 323; 1824. Pr. I p. 48: g. Helleborear. — Par. Dumort. 1827. Belg. p. 129; 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 254. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 47. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Koch 1836. Syn. p. 20. Ed. II. p. 22. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (4). — Endl. 1839. Gen. n. 4790. p. 848; 1841. Ench. p. 435. Sect.: Olfa, Leptopyrum. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 660. Sect.: Enemion. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 53. — Brongn. 1843. En. genr. p. 97. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 317. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428. — Gren. (& Godr.) 1848. France I. p. 42. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 42. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 26.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX: g. Isopyrear.

Link 1831. Hdb. II. p. 386: g. Aconitear.
Synon. Olfa Adans.; Gontarella Gilib. (Steud.)

Isopyrum „Diosc." Adans. 1763. Fam. II. p. 460: g. Ranunculor.
= Hepatica Dill.

Isopyrum A. Rich. 1826. Dict. class. IX. p. 34.
= Leptopyrum Rchb.

Isopyrum Rchb. 1828. Consp. p. 192. n. 4955: g. restrict. Helleborear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 747: g. Aquileginar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 277; 1841. Nom. p. 191. n. 7241: g. Isopyrear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 326: g. Isopyrinear.
= Olfa Adans.

Isora*) Plumier 1703. Gen. p. 24. t. 37. Adans. 1763. Fam. II. p. 382: g. Tiliar.
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 31: g. Euhelicterear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 29 (25).
Rchb. 1837. Hdb. p. 294: g. Isorear.
Endl. 1840. Gen. n. 5316*b*. p. 992; 1841. Ench. p. 515: sect. Helicteris. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 203. n. 7735. 2. — Walp. 1842. Rep. I. p. 334.
Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 308: g. Sterculiacear.

Isoreae Rchb. 1837. Handb. p. 294: subdiv. Helicterear. Gen.: Helicteres, Isora, Methoricum, Alicteres, Orthothecium.

Isoschoenus Nees 1841. Ann. nat. hist. VI. p. 49: nov. g. Cyperacear. (Schoenus acuminatus R. Br.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 10. n. 978/2: g. Schoenoidear.
Meisn. 1843. Comm. p. 371: g. Rhynchosporear. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 908. — Steud. 1855. Glum. II. p. 167.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119 (*Isochoenus*): g. Schoenidar.

Isostigma Lessing 1831. Linnaea VI. p. 513: nov. g. Helianthear. (I. simplicifolium.)
Less. 1832. Syn. p. 235: g. Verbesinear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 634. — Endl. 1838. Gen. n. 2570. p. 418; 1841. Ench. p. 239. — Meisn. 1839. Gen. p. 200 (130). — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3176. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19: g. Coreopsidear.

Isostoma Dietr. vid. *Isotoma R. Brown.*

Isostylis R. Brown 1810. Prodr. I. p. 396. Ed. Nees p. 252: sect. Banksiae. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 443. — Endl. 1838. Gen. n. 2157*b*. p. 343; 1841. Ench. p. 216. — Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2388. 2. — Meisn. 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 589; 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 466.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Banksiear.

Isostylis A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 90: sect. Badulae. (B. caribaea.)

---

*) Nomen indicum.

Isotachis Mitten 1855 in Hook. f. Fl. New-Zeal. II. p. 148. t. 100. f. 7: nov. g. Hepaticar. foliosar. (I. Lyallii et subtrifida.)

Isotes Necker vid. *Isoetës Linn.*

Isothea E. Meyer 1835. Comm. pl. Afr. I. p. 17: sect. Priestleyae. — Par. Walp. 1839. Linnaea XIII. p. 469. — Endl. 1840. Gen. n. 6464 *a*. p. 1261; 1841. Ench. p. 667. — Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 444.

Synon. Eisothea DC.; Priestleya Eckl. & Zeyh.; Borboniae et Lipariae sp. Thunb.

Isothea Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 421: nov. g. Phyllosticteor. (I. rhytismoides.)

Isotheciaceae Spruce 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 285: trib. Pleurocarpar. Gen.: Climacium, Isothecium, Leskea.

Isothecium Brid. 1827. Bryol. II. p. 355: nov. g. Pleurocarpor. peristomor. (Hypnum myosuroides.)

Brid. 1827 Bryol. II. p. XLV: g. Leskiar.

Rchb. 1828. Consp. p. 33. n. 576: g. Leskeaceor.

Hüb. 1833. Muscol. germ. p. 596: g. Pleurocarpor. (diploperistomor.) — Par. Mont. 1842. Pl. cell. Cub. p. 526.

Endl. 1836. Gen. n. 573. p. 55; 1841. Ench. p. 32: g. Bryacear.

Genth 1836. Nass. I. p. 270: g. Hypnoideor.

Rchb. 1841. Nom. p. 26. n. 951: g. Calyptrobryor.

Mont. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 399: g. Hypnear.

Bayrh. 1849. Taun. p. 26: g. Hypnacear. — Par. Bruch, Schimp. & Gümb. 1851. Bryol. eur. V. (Fasc. 46. 47.)

Spruce 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 286: g. Isotheciacear. — Par. Wils. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 104. Sect.: Isothecium, Hypnodendron.

Isothecium C. Müll. 1857. Syn. Musc. II. p. 356: subsect. Mallacodii restricta.

Isotoma R. Brown 1810. Prodr. I. p. 565. Ed. Nees p. 421: sect. Lobeliae. (L. hypocrateriformis.)

Lindl. 1826. Bot. Regist. XII. t. 964.

Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2789: g. Lobeliacear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Bartl. 1830. Ord. p. 151. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 716. — Brongn. 1843. En. genr. p. 31.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 167. n. 839: g. Lobeliear. — Par. Presl 1836. Prodr. Lobel. p. 42. — Rchb. 1837. Hdb. p. 186; 1841. Nom. p. 102. n. 3994. Sect. (1841) ex A. DC. — Meisn. 1839. Gen. p. 240 (148). — A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 412. Sect.: Euisotoma, Solenanthis. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 737 *(Isostoma)*. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 572.

Endl. 1838. Gen. n. 3060 *c*. p. 512; 1841. Ench. p. 264: sect. Laurentiae.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Lobelear.

Isotrema Rafin. 1819. Journ. Phys. LXXXIX. p. 102: nov. g. ab Aristolochia separatum. (A. sipho et tripteris Fl. Ludov., forsan omnes species perigonio trifido.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 560: g. Aristolochiear.

Synon. Siphisia Rafin.; Hocquartia Dumort.; Sipho Endl.; Siphonolochia Rchb.

Isotria Rafin. 1808. New-York med. rep. V. p. 356; 1808 in Desv. journ. bot. I. p. 220: g. Orchidear. *Cf.* Rafin. in Journ. Phys. LXXXIX. p. 261 et Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 30. — Par. Lindl. 1826. Orch. scel. p. 19 (Linnaea II. p. 532) dubium. — Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1585.

= Pogonia Juss.

Isotrichia DC. 1836. Prodr. V. p. 82: sect. Albertiniae. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2224 *b*. p. 361; 1841. Ench. p. 232. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3859. 2. — Gardn. 1846. Lond. journ. bot. V. p. 236.

Synon. Eremanthus Less.

Isotropis Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 28; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 70: nov. g. Eupodalyriear. (I. striata). — Par. Endl. 1840 Gen. n. 6429. p. 1256; 1841. Ench. p. 667. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 31. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553.

Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5922: g. Podaliriear.

Meisn. 1843. Comm. p. 349: g. Sophorear.

Synon. Callistachya Smith.

Isotypus HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 11. t. 307: nov. g. Onoseridar. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 357.

Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 30: g. Mutisiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 190. n. 2254. — Bartl. 1830. Ord. p. 137. — Less. 1830. Linnaea V. p. 261. 345; 1832. Syn. p. 120. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 35.

Cass. 1824. Dict. v. 33. p. 464; 1830. v. 60. p. 584: g. Gerberiear.

DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 33: g. Eumutisiear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2926. p. 486; 1841. Ench. p. 248. — Meisn. 1839. Gen. p. 229. (141).

Rchb. 1841. Nom. p. 97. n. 3786: g. Chuquiragear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714: g. Barnadesiear.

Synon. Seris Willd.; Hilairia DC.; Schätzellia Kl.; Cataleuca Hort. Belg.

Isquierda Willd. 1805. Spec. IV. p. 1115. n. 1914: g. Polygam. Dioec.

Pers. 1807. Ench. II. p. 612. n. 2199: g. Dioec. Tetrandr.

Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 17. 305. n. 507: g. Tetrandr. Monogyn.

= Izquierdia Ruiz & Pav.

Isquierdia Poir. vid. *praeced.*

Isthmia*) Agardh 1832. Consp. Diatom. p. 55: nov. g. Diatomear. — Par. Menegh. 1840. Linnaea XIV. p. 204. — Trevis. 1842. Prosp. fl. Eugan. (Flora 1843. p. 467.) — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 23.
Kütz. 1833. Linnaea VIII. p. 579: g. Diatomacear. liberar.
Endl. 1836. Gen. n. 7. p. 2; 1841. Ench. p. 2: g. Frustuliear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 637.
Harv. 1838. Gen. South-Afr. pl. p. 407; 1841. Brit. Alg. p. 200: g. Fragilariear.
Ehrenb. 1838. Infus. p. 209.
Kütz. 1844. Bacill. p. 137. t. 19; 1845. Phyc. germ. p. 115; 1849. Sp. Alg. p. 135. n. 91: g. Biddulphiear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 13: g. Cymbellear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 96: g. Eubiddulphiear.
Synon. Confervae sp. E. B.; Diatomae sp. Agdh.; Biddulphiae sp. Gray.

Isthmosira Kütz. 1845. Phycol. germ. p. 140; 1849. Spec. Alg. p. 188. n. 139: g. Desmidiear.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 56: sect. Tessararthrae.
Synon. Sphaerozosma Ralfs; Tessararthrae sp. Ehrenb.

Isthmovicia Rchb. 1841. Nomencl. p. 148. n. 5771. 2: sect. Viciae.
= Vicioides Mönch.

Itea**) „Gronov." Linn. 1742. Gen. ed. II. p. 85. n. 198; 1753. Sp. I. p. 199; 1759. Syst. ed. X. p. 940. n. 243; 1762. Sp. ed. II. p. 289; 1764. Gen. ed. VI. p. 109. n. 275; 1767. Syst. ed. XII. p. 183. n. 273: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Gron. 1743. Fl. Virg. I. p. 143. — Murr. 1774. Syst. p. 200; 1784. Syst. p. 241. — Reich. 1778. Gen. p. 112. n. 295. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 150. n. 381. — Swartz 1791. Obs. bot. p. 93. (Char. corr.) — Gmel. 1791. Syst. p. 411. — Pers. 1797. Syst. p. 252; 1805. Ench. I. p. 175. n. 405. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1146. n. 433; 1809. En. p. 261. — Michx. 1803. Fl. am. I. p. 156. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 144. — Roxb. 1824. Ind. ed. Wall. II. p. 418; ed. 1832. I. p. 632. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 193. n. 974. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 848.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125: g. Thalamostemonum.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Sempervivar.
Gled. 1764. Syst. p. 264. n. 1091: g. Calycostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 210: g. Dumosar.
Juss. 1789. Gen. p. 159: g. Rhododendror.
Neck. 1790. El. II. p. 112. n. 780. g. Plyrontophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 457: g. Rhodoracear. — Par. St. Hil. 1805. Exp. I. p. 355. — Hedw. 1806. Gen. p. 165. n. 697.

Itea Gronov. cont.
Batsch 1802. Tab. p. 215: g. Rhodoidear.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 142. t. 209.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 511: g. Rhododendrear.
Juss. 1818. Dict. v. 12. p. 223: g. Cunoniacear. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 36. — Rchb. 1828. Consp. p. 159. n. 4215. — Bartl. 1830. Ord. p. 313 (desciscens).
Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXI. 408. n. 981: g. Saxifragar.
Link 1821. En. I. p. 235: g. Rhamnoidear.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 794. n. 886: g. Ericear. (?) — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 15. p. 863.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37: g. Escalloniacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 752.
DC. 1830. Pr. IV. p. 6: g. Escalloniear. — Par Hook. & Arn. 1833. Bot. Beech. voy. Pt. 4. p. 189. t. 39. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 34. — Rchb. 1837. Hdb. p. 233; 1841. Nom. p. 160. n. 6253. — Meisn. 1838. Gen. p. 137 (101). — Endl. 1839. Gen. n. 4677. p. 822; 1841. Ench. p. 410. — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 590. — Brongn. 1843. En. genr. p. 108.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 196: g. Escallonear.
Synon. Diconangia Mitch.; Cedrela Lour.; Pseuditea Hassk.?

Itea Andrews.... Botan. repos. t. 314.
= Bursaria Cavan. (DC. Pr. I. p. 347.)

Iteadaphne Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 23. p. 365: nov. g. Tetrantherear. (Polyadenia subumbelliflora Nees.)
Miq. 1857. Ind. bot. I. p. 963: sect. Polyadeniae.

Iteoideae Leunis 1849. Schul-Naturg. II. p. 174: ordo (39) Monochlamydear. Fam.: Salicinae, Balsamifluae.

Ithyphallus Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 675: nov. g. Lytothecear. (Phallus caninus Pers.)
Fries 1823. Syst. myc. II. p. 282: trib. Phalli.
Synon. Ityphallus Fries; Phallus Nees.

Ittnera*) Gmel. 1808. Fl. Bad. III. p. 578. 590. t. 4: nov. g. Monoec. Monandr. (Najas monosperma et Caulinia fragilis.)
Cf. Leman 1822. Dict. v. 24. p. 29.
= Caulinia Willd.

Ityphallus**) Fries 1823. Syst. mycol. II. p. 283: trib. Phalli.
Endl. 1836. Gen. n. 358 *d.* p. 31; 1841. Ench. p. 18: sect. Phalli. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 10. n. 413. 4.
Ithyphallus Gray.

Iuga Rchb. vid. *Inga.*

---

*) ἰσθμός, faux, collum.

**) Nomen ex Dioscoride, ubi Salix esse videtur.

*) Dicat. F. de Ittner, curatori Academiae Freyburgensis.

**) ἴτυς, scutum, circumferentia.

Iva*) „Riv." Rupp. 1718. Fl. jen. p. 214. Ed. Hall. 1745. p. 219: g. pl. class. IX.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 102. t. 3: g. herbae Verticillatae.
— Ajugae sp. Benth.

Iva Linn. 1748. Upsal. p. 285; 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1757. p. 25; 1753. Sp. II. p. 988; 1759. Syst. ed. X. p. 1268. n. 940; 1763. Sp. ed. II. p. 1402; 1764. Gen. ed. VI. p. 490. n. 1059; 1767. Syst. ed. XII. p. 624: g. Monoec. Pentandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 712; 1784. Syst. p. 853. — Reich. 1778. Gen. p. 486. n. 1155. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 637. n. 1429. — Pers. 1797. Syst. p. 897. — Michx. 1803. Fl. am. II. p. 184.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Nucamentacear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 540.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Corymbiferar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 190. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 553. — Batsch 1802. Tab. p. 254. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 430. (anomalar.)
Gled. 1764. Syst. p. 191. n. 795: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 569.
Hill 1769. Ht. kew. p. 385: g. Pentaphyllar.
Scop. 1777. Intr. p. 135: g. Flosculosar.
Neck. 1790. El. I. p. 91. n. 165: g. Siphoniphytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 394. t. 164: g. Tubulosar.
Gmel. 1791. Syst. p. 463: g. Pentandr. Digyn.
Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2386. n. 1568; 1809. En. p. 940: g. Syngenes. Frustran. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 497. n. 1954.
Nutt. 1818. Gen. II. p. 185: g. Syngenes. Polygam. Necessar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 576; 1826. Syst. III. p. 620. n. 2859; 1831. Gen. II. p. 641. n. 3217: g. Radiatar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 276: g. Helianthear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 502. — Bartl. 1830. Ord. p. 141.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 89: g. Ambrosidiae.
Link 1822. En. II. p. 366: g. Ambrosiacear.
Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 43; 1830. v. 60. p. 578: g. Ambrosiear. (1830 spuriar.) — Par. Less. 1830. Linnaea V. p. 151; 1832. Syn. p. 219. — Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 309. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22.
Cass. 1823. Dict. v. 29. p. 176; 1830. v. 60. p. 578: g. Ivear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 529. — Endl. 1838. Gen. n. 2485. p. 404; 1841. Ench. p. 237. — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 346. Subg.: Picrotus. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 286. Sect. nova: Monachaena. — Rchb. 1841. Nom. p. 100. n. 3917. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

*) Nomen a voce antiqua abiga seu ibiga (Ruell.)

Iva Linn. cont.
Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2740: g. Ivacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 79: g. Anthemidear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 43: g. Melampodiear.
Synon. Denira Adans.; Tarchonanthi sp. Vaill.; Parthenii sp. Linn. 1737.

Ivaceae Rchb. 1828. Consp. p. 112: subdiv. Ambrosiacear. Gen.: Iva.

Iveae Cassini 1823. Dict. v. 29. p. 175; 1830. v. 60. p. 578: div. Ambrosiear. Gen.: Clibadium? (1830 exclusum), Iva.
DC. 1836. Pr. V. p. 527: div. Melampodinear. Gen.: Pinillosia, Tetranthus, Iva, Euphrosyne. — Par. Endl. 1838. Gen. p. 403; 1841. Ench. p. 237. Gen. ead. — Meisn. 1839. Gen. p. 198 (130). Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 100: subdiv. Dispositar. Gen. ut DC. (Euphrosinia loco Euphrosynes.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711: subtrib. Senecionidear. Gen. ut DC. et Gymnogyne.

Ivira*) Aublet 1775. Guian. II. p. 694. t. 279: nov. g. Monadelph. Decandr. (I. pruriens.)
Scop. 1777. Intr. p. 249: g. Polycarpiar.
Schott & Endl. 1832. Melet. p. 32: subsect. Sterculiae. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5320 *a β*. p. 994; 1841. Ench. p. 516. — Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7699. 1 *b*. — Simil. Endl. 1850. Spl. V. p. 60. n. 5319 *c*. Subsect.: Euivira, Southwellia.
Synon. Theodoria Neck.

Ivonia Vell. Flor. Flum. III. t. 4: g. Pentandr. Monogyn. (I. amplexicaulis) ex Steud. Nom. I. p. 840.
Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 29: inter genera nondum descripta.

Ixalum Forst. herb. ex Steud. Nomencl. I. p. 840; II. p. 623. (I. inerme.)
= Spinifex Linn. (hirsutus.)

Ixanthus**) Griseb. 1839. Gen. et sp. Gent. p. 129: nov. g. Chlorear. (Gentiana viscosa Ait.) — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 260 (169).
Endl. 1841. Spl. I. n. $3540/_1$. p. 1399; 1841. Ench. p. 302: g. Chironiear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 54.
Griseb. 1845 in DC. Pr. IX. p. 69: g. Erythraeacear.
Lindl 1847. Veg. kd. p. 614: g. Gentianear.

Ixauchenus Cassini 1828. Dict. v. 56. p. 176; 1830. v. 60. p. 582: nov. g. Bellidear. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 308. — Endl. 1838. Gen. n. 2352. p. 381; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 186 (126). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31. — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3245. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951 (*Ixiauchenus*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Less. 1832. Syn. p. 193 (*Ixiauchenus*): g. Asterear.

*) *Ivira* nomen caribaeum.
**) ἰξός, gluten.

Ixerba*) A. Cunningh. 1839. Ann. nat. hist. III. Jun. p. 249: nov. g. inter Brexiaceas et Celastrineas intermedium. (I. brexioides.)
Endl. 1841. Spl. I. n. 4681/1. p. 1417: 1841. Ench. p. 412: g. Brexiacear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 348. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 573. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 81.
Rchb. 1841. Nom. p. 136. n. 5272: g. Brexiear.

Ixeris Cassini 1821. Bull. soc. philom. p. 173; 1822. Dict. v. 24. p. 49: subg. Taraxaci.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 62; 1830. v. 60. p. 568: g. Crepidear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6.
Rchb. 1828. Consp. p. 98. n. 2162c: g. Scorzonerear.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Lactucear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 136. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 151. — Endl. 1838. Gen. n. 3012. p. 499; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 236 (144). — Rchb. 1841. Nom. p. 95. n. 3701. (genuinar.) — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 817. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Turczan. 1848. Bull. soc. Mosc. XXI. 2. p. 103.
Synon. Chondrillae sp. Wall.

Ixia*) Linn. 1737. Coroll. p. 1. n. 938; 1737. Cliff. p. 490; 1740. Syst. p. 17; 1742. Gen. ed. II. p. 21. n. 46; 1748. Ups. p. 16; 1753. Sp. I. p. 36; 1759. Syst. ed. X. p. 862. n. 64; 1762. Sp. ed. II. p. 51; 1764. Gen. ed. VI. p. 26. n. 56; 1767. Syst. ed. XII. p. 75: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 75; 1784. Syst. p. 83. — Reich. 1778. Gen. p. 27. n. 62. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 35. n. 76. — Lour. 1790. Coch. I. p. 36. — Gmel. 1791. Syst. p. 108. — Thunb. 1794. Prodr. I. p. 9; 1818. Fl. cap. I. p. 216. — Pers. 1797. Syst. p. 85; 1805. Ench. I. p. 47. n. 102. — Willd. 1797. Sp. I. p. 195. n. 93; 1809. En. p. 55. — Vahl 1806. Enum. II. p. 49. n. 97. — Schrad. 1806. Fl. germ. I. p. 100. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 22.
Gled. 1749. Berl. V. p. 124; 1764. Syst. p. 9. n. 31: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 27; 1764. Ord. nat.: g. Ensatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 170. — Batsch 1802. Tab. p. 143. — Gawl. 1805 in Kon. Ann. bot. I. p. 226. Sejunguntur Trichonema, Geissorhiza, Hesperantha, Sparaxis.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Iridum. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 58.
Scop. 1777. Intr. p. 88: g. Liliacear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 40. t. 13. f. 3 (chinensis).

Ixia Linn. cont.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 319. *Cf. Belemcanda Rheede.*
Neck. 1790. El. III. p. 167. n. 1518: g. Ymnodiphytor.
Wendl. 1798. Bot. Beob. p. 4. t. 1. f. 1—3.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 192: g. Iridear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 146. — DC. 1805. Franç. III. p. 240. — Hedw. 1806. Gen. p. 25. 354. Sect.: Romulea, Euridice, Belemcanda. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 341. 371. n. 125. — Link 1821. En. I. p. 49; 1829. Hdb. I. p. 220. — Lois. 1822. Dict. v. 24. p. 51. — Schrank 1822. Denkschr. Regensb. Ges. II. p. . . . (verar.) — Agdh 1823. Aphor. p. 172. — Bartl. 1830. Ord. p. 45. — Endl. 1837. Gen. n. 1243. p. 169; 1841. Ench. p. 98. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 152. — Meisn. 1842. Gen. p. 392 (294). — Brongn. 1843. En. genr. p. 23. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 132.
Mönch 1802. Meth. Suppl. p. 213: g. Petalostemonis. Sejungitur Belemcanda.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 321: g. Gladiolear. Distinguuntur Dichone, Gissorhiza, Rochea, Acaste.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 252; 1825. Syst. I. p. 156. n. 158; 1830. Gen. I. p. 38. n. 166: g. Spathacear.
Ker . . . . Botan. Regist. 530. Char. emend. *Cf.* Schult. 1827. Mant. II. Add. p. 389 not.
Eckl. 1827. Verz. p. 24: g. Ixiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1204; 1841. Nom. p. 44. n. 1591: g. Ixiear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 87.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 128: g. Crocear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 161: g. Iridacear.
Synon. Morphixia Ker?; Hyalis Salisb.; Eurydice Pers.; Agretta Eckl.

Ixiaceae Ecklon 1827. Verzeichn. p. 18: ordo Ensatar. Gen.: Romulea, Geissorhiza, Weihea, Hesperantha, Agretta, Ixia, Sparaxis, Tritonia, Freesea, Lapeyrousia, Diasia.

Ixiales Lindl. 1833. Nix. plant. p. 33: nixus Epigynar. Ordo: Irideae.

Ixianthes Benth. 1836. Bot. Mag. Comp. II. p. 53: nov. g. Digitalear. (I. retzioides.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3913. p. 677; 1841. Ench. p. 339. — Meisn. 1840. Gen. p. 308 (219). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 268. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 506. — Walp. 1845. Rep. III. p. 251. 961.
Rchb. 1841. Nom. p. 116. n. 4510 (*Ixianthus*): g. Chelonicar.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 335; 1847 in Lindl. Veg. kd. p. 684: g. Chelonear.

Ixianthus „E. Mey." Rchb. vid. *Ixianthes Benth.*

Ixiauchenus Less., Schultz Bip. vid. *Ixauchenus Cass.*

---

*) Anagramma nominis Brexiae.
**) Genus herbae Plin. 22. [illegible], i. e. a visco, quod circa radicem ejus invenitur.

Ixieae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 137: trib. Iridear. Gen.: Crocus. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58. Gen.: Ixia, Babiana, Aristea, Witsenia, Hesperantha, Anomatheca, Geissorhiza, Sparaxis, Diasia, Trichonema. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 4. Gen.: Ixia, Diasia, Hesperantha, Geissorhiza, Sparaxis, Babiana, Anomatheca, Ovieda, Witsenia, Sophronia, Aristea, Trichonema.

Rchb. 1828. Consp. p. 60; 1830. Fl. exc. p. 83; 1837. Hdb. p. 150: div. Iridear. Gen.: Galaxia, Crocus, Tapeinia, Trichonema, Geissorrhiza, Ixia, Hesperantha, Aristea, Genlisia, Belemcanda, Ixiolirion? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 44. Gen.: Crociris, Crocus, Trichonema, Geissorrhiza, Hesperantha, Ixia, Phyganthus.

Ixine Hill 1769. Hort. kew. p. 61: nov. g. Associatar. (Carduus tuberosus et Casabonae.)
= Cirsium Tourn.

Ixiochlamys F. Müll. & Sond. 1852. Linnaea XXV. p. 466: g. Euasterear. (Podocoma cuneifolia R. Br.)

Ixiolaena Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 66: nov. g. Helichrysear. (I. viscosa.) — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 161. — Endl. 1838. Gen. n. 2734. p. 445; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 219 (136). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3497. — Steetz 1845 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 458. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.

Fenzl 1839. Flora II. p. 727: g. Eugnaphaliear.

Spach 1841. Vég. phan. X. p. 26: g. Gnaphaliear.

Ixiolirion „Fisch. mss." Herbert 1821. Append. p. 18: nov. g. Amaryllidear. (Amaryllis montana Labill.) — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XLII. 752. (?) — Endl. 1837. Gen. n. 1293. p. 180; 1841. Ench. p. 104. (anomalar.) — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 406. (anomalar.) — Ledeb. 1853. Ross. IV. p. 116. (anomalar.)

Rchb. 1828. Consp. p. 60. n. 1209: g. Ixiear.?

Herb. 1837. Amaryll. p. 68. 125: g. Agavear.

Rchb. 1841. Nom. p. 48. n. 1764: g. Alströmeriear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 393 (295). — Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 19. 246. — Kunth 1850. Enum. V. p. 816. (anomalar.)

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 158: g. Amaryllear.

Ixionantheae Planchon 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 29: fam. Ochnaceis aff. Gen.: Ixionanthes, Ochthocosmus.

Klotzsch 1857. Abh. Berl. Ak. f. 1856. p. 235: ordo Erythroxyleis aff. Novum gen.: Phyllocosmus.
= Ixonantheae Endl.

Ixionanthes Endl. 1840. Gen. n. 5557. p. 1055; 1841. Ench. p. 553: g. Cedrelear. (dubium.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 213. n. 8093.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397: g. Ternströmiacear.

Planch. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 29: g. Ixionanthear.

Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 351 *(Ixionanthus)*: g. Camelliear.
= Ixonanthes Jack.

Ixionanthus Müll. vid. *praeced.*

Ixochiron*) Griseb. 1845 in DC. Prodr. IX. p. 40: sect. Chironiae.

Ixodia R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 517 (Verm. bot. Schr. II. p. 442): nov. g. Synantherear. (I. achilleaoides.)

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 547; 1826. Syst. III. p. 457. n. 2714; 1831. Gen. II. p. 617. n. 3059: g. Eupatorinar.

Link 1822. En. II. p. 311: g. Corymbiferar.

Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 562; 1822. v. 24. p. 56: g. Gnaphaliear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2423. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 203. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 39.

Cass. 1827. Dict. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Cassiniear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 272. — DC. 1837. Pr. VI. p. 153. — Endl. 1838. Gen. n. 2724. p. 443; 1841. Ench. p. 242. — Meisn. 1839. Gen. p. 217 (137). — Rchb. 1841. Nom. p. 90. n. 3510. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.

Bartl. 1830. Ord. p. 140: g. Inulear.

Fenzl 1839. Flora II. p. 730: g. Ammobiear.

Ixodia Soland. mss.
= Brasenia Schreb.

Ixonantheae Endl. 1850. Gen. Suppl. V. p. 67: div. Laplacear. Gen.: Ixonanthes, Ochthocosmus.
Synon. Ixionantheae Planch.

Ixonanthes Jack (Malay. Misc.) 1835 in Hook. Bot. Mag. Comp. I. p. 154: nov. g. plantar. (I. reticulata et icosandra.)

Meisn. 1843. Comm. p. 345: g. Cedrelear.?

Römer 1846. Fam. nat. I. p. 131. 140: g. Cedrelaceis aff. Sejungitur Brewstera.

Endl. 1850. Spl. V. p. 67. n. $5422/_2$: g. Ixonanthear.
Synon. Emmenanthus Arn.; Pierotia Blume; Ixionanthes Endl.; Ixionanthus Müll.; Brewstera Röm.

Ixora**) Linn. 1737. Gen. p. 27. n. 73; 1740. Syst. p. 18; 1753. Sp. I. p. 110; 1759. Syst. ed. X. p. 893. n. 122; 1762. Sp. ed. II. p. 159; 1764. Gen. ed. VI. p. 54. n. 131; 1767. Syst. ed. XII. p. 120: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Jacq. 1763. Amer. p. 16. t. 77. f. 8. — Murr. 1774. Syst. p. 129; 1784. Syst. p. 152. — Reich. 1778. Gen. p. 55. n. 137. — Schreb. 1789.

---

*) ἰξός, gluten.

**) Nomen idoli Malabarici.

Ixora Linn. cont.
Gen. I. p. 70. n. 167. — Lour. 1790. Coch. I. p. 75. — Gmel. 1791. Syst. p. 243. — Pers. 1797. Syst. p. 158; 1805. Ench. I. p. 130. n. 251. — Willd. 1797. Sp. I. p. 609. n. 194; 1809. En. p. 157. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 385; ed. 1832. I. p. 375. — Schult. 1827. Mant. III. p. 7.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 166. n. 677: g. Petalostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 35: g. Cymosar.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 203; 1820. Mém. Mus. VI. p. 375. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 580. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 442. — Hedw. 1806. Gen. p. 60. 371. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 10. 178. n. 455. — Link 1821. En. I. p. 139. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 58. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 407. n. 401; 1830. Gen. I. p. 90. n. 447. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 457.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520.

Scop. 1777. Intr. p. 143: g. Opulinar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 177. t. 25. f. 2 (coccinea).

Neck. 1790. El. I. p. 126. n. 215: g. Sphanidophytor.

Batsch 1802. Tab. p. 233: g. Coffeacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2011. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 427. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 439. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49.

Ixora Linn. cont.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84: g. Ixoriniae.

Blume 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 949: sect. Pavettae. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 264.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Pavettear.

Cham. & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 14: g. Psychotriacear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 169 (118).

Bartl. 1830. Ord. p. 212: g. Psychotriear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 75. n. 2811.

DC. 1830. Pr. IV. p. 485: g. Coffeear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 570. — Endl. 1838. Gen. n. 3161. p. 535; 1841. Ench. p. 272. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 111.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Psychotridar.

Benth. 1850. Linnaea XXIII. p. 426.
Synon. Jasminum Burm.; Schetti Adans.; Pavettae sp. A. Rich.

Ixorinia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 84: subfam. Larnospermiae. Gen.: Ixora, Pagamea.

Izochilus Ritgen vid. *Isochilus R. Brown.*

Izquierdia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 140. t. 30; 1798. Syst. p. 278: nov. g. Polygam. Dioec. *Cf. Isquierda Willd.* et Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 13 *(Isquierdia).*
= Samara Linn. (Steud.)

J.

Jaborandi Pison. 1648. Brasil. p. 96 et Marcgr. ibid. p. 36. 69 c. ic.
= Ottonia Spreng.?

Jaborosa*) Juss. 1789. Gen. p. 125; 1827. Dict. v. 49. p. 408: nov. g. Solanear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 287. — Hedw. 1806. Gen. p. 123. n. 544. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LVI. 690. n. 836. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 66. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 700. n. 756; 1830. Gen. I. p. 159. n. 799. — Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3311. — Hook. 1830. Bot. Miscell. I. p. 347. t. 71. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 461. — Endl. 1839. Gen. n. 3861. p. 666; 1841. Ench. p. 332. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 712. — Meisn. 1840. Gen. p. 277 (184). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 57. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 57. — Miers 1845. Lond. journ. bot. IV. p. 346 adnot. (Char. emend.) — Walp. 1845. Rep. III. p. 106. 955; 1847. VI. p. 614.
Lam. 1789. Dict. III. p. 189. t. 114.

Jaborosa Juss. cont.
Gmel. 1791. Syst. p. 380: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 1060. n. 380.
Pers. 1805. Ench. I. p. 218. n. 499: g. Solanacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 194. — Steud. 1840. Nom. I. p. 795 *(Jabrosa).* — Sendtn. 1846 in Mart. Fl. Bras. fasc. VI. p. 148.
Rchb. 1837. Hdb. p. 201: g. Mandragorear.
Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4757: g. Physalidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 178: g. Jaborosear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 481: g. Atropinear.
Philippi 1857. Bot. Zeit. p. 719. Sect.(?): Sparattophyllum, Oreobia, Trichanthus.

Jaboroseae Miers 1849. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. III. p. 178: trib. Solanacear. Gen.: Jaborosa, Dorystigma, Himeranthus, Trechonaetes, Salpichroma, Nectouxia.

*) *Jabrosse* nomen arabicum Mandragorae.

*) Dicat. Eugenio Izquierdo.

Jabotapita*) Plumier 1703. Nov. gen. p. 41. t. 32. (Icon. 153.)
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 123. t. 56.
Adans. 1763. Fam. II. p. 364: g. Anonar.
Erhard 1849. Elora I. p. 253: sect. Gomphiae.
= Gomphiae Schreb. pars.

Jabrosa Steud. vid. *Jaborosa Juss.*

Jaca Endl. 1837. Gen. n. 1868*a*. p. 281; 1841. Ench. p. 168; 1847. Spl. IV. p. 36 *(Jacca)*: sect. Artocarpi. (A. integrifolia.)
Tréc. 1847. Ann. sc. nat. 3e sér. VIII. p. 110: subg. Artocarpi. — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 659.
Synon. Polyphema Lour.; Iridaps Comm.; Sitodium Banks.

Jacaeoides Endl. vid. *Jaceoides DC.*

Jacaranda (Marcgr. 1648. Brasil. p. 136?) Juss. 1789. Gen. p. 138: nov. g. Bignoniar. — Par. Humb. & Bonpl. 1808. Pl. aequin. I. p. 61. t. 17. 18. (Char. reform.)
Vent. 1799. Tabl. II. p. 404: g. Bignonear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 317.
Batsch 1802. Tab. p. 193: g. Personatar.
Pers. 1807. Ench. II. p. 173. n. 1516 *(Icaranda)*: g. Bignoniacear. — Par. HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 145. *(verar.)* — R. Brown 1822. Bot. Mag. n. 2327 *(Verm. bot. Schr. V. p. 325: Iacaranda)*. — Kunth 1823. Syn. II. p. 246. — D. Don 1823. Edinb. n. phil. journ. IX. p. 264. Char. reform. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXIX. — Lindl. 1827. Bot. Regist. XIII. t. 1103; 1847. Veg. kd. p. 677. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23. — Bartl. 1830. Ord. p. 186. — Cham. 1832. Linnaea VII. p. 542.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 413; 1825. Syst. II. p. 834. n. 2226; 1831. Gen. II. p. 502. n. 2469: g. (Didynam. Angiosperm.) Bignoniear. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 85. — Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3261. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 225. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 130. — Brongn. 1843. En. genr. p. 62.
DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 131; 1840 in Meisn. Gen. p. 300 *(209)*; 1845. Pr. IX. p. 228: g. Catalpear. Sect. *(1845)*: Monolobos, Dilobos, Nematopogon?
Endl. 1839. Gen. n. 4115. p. 711; 1841. Ench. p. 346: g. Tecomear. Sect.: Copaia, Hemilobos, Dilobos, Kordelestris? — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4547. Sect.: Jacaranda, Hemilobos, Dilobos.
Miq. 1844. Linnaea XVIII. p. 249: g. Jacarandear.
Synon. Kordelestris Arruda; Kordellestris Wittst.; Bignoniae sp. Linn.

Jacarandeae „Fenzl" Miquel 1844. Linnaea XVIII. p. 249: trib. Bignoniacear. Gen.: Jacaranda.

Jacca Endl. vid. *Jaca Endl.*

Jacea Tourn. 1700. Inst. p. 443. t. 253: g. pl. class. XII.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 172. Ed. Hall. 1745. p. 183: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1718. Act. Ac. Paris. p. 182: g. Cynarocephalar. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 502.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 164. t. 13.
Hall. 1768. Hist. I. p. 80.
Juss. 1789. Gen. p. 173: g. Cinarocephalar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 385.
Neck. 1790. El. I. p. 71. n. 125: g. Siphoniphytor.
Mönch 1794. Meth. p. 565: g. Petalostemonis.
Pers. 1807. Ench. II. p. 484: sect. Centaureae. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 537. — Dumort. 1827. Belg. p. 73. — Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1542; 1831. Fl. exc. p. 213. — Koch 1837. Syn. p. 409. Ed. II. p. 468. — DC. 1837. Pr. VI. p. 570. Subsect.: Jacea, Platylophus. — Endl. 1838. Gen. n. 2871*f*. p. 473; 1841. Ench. p. 246. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 454. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 232. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 690. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 240. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 423.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 442: g. Cynarocephalear. (Centaurea Jacea L.)
Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 88: g. Centauriear. Archetypar.
Cass. 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 570: g. Jaceinear. verar.
Link 1829. Hdb. I. p. 703: subg. Centaureae. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11. 67.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Centaureacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 93. n. 3655. 2 *a*: subsect. Centaureae.
Synon. Rhaponticum Mönch; Platylophus Cass.

Jacea „Camer." Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 649: sect. Violae. (V. tricolor L.)
= Melanium Ging.

Jacea Gaudin 1829. Fl. Helv. V. p. 391: sect. Centaureae. (C. Crupina L.)
= Crupina Rupp., Cass.

Jaceineae Cassini 1826. Dict. v. 44. p. 35; 1827. v. 50. p. 247; 1830. v. 60. p. 570: subdiv. Centauriear. Archetypar. Sect.: *verae* (gen. 1826: Chartolepis, Jacea, Pterolophus, Platylophus, Stenolophus, Stizolophus, Zoëgea, Psephellus. Accedunt 1827 et 1830: Microlophus [1830 ad Centaurieas Archetypas veras translatus], Phalolepis, Aetheopappus, Cheirolophus s. Chirolophus, Heterolophus), Cyaneae.

Jaceoides DC. 1837. Prodr. VI. p. 572: subsect. Pterolophi. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2871 *g β*. p. 473 *(Jacaeoides)*; 1841. Ench. p. 246.

*) Nomen americanum apud Marcgravium.

Jackia*) Blume 1823. Catal. h. Buitenz. (ex Flora 1825. p. 120); 1825. Bijdr. Nr. 2. p. 60: nov. g. Polygalear. *Cf.* Linnaea I. p. 646. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3034. — Bartl. 1830. Ord. p. 257. — G. Don 1831 Gen. syst. I. p. 368.
= Xanthophyllum Roxb.

Jackia Wallich 1824 in Roxb. Fl. Ind. II. p. 321 (Pl. As. rar. t. 293): nov. g. Rubiacear. (J. ornata.) — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 621 (minus notum). — Endl. 1838. Gen. n. 3329. p. 566; 1841. Ench. p. 275. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2986.
Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 2028: g. Coffeacear. — Par. A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 199.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 604: g. Coffeear.
Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119): g. Euspermacocear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Cinchonacear.
Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 237: g. Diplosporear.
Synon. Zuccarinia Spreng.

Jackia Spreng. 1826. Syst. III. p. 10. 85. n. 2426: g. Pentapetear. (*Synon. Wallichia DC.*)
Spreng. 1831. Gen. II. p. 550. n. 2696: g. Büttnerear.
= Schillera Rchb.

Jacksonia**) Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 170 (New-York med. repos. II. Hex. 5. p. 350): nov. g. pro Cleome dodecandra L. propositum.
= Polanisia Rafin.

Jacksonia R. Brown 1811 in Ait. h. kew. ed. sec. III. p. 12 (Verm. bot. Schr. II. p. 464): nov. g. Leguminosar. (Gompholobium spinosum Labill.) — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 108. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 353. n. 1661; 1830. Gen. I. p. 366. n. 1846. (Decandr. Monogyn.) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1506.
Bronn 1822. Diss. p. 131: g. Sophorear. — Par. DC. 1825. Pr. II. p. 107. — Rchb. 1828. Consp. p. 154. n. 4071. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 409. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 119. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 152. — Meisn. 1837. Gen. p. 81 (58).
Benth. 1837. En. pl. Hügel. p. 30; 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 73: g. Pultenaear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6434. p. 1257; 1841. Ench. p. 667. Sect.: Eujacksonia, Pteronema. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 43. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 464.
Endl. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 197: g. Podalyriear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 126.
Rchb. 1841. Nom. p. 152. n. 5937: g. Pultenaear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 553: g. Pulteneear.

*) Dicat. Wilh. Jack peregrinatori.

**) Dicat. G. Jackson. botanico anglico.

Jacobaceae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 65: trib. Trichostigmar. Subtrib.: Senecioneae, Astereae, Inuleae, Anthemideae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: trib. Trichostigmear. Subtrib. ut 1827 et Gnaphalieae.

Jacobaea*) Tourn. 1700. Inst. p. 485. t. 276: g. pl. class. XIV.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 164. Ed. Hall. 1745. p. 176: g. pl. class. VIII.
Vaill. 1720. Act. Ac. Paris. p. 296: g. Corymbiferar.
Adans. 1763. Fam. II. p. 124: g. Jacobear.
Mönch 1794. Meth. p. 586: g. Pelalostemonis.
Thunb. 1800. Prodr. II. p. 156. 194: g. Syngenes. Polygam. Superfl.
GMS. 1801. Fl. Wett. III. 1. p. 206: g. Radiatar.
Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 110: subg. Senecionis.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1473; 1831. Fl. exc. p. 243; 1841. Nom. p. 87. n. 3365. 3: sect. Senecionis. — Par. Griseb. 1844. Rumel. II. p. 222. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 112.
= Senecionis Linn. pars.

Jacobaea Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 124. t. 55. f. 2.
= Vicoa Cass.

Jacobaea Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 445. t. 170. f. 1: g. Radiatar. restrictum.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 448. 454; 1830. v. 60. p. 583: g. Senecionear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 106. n. 2497. — Bartl. 1830. Ord. p. 138. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 271.
Dumort. 1827. Belg. p. 65: sect. Senecionis. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 348. — Endl. 1839. Gen. n. 2811 *Id.* p. 459; 1841. Ench. p. 244.

Jacobaeastrum Vaillant 1720. Act. Ac. Paris. p. 301: g. Corymbiferar.
= Othonna Linn.

Jacobaeoides Vaillant 1720. Act. Ac. Paris. p. 300: g. Corymbiferar.
= Solidaginis Linn. pars.

Jacobea Thunb. 1801. Nov. gen. XIII. p. 169: nov. g. Syngenes. Polygam. Superfl. (Senecio reclinatus, etc.)
= Senecionis spec. absque radio.

Jacobeae Adans. 1763. Fam. II. p. 123: sect. 8 Compositar. Gen.: Panios, Bartolina, Doronicum, Tussilago, Jacobaea, Doria, Asteropterus, Aster, Amellus, Limbarda, Helenium, Arnica, Aristotela. *Cf.* Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 114.

Jacobeae HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 151: sect. Compositar. Gen.: Perdicium, Dumerilia, Kleinia, Cacalia, Culcitium, Senecio, Cineraria, Werneria, Tagetes, Böbera. *Cf.* Spreng. Neue Entd. III. p. 198.

*) Flos divi Jacobi, quia circa diem Jacobi floret.

Jacobia*) DC. 1828. Prodr. III. p. 125: sect. Trembleyae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 173. n. 4591 *a;* 1841. Nom. p. 173. n. 6714. 1. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 749. — Endl. 1840. Gen. n. 6206 *a.* p. 1212; 1841. Ench. p. 646.

Jacobinia Nees 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VII. p. 93. 113; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 331: nov. g. Gendarussear. — Par. Örsted 1855. Centralam. Acanth. p. 40. Char. emend. *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 659.
Moric. 1846. Pl. nouv. d'Amér. t. 92: g. Acanthacear.

Jacosta E. Meyer in herb. Dreg. teste DC. Prodr. VI. p. 76. (An potius *Jocaste?* DC. Prodr. VII. p. 298.)
Endl. 1838. Gen. n. 2680. p. 436; 1841. Ench. p. 241: g. Chrysanthemear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 81. n. 3093. — Walp. 1843. Rep. II. p. 638. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
= Oligoglossa DC.

Jacquemontia**) Choisy 1833. Mém. soc. Genèv. VI. p. 476; . . . . ibid. VIII. p. 61; 1845 in DC. Prodr. IX. p. 396: nov. g. Convolvulear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 283. — Rchb. 1841. Nom. p. 113. n. 4411. (genuinar.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 631.
Endl. 1839. Gen. n. 3803 *b.* p. 654; 1841. Ench. p. 324: sect. Convolvuli. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 275 (182).

Jacquemontia Bélanger 1836. Voy. Ind. ic. sine descript.
= Psilothamnus DC.

Jacquinia***) (Linn. emend.) Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 53. t. 40: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Linn. 1764. Gen. ed. VI. p. 101. n. 254; 1767. Syst. ed. XII. p. 175. n. 253. — Murr. 1774. Syst. p. 190; 1784. Syst. p. 229. — Reich. 1778. Gen. p. 104. n. 274. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 137. n. 346. — Gmel. 1791. Syst. p. 390. — Pers. 1797. Syst. p. 239; 1805. Ench. I. p. 234. n. 518. — Willd. 1797. Sp. I. p. 1064. n. 392; 1809. En. p. 246. — Cavan. 1799. Ic. V. p. 55. t. 483.
Gled. 1764. Syst. p. 215. n. 903: g. Petalostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 197: g. Speciosar.
Juss. 1789. Gen. p. 151 (praeced. B. Juss. in Ht. Trian.): g. Sapotar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 204. — Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. XLIV. 490. n. 791.
Neck. 1790. El. III. p. 380. n. 1820: g. Arcythophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 434: g. Hilospermar. — Par. Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60.

Jacquinia Linn. cont.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 341: g. Sapotear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 120. n. 525. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 499. — Link 1821. En. I. p. 194. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 117.
Gärtn. f. 1805. Fr. III. p. 118. t. 201.
HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 250. t. 246: g. Myrsinear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 311. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 668. n. 724; 1830. Gen. I. p. 140. n. 697. — Rchb. 1837. Hdb. p. 204. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 638.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII: g. Lucumear.
Rchb. 1828. Consp. p. 136. n. 3606; 1841. Nom. p. 125. n. 4863: g. Theophrastear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 165. — G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 24. — Endl. 1839. Gen. n. 4228. p. 737; 1841. Ench. p. 359. — Meisn. 1839. Gen. p. 252 (161). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 374. — A. DC. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 140. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 70. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 648. — Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 280.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: g. Ardisiacear.
Cham. 1831. Linnaea VI. p. 394.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 149: g. Jacquiniear.
Synon. Jaquinia Linn.; Bonellia Bert.; Chrysophylli sp. Löfl.; Medeolae sp. Linn.; Rusci sp. Mill.

Jacquinia Mutis mss.
= Trilix Linn.

Jacquinieae Rchb. 1837. Handb. p. 204; 1841. Nomencl. p. 124: div. Primulacear. Subdivis.: Samoleae, Ardisieae, Myrsineae (quarum loco 1841 Theophrasteae).

Jacquinieae A. DC. 1844. Prodr. VIII. p. 148: trib. Theophrastear. Gen.: Jacquinia, Oncinus?

Jacquinotia Hombr. & Jacq. . . . . Voy. pol Sud (Bot. Phanérog. dic.) t. 22. R.
= Lebetanthus Endl. (Walp. Rep. VI. p. 423.)

Jacuanga Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 329. 341: nov. g. Costoidear. (Costus Pisonis.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 23. n. 1638 *b:* sect. Costi.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear.

Jacularia Rafin. 1832 in Loud. Gard. Mag. VIII. (Linnaea VIII. Litt. p. 72): novum nomen pro *Belide Salisb.* propositum.

Jägera Giseke 1792 in Linn. Prael. p. 203. 236: nov. g. Scitaminear. (Amomum montanum Kön.)
= Zingiber Gärtn.

Jägera Räusch. . . . . g. monandrum sine descriptione omnino ignotum. (DC. Prodr. V. p. 543 not.)
= praeced.?

---

*) Dicat. Jacobo Trembley.
**) Dicat. Vict. Jacquemont, peregrinatori.
***) Dicat. Nicol. Jos. de Jacquin, Vindobon.

Jägeria*) HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 277. t. 400: nov. g. Heliantheae. (J. mnioides.) — Par. Kunth 1822. Syn. II. p. 503. — Bartl. 1830. Ord. p. 141.

Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 125; 1825. v. 38. p. 17: g. Millerieae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 112. n. 2710. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 22.

Spreng. 1826. Syst. III. p. 590. n. 2818; 1831. Gen. II. p. 635. n. 3174: g. Radiatae.

Cass. 1829. Dict. v. 59. p. 237; 1830 v. 60. p. 577: g. Sigesbeckieae.

Less. 1832. Syn. p. 223: g. Heliopsideae. — Par. DC. 1836. Pr. V. p. 543. — Endl. 1838. Gen. n. 2497. p. 406; 1841. Ench. p. 238. — Meisn. 1839. Gen. p. 201 (131). — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3128. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 711.

Jagera Blume 1850. Rumphia III. p. 155: nov. g. Melicocceae. (Garuga javanica Bl.)

Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 210: g. Sapindeae.

Hassk. 1858. Ht. Bogor. p. 137: g. Sapindaceae.

Jalambicea**) La Llave & Lexarza 1825. Nov. veg. descr. II. p. 12: nov. g. Monoec. Hexandr. (J. repens.)

Spreng. 1830. Gen. I. p. 294. n. 1519: g. Hexandr. Hexagyn.

= Limnobium Rich.

Jalapa Tourn. 1700. Inst. p. 129. t. 50: g. pl. class. II.

Vaill. 1722. Act. Ac. Paris. p. 192: g. Dipsaceae.

Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 124 (*Jalappa*).

Adans. 1763. Fam. II. p. 265: g. Jalapae.

Medic. 1787. Malv. p. 82: g. Monadelph. Pentandr. *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 326 (*Jalappa*); 1789. Phil. Bot. I. p. 180.

Mönch 1794. Meth. p. 508: g. Petalostemonis.

= Mirabilis Linn.

Jalapae B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 45 plant. Gen.: Pisonia, Boerhaavia, Mirabilis, Ovieda, Plumbago, Statice, Plantago, Cressa, Gomphrena, Achyranthes, Celosia, Iresine, Amaranthus.

Adans. 1763. Fam. II. p. 263: fam. 36 plant. Gen.: Plumbago, Pisonia, Boerhavia, Jalapa.

Jalapinae Batsch 1802. Tab. affin. p. 224: fam. Marcidae. Gen.: Mirabilis, Abronia, Pisonia, Buginvillaea, Boerhavia; Plumbago, Statice.

Jalappa Burm., Medic. vid. *Jalapa Tourn.*

Jaltomata***) Schlechtend. 1838. Ind. sem. h. bot. Hal. n. 7: nov. g. Solaneae. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 75.

= Saracha Ruiz & Pav.

*) Dicat. Dr. G. F. Jäger.

**) Dicat. Joanni Jalambic, Dr.

***) *Jaltomata* Mexicanorum.

Jaltonia Steud. Nom. I. p. 796: err. pro *praeced.*

Jamacaru Pison. 1648. Brasil. p. 99 et Marcgr. ibid. p. 126 cum icone.

= Cacti Linn. spec.

Jambolana Rumph. 1741. Amboin. I. p. 131. t. 42. *Cf.* Hamilt. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 341.

Adans. 1763. Fam. II. p. 508: g. Zizyphor.

= Jambolifera Linn.

Jambolana Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 458: sect. Syzygii. (S. Jambolana DC.)

Jambolifera Linn. 1747. Amoen. acad. I. Ed. 1749. p. 125: nov. g. plant.

Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 58. n. 139 (Nov. gen. zeyl. p. 9. n. 1051); 1753. Sp. I. p. 349; 1759. Syst. ed. X. p. 1000. n. 480; 1762. Sp. ed. II. p. 497; 1764. Gen. ed. VI. p. 190. n. 479; 1767. Syst. ed. XII. p. 266. n. 472: g. Octandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 298; 1784. Syst. p. 360. — Reich. 1778. Gen. p. 192. n. 513. — Lour. 1790. Coch. I. p. 230. — Gmel. 1791. Syst. p. 613. — Pers. 1797. Syst. p. 384; 1805. Ench. I. p. 416. n. 950. — Willd. 1799. Sp. II. p. 326. n. 744.

Gled. 1764. Syst. p. 83. n. 342: g. Thalamostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 230: g. Nomadeae.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 178. t. 36. f. 4 (pedunculata).

Juss. 1789. Gen. p. 321: g. Onagrar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 77.

Neck. 1790. El. II. p. 364. n. 1168: g. Osariphytor.

Vahl 1794. Symb. III. p. 52. t. 61.

Dryand. . . . . Linn. Trans. II. p. 233.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 156: g. Onagrariae. (Myrteis aff.)

Hedw. 1806. Gen. p. 270. n. 1088: g. Onagreae.

R. Brown 1814. Flind. voy. II. App. 3. p. 545 (Verm. bot. Schr. I. p. 33): g. Diosmeae.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 673; 1825. Syst. II. p. 216. n. 1437: g. Rutaceae.

Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 153: g. Fraxinellae.

= Acronychia Forst.

Jambolifera Auct. nonnullor

= Syzygium Gärtn.

Jambos Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 124.

Adans. 1763. Fam. II. p. 88: g. Myrtor.

Jambosa Rumph.

Jambosa Rumph. 1741. Amboin. I. p. 121. *Cf.* Hamilt. 1826. Mem. Wern. Soc. V. 2. p. 335.

DC. 1828. Pr. III. p. 286: g. Myrteae. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4682. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — Bartl. 1830. Ord. p. 332. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 867. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 179. — Meisn. 1838. Gen. p. 109 (77). — Endl. 1840. Gen. n. 6324. p. 1233; 1841. Ench. p. 651. — Brongn. 1843. En. genr. p. 123. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 738. — Blume 1849. Mus.

Jambosa Rumph. cont.
bot. Lugd. I. p. 90. Sect.: genuinae, Cerocarpus, Porphyrosia, Ascojambosa, Sterrojambosa. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 407. Sect.: verae, Clavimyrtus, Leptomyrtus, Bostrychode.
Link 1831. Hdb. II. p. 68: g. Myrtacear. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 332. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 36. 69.
Rchb. 1837. Hdb. p. 253; 1841. Nom. p. 177. n. 6853: g. Eugeniear.
Berg 1855. Linnaea XXVII. p. 340; 1857 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVIII. 1. p. 376: g. Eugenioidear. Sect. ex Blume.
Synon. Jambos Burm., Adans.; Eugeniae sp. Linn.; Myrti sp. Swartz, Kunth.

Jamesia Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 593: nov. g. Hydrangear. (J. americana.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 158. n. 6168.
Endl. 1841. Spl. I. n. $4670/_1$. p. 1416; 1841. Ench. p. 409: g. Hydrangeear. — Par. A. Gray 1849. Mem. Amer. Ac. IV. P. 1. (*Cf.* Flora 1850. II. p. 706.) Char. emend.
Meisn. 1843. Comm. p. 358: g. Hydrangeacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 570.

Jamesia Nees 1841 in Neuwied Reise Nord-Am. II. p. 442: nov. g. Synantherear. (Prenanthes? pauciflora Torr.)

Jamesonia*) Hook. & Grev. . . . . Ic. t. 178: nov. g. Polypodiacear. (Pteris imbricata Sw.) — Par. Kunze 1844. Bot. Zeit. p. 737.
Endl. 1836. Gen. n. 623. p. 61; 1841. Ench. p. 36: g. Polypodiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 28. n. 1012. — J. Smith 1842. Hook. journ. bot. IV. p. 49. — Meisn. 1843. Gen. p. 431 (331).
J. Bauer . . . . Filic. t. 13.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 80: g. Polypodear.
Klotzsch 1847. Linnaea XX. p. 407: sect. Gymnogrammes.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 161: g. Jamesoniear.
Synon. Allosori sp. Presl.

Jamesonieae Fée 1852. Gen. Fil. p. 36. 161: subtrib. Cheilanthear. Gen.: Jamesonia.

Jandinea Steud. in Flora 1850. I. p. 229 (nomen): vid. *Jardinea Steud.*

Jangaraca Rafin. vid. *Tangaraca Adans.*

Jania**) Lamx. 1812. Bull. philom. p. . . . ; 1816. Polyp. flex. t. 9. f. 6. 7.
Gray 1821. Brit. pl. I. p. 339: g. Corallidear.
Menegh. 1838. Cenni p. 33: g. Corallinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 19. n. 681. — Decne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVII. p. 359 (Flora 1843. p. 98); 1842. ibid. XVIII. p. 122. Sect.: Jania, Haliptylon. — Endl. 1843. Spl. III. p. 48. n. $122/_{72}$. Sect. eaed. — Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 101; 1843. Phyc. gener. p. 388; 1849. Sp. Alg. p. 709. n. 471. — Fries 1846.

Jania Lamx. cont.
Summ. veg. Scand. I. p. 126. — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 186. Sect. ut Decne. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25. — Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 130. (genuinar.) — Duj. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 141. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54. — Harv. 1853. Ner. bor. am. II. p. 83.
Harv. 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 237: g. Corallinacear

Jania Schult. f. 1830. Syst. VII. p. XCVIII. 1528. n. 1536: nov. g. Melanthacear. (Melanthium aethiopicum Thunb.)
= Baeometra Salisb.

Jania Decaisne 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 122: sect. Janiae. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 49. n. $122/_{72}$ *a.* — Sonder 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 186.

Janiparandiba Pison. Brasil. p. 121. c. ic. vid. *Japarandiba Marcgr.*

Janipha HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 106. t. 109: nov. g. Euphorbiacear. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 417. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 139. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 37.
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 616: g. Crotonear.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 77. n. 2404: g. Tricoccar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Crotoniear.
Bartl. 1830. Ord. p. 371: g. Ricinear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 507.
= Manihot Plum.

Janraja „Plumier 1704. Icon. p. 255. f. 1." Adans. 1763. Fam. II. p. 76: g. Aristolochiar.
= Rajania Linn.

Jansonia*) Kippist 1847. Gard. Chron. Nr. 19; . . . . Linn. Trans. XX. p. 383; 1848. Ann. and Mag. 2d. ser. I. p. 235: nov. g. Leguminosar., Brachysemae R. Brown aff. *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 736; 1850. p. 408.
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 308: g. Podalyriear.

Jantha vid. *Iantha.*

Janthe vid. *Ianthe.*

Janusia A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 250; 1843. Arch. Mus. III. p. 603. t. 21: nov. g. Gaudichaudiear. (Gaudichaudiae sp. St. Hil.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7840. — Walp. 1846. Rep. V. p. 351. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 369. — Griseb. 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXI. p. 102.
Endl. (ex A. Juss. mss.) 1840. Gen. n. 5562. p. 1058; 1841. Ench. p. 557: g. Malpighiacear. Meiostemonum.
Meisn. 1843. Comm. p. 346: g. Hiptagear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390: g. Gaudichaudear.

---

*) Dicat. Rob. Jameson, prof. Edinb.

**) Dicat. Georgio Jan, prof. Parm.

*) Dicat. Jos. Janson.

Japarandiba (Marcgr. 1648. Brasil. p. 109 c. ic., *Janiparandiba Pis.*) Adans. 1763. Fam. II. p. 448: g. Cistor.
= Pirigara Aubl.

Japotapita „Plum." Endl. in synon. Gomphiae: vid. *Jabotapita Plum.*

Jaquinia Linn. 1759. Amoen. acad. V. Ed. 1788. p. 388: nov. g. plant. (Dill. Ht. Elth. t. 123.)
Linn. 1762. Sp. ed. II. p. 271: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Swartz 1788. Prodr. p. 47.
Adans. 1763. Fam. II. p. 502: g. Vaccinior.
= Jacquinia Linn.

Jaracatia Marcgr. 1648. Brasil. p. 128 c. ic.
= Carica Linn.? (Endl. Gen. p. 933.)

Jarapha Steud. Nom. I. p. 797: lege *Jarava Rz. & P.*

Jaraphaea Steud. vid. *Jaravaea Scop.*

Jarava*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 2. t. 1; 1798. Fl. peruv. I. p. 5. t. 6: nov. g. (Graminum) Monandr. Digyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 6. n. 30. — Hedw. 1806. Gen. p. 6. 345. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 8. 49. n. 42.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 71: g. Graminear. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 164.
Rchb. 1828. Consp. p. 50. n. 920 *b:* sect. Stipae. — Par. Trin. & Rupr. 1842 in Mém. Ac. Pet. 6e sér. V. (1849) p. 42. — Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 731.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 161: g. Stipacear.
= Stipa Trin.

Jaravaea Scopoli 1777. Introd. p. 215. n. 948: nov. g. Dumosar. *Cf.* Steud. Nom. I. p. 797 (*Jaraphaea*).
Neck. 1790. El. II. p. 118. n. 792: g. Plyrontophytor.
= Spennera Mart., Microlicia Don et Noterophila Mart.

Jardinea Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 360: nov. g. Rottbölliacear., antea sphalm. *Jandinea.*
Synon. Rhiniachne Hochst.

Jaroba Marcgr. 1648. Brasil. p. 25 c. ic.
= Tanaecium Swartz?

Jasione**) Linn. 1737. Gen. p. 677. n. 266; 1737. Cliff. p. 426; 1753. Sp. II. p. 928; 1759. Syst. ed. X. p. 1236. n. 896; 1763. Sp. ed. II. p. 1317; 1764. Gen. ed. VI. p. 455. n. 1005; 1767. Syst. ed. XII. p. 799: g. Syngenes. Monogam. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 666; 1784. Syst. p. 799. — Reich. 1778. Gen. p. 451. n. 1090. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 596. n. 1362. — Pers. 1797. Syst. p. 841.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. II. p. 496: g. Dicotyledonum Isostemonum.

*) Dicat. Jos. Jarava, Hispano.

**) Ἰασιώνη Theophrasti.

Jasione Linn. cont.
Gmel. 1749. Sibir. II. p. 215: g. Aggregatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 79.
Gled. 1749. Berl. V. p. 130; 1764. Syst. p. 288. n. 977: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 518.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Campanaceor.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Campanular.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Campanacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 149. — Gis. 1792. Prael. p. 393. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 540.
Hill 1769. Ht. kew. p. 37: g. Tubulatar.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 489: g. Campanatar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 149. t. 30. f. 5 (montana).
Juss. 1789. Gen. p. 166: g. Campanulacear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 475. — DC. 1805. Franç. III. p. 716; 1815. V. p. 433. — Link 1821. En. I. p. 218; 1829. Hdb. I. p. 636. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 411. — Lois. 1822. Dict. v. 24. p. 189. — Bartl. 1830. Ord. p. 152. — Koch 1837. Syn. p. 463. Ed. II. p. 532. — Kunth 1838. Berol. I. p. 398. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 568. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 293. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 398.
Neck. 1790. El. I. p. 232. n. 376: g. Sygolliphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 373: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Willd. 1797. Sp. I. p. 888. n. 328; 1809. En. p. 209. — Rebent. 1804. Neom. p. 121. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 10. 185.
Batsch 1802. Tab. p. 212: g. Campanulatar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 370: g. Campanulear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 170. n. 715. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 525; 1825. Syst. I. p. 809. n. 908; 1830. Gen. I. p. 196. n. 944. — Röm. & Schult. 1819. Syst. V. p. XXXVIII. 473. n. 1009. — A. DC. 1830. Mon. Camp. p. 55. 101. — Rchb. 1831. Fl. exc. p. 296. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 857.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: g. Jasionidiar.
Dumort. 1827. Belg. p. 59: g. Jasionear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 733. — Endl. 1838. Gen. n. 3071. p. 514; 1841. Ench. p. 266. — Meisn. 1839. Gen. p. 241 (148). — Rchb. 1841. Nom. p. 103. n. 4030. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 691.
Rchb. 1828. Consp. p. 114. n. 2792: g. Phyteumear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: g. Jasionidear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 186: g. Canarinear.
A. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 415: g. Wahlenbergiear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 31. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 869.
Synon. Ovilla Adans.; Aphyllanthes Dalech.; Scabiosae sp. Lob.; Rapuntii sp. Col.

Jasioneae Dumort. 1827. Fl. Belg. p. 59: trib. Campanulacear. Gen.: Jasione. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 241 (148). — Gen.: Jasione, Symphyandra. — Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 691. Gen.: Jasione.
Endl. 1838. Gen. p. 514; 1841. Ench. p. 266: subtrib. Wahlenbergiear. Gen. unicum: Jasione.
Rchb. 1841. Nom. p. 103: subsect. Canarinear. Gen.: Jasione.

Jasioneae G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 733: trib. Campanulacear. Gen. §. 1: Jasione; Lightfootia, Cephalostigma, Campanumaea. §. 2: Codonopsis, Canarina, Platycodon, Microcodon, Wahlenbergia; Prismatocarpus, Roëlla.

Jasionideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28. 30: fam. Campanariear. Gen.: Jasione.

Jasionidiae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 57: fam. Calicitubiae. Gen.: Jasione.

Jasmina B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 26 plant. Gen.: Syringa, Eranthemum, Ligustrum, Jasminum, Nyctanthes, Phyllirea, Olea, Chionanthus, Fraxinus.
Adans. 1763. Fam. II. p. 220: fam. 29 plant. Gen. §. 1: Lilac, Pariaticu, Pigafetta, Jasminum, Mogori, Ligustrum, Phyllirea, Olea, Chionanthus, Comocladia. §. 2: Petitia, Aquartia, Crossopetalon, Cleyera, Budleia, Houstonia, Sarcocolla, Plantago. §. 3: Kreidek, Arapabaca, Lysianthius, Mungos, Macrocnemum, Bistella, Brossaea, Rembertia, Galax, Myrstiphyllon, Plotia, Callicarpa, Marurang, Notjo.

Jasminaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 308; 1847. Veg. kingd. p. 650: ordo Echialium. Gen. Jasminear. A. DC. (excepto Chondrospermo.)
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 150: fam. Dicotyledonear. monopetalar. hypoginar. Gen. Jasminear. Endl.
= Jasmineae R. Brown.

Jasminanthes Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. Nr. 10. p. 148: nov. g. Sarcolobear., Gymnemati aff. (J. suaveolens.)
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 62: g. Ceropegiar.
Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 500: g. Gymnemear.

Jasminarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 21: ordo Torocoronar. Fam.: Jasminideae, Strychnideae, Potaliaceae; Ebenaceae, Sapotaceae, Leeaceae; Symploceae, Stackhousieae, Iliceae.

Jasmineaceae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 58: ordo Corollaeflorar. Gen.: Jasminum, Nyctanthes.

Jasmineae Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Pal. II. p. 477: ordo plant. Gen.: Veronica, Ligustrum.
Juss. 1789. Gen. p. 104: ordo 4 class. VIII. Gen. §. 1: Nyctanthes, Lilac, Hebe, Fraxinus. §. 2: Chionanthus, Olea, Phyllirea, Mogorium, Jasminum, Ligustrum. *Cf.* Juss. 1804. Ann. Mus. V. p. 252.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 311: ordo 6 class. VIII. Gen.: Chionanthus, Olea, Phillyrea, Mogorium, Jasminum, Ligustrum.

Jasmineae Neck. cont.
Batsch 1802. Tab. p. 198: fam. Nudar. Gen.: Syringa, Chionanthus, Olea, Phyllirea, Nyctanthes, Jasminum, Ligustrum.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 240. t. 42. Gen. ut Juss., accedente in §. 1 Fontanesia.
DC. 1805. Franç. III. p. 494: fam. (42) Dicotyledonum monopetalar. Gen.: Lilac, Fraxinus, Olea, Phillyrea, Jasminum, Ligustrum. — Par. Mirb. 1815. Élém. II. p. 877.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 468: fam. 47 plant. Gen.: Jasminum, Ligustrum, Nyctanthes, Phillyrea, Olea, Chionanthus, Notelaea, Linociera, Syringa, Borya, Fontanesia.
Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 199. Sect.: Oleineae, *verae* (gen.: Mogorium, Jasminum, Nyctanthes).
Dumort. 1822. Comm. p. 60; 1827. Belg. p. 52: fam. Talamitubiae. Gen. 1822: Lilac, Jasminium, etc. Trib. 1827: Lilacineae, Oleineae.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 11; 1826. Isis p. 586: ordo Tubiflorar.
Rchb. 1828. Consp. p. 134: subdiv. Carissear. Gen.: Jasminum, Menodora, Mogorium, Ligustrum, Syringa, Forsythia.
Rchb. 1837. Hdb. p. 213: divis. Sapotacear. Subdivis.: Oleinae, Columelleae, Mogorinae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 135. Subdivis.: Fraxineae, Oleinae, *genuinae* (gen.: Jasminum, Nyctanthes, Bolivaria, Menodora).

Jasmineae R. Brown 1810. Prodr. I. p. 520. Ed. Nees p. 376: ordo restrictus. Gen.: Jasminum, Nyctanthes.
DC. 1819. Théor. élém. p. 246: ordo Corolliflorar. — Par. Koch 1837. Syn. p. 482. Ed. II. p. 554. Gen.: Jasminum. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 300. Gen.: Chondrospermum, Jasminum, Nyctanthes, Bolivaria, Menodora, Balangue?
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLII: div. Contortar. Gen. ut R. Brown.
Link 1829. Hdb. I. p. 440: ordo (24) Hypanthar. Gen.: Jasminum.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: trib. Jasminidear. Gen.: Nyctanthes, Jasminium.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (204) Monopetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 216: ordo (128) Ligustrinar. Gen. ut R. Brown. — Par. Meisn. 1839. Gen. p. 256 (165). Gen. ead. et Chondrospermum.
Lindl. 1833. Nix. p. 29: ordo Olealium.
Endl. 1838. Gen. p. 570: ordo Contortar. Gen.: Jasminum, Nyctanthes, Menodora, Chondrospermum? — Par. Endl. 1841. Ench. p. 284. Gen. ut R. Brown. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 54) Schrebera, Nathusia.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 240: fam. (121) Ligustrinear. Gen. ut Endl. 1838 et Mogorium.
Brongn. 1843. En. genr. p. 64: fam. Selaginoidear. Gen. ut R. Brown.

Jasminideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26: fam. Jasminariear. Trib.: Lilacineae, Oleineae, Jasmineae.

Jasminium Dumort. vid. *Jasminum Tourn.*

Jasminoides Nissole 1711. Act. Ac. Par. p. 320. t. 12: nov. g. plant. *Cf.* Dill. 1719. Nov. gen. p. 159.

Micheli 1729. Nov. gen. p. 224. t. 105: g. pl. class. XX.

Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 132. (Lycium afrum L.)

Mönch 1794. Meth. p. 469: g. Petalostemonis.

= Lycium Linn.

Jasmino-Nerium Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 191. n. 405: g. Pentandr. obscurum. (*Pluk.* Almag. 318 t. 45. f. 6; *Herm.* zeyl. 33; *Burm.* zeyl. 102.) *Vid. Carandas Rumph., Adans.*

= Carissa Linn.

Jasminum*) Tourn. 1700. Inst. p. 597. t. 368: g. pl. class. XX.

Rupp. 1718. Fl. jen. p. 40. Ed. Hall. 1745. p. 43: g. pl. class. I.

Linn. 1737. Gen. p. 3. n. 7; 1737. Cliff. p. 5; 1740. Syst. p. 16; 1748. Ups. p. 5; 1753. Sp. I. p. 7; 1759. Syst. ed. X. p. 847. n. 17; 1762. Sp. ed. II. p. 9; 1764. Gen. ed. VI. p. 9. n. 17; 1767. Syst. ed. XII. p. 55: g. Diandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 54; 1784. Syst. p. 56. — Reich. 1778. Gen. p. 9. n. 17. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 12. n. 22. — Lour. 1790. Coch. I. p. 20. — Gmel. 1791. Syst. p. 24. — Pers. 1797. Syst. p. 56; 1805. Ench. I. p. 7. n. 33. — Willd. 1797. Sp. I. p. 35. n. 32; 1809. En. p. 9. — Vahl 1805. Enum. I. p. 25. n. 17. — Thunb. 1807. Fl. cap. p. 41. — Edw. 1815. Bot. Regist. I. Nr. 1. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 86; ed. 1832. p. 87. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 302. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 9.

Gled. 1749. Berl. V. p. 128; 1764. Syst. p. 153. n. 629: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 467.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30; 1764. Ord. nat.: g. Sepiariar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 506.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Jasminor. — Par. Adans 1763. Fam. II. p. 223.

Rüling 1774. Ord. pl. p. 35: g. Jasmina et Solana conjungens.

Scop. 1777. Intr. p. 196: g. Speciosar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 196. t. 42. f. 1 (fruticans).

Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 292; 1789. Phil. Bot. I. p. 140.

Juss. 1789. Gen. p. 106: g. Jasminear. (Sejungitur Mogorium.) — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 314. — Batsch 1802. Tab. p. 198. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 243.

Jasminum Tourn. cont.
— DC. 1805. Franç. III. p. 500. — Hedw. 1806. Gen. p. 8. 345. — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 521. Ed. Nees p. 377. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 52. 78. n. 60. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 469; 1825. Syst. I. p. 30. n. 53; 1830. Gen. I. p. 15. n. 55. — HBK. 1818. Nov. gen. III. p. 234. — Link 1821. En. I. p. 31; 1829. Hdb. I. p. 440. — Lois 1822. Dict. v. 24. p. 191 et Juss. ibid. p. 200. — Dumort. 1822. Comm. bot. p. 60; 1829. Anal. fam. p. 26 (*Jasminium*). — Kunth 1823. Syn. II. p. 300. — Blume 1825. Bijdr. Nr. 13. p. 677. — D. Don 1825. Nepal. p. 105. — Rchb. 1828. Consp. p. 134. n. 3544; 1841. Nom. p. 135. n. 5244. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 217. — Endl. 1833. Norf. p. 55; 1838. Gen. n. 3342. p. 570; 1841. Ench. p. 285. — Koch 1837. Syn. p. 483. Ed. II. p. 554. — E. Meyer 1837. Comm. pl. Afr. II. p. 173. — Meisn. 1839. Gen. p. 256 (165). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 29. 34. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 242. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 64. — DC. 1844. Pr. VIII. p. 301. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 70. — Webb.... Canar. III. p. 165. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 148. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 40. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 476. — Blume 1850. Mus. bot. Lugd. I. 17. p. 270. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 530.

Rchb. 1831. Fl. exc. p. 432: g. Carissear.

Lindl. 1836. Nat. syst. p. 308; 1847. Veg. kd. p. 651: g. Jasminacear.

G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 59: g. Jasmineaccar.

Rchb. 1837. Hdb. p. 214: g. Mogorinar.
Synon. Mogori Adans.; Mogorium Juss.

Jasminum Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 125. t. 57.

= Ixora Linn.

Jasonia Cassini 1815. Bull. soc. philom. Oct. p. 175: nov. g. pro Erigeronte longifolio et foetido indicatum.

Cass. 1822. Dict. v. 23. p. 565; 1827. v. 49. p. 224; 1830. v. 60. p. 580: g. Inulear. (Archetypar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 105. n. 2463. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 139. — Less. 1832. Syn. p. 197. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 27. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 181.

Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 200: subg. Pulicariae. (Erigeron tuberosum L.)

Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3388. 2: sect. Jasoniae.

: Eujasonia DC.

Jasonia DC. 1836. Prodr. V. p. 476: g. emendat. Euinulear. Sect.: Chiliadenus, Eujasonia, Allagopappus, Donioides. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2438. p. 394; 1841. Ench. p. 236. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 192 (128).

*) Nomen ex Arabo. *Jatsimin, Jesemin.*

Jasonia DC. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 87. n. 3388: g. Inulear. (genuinar.) Sect.: Chiliadenus, Jasonia, Allagopappus. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 44. — Griseb. 1843. Rumel. II. p. 193. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 954: g. Eujasoniear. (restrict.)
Synon. Jasonia, Chiliadenus et Allagopappus Cass.; Jasonia, Allagopappus et Doniae sp. Less.; Inulae et Erigerontis sp. Auct.

Jasonieae Schultz Bip. 1843 in Walp. Repert. II. p. 954: sect. Pulicariear. Subsect.: Eujasonieae, Pegolettieae.

Jateorhiza Miers 1849 in Hook. Niger Fl. p. 212: novum g. Menispermacear. (Cocculus? macranthus Hook. f.) — Par. Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 21.
Miers 1851. Ann. and Mag. n. h. 2d. ser. VII. p. 35. 38: g. Heteroclinear. (Cocculus palmatus DC.)

Jatitara Marcgr. vid. *Atitara Marcgr.*

Jatropa Scopoli, Neck. vid. *Jatropha Linn.*

Jatropha*) Linn. 1737. Gen. p. 288. n. 721; 1737. Cliff. p. 445; 1742. Gen. ed. II. p. 457. n. 867: g. Monoec. Polyandr. — Par. Cram. 1803. Disp. p. 184.
Linn. 1748. Ups. p. 290: g. Monoec. Polyadelph.
Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 141. n. 593: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 291.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 32: g. Tricoccor.
Linn. 1753. Sp. II. p. 1006; 1759. Syst. ed. X. p. 1276. n. 961; 1763. Sp. ed. II. p. 1428; 1764. Gen. ed. VI. p. 503. n. 1084; 1767. Syst. ed. XII. p. 636: g. Monoec. Monadelph. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 723; 1784. Syst. p. 865. — Reich. 1778. Gen. p. 499. n. 1183. — Lour. 1790. Coch. II. p. 585. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 655. n. 1463. — Pers. 1797. Syst. p. 909. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 216. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 557. n. 1719; 1809. En. p. 994. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 225. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 686.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Euphorbiar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 389.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tricoccar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 243 (*Jatropa*). — Gis. 1792. Prael. p. 474. — Batsch 1802. Tab. p. 169. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 76. n. 2403; 1831. Gen. II. p. 546. n. 2677.
Hill 1769. Ht. kew. p. 134: g. Monopetalar.
Neck. 1790. El. II. p. 346. n. 1142 (*Jatropa*): g. Cyrtosiphytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 1026: g. Monadelph. Decandr. — Par. Swartz 1800. Ind. occ. II. p. 1158.

*) ἰατρον, medicamentum; φάγω, edo. (Linn. Phil. bot. p. 184.) Conf. Beckmann Lex. bot. p. 117.

Jatropha Linn. cont.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 494: g. Tithymaloidear.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 283: g. Euphorbiacear. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 587. n. 2140. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 210. — Link 1822. En. II. p. 406. — Agdh. 1823. Aphor. p. 194.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 365: g. Euphorbiear.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: g. Tithymalear.
Rchb. 1828. Consp. p. 195. n. 5061: g. Ricinear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. II. p. 512.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: g. Crotoniear.
Blanco 1837. Filipin. p. 758: g. Monoec. Adelph.
= Jatropha et Curcas Adans.; Cnidoscolus Pohl et Manihot Plum.

Jatropha Adans. 1763. Fam. II. p. 376: g. Tithymalor., sejuncto Curcade restrictum.
Medic. 1787. Malv. p. 120: g. Monadelph. Decandr.
HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 103: g. Euphorbiacear. emend. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 414. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 44 (*Médicinier*).
Blume 1825. Bijdr. Nr. 12. p. 617: g. Crotonear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5805. p. 1114; 1841. Ench. p. 588. — Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7397. (genuinar.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 80. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281.
Bartl. 1830. Ord. p. 371: g. Ricinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 281: g. Crozophorear.
Meisn. 1841. Gen. p. 341 (253): g. Jatrophear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 294: g. Jatrophidear.
Synon. Jatropa Scop.; Adenorhopium Pohl; Adenoropium Spreng.; Adenorrhopium Wittst.; Crotonis sp. Forst.

Jatropha Pohl 1827. Pl. Brasil. I. p. 13: g. Euphorbiacear. restrictum.
= Curcas Adans.

Jatropheae Meisn. 1841. Gen. pl. vasc. p. 341 (253): subtrib. Crotonear. Gen.: Garcia, Baloghia, Ricinocarpus, Ostodes, Aleurites, Elaeococca, Curcas, Cnidoscolus, Jatropha, Anda, Manihot, Mozinna, Trigonostemon, Ryparia, Griselinia?, Trujanoa?, Margaritaria?

Jatrophideae Baillon 1858. Ét. Euphorb. p. 294: div. Euphorbiacear. uniovulatar. Gen.: Jatropha, Philyra, Ditaxis, Caperonia, Cnidoscolus, Manihot, Monotaxis, Sarcoclinium, Agrostistachys, Bennettia, Curcas, Anda, Elaeococca, Serophyton, Crozophora, Chaetocarpus, Siphonia, Telogyne, Cluytia, Pogonophora, Micrandra, Mischodon, Chiropetalum, Argythamnia, Ryparia, Trigonostemon, Silvaea, Tritaxis, Ricinocarpus, Baloghia, Aleurites, Bertya.

Jatus Rumph. 1743. Amboin. III. p. 34. t. 18.
= Tectona Thunb.

Jaubertia*) Guillem. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 60: nov. g. Rubiacear., Gailloniae et Crocyllidi aff. (J. Aucheri.) — Par. Jaub. & Spach Ill. pl. or. (Flora 1842. Lit. p. 67.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 52. n. $3132/_1$: g. Spermacocear.
Meisn. 1843. Comm. p. 361: g. Euspermacocear.?
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
= Gailloniae A. Rich. sect. Ptilostephus. (Jaub. & Sp.)

Jaubertia Spach 1849. Ill. pl. or. III. p. 131. t. 289: nov. g. Calendulacear. (Kölpinia sessilis Bois.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 921.

Jaumea**) Pers. 1807. Ench. II. p. 397. n. 1816: g. Syngenes. Aequal. (Kleinia linearifolia Juss.)
DC. 1836. Pr. V. p. 663: g. Euheleniear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2600. p. 423; 1841. Ench. p. 240. — Meisn. 1839. Gen. p. 206 (138).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 18: g. Heleniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3193. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 712.
Synon. Kleinia Juss.

Javilla Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 113. 116: sect. Feuilleae (F. Javilla Kunth.)

Jeannerettia***) Hook. f. & Harv. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 398: nov. g. Rhodomelear. (J. lobata.) *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 793. — Par. Sonder 1852. Linnaea XXV. p. 697.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 108: g. Amansiear.
= Botryoglossum Kütz.

Jeanpaulia Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 112; 1846. Chlor. prot. p. LII: g. Marsileacear.
Synon. Baiera C. F. Braun.

Jecorariae Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXIX; 1846. Syn. p. 521: subtrib. Marchantiear. Gen.: Marchantia, Preissia, Sauteria, Dumortiera, Fegatella, Rebouillia, Grimaldia, Duvalia, Fimbriaria et 1846 Rhacotheca.

Jeffersonia†) Barton 1793. Act. soc. Amer. III. p. 334: nov. g. ex typo Podophylli diphylli L.
Rich. 1803 in Michx. Fl. am. I. p. 236: g. Octandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 418. n. 954. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 364. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 253. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 219.
Hedw. 1806. Gen. p. 276. n. 1110: g. Ranunculear.?

*) Dicat. comiti Hippolyto Jaubert.
**) Dicat. Jaumo St. Hilaire.
***) Dicat. Dr. Jeannerett.
†) Dicat. Thom. Jefferson, praesidi Statuum Unitorum.

Jeffersonia Bart. cont.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 473: g. Ranunculacear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 729; 1825. Syst. II. p. 225. n. 1468: g. Papaverear.
DC. 1821. Syst. II. p. 34; 1824. Pr. I. p. 111: g. Podophyllear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVIII; 1841. Nom. p. 185. n. 7087. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 52. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 314. n. 1603. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 452. — Meisn. 1837. Gen. p. 6 (8). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 34.
Rchb. 1828. Consp. p. 187. n. 4843; 1837. Hdb. p. 265: g. Bocconiear.
Bartl. 1830. Ord. p. 252: g. Paeoniacear.
G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 121: g. Podophyllacear.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 53: g. Nandinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 438.
Endl. 1839. Gen. n. 4807. p. 852; 1841. Ench. p. 440: g. Berberidear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 95.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1284: g. Papaveracear.

Jenkinsia Hook. 1839. Gen. Fil. t. 75: nov. g. Filicum.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 693: g. Taenitidear.
Fée 1852. Gen. Fil. p. 92: g. Vittariear.
= Cyrtogonium Smith?

Jenkinsia Griffith 1843 in Calcutta journ. IV. p. 231: nov. g. Thymelaear. *Cf.* Flora 1844. II. p. 433.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 531: g. Thymelacear.
Endl. 1847. Spl. IV. p. 69. n. $2106/_{17}$: g. Daphnoidear. (anomalar.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 584.
= Miquelia Meisn.

Jenkinsonia*) Sweet 1820. Geran. n. 79: g. Pelargoniear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Eckl. & Zeyh. 1835. En. pl. Afr. p. 70. — Rchb. 1837. Hdb. p. 290; 1841. Nom. p. 201. n. 7664.
DC. 1824. Pr. I. p. 658: sect. Pelargonii. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5278*e*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 731. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 322. — Endl. 1840. Gen. n. 6048*k*. p. 1168; 1841. Ench. p. 620.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII: g. Geraniear.

Jerdonia Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. 2. p. 10. t. 1352: nov. g. Cyrtandracear. (J. indica.)
Walp. 1852. Ann. bot. III. p. 96: g. Eudidymocarpear.?

*) Dicat. Jano Jenkinson, scriptori de plantis brit.

Jessenia*) Karsten 1856. Linnaea XXVIII. p. 387: nov. g. Arecinar. (*J. polycarpa.*) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 837.

Jiraseckia Dumort. vid. *seq.*

Jirasekia**) W. Schmidt 1791 in Usteri Ann. II. p. 124.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 299 (*Irasekia*): g. Primulacear. (Lysimachia tenella L.) — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 343.
Dumort. 1827. Belg. p. 29 (*Jiraseckia*): sect. Anagallidis. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4213*a*. p. 734; 1841. Ench. p. 356. — Miq. 1856 in Mart. Fl. Bras. fasc. XVI. p. 262.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 408; 1837. Hdb. p. 204: g. Anagallidear.
Rchb. 1841. Nom. p. 124. n. 4837: g. Anagallear.
Synon. Tiraseckia Sweet. (Steud.)

Joachimia***) Tenore 1807. Neap. p. 16. t. 5.
= Beckmannia Host.

Joannea Spreng. vid. *Johannia Willd.*

Joannesia Pers. vid. *Johannia Willd.*

Joanulloa Rchb. vid. *Juanulloa Ruiz & Pav.*

Jobaphes Philippi 1860. Fl. Atacam. p. 27. t. 4. f. C: nov. g. Labiatiflorar. (J. virgatus), nomine (err. *Tobaphes*) indicatum in Bot. Zeit. 1857. p. 681.

Jocaste DC. 1838. Prodr. VII. 1. p. 298: nomen correctum pro *Jacosta E. Meyer.*
Meisn. 1839. Gen. p. 211 (135): g. Chrysanthemear.
= Oligoglossa DC.

Jocaste†) Kunth 1850 in Abh. Berl. Ak. f. 1848. p. 33: nov. g. Smilacinear. (Smilacina purpurea Wall.)
Kunth 1850. Enum. V. p. 154: g. Convallariear.

Jocayena Rafin. vid. *Tocoyena Aubl.*

Jochroma vid. *Iochroma.*

Jodanthus vid. *Iodanthus.*

Jodes vid. *Iodes.*

Jodina vid. *Iodina.*

Jodopappus vid. *Iodopappus.*

Jödes vid. *Iödes.*

Johannesia „Vellozo Alografia dos Alcalis fixos p. 199" Gomes 1812. Mem. Ac. Lisboa III. Mem. dos corresp. p. 6. t. 1: nov. g. Monoec. Monadelph. (J. princeps.)
= Anda Marcgr.

*) Dicat. Algologo Car. Jessen.
**) Dicat. Joanni Jirasek.
***) Dicat. Joachim Murat, regi Neapolitano.
†) Jocaste Cadmi uxor.

Johannia*) Willd. 1803. Spec. III. 3. p. 1705. n. 1444: g. Syngenes. Aequal. — Par. Pers. 1807. Ench. II. p. 383. n. 1796 (*Joannesia*).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 535 (*Joannea*); 1826. Syst. III. p. 382. n. 2615; 1831. Gen. II. p. 606. n. 2932: g. Cynarear.
= Chuquiraga Juss.

Johnia**) Roxb. 1820. Fl. Ind. ed. Wall. I. p. 172 (*Cf.* Spreng. n. Entd. III. p. 93); ed. 1832. I. p. 168: nov. g. Triandr. Monogyn. (J. salacioides.) — Par. Schult. 1822. Mant. I. p. 253.
DC. 1824. Pr. I. p. 571: g. Hippocrateacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXVI. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Bartl. 1830. Ord. p. 380. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 398.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 175. n. 188: g. Rosaceis aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5386: g. Hippocratear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 44. n. 203. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 179.
Rchb. 1837. Hdb. p. 301: g. Salaciear.
= Salacia Linn.

Johnia Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 449: g. Clitoriear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 86 (61).
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 112: g. Glycinear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6646. p. 1291; 1841. Ench. p. 671. — Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5802. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Synon. Notonia Wight & Arn. (non DC.)

Johnsonia***) Catesby 1743. Carolin. II. p. 47. t. 47.
= Callicarpa Linn. (Endl. Gen. p. 637.)

Johnsonia Adans. 1763. Fam. II. p. 343: g. Pistaciar.
= Cedrela P. Browne.

Johnsonia Necker 1790. Elem. bot. II. p. 49. n. 684: nov. g. Areythophytor., a Lycio L. sejunctum.

Johnsonia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 287. Ed. Nees p. 143: nov. g. Asphodelear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 228. — Leman 1822. Dict. v. 24. p. 232. — Agdh 1823. Aphor. p. 164 (abnormium). — Bartl. 1830. Ord. p. 51 (desciscens). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 171.
Schult. 1822. Mant. I. p. 251: g. Triandr. Monogyn.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 169. n. 177; 1831. Gen. II. p. 526. n. 2587 (in Monadelph. Triandr.): g. Sarmentacear.
Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 272: g. Restiacear.

*) Dicat. Johanni, archiduci Austriae.
**) Dicat. Dr. John, Tranquebar.
***) Dicat. Thom. Johnson, botanico saeculi XVII.

Johnsonia R. Brown cont.
Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41: g. Xyridear. (?) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 58. n. 1153. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62: g. Xanthorhaeacear.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 131: g. Medeolear.
Endl. 1837. Gen. n. 1172. p. 152; 1841. Ench. p. 87; 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 40: g. Aphyllanthear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1689. — Meisn. 1842. Gen. p. 401 (305). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 205.
Kunth 1843. Enum. II. p. 647: g. Asphodeleis aff. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 256.

Johrenia*) DC. 1829. Coll. Mém. V. p. 54; 1830. Prodr. IV. p. 196: nov. g. Peucedanear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 345. — Tausch 1834. Flora I. p. 347. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 141. n. 5481. — Meisn. 1838. Gen. p. 147 (106). — Endl. 1839. Gen. n. 4480. p. 782; 1841. Ench. p. 379; 1850. Spl. V. p. 11. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 136. — Boiss. 1844. Ann. sc. nat. 3e sér. I. p. 303. Char. emend.
Fenzl 1843 in Russegg. Reise II. p. 960.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 510: g. Diclidospermar.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Peucedanidar.
Synon. Dichoropetalum Fenzl.

Joliffia**) „Bojer" Delile 1827. Mém. soc. h. n. Par. II. p. 314. t. 6: nov. g. Cucurbitacear. (J. africana.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 275. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 799. n. 4140.
DC. 1828. Pr. III. p. 316: g. Cucurbitear.
Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2770: g. Nhandirobear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 191.
Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 402: g. Joliffiear.
Telfairia Hook.

Joliffieae Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 402: trib. Cucurbitacear. Gen. unicum: Joliffia.

Jon vid. *Ion.*

Joncaceae Vent. vid. *Juncaceae Vent.*

Joncquetia***) Schreb. 1789. Gen. I. p. 308. n. 785: g. Decandr. Pentagyn. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 728. — Willd. 1799. Sp. II. p. 750. n. 908.
Batsch 1802. Tab. p. 67 (*Jonquetia*): g. Terebinthinacear.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 439. n. 1731: g. Terebinthacear. — Par. E. Meyer 1825. Nov. Act. Leop. XII. p. 811 (*Jonquenetia*).
Tapiria Juss.

Jondraba vid. *Iondraba.*

Jone vid. *Ione.*

Jonesia*) Roxb. 1795. Asiat. research. IV. p. 355; 1832. Fl. Ind. II. p. 218: nov. g. Heptandr. Monogyn. (J. asoca.) — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 287. n. 719. — Pers. 1805. Ench. I. p. 403. n. 908. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 362. — Hedw. 1806. Gen. p. 258. n. 1044.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 771; 1825. Syst. II. p. 167. n. 1398; 1830. Gen. I. p. 317. n. 1615: g. Leguminosar. (anomal.) — Par. Link 1821. En. I. p. 355. — Poir. 1822. Dict. v. 23. p. 600. — Jack 1835. Bot. Mag. Comp. I. p. 222. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1304.
Bronn 1822. Diss. p. 135: g. Intsiear.
DC. 1825. Pr. II. p. 487: g. Cassiear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 436. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 284. — Meisn. 1837. Gen. p. 97 (69).
Rchb. 1828. Consp. p. 155. n. 4105; 1841. Nom. p. 154. n. 6052: g. Ceratoniear.
Bartl. 1830. Ord. p. 415: g. Caesalpinear.
Spach 1834. Vég. phan. I. p. 110: g. Caesalpiniear. (verar.) — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6795. p. 1318; 1841. Ench. p. 674. — Brongn. 1843. En. genr. p. 132. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 609.
Benth. 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 73: g. Amherstiear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 556.
Synon. Saraca Burm.

Jonidia vid. *Ionidia.*

Jonidieae vid. *Ionidieae.*

Jonidiopsis vid. *Ionidiopsis.*

Jonidium vid. *Ionidium.*

Joniris vid. *Ioniris.*

Jonium vid. *Ionium.*

Jonopsidium vid. *Ionopsidium.*

Jonopsis vid. *Ionopsis.*

Jonquenetia E. Meyer vid. *seq.*

Jonquetia Batsch vid. *Joncquetia Schreb.*

Jonquilla**) Haworth 1831. Mon. Narciss. p. 7: nov. g. Narcissinear., ab Hermione disjunctum. *Cf.* Kunth Enum. V. p. 721.
Schult. 1830. Syst. VII. p. 961: subsect. Hermiones. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1289 *h* ... p. 179; 1841. Ench. p. 103 (*Jonquillia DC.*) — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1169. — Rchb. 1841. Nom. p. 44. n. 1611. 6. *a.*
Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 441: subg. Narcissi.
Römer 1847. Fam. nat. IV. p. 18. 234: sect. Narcissi.
— Queltiae Herb. pars.

Jonquillia „DC." Endl., Rchb. vid. *Jonquilla Haw.*

Jontanea Rafin. vid. *Tontanea Aubl.*

Jonthlaspi vid. *Ionthlaspi.*

Joosia***) Karsten 1858. Fl. Columb. I. p. 9. t. 5: nov. g. Cinchonear. (*Ladenbergia Wedd.*)

*) Dicat. Mart. Dan. Johrenio.
**) Dicat. Le Joliff.
***) Dicat. Denys Joncquet, medico Paris.

*) Dicat. Will. Jones, Calcutta.
**) Diminuticum vocis gallicae *Jono.*
***) Dicat. doctoribus Emilio et Guilielmo Joos.

Jordania*) Boissier & Heldr. 1849. Diagn. pl. or. nov. II. Nr. 8. p. 93: nov. g. Caryophyllear. (Heterochroae sp. Jaub. & Sp.) *Cf.* Flora 1850. p. 43.
Walp. 1851. Ann. bot. II. p. 103: g. Silenear.

Jorena Adans. 1763. Fam. II. p. 249: g. Sedorum. (*Synon. Alsinoides Lippi* 248.) = . . .?

Josepha Vellozo Fl. Flum. IV. t. 13. (*Josephia augusta Arrab.* ex Steud. Nom. I. p. 814.) = Buginvillaea Comm.

Josephia**) Knight & Salisb. 1809. Prot. p. 110: nov. g. Proteear.
Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 244: g. Proteacear.
Agdh. 1826. Aphor. p. 237: g. Embothriear.
Synon. Dryandra R. Brown.

Josephia „Arr." Steud. vid. *Josepha Fl. Flum.*

Josephia***) Wight 1851. Icon. V. 1. p. 19. t. 1742. 1743: nov. g. Vandear. *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 924.

Josephina Pers., Dumort. vid. *seq.*

Josephinia†) Vent. 1805. Malmais. t. 103; 1806. Mém. Inst. VII. 1. p. 71: nov. g. Bignoniar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 377: g. Didynam. Angiosperm. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 768. n. 2141; 1831. Gen. II. p. 483. n. 2383.
Pers. 1807. Ench. II. p. 174. n. 1518 (*Josephina*): g. Bignoniacear.
R. Brown 1810. Prodr. I. p. 519. Ed. Nees p. 375: g. Pedalinar.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 417: g. Bignoniear. (anomalar.) — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 247.
Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 779: g. Sesamear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 125. n. 3253. — Bartl. 1830. Ord. p. 176. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 249.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22 (*Josephina*): g. Pedaliear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 298 (206).
Endl. 1832. Linnaea VII. p. 11. t. 3. f. 74—78; 1839. Gen. n. 4181. p. 725; 1841. Ench. p. 351: g. Pedalinear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 235. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 626. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 63. — DC. 1845. Pr. IX. p. 255. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 761.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198; 1841. Nom. p. 116. n. 4537; g. Martyniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 670: g. Pedalear.

*) Dicat. Al. Jordan, Lugdunensi.
**) Dicat. Josepho Banks.
***) Dicat. Josepho Dalton Hooker.
†) Dicat. imperatrici Josephinae.

Jossinia „Comm. mss." DC. 1828. Prodr. III. p. 237: nov. g. Myrtear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 176. n. 4686. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38. — Bartl. 1830. Ord. p. 332. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 833. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 105. — Meisn. 1838. Gen. p. 109 (77). — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 119. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 467.
Rchb. 1837. Hdb. p. 253: g. Psidiear.
Endl. 1840. Gen. n. 6316 *aβ*. p. 1232; 1841. Ench. p. 651: subsect. Leucomyrti.
Rchb. 1841. Nom. p. 177. n. 6854. 2: sect. Myrti.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 36. 74: g. Myrtacear.
Synon. Eugeniae sp. Linn.; Myrti sp. Spreng.

Jovellana*) Ruiz & Pav. 1798. Fl. peruv. I. p. 12. t. 18: nov. g. Diandr. Monogyn. — Par. Cavan. 1799. Ic. V. p. 32. t. 453.
Pers. 1805. Ench. I. p. 15: sect. Baeae.
Hedw. 1806. Gen. p. 14: g. Personatar.
Juss. 1827. Dict. v. 48. p. 219: g. Scrophularinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 123. n. 3143: g. Antirrhinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 171.
D. Don 1835. Edinb. n. phil. journ. XIX. p. 112: g. Calceolariear. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 608. — Meisn. 1840. Gen. p. 305 (216). — Rchb. 1841. Nom. p. 117. n. 4580. (genuinar.)
Benth. 1835. Scroph. rev. p. 1: g. Verbascear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 3881. p. 671; 1841. Ench. p. 338. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 266.
Rchb. 1837. Hdb. p. 198: g. Lentibulariar.
Benth. 1846 in DC. Pr. X. p. 205: sect. Calceolariae. *Cf.* Clos 1848. Ann. sc. nat. 3e sér. X. p. 381.
Synon. Porotiddia G. Don?

Jovibarba DC. . . . . Pl. rar. jard. Genèv. n. 21. obs.; 1828. Prodr. III. p. 413: sect. Sempervivi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 158. n. 4190 *b*. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 123. — Koch 1836. Syn. p. 263. Ed. II. p. 290 (*Jovisbarba*). — Endl. 1839. Gen. n. 4623 *b*. p. 811; 1841. Ench. p. 405; 1850. Spl. V. p. 21. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 329.

Jovibarba Boissier 1848 in DC. Prodr. XII. p. 665: sect. Statices. (St. Jovibarba Webb.)

Jovisbarba Koch vid. *Jovibarba DC.*

Joxylon vid. *Ioxylon.*

Jozosmene Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 202.
= seq.

Jozoste Nees 1831 in Wall. Pl. As. rar. II. p. 63; 1833. Progr. p. 19: g. Daphnidior., serius cum Actinodaphne junctum.
Blume 1851. Mus. bot. Lugd. I. 23. p. 364: g. Daphnidiear.
Synon. Jozosmene Lindl.

*) Dicat. Casp. Melch. de Jovellanos.

Juanulloa*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 27. t. 4; 1799. Fl. peruv. II. p. 47. t. 185: nov g. Pentandr. Monogyn.
Röm. & Schult. 1819. Syst. IV. p. LIII. 559. n. 823: g. Solanear. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 253. — Rchb. 1828. Consp. p. 126. n. 3303. — Endl. 1839. Gen. n. 3862. p. 666; 1841. Ench. p. 332. — Meisn. 1840. Gen. p. 277 (185)? — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 57.
Bartl. 1830. Ord. p. 194: g. Solanacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 122. n. 4756 (*Joanulloa*): g. Physalidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 622: g. Curvembryar.
Miers 1849. Ann. and Mag. 2d. ser. III. p. 166: g. Solandrear.
Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 528: g. Lycinear. Sect.: Eujuanulloa, Physalina, Sarcophysa.
Synon. Ulloa Pers.; Brugmansia Hort. Swanalloia Hort.; Laureria Schl.; Sarcophysa Miers; Portea Tenore?

Jubaea**) HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 308. t. 96: nov. g. Cocoinar. — Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 309; 1841. Enum. III. p. 293 — Mart. 1824. Palm. fam. p. 19; 1846. Palmet. Orbign. — Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1633; 1841. Nom. p. 58. n. 2279. — Endl. 1837. Gen. n. 1776. p. 257; 1841. Ench. p. 136 (sphalm. *Tubaea*). — Meisn. 1842. Gen. p. 359 (267).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 876: g. Phoenicear.
Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 254: g Palmar. — Par. Spreng. 1825. Syst. II. p. 623. n. 1993; 1830. Gen. I. p. 449. n. 2219 (in Polyandr. Trigyn.). — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 17: g. Cocoinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 130.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 139: g. Cocoëar.
Synon. Molinaea Bert.

Jubelina A. Juss. 1837 in Deless. Ic. sel. III. p. 19. t. 32: nov. g. Malpighiacear. (J. riparia.)
Griseb. 1839. Linnaea XIII. p. 181 (sphalm. *Tubelina*): g. Banisteriear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 346.
A. Juss. 1840. Ann. sc. nat. 2e sér. XIII. p. 225; 1843. Arch. Mus. III. p. 579. t. 20: g. Hirear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 390. — Endl. 1850. Spl. V. p. 76. n. 5566 (*Jubelinia*).
Endl. 1840. Gen. n. 5566. p. 1059; 1841. Ench. p. 557: g. Pleuropterygiar. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 370.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7847: g. Triopteridear.
Walp. 1846. Rep. V. p. 340: g. Hiraeear.

Jubelinia Endl. vid. *praeced.*

Jubula Dumort. 1822. Comm. bot. p. 112: nov. g. Jungermanniacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Jungermanniear.
Dumort. 1831. Syll. Jung. p. 36; 1835. Obs. Jung. p. 12: g. Jubulear. Sect.: Jubulotybus, Ascolobium (exclusa 1835 sect secunda).
Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 200: g. Lejenniar.
Hampe 1837. Linnaea XI. p. 92: g. Lejeunear.
Nees 1838. Eur. Leberm. III. p. 210 not.: subg. Frullaniae. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. $472/_{10}a$. p. 1340; 1841. Ench. p. 28.
= Frullania Raddi.

Jubula Corda 1835 in Sturm Flora II. H. 26. 27. p. 152: g. Jungermanniacear.
= Radulae et Frullaniae sp.

Jubuleae Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 24. 35: subtrib. Jungermanniacear. Gen.: Phragmicoma, Jubula.
Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 12: trib. Jungermanniotypar. Gen.: Jubula, Frullania, Phragmicoma, Lepidolaena.
Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXV: subtrib. 7 Jungermanniear. Gen.: Radula, Madotheca, Frullania, Phragmicoma, Lejeunia. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 23. Gen. ead. (Porella loco Madothecae.) — Nees 1845. Syn. Hepat. p. 283. Gen.: Bryopteris, Thysananthus, Ptychanthus, Pragmicoma, Omphalanthus, Lejeunia, Frullania. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 549. Gen. ead. — Bayrh. 1849. Taun. p. 51.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1340; 1841. Ench. p. 27: trib. 2 Jungermanniacear. Gen. ut Nees 1838 et Ptychanthus.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 17: sect. Jungermanniear. foliosar. Gen. germ.: Lejeunia, Frullania.

Jubulidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 59: trib. Jungermannear. Gen. Jubulear. Endl. et Physananthus.

Jubulotypus Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 36: sect. Jubulae. (Jung. Hutchinsiae Hook.)
= Jubula Dumort. 1835.

Juchia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 133. n. 229: nov. g. Sphanidophytor., a Lobelia L. sejunctum.
. . .?

Juchia Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 11. 48: nov. g. Eubryoniear. (Bryonia hastata Lour.)

Jucunda Chamisso 1834. Linnaea IX. p. 456: nov. g. Osbeckiar.
Meisn. 1838. Gen. p. 113 (81): g. Miconiear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6230. p. 1216; 1841. Ench. p. 647. — Rchb. 1841. Nom. p. 174. n. 6738. — Walp. 1843. Rep. II. p. 140. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.

*) Dicat. Georg. Juan et Ant. Ulloa.
**) In honorem Jubae, regis Numidiae.

Jucunda Chamisso cont.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1375. 1443: g. Osbeckiear.
Naud. 1851. Ann. sc. nat. 3e sér. XVI. p. 122: sect. Miconiae — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 708.
Synon. Graffenrieda Mart.; Osbeckiae sp. DC.

Jürgensenia Turczan. 1847. Bull. soc. Mosc. XX. p. 151: nov. g. Zygophyllo et Julianiae aff. *Cf.* Bot. Zeit. 1848. p. 435 et Flora 1848. I. p. 315.
Walp. 1848. Ann. bot. I. p. 150: g. Zygophyllear. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 104. n. 6041 $_1$ (dubium).
= Bejaria Mutis. (Turcz. in Bull. Mosc. 1852. p. 180.)

Jürgensia*) Spreng. 1818 Anleit. II. 2. p. 806: g. Pentapetear. (*Medusa Lour.*)
Spreng. 1826. Syst. III. p. 6. 50. n. 2376; 1831. Gen. II. p. 538. n. 2639: g. Monadelph. Pentandr.
Rchb. 1828. Consp. p. 212^6. n. 5310^6: g. Dombeyacear.
Meisn. 1837. Gen. p. 33 (26): g. Hermanniear.?
= Commersonia Forst.? (Endl. Gen. p. 998.)

Jürgensia Rchb. 1841. Nomencl. p. 22. n. 769: g. Dictyotear. (*Agardhia Menegh.*, non aliorum.)

Jugiandinium Ung. vid. *Juglandinium*

Juglandaceae Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 180; 1847. Veg. kingd. p. 292: ordo Quernalium. Gen.: Juglans, Carya, Pterocarya, Engelhardtia.
= Juglandeae DC.

Juglandarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11: ordo Julosepalar. Fam.: Juglandineae.

Juglandeacites Sternb. 1838. Vers. II. p. 207: ordo plant. foss. Gen.: Juglandites.

Juglandeae DC. 1813. Théor. élém. p. 215. Ed. II. 1819. p. 245: ordo (50) Calyciflorar.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 343 (Gen. Tereb. p. 11): fam. Terebinthacear. Gen.: Juglans, Carya, Pterocarya. *Affine:* Decostea.
Agdh. 1825. Aphor. p. 209; 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: trib. Amentacear. Gen.: Juglans.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLV; 1832. Fl. exc. p. 489: div. Terebinthacear. Gen.: Juglans, Carya.
Rchb. 1828. Consp. p. 146: sect. Amyridear. Gen. ut Kunth.
Blume 1829. Fl. jav. fasc. XVII. XVIII. p. 3. Gen. jav.: Engelhardtia.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (87) Apetalar.
Bartl. 1830. Ord. p. 397: ordo (236) Terebinthinar. Gen. ut Kunth.
Lindl. 1833. Nix. p. 25: ordo Urticalium.

*) Dicat. Algologo Jürgens. Jeverensi.

Juglandeae DC. cont.
Spach 1834. Vég. phan. II. p. 163: fam. (11) Terebinthinear. Gen. ut Kunth et Engelhardtia.
Koch 1837. Syn. p. 638. Ed. II. p. 735: ordo Monochlamydear. Gen.: Juglans.
Meisn. 1837. Gen. p. 74 (54): trib. Terebinthacear. Gen. ut Spach.
Rchb. 1837. Hdb. p. 224; 1841. Nom. p. 145: subdiv. Terebinthinear. Gen. ut antea et 1841 Engelhardtia.
Endl. 1840. Gen. p. 1125; 1841. Ench. p. 597: ordo Terebinthinear. Gen. ut Spach et Juglandites. Accedit 1843 (Spl. III. p. 99 et 1850. Spl. V. p. 94) Platycarya. — Par. Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 439; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIV. Gen. foss.: Juglans (Juglandites), Juglandinium, Mirbellites.
Döll 1842. Flora II. p. 724: ordo Cupuliferar.
Brongn. 1843. En. genr. p. 134: fam. Amentacear. Gen. ut Kunth.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 158: fam. Dicotyledonear. apetalar. diclinar. Gen. ut Spach.
Synon. Juglandaceae Lindl.; Juglandineae Fries.

Juglandineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11. 12: fam. Juglandariear. Gen.: Juglans, Carya.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 55: fam. Juliflorar. Gen.: Juglans.

Juglandinium Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 241 (sph. *Jugiandinium*); 1846. Chlor. prot. p. LXXXV: nov. g. Juglandear. foss. — Par. Endl. 1850. Spl. V. p. 95. n. 5892/$_4$.

Juglandites Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XL: g. Dicotyledonum foss.
Sternb. 1838. Vers. II. p. 207: g. Juglandeacitum.
Endl. 1840. Gen. p. 1127: g. Juglandear. ex nuce fossili modo cognitum. — Par. Unger 1845. Syn. p. 240; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIV. — Endl. 1850. Spl. V. p. 95. Sect.: Hicorites, Eujuglandites.

Juglans*) Linn. 1737. Gen. p. 291. n. 727; 1737. Cliff. p. 448; 1740. Syst. p. 30; 1748. Ups. p. 286; 1753. Sp. II. p. 997; 1759. Syst. ed. X. p. 1272. n. 950; 1763. Sp. ed. II. p. 1415; 1764. Gen. ed. VI. p. 496. n. 1071; 1767. Syst. ed. XII. p. 630: g. Monoec. Polyandr. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 241. — Murr. 1774. Syst. p. 717; 1784. Syst. p. 858. — Reich. 1778. Gen. p. 492. n. 1169. — Lour. 1790. Coch. II. p. 572. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 645. n. 1446. — Pers. 1797. Syst. p. 903; 1807. Ench. II. p. 566. n. 2100. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 191. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 455. n. 1693; 1809. En. p. 978. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 220. (Sejungitur Carya.) — MBieb. 1819. Taur. cauc. III. p. 621. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 6. 165. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 631.

*) Nomen contractum ex: Jovis glans.

Juglans Linn. cont.
Gled. 1749. Berl. V. p. 122; 1764. Syst. p. 125. n. 516: g. Thalamostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat.: g. Amentacear. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 350. — Gis. 1792. Prael. p. 578. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 350; 1826. Syst. III. p. 865. n. 3127; 1831. Gen. II. p. 696. n. 3510. — Link 1822. En. II. p. 399.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Terebintor.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 195: g. Dodecandr. Trigyn.
Juss. 1789. Gen. p. 375: g. Terebintaceis aff. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 260.
Neck. 1790. El. III. p. 253. n. 1642: g. Axonophytor.
Gmel. 1791. Syst. p. 755: g. Dodecandr. Digyn.
Mönch. 1794. Meth. p. 696: g. Calycostemonis.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 457: g. Terebinthaceis aff.
Batsch 1802. Tab. p. 66: g. Terebinthinacear.
DC. 1805. Franç. IV. p. 617: g. Terebinthacear. — Par. Lois. 1825. Dict. v. 35. p. 181 *(Noyer)*.
Kunth 1824. Ann. sc. nat. II. p. 344 (Gen. Tereb. p. 12): g. Juglandear. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 209. — Rchb. 1828. Consp. p. 146. n. 3831; 1832. Fl. exc. p. 489; 1841. Nom. p. 145. n. 5629. — Bartl. 1830. Ord. p. 397. — Spach 1834. Vég. II. p. 165. — Koch 1837. Syn. p. 638. Ed. II. p. 735. — Meisn. 1837. Gen. p. 74 (54). — Endl. 1840. Gen. n. 5890. p. 1127; 1841. Ench. p. 597. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 507. — Brongn. 1843. En. genr. p. 134. — Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 139; 1846. Chlor. prot. p. LXXXII. — Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 113.
Dumort. 1827. Belg. p. 15: g. Nuculacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: g. Juglandinear. (distincta Carya.) — Par. Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 55.
Link 1831. Hdb. II. p. 461: g. Juliferar. — Par. Rabenh. 1837. Linnaea XI. p. 242.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 180; 1847. Veg. kd. p. 293: g. Juglandacear. — Par. Duch. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 678 *(Noyer)*.
Synon. Nux Tourn.; Nux juglans Rupp.

Jujuba Burm. 1737. Thes. zeyl p. 131. t. 61.
= Ziziphus Tourn.

Julacia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 53: ordo Solitegmiae. Fam.: Taxineae, Coniferae, Amentaceae, Cupuliferae, Piperiteae.

Julla C. Müll. 1851. Syn. Musc. II. p. 465: subsect. Rigodii. (Hypnum julaceum Vill.)
= Myurella Bryol. eur.

Juliana Rchb. vid. *seq.*

Juliania*) La Llave & Lexarza 1825. Nov. veg. descr. II. p. 4: nov. g. Decandr. Monogyn., Fagoniae aff. (J. caryophyllata.)
Endl. 1840. Gen. n. 6033. p. 1163; 1841. Ench. p. 616: g. Zygophyllear. (verar.) — Par. Walp. 1842. Rep. I. p. 493. — Meisn. 1843. Comm. p. 347. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479.
Rchb. 1841. Nom. p. 198. n. 7555 *(Juliana)*: g. Guajacear.
= Choisya HBK.

Juliania Schlechtend. 1843. Linnaea XVII. p. 746: nomen pro *Hypopterygio Schltd.* (nec. Brid.) propositum.
Walp. 1846. Rep. V. p. 420: g. Burseracear.

Julieta Lesch. mss.
= Lysinema R. Brown.

Juliferae Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 151: ordo 2 class. III. Gen.: Salix, Populus, Alnus, Betula, Carpinus, Quercus, Corylus, Castanea, Fagus, Xanthium.
Batsch 1802. Tab. p. 162: ordo Incompletar. Fam.: Amentaceae, Coniferae, Sempervirentes.
Link 1831. Hdb. II. p. 446: ordo 6 Amentacear. Gen. Halleriana (excepto Xanthio) et Ostrya, Platanus, Liquidambar, Comptonia, Myrica, Pistacia, Juglans, Carya.

Juliflorae Endl. 1837. Gen. p. 270; 1841. Ench. p. 156: class. Acramphibryor. Apetalor. Ordines: Casuarineae, Myriceae, Betulaceae, Cupuliferae, Ulmaceae, Celtideae, Moreae, Artocarpeae, Urticaceae (Cynocrambeae, Gunneraceae), Cannabineae, Antidesmeae (Putranjiveae, Forestiereae, Scepaceae, Garryaceae), Plataneae, Balsamifluae, Salicineae, Henslowiaceae), Lacistemeae.
Meisn. 1841. Gen. p. 345. 442 (256): class. 36 Monochlamydear. Ord.: Cupuliferae, Gunneraceae, Cynocrambeae, Garryaceae, Datisceae, Putranjiveae, Forestiereae, Scepaceae, Henslowiaceae?, Lacistemeae, Balsamifluae, Plataneae, Antidesmeae, Salicineae, Batideae, Celtideae, Urticaceae, Moreae, Artocarpeae, Trewiaceae, Cannabineae, Betulaceae, Ulmaceae, Myriceae, Casuarineae.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 55: class. Incompletar. Fam.: Juglandineae, Cupuliferae, Salicineae, Betulineae, Myriceae, Coniferae, Equisetaceae.

Julitegmia Dumort. 1827. Fl. belg. p. 9: ordo Simplitegmiae. Fam.: Ephedraceae, Coniferae, Taxineae, Amentaceae, Cupuliferae, Nuculaceae.

*) Dicat. Juliano Cervantes, Vincentii filio.

Julocroton Martius 1837. Herb. bras. p. 119: nov. g. ex typo Crotonis cordati Vell.
Endl. 1840. Gen. n. 5828. p. 1117; 1841. Ench. p. 588: g. Crotonear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 194. n. 7386. (genuinar.) — Klotzsch 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 417. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 281. — Didrichs. 1857. Nat. For. Vid. Medd. . . . . . Subgen.: Oligonychia, Eremadenia.
Meisn. 1840. Gen. p. 340 (253): g. Eucrotonear.
Baill. 1858. Euphorb. p. 374: g. Crotonidear. (*Synon. Heterochlamys Turcz.*)

Julosepalae Dumort. 1829. Anal. d. fam. p. 9. 11: class. (1) Sepalanthar. Ord.: Linarieae, Ephedrarieae, Popularieae, Corylarieae, Juglandarieae.

Julospermae Wiggers 1780. Prim. fl. Holsat. p. 74: ordo 4 Cryptogamiae. Gen.: Equisetum.

Julostylis Thwait. 1858. Nov. pl. zeyl. p. 30 (Müll. Ann. bot. VII. p. 402): nov. g. Hibiscear. (Kydia angustifolia Arn.)

Juncaceae Vent. 1799. Tabl. II. p. 150 (*Joncaceae*): ordo 4 class. III. Gen. §. 1: Aphyllanthes, Juncus. §. 2: Commelina, Tradescantia. §. 3: Narthecium, Veratrum, Colchicum.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 66: fam. Thalamauliae.
Agdh. 1823. Aphor. p. 156; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: ordo Glumiflorar. Trib.: Restiaceae, Junceae. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. Trib. eaed. et Xyrideae.
Rchb. 1828. Consp. p. 63; 1830. Fl. exc. p. 90: fam. Liliacear. Divis.: Junceae, Triglochinae, Melantheae. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 151. Divis.: Junceae, Scheuchzeria, Melantheae.
Bartl. 1830. Ord. p. 37: ordo (26) Juncinar. Divis.: Junceae, Aphyllantheae.
Koch 1837. Syn. p. 725. Ed. II. p. 837: ordo Endogenear. Gen.: Juncus, Luzula.
Endl. 1837. Gen. p. 130; 1841. Ench. p. 74: ordo Coronariar. Gen.: Luzula, Prionium, Juncus, Narthecium. Accedit 1843 (Spl. III. p. 58) Distichia. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 405 (309). Subord.: Junceae, Rapateaceae, Xerotideae, Kingiaceae, Calectasieae, Astelieae, Flagellarieae.
Kunth 1841. Enum. III. p. 295: ordo Monocotyledonum staminibus perigynis. Gen. ut Endl. 1837. *Affinia:* Astelieae, Rapateae, Flagellarieae, Xerotideae, Kingiaceae, Calectasieae.
Rchb. 1841. Nom. p. 46: fam. Liliiflorar. Divis.: Junceae, Veratreae, Colchiceae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 13: fam. Juncinear. Gen.: Luzula, Juncus, Flagellaria. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 133. Trib. ut Bartl.

Juncaceae Vent. cont.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 191: ordo Juncalium. Gen.: Luzula, Prionium, Juncus, Distichia, Rostkovia, Narthecium, Cephaloxys, Susum, Xerotes, Lomandra, Astelia, Kingia, Baxteria, Calectasia.
Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 154: fam. Monocotyledonum. Gen. ut Endl.
B. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 417: fam. Homoblastear.

Juncaginaceae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 210: ordo Alismalium. Gen.: Triglochin, Scheuchzeria, Ruppia, Potamogeton, Aponogeton, Cycnogeton, Ouvirandra.

Juncagineae Rich. 1815. Mém. Mus. I. p. 365: fam. Endorhizar. Gen.: Lilaea, Cathanthes, Triglochin, Scheuchzeria.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 244: fam. plant. Gen.: Triglochin, Lilaea.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 218: fam. plant. endogenar. phanerogamar. Gen.: Scheuchzeria, Triglochin.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (259) Spadicear.
Bartl. 1830. Ord. p. 73: div. Alismacear. Gen. ut Gray et Lilaea, Tetroncium.
Lindl. 1833. Nix. p. 35: ordo Fluvialium.
Endl. 1837. Gen. p. 127; 1841. Ench. p. 72: subordo Alismacear. Gen. ut Bartl.
Koch 1837. Syn. p. 671. Ed. II. p. 173: ordo Endogenear. Gen. ut Gray.
Kunth 1841. Enum. III. p. 141: ordo Monocotyledonum. Gen. ut Bartl.
Meisn. 1842. Gen. p. 364 (272): trib. Alismacear. Gen. ead. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 29. Gen. ut Gray. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 10. Gen. ut Bartl. — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 103. Gen.: Triglochin.
A. Juss. 1849 in Orb. Dict. XII. p. 416: fam. Aperispermear.
Synon. Juncagines Rich.

Juncagines Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt (1811) p. XIII: fam. Endorhizar.
Agdh. 1822. Aphor. p. 126; 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 584: div. Alismacear. Gen.: Scheuchzeria, Triglochin, Lilaea. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 113. Gen. ead.
= Juncagineae Rich.

Juncagines Wahlenb. 1824. Fl. suec. I. p. LXX: div. Tripetaloidear. Gen.: Butomus, Triglochin, Scheuchzeria, Juncus, Luzula.

Juncago Tourn. 1700. Inst. p. 266. t. 142: g. pl. class. VI.
Micheli 1729. Nov. pl. gen. p. 43. t. 31: g. pl. class. XV.
Mönch 1794. Meth. p. 614: g. Petalostemonis.
= Triglochin Linn.

Juncales Lindl. 1833. Nix. pl. p. 35: nixus Hypogynar., Ordines: Junceae, Philydreae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 190: nixus Endogenar. Ord.: Juncaceae, Orontiaceae.

Juncaria Clus. Hist. II. p. 147. f. 2.
= Ortegia Löfl.

Juncarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60: ordo Torochlamydar. Fam.: Xanthorhaeaceae, Juncineae, Rapateaceae, Restioneae.

Junceae Batsch 1802. Tab. affin. p. 152: fam. Culmalium. Gen.: Eriocaulon, Restio, Xyris, Aphyllanthes, Juncus, Scheuchzeria, Triglochin.
DC. 1805. Franç. III. p. 155: fam. (16) Monocotyledonum (phanerogamar.) Gen.: Caulinia, Acorus, Luzula, Juncus, Aphyllanthes, Abama. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 257. Ed. Nees p. 113. Nova gen.: Xerotes, Dasypogon, Calectasia.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 189: ordo 2 fam. plant. Gen.: Juncus, Luzula, Aphyllanthes, Triglochin, Scheuchzeria, Tofieldia, Helonias, Xerophyllum, Melanthium, Ornithoglossum, Zigadenus, Nolina, Wurmbea, Calochortus, Dasypogon, Calectasia, Xerotes.
DC. 1819. Theor. élém. p. 249 *(Joncées)*: ordo Endogenar. phanerogamar.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 159: fam. pl. endogenar. phanerogamar. Gen.: Acorus, Juncus, Luzula, Abama.
Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 237: ordo Monoperigynar. Gen.: Juncus, Dasypogon, Calectasia; Xerotes, Lomandra, Xyris, Aphyllanthes, Rapatea, Mayaca, Schmidtia, Spatanthus.
Agdh. 1823. Aphor. p. 157: trib. Juncacear. Gen.: Juncus, Luzula, Cephaloxis, Flagellaria. — Par. Ritg. 1831. Marb. II. p. 120. Gen. ead. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 134. Gen.: Cephaloxys, Juncus, Rostkovia, Marsippospermum, Prionium, Luzula, Xerotes, Kingia.
Laharpe 1827. Mém. soc. h. n. Par. III. p. 89.
Rchb. 1828. Consp. p. 63; 1830. Fl. exc. p. 91; 1837. Hdb. p. 152: div. Juncacear. Gen.: Cephaloxys, Luzula, Juncus. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 38. Gen. ead. et Xerotes, Kingia. — Rchb. 1841. Nom. p. 46. Gen.: Luzula, Prionium, Juncus, Narthecium; Astelieae; Rapateae; Flagellarieae; Xerotideae; Kingieae; Calectasieae; Aphyllantheae.
Link 1829. Hdb. I. p. 133: ordo 3 Endogenear. Subord.: Restiaceae, *genuinae* (gen.: Juncus, Luzula), Acorinae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62: trib. Juncinear. Gen.: Juncus, Cephaloxis, Luzula.
Lindl. 1830. Nat. syst. ed. I. Clav.: ordo (244) Hexapetaloidear.
Lindl. 1833. Nix. p. 35: ordo Juncalium.
Mart. 1835. Consp. p. 6: ordo 26.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 356.
Bernh. 1840. Flora II. p. 426: trib. Alliacear.
Meisn. 1842. Gen. p. 405 (309): subordo Juncacear. Gen.: Narthecium, Juncus, Prionium, Luzula.
Steud. 1855. Glum. II. p. 290: ordo Glumacear. Gen.: Luzula, Juncus, Distichia, Prionium.

Junci B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: ordo 13 plant. Gen.: Xyris, Juncus, Aphyllanthes, Tradescantia, Commelina, Trillium, Paris, Helonias, Melanthium, Veratrum, Scheuchzeria, Wachendorfia, Narthecium, Tillandsia, Acorus, Triglochin, Alisma, Sagittaria, Butomus, Sparganium.
Adans. 1763. Fam. II. p. 46: sect. 1 Liliacear. Gen.: Juncus, Juncoides, Aphyllanthes, Abalum, Scheuzeria, Veratrum, Vachendorfia, Abama, Acorus, Tradescantia, Commelina.
Juss. 1789. Gen. p. 43: ordo 3 class. III. Gen. §. 1: Eriocaulon, Restio, Xyris, Aphyllanthes, Juncus. §. 2: Rapatea, Mayaca, Pollia, Callisia, Commelina, Tradescantia. §. 3: Butomus, Damasonium, Alisma, Sagittaria. §. 4: Cabomba, Scheuchzeria, Triglochin, Narthecium, Helonias, Melanthium, Veratrum, Colchicum.

Juncinae Link 1821. Enum. I. p. 444.
Bartl. 1830. Ord. p. 34: class. (X.) Monocotyledoneor. Ord.: Restiaceae, Juncaceae, Xyrideae, Commelinaceae.
Leun. 1849. Schul-Naturg. II. p. 198: ordo Eleutherogynar. Fam.: Juncaceae.

Juncineae Jaume St. Hil. 1805. Expos. fam. I. p. 108. t. 17: fam. plant. Gen. Juncor. Juss. 1789. Accedunt in §. 3 Brasenia et in §. 4 Pleea, Zigadenus, Curculigo, Merendera.
Dumort. 1827. Belg. p. 142: fam. Liliflorae. Gen.: Abama, Luzula, Juncus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 60. 62: fam. Juncariear. Trib.: Junceae, Abameae.
Brongn. 1843. Én. genr. p. XIV. 12: class. Monocotyledonear. Fam.: Restiaceae, Eriocauloneae, Xyrideae, Commelyneae, Juncaceaé.
Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 120: class. (51) Monocotyledoneor. Fam.: Commelinaceae, Xyrideae, Juncaceae, Restiaceae.

Juncoideae Link 1822. Enum. II. p. 426.
= Juncaceae DC.

Juncoides Dillen. 1719. Nov. pl. gen. p. 166: nov. g. Junco simile.
Micheli 1729. Nov. gen. p. 41. t. 31: g. pl. class. XV.
Adans. 1763. Fam. II. p. 47: g. Juncor.
Scop. 1772. Carn. I. p. 258: sect. Junci.
= Luzula DC.

Juncotypus Dumort. 1827. Fl. belg. p. 142: sect. Junci. (J. effusus, conglomeratus, etc.)

Juncus Tourn. 1700. Inst. p. 246. t. 127: g. pl. class. VI.
Linn. 1737. Gen. p. 104. n. 295; 1737. Cliff. p. 137; 1740. Syst. p. 22; 1753. Sp. I. p. 325; 1759. Syst. ed. X. p. 987. n. 396; 1762. Sp. ed. II. p. 463; 1764. Gen. ed. VI. p. 173. n. 437; 1767. Syst. ed. XII. p. 250. n. 433: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Scop. 1772. Carn. I. p. 254. Sect.: legitimi, Juncoides. — Murr. 1774. Syst.

Juncus Tourn. cont.
p. 279; 1784. Syst. p. 340. — Reich. 1778. Gen. p. 175. n. 471. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 230. n. 590. — Lour. 1790. Coch. I. p. 213. — Gmel. 1791. Syst. p. 571. — Pers. 1797. Syst. p. 362; 1805. Ench. I. p. 383. n. 846. — Willd. 1799. Sp. II. p. 204. n. 670. — Thunb. 1818. Fl. cap. II. p. 339.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 252: g. Graminibus adfine.
Linn. 1747. Cl. plant. p. 343: g. Rosaceor.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 64: g. Lilior.
Gled. 1749. Berl. V. p. 123; 1764. Syst. p. 75. n. 314: g. Thalamostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 239.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 28: g. Calamariar.?
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Juncor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 44.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Tripetaloidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 167.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 462: g. Liliatar.
Rüling 1774. Ord. pl. p. 35: g. Juncos et Carices conjungens.
Scop. 1777. Intr. p. 81: g. Liliacear.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 53. t. 15. f. 5 (bufonius et pilosus).
Neck. 1790. El. III. p. 193. n. 1558: g. Gonoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 152: g. Juncacear.
Rostk. 1801. Diss. bot. de Junco.
Batsch 1802. Tab. p. 152: g. Juncear. — Par. Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 238. Sect.: Luzula, Cephaloxis, Rostkowia, Marsipospermum.
Host 1805. Gram. Austr. III. p. 54. t. 80—100: g. Graminum.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 109: g. Juncinear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 247. n. 1003.
= Juncus Rupp. et Luzula DC.

Juncus Rupp. 1718. Fl. jen. p. 131. Ed. Hall. 1745. p. 144: g. plant. class. VI, disjuncta Cyperella a Linnaeano discrepans.
Micheli 1729. Nov. gen. p. 37. t. 31: g. pl. class. XV.
Adans. 1763. Fam. II. p. 47: g. Juncor. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XX. 175.
Cram. 1803. Disp. p. 23 in Triandr. Monogyn. (J. conglomeratus, effusus, etc.)
DC. 1805. Franç. III. p. 162; 1815. V. p. 307: g. Juncear. (Distinguitur Luzula.) — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 258. Ed. Nees p. 114. — HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 235. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 190. — Gray 1821. Brit. pl. II. p. 160. — Link 1821. En. I. p. 305; 1829. Hdb. I. p. 135. (genuinar.) — Kunth 1822. Syn. I. p. 255; 1838. Berol. II. p. 276. — Lois. 1822. Dict. v. 24. p. 234 *(Jonc)*. — Agdh. 1823. Aphor. p. 157. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 103. n. 1275; 1830. Gen. I. p. 270. n. 1410. Sect.: Cephaloxys, Rostcovia, Marsippospermum. — D. Don 1825. Nepal. p. 43. — Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1287 (sect. Rostkovia, Marsippospermum, Juncus, Prionoschoenus);

Juncus Rupp. cont.
1830. Fl. exc. p. 93; 1841. Nom. p. 46. n. 1674 (sect. ut Endl.). — Ledeb. 1830. Alt. II. p. 46; 1853. Ross. IV. p. 221. — Bartl. 1830. Ord. p. 38. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 93. — Hook. 1840. Fl. bor. am. II. p. 189. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1157. — Meisn. 1842. Gen. p. 405 (309). — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 405. Sect.: Steirocaulos, Steirochloa. — E. Meyer 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 46. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 626. Sect.: Steirocaulos, Arthrophyllon, Cephalophora, Isophyllon. — Webb 1850. Canar. III. p. 353. — Hook. f. 1853. N. Zeal. I. p. 262. — Steud. 1855. Glum. II. p. 295. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 246. — Gren. (& Godr.) 1856. France III. p. 338.
Willd. 1809. Enum. p. 390: g. Hexandr. Monogyn. — Par. Nutt. 1818. Gen. I. p. 227. — Gaud. 1828. Helv. II. p. 469. 540.
Meyer 1819. Junci gen. mon. (Gött.); 1823. Synops. Juncor.
Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 142.
Wahlenb. 1824. Suec. I. p. 208: g. Tripetaloidear.
Dumort. 1827. Belg. p. 142: g. Juncinear. Sect.: Ozophyllum, Tenageia, Marsippospermum, Juncotypus.
Laharpe 1827. Mém. soc. h. n. Par. III. p. 104.
Endl. 1837. Gen. n. 1049. p. 130; 1841. Ench. p. 75: g. Juncacear. Sect.: Juncus, Marsippospermum, Cephaloxys. — Par. Koch 1837. Syn. p. 726. Ed. II. p. 838. — Kunth 1841. Enum. III. p. 315. — Nees 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 126. — Brongn. 1843. En. genr. p. 13. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 192. (restrict.) — Seub. 1847 in Mart. Fl. Bras. fasc. VIII. p. 119. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 153 *(Jonc)*. Sect. ut Endl.
Synon. Junci Linn. pars; Stygiaria et Tenageia Ehrh.

Juncus Desvaux 1808. Journ. bot. I. p. 321: g. disjunctis Marsippospermo et Cephaloxyde restrictum.
Desv. 1828. Ann. sc. nat. XIII. p. 41: g. Juncinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1287*c*; 1841. Nom. p. 46. n. 1674. 1: sect. Junci. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1049*a*. p. 131; 1841. Ench. p. 75.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62: g. Juncear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 134.
Synon. Rostkovia Desv.; Juncotypus Dumort.

Jundzillia*) Andrz. mss.
= Lepidii sect. Cardaria DC.

Jungeae D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 224: trib. Labiatiflorar. Gen.: Jungia, Pleocarphus. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 173.

---

*) Dicat. X. Bonif. Stanislaw Jundzill, scriptori botan. 1791.

Jungermania Necker vid. *Jungermannia Rupp.*

Jungermannarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: ordo Mitrogynar. Fam.: Jungermanniaceae, Cephalotheceae, Anthocereae, Targioniaceae.

Jungermanneae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 59: subordo Jungermanniacear. Trib.: Metzgeridae, Aneuridae, Haplolaenidae, Diplomitridae, Codonidae, Jubulidae, Ptilidae, Mastigophoridae, Trichomanidae, Geocalycidae, Jungermannidae, Gymnomitridae.

Jungermannia*) Rupp. 1718. Fl. jen. p. 345. Ed. Hall. 1745. p. 404: g. Muscor. — Par. Neck. 1771. Meth. musc. p. 126. 260. (gemmascentium — *Jungermania.*) — Roth 1788. Germ. I. p. 479. (hepaticor.) — Gmel. 1791. Syst. p. 1347.

Micheli 1729. Nov. gen. p. 6. t. 5: g. pl. class. I.

Linn. 1737. Gen. p. 324. n. 1794; 1740. Syst. p. 32; 1753. Sp. II. p. 1131; 1759. Syst. ed. X. p. 1337. n. 1059; 1763. Sp. ed. II. p. 1597; 1764. Gen. ed. VI. p. 564. n. 1196; 1767. Syst. ed. XII. p. 705: g. Algar. — Par. Gled. 1749. Berl. V. p. 135. — Scop. 1772. Carn. II. p. 343. — Murr. 1774. Syst. p. 802; 1784. Syst. p. 953. — Reich. 1778. Gen. p. 560. n. 1313. — Thunb. 1784. Fl. jap. p. 343. — Gis. 1792. Prael. p. 611. — Pers. 1797. Syst. p. 992.

Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 120: g. Muscis adfine.

Adans. 1763. Fam. II. p. 15: g. Hepaticar. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 8. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 764. n. 1662. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 40. — Roth 1800. Germ. III. p. 362. — Schrad. 1801. Journ. Bot. I. p. 66. — Batsch 1802. Tab. p. 266. — GMS. 1802. Fl. Wett. III. 2. p. 14. 140. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 277. — Rebent. 1804. Neom. p. 275. — DC. 1805. Franç. II. p. 425; 1815. V. p. 194. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 25. — Mart. 1817. Erlang. p. 127. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 71. — Leman 1822. Dict. v. 24. p. 271. — Agdh. 1822. Aphor. p. 104. — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 124. — Lindenb. 1829. Syn. Hepat. p. 14.

Gled. 1764. Syst. p. 297. n. 1198: g. Muscosar. calyculatar.

Neck. 1770. Act. Ac. Theod. Pal. II. p. 447: g. Algacear. (*Jungermania*).

Rüling 1774. Ord. pl. p. 35: g. Algas et Muscos conjungens.

Scop. 1777. Intr. p. 358: g. Muscoidear.

Wigg. 1780. Holsat. p. 81: g. Coleofissar.

Mönch 1794. Meth. p. 748: g. Hepaticor.

Hoffm. 1795. Crypt. p. 81: g. Ecalyptrator.

Jungermannia Rupp. cont.

Lühnem. 1809 in Schrad. n. Journ. III. 3. p. 39: g. Eccalyptrator.

Schwägr. 1814. Musc. Hepat. prodr. p. 13: g. Muscor. hepaticor. — Par. Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 779. — Spreng. 1827. Syst. IV. p. 217. n. 3347; 1831. Gen. II. p. 737. n. 3741.

Ritg. 1831. Marb. II. p. 108: g. Dysbryor.

Wallr. 1831. Fl. crypt. I. p. 46: g. unicum Lichenastror. tetracephalor.

Ekart 1832. Syn. Jungerm.: g. plantar. Calyptratar. deoperculatar.

Math. 1853. Belg. II. p. 74: g. Jungermanniear.

= Jungermannieae Nees.

Jungermannia Auctor.: g. magis minusve restrictum.

Neck. 1790. El. III. p. 343. n. 1757: g. Athrosophytor. Disjunguntur Nitophyllum, Dinckleria, Richardsonia, Heimea.

Libert 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 372. Emittitur Lejeunia.

Raddi 1820. Mem. soc. Modena XVIII. p. 17. 25. Ed. Nees 1841. p. 3. 8: g. Muscor. frondosor. Distinguuntur Bellincinia, Antoiria, Frullania, Candollea, Fossombronia, Calypogeja, Metzgeria, Römeria, Pellia.

Gray 1821. Brit. pl. I. p. 695: g. Jungermannidear. (*g. cf.*), emissis multis restrict. (= Ptilidium Nees, Sendtnera Endl., Lepidozia, Lophocolea et Jungermanniae sp. Nees.)

Raddi 1822. Crypt. bras. p. 13. 18. Emittuntur Frullanoides, Viviania.

Dumort. 1822. Comm. bot. p. 113: g. Jungermanniacear. Sejunguntur Mesophylla, Radula, Jubula, Madotheca, Lejeunia, Phragmicoma, Dilaena, Saccogyna, Cincinnulus, Thricholea, Codonia, Fasciola, Aneura, Schisma, Mniopsis. — Par. Corda 1829 in Opiz Beitr.; 1830 in Sturm Flora II. 19 et 20. p. 6. 28 etc. Disjunguntur Gymnomitrion, Sarcoscyphos, Alicularia, Cheiloscyphos, Calypogeia, Syckorea, Lejeunia, Blasia, Diplomitrion, Metzgeria, Pellia. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 78. — Simil. Endl. 1836. Gen. p. 45. n. 474. Distinguuntur Codonia, Gymnomitrium et Sarcoscyphus.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69; 1831. Syll. Jung. p. 44: g. Jungermanniear. Sect. (1831): Diplophyllum, Blepharozia, Aplozia, Gymnocolea, Lophozia, Lophocolea, Cephalozia, Anthelia, Blepharostoma. — Simil. Hampe 1837. Linnaea XI. p. 90.

Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 102. 143; 1836. ibid. II. p. 1: g. Jungermanniar. propriar.

Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 16: g. Aplozicar. restrict., antea sect. *Aplozia.*

Jungermannia A. Braun 1821. Flora II. p. 756: g. disjuncta Merkia restrict.

Rchb. 1828. Consp. p. 31. n. 532: g. Entophyllinor. Sect.: Carpolepis, Conianthus, Bellinginia, Antoiria, Frullania, Candollea, Jungermannia (Raddi), Fossombronia, Calypogeia, Porella?

*) Dicat. Lud. Jungermann, prof. bot. Giess., tandem Altdorf.

Jungermannia A. Braun cont.
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 49: g. Jungermanniear. (foliosar.) — Par. Genth 1836. Nass. I. p. 75.
= Jungermanniaceae foliosae Rabenh.

Jungermannia Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXII; 1844. Syn. Hepat. p. 73: g. Jungermannidear. arctissime restrictum. — Simil. Endl. 1841. Spl. I. n. 473. p. 1344; 1841. Ench. p. 28. — Lehm. 1846. Pl. Preiss. II. p. 122. — Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 34. — Bayrh. 1849. Taun. p. 40.
Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 48; 1842. Pl. cell. Cub. p. 454: g. Jungermanniear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 23. n. 809. Sect.: Diplophylleia, Jungermannia.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 60: g. Jungermannidar.
Mitten 1855 in Hook. f. N. Zeal. II. p. 127: g. Hepaticar. foliosar.

Jungermanniacea Rchb. Fl. exc. p. L: vid. *Jungermanniea Rchb.*

Jungermanniaceae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 112: trib. 2 Jungermannidear. Gen. §. 1. *Foliosae:* Phragmicoma, Jubula, Radula, Mesophylla, Jungermannia, Thricholea, Saccogyna, Cincinnulus, Schisma, Marsupella. §. 2. *Lemnisceae:* Dilaena, Fasciola, Aneura, Scopulina, Blasia. — Par. Dumort. 1831. Syll. Jung. p. 24. 35. Subtrib.: Jubuleae, Jungermannieae, Saccogyneae, Acoleae, Mesophylleae.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68. 69: fam. Jungermannariear. Trib.: Lejeuniaceae, Jungermannieae, Blasieae.
Corda 1829 in Opiz Beitr. I.; 1830 in Sturm Jungerm. p. 6: trib. Hepaticinor. Gen.: Gymnomitrion, Sarcoscyphos, Alicularia, Cheiloscyphos, Jungermannia, Calypogeia, Syckorea, Lejeunia, Blasia, Diplomitrion, Metzgeria, Pellia.
Lindl. 1833. Nix. p. 37: ordo Muscalium.
Endl. 1836. Gen. p. 45: ordo Hepaticar. Gen.: Codonia, Gymnomitrium, Sarcoscyphus, Jungermannia. — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1338; 1841. Ench. p. 27. Trib.: Frondosae, Jubuleae, Ptilidia, Mastigophoreae, Trichomanoideae, Geocalyceae, Jungermannideae, Gymnomitria. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 59. Subord.: Jungermanneae, Anthoceroteae.
Rchb. 1837. Hdb. p. 136: fam. Thallobryor. Divis.: Blasieae, Geocalyceae, Jungermannieae. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 23. Divis.: Jungermannieae, Ptilidieae, Frondosae.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 12: fam. Hepaticar. Trib.: *frondosae* (sect.: Metzgerieae, Aneureae, Haplolaeneae, Diplomitrieae, Codonieae), *foliosae* (sect.: Jubuleae, Platyphyllae, Ptilidieae, Trichomanoideae, Geocalyceae, Jungermannideae, Gymnomitria).

Jungermanniaceae Dumort. 1835. Rec. obs. Jung. p. 1. Series: Jungermanniotypae, Blasiaceae.

Jungermannidae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 60: trib. Jungermannear. Gen. Jungermannidear. Nees 1838 et Gymnanthe.

Jungermannideae Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 678. 683: div. Hepaticar. Gen.: Riccardius, Pallavicinius, Herverus, Papa, Blasia, Maurocenius, Salviatus, Pandulphinius, Marchesinius, Cavendishia, Martinellius, Mylius, Nardius, Jungermannia, Bazzanius, Scalius, Cesius, Herbertus, Lippius, Kantius.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 68 *(Jungermanideae):* fam. Urnuliniae.
Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 6: div. Hepaticar. Trib.: Lejeuniaceae, Jungermanniaceae, Blasiaceae.
Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXII; 1844. Syn. Hepat. p. 22: subtrib. Jungermanniear. Gen.: Plagiochila, Jungermannia, Lophocolea, Harpanthus, Chiloscyphus, Gymnoscyphus?, et 1844 Scapania, Sphagnoecetis, Liochlaena, Pleuranthe. — Par. Bayrh. 1849. Taun. p. 38. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 548. Gen. ut Nees 1844.
Endl. 1841. Spl. I. p. 1343; 1841. Ench. p. 28: trib. Jungermanniacear. Gen. ut Nees 1838.
Rabenh. 1848. Krypt. II. 3. p. 29: sect. Jungermanniacear. foliosar. Gen. ut Nees.

Jungermanniea Rchb. 1828. Consp. p. 30; 1832. Fl. exc. p. L *(Jungermanniacea):* fam. Sporangibryor. Divis.: Hypophyllina, Epiphyllina, Entophyllina, Eleutherophyllina.

Jungermannieae Dumort. 1831. Syll. Jungerm. p. 24. 37: subtrib. Jungermanniacear. Gen.: Radula, Jungermannia, Thricolea, Chiloscyphus, Pleuroschisma.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: trib. Jungermanniacear. Gen.: Phragmicoma, Jubula, Radula, Mesophylla, Jungermannia, Tricholea, Saccogyna, Cincinnulus, Schisma, Marsupella, Mniopsis.
Nees 1833. Eur. Leberm. I. p. 84. 99. 106: trib. (1) Hepaticar. Subtrib.: Gymnomitria, Lejeuniae, Ptilidia, Trichomanoideae, Geocalyceae, Jungermannieae *propriae* (gen. unicum: Jungermannia), Frondosae. — Par. Bisch. 1835. Nov. Act. Leop. XVII. 2. p. 960. — Nees 1838. Eur. Leberm. IV. p. XXI. Subtrib.: Gymnomitria, Jungermannideae, Geocalyceae, Trichomanoideae, Mastigophoreae, Ptilidia, Jubuleae, Frondosae. — Mont. 1840 in Webb Canar. IV. p. 46. Gen.: Plagiochila, Jungermannia, Lophocolea, Radula, Madotheca, Frullania, Lejeunia, Fossombronia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 3. — Nees 1844. Syn. Hepat. p. 1. *A. Foliosae.* Subtrib.: Gymnomitria, Coelocaules, Jungermannideae, Geocalyceae, Trichomanoideae, Ptilidieae, Platyphyllae, Jubuleae. *B. Frondosae.* Subtrib.: Codonieae, Diplomitrieae, Haplolaeneae, Aneureae, Metzgerieae. — Mont. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 548. Subtrib. ut Nees 1844.
Hüb. 1834. Hepat. germ. p. 33: ordo Hepaticinor. Gen.: Blasia, Cordaea, Gymnomitrion, Echinomitrion, Jungermannia.

Jungermannieae Dumort. cont.
Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 15: trib. Jungermanniotypar. Subtrib.: Aplozieae, Cephalozieae.
Genth 1836. Nass. I. p. 67: ordo Hepaticor. Gen. ut Hüb. (excepta Cordaea.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 137; 1841. Nom. p. 23: div. Jungermanniacear. Subdivis. (1841): Gymnomitrieae, *genuinae* (gen.: Plagiochila, Jungermannia, Lophocolea, Harpanthus, Chiloscyphus, Gymnoscyphus?), Geocalyceae, Trichomanoideae, Mastigophoreae, Jubuleae.

Jungermannieae Mathieu 1853. Fl. Belg. II. p. 74: trib. Hepaticar. Gen.: Jungermannia, Marchantia, Anthoceros, Targionia.

Jungermannioidei Brid. 1827. Bryol. II. p. XLVI: fam. unica Hypophyllocarpor. Gen.: Helicophyllum, Hypopterygium, Cyathophorus, Racopilum.

Jungermanniotypae Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 11: series Jungermanniacear. Trib.: Lejeuniaceae, Jubuleae, Raduleae, Jungermannieae, Pleuroschismeae, Tricholeae, Saccogyneae, Acoleae, Mesophylleae.

Junghansia Gmel. 1791. Syst. p. 259: nov. Tetrandr. Monogyn. *Cf.* Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 282.
= Curtisiae Ait. pars.

Junghausia DC. Prodr. II. p. 12 et Endl. Gen. p. 799 in synon. Curtisiae: vid. *Junghansia Gmel.*

Junghuhnia Corda 1842. Anl. Mycol. p. 195: g. Polyporeor., pro *Laschia Jungh.* propositum. — Par. Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487 *(Junguhnia)*.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41: g. Agaricinor.
= Aschersonia Endl. (Synon. a Corda citatum.)

Jungia*) Linn. f. 1781. Suppl. p. 58. n. 1422: g. Syngenes. Polygam. Segregat. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 797. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 589. n. 1348. — Gmel. 1791. Syst. p. 1281. — Pers. 1797. Syst. p. 839; 1807. Ench. II. p. 498. n. 1956. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 2391. n. 1572.
Juss. 1789. Gen. p. 175: g. Cinarocephalar. (anomalar.) — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 387.
Neck. 1790. El. I. p. 94. n. 170: g. Siphoniphytor.
Gis. 1792. Prael. p. 540: g. Oppositifoliar.
Batsch 1802. Tab. p. 251: g. Capitatar.
Lagasc. 1811. Amen. nat. I. p. 36: g. Chaenanthophorar.
DC. 1812. Ann. Mus. XIX. p. 67: g. Labiatiflorar.
Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 283: g. Nassauviear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 100. n. 2276. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Bartl. 1830. Ord. p. 137.

*) Dicat. Joachim Jung, prof. Rostock.

Jungia Linn. cont.
Cass. 1825. Dict. v. 34. p. 205; 1830. v. 60. p. 584: g. Trixidear. — Par. Less. 1830. Linnaea V. p. 35; 1832. Syn. p. 414. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 55. — Endl. 1838. Gen. n. 2954. p. 491; 1841. Ench. p. 249. — Meisn. 1839. Gen. p. 232 (142). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 33. — Rchb. 1841. Nom. p. 96. n. 3773. Sect.: Jungia, Martrasia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 559; 1826. Syst. III. p. 506. n. 2757; 1831. Gen. II. p. 625. n. 3103: g. Perdiciear.
D. Don 1830. Linn. Trans. XVI. 2. p. 224: g. Jungear. *Cf.* Linnaea V. Litt. p. 173.
Synon. Trinacte Gärtn.; Rhinactina Willd.; Dumerilia Lag.; Martrasia Lag.

Jungia Löfl. . . .
= Ayenia Linn. (DC. Pr. VII. 1. p. 55 not.)

Jungia Gärtn. 1788. Fruct. I. p. 175. t. 35. f. 5: nov. g. pro Philadelpho imbricato Sol. mss. propositum.
= Schidiomyrtus Schauer.

Jungia „Heist." Mönch 1794. Meth. p. 378: g. Petalostemonis. (Salvia mexicana L.)
Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 181: sect. Salviae.
= Salviae sect. Calosphace Benth.

Junguhnia Lév. vid. *Junghuhnia Corda.*

Junia Adans. 1763. Fam. II. p. 165: g. Vaccinior.
= Clethra Linn.

Junia Dumort. 1822. Comm. bot. p. 82: nov. g. Laticear. (Phallus Hadriani.)
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 74: g. Clathridar. *Cf.* Orb. Dict. III. p. 736.
= Hymenophallus Nees.

Junipereae Spreng. 1817. Anleit. II. 1. p. 214: ordo Coniferar. Gen.: Juniperus, Thuia, Cupressus, Casuarina, Ephedra, Batis.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXVII: div. Coniferar. Gen.: Thuia, Cupressus, Taxodium, Juniperus.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: trib. Coniferar. Gen.: Juniperus.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 161: subdiv. Cupressinar. Gen.: Thuja, Juniperus.

Juniperinae Endl. 1847. Syn. Conif. p. 5; 1847. Gen. Suppl. IV. p. 1: div. Cupressinear. Gen.: Juniperus.

Juniperites Brongn. 1828. Dict. v. 57. p. 112; 1828. Prodr. p. 108: g. foss. Coniferar. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1814. p. 264; 1841. Ench. p. 247.
Endl. 1842. Spl. II. p. 25. n. $1796/_1$: g. Cupressinar. foss.
Unger 1843. Chlor. prot. p. 80. t. 21 (1846. p. LXXII); 1845. Syn. pl. foss. p. 189: g. Cupressinear. — Par. Endl. 1847. Syn. Conif. p. 271; 1847. Gen. Spl. IV. p. 11. n. $1816/_4$. Sect.: Oxycedrites, Sabinites. — Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 120.
Synon. Thuyites sp. Sternb.

Juniperus*) Tourn. 1700. Inst. p. 588. t. 361: g. pl. class. XIX.
Rupp. 1718. Fl. jen. p. 316: g. pl. class. XV. (Ed. Hall. 1745. p. 336 in class. XVI.)
= Juniperi Linn. pars.

Juniperus Linn. 1737. Gen. p. 311. n. 764; 1737. Cliff. p. 464; 1740. Syst. p. 31; 1748. Ups. p. 299; 1753. Sp. II. p. 1038; 1759. Syst. ed. X. p. 1297. n. 1005; 1763. Sp. ed. II. p. 1470; 1764. Gen. ed. VI. p. 531. n. 1134; 1767. Syst. ed. XII. p. 660: g. Dioec. Monadelph. — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 267. — Murr. 1774. Syst. p. 749; 1784. Syst. p. 894. — Reich. 1778. Gen. p. 527. n. 1240. — Lour. 1790. Coch. II. p. 636. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 705. n. 1552. — Pers. 1797. Syst. p. 936. — Michx. 1803. Fl. bor. am. II. p. 245. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 851. n. 1841; 1809. En. p. 1023. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 245. — Gaud. 1830. Helv. VI. p. 201. 298. — Roxb. 1832. Ind. III. p. 838.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 146: g. Coniferar. — Par. Linn. 1751. Phil. bot. p. 28; 1764. Ord. nat. — B. Juss. 1759 in Ht. Trian. — Scop. 1777. Intr. p. 354. — Juss. 1789. Gen. p. 413. — Gis. 1792. Prael. p. 586. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 579. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 327. — DC. 1805. Franç. III. p. 278. — Pers. 1807. Ench. II. p. 632. n. 2286. — Schoub. & Mirb. 1812. Bull. soc. philom. p. 122. — Mirb. 1815. Élém. II. p. 907. — Lois. 1820. Dict. v. 18. p. 324 (*Genévrier*). — Link 1822. En. II. p. 434. — D. Don 1825. Nepal. p. 55. — Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 657. — Cham. & Schltd. 1830. Linnaea V. p. 77. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 351.
Gmel. 1747. Sibir. I. p. 182: g. Amentacear.
Gled. 1749. Berl. V. p. 126; 1764. Syst. p. 144. n. 601: g. Thalamostemonum.
Adans. 1763. Fam. II. p. 481: g. Pinuum.
Neck. 1770. Act. Theod. Pal. II. p. 494: g. Pinetar.
Thunb. 1784. Fl. jap. p. 264: g. Monadelph. Triandr. — Par. Gmel. 1791. Syst. p. 1004.
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 301; 1789. Phil. Bot. I. p. 153.
Neck. 1790. El. III. p. 271. n. 1666: g. Lepyrophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 62. t. 91.
Mönch 1794. Meth. p. 698: g. Calycostemonis.
Batsch 1802. Tab. p. 167: g. Sempervirentium.
Rebent. 1804. Neom. p. 163: g. Hexandr. Trigyn.

*) Nomen ex Virgilio.

Juniperus Linn. cont.
Rich. 1808. Anal. d. fr. Ed. Voigt p. 121: g. Galbuliferar.
Rich. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 298: g. Cupressinar. — Par. Agdh. 1825. Aphor. p. 212. — Rchb. 1828. Consp. p. 80. n. 1719. — Bartl. 1830. Ord. p. 95. — Link 1831. Hdb. II. p. 471. — Endl. 1837. Gen. n. 1789. p. 258; 1841. Ench. p. 139. — Kunth 1838. Berol. II. p. 225.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 214; 1826. Syst. III. p. 908. n. 3200; 1831. Gen. II. p. 712. n. 3590: g. Juniperear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXVII; 1831. Fl. exc. p. 161. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12. — Ledeb. 1833. Alt. IV. p. 298.
Gray 1821. Brit. pl. II. p. 225: g. Cupressidear.
A. Rich. 1826. Conif. p. 137. t. 5. 6: g. Cupressinear. — Par. Dumort. 1827. Belg. p. 9. Sect.: Sabina, Oxycedrus. — Koch 1837. Syn. p. 665. Ed. II. p. 764. — Rchb. 1841. Nom. p. 62. n. 2364. — Meisn. 1842. Gen. p. 352 (263). — Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 305. Sect. ut 1841. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 135. — A. 1849 in Orb. Dict. VI. p. 72 (*Genévrier*). — (Gren. &) Godr. 1855. France III. p. 157. Sect. eaed.
Spach 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 282. Revisio generis. Sect. ut Dumort.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 229: g. Cupressear.
Endl. 1847. Syn. Conif. p. 7; 1847. Gen. Spl. IV. p. 1. n. 1789: g. Juniperinar. Sect. ut Dumort. et Caryocedrus. — Par. Ledeb. 1851. Ross. III. p. 681. Sect. ut Spach.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 444: g. Cupressacear. Sect. ut Spach.
Synon. Juniperus et Cedrus Tourn.; Juniperus et Sabina Rupp.; Thuiaecarpus Trautv.

Junkia „Spr." Ritg. vid. *Funkia Spreng.*

Juno Tratt. ex Steud. Nomencl. I. p. 821. 835. (J. persica et scorpioides.)
= Iridis spec.

Jurinaea Steud. Nom. vid. *seq.*

Jurinea*) Cassini 1821. Bull. soc. philom. p. 140; 1822. Dict. v. 24. p. 287: nov. g. Carduinear. (Serratula alata Desf.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12.
Cass. 1826. Dict. v. 41. p. 310. 321; 1830. v. 60. p. 572: g. Serratulear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2315; 1841. Nom. p. 99. n. 3887. — Less. 1832. Syn. p. 5. — DC. 1837. Pr. VI. p. 673. — Endl. 1838. Gen. n. 2898. p. 480; 1841. Ench. p. 247. — Meisn. 1839. Gen. p. 226 (140). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 35. — Koch 1844. Syn. ed. II. p. 467. —

*) Dicat. Ludov. Jurine, prof. Genevensi.

Jurinea Cassini cont.
Ledeb. 1846. Ross. II. p. 761. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714. — C. Koch 1851. Linnaea XXIV. p. 412. Sect.: Cylindrocephala, Brachycephala, Acanthodium.
Bartl. 1830. Ord. p. 144: g. Carduacear. — Par. Rchb. 1831. Fl. exc. p. 290. — Steud. 1840. Nom. I. p. 835 (*Jurinaea*).
Koch 1837. Syn. p. 408: sect. Serratulae.
Bunge 1841. Flora I. p. 153.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 256: g. Cynarocephalar.
Schultz Bip. 1846. Linnaea XIX. 3. p. 327: g. Euserratulear.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 269: g. Carlinear.
Synon. Cardui sp. Linn.; Serratulae sect. 2 DC. olim.

Jurinella Jaub. & Spach 1846. Ill. pl. Or. II. p. 101. t. 183. 184. 185. (Bot. Zeit. 1847. p. 460): nov. g. Compositar., Jurineae aff. (J. Aucheri etc.) *Cf.* Flora 1847. I. p. 294.
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 453: g. Serratulear.

Juripeba Pison. 1648. Brasil. p. 84. c. ic. Dunal 1852 in DC. Pr. XIII. 1. p. 197: subsect. Euleptostemoni.

Jussia Adans. vid. *seq.*

Jussiaea*) Linn. 1748. Upsal. p. 103; 1753. Sp. I. p. 388; 1759. Syst. ed. X. p. 1021. n. 478; 1762. Sp. ed. II. p. 555; 1764. Gen. ed. VI. p. 215. n. 538; 1767. Syst. ed. XII. p. 297. n. 532: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 403. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 292. n. 741. — Gmel. 1791. Syst. p. 686.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 31: g. Calycanthemor.
B. Juss. 1759 in Ht. Triau.: g. Onagrar. — Par. Adans. 1763. Fam. II. p. 85 (*Jussia*). — Juss. 1789. Gen. p. 319. — Batsch 1802. Tab. p. 77. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 299. — Kunth 1824. Syn. III. p. 390.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Calycanthemar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 332.
Gled. 1764. Syst. p. 271. n. 1113: g. Calycostemonum.
Scop. 1777. Intr. p. 104: g. Strictar.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 158. t. 31. f. 9 (erecta).
Vent. 1799. Tabl. III. p. 312: g. Epilobianar.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 152: g. Onagrariar. — Par. Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 335. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 532.
Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: g. Jussidiar.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 96: g. Onagrear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1131.

Jussiaea Linn. cont.
DC. 1828. Pr. III. p. 52: g. Jussiear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 319. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 691. — Meisn. 1838. Gen. p. 120 (85). — Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 520.
Rchb. 1828. Consp. p. 170. n. 4493: g. Jussieuear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39.
Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 253: g. Onagrariear.
Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 340: g. Jussievear. — Par. Endl. 1840. Gen. p. 1188. n. 6109. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 626.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 725: g. Jussiaear.
Hassk. 1848. Pl. jav. rar. p. 439: g. Oenotherear.
= Jussieua Linn.

Jussiaea Forsk. 1775. Fl. Aeg. Ar. p. 210: g. Decandr.
Antichorus Linn.

Jussiaeae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 725: trib. Onagracear. Gen. Jussieviear. Endl.

Jussidiae Dumort. 1822. Comm. bot. p. 58: fam. Calicunguliae. Gen.: Oenothera, Jussiaea.

Jussidieae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 90: trib. Onagridear. Gen.: Isnardia.

Jussieae DC. 1828. Prodr. III. p. 52: trib. Onagrariar. Gen.: Jussiaea, Prieurea, Ludwigia, Isnardia. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 691. Gen. ead. — Koch 1836. Syn. p. 243. Ed. II. p. 268. Gen.: Isnardia.
Bartl. 1830. Ord. p. 319: div. Onagrariar. Gen. ut DC. et Vahlia, Lopezia, Circaea.
Meisn. 1838. Gen. p. 120 (85): subtrib. Epilobiacear. Gen. Candolleana et Sphondylantha?, Onosuris.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 520: subtrib. Onagrear. Gen.: Jussiaea, Ludwigia.

Jussiena Rchb. Handb. p. 246: sphalm. pro *Jussieua*.

Jussieua Linn. 1737. Gen. p. 126. n. 353; 1740. Syst. ed. II. p. 23 (*Jussievia*); 1742. Gen. ed. II. p. 186. n. 422: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 335. — Thunb. 1784. Fl. japon. p. 180 (*Jussieuia*). — Pers. 1797. Syst. p. 430. — Willd. 1799. Sp. II. p. 574. n. 856; 1809. En. p. 449. — Elliott 1817. Sketch I. p. 480. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 279. — Roxb. 1832. Ind. II. p. 401.
Neck. 1790. El. II. p. 135. n. 818: g. Coryphophytor.
Cram. 1803. Disp. p. 90 in Octandr. Monogyn.
Pers. 1805. Ench. I. p. 469. n. 1069: g. Onagrar. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 316. n. 1250. — Link 1821. En. I. p. 396.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII: g. Oenotherear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 118.

*) Dicat. Bern. et Ant. Jussieu.

Jussieua Linn. cont.
Link 1831. Hdb. II. p. 55: g. Onagrariar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170. n. 6557: g. Jussieuear.
Synon. Jussiaea Linn.; Jussieva Gled.; Jussia Adans.; Oldenlandia P. Browne; Cubospermum Lour.; Vigiera Fl. Flum.; Corynostigma Presl.

Jussieuaca Rottl. herb. teste DC. Prodr. III. p. 22.
= Lumnitzera Willd.

Jussieueae Rchb. 1828. Consp. p. 169: div. Onagrear. Gen.: Callitriche, Fontanesia?, Isnardia, Ludwigia, Prieurea, Jussiaea; Fuchsia.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39: trib. Onagracear. Gen.: Jussiaea, Ludwigia, Isnardia.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 634; 1837. Hdb. p. 246; 1841. Nom. p. 170: subdiv. Oenotherear. Gen. ut Dumort. et Prieurea.
A. Rich. 1849 in Orb. Dict. IX. p. 104: trib. Onagrariear. Gen. Jussievear. Endl.

Jussieuia Thunb. vid. *Jussieua Linn.*

Jussieva Gleditsch 1749 in Mém. Ac. Berol. 1751 (V.) p. 124: g. Thalamostemonum.
Reich. 1778. Gen. p. 229. n. 585: g. Decandr. Monogyn.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 701; 1825. Syst. II. p. 231. n. 1470; 1830. Gen. I. p. 315. n. 1607: g. Onagrar. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1293.
Endl. 1841. Ench. p. 637. n. 6019: g. Jussievear.
= Jussieua Linn.

Jussieveae Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 337: trib. Onagrariear. Gen.: Vahlia, Jussiaea, Ludwigia, Isnardia, Spondylantha.
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 161: trib. Onagrariar.
Endl. 1840. Gen. p. 1188; 1841. Ench. p. 637: trib. Oenotherear. Gen.: Prieurea, Jussiaea (Jussieva), Ludwigia, Isnardia.

Jussievia Linn. 1740 vid. *Jussieua Linn.*

Jussievia Houst. 1781. Reliq. t. 15.
= Cnidoscolus Pohl.

Justica Necker vid. *seq.*

Justicia*) Linn. 1737. Gen. p. 4. n. 12; 1737. Cliff. p. 9; 1740. Syst. p. 16; 1748. Ups. p. 7; 1753. Sp. I. p. 15; 1759. Syst. ed. X. p. 849. n. 26; 1762. Sp. ed. II. p. 20; 1764. Gen. ed. VI. p. 12. n. 27; 1767. Syst. ed. XII. p. 59: g. Diandr. Monogyn. (*Cf.* Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 303.) — Par. Murr. 1774. Syst. p. 58; 1784. Syst. p. 61. — Reich. 1778. Gen. p. 13. n. 28. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 17. n. 35. — Lour. 1790. Coch. I. p. 23. — Gmel. 1791. Syst. p. 32. — Pers. 1797. Syst. p. 62; 1805. Ench. I. p. 19. n. 57. — Willd. 1797. Sp. I. p. 79. n. 18; 1809. En. p. 24. — Roxb. 1798. Corom. II. p. 15. 29. 41. t. 127. 152. 153. 176. 177; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 115; ed. 1832. p. 114. — Vahl 1805. Enum. I. p. 108. n. 42. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 11.
Gled. 1749. Berl. V. p. 129; 1764. Syst. p. 154. n. 634: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 432; 1802. Spl. p. 167.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 34; 1764. Ord. nat.: g. Personatar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 167. — Gis. 1792. Prael. p. 486. — Batsch 1802. Tab. p. 193.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Acanthor. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 104.
Hill 1769. Ht. kew. p. 266 (*Justitia*): g. Monopetalar. irregular.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 255. t. 54. f. 4 (purpurea).
Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 227; 1789. Phil. Bot. I. p. 74. *Cf. Ecbolium et Adhatoda.*
Neck. 1790. El. I. p. 330. n. 514 (*Justica*): g. Chasmatophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 304: g. Acanthoidear.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 238: g. Acanthacear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 12. 348 (*Justitia*). — R. Brown 1810. Prodr. I. p. 475. Ed. Nees p. 331. — Poir. 1817. Dict. v. 7. p. 113 (*Carmantine*). — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 55. 142. n. 79. — HBK. 1817. Nov. gen. II. p. 231. — Kunth 1823. Syn. II. p. 29. — D. Don 1825. Nepal. p. 118. — Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 783. Sect.: Justicia, Geneium. — Link 1829. Hdb. I. p. 500. — Bartl. 1830. Ord. p. 184. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 72. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 163.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 410; 1825. Syst. I. p. 77. n. 106; 1830. Gen. I. p. 23. n. 95: g. Acanthear. — Par. Nees & Mart. 1823. Nov. Act. Leop. XI. 1. p. 52. — Rchb. 1828. Consp. p. 122. n. 3112. Sect.: Dianthera, Justicia.
Link 1821. En. I. p. 29: g. Acanthinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Justiciear.
Synon. Dianthera Gron.?; Diplanthera Gled.?

Justicia Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 108; 1847 in DC. Prodr. XI. p. 426: g. restrict. Eranthemear. (Justicia Ecbolium L.) — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4089. p. 706; 1841. Ench. p. 344. — Meisn. 1840. Gen. p. 297 (205). — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 146. — Rchb. 1841. Nom. p. 110. n. 4282. — Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 832.
Brongn. 1843. En. genr. p. 64: g. Echmacanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 679: g. Justiciadar.

*) Dixit Houstonius hanc plantam Justiciam a botanico anglo. Conf. Linn. Ht. Cliff. p. 10.

Justiciadae Lindl. 1847. Veg. kingd. p. 679: trib. Echmatacanthor. Gen. Justiciear. Endl. et Strobilorachis, Porphyrocoma, Haplanthera, Odontonema, Tyloglossa.

Justicieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: trib. Acanthidear. Gen.: Justicia, Hypoestes, Eranthemum, Dicliptera.

Nees 1832 in Wall. Pl. As. rar. III. p. 76; 1841. Linnaea XV. p. 364: subtrib. Echmatacanthor. Divis.: Aphelandreae, Gendarusseae, Eranthemeae. — Par. Endl. 1839. Gen. p. 703; 1841. Ench. p. 343. Divis.

Justicieae Dumort. cont.

eaed. — Meisn. 1840. Gen. p. 296 (204). Divis. eaed.

Rchb. 1837. Hdb. p. 190: sect. Acanthear. Subsect.: Eranthemeae, Ruelliariae, Gendarusseae.

Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 145: sect. Echmatacanthor. Subsect. ut Nees.

Rchb. 1841. Nom. p. 109: div. Esmatacanthar. Subdivis. eaed.

Justitia Hill, Hedw. vid. *Justicia Linn.*

K.

Kabbe Herm. (Rhus Cobbe L.) *Cf.* Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 330.

≐ Ornitrophe Comm.

Kabera Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4818*b*: sect. Sinapeos.

= Ceratosinapis DC.

Kadali Adans. 1763. Fam. II. p. 234: g. Salicariar.

= Osbeckia Linn.

Kadsura „Kämpf." Juss. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 340: nov. g. Anonear. (Uvaria japonica Thunb.) — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 307. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXI; 1828. Consp. p. 193. n. 4998. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 457. n. 2255 (*Cadsura*). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 307.

Dunal 1817. Mon. Anon. p. 25. 57: g. Anonacear. — Par. DC. 1818. Syst. I. p. 465; 1824. Pr. I. p. 83. — Bartl. 1830. Ord. p. 247.

Spreng. 1825. Syst. II. p. 642. n. 2028 (*Cadsura*): g. Polyandr. Polygyn.

Wall. 1826. Fl. Nepal. I. p. 7: g. Dilleniacear.

Blume 1830. Fl. jav. Schizandr. p. 7. t. 1. 2; 1833. Nov. fam. expos.; 1834. Ann. sc. nat. 2e sér. II. p. 91: g. Schizandrear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 8. — Rchb. 1841. Nom. p. 193. n. 7314. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 95.

G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 101: g. Schizandriacear.

Meisn. 1837. Gen. p. 5 (7): g. Schizandracear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4731. p. 835; 1841. Ench. p. 426. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 306. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 83. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 78.

Synon. Sarcocarpon Blume; Sarcocarpum G. Don; Panslowia Wight; Uvariae sp. Linn.

Kadua*) Chamisso & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 157: nov. g. Hedyotidear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 210. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 374.

A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 268: sect. Hedyotidis. — Par. Endl.

Kadua Chamisso cont.

1838. Gen. n. 3240*i*. p. 550; 1841. Ench. p. 273. — Meisn. 1838. Comm. p. 115. — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2874. 9.

DC. 1830. Pr. IV. p. 430: g. Hedyotear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 533. — Meisn. 1838. Gen. p. 160.

Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 495: g. Rubiacear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.

Käleria Boissier vid. *Köleria Pers.*

Kämpfera Houst. 1781. Reliq. p. 3. t. 2. *Cf. Kempfera Adans.*

= Tamonea Aubl.

Kämpfera Spreng. vid. *seq.*

Kämpferia*) Linn. 1737. Gen. p. 331. n. 827; 1737. Cliff. p. 2; 1740. Syst. p. 16; 1748. Ups. p. 2; 1753. Sp. I. p. 2; 1759. Syst. ed. X. p. 843. n. 7; 1762. Sp. ed. II. p. 3; 1764. Gen. ed. VI. p. 4. n. 7; 1767. Syst. ed. XII. p. 51: g. Monandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 50; 1784. Syst. p. 51. — Reich. 1778. Gen. p. 4. n. 7. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 5. n. 9. — Lour. 1790. Coch. I. p. 12. — Gmel. 1791. Syst. p. 8. — Pers. 1797. Syst. p. 50. — Willd. 1797. Sp. I. p. 15. n. 12; 1809. En. p. 5. — Roxb. 1819. Corom. III. p. 75. t. 278; 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 14; ed. 1832. p. 15.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 27: g. Scitaminum. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 275. (veror.)

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Scitaminear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 188. — Batsch 1802. Tab. p. 104. — Pers. 1805. Ench. I. p. 4. n. 13. — Willd. 1808. Berl. Mag. II. p. 166. — Roxb. 1812. Asiat. research. XI. p. 518. *Cf.* Link Jahrb. I. 1820. p. 72. — Röm. & Schult. 1817. Syst. I. p. 8. 27. — Agdh. 1823. Aphor. p. 181. — Schrank 1824. Syll. Ratisb. I. p. 176. (Char. emend.) — Spreng. 1825. Syst. I. p. 9. n. 9 (*Kämpfera*); 1830. Gen. I. p. 5. n. 9. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 123.

*) Dicat. Kadu ex Ulea, expeditionis sodali.

*) Dicat. „curiosissimo per Japoniam peregrinatori Kämpforo, cui notitiam plantarum Japonicarum et harum descriptionem accuratam debemus". (Ht. Cliff. p. 2.)

Kämpferia Linn. cont.
— Dictr. 1839. Syn. I. p. 1. 15. — Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 317. — Duch. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 164.
Gled. 1764. Syst. p. 149. n. 615: g. Petalostemonum.
Hill 1769. Ht. kew. p. 239: g. Monopetalar. irregular.
Juss. 1789. Gen. p. 64: g. Cannar.
Neck. 1790. El. III. p. 140. n. 1480 (*Kempferia*): g. Cratoophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 205: g. Dryrrhizar.
St. Hil. 1805. Expos. I. p. 157: g. Amomear. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 3. 343. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 309. — Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1600. — Bartl. 1830. Ord. p. 61. — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 160.
Salisb. 1812. Hort. trans. I. p. 286: g. Zingiberear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2212. — Meisn. 1842. Gen. p. 388 (290).
Link 1821. En. I. p. 3; 1829. Hdb. I. p. 228: g. Alpiniacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: g. Curcumacear.
Blume 1830. En. pl. Jav. I. p. 45: g. Zingiberum. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 1624. p. 223; 1841. Ench. p. 119. Sect. (1842. Spl. II. p. 22): Kämpferia, Tritophus.
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: g. Kämpferiear.
Brongn. 1843. En. genr. p. 25: g. Zingiberacear. — Par. Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 597.
Synon. Soncorus Rumph.; Aro-Orchis Burm.

Kämpferia Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341. t. 20. f. 5—8: g. restrict. Kämpferiear.
Endl. 1842. Spl. II. p. 22: sect. Kämpferiae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167: g. Zingiberacear.

Kämpferieae Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XV. p. 341: div. Scitaminear. Gen.: Tritophus, Kämpferia, Monolophus, Gastrochilus.
A. Rich. 1841 in Orb. Dict. I. p. 367: sect. Zingiberacear. Gen.: Zingiber, Curcuma, Kämpferia, Hitchenia.
Duch. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 356: trib. Zingiberacear. Gen. ut Lestib.

Kagenackia Steud. vid. *seq.*

Kageneckia*) Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 145. t. 37: nov. g. Polygam. Dioec. — Par. Willd. 1805. Sp. IV. p. 1123. n. 1924.
Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 312: g. Polygam. Monoec.

Kageneckia Ruiz & Pav. cont.
HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 236: g. Spiraeacear. — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 478. — DC. 1825. Pr. II. p. 547 (*Kagenekia*). — Bartl. 1830. Ord. p. 404 (desciscens). — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 429 (anomalum). — Steud. 1840. Nom. I. p. 844 (*Kagenackia*).
Spreng. 1825. Syst. II. p. 466. n. 1803; 1830. Gen. I. p. 399. n. 2002: g. Rosacear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 31.
Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4455: g. Spiraeear.
Don 1831. Edinb. n. phil. journ. X. p. 231; XII. p. 111: g. Quillajear. — Par. G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 522. — Lindl. 1836. Bot. Regist. XXII. t. 1836; 1847. Veg. kd. p. 565. — Meisn. 1837. Gen. p. 103 (72). — Endl. 1841. Gen. n. 6396. p. 1248; 1841. Ench. p. 660. — Rchb. 1841. Nom. p. 168. n. 6516.
Synon. Lydaea Mol.

Kagenekia DC. vid. *praeced.*

Kahiria*) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Ar. p. 153: nov. g. Syngenes. Polygam. Aequal.
Ethulia Cass.

Kakosmanthus**) Hasskarl 1855. Flora II. p. 577 (Retzia I. p. 97): nov. g. Sapotacear., inter Payenam et Bassiam intermedium. (K. macrophyllus.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 474. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1040 (*Cacosmanthus*).

Kalanchoë Adans. 1763. Fam. II. p. 248: g. Sedorum.
Medic 1789. Phil. Bot. I. p. 62. *Cf. Cotyledon Medic.* Vorles. IV. 1. p. 215. nr. 131. 132.
DC. . . . . Pl. grass. n. 64.
Hedw. 1806. Gen. p. 286. n. 1146: g. Crassulear. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 321. — DC. 1828. Pr. III. p. 394. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 108. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 346.
Haw. 1812. Syn. succ. p. 109 (ed. Schrank 1819. p. 119); 1821. Rev. succ. p. 23 (ubique *Kalenchoë*): g. Pentandr. Pentagyn.
Cambess. 1829 in St. Hil. Fl. Bras. II. p. 195: g. Crassulacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 310. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 359. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 84. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 305. — Brongn. 1843. En. genr. p. 106. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 727.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: g. Cotyledonear.
Meisn. 1838. Gen. p. 135 (98): g. Umbilicear. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4616. p. 810; 1841. Ench. p. 405. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 11.
Synon. Calanchoë Pers.; Vereia Andr.; Verea Willd.; Cotyledonis sp. Forsk. etc.

---

*) Dicat. Frid. com. de Kageneck.

*) Nomen ex habitatione prope Kahiriam.

**) κακός, malus; ὀσμή, odor.

Kalawaël Adans. 1763. Fam. II. p. 344: g. Pistaciar.
= Connarus Linn.

Kalayara[*]) Römer 1846. Fam. nat. syn. II. p. 16. 94: sect. Trichosanthis. (T. tricuspidata Lour.)

Kalbfussia[**]) Schultz 1833. Flora II. p. 723: nov. g. Scorzonerear. (K. Salzmanni et Mülleri.) *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 378. — Par. DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 101. — Endl. 1838. Gen. n. 3001. p. 498; 1841. Ench. p. 250. — Meisn. 1839. Gen. p. 235 (144). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7. — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3687. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 33. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Schultz Bip. 1834. Flora II. p. 478: g. Fideliear.

Kalenchoë Haw. vid. *Kalanchoë Adans.*

Kaleniczenkia[***]) Turczan. 1853. Bull. soc. Mosc. XXVI. Nr. 1. p. 252: nov. g. Podalyriear. (K. daviesioides.)

Kaleria Adans. 1763. Fam. II. p. 506: g. Alsinium. (Silene anglica, lusitanica, quinquevulnera, Behen et Armeria L.)
= Silene Linn. emend.

Kali Tourn. 1700. Inst. p. 247. t. 128: g. pl. class. VI.
Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 340: g. pl. class. XVI.
Adans. 1763. Fam. II. p. 261: g. Blitor.
Scop. 1772. Carn. I. p. 175: g. Pentandr. Digyn.
Medic. 1789. Phil. Bot. I. p. 33. (*Cf. Salsola Medic.*)
Mönch 1794. Meth. p. 331: g. Thalamostemonis.
Dumort. 1827. Belg. p. 22: sect. Salsolae. — Par. Moq.-Tand. 1840. Chenop. p. 135; 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 179. — Endl. 1847. Spl. IV. p. 41. n. 1944 *a*. — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 797. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1021.

Kali Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 286: sect. Chenopodii. (Ch. maritimum et Salsola fruticosa L.)

Kalidium Moquin-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 146: nov. g. Salicorniear. (Salicorniae sp. L., Halocnemi sp. Spr.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 733. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 769.

Kaliformia „Stackh." Endl. Gen. Suppl. III. p. 43 in synon. Lomentariae: vid. *seq.*

Kaliformis Stackhouse 1809. Mem. soc. Mosc. II. p. 56. 78 (1816. Ner. brit. ed. alt.): nov. g. Fucor. (verticillatus, articulatus, opuntia, etc.) *Cf.* Leman 1822. Dict. v. 24. p. 324 et Spreng. n. Entd. I. p. 96.
Lomentariae Lyngb. pars.

*) *Kalayar* nomen vernaculum plantae in Java.
**) Dicat. Car. Kalbfuss.
***) Dicat. Kaleniczenko, botan. ross.

Kalimeris Cassini 1822. Dict. v. 24. p. 324: subg. Asteris.
Cass. 1825. Dict. v. 37. p. 464; 1830. v. 60. p. 582: g. Bellidear. spuriar.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2562: g. Amelloidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 139: g. Asterear.
= Calimeris Nees.

Kallias Cassini 1822. Dict. v. 24. p. 326: subg. Heliopsidis. (Anthemis buphthalmoides Jacq.)
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17: g. Rudbeckiear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 110. n. 2659. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 20.
Cass. 1827. Dict. v. 46. p. 399. 406; 1828. v. 54. p. 461 (*Callias*); 1830. v. 60. p. 576: g. Heliopsidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Heliantheаr.
DC. 1836. Pr. V. p. 550: sect. Heliopsidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2506 *b*. p. 408; 1841. Ench. p. 238. — Rchb. 1841. Nom. p. 82. n. 3137, 2.

Kallströmia Scopoli 1777. Introd. p. 212. n. 937: nov. g. Dumosar. (Tribulus maximus Löfl.)
Rchb. 1828. Consp. p. 199. n. 5192; 1841. Nom. p. 198. n. 7548: g. Tribulear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 391. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 305. — Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 213. — Endl. 1840. Gen. n. 6031. p. 1162; 1841. Ench. p. 616. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 479. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 404.
Meisn. 1837. Gen. p. 59 (43): g. Zygophyllear.
Synon. Ehrenbergia Mart.; Heterozygis Bunge.

Kallymena Wittst. vid. *seq.*

Kallymenia J. Agardh 1842. Alg. medit. p. 98: nov. g. Gasterocarpear. (Fucus reniformis Turn.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 484 (*Kallymema*, dein corr. *Kallymena*). — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 40. n. $122/_{43}$. Sect.: Kallymenia, Constantinea. — Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 54 (*Callymenia*).
Kütz. 1843. Linnaea XVII. p. 102 (*Callymenia*): g. Gigartinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 25: g. Gasterocarpidar.
Rabenh. 1847. Krypt. II. 2. p. 149: g. Halymeniear.
Nägeli 1847. Alg. Syst. p. . . .: g. Chondrear.
Harv. 1843. Ner. bor. am. II. p. 171: g. Kallymeniear.
Harv. 1855 in Hook f. N. Zeal. II. p. 251: g. Cryptonemiacear.
= Euhymenia Kütz.

Kallymenieae Harvey 1853. Ner. bor. am. II. p. 159: trib. Gigartinear. Gen.: Cystoclonium, Callophyllis, Kallymenia, Constantinea.

Kalmia*) Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 13; 1753. Sp. I. p. 391; 1759. Syst. ed. X. p. 1022. n. 482; 1762. Sp. ed. II. p. 560; 1764. Gen. ed. VI. p. 217. n. 545; 1767. Syst. ed. XII. p. 298. n. 537: g. Decandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 337; 1784. Syst. p. 404. — Reich. 1778. Gen. p. 222. n. 590. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 293. n. 743. — Gmel. 1791. Syst. p. 693. — Pers. 1797. Syst. p. 432. — Willd. 1799. Syn. II. p. 600. n. 864; 1809. En. p. 450. — Elliott 1817. Sketch I. p. 480. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 267.
B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Myrtillor.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Bicornium. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 337.
Gled. 1764. Syst. p. 228. n. 938: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 456.
Gärtn. 1788. Fr. I. p. 305. t. 63. f. 7 (latifolia).
Juss. 1789. Gen. p. 158: g. Rhododendror.
Neck. 1790. El. I. p. 213. n. 352: g. Dicroophytor.
Vent. 1799. Tabl. II. p. 451: g. Rhodoracear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 352. — Pers. 1805. Ench. I. p. 477. n. 1083. — Hedw. 1806. Gen. p. 319. n. 1261. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 334. — Juss. 1827. Dict. v. 45. p. 410. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XL; 1828. Consp. p. 130. n. 3403. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27.
Batsch 1802. Tab. p. 215: g. Rhodoidear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 509: g. Rhododendrear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 728. — Endl. 1839. Gen. n. 4339. p. 759; 1841. Ench. p. 371. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 72. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 922. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 455.
Link 1821. En. I. p. 392: g. Ledinar.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 293. n. 1549; 1830. Gen. I. p. 334. n. 1690: g. Ericear. — Par. Link 1829. Hdb. I. p. 602. (genuinar.) — Bartl. 1830. Ord. p. 155. — Hook. 1833. Fl. bor. am. II. p. 41. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1371. 1407.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 850: g. Rhodorear. — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 496.
Rchb. 1837. Hdb. p. 206: g. Chamaeledear.
Meisn. 1839. Gen. p. 246 (154): g. Andromedear.
Rchb. 1841. Nom. p. 127. n. 4944: g. Daboeciear.
Klotzsch 1857. Ber. Berl. Ak. p. 8: g. Menziesiacear.
Synon. Rhododendros Adans. ex parte.

*) Dicat. Petro Kalm, prof. Aboensi.

Kaloëdron Miquel 1855. Fl. Ind. bat. I. p. 609: sect. Combreti. (C. trifoliatum Vent.)
Kalomikta Regel 1857. Bull. Ac. Pet. XV. p. 219: nov. g. Tiliacear. (Prunus Kolomikta Maxim.)
= Actinidia Lindl. (Maxim.)
Kalophyllodendron Vaillant 1722. Act. Ac. Paris. p. 207: g. Dipsacear.
= Calophyllum Linn.
Kaloprasum C. Koch 1849. Linnaea XXII. p. 234: sect. Allii. (A. caspium.)
Kalosanthes Haworth 1821. Rev. succ. p. 6: nov. g. Pentandr. Pentagyn. (Crassula jasminea, odoratissima, etc.)
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. L (*Calosanthos*): g. Sedear.
G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 107: g. Crassulear.
= Rocheae sect. Franciscaria DC.
Kalosanthes DC. vid. *Calosanthes Blume.*
Kalpandria Walp. vid. *Calpandria Blume.*
Kalymenia Harv. 1846. Phyc. brit. t. 13 teste Kütz. 1847. Bot. Zeit. p. 144.
J. Agdh. 1833. Öfvers. k. Ac. Förh. ex Flora 1849. p. 175.
Vid. Kallymenia J. Agdh.
Kalymopetalon Pohl mss. ex Flora 1825. I. p. 183: nov. g. plant. (Nomen.)
Kamettia*) „Kostel. Allg. med. pharm. Flora" Rchb. 1837. Hdb. p. 211: g. Echitear. (Nomen).
Kampmania Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 170 (New-York med. repos. II. Hex. V. p. 350); novum g. pro Zanthoxylo tricarpo Mich. propositum. *Cf.* Leman 1822. Dict. v. 24. p. 341.
= Ochroxylum Schreb.
Kampmannia Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 34: nov. g. Panicear.
Kamptzia**) Nees 1840. Progr. gratul. de Kamptzia; 1841. Nov. Act. Leop. XVIII. 1. p. IX: nov. g. Leptospermear.
= Syncarpia Tenore.
Kanahia***) R. Brown 1809. Mem. Wern. Soc. I. p. 39 (Verm. bot. Schr. II. p. 377): nov. g. Asclepiadear. (Asclepias laniflora Forsk.) — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 403; 1825. Syst. I. p. 851. n. 988; 1830. Gen. I. p. 211. n. 1084 (*Canahia*). — Schult. 1820. Syst. VI. p. XII. 97. — Leman 1822. Dict. v. 24. p. 342. — Bartl. 1830. Ord. p. 202. — Decne 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 329; 1842 in Orb. Dict. II. p. 212. (verar.) — Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 903 (*Canahia*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 626. (verar.)
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XLI (*Canahia*); 1828. Consp. p. 131. n. 3436: g. Cynanchear. (genuinar.) — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 26. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 539.

*) Nomen vernaculum.
**) Dicat. Car. Alb. Chr. Heur. de Kamptz.
***) Nomen arabicum.

Kanahia R. Brown cont.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 149: g. Asclepiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3471. p. 592; 1841. Ench. p. 299: g. Calotropidear. — Par. Meisn. 1840. Gen. p. 268 (175). — Rchb. 1841. Nom. p. 129. n. 4983.
Dcne 1844 in DC. Pr. VIII. p. 537: g. Sarcostemmar.

Kandelia DC. 1828. Prodr. III. p. 32: sect. Rhizophorae. (Rh. Kandel.)
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 310: g. Rhizophorear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 119 (85). — Griff. 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. X. p. 122. — Arnott 1838. Ann. nat. hist. I. p. 365. — Endl. 1840. Gen. n. 6100. p. 1185; 1841. Ench. p. 634. — Rchb. 1841. Nom. p. 171. n. 6620. — Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 134. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 585.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 728: g. Rhizophoracear.

Kandis Adans. 1763. Fam. II. p. 422: g. Thlaspium. (Lepidium perfoliatum L.)
= Dileptium DC.

Kanilia DC. 1828. Prodr. III. p. 32: sect. Rhizophorae. (Rh. cylindrica L. = *Kanil-Kandel Rheede.*) — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 588.
Blume 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 140: g. Rhizophorear. — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 528.

Kanimia*) Gardn. 1847. Lond. journ. bot. VI. p. 446: nov. g. Eupatoriacear., Mikaniae aff. (K. palustris.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 403: g. Adenostylear.

Kaniram Petit-Thouars 1808 in Desv. Journ. bot. I. p. 247.
= Strychnos Linn.

Kanta Adans. 1763. Fam. II. p. 3: g. Byssor. (*Byssus Mich.* t. 90. f. 1. 5. 7. — *Dill.* Musc. t. 1. f. 18. 19.
= . . . ?

Kantia Gray vid. *seq.*

Kantius Gray 1821. Arr. brit. pl. I. p. 706 (p. 679 *Kantia*): nov. g. Jungermannidear. (Jung. Trichomanis Dicks.)
= Calypogeia Raddi.

Kantuffa Bruce 1790. Abyssin. V. t. 14.
Gmel. 1791. Syst. p. 677 (*Cantuffa*): g. Decandr. Monogyn.
Pterolobium R. Brown. (Endl. Gen. p. 1313.)

Kara-angolam Adans. 1763. Fam. II. p. 84: g. Onagrar. (*Rheede* IV. t. 26.) *Cf.* Hamilt. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 183.
= Alangii sp. Vahl.

Karamyschewia*) Fisch. & Meyer 1838. Bull. soc. Mosc. Nr. 3. p. 266: nov. g. Rubiacear. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 844 (*Karamyschovia*).
Endl. 1841. Spl. I. n. 3240/1. p. 1393; 1841. Ench. p. 273: g. Hedyotear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2875. — Meisn. 1843. Comm. p. 360.
Ledeb. 1845. Ross. II. p. 395: g. Hedyotidear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar. (et p. 771 Galiacear.)

Karamyschovia Steud. vid. *praeced.*

Karatas Plumier 1703. Gen. p. 10. t. 33.
Adans. 1763. Fam. II. p. 67: g. Zingiberum.
: Bromeliae Linn. pars.

Kardanoglyphos Schlechtend. 1856. Linnaea XXVIII. p. 472: nov. g. Arabidear. An Cardamines sect.? (K. nana.)

Kare-Kandel Adans. 1763. Fam. II. p. 88: g. Myrtor. (*Rheede* V. t. 13.)
= Carallia Roxb.

Karelinia**) Lessing 1834. Linnaea IX. p. 187: nov. g. ex typo Serratulae caspicae Pall.
DC. 1836. Pr. V. p. 375: g. Euconyzear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2402. p. 389; 1841. Ench. p. 235. — Meisn. 1839. Gen. p. 190 (128). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 498.
Rchb. 1841. Nom. p. 91. n. 3579 (*Korelinia*): g. Conyzear. (genuinar.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 952: g. Euasterear.

Karivia Arnott 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 275: nov. g. Cucurbitear. (Bryonia amplexicaulis Lam.) — Par. Wight 1842. Ann. and Mag. VIII. p. 268. — Meisn. 1843. Comm. p. 356. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 315.
Endl. 1842. Spl. II. p. 77: g. Bryoniear. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 199. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 660.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 11. 45: g. Eubryoniear.

Karpatia Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 83: subfam. Caprifoliae. Gen.: Karpaton.

Karpaton Rafin. 1817. Fl. Ludov. p. 78: nov. g. Caprifoliear. (K. hastatum.) *Cf.* Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 359.
Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 83: g. Karpatiae.
Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 216. 243: g. Diandr. Monogyn.
DC. 1830. Pr. IV. p. 340: g. Loniceréis aff., minus notum. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 453.
Endl. 1838. Gen. p. 570; 1841. Ench. p. 282: g. Sambucear. (vix notum.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 767. (?)

*) Anagr. nominis Mikaniae.

*) Dicat. Alex. de Karamyschew, Linnaei discipulo.
**) Dicat. G. de Karelin, peregrinatori.

Karpaton Rafin. cont.
Meisn. 1838. Gen. p. 155 *(111)*: g. Lonicerear. *(vix notum.)* — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 73. n. 2732. (genuinar.?)
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 327: g. Caprifoliacear. dubium.
= Diervilla Tourn.? (Lindl. nat. syst. ed. II. p. 248.)

Karstenia*) Göppert 1836. Syst. Fil. foss. p. 171. 451. t. 33: nov. g. Filicum. *(Rhizoma.)*
Endl. 1841. Ench. p. 44. n. $687/_{23}$: g. Caulopteridum.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 111; 1846. Chlor. prot. p. LII: caudex Filicis foss.
Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 85: g. Caulopteridear.

Karthemia Schultz Bip. vid. *Varthemia DC.*

Karwinskia**) Zuccar. 1832. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. I. p. 349: nov. g. Rhamnear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 71 (50). — Unger 1846. Chlor. prot. p. 147. t. 50. f. 4.
Endl. 1840. Gen. n. 5723. p. 1097; 1841. Ench. p. 581: g. Frangulear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 144. n. 5593. (genuinar.)
Brongn. 1843. Én. genr. p. 122: g. Zizyphear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 582: g. Rhamnacear.

Kasailo Dennstädt 1818. Schl. z. Ht. Malab. p. 30: nov. g. plant. *(Bentheka Rheede* IV. p. 30. — *Kasailo* Bramin.)
= Ambelania Aubl.

Kastnera C. H. Schultz 1853. Flora I. p. 37: nov. g. Euliabear.

Katarsis Medic. 1787. Malv. p. 111: nov. g. Monadelph. Octandr. (Gypsophila arborea Med. Bot. Beob.) *Cf.* Hedw. 1806. Gen. p. 328.

Kataxera Endl. 1840. Gen. n. 5216 c. p. 961; 1841. Ench. p. 504: sect. Polycarpaeae. (Celosiae sp. Roxb., Achyranthis sp. W., Illecebri sp. Pers., Alternantherae sp. Rchb.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 162. n. 6291. 3.

Katoutheka Adans. 1763. Fam. II. p. 159: g. Caprifolior. *(Rheede* IV. p. 59. t. 28.) *Cf.* Hamilt. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 186.
= Ardisiae sp. Vahl?

Katou-Tsjeroë Adans. 1763. Fam. II. p. 84: g. Onagrar. *(Rheede* IV. t. 9.) *Cf.* Hamilt. 1835. Linn. Trans. XVII. 2. p. 155 et Isis 1838. p. 421.
= Holigarna Roxb.

Katubala Adans. 1763. Fam. II. p. 67: g. Zingiberum.
= Canna Linn.

*) Dicat. Dr. Karsten, Berolin.
**) Dicat. baroni de Karwinski, peregrinatori.

Kaulfussia Dennst. ex Steud. Nomencl. I. p. 844; II. p. 790. (K. geminiflora.)
= Xanthophyllum flavescens.

Kaulfussia*) Nees 1820. Hor. phys. Berol. p. 53: nov. g. Corymbiferar. (Millerear.) *Cf.* Flora 1821. II. p. 514. — Par. Link 1822. En. II. p. 334.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 570. n. 2779; 1831. Gen. II. p. 629. n. 3131: g. Radiatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 108. n. 2558: g. Asterinar.
Link 1829. Hdb. I. p. 751: g. Asteroidear.
Bartl. 1830. Ord. p. 139: g. Astercar.
= Charieis Cass.

Kaulfussia Blume 1830. Enum. pl. Jav. II. p. 260: nov. g. Mesodmear. *(Aspidium aesculifolium Bl.)*
Grev. & Hook. 1833. Bot. Miscell. III. p. 229: g. Marattiacear. — Par. Endl. 1836. Gen. n. 667. p. 65; 1841. Ench. p. 42. — Griff. 1836. Asiat. research. XIX. 1 (Ann. sc. nat. 2e sér. IX. p. 187); 1840 in Hook. journ. bot. II. p. 375. t. 11. 12. — J. Smith 1841 in Hook. journ. bot. III. p. 421; 1843. Lond. journ. bot. II. p. 393. — Meisn. 1843. Gen. p. 435 (337). — Metten. 1856. Fil. h. Lips. p. 118.
Rchb. 1841. Nom. p. 30. n. 1058: g. Marattiear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. V. p. 694.
Presl 1845 in Corda Fl. Vorw. p. 92; 1847. Suppl. Pterid. p. 278: g. Kaulfussiear. — Par. Vriese & Hart. 1853. Mon. d. Maratt.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 82: g. Danaeacear.
Synon. Macrostoma Griff.

Kaulfussieae Presl 1845 in Corda Fl. Vorw. p. 92; 1847. Suppl. Pterid. p. 277: subordo Marattiacear. Gen.: Asterotheca, Kaulfussia.
Vriese & Hart. 1853. Mon. d. Maratt.: trib. Marattiacear.

Kayea Wallich 1832. Pl. As. rar. III. p. 4. t. 210: nov. g. Calophyllear. (K. floribunda.) *Cf.* Isis 1834. p. 779. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 43 (32). — Rchb. 1837. Hdb. p. 311; 1841. Nom. p. 212. n. 8036. — Endl. 1840. Gen. n. 5449. p. 1028; 1841. Ench. p. 535. — Lindl. 1837. Veg. kd. p. 402.
Spach 1836. Vég. phan. V. p. 333: g. Garciniear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 234: g. Guttiferar.

Keckia**) Glocker 1841. Nov. Act. Leop. XIX. 2. p. 319: g. plant. foss.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 16; 1846. Chlor. prot. p. XXVIII: g. Algar. foss. dubium.

Kedrostis Medic. 1791. Phil. Bot. II. p. 69: nov. g. ex typo Bryoniae africanae L.

*) Dicat. G. Fr. Kaulfuss, prof. Halensi.
**) Dicat. Mich. Keck de Keck.

Keerlia*) DC. 1836. Prodr. V. p. 309: nov. g. Bellidear. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2355. p. 382; 1841. Ench. p. 234. — Meisn. 1839. Gen. p. 186 (126). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 31. — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3248. — Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 951. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 710.
= Gutierrezia Lag. et Aphanostephus DC. (A. Gray.)

Keerlia A. Gray . . . . Pl. Lindh. II. p. 221; 1852. Pl. Wright I. p. 92: nov. g. Bellidear.? — Par. Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 188.

Kefersteinia Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 633; 1858. Xen. Orchid. p. 66. t. 25: nov. g. Orchidear., Zygopetalo aff.

Kegelia C. H. Schultz 1848. Linnaea XXI. p. 245: nov. g. Ivear. (Melampodium? ruderale.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 851.
= Unxia Linn.

Kegelia**) Rchb. f. 1852. Bot. Zeit. p. 670; 1858. Xen. Orchid. p. 45. t. 20: nov. g. Vandear., aff. Lacaenae. (Xen. Orchid. p. 110 g. Catasetear.)

Keimadracon Endl., Rchb. vid. *seq.*

Keimodracon***) Benth. 1834. Labiat. p. 492; 1848 in DC. Prodr. XII. p. 396: sect. Dracocephali. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 811. — Endl. 1838. Gen. n. 3638 *a.* p. 923 (*Keimadracon*); 1841. Ench. p. 308. — Rchb. 1841. Nom. p. 105. n. 4089. 1 (*Keimadracon*). — Walp. 1845. Rep. III. p. 791. — Ledeb. 1849. Ross. III. p. 382.

Keiri „C. B.“ Rupp. 1718. Fl. jen. p. 69. Ed. Hall. 1745. p. 75: g. pl. class. IV.
= Cheiranthus Linn.

Keiria Bowdich 1825. Madeir. p. 396.
Rchb. 1828. Consp. p. 212 d. n. 5561 inter genera incognita.
Endl. 1841. Gen. n. 6865. p. 1330; 1841. Ench. p. 685: g. gamopetalum incertae sedis. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 372.

Keithia Spreng. 1822. Neue Entdeck. III. p. 57; 1825. Syst. II. p. 219. n. 1450: nov. g. Capparidear.
. . . ?

Keithia†) Benth. 1834. Labiat. p. 409: nov. g. Melissinear. Sect.: Eriothymus, Keithia, Rhabdocaulon, Gymnocylix. — Par. G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 788. Sect. eaed. — Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 164. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 353. 420. — Walp. 1845. Rep. III. p. 742. 983. Sect. eaed.
Rchb. 1837. Hdb. p. 189; 1841. Nom. p. 106. n. 4119: g. Melissear. Sect. eaed. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 661. —

*) Dicat. peregrinatori F. W. Keerl.

**) Dicat. Kegel, hortulano univers. Halensis.

***) κεῖμαι, jaceo. (?)

†) Dicat. Rev. Patrick Keith.

Keithia Benth. cont.
Benth. 1848 in DC. Pr. XII. p. 246. Sect. ut antea.
Endl. 1838. Gen. n. 3620. p. 619; 1841. Ench. p. 307: g. Melissinar. Sect. eaed.
Meisn. 1840. Gen. p. 285 (193): g. Hedeomear.
Schmidt 1858 in Mart. Fl. Bras. fasc. XXII. p. 171: g. Satureinear. Sect.: Gymnocalyx, Rhabdocaulon.

Keklismenae (Keklismenen) Spreng. Anleit. II. p. 330: vid. *Ceclismenae.*

Kellaua A. DC. 1842. Ann. sc. nat. 2e sér. XVIII. p. 209; 1844. Prodr. VIII. p. 289 („?“): nov. g. Oleinear. (Myrsine Kellau Hochst.)
Endl. 1843. Spl. III. p. 74. n. $3350/_1$: g. Oleacear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 674: g. Eucleae aff.?
= Eucleae sp. (Hochst. in Flora 1843. p. 82. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 852.)

Kelleria Endl. 1847. Gen. Suppl. IV. p. 61. n. 2095: nov. g. Passerinear. (Drapetes Dieffenbachii Hook.)
Meisn. 1857 in DC. Pr. XIV. 2. p. 665: g. Gnidiear.

Kellettia Seemann 1853. Fl. Panam. p. 85: nov. g. Tiliacear., Sloaneae aff. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 328.

Kempfera Adans. 1763. Fam. II. p. 198: g. Verbenar. (Houst. ic. 1.)
= Tamonea Aubl.?

Kempferia Neck. vid. *Kämpferia Linn.*

Kennedia*) Vent. 1804. Malmais. t. 104—106.
Pers. 1807. Ench. II. p. 301. n. 1708: g. Diadelph. Decandr.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 758: g. Astragalear.
Link 1822. En. II. p. 235: g. Leguminosar. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 379. — Spreng. 1826. Syst. III. p. 310. n. 2592; 1831. Gen. II. p. 591. n. 2919.
Bronn 1822. Diss. p. 133: g. Phaseolear.
= Kennedya R. Brown.

Kennedya R. Brown 1812 in Ait. h. kew. ed. sec. IV. p. 299 (Verm. bot. Schr. V. p. 389): g. Papilionacear.
DC. 1825. Pr. II. p. 383: g. Phaseolear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 150. n. 3932. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40. — Bartl. 1830. Ord. p. 412. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 343. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 318. — Meisn. 1837. Gen. p. 94 (67).
Kennedyeae Benth.

Kennedya Benth. 1837. Enum. pl. Hügel. p. 38: g. restrict. Phaseolear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 351. — Brongn. 1843. En. genr. p. 130.
Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 122: g. Kennedyear. — Par. Endl. 1841. Gen. n. 6641. p. 1290; 1841. Ench. p. 671. —

*) Dicat. Kennedy, hortulano Londin.

Kennedya Benth. cont.
Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5797. — Meisn. 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 89. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555.
Synon. Caulinia Mönch; Kennediae Vent. pars.

Kennedyeae Benth. 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 112: subtrib. Phaseolear. Gen.: Kennedya, Zichya, Physolobium, Hardenbergia, Leptolobium. — Par. Endl. 1841. Gen. p. 1290; 1841. Ench. p. 671. Gen. ead. (Leptocyamus loco Leptolobii.) — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. Gen. ead. — A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 271. Gen. ead.
Rchb. 1841. Nom. p. 149: sect. Glycinear. Gen. ut Endl.

Kennedynella Steud. 1840. Nomencl. I. p. 845: g. Phaseolear. (*Leptolobium Benth.*, non Vog.)
= Leptocyamus Benth.

Kentia Adans. 1763. Fam. II. p. 508: g. Genistar. (Trigonella polyceratia et spinosa L.)
= Trigonellae sect. Buceras Ser.

Kentia Blume 1829. Fl. jav. Anon. p. 71: sect. Polyalthiae. — Par. Endl. 1839. Gen. n. 4713 c. p. 831; 1841. Ench. p. 422. — Rchb. 1841. Nom. p. 192. n. 7308. 3 (serius *Schnittspahnia Rchb.*).
Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 122: sect. Melodori. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 60. — Zolling. 1858. Linnaea XXIX. p. 318.

Kentia Blume 1838. Bull. Néerl. p. 64; 1838. Ann. sc. nat. 2e sér. X. p. 373: nov. g. Palmar. (K. procera.)
Kunth 1841. Enum. III. p. 639: g. Arecinar. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 1727/$_2$. p. 1371; 1841. Ench. p. 135. — Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2257. — Meisn. 1842. Gen. p. 356 (266). — Blume 1843. Rumphia II. t. 106.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 460: g. Arecinear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. III. p. 15.

Kentia Steud. 1840. Nomencl. I. p. 845: nov. g. Bignoniacear.? (Kuhlia morindaefolia Reinw.) *Cf.* Steud. Nom. II. p. 736: *Utanica.*
= Fagraea Thunb.

Kentranthus*) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 122. n. 207: nov. g. Sphanidophytor., a Valeriana L. sejunctum.
= Centranthus DC.

Kentrophyllum Necker 1790. Elem. bot. I. p. 86. n. 155: nov. g. Siphoniphytor., a Carthamo L. segregat.
DC. 1810. Ann. Mus. XVI. p. 158: g. Centaurear.
Cass. 1817. Dict. v. 7. p. 377; 1822. v. 24. p. 381: g. Centauriear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32 (*Centrophyllum*). — Less. 1832. Syn. p. 7. — Koch 1837. Syn. p. 408. Ed. II. p. 468. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 264.
Cass. 1826. Dict. v. 44. p. 36. 40; 1827. v. 50. p. 247 (*Kentroph.* s. *Centrophyllum*); 1830. v. 60. p. 571: g. Chryseidear. (spuriar.) — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 11.
Rchb. 1828. Consp. p. 111. n. 2690: g. Centaureear.
Bartl. 1830. Ord. p. 145: g. Centaureacear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 218 (*Centrophyllum*): g. Centaurinar.
DC. 1837. Pr. VI. p. 610: g. Carthamear. Sect. Atraxyle, Odontagnathia, Thamnacantha. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2874. p. 475; 1841. Ench. p. 247. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 227 (141). — Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3895 (*Centrophyllum*). Sect. ut DC. (Centrophyllum loco Atraxyles.) — Brongn. 1843. Én. genr. p. 36. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 713. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 714.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 244: g. Cynarocephalar.
Synon. Atractylis Vaill.; Attractilis Scop.; Carthamus Berkh.; Hohenwartha Vest; Heracantha Link; Calcitrapae sp. Juss.

Kentrophyta „Nuttall" Torrey & A. Gray 1840. Fl. North-Amer. I. p. 353: nov. g. Astragalear. (K. montana et viridis.) — Par. Endl. 1840. Gen. n. 6576. p. 1278; 1841. Ench. p. 669 (dubium.) — Rchb. 1841. Nom. p. 148. n. 5765 (*Centrophyta*). — Meisn. 1843. Comm. p. 351. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554.

Kentropsis Moquin-Tand. 1840. Chenop. en. p. 83: nov. g. Camphorosmear. — Par. A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 315.
Endl. 1842. Spl. II. p. 33. n. 1926/$_3$ (*Centropsis*): g. Kochiear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 368 (*Centropsis*). — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 137.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.

Kentrosporium Wallroth 1844. Beitr. z. Bot. I. 2. p. 163: nov. g. Entomo-pyrenomycetum. *Cf.* Bot. Zeit. 1845. p. 25.
Bonord. 1851. Hdb. p. 273: g. Sphaeriaceor. (*Synon. Cordiceps Fr.*)
= Hypocrea Fries.

Keppleria*) „Mart. Palm. t. 139" Endl. 1837. Gen. p. 251. n. 1750: g. Borassinar.
Rchb. 1841. Nom. p. 58. n. 2284: g. Maniceariear.
= Bentinckia Berry.

Keppleria Meisn. 1842. Gen. pl. vasc. p. 355 (266): nov. g. Arecinar. (Areca tigillaria Jack.)

Keracia Cosson 1856. Ann. sc. nat. 4e sér. V. p. 140: sect. Hohenackeriae. (H. polyodon n. sp.)

---

*) κέντρον, stimulus, calcar.

*) Dicat. Joh. Keppler, Astronomo.

Keramocarpus Fenzl 1843 in Russegg. Reise II. p. 966: nov. g. Smyrnear. — Par. Endl. 1843. Spl. III. p. 83. n. 4540/$_1$. — Walp. 1846. Rep. V. p. 921.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 779: g. Smyrnidar.
Endl. 1847. Spl. V. p. 15: g. Eusmyrnear.
Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 173 *(Ceramocarpus)*: g. Umbelliferar.

Kerandrenia Steud. vid. *Keraudrenia Gay.*

Keranthus Lour. in herb. Banks.
= Dendrobium Swartz.

Keraselma Necker 1790. Elem. bot. II. p. 353. n. 1154: nov. g. Cyrtosiphytor., ab Euphorbia L. disjunctum. *Cf.* Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 387 et Wittst. Etym. Handw. p. 174 *(Caraselma)*.
Rchb. 1828. Consp. p. 194. n. 5012 *b*: sect. Euphorbiae.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 759: subsect. Tithymali. *(E.* Peplus, exigua, segetalis, Lathyris, Esula, Cyparissias, etc.)

Keratephorus*) Hasskarl 1855. Flora II. p. 578 (Retzia I. p. 100): nov. g. Sapotacear. (Isonandra polyantha Wight et Azaola Leeri T. & B.) *Cf.* Müll. Ann. bot. V. p. 475. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. II. p. 1038 *(Ceratophorus)*.

Keraudrenia**) Gay 1821. Diss. p. 31; 1821. Mém. Mus. VII. p. 461. t. 8: nov. g. Lasiopetalear. (K. hermanniaefolia.) — Par. HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 312. — DC. 1824. Pr. I. p. 489. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 948. n. 1132; 1830. Gen. I. p. 235. n. 1238. — Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV; 1828. Consp. p. 204. n. 5300; 1837. Hdb. p. 292; 1841. Nom. p. 202. n. 7706. — Bartl. 1830. Ord. p. 342. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 527. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 477. — Meisn. 1837. Gen. p. 33 (26). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1016. — Endl. 1840. Gen. n. 5327. p. 997; 1841. Ench. p. 519. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.
Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 388: g. Büttneriacear. — Par. Steud. 1840. Nom. I. p. 845 *(Kerandrenia)*; 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 236.
Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 317. 346: g. Keraudrenieur.

Keraudrenieae Steetz 1847 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 317. 346: subtrib. Lasiopetalear. monocarpar. Gen.: Keraudrenia.

Keria Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 869: g. Rosaceis aff.
Cambess. 1824. Ann. sc. nat. I. p. 239. 389: sect. Spiraeae.

*) κέρας, cornu.
**) Dicat. Cl. Keraudren, navalium exercituum archiatro.

Keria Spreng. cont.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 504. n. 1851; 1830. Gen. I. p. 412. n. 2059: g. Rosacear. — Par. Blume 1826. Bijdr. Nr. 17. p. 1113. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 128.
Meisn. 1837. Gen. p. 103 (73): g. Ulmariear.
= Kerria DC.

Kerinozoma*) Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 358: nov. g. Rottbölliacear. — Par. Miq. 1857. Ind. bat. III. p. 404.

Kermesia Endl. 1840. Gen. n. 5262 *a*. p. 977; 1841. Ench. p. 508: sect. Phytolaccae.
= Phytolacca Tourn.

Kermula Noronh. . . .
= Fleurya Gaudich.

Kernera**) Medic. 1792. Pflanzengatt. p. 71; 1794 in Usteri n. Ann. II. p. 42: nov. g. Cruciflorar. *(Kreuzblüthen* — Myagrum saxatile Jacq.)
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 234; 1821. Syst. II. p. 359; 1824. Pr. I. p. 172: sect. Cochleariae. — Par. Dumort. 1827. Belg. p. 120. — Gaud. 1829. Helv. IV. p. 269. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 187. — Endl. 1839. Gen. n. 4882 *b*. p. 870; 1841. Ench. p. 449. — Koch 1843. Syn. ed. II. p. 438.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1102. 1142: g. Siliculosar. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 264. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 325.
Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4778: g. Camelinear.
Rchb. 1832. Fl. exc. p. 669: g. Alyssinear. — Par. Koch 1836. Syn. p. 66. Ed. II. p. 72. — Meisn. 1837. Gen. p. 11 (11). — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 129. — Boiss. & Reut. . . . . Pugill. pl. nov. p. 9. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 200.
Rchb. 1837. Hdb. p. 260; 1841. Nom. p. 181. n. 6966: g. Armoraciear.

Kernera Willd. 1805. Spec. IV. p. 947. n. 1873: g. Polygam. Monoec.
Agdh. 1822. Aphor. p. 124: g. Najadear.
Schult. 1829. Syst. VII. p. XIX. 169: g. Aroidear. (Hexandr. Monogyn.)
= Posidonia Kön.

Kerneria Mönch 1794. Meth. p. 595: nov. g. Petalostemonis. (Bidens pilosa L.)
Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 397: subg. Bidentis.
Cass. 1825. Dict. v. 38. p. 17; 1827. v. 51. p. 473 (typus: Coreopsis ferulaefolia Jacq.); 1829. v. 59. p. 321. 328; 1830. v. 60. p. 576: g. Coreopsidear. (verar.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 109. n. 2613. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 19.
Bartl. 1830. Ord. p. 142: g. Helianthear.
(Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 169: g. Bidentidear.
= Bidentis Linn. pars.

*) κήρινος, cerinus; ζῶμα, cingula.
**) Dicat. Joh. Sim. a Kerner, prof. Stuttgart.

Keropagae (Keropagen) Spreng. Anleit. II. 1. p. 281: vid. *Ceropagae.*

Kerria*) DC. 1816. Linn. Trans. XII. p. 156: nov. g. Rosacear. (Corchorus japonicus Thunb.) *Cf.* Isis 1829. p. 502. — Par. Link 1822. En. II. p. 66.
DC. 1825. Pr. II. p. 541: g. Spiraeacear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIII. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 39. — Bartl. 1830. Ord. p. 404. — Link 1831. Hdb. II. p. 95. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 517. — Spach 1834. Vég. phan. I. p. 429. — Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 390.
Rchb. 1828. Consp. p. 168. n. 4450; 1841. Nom. p. 168. n. 6512: g. Spiraeear. (genuinar.)
Sieb. & Zucc. 1835. Fl. japon. I. p. 183. t. 98.
Lindl. 1837. Bot. Regist. XXII. t. 1873: g. Spiraear.
Endl. 1840. Gen. n. 6390. p. 1247; 1841. Ench. p. 660: g. Spirear. verar.
Brongn. 1843. En. genr. p. 124: g. Spireacear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 565: g. Spiraeidar.
Synon. Keria Spreng.; Rubi sp. Linn.

Ketmia Tourn. 1700. Inst. p. 99. t. 26: g. pl. class. I. — Par. Rupp. 1718. Fl. jen. p. 38. Ed. Hall. 1745. p. 39.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 133.
Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 221: g. Monadelph. (serius ad Hibiscum relatum). — Par. Scop. 1772. Carn. II. p. 44. (Polyandr.)
Adans. 1763. Fam. II. p. 399: g. Malvar. — Par. Medic. 1787. Malv. p. 45. *Cf.* Medic. 1789. Vorles. IV. 1. p. 240 *(Kettmia).*
Scop. 1777. Intr. p. 282: g. Columniferar.
Mönch 1794. Meth. p. 617: g. Petalostemonis. (Hibiscus mutabilis L.)
DC. 1824. Pr. I. p. 448: sect. Hibisci. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5273*b*. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 477. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 48. — Endl. 1840. Gen. n. 5277*b*. p. 982; 1841. Ench. p. 512. Subsect.: Cremontia, Euketmia, Sabdariffa, Polychlaena? — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 438. — A. Rich. 1845. Pl. vasc. Cub. p. 137. — Garcke 1849. Bot. Zeit. p. 821.

Ketmia Wallroth 1822. Syll. Ratisb. I. p. 140: sect. Malvae. (M. rotundifolia L.)

Ketmieae Rchb. 1828. Consp. p. 202; 1832. Fl. exc. p. 770: subdiv. Hibiscear. Gen.: Lagunaria, Fugosia, Redoutea, Gossypium, Hibiscus, Parita, Thespesia. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 287. Sect.: *genuinae* (gen.: Senra, Hibiscus, Abelmoschus, Kosteletzkya, Lagunaria, Polychlaena, Gossypium), Fugosieae, Thespesieae. — Rchb. 1841. Nom. p. 200. Gen.: Fugosia, Hibiscus, Serraea, Abelmoschus, Kosteletzkya, Lagunaria, Polychlaena, Gossypium.

*) Dicat. Bellenden Ker, botanico.

Kettmia Medic. vid. *Ketmia Tourn.*

Keuchera Endl. vid. *Heuchera Linn.*

Keulia Molin . . . .
= Peumus Nees. (Endl. Gen. p. 318.)

Keura Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 172: nov. g. Dioec. Monandr. — Par. Thunb. 1781. Nov. gen. I. p. 25.
= Pandanus Linn.

Keurva Endl. in synon. Pandani: vid. *Keura Forsk.*

Khaya*) A. Juss. 1820. Mém. Mus. XIX. p. 249: nov. g. Swieteniear. (Swietenia senegalensis L.) *Cf.* Linnaea VI. Litt. p. 110. — Par. Spach 1834. Vég. phan. III. p. 167. — Meisn. 1837. Gen. p. 47 (35). — Endl. 1840. Gen. n. 5550. p. 1053; 1841. Ench. p. 553. — Römer 1846. Fam. nat. I. p. 129. 134.
Guillem. & Perr. 1832. Fl. Seneg. I. p. 29.
Rchb. 1837. Hdb. p. 213; 1841. Nom. p. 213. n. 8088: g. Khayear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 462: g. Swietenear.

Khayeae Rchb. 1837. Handb. p. 313: sect. Swieteniear. Gen.: Khaya.
Rchb. 1841. Nom. p. 213: sect. Cedrelear. Gen. id.

Kibara**) Endl. 1837. Gen. n. 2016. p. 314; 1841. Ench. p. 195: g. Monimiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 69. n. 2590. — Tulasne 1855. Arch. Mus. VIII. p. 403. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 110.
Spach 1842. Vég. phan. XI. p. 90: g. Amborear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 299: g. Monimiacear. — Par. Blume 1854. Mus. bot. Lugd. II. p. 88. — Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 165.
Synon. Brongniartia Blume; Sciadicarpus Hassk.

Kibatalia***) G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 86: g. Wrightiear.
= Kixia Blume.

Kibbesia Walp. Repert. II. p. 148: sphalm. pro *Kibessia DC.*

Kibera Adans. 1763. Fam. II. p. 417: g. Erucar. (Sisymbrium supinum L.)
DC. 1821. Mém. Mus. VII. p. 238; 1821. Syst. II. p. 477; 1824. Pr. I. p. 194: sect. Sisymbrii. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 208. — Rchb. 1832. Fl. exc. p. 689; 1841. Nom. p. 183. n. 7033. 2. — Endl. 1839. Gen. n. 4906*f*. p. 875; 1841. Ench. p. 449. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 182. — Griseb. 1843. Rumel. I. p. 256.
Dumort. 1827. Belg. p. 124: sect. Erysimi.
Rchb. 1828 ap. Mössl. II. p. 1165; 1828. Consp. p. 185. n. 4808*b*: sect. Velari.

*) Vulgo *Khaye* in Senegambia.
**) Vox Sundensis.
***) *Kibatala* nomen javanum arboris.

Kibessia*) DC. 1828. Prodr. III. p. 196: nov. g. Charianthear. (Melastoma azurea Bl.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 174. n. 4645; 1841. Nom. p. 174. n. 6774. — Bartl. 1830. Ord. p. 330. — Blume 1831. Flora II. p. 524; 1849. Mus. bot. Lugd. I. p. 7. — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 801. — Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 270. — Meisn. 1838. Gen. p. 111 (79). — Endl. 1840. Gen. n. 6265. p. 1222; 1841. Ench. p. 647. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1470. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 733.

Decne 1846. Ann. sc. nat. 3e sér. V. p. 313: g. Astroniear.

Naud. 1852. Ann. sc. nat. 3e sér. XVIII. p. 262: g. Kibessiear. — Par. Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 569. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 799.

Kibessieae Naudin 1849. Ann. sc. nat. 3e sér. XII. p. 201; 1852. ibid. XVIII. p. 260: subordo Melastomacear. Gen.: Macroplacis, Ewyckia, Rectomitra, Kibessia.

Kicksia Wittst. vid. *seq.*

Kickxia**) Dumort. 1827. Fl. belg. p. 35; 1829. Anal. fam. p. 24: nov. g. Antirrhinear. (Antirrhinum Elatine et spurium.) *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 485 (*Kicksia*). — Par. Spach 1840. Vég. phan. IX. p. 267.

= Linariae sect. Elatinoides Chav.

Kickxia Blume, Miquel vid. *Kixia Blume.*

Kielboul Adans. 1763. Fam. II. p. 31: g. Phalaridum.

= Aristidae sect. Arthratherum.

Kielmeyera***) Martius & Zucc. 1824. Nov. gen. I. p. 109. t. 68—72: nov. g. Bonnetiar. *Cf.* Flora 1825. I. p. 30.

St. Hil. 1827. Fl. Bras. I. p. 303: g. Ternströmiacear. — Par. Cambess. 1828. Mém. Mus. XVI. p. 412. — Pohl 1831. Pl. Bras. II. p. 45. t. 129—132. — Meisn. 1837. Gen. p. 41 (30). — Dietr. 1843. Syn. III. p. 210. 257. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 397.

Rchb. 1828. Consp. p. 208. n. 5401: g. Ternströmiear.

Bartl. 1830. Ord. p. 336: g. Bonnetiear. — Par. Spach 1835. Vég. phan. IV. p. 71.

G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 571: g. Laplacear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5419. p. 1021; 1841. Ench. p. 531. — Rchb. 1841. Nom. p. 208. n. 7928.

Rchb. 1837. Hdb. p. 302: g. Camelliear.

Synon. Martineria Fl. Flum.

Kielmiera G. Don Gen. syst. I. p. 564: sphalm. pro *Kielmeyera.*

Kierschlegeria*) Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 403: nov. g. Fuchsiear. (Fuchsia lycioides Andr.) — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 246 (*Kirschlegeria*); 1841. Nom. p. 170. n. 6575 (*Kirschlegera*).

Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 176: g. Fuchsinear.

Endl. 1840. Gen. n. 6125 $b\gamma$. p. 1193; 1841. Ench. p. 638: sect. Fuchsiae.

Kiesera**) Reinwardt 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Diadelph. (sericea, arbor leguminosa, diadelpha: Isis 1823. p. 317.)

Reinw. 1825. Syll. Ratisb. II. p. 11: g. Leguminosar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 245. n. 2556 (*Kieseria*).

G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 219 (*Kieseria*): g. Clitoriar.

Endl. 1841. Gen. n. 6654. p. 1292; 1841. Ench. p. 671: g. Glycinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 149. n. 5810. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 555. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 554.

Meisn. 1843. Comm. p. 350: g. Clitoriear.

Miq. 1855. Ind. bat. I. p. 290: g. Galegear. (*Synon. Xiphocarpus Presl.*

Kieseria Nees (Neuwied Reise I. p. 104) 1821. Flora I. p. 298: nov. g. Guttiferar.

= Bonnetia Mart. & Zucc.

Kieseria Spreng., G. Don vid. *Kiesera Reinw.*

Kigelia***) DC. 1838. Bibl. univ. Genèv. XVII. p. 135 (Rev. Bignon. p. 18); 1845. Prodr. IX. p. 247: nov. g. Crescentiear. (Tanaecium pinnatum W.) — Par. Endl. 1841. Spl. I. p. 1409. n. 4173/$_1$; 1841. Ench. p. 350. n. 4172/$_1$. — Meisn. 1840. Gen. p. 301 (211). — Rchb. 1841. Nom. p. 121. n. 4727. — Seem. 1854 in Hook. Kew gard. misc. VI. p. 276. Char. reform.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 674: g. Crescentiacear.

Synon. Tanaecium Boj.; Sotor Fenzl; Crescentiae sp. Jacq.; Tripinnariae sp. Spreng.

Kigellaria Endl., Brongn. vid. *Kiggelaria Linn.*

Kiggelaria†) Linn. 1737. Gen. p. 309. n. 760; 1737. Cliff. p. 462; 1740. Syst. p. 31; 1753. Sp. II. p. 1037; 1759. Syst. ed. X. p. 1295. n. 1001; 1763. Sp. ed. II. p. 1466; 1764. Gen. ed. VI. p. 528. n. 1128; 1767. Syst. ed. XII. p. 658: g. Dioec. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 747; 1784. Syst. p. 891. — Reich. 1778. Gen. p. 524.

*) Nomen javanum *Kibessie.*
**) Dicat. Joh. Kickx, prof. Gent.
***) Dicat. C. F. de Kielmeyer.

*) Dicat. Fr. Kirschleger, prof. Argentorat.
**) Dicat. Diet. Gotth. Kieser, prof. Jenensi.
***) *Kigeli-keia* Mozamb.
†) Dicat. Fr. Kiggelaer.

Kiggelaria Linn. cont.
n. 1233. — Schreb. 1791. Gen. II. p. 697. n. 1538. — Pers. 1797. Syst. p. 933; 1807. Ench. II. p. 626. n. 2259. — Willd. 1805. Sp. IV. p. 816. n. 1819; 1809. En. p. 1019.

Gled. 1749. Berl. V. p. 125; 1764. Syst. p. 96. n. 398: g. Thalamostemonum.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 30: g. Culminiar.

Adans. 1763. Fam. II. p. 449: g. Cistor.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 453.

Scop. 1777. Intr. p. 225 *(Kiggellaria)*: g. Nomadear.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 206. t. 44. f. 4 (africana).

Juss. 1789. Gen. p. 387: g. Euphorbiar. *Cf.* Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 476.

Neck. 1790. El. II. p. 389. n. 1209: g. Ypsoophytor.

Gmel. 1791. Syst. p. 727: g. Decandr. Pentagyn.

Vent. 1799. Tabl. III. p. 489: g. Tithymaloidear.

Batsch 1802. Tab. p. 168: g. Tricoccar.

St. Hil. 1805. Expos. II. p. 280: g. Euphorbiacear. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 424. — Link 1822. En. II. p. 430. — Agdh. 1823. Aphor. p. 194.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 658; 1825. Syst. II. p. 440. n. 1739: g. Terebinthacear.

DC. 1824. Pr. I. p. 257: g. Kiggelariear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49. — Bartl. 1830. Ord. p. 280. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 292. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). — Rchb. 1837. Hdb. p. 267; 1841. Nom. p. 186. n. 7135. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 135.

Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LIX: g. Flacourtianear.

Rchb. 1828. Consp. p. 188. n. 4883: g. Flacourtiear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 384. n. 1935.

Link 1831. Hdb. II. p. 221: g. Kiggelariacear.

Endl. 1839. Gen. n. 5082. p. 922; 1841. Ench. p. 479 *(Kigellaria)*: g. Erythrospermear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328 *(Kiggellaria)*.

Brongn. 1843. Én. genr. p. 75 *(Kigellaria)*: g. Bixinear.

Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 364; 1857. ibid. VIII. p. 267: g. Pangiear.

Kiggelariaceae Link 1831. Handb. II. p. 221: ordo 3 Anastemonum. Gen.: Kiggelaria.

Kiggelarieae DC. 1824. Prodr. I. p. 257: trib. Flacourtianear. Gen.: Kiggelaria, Melicytus, Hydnocarpus. — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 292. Gen. ead. — Meisn. 1837. Gen. p. 18 (16). Gen. ead. et Denhamia. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 133. Gen. ut DC.

Kiggelarieae DC. cont.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 49: trib. Flacurtiacear. Gen.: Kiggelaria, Melicytus.

Bartl. 1830. Ord. p. 279: div. Flacourtianear. Gen. ut DC. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 267. Gen.: Kiggelaria; Hydnocarpus; Pangium. — Rchb. 1841. Nom. p. 186. Gen.: Kiggelaria. Subsect.: Pangieae.

Kiggellaria Scop., Juss., Neck., Vent., St. Hil., Poir. etc. vid. *Kiggelaria Linn.*

Kiliana „C. H. Schultz" Rchb. 1841. Nom. p. 85. n. 3288: g. Asterear. genuinar.

Killinga Adans. 1763. Fam. II. p. 498: g. Chaerophyllor.
= Athamantae Koch sp.

Killinga Blanco 1837. Fl. Filipin. p. 34: g. obscurum Cyperear. *Cf.* Steud. 1855. Glum. II. p. 71.

Killingia Juss. 1789. Gen. p. 27: g. Cyperoidear.

St. Hil. 1805. Expos. I. p. 68: g. Cyperacear. — Par. Decne 1834. Nouv. Ann. Mus. III. p. 360. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 226.

Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 20 et Schult. 1824. Mant. II. p. 4 *(Kyllingia)*: g. Cyperear. — Par. Brongn. 1843. Én. genr. p. 12.
= Kyllingia Linn. f.

Killyngia Hamilt. vid. *Kyllingia Linn.*

Kingia*) R. Brown 1826 in Phil. Parker King voy. App. bot. p. 529 (Verm. bot. Schr. IV. p. 78): nov. g. Juncear. (K. australis.) *Cf.* Linnaea II. p. 691. — Par. Schult. 1829. Syst. VII. p. XXI. 281. — Bartl. 1830. Ord. p. 38. — Spreng. 1831. Gen. II. p. 792. n. 4109. — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 134.

Rchb. 1828. Consp. p. 64. n. 1315: g. Xerotear.

Endl. 1837. Gen. n. 1057. p. 132; 1841. Ench. p. 76: g. Kingiacear. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 375. — Meisn. 1842. Gen. p. 406 (310). — Lehm. 1847. Pl. Preiss. II. p. 52. — Steud. 1855. Glum. II. p. 311.

Rchb. 1841. Nom. p. 46. n. 1682: g. Kingiear.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 192: g. Juncacear.

Kingiaceae Endl. 1837. Gen. p. 132; 1841. Ench. p. 76: fam. Juncaceis aff. Gen.: Kingia, Dasypogon. — Par. Kunth 1841. Enum. III. p. 375. Gen. ead. — Simil. Steud. 1855. Glum. II. p. 311. Gen. ead.

Meisn. 1842. Gen. p. 406 (370): subordo Juncacear. Gen. ead.

Kingieae Rchb. 1841. Nomencl. p. 46: subdiv. Juncear. Gen.: Kingia, Dasypogonia.

---

*) Dicat. Phil. Parker King et memoriae Phil. Gidley King, quondam gubernatoris.

Kingsboroughia Liebm. 1850. Medd. nat. Foren. p. 67; 1855. Bidr. till Meliosm. fam.: nov. g. Sapindacear. (Mellingtonia alba Schl. = *Llavea Planch.* olim.)
Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 134: g. Meliosmear.
= Meliosma Kunth? (Planch. 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. III. p. 295.)

Kingstonia*) Gray 1821. Arr. brit. pl. II. p. 531: nov g. Saxifragear. (Saxifraga Hirculus L.)
= Saxifragae sect. Hirculus Tausch.

Kinkina Adans. 1763. Fam. II. p. 147: g. Aparinium.
= Cinchona Linn.

Kirganelia**) Juss. 1789. Gen. p. 387: nov. g. Euphorbiar.
Gmel. 1791. Syst. p. 1008 (*Kirganella*): g. Monadelph. Pentandr.
Batsch 1802. Tab. p. 168: g. Tricoccar. — Par. Spreng. 1826. Syst. III. p. 48. n. 2372; 1831. Gen. II. p. 537. n. 2636.
St. Hil. 1805. Expos. II. p. 280 (*Kirganella*): g. Euphorbiacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 193. — A. Juss. 1824. Euphorb. p. 21. t. 4.
Pers. 1807. Ench. II. p. 591: sect. Phyllanthi.
Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 450: g. Phyllantho aff.
Rchb. 1828. Consp. p. 196. n. 5077; 1841. Nom. p. 195. n. 7412: g. Phyllanthear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45 (*Kirganellia*). — Bartl. 1830. Ord. p. 371. — Spach 1834. Vég. phan. II. p. 486. — Endl. 1840. Gen. n. 5849. p. 1120; 1841. Ench. p. 589. — Meisn. 1841. Gen. p. 342 (254). — Brongn. 1843. Én. genr. p. 81. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 282.
Baill. 1858. Euphorb. p. 612: g. Phyllanthidear. Sect.: Anisonema, Anisonemopsis, Eukirganelia.
Synon. Ardinghelia Comm.; Phyllanthus Kirganelia Willd.

Kirganella Gmel., St. Hil. vid. *praeced.*

Kirganellia Dumort. vid. *praeced.*

Kirilovia Lindl. vid. *seq.*

Kirilowia***) Bunge 1843. Del. sem. Dorp. p. 7; 1846. Linnaea XVIII. p. 153: nov. g. Camphorosmear. (K. eriantha et pilosa.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513 (*Kirilovia*): g. Chenopodiacear.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 125: g. Panderiear. — Par. Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 741. — Bunge (Reliq. Lehm. p. 276) 1854. Ac. Pet. Mém. sav. etr. VII. p. 452.

Kirschlegera Rchb. vid. *Kierschlegeria Spach.*

Kirschlegeria Rchb. vid. *praeced.*

*) Dicat. Dr. Kingstone.
**) *Kirganeli* nomen malabaricum Phyllanthi.
***) Dicat. Joh. Kirilow, peregrinatori.

Kissi Endl. 1840. Gen. n. 5425 *b.* p. 1023; 1841. Ench. p. 532: sect. Camelliae.

Kissosycea Miquel 1848. Lond. journ. bot. VII. p. 452: sect. Ficus. (F. scandens et fruticosa Roxb.) — Par. Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 723.

Kitaibela Batsch vid. *seq.*

Kitaibelia*) Willd. 1799. Neue Schr. nat. Fr. Berl. II. p. 107; 1800. Spec. III. p. 800. n. 1294; 1809. Enum. p. 734: nov. g. Monadelph. Polyandr.
Waldst. & Kit. 1802. Pl. rar. Hung. I. p. 29.
Batsch 1802. Tab. p. 19 (*Kitaibela*): g. Malvacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 58. — Pers. 1807. Ench. II. p. 253. n. 1637. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 800; 1826. Syst. III. p. 109. n. 2443; 1831. Gen. II. p. 556. n. 2722. — Link 1822. En. II. p. 212; 1831. Hdb. II. p. 357. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 453. — DC. 1824. Pr. I. p. 436. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 466.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIII; 1828. Consp. p. 201. n. 5244; 1832. Fl. exc. p. 771: g. Malopear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 26 (22). — Endl. 1840. Gen. n. 5268. p. 979; 1841. Ench. p. 511. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 76. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: g. Malvear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 346. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 342.
Rchb. 1837. Hdb. p. 287; 1841. Nom. p. 199. n. 7617: g. Kitaibeliear.

Kitaibelieae Rchb. 1837. Handb. p. 287; 1841. Nomencl. p. 199: subdiv. Malopear. Gen.: Kitaibelia.

Kitaibella Reuss Rep. comm. II. p. 30. 145: lege *Kitaibelia Willd.*

Kittelia**) Rchb. 1837. Handb. p. 186; 1841. Nomencl. p. 102. n. 4000: g. Delisseear.
Meisn. 1839. Gen. p. 241 (148): g. Delisseacear. — Par. Endl. 1841. Spl. I. n. 3065. p. 1392; 1841. Ench. p. 264.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 693: g. Delissear.
Synon. Cyanea Gaudich., non Zoolog.

Kixia Blume 1830. Fl. jav. Praef. p. VII: synon. *Hasseltiae Blume.*
Endl. 1838. Gen. n. 3430. p. 586; 1841. Ench. p. 295: g. Wrightiear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 503. — Meisn. 1840. Gen. p. 265 (173). — Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5188. — A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 408. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 435 (*Kickxia*).
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Wrightear.
Blume 1848. Rumphia IV. p. 25 (*Kickxia*): g. Apocynear.
Synon. Hasseltia Blume; Kibatalia G. Don.

*) Dicat. Paulo Kitaibel, prof. Pestinensi.
**) Dicat. Mart. Bald. Kittel, prof. Aschaffenb.

Kixia „Dumort." Meisn. Comm. p. 215 in synon. Linariae: vid. *Kickxia.*

Klanderia F. Müll. 1852. Linnaea KXV. p. 426: g. Labiatar. (K. chlorantha.) Ubi genus?

Klaprothia*) HBK. 1823. Nov. gen. VI. p. 121. t. 537: nov. g. Loasear. (verar. — Kl. mentzelioides.) — Par. Kunth 1824. Syn. III. p. 405. — DC. 1828. Pr. III. p. 343. — Rchb. 1828. Consp. p. 160. n. 4236. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 407. n. 2036. — Bartl. 1830. Ord. p. 273. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 66. — Meisn. 1838. Gen. p. 125 (90). — Endl. 1839. Gen. n. 5113. p. 931; 1841. Ench. p. 486. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 37. 82. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 745.
Rchb. 1837. Hdb. p. 232; 1841. Nom. p. 160. n. 6244: g. Mentzeliear.
Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 235: g. Loasinear.

Klasea Cassini 1826. Dict. v. 41. p. 310. 321; 1830. v. 60. p. 572: nov. g. Serratulear. genuinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 101. n. 2316.
Bartl. 1830. Ord. p. 144: g. Carduacear.
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 290; 1841. Nom. p. 99. n. 3886. 3: sect. Serratulae. — Par. DC. 1837. Pr. VI. p. 668. — Endl. 1838. Gen. n. 2897 c. p. 480; 1841. Ench. p. 247. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 756. — (Gren. &) Godr. 1850. France II. p. 269.
Less. 1832. Syn. p. 6: subg. Rhapontici.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 12: g. Carduinear.
Synon. Centaureae sp. Linn.; Cardui sp. Cav.

Klausea „Cass." Endl. Gen. p. 480 in synon. Serratulae: sphalm. pro *Klasea.*

Kleinhofia Schreb., Gis., Willd., Cram., Pers., Link: vid. *Kleinhovia Linn.*

Kleinhovea Roxb. vid. *seq.*

Kleinhovia**) Linn. 1763. Spec. ed. II. p. 1365; 1764. Gen. ed. VI. p. 468. n. 1024; 1767. Syst. ed. XII. p. 601: g. Gynandr. Decandr. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 687; 1784. Syst. p. 825. — Reich. 1778. Gen. p. 463. n. 1113. — Pers. 1797. Syst. p. 870.
Linn. 1764. Ord. nat.: g. Columniferar. — Par. Scop. 1777. Intr. p. 285. — Gis. 1792. Prael. p. 452 (*Kleinhofia*). — Batsch 1802. Tab. p. 22.
Cavan. 1788. Diss. V. p. 288. t. 146: g. Malvacear. Char. emend. *Cf.* Röm. & Ust. Mag. Bot. XI. p. 128. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 278. — Vent. 1799. Tabl. III. p. 200. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 71. — Pers. 1807. Ench. II. p. 240. n. 1618. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 458. — Link 1822. En. II. p. 199.
Schreb. 1789. Gen. I. p. 324. n. 827: g. Dodecandr. Monogyn. — Par. Willd. 1799. Sp. II. p. 871. n. 954.

Kleinhovia Linn. cont.
Neck. 1790. El. II. p. 426. n. 1250: g. Comizophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 261. t. 137.
Gmel. 1791. Syst. p. 683: g. Decandr. Monogyn.
Cram. 1803. Disp. p. 164: g. Monadelph. Dodecandr. — Par. Roxb. 1832. Ind. III. p. 140 (*Kleinhovea*).
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 809; 1826. Syst. III. p. 83. n. 2419; 1831. Gen. II. p. 550. n. 2693: g. Büttnerear.
DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: g. Helicterear.?
DC. 1824. Pr. I. p. 488: g. Byttneriear.? — Par. G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 526. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 493.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LXIV: g. Sterculiacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 203. n. 5284: g. Sterculiear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46: g. Buttneriear. — Par. Brongn. 1843. En. genr. p. 79 (*Kleinhowia*).
Bartl. 1830. Ord. p. 342: g. Büttneriear. — Par. Endl. 1841. Ench. p. 509. n. 5335.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 64: g. Kleinhoviear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 33 (26). — Rchb. 1837. Hdb. p. 291; 1841. Nom. p. 203. n. 7738. — Endl. 1840. Gen. p. 999. n. 5335.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364: g. Byttnerear.

Kleinhovieae Wight & Arnott 1834. Prodr. I. p. 68: trib. Byttneriacear. Gen.: Kleinhovia.
Meisn. 1837. Gen. p. 33 (26): trib. Büttneriacear. Gen. id.
Rchb. 1837. Hdb. p. 291: sect. Sterculiear. Gen. id.
Endl. 1840. Gen. p. 999: fam. Büttnerieis aff. Gen. id. (serius Büttnerieis insertum.)
Rchb. 1841. Nom. p. 203: sect. Myrodiear. Gen. id.

Kleinhowia Brongn. vid. *Kleinhovia Linn.*

Kleinia Linn.*) 1737. Gen. p. 252. n. 649: g. Syngenes. Polygam. Superfl.
Linn. 1737. Cliff. p. 395; 1742. Gen. ed. II. p. 394. n. 775; 1748. Ups. p. 254: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Haw. 1812. Syn. succ. p. 312. Ed. Schrank 1819. p. 345.
Gled. 1749. Berl. V. p. 131: g. Petalostemonum.
Linn. 1751. Phil. bot. p. 29: g. Corymbiferar., serius Cacaliae injunctum.
P. Browne 1756. Jamaic. p. 316: g. Syngenes. sect. 1. (?)
Link 1829. Hdb. I. p. 733: g. Asteroidear.

*) Dicat. Mart. Henr. Klaproth. chemico.

**) Dicat. M. Kleinhof, directori h. bot. Batav.

*) Dicat. nobilissimo J. Th. Klein, Gedanensi.

Kleinia Linn. cont.
DC. 1837. Pr. VI. p. 336: g. Eusenecionear. Sect.: Cacalianthemum, Erechthitoides. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2809. p. 458; 1841. Ench. p. 244. Sect. eaed. — Meisn. 1839. Gen. p. 214 (136).
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 32: g. Senecionear. (genuinar.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 86. n. 3363. Sect.: Kleinia, Erechtitopsis. — Brongn. 1843. En. genr. p. 38. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 713.
Synon. Cacalianthemum Dill.; Cacalia Cass.

Kleinia Jacq. 1763. Stirp. Amer. hist. p. 215. t. 127: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Schreb. 1791. Gen. II. p. 545. n. 1270. — Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1738. n. 1450; 1809. En. p. 851. — Pers. 1807. Ench. II. p. 397. n. 1815.
Scop. 1777. Intr. p. 128: g. Flosculosar.
Gis. 1792. Prael. p. 539: g. Discoidear.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 544; 1826. Syst. III. p. 438. n. 2680; 1831. Gen. II. p. 611. n. 3019: g. Eupatorinar.
HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 156: g. Jacobear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 442.
Link 1822. En. II. p. 310: g. Corymbiferar.
Less. 1831. Linnaea VI. p. 132: g. Asterear.
Less. 1832. Syn. p. 196: g. Chrysocomear.
= Porophyllum Vaill.

Kleinia Juss. 1803. Ann. Mus. II. p. 424: nov. g. Corymbiferar. *Cf.* Konig Ann. of bot. II. p. 353. — Par. St. Hil. 1805. Expos. I. p. 393.
Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 459; 1825. v. 38. p. 203; 1829. v. 59. p. 63: g. Tagetinear.? — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 143.
Rchb. 1828. Consp. p. 103. n. 2362: g. Tagetear.
Cass. 1830. Dict. v. 60. p. 581: g. Chrysocomear.?
= Jaumea Pers.

Kleioweissia*) Bayrh. 1849. Taunus p. 1. 3: nov. g. Phascacear. (Phascum rostellatum.)
= Phascum C. Müll.

Kleistrocalyx Steud. 1850. Flora I. p. 229: nov. g. Cyperacear., Rhynchosporae aff. (Nomen.)
= Calyptrolepis Steud.

Klenzea Schultz Bip. mss. in Schimp. It. abyss. sect. I. nr. 227 et nr. 265. (Steud. Nomencl. ed. sec. I. p. 847.)
Rchb. 1841. Nom. p. 99. n. 3903: g. Cirsiear.
Schultz Bip. 1843 in Walp. Rep. II. p. 953. 973: g. Euinulear. (Inulear. legitimar.)

Klippsteinia Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 234; 1846. Chlor. prot. p. LXXXIII: nov. g. Aurantiacear. foss.

Klödenia Göppert 1839 in Leonh. & Bronn Jahrb. p. 518: g. fossile ligni, Quercubus analogum.
= Quercinium Ung.?

*) κλείω, claudo.

Klopstockia Karsten 1856. Linnaea XXVIII. p. 251: nov. g. Palmar., Ceroxylo aff. (K. cerifera.) *Cf.* Bot. Zeit. 1847. p. 694 et Müll. Ann. bot. V. p. 840.

Klotschia Endl., Spach, Lindl. vid. *Klotzschia.*

Klotzschia*) Chamisso 1833. Linnaea VIII. p. 327: nov. g. Saniculear. (K. brasiliensis.) — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 141 (103). — Endl. (Atakt. bot. p. 21. t. 19) 1839. Gen. n. 4381. p. 767 (*Klotschia*); 1841. Ench. p. 377. — Rchb. 1841. Nom. p. 142. n. 5531.
Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 139 (*Klotschia*): g. Seselinear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778 (*Klotschia*): g. Saniculidar.

Klotzschiphytum Baillon 1858. Et. Euphorb. p. 382: nov. g. Crotonidear. (Croton mauritianum Lam.?)

Klugia**) Schlechtend. 1833. Linnaea VIII. p. 248: nov. g. Gesnerear. (K. azurea.) — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 672 (et denuo inter Didymocarpidas).
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 653: g. Besleriear. — Par. DC. 1839. Pr. VII. 2. p. 543.
Meisn. 1840. Gen. p. 302 (212): g. Ramondiear.
Endl. 1841. Ench. p. 349. n. 4144: g. Didymocarpear.
Rchb. 1841. Nom. p. 120. n. 4681: g. Episciear.
A. DC. 1845. Pr. IX. p. 275: g. Loxoniear.
Synon. Glossanthus Klein.

Klukia Andrz. Cruc. ined. teste DC. 1821. Syst. II. p. 459.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LVII: g. Sisymbrear.
Rchb. 1828. Consp. p. 185. n. 4808*a*: sect. Velari.
= Sisymbrii sect. Velarum DC.

Knappia***) Smith 1803. Engl. bot. t. 1127: nov. g. ex typo Agrostidis minimae L. *Cf.* Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 463. (*Knappia „Gmel.“*)
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 148: g. Agrostidear. — Par. Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 29.
Trin. 1820. Fund. p. 113: g. Triandr. Digyn.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 671): g. Vilfaceor.
Spreng. 1825. Syst. I. p. 264. n. 268; 1830. Gen. I. p. 55. n. 267: g. Graminear.
= Mibora Adans.

Knappia F. Bauer mss.
= Rhynchoglossum Blume.

*) Dicat. J. F. Klotzsch, Berolin.
**) Dicat. Fr. Klug, prof.
***) Dicat. J. L. Knapp, botanico anglico.

Knautia*) Linn. 1737. Gen. p. 23. n. 62; 1737. Cliff. p. 32; 1740. Syst. p. 18; 1748. Ups. p. 27; 1753. Sp. I. p. 101; 1759. Syst. ed. X. p. 890. n. 109; 1762. Sp. ed. II. p. 146; 1764. Gen. ed. VI. p. 49. n. 116; 1767. Syst. ed. XII. p. 114: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 123; 1784. Syst. p. 147. — Reich. 1778. Gen. p. 50. n. 122. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 65. n. 150. — Gmel. 1791. Syst. p. 231. — Pers. 1797. Syst. p. 151; 1805. Ench. I. p. 121. n. 227. — Willd. 1797. Sp. I. p. 561. n. 573; 1809. En. p. 148.

Gled. 1749. Berl. V. p. 130: g. Petalostemonum. — Simil. Mönch 1794. Meth. p. 487.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 29; 1764. Ord. nat.: g. Aggregatar. — Par. Hill 1769. Ht. kew. p. 76. — Gis. 1792. Prael. p. 528. — Batsch 1802. Tab. p. 228. — Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 587; 1825. Syst. I. p. 384. n. 379; 1830. Gen. I. p. 88. n. 436.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. Dipsacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 195; 1819. Dict. v. 13. p. 316. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 560. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 425. — Hedw. 1806. Gen. p. 54. 367. — Lagasc. 1816. Gen. et sp. p. 9. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 2. 87. n. 409. — Link 1821. En. I. p. 130; 1829. Hdb. I. p. 683. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 463. — Wallr. 1822. Sched. crit. I. p. 47. *Cf.* Schult. 1827. Mant. II. p. 2. Bartl. 1830. Ord. p. 130. — Koch 1836. Syn. p. 343. Ed. II. p. 376.

Adans. 1763. Fam. II. p. 151: g. Scabiosar.

Gled. 1764. Syst. p. 31. n. 122: g. Thalamostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 120: g. Compositar.

Neck. 1790. El. I. p. 110. n. 193: g. Psydomorphytor. Disjungitur Trichopteris.

Rchb. 1828. Consp. p. 92. n. 1931; 1841. Nom. p. 72. n. 2688: g. Scabiosear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 314.
= Knautiae sect. Lychnoides DC.

Knautia Coulter 1823. Dipsac. p. 28: g. Dipsacear. emend. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32. (genuinar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 47. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 176. Sect. ut DC. — Gren. (& Godr.) 1850. France II. p. 71.

DC. 1830. Pr. IV. p. 650: g. Scabiosear. Sect.: Lychnoides, Tricheroides, Trichera. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 686. Sect. eaed. — Endl. 1838. Gen. n. 2193. p. 354; 1841. Ench. p. 229. Sect. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 174 (121). — Ledeb. 1845. Ross. II. p. 449. Sect. ut DC. — Müll. 1858. Ann. bot. V. p. 141.

Dietr. 1839. Syn. I. p. 447: sect. Scabiosae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 700: g. Dipsacacear.
Synon. Scabiosae et Knautiae sp. Auct.

Knavel*) „Riv., Trag." Hall. 1745 in Rupp. Fl. jen. p. 3: g. pl. class. I. *Cf. seq.*
Adans. 1763. Fam. II. p. 506: g. Blitor.
Scop. 1772. Carn. I. p. 298: g. Decandr. Digyn.
= Scleranthus Linn.

Knawel Rupp. 1718. Fl. jen. p. 85: g. pl. class. V.
Dill. 1719. Nov. gen. p. 94: g. ab Alchimilla Tourn. sejunctum.
Hall. 1742. En. stirp. Helv. I. p. 186: g. Apetalar. Diplostemonum.
= Scleranthus Linn.

Kneiffia**) Spach 1835. Hist. vég. phan. IV. p. 373: nov. g. Oenotherear. (Oenothera glauca Michx., fruticosa L., etc.)
Spach 1835. Ann. sc. nat. 2e sér. IV. p. 167: g. Oenotherinear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 246: g. Onagrear.
Torr. & Gray 1840. North-Am. I. p. 496: subsect. Oenotherii.
Endl. 1840. Gen. n. 6115. s. p. 1191; 1841. Ench. p. 637: sect. Oenotherae. — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 84.
Synon. Oenothera Mönch; Neumannia Rchb.

Kneiffia Fries 1838. Epicr. p. 529: nov. g. Hydneor. (Thelephora setigera Fr.) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 12. n. 464. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 41. — Lév. 1849 in Orb. Dict. VIII. p. 487.
Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 336: g. Auricularinor.
= Leiostroma Fries?

Knema***) Lour. 1790. Fl. Cochinch. II. p. 604. Ed. Willd. p. 741: nov. g. Dioec. Monandr. (Kn. corticosa.)
Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 466: g. Laurinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 86. n. 1863; 1841. Nom. p. 69. n. 2586: g. Myristicear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16. — Bartl. 1830. Ord. p. 245. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 535. — Endl. 1839. Gen. n. 4707. p. 830; 1841. Ench. p. 419. — Meisn. 1841. Gen. p. 329 (241). — Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 209 (*Cnema*).

*) Dicat. in memoriam Knauti, qui semina nuda negabat absolute. (Linn. Hort. Cliff.)

*) Num a voce gallica *Gnavelle* derivatum?
**) Dicat. C. Kneiff, Argentorat.
***) κνήμη, radius rotae: ab antheris in formam radiorum stellatis.

Knema Lour. cont.
Jack 1835 in Hook. Bot. Mag. Comp. I. p. 148.
Blume 1835. Rumphia I. p. 187. t. 60. 61: sect. Myristicae. — Par. Hook. f. & Thoms. 1855. Fl. Ind. I. p. 155. — A. DC. 1856. Pr. XIV. 1. p. 204.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 302: g. Myristicaceae.

Knesebeckia*) Klotzsch 1855. Begon. p. 161: nov. g. Begoniacear. (Begonia incarnata Link & O.) — Par. Hassk. 1858. Ht. Bogor. I. p. 316.

Knifa Adans. 1763. Fam. II. p. 444: g. Cistor. (Hyperici spec. digynae L.: mutilum et setosum.)
Vent. 1799. Tabl. III. p. 144 *(Kniffa)*: g. Hypericoidear.
Juss. 1821. Dict. v. 22. p. 345: g. Hypericear.
= Hyperici et Ascyri spec. (Ait. ex Steud.)

Kniffa Vent. vid. *Knifa Adans.*

Knightia**) R. Brown 1809. Linn. Trans. X. p. 193 (Verm. bot. Schr. II. p. 300): nov. g. Proteacear., Rhopalae proximum. (K. excelsa.) — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 26. 431. n. 554. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 469. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 483. n. 526; 1830. Gen. I. p. 107. n. 536. (Tetrandr. Monogyn.) — Bartl. 1830. Ord. p. 117. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 536. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 219.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 337: g. Embothriear. — Par. Agdh. 1826. Aphor. p. 237.
Rchb. 1828. Consp. p. 82. n. 1762: g. Knightiear.
R. Brown 1830. Suppl. I. p. 32. (Verm. bot. Schr. V. p. 108.) Sect.: Eucarpha.
Endl. 1838. Gen. n. 2151. p. 342; 1841. Ench. p. 216; 1847. Spl. IV. p. 88: g. Hakeear. Sect. (1841): Caloknightia (1847 Euknightia), Eucarpha. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 63. n. 2401.
Meisn. 1841. Gen. p. 333 (245): g. Rhopalear.
Spach 1841. Vég. phan. X. p. 402: g. Grevillear. (restrict.) — Par. A. Juss. 1849 in Orb. Dict. X. p. 565. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 442. Sect. ut Endl. 1847.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 533: g. Grevillidar.

Knightieae Rchb. 1828. Consp. p. 82: div. Proteacear. Gen.: Knightia.

Kniphofia Scopoli 1777. Introd. p. 327. n. 1510: nov. g. Disciferar. *(Adamaram Rheede IV. t. 3. 4.)*
= Catappa Gärtn.

Kniphofia*) Mönch 1794. Meth. p. 631: nov. g. Petalostemonis. (Aletris Uvaria L.)
Endl. 1837. Gen. n. 1114. p. 143; 1841. Ench. p. 83: g. Aloinear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 49. n. 1841. — Meisn. 1842. Gen. p. 398 (301).
Kunth 1843. Enum. IV. p. 550: g. Anthericear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 364.
Synon. Tritoma Ker.; Tritomanthe et Tritomium Link; Rudolfo-Römeria Steud.

Knorrea Moç. & Sesse Fl. mexic. ined. = Hedwigia Swartz? (Endl. Gen. p. 1137.)

Knorria**) Sternb. 1825. Vers. I. 4. p. XXXVII: nov. g. Dicotyledonum foss. *Cf.* Flora 1827. I. p. 345.
Göpp. 1841. Gatt. foss. Pfl. p. 37.
Unger 1845. Syn. pl. foss. p. 136; 1846. Chlor. prot. p. LVIII: g. Lepidodendrear. — Par. Brongn. 1849 in Orb. Dict. XIII. p. 92.

Knowltonia***) Salisb. 1796. Prodr. p. 372.
DC. 1818. Syst. I. p. 218; 1824. Pr. I. p. 23: g. Anemonear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 50. — Bartl. 1830. Ord. p. 253. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 22. — Bernh. 1833. Linnaea VIII. p. 451. — Meisn. 1837. Gen. p. 1 (3). — Endl. 1839. Gen. n. 4775. p. 846; 1841. Ench. p. 434. — Brongn. 1843. En. genr. p. 97. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 428.
Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 472: g. Ranunculacear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 328.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 644. n. 2035; 1830. Gen. I. p. 459. n. 2265: g. Ranunculear. (Polyandr. Polygyn.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 191. n. 4937.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. LX: g. Calthear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 276; 1841. Nom. p. 190. n. 7234: g. Knowltoniear.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 231: g. Adoninear.
Synon. Anamenia Vent.; Thebesia Neck.?

Knowltonieae Rchb. 1837. Handb. p. 276; 1841. Nomencl. p. 190: subsect. Anemonear. genuinar. Gen.: Hamadryas, Knowltonia.

Knoxia†) Linn. 1747. Fl. zeyl. p. 189: g. Tetrandr. obscurum. *(Wissaduli Herm. zeyl. 11. 42.)*
Linn. 1751. Amoen. ac. III. Ed. 1787. p. 21; 1753. Sp. I. p. 104; 1759. Syst. ed. X. p. 891. n. 115; 1762. Sp. ed. II. p. 151; 1764. Gen. ed. VI. p. 51. n. 123;

---

*) Dicat. H. B. v. d. Knesebeck.
**) Dicat. Thom. Andrew Knight, botanico.

*) Dicat. Joh. Jerem. Kniphof, prof. Erford.
**) In honorem Georgii Wolfgangi Knorr.
***) Dicat. Th. Knowlton, directori hort. botan. Eltham.
†) Dicat. Rich. Knox, scriptori de insula Ceylon.

Knoxia Linn. cont.
1767. Syst. ed. XII. p. 117: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 126; 1784. Syst. p. 149. — Reich. 1778. Gen. p. 53. n. 130. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 68. n. 160. — Gmel. 1791. Syst. p. 236. — Pers. 1797. Syst. p. 154; 1805. Ench. I. p. 125. n. 238. — Willd. 1797. Sp. I. p. 582. n. 182. — Schult. 1827. Mant. III. p. 14.

Linn. 1751. Phil. bot. p. 32; 1764. Ord. nat.: g. Stellatar. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 520.

B. Juss. 1759 in Ht. Trian.: g. (Dipsacear. et tum) Rubiacear. — Par. Juss. 1789. Gen. p. 197; 1820. Mém. Mus. VI. p. 371. — Vent. 1799. Tabl. II. p. 569. — Batsch 1802. Tab. p. 232. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 432. — Hedw. 1806. Gen. p. 65. 373. — Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 14. 283. n. 486. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 474. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 406. n. 396; 1830. Gen. I. p. 94. n. 466. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 483.

Gled. 1764. Syst. p. 164. n. 669: g. Petalostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 139: g. Opulinar.

Gärtn. 1788. Fr. I. p. 121. t. 25. f. 8 (*stricta*).

Neck. 1790. El. I. p. 205. n. 344: g. Phyllastrophytor.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 599: g. Spermacocear. — Par. Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. XXXI; 1841. Nom. p. 75. n. 2783. — A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 152. — Bartl. 1830. Ord. p. 210. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 377. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 49. — Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 329.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 85: g. Astrophyllae.

Rchb. 1828. Consp. p. 94. n. 1993: g. Coffeacear.

Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: g. Spermacoccear.

DC. 1830. Pr. IV. p. 569: g. Euspermacocear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 628. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 439. — Endl. 1838. Gen. n. 3134. p. 529; 1841. Ench. p. 271. — Meisn. 1838. Gen. p. 171 (119).

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 764: g. Spermacocidar.
Synon. Vissadali Adans.; Spermacoces sp. Roxb., etc.

Knoxia P. Browne . . .
= Ernodea littoralis. (DC. Pr. IV. p. 569.)

Koanophyllum „Arrud." Kost. . . . . Voy. Brés. II. p. 496: g. Compositar. nondum descriptum. (DC. Pr. VII. 1. p. 262 et Endl. Gen. p. 1391. n. 4.)

Kobresia*) Willd. 1805. Spec. IV. p. 205. n. 1641: nov. g. Monoec. Triandr.
DC. 1815. Franç. V. p. 298: g. Cyperacear. — Par. Lois. 1817. Dict. v. 9. p. 486. — Gaud. 1828. Helv. I. p. 64. 137.
Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 19): g. Kobresiar.
Wahlenb. 1826. Suec. II. p. 583: g. Calamariar.
Link 1827. Hort. I. p. 333; 1829. Hdb. I. p. 111: g. Cyperoidear.
Rchb. 1828. Consp. p. 55. n. 1066; 1830. Fl. exc. p. 55: g. Elynacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: g. Elynear. — Par. Nees 1834. Linnaea IX. p. 304. — Endl. 1837. Gen. n. 962. p. 111; 1841. Ench. p. 63. — Rchb. 1841. Nom. p. 40. n. 1439. — Meisn. 1843. Gen. p. 413 (316). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 147. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119.
Koch 1837. Syn. p. 746. Ed. II. p. 861: g. Caricear.
Lang 1851. Linnaea XXIV. p. 493: g. Caricinear.
Synon. Cobresia Pers., etc.; Caricis sp. All.; Schoeni sp. Smith.

Kobresiae Lestib. 1819. Ess. Cypér. (Flora 1821. I. p. 19 et Schult. 1824. Mant. II. p. 3): div. Cyperacear. Gen.: Elyna, Kobresia, Catagyna, Opetiola, Diaphora.

Kobus Banks ic. ex DC. Prodr. I. p. 81.
= Magnoliae sect. Gwillimia.

Kochia**) Roth 1800 in Schrad. Journ. I. p. 303: nov. g. Pentandr. Monogyn. *Cf.* Pers. Ench. I. p. 297.
Hedw. 1806. Gen. p. 185. n. 764: g. Chenopodear. — Par. Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 309. — Agdh. 1825. Aphor. p. 216. — Mert. & Koch 1826. Deutschl. Fl. II. p. 15. 323. — Rchb. 1828. Consp. p. 164. n. 4338; 1832. Fl. exc. p. 581. — Link 1831. Hdb. II. p. 412. — Spach 1836. Vég. phan. V. p. 283. — Griseb. 1844. Rumel. II. p. 311.
Schrad. 1809. N. Journ. III. 3. p. 85 (1811. Comm. Gott. I. p. 12): g. Atriplicum.
Nutt. 1818. Gen. I. p. 200: g. Pentandr. Digyn.
Schult. 1820. Syst. VI. p. XXIII. 244: g. Atriplicear.
Link 1821. En. 1. p. 246: g. Atriplicinar.
Dumort. 1827. Belg. p. 22: g. Suaedear. Sect.: Wilmetia, Cornulaca.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: g. Salsolear.
C. A. Meyer 1829 in Ledeb. Alt. I. p. 411: g. Chenopodiear. Sect.: Kochia, Willemetia. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 297. — Koch 1837. Syn. p. 604. Ed. II. p. 695. Sect.: Willemetia, Suaeda.

---

*) Dicat. de Kobres Augsburg., botanophilo.
**) Dicat. W. D. J. Koch, tandem prof. Erlang.

Kochia Roth cont.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 228: sect. Salsolae.
Endl. 1837. Gen. n. 1928. p. 296; 1841. Ench. p. 181: g. Kochiear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 239. — Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233). — Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 130. — Fenzl 1851 in Ledeb. Ross. III. p. 745.
Moq.-Tand. 1840. Chenop. en. p. 91: g. Camphorosmear. — Par. Gren. (& Godr.) 1855. France III. p. 24. Subgen.: Eukochia, Echinopsilon. — Miq. 1857. Ind. bat. I. p. 1018.
Rchb. 1841. Nom. p. 164. n. 6382: g. Betear.
Brongn. 1843. Én. genr. p. 102: g. Cyclolobear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 513: g. Chenopodiacear.
Synon. Willemetia R. Brown.

Kochia R. Brown 1810. Prodr. I. p. 409. Ed. Nees p. 265: g. Chenopodear. (K. brevifolia et aphylla.)
= Echinopsilon Moq.

Kochieae Endl. 1837. Gen. p. 295; 1841. Ench. p. 181: subtrib. Chenopodiear. Gen.: Beta, Enchylaena, Londesia, Echinopsilon, Kochia, Cyclolepis, Chenopodium, Oligandra (1841 Oliganthera), Rhagodia, Teloxys, Lecanocarpus, Hablitzia, Cryptocarpus. Accedunt 1842 (Spl. II. p. 31) Chenolea, Maireana, Centropsis et 1847 (Spl. IV. p. 40) Oreobliton. — Par. Meisn. 1841. Gen. p. 320 (233). Gen. ut Endl. 1837 excluso Cryptocarpo.
Rchb. 1837. Hdb. p. 288: subsect. Chenopodear. genuinar. Gen.: Teloxis, Cyclolepis, Chenopodium, Blitanthus, Kochia, Suaeda.
Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 127: subtrib. restricta Camphorosmear. Gen.: Enchylaena, Londesia, Chenolea, Maireana, Kochia, Echinopsilon, Kentropsis.

Kodda-Pail*) Plumier 1703. Nov. gen. p. 30. t. 39.
Adans. 1763. Fam. II. p. 75: g. Aristolochiar.
= Pistia Linn.

Köberlinia**) Zuccar. 1832. Abh. math. phys. Cl. Ak. Münch. I. p. 358: nov. g. Pittosporear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 66 (47). — Rchb. 1841. Nom. p. 187. n. 7174. (genuinar.)
Endl. 1840. Gen. n. 5670. p. 1084; 1841. Ench. p. 572: g. Pittosporeis aff.
Benth. 1840. Pl. Hartweg. p. 35: g. Rutacear.? (Diosmear.?)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 441: g. Pittosporacear.?
A. Gray 1852. Pl. Wright. I. p. 30: g. Diosmear.

Köchlea Endl. 1842. Gen. Suppl. II. p. 48. n. 2858/1 (Catal. h. Vindob. I. p. 388): nov. g. Carlinear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 718.

*) Nomen Indicum.
**) Dicat. C. L. Köberlin, botanico.

Köhlreutera Roth vid. *Kölreutera Hedw.*

Kölera Willd. 1805. Spec. IV. p. 750. n. 1781: g. Dioec. Tetrandr.
= Roupea Poit.

Kölera Spreng. vid. *Köleria Pers.*

Köleria*) Pers. 1805. Ench. I. p. 97. n. 173: g. Triandr. Digyn. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 45. n. 213. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 74. — Mert. & Koch 1823. Deutschl. Fl. I. p. 579.
Palis. 1812. Agrost. p. 84: g. Graminear. — Par. DC. 1815. Franç. V. p. 268. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 37. 619. n. 320. — Lois. 1822. Dict. v. 24. p. 479. — Link 1829. Hdb. I. p. 65. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 332. n. 337 (*Kölera*); 1830. Gen. I. p. 72. n. 350. — Hook. f. 1853. N.-Zeal. I. p. 305. — Boiss. 1856. Diagn. pl. nov. III. Ser. 2. Nr. 4. p. 134. 135 (*Käleria*).
Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 73: g. Bromear. (verar.) — Par. Gray 1821. Brit. pl. II. p. 126. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63. — Bartl. 1830. Ord. p. 29. — Endl. 1837. Gen. n. 889. p. 100; 1841. Ench. p. 59. Sect. Airochloa, Köleria. — Meisn. 1843. Gen. p. 424 (324). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 164.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 164: g. Festucacear. — Par. Agdh. 1823. Aphor. p. 150. — Kunth 1830. Gram. p. 123; 1833. Agrost. p. 380; 1838. Berol. II. p. 393. — Schrad. 1838. Reliq. in Linnaea XII. p. 454. — Woods 1838. Linn. Trans. XVIII. 1. p. 40. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 138. 369. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 9. — Scheele 1844. Flora I. p. 60. — Parlat. 1845. Palerm. I. p. 131 (sph. *Köloeria*); 1850 in Webb Canar. III. p. 404. — Steud. 1854. Glum. I. p. 292.
Link 1821. En. I. p. 82: g. Graminum. — Par. Gaud. 1828. Helv. I. p. 69. 265. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 103.
Rchb. 1827 ap. Mössl. I. p. 115: sect. Airae.
Dumort. 1827. Belg. p. 156: g. Bromacear.
Rchb. 1828. Consp. p. 54. n. 1020; 1829 ap. Mössl. III. p. 1826: g. Poacear. Sect. (1829): Köleria, Airochloa.
Rchb. 1830. Fl. exc. p. 49: g. Avenacear. — Par. Koch 1837. Syn. p. 790. Ed. II. p. 912. Sect. ut Rchb. 1829. — C. Koch 1848. Linnaea XXI. p. 396. Sect.: Airochloa, Lophochloa.
Rchb. 1841. Nom. p. 39. n. 1398 (1844. Fl. sax. p. 34): g. Seslerear. Sect.: Lophochloa, Köleria.
Griseb. 1844. Rumel. II. p. 446: g. Festucear. Sect.: Acrochloa, Lophochloa.
Fries 1846. Summ. veg. Scand. I. p. 78: g. Avenear. — Par. Math. 1853. Belg. I. p. 604. (verar.)
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 116: g. Bromidar.
Griseb. 1853 in Ledeb. Ross. IV. p. 101: g. Poëar. Sect. ut C. Koch.
(Gren. &) Godr. 1856. France III. p. 525: g. Triseteur. Sect. eaed.

*) Dicat. G. Lud. Köler, prof. Mogunt.

Köleria Link 1827. Hort. Berol. I. p. 160: g. Glycerinar. restrict.
Rchb. 1829 ap. Mössl. III. p. 1826: sect. Köleriae. — Par. Endl. 1837. Gen. n. 889 *b.* p. 100; 1841. Ench. p. 59. — Koch 1837. Syn. p. 791. Ed. II. p. 913.
Synon. Collinaria Ehrh.; Aegialitis Trin.; Poarion Rchb.; Aegialina Schult.; Lophochloa Rchb.

Köllea*) Biria 1811. Hist. d. Rénonc. p. 21.
Lois. 1822. Dict. v. 24. p. 480: g. Ranunculacear.
= Eranthis Salisb.

Köllensteinia Rchb. f. 1854 in Seem. Bonplandia II. p. 17; 1858. Xen. Orchid. p. 64. t. 24: nov. g. Orchidear., ad Warreas accedens. *Cf.* Müll. Ann. bot. VI. p. 551.

Köllia Mönch 1794. Meth. p. 407: nov. g. Petalostemonis. (Thymus virginicus L.)
= Pycnanthemi Michx. pars.

Köllikeria**) Regel 1848. Flora I. p. 249: nov. g. Gesnerear. (Achimenes argyrostigma.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1069.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 201; 1856. ibid. XXVII. p. 698. 735: g. Achimenear.
Örsted 1858. Gesn. centroam. p. 9: g. Euachimenear.

Koeloeria Parlat. vid. *Köleria Pers.*

Kölpinia***) Pallas 1776. It. III. p. 755; 1778. Reis. russ. Reich. III. App. p. 74. t. L.: nov. g. Lapsanae et Rhagadiolo proximum. (*K. linearis.*)
Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 482: subg. Rhagadioli.
Link 1822. En. II. p. 295: g. Syngenes. Aequal.
Cass. 1825. Dict. v. 25. p. 61: g. Crepidear. — Par. Spach 1841. Vég. phan. X. p. 6.
Cass. 1827. Dict. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 568: g. Lampsanear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 127. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 78. — Endl. 1838 Gen. n. 2971. p. 494; 1841. Ench. p. 249. — Meisn. 1839. Gen. p. 234 (143). — Rchb. 1841. Nom. p. 94. n. 3671. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 34. — Ledeb. 1846. Ross. II. p. 772. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2123: g. Hyoseridear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: g. Lapsanear.
Bartl. 1830. Ord. p. 146: g. Lactucear.
Schultz Bip. . . . . in Webb Canar. II. p. 392: g. Rhagadiolear. legitimar.
Synon. Lapsanae sp. Linn.; Rhagadioli sp. Schreb.

*) Dicat. J. L. C. Kölle, scriptori de Aconito.
**) Dicat. Kölliker, Wirceburgensi.
***) Dicat. Alex. Bernh. Kölpin, medico Greifsw.

Kölpinia Scopoli 1777. Introd. n. 1047 (p. 231 err. *Rölpinia,* correct. in Ind.): nov. g. Nomadear. (*Perin-Panel* Hort. Malab. V. t. 15.)
Acronychia Forst.

Kölreutera*) Hedwig 1782. Fund. II. p. 95: nov. g. Muscor. frondosor. (Mnium hygrometricum L.) — Par. Roth 1788. Fl. germ. I. p. 477 (*Köhlreutera*).
Brid. 1797. Muscol. rec. I. p. 172: g. Diploperistomator.
Funaria Schreb.

Kölreutera Murray Nov. Comm. Gott. III. t. 2. f. 1.
= Gisekia Linn.

Kölreutera Schreb., Spreng., Link, Dietr. vid. *seq.*

Kölreuteria Laxmann 1772. Nov. Comm. Petrop. XVI. p. 561. t. 18: nov. g. plant. (Sapindus chinensis L.)
Schreb. 1791. Gen. II. p. 731. n. 1589 (*Kölreutera*): g. Polygam. Monoec.
Willd. 1799. Sp. II. p. 330. n. 750; 1809. En. p. 411: g. Octandr. Monogyn. — Par. Pers. 1805. Ench. I. p. 413. n. 934.
Vent. 1799. Tabl. III. p. 128: g. Saponacear. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 9. — Hedw. 1806. Gen. p. 267. n. 1077.
Juss. 1811. Ann. Mus. XVIII. p. 477: g. Sapindacear. — Par. Link 1821. En. I. p. 382. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 87.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 684 (*Kölreutera*); 1825. Syst. II. p. 213. n. 1428: g. Meliear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1270.
Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 483: g. Sapindear. — Par. Spreng. 1830. Gen. I. p. 305. n. 1561 (*Kölreutera*).
DC. 1824. Pr. I. p. 616: g. Dodonaeacear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 201. n. 5223. — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48. — Cambess. 1829. Mém. Mus. XVIII. p. 33. — Bartl. 1830. Ord. p. 364. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 672. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 66. — Meisn. 1837. Gen. p. 53 (38). — Endl. 1840. Gen. n. 5622. p. 1072; 1841. Ench. p. 561.
Link 1831. Hdb. II. p. 442 (*Kölreutera*): g. Spirolobar.
Rchb. 1841. Nom. p. 198. n. 7578: g. Dodonaeear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 385: g. Dodonear.
Blume 1850. Rumphia III. p. . . . : g. Cossigniear.

Kölreuteria Medic. 1782. Bot. Beob. p. 22; 1789. Vorles. IV. 1. p. 259; 1789. Phil. Bot. I. p. 104: nov. g. plant., Asclepiadi et Cynancho aff.
Medic. 1790. Act. Theod. Palat. IV. p. 406: g. Gynandriae monadelpho-icosandro-digynae. (Cynanchum erectum L.)
= Marsdenia R. Brown.

*) Dicat. Joh. Gottl. Kölreuter, prof. Carlsruh.

Königia*) Linn. 1767. Mant. p. 3. n. 1241; 1767. Syst. ed. XII. p. 104: g. Triandr. Trigyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 110; 1784. Syst. p. 129. — Reich. 1778. Gen. p. 44. n. 111. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 57. n. 137. — Gmel. 1791. Syst. p. 207. — Pers. 1797. Syst. p. 133; 1805. Ench. I. p. 111. n. 206. — Willd. 1797. Sp. I. p. 490. n. 158. — Spreng. 1830. Gen. I. p. 78. n. 384. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 142. 416.
Scop. 1777. Intr. p. 345: g. Seminudar.
Juss. 1789. Gen. p. 83; 1826. Dict. v. 42. p. 346: g. Polygonear. — Par. Vent. 1799. Tabl. II. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 195. — Hedw. 1806. Gen. p. 52. 365. — Röm. & Schult. 1817. Syst. II. p. 57. 873. n. 399. — Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 307; 1825. Syst. I. p. 364. n. 368. — Campd. 1819. Mon. Rum. p. 18. — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 378. — D. Don. 1825. Nepal. p. 74. — Rchb. 1828. Consp. p. 162. n. 4281. (genuinar.) — Link 1829. Hdb. I. p. 308. — Ledeb. 1829. Alt. I. p. 124. — Bartl. 1830. Ord. p. 109. — Endl. 1837. Gen. n. 1985. p. 306; 1841. Ench. p. 188; 1847. Spl. IV. p. 45. (verar.) — Meisn. 1841. Gen. p. 317 (228). — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 521. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 100. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 504.
Neck. 1790. El. II. p. 193. n. 916: g. Aclithrophytor.
Gärtn. 1791. Fr. II. p. 212. t. 128.
Batsch 1802. Tab. p. 176: g. Vaginalium.
Cram. 1803. Disp. p. 25 in Triandr. Digyn.
Wahlenb. 1812. Fl. lappon. p. 45; 1824. Suec. I. p. 82: g. Holoracear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: g. Persicariear. — Par. Rchb. 1837. Hdb. p. 236; 1841. Nom. p. 163. n. 6316.
E. Meyer 1840. Mém. Ac. Pet. 6e sér. IV. (1845.) Bot. p. 145: g. Eupolygonear. — Par. Ledeb. 1851. Ross. III. p. 534. — Meisn. 1856 in DC. Pr. XIV. 1. p. 82.

Königia Commers. mss.
= Assonia Cavan.

Körberia Massalongo 1854. Geneacaena lich. p. . . . : nov. g. Lichenum, a Körb. (1855. Syst. Lich. Germ. p. 395) Collemaceis adscriptum.

Kohautia**) Chamisso & Schltd. 1829. Linnaea IV. p. 156: nov. g. Hedyotidear. (Knoxia senegalensis Rchb.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 210. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 360. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 474.
A. Rich. 1830. Mém. soc. h. n. Par. V. p. 268: sect. Hedyotidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 3240 *h.* p. 550; 1841. Ench. p. 273 (*Cohautia*). — Meisn. 1838. Comm. p. 115. — Rchb. 1841. Nom. p. 76. n. 2874. 3.

Kohautia Chamisso cont.
DC. 1830. Pr. IV. p. 429: g. Hedyotear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 532. — Meisn. 1838. Gen. p. 160.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 788. n. 4087: g. Rubiacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 495.
Endl. 1834. Atakt. bot. p. 24. t. 23.
Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 417: subsect. Oldenlandiae.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Hedyotidar.
Synon. Knoxiae et Hedyotidis sp. Auct.

Kohleria Regel 1848. Flora I. p. 250: nov. g. Gesnerear. (Gesnera hirsuta HB.) — Par. Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1070.
= Isoloma Benth.

Kohleria Regel 1851. Bot. Zeit. p. 893: nov. g. Gesneriacear.
Hanst. 1853. Linnaea XXVI. p. 203; 1858. ibid. XXIX. p. 506. 558: g. Brachylomatear.

Kohlrauschia*) Kunth 1838. Fl. Berol. I. p. 108: nov. g. Dianthear. (Dianthus prolifer L.)
Endl. 1840. Gen. n. 5244 *b.* 971; 1841. Ench. p. 506: sect. Dianthi. — Par. Ledeb. 1842. Ross. I. p. 286. — (Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 229.
Rchb. 1841. Nom. p. 206. n. 7823: g. Tunicear.
A. Braun 1843. Flora p. 385: sect. Tunicae. — Par. Griseb. 1843. Rumel. I. p. 185.
Willk. . . . . Ic. pl. Hisp. p. 25: sect. Pseudodianthi. — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 265.
Synon. Tunicae sp. Scop.; Caryophylli sp. Mönch.

Kokera Adans. 1763. Fam. II. p. 269: g. Amaranthor. (*Amaranthus Sloane.*)
= Chamissoa HBK.

Kokoona**) Thwaites 1853 in Hook. Kew gard. misc. V. p. 379. t. 6: nov. g. Hippocrateacear. anomalum. (K. zeylanica.) — Par. Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 368.

Kokoschkinia Turczan. 1849. Bull. Mosc. XXII. 2. p. 33. t. 2: nov. g. Besleriacear. (K. paniculata.) *Cf.* Flora 1850. p. 478.
Walp. 1852. Ann. bot. II. p. 1073: g. Besleriear.

Kolbea***) Schlechtend. 1826. Linnaea I. p. 80: nov. g. Melianthacear. (Tulipa Breyniana L.)
Spreng. 1827. Cur. post. p. 130: g. Juncear.
Rchb. 1828. Consp. p. 63. n. 1304: g. Helonicar.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 286. n. 1484: g. Melanthacear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1206.
Bartl. 1830. Ord. p. 52: g. Colchicacear.
= Bacometra Salisb.

---

*) Dicat. Joh. Gerh. König, peregrinatori.
**) Dicat. inventori Fr. Kohaut.

*) Dicat. studiosissimae matronae H. Kohlrausch, e gente Eichmanniana.
**) *Kokoon* nomen vernaculum.
***) Dicat. peregrinatori J. P. Kolbe.

Kolbea Rchb. vid. *Kolbia Palis.*
Kolbia Adans. 1763. Fam. II. p. 164: g. Vaccinior.
= Blaeria Linn.
Kolbia Palis.-Beauv. 1807. Fl. Owar. II. p. 91.
Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 488: g. Cucurbitacear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 275.
DC. 1828. Pr. III. p. 320: g. Cucurbitaceis aff. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 43.
Rchb. 1828. Consp. p. 113. n. 2769 (*Kolbea*): g. Nhandirobear. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 190.
Rchb. 1837. Hdb. p. 184 (*Kolbea*): g. Passiflorear.
Meisn. 1838. Gen. p. 127 (92): g. Cucurbitear.
Endl. 1839. Gen. n. 5105. p. 928; 1841. Ench. p. 483: g. Modeccear. (An Modeccae sp.?) *Cf.* Planch. 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. III. p. 292. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 131. n. 5073.
Römer 1846. Fam. nat. II. p. 134. 205: g. Paschanthear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 322: g. Papayacear.
Kolgyda Dumort. 1827. Fl. belg. p. 55: sect. Galii. (G. tricorne et saccharatum.)
Kolleria*) Presl 1830. Symb. I. p. 23. t. 14: nov. p. Ficoidear. (Aizoon Herniaria Rchb.) *Cf.* Linnaea VIII. Litt. p. 6 et Ann. sc. nat. 2e sér. I. p. 361. — Par. Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 327. — Meisn. 1838. Gen. p. 123 (93).
Fenzl 1838. Ann. Wien. Mus. II. p. 288: subg. Galeniae.
Endl. 1839. Gen. p. 948. n. 5166 *a:* sect. Galeniae. (in Ench. p. 500 Galenia L.)
Rchb. 1841. Nom. p. 166. n. 6459: g. Galeniear.
Kolman Adans. 1763. Fam. II. p. 7: g. Fungor. (*Lichenoides Dill.* musc. t. 18. 19.)
= . . .?
Kolovratia Lestib. vid. *seq.*
Kolowratia**) Presl 1827. Reliq. Hänk. I. 2. p. 113. t. 20: nov. g. Scitaminear. *Cf.* Flora 1828. I. p. 351. — Par. Lestib. 1841. Ann. sc. nat. 2e sér. XI. p. 341 (*Kolovratia*).
Rchb. 1828. Consp. p. 70. n. 1598; 1841. Nom. p. 57. n. 2229: g. Amomear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 61. — Meisn. 1842. Gen. p. 389 (291). — Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 154.
Endl. 1837. Gen. n. 1640. p. 225; 1841. Ench. p. 119: g. Zingiberacear. (desciscens). — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 167. — Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 610.

*) Dicat. baroni Franc. de Koller, scientiarum fautori.
**) Dicat. comiti Kolowrat-Liebsteinsky.

Komana Adans. 1763. Fam. II. p. 444: g. Cistor. (*Hypericum Mill.* Dict. t. 151. f. 2.)
= Hyperici Linn. sp.?
Konig Adans. 1763. Fam. II. p. 420: g. Lunariar., serius p. [23] *Aduseton* dictum. (Clypeola maritima L.)
= Koniga R. Brown.
Konig Adans. Fam. II. p. [23]: g. Lunariar.: vid. *Adyseton Adans.*
Koniga*) R. Brown 1826. Narr. trav. Afr. I. p. 214 (Verm. bot. Schr. IV. p. 14): g. Alyssinear. (Lunaria libyca Viv. et Alyssum maritimum L.) — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 184. n. 4773; 1832. Fl. exc. p. 669. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 175. — Endl. 1839. Gen. n. 4870. p. 867; 1841. Ench. p. 449.
Bartl. 1830. Ord. p. 264: g. Siliculosar. — Par. Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 489. Sect.: Octadenia, Tetradenia. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 629. 637.
Rchb. 1837. Hdb. p. 259; 1841. Nom. p. 180. n. 6957: g. Alyssear. genuinar.
Griseb. 1843. Rumel. I. p. 277: g. Latiseptar. (emend.) Sect.: Lobularia, Ptilotrichum.
(Gren. &) Godr. 1848. France I. p. 118: sect. Alyssi.
Synon. Konig, serius Aduseton Adans.; Clypeola Neck.; Lobularia Desv.; Octadenia R. Brown; Alyssum Gray; Glyce Lindl.
Konigia Commers. mss. teste Cavan.
= Ruizia Cavan.
Koniopagae (*Koniopagen*) Spreng. Anleit. II. 1. p. 292: vid. *Coniopagae.*
Kookia Pers., Rchb. vid. *Cookia Sonn.*
Koon Gärtn. 1791. Fruct. II. p. 486. t. 180. *Cf.* Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 494.
= Schleichera Willd.
Kopsia**) Dumort. 1822. Comm. bot. p. 16: nov. g. ab Orobanche distinctum. (O. ramosa, caerulea, etc.)
Rchb. 1831. Fl. exc. p. 356; 1844. Fl. sax. p. 236: sect. Orobanches.
Kopsia Blume 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 110; 1826. Bijdr. Nr. 16. p. 1030; 1848. Rumphia IV. p. 27: nov. g. Apocynear.
G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 100: g. Kopsiear.
Endl. 1838. Gen. n. 3390. p. 580; 1841. Ench. p. 294: g. Ophioxylear. — Par. Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 502. — Meisn. 1840. Gen. p. 262 (171).
Rchb. 1841. Nom. p. 134. n. 5208: g. Rauwolfiear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 351: g. Tabernaemontanear. — Par. Miq. 1856. Ind. bat. II. p. 400.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 601: g. Plumierear.
Synon. Calpicarpum Don?; Cerberae sp. Auct.

*) Dicat. Charles Konig, Londin.
**) Dicat. dom. Kops, florae batavae auctori.

Kopsieae G. Don 1837. Gen. syst. IV. p. 100: trib. Apocynear. Gen.: Kopsia, Calpicarpum.

Kordelestris „Arruda" Koster . . . . Voy. Brés. I. p. 508. (*Kordellestris* in Wittstein.)
 = Jacaranda Juss.? (DC. Pr. IX. p. 228.)

Kordera Adans. 1763. Fam. II. p. 10: g. Fungor. (*Corallofungus Vaill.* Bot. t. 8. f. 1.) *Cf.* Leman 1822. Dict. v. 24. p. 496.
 . . .?

Korelinia Rchb. vid. *Karelinia Less.*

Korkir Adans. 1763. Fam. II. p. 7: g. Fungor. (*Lichenoides Dill.* musc. t. 18.) *Cf.* Leman 1822. Dict. v. 24. p. 497.
 — . . . .?

Korosvel Adans. 1763. Fam. II. p. 442: g. Cistor.
 = Delima Linn.

Korsaria Steud. Nomencl. I. p. 850: lege *Kosaria Forsk.*

Korthalsia*) Blume 1843. Rumphia II. p. 167: nov. g. Palmar. — Par. Miq. 1852. Pl. Jungh. II. p. 164.
 Mart. . . . . Gen. Palm. p. . . .: g. Lepidocaryinar. — Par. Walp. 1853. Ann. bot. III. p. 492.
 Miq. 1858. Ind. bat. III. p. 74: g. Lepidocaryinear.

Korycarpus Lagasc. Gen. et spec. p. 1: vid. *Corycarpus.*

Kosaria**) Forsk. 1775. Fl. Aeg. Arab. p. 164: nov. g. Monoec.
 Scop. 1777. Intr. p. 125: g. Flosculosar.
 Gmel. 1791. Syst. p. 71 (*Cosaria*): g. Diandr. Monogyn.
 Pers. 1807. Ench. II. p. 557: sect. Dorsteniae. — Par. Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 474. — Endl. 1847. Spl. IV. p. 36. n. 1806 c. — Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 706.
 Endl. 1837. Gen. p. 279; 1841. Ench. p. 165: g. Morear.?
 Rchb. 1841. Nom. p. 67. n. 2522: g. Dorstenicar.?
 Lindl. 1847. Veg. kd. p. 268: g. Moraceae.?

Kosteletskya Brongn. vid. *seq.*

Kosteletzkya***) Presl 1831. Reliq. Hänk. II. 1. p. 130. t. 70: nov. g. Hibiscacear. (K. hastata.)
 Meisn. 1837. Gen. p. 27 (23): g. Hibiscear. — Par. Endl. 1840. Gen. n. 5276. p. 982; 1841. Ench. p. 511. — Ledeb. 1842. Ross. I. p. 437. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 77 (*Kosteletskya*). — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 370. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 304.

Kosteletzkya Presl cont.
 Rchb. 1837. Hdb. p. 287; 1841. Nom. p. 200. n. 7645: g. Ketmiear. genuinar.
 Benth. 1843. Pl. Hartweg. II. p. 114: g. Malvacear.
 Garcke 1849. Bot. Zeit. p. 820 ad Hibiscum reducit.
 = Polychlaena Don.

Kotschya*) Endl. 1839. Nov. stirp. Mus. Vindob. dec. p. 4: nov. g. Papilionacear.
 Endl. 1841. Gen. n. 6607. p. 1284; 1841. Ench. p. 670: g. Euhedysarear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 351.
 Rchb. 1841. Nom. p. 153. n. 5969: g. Onobrychear.
 Benth. 1852. Pl. Jungh. II. p. 211 adnot.: sect. Smithiae.

Kotsjiletti Adans. 1763. Fam. II. p. 60: g. Iridum.
 = Xyris Linn.

Krameria*) Löfl. 1758. It. hispan. p. 195.
 Linn. 1759. Syst. ed. X. p. 899. 1362. n. 1116; 1762. Sp. ed. II. p. 177; 1764. Gen. ed. VI. p. 63. n. 161; 1767. Syst. ed. XII. p. 128: g. Tetrandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 138 (*Crumeria*); 1784. Syst. p. 165. — Reich. 1778. Gen. p. 65. n. 172. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 86. n. 217. — Gmel. 1791. Syst. p. 278. — Ruiz & Pav. 1794. Prodr. p. 14. t. 3; 1798. Fl. peruv. I. p. 61. t. 93. — — Pers. 1797. Syst. p. 171; 1805. Ench. I. p. 141. n. 292. — Willd. 1797. Sp. I. p. 693. n. 253. — St. Hil. 1805. Expos. II. p. 346.
 Adans. 1763. Fam. II. p. 268: g. Amaranthor.
 Gled. 1764. Syst. p. 168. n. 684: g. Petalostemonum.
 Scop. 1777. Intr. p. 346: g. Seminudar.
 Juss. 1789. Gen. p. 425: g. pl. incertae sedis. — Par. Hedw. 1806. Gen. p. 76. n. 355.
 Neck. 1790. El. II. p. 175. n. 881: g. Aclithrophytor.
 Cram. 1803. Disp. p. 22 in Triandr. Monogyn.
 Juss. 1815. Mém. Mus. I. p. 390: g. Polygaleis aff. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 504.
 Röm. & Schult. 1818. Syst. III. p. 28. 458. n. 565: g. Polygalear. — Par. Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 739. — DC. 1824. Pr. I. p. 341. (?) — HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 243. — Kunth 1825. Syn. IV. p. 248. — A. St. Hil. & Moq. 1828. Mém. Mus. XVII. p. 354; 1829. Fl. Bras. II. p. 72; 1830. Mém. Mus. XIX. p. 336. — Bartl. 1830. Ord. p. 257. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 370. — Hook. &

*) Dicat. Korthals, Batavo.
**) Arabice *Kosar.*
***) Dicat. Dr. Vincentio Kosteletzky.

*) Dicat. Theod. Kotschy, peregrinatori.
**) Dicat. Joh. G. Henr. Kramer, medico hungarico.

Krameria Löfl. cont.
Arn. 1831. Bot. Beech. voy. Pt. 1. p. 8. t. 5. — Meisn. 1837. Gen. p. 23 (20). — Endl. 1840. Gen. n. 5656. p. 1080; 1841. Ench. p. 568. (anomalar.) — Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 626. — Müll. 1857. Ann. bot. IV. p. 240.
Spreng. 1825. Syst. II. p. 844. n. 2255; 1831. Gen. II. p. 509. n. 2498: g. Personatar.
Rchb. 1828. Consp. p. 120. n. 3042: g. Myoporinar.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: g. Krameriacear. — Par. A. Gray 1848. Gen. bor. am. II. p. 227.
Link 1831. Hdb. II. p. 274: g. Polygalinar.
Rchb. 1837. Hdb. p. 250; 1841. Nom. p. 175. n. 6789: g. Kramerieur. — Par. Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 134. — Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 150.
Benth. 1839. Pl. Hartweg. p. 13: g. Polygalacear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 378.

Krameriaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 23: fam. Polygalariear. Gen.: Krameria.
Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 37.
A. Gray 1848. Gen. bor. am. II. p. 227: fam. Leguminosar. Gen. id. *Cf.* Griseb. 1850 in Arch. f. Naturg. II. p. 312.

Kramerieae Rchb. 1837. Handb. p. 250: subdiv. Polygalear. Gen.: Krameria. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 175. Gen. id. et Xanthophyllum; Soulamea.
Torr. & Gray 1838. North-Am. I. p. 133: subordo Polygalacear. Gen. id.
Spach 1839. Vég. phan. VII. p. 111. 150: trib. Polygalear. Gen.: Krameria, Soulamea, Cardiocarpus?

Krapfia*) DC. 1818. Syst. I. p. 228: nov. g. Anemonear.
Meisn. 1837. Gen. p. 1 (3): g. Ranunculear.
Rchb. 1837. Hdb. p. 276: g. Ranunculariar.
Rchb. 1841. Nom. p. 190. n. 7221. 5: sect. Ranunculi.
= Ranunculastri sp. (DC. Pr. I. p. 29. n. 24.)

Krascheninikovia Turczan. 1834. Flora I. Beibl. p. 9; 1838. Bull. soc. Mosc. I. nr. 271.
Endl. 1840. Gen. n. 5236. p. 968; 1841. Ench. p. 505: g. Arenariear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 205. n. 7792. — Fenzl 1842 in Ledeb. Ross. I. p. 373 (*Krascheninnikowia*).
Meisn. 1843. Comm. p. 343: g. Alsinear. — Par. Lindl. 1847. Veg. kd. p. 498. — Maxim. 1858. Mém. sav. étr. Ac. Pet. IX. p. 57 (*Krascheninikowia*).

Krascheninikowia Maxim. vid. *praeced.*

*) Dicat. Car. Krapf.

Krascheninnikovia*) Güldenst. 1772. Nov. Comm. Petrop. XVI. p. 548: nov. g. Monoec. Tetrandr., Ceratocarpo aff. (Ceratoidis sp. Tourn.)
Gmel. 1791. Syst. p. 274: g. Tetrandr. Monogyn.
= Eurotia Adans.

Krascheninnikowia Fenzl vid. *Krascheninikovia Turcz.*

Kraunhia Rafin. 1809 in Desv. Journ. bot. II. p. 71 (New-York med. repos. II. 5. p. 350): nov. g. pro Glycine frutescente L. indicatum.
= Wisteria Nutt.

Kraussia**) Harvey 1842. Lond. journ. bot. I. p. 21: nov. g. Rubiacear. (Krauss Pl. natal. nr. 121.) — Par. Walp. 1843. Rep. II. p. 525 (vix notum). — Sond. 1850. Linnaea XXIII. p. 52. (*Synon. Carpothalis Meyer.*)
Meisn. 1843. Comm. p. 360: g. Psychotriacear.
Walp. 1847. Rep. VI. p. 47: g. Coffeear.?
= Eucanthium DC.? (Endl. Spl. III. p. 72.)

Kraussia Schultz Bip. (mss. in Kraussii It. cap. nr. 575) 1843 in Walp. Rep. II. p. 955: nov. g. Cervanear.
= Hänelia Walp.

Krebsia***) Ecklon & Zeyh. 1836. En. pl. Afr. austr. II. p. 179: nov. g. Genistear. — Par. Meisn. 1837. Gen. p. 84 (60). — Endl. 1840. Gen. n. 6490. p. 1264; 1841. Ench. p. 668. — Rchb. 1841. Nom. p. 150. n. 5867. (genuinar.) — Brongn. 1843. En. genr. p. 127.
Benth. 1843. Lond. journ. bot. II. p. 598: sect. Lotononidis. *Cf.* Bot. Zeit. 1844. p. 408.
Synon. Telinae E. Meyer pars.

Kreidek Adans. 1763. Fam. II. p. 225: g. Jasminor.
= Scoparia Linn.

Kremeria Durieu 1846 in Duchartre Rev. bot. I. p. 364 (Bot. Zeit. 1846. p. 503): nov. g. Compositar., Prolongoae et Leucanthemo aff. (Kr. paludosa.)
Walp. 1849. Ann. bot. I. p. 419: g. Chrysanthemear.

Krempelhuberia Massalongo 1854. Geneacaena Lich. p. 14: nov. g. Lichenum, a Körb. (1855. Syst. Lich. Germ. p. 289) Fungis Opegrapheis similibus (una cum Hysterio et Stictide) adscriptum.

Kretschmaria Fries 1849. Summ. veg. Scand. II. p. 409: nov. g. Leveillineor. (Sphaeria clavus.)

Kreysigia†) Rchb. . . . . Ic. exot. t. 229. *Cf.* Wittst. Etym. Handw. p. 490 (*Kreysigia*).
Endl. 1837. Gen. n. 1079. p. 136; 1841. Ench. p. 79: g. Veratrear. *Cf.* Endl. Spl. I. p. 1357 et Suppl. II. p. 104. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 250.

*) Dicat. Steph. Krascheninnikow, prof. Petropol.
**) Dicat. Dr. Chr. Ferd. Fr. Krauss, peregrinatori.
***) Dicat. L. Krebs.
†) Dicat. F. L. Kreysig, medico Dresd.

Kreysigia Rchb. cont.
D. Don 1841. Linn. Trans. XVIII. 4. p. 522: g. Melanthacear.
Rchb. 1841. Nom. p. 47. n. 1711: g. Uvulariear. — Par. Meisn. 1842. Gen. p. 402 (306). — Kunth 1843. Enum. IV. p. 209.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 199: g. Uvularear.
Synon. Tripladenia Don.

Kreyssigia Wittst. vid. *praeced.*

Krigia Schreb. 1791. Gen. II. p. 532. n. 1244: g. Syngenes. Polygam. Aequal. — Par. Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1618. n. 1409; 1809. En. p. 831. — Nutt. 1818. Gen. II. p. 126. — Link 1822. En. II. p. 293.
Gis. 1792. Prael. p. 538: g. Semiflosculosar.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 577; 1826. Syst. III. p. 699. n. 2899; 1831. Gen. II. p. 647. n. 3257: g. Cichorear.
Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 508: g. Lactucear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 146.
Cass. 1822. Dict. v. 25. p. 63; 1827. v. 48. p. 422; 1830. v. 60. p. 569: g. Hieraciear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 7.
Rchb. 1828. Consp. p. 97. n. 2127; 1841. Nom. p. 94. n. 3683: g. Hyoseridear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 129. — DC. 1838. Pr. VII. 1. p. 88. — Endl. 1838. Gen. n. 2981. p. 495; 1841. Ench. p. 249. — Meisn. 1839. Gen. p. 234 (144). — Nutt. 1841. Amer. phil. trans. VII. p. 427. — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 467. Sect.: Cymbia, Eukrigia. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 34. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715. — Scheele 1852. Linnaea XXV. p. 257. Sect. ut Torr. & Gray et Bellidion.
Hook. 1833. Fl. bor. am. I. p. 301: g. Cichoracear.
Schultz Bip. 1835. Linnaea X. p. 256: g. Krigiear.
Synon. Hyoseridis sp. Linn., Lam.

Krigieae Schultz Bip. 1835. Linnaea X. p. 256: trib. Cichoracear. Divis.: Krigieae (gen.: Krigia, Luthera), Fichtieae.

Krockeria Necker 1790. Elem. bot. II. p. 317. n. 1097: g. Acascophytor. (*Waria Aubl.*) *Cf.* Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 510.
= Habzelia A. DC.

Krockeria Rchb. vid. *Krokeria Mönch.*

Krokeria Mönch 1794. Meth. p. 143: nov. g. Thalamostemonis. (Lotus edulis L.)
Seringe 1825 in DC. Pr. II. p. 209: sect. Loti. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 148. n. 3874 *a*; 1832. Fl. exc. p. 506; 1841. Nom. p. 147. n. 5702. 1 (*Krockeria*). — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 195. — Endl. 1840. Gen. n. 6514 *a*. p. 1269; 1841. Ench. p. 668.

Krokeria „Neck." Endl. Gen. p. 832 in synon. Uvariae: vid. *Krockeria Neck.*

Krombholzia*) Rupr. 1842. Bull. Ac. Brux. IX. 2. p. 247: g. Graminear. sedis dubiae, indescriptum. (K. mexicana.)

*) Dicat. Dr. Krombholz, Pragensi, mycologo

Krubera*) Hoffm. 1814. Umbell. I. p. 103: nov. g. Umbelliferar. (Conium dichotomum Desf.) — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 235.
Koch 1824. Nov. Act. Leop. XII. 1. p. 86: g. Tordylinear.
Rchb. 1828. Consp. p. 142. n. 3684: g. Peucedanear. — Par. Tausch 1834. Flora I. p. 347. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 135.
Ledeb. 1829. Alt. I. p. 296: g. Pachypleurear. — Par. Meisn. 1838. Gen. p. 145 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4450. p. 777; 1841. Ench. p. 379. — Rchb. 1841. Nom. p. 141. n. 5445.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: g. Silerinear. — Par. DC. 1830. Pr. IV. p. 199. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 347. — Eckl. & Zeyh. 1837. En. pl. Afr. III. p. 353. — Rchb. 1837. Hdb. p. 220. — Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 973. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 112. — Parlat. . . . . in Webb Canar. II. p. 163.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Pachypleuridar.
Synon. Ulospermum Link; Capnophyllum Lag; Tordylii sp. Linn.; Cachrydis sp. Spreng.

Krügeria Scopoli 1777. Introd. p. 314. n. 1438: g. Anomalar.
Neck. 1790. El. III. p. 65. n. 1389: g. Amorphophytor.
= Vouapa Aubl.

Krynitzia Rchb. vid. *seq.*

Krynitzkia**) Fisch. & Meyer 1841. Ind. sem. h. Petr. VII. p. 52: nov. g. ex typo Echinospermi leiocarpi F. & M. 1835. *Cf.* Ann. sc. nat. 2e sér. XVI. p. 55 et Linnaea XV. Litt. p. 116.
Rchb. 1841. Nom. p. 112. n. 4351 (*Krynitzia*): g. Cynoglossear. — Par. Endl. 1842. Spl. II. p. 59. n. 3786/1. — Meisn. 1843. Comm. p. 366. — A. DC. 1846. Pr. X. p. 134.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 656: g. Cynoglossidar.

Kryoblasti Körber 1855. Syst. Lich. Germ. p. XXII. 102: ordo Lichenum heteromericor. Fam.: Lecanoreae, Lecideae, Baeomyceae, Graphideae, Calycieae, Dacampieae, Hymenelieae, Verrucarieae, Pertusarieae.

Ktenosachne***) Steud. 1854. Syn. pl. glum. I. p. 150: nov. g. Vilfear. (K. tenerrima.)

Ktenospermum Lehm. 1837. Del. sem. h. Hamb. p. 7: nov. g. Borraginear. *Cf.* Linnaea 1838. Litt. p. 84 et Meisn. Comm. p. 187.
= Pectocarya DC.

Kua „Rheede Ht. Malab. IX. t. 7" Medic. 1790. Act. Theod. Palat. Phys. VI. p. 394: g. Gynandriae Monadelpho-Monogynae.
Curcuma Linn.

*) Dicat. J. J. Kruber.
**) Dicat. J. Krynitzki, prof. olim Charcov.
***) κτείς, κτενός, pecten.

Kuala*) Karsten & Triana 1856. Linnaea XXVIII. p. 428: nov. g. Pilocarpear. (K. alata et laevis.) *Cf.* Müll. Ann. bot. VII. p. 529.

Kuema Adans. 1763. Fam. II. p. 11: g. Fungor. (Agaricum Mich. t. 65. f. 3. 4.) *Cf.* Leman 1822. Dict. v. 24. p. 514.

= Schizophyllum Fries?

Kützingia Sonder 1845. Bot. Zeit. p. 45; 1846 in Lehm. Pl. Preiss. II. p. 184: nov. g. Rhodomelear. (Rytiphlaea canaliculata Grev.) — Par. Mont. 1849 in Orb. Dict. X. p. 55.

Trevis. 1848. Algh. coccot. p. 107: g. Rytiphlaeinear.

Kütz. 1849. Sp. Alg. p. 846. n. 554: g. Rytiphlaeacear.

Kugaia**) DC. 1836. Prodr. V. p. 650: sect. Porophylli. (Senecio japonicus Thunb. An genus proprium?) — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2582 *c.* p. 420; 1841. Ench. p. 239. — Rchb. 1841. Nom. p. 83. n. 3217. 3.

Kugia „Bertero" Lindl. 1836. Nat. syst. ed. II. p. 438.

Endl. 1841. Gen. p. 1334. n. 30: inter genera nondum descripta.

Kuhlia***) Reinwardt 1823. Catal. h. Buitenz. ex Flora 1825. I. p. 103: nov. g. Pentandr.

Reinw. 1825. Syll. Ratisb. II. p. 6: g. Sesamear. s. Cyrtandracear.

Blume 1826. Bijdr. Nr. 14. p. 777: g. Cyrtandrear.

A. Juss. 1849 in Orb. Dict. VII. p. 425: g. Loganiear. sect. 2.

= Fagraea Thunb.

Kuhlia HBK. 1825. Nov. gen. VII. p. 234. t. 652. 653: nov. g. Bixinar. (K. glauca.) — Par. Kunth 1825. Syn. IV. p. 242.

Spreng. 1827. Cur. post. p. 201: g. Bixear.

Rchb. 1828. Consp. p. 190. n. 4922: g. Bixinear. — Par. Bartl. 1830. Ord. p. 282. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 297. — Spach 1838. Vég. phan. VI. p. 115. — Dietr. 1843. Syn. III. p. 212. 267.

Spreng. 1830. Gen. I. p. 440. n. 2180: g. Flacourtiear. (Polyandr. Monogyn.)

Meisn. 1837. Gen. p. 18 (17): g. Flacourtiaceum dubium.

Endl. 1839. Gen. n. 5074. p. 920; 1841. Ench. p. 479: g. Prockiear. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 189. n. 7203.

A. Juss. 1842 in Orb. Dict. II. p. 589: g. Bixacear.

Pöpp. & Endl. 1845. Nov. gen. III. p. 74. t. 285.

Lindl. 1847. Veg. kd. p. 328: in synon. Azarae.

Clos 1855. Ann. sc. nat. 4e sér. IV. p. 364; 1857. ibid. VIII. p. 237: g. Azarear.

*) *Kuala* nomen vernaculum.

**) *Kwugai Sai* Japanensium.

***) Dicat. H. Kuhl, botanico in Java.

Kuhnia*) Linn. 1763. Spec. pl. ed. II. p. 1662; 1764. Gen. ed. VI. p. 95. n. 237; 1767. Syst. ed. XII. p. 167. n. 236: g. Pentandr. Monogyn. — Par. Murr. 1774. Syst. p. 181; 1784. Syst. p. 217. — Reich. 1778. Gen. p. 97. n. 254. — Schreb. 1789. Gen. I. p. 129. n. 322. — Gmel. 1791. Syst. p. 375. — Pers. 1797. Syst. p. 226; 1805. Ench. I. p. 257. n. 585.

Linn. 1764. Ord. nat.: g. Discoidear. — Par. Gis. 1792. Prael. p. 539.

Gled. 1764. Syst. p. 191. n. 763: g. Petalostemonum.

Scop. 1777. Intr. p. 128: g. Flosculosar.

Juss. 1789. Gen. p. 177: g. Corymbiferar. — Par. Batsch 1802. Tab. p. 253. — St. Hil. 1805. Expos. I. p. 392. — Hedw. 1806. Gen. p. 167. n. 703. — Link 1822. En. II. p. 308.

Neck. 1790. El. III. p. 381. n. 1821: g. Siphoniphytor.

Willd. 1803. Sp. III. 3. p. 1772. n. 1455; 1809. En. p. 854: g. Syngenes. Aequal. — Par. Nutt. 1818. Gen. II. p. 134.

Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 543; 1826. Syst. III. p. 439. n. 2682; 1831. Gen. II. p. 612. n. 3021: g. Eupatorinar. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 99. n. 2238. — Bartl. 1830. Ord. p. 136.

HBK. 1820. Nov. gen. IV. p. 104: g. Eupatorear. — Par. Kunth 1823. Syn. II. p. 408.

Cass. 1820. Dict. v. 16. p. 10; 1822. v. 24. p. 515: g. Eupatoriear. — Par. Less. 1832. Syn. p. 157.

Rafin. 1820. Ann. gén. sc. phys. VI. p. 89: g. Astrocomiae.

Cass. 1823. Dict. v. 26. p. 228: g. Liatridear. — Par. Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31. — Spach 1841. Vég. phan. X. p. 37.

DC. 1836. Pr. V. p. 126: g. Adenostylear. Sect.: Strigia, Trichogonia, Leiogonia. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2268. p. 368; 1841. Ench. p. 233. Sect. eaed. — Meisn. 1838. Gen. p. 180 (124). — Torr. & Gray 1841. North-Am. II. p. 78. — Rchb. 1841. Nom. p. 98. n. 3843. Sect.: Kuhnia, Trichogonia, Leiogonia. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 709.

C. H. Schultz 1850. Flora p. 420: g. Kuhniear.

Synon. Critonia Gärtn.; Eupatorii sp. Ort.

Kuhnieae C. H. Schultz 1850. Flora Nr. 27. p. 420: div. Eupatoriacear. Gen.: Kuhnia, Liatris, Bulbostylis.

Kuhnistera**) Lamarck 1789. Dict. III. p. 370.

Vent. 1792. Act. soc. h. n. Par. p. 113; 1799. Tabl. III. p. 395: g. Leguminosar. — Par. St. Hil. 1805. Expos. II. p. 219.

DC. 1825. Pr. II. p. 244: sect. Petalostemi. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 149. n. 3887 *b.* — G. Don 1832. Gen. syst. II. p. 222.

*) Dicat. Adam Kühn, peregrinatori. (?)

**) Nomen ex habitu Kuhniae simili.

Kuhnistera Lamarck cont.
Bartl. 1830. Ord. p. 410: g. Galegear. — Par. Spach 1834. Vég. phan. I. p. 154.
Endl. 1840. Gen. n. 6522*b*. p. 1270 *(Kuhnistra)*; 1841. Ench. p. 669: sect. Petalostemonis. — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 147. n. 5721. 2 *(Kuhnistra)*.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 554: g. Psoraliear.
Synon. Anonymos Walt. Carol. n. 102 (Vent.)?; Cylipogon Rafin.

Kuhnistra Endl., Rchb. vid. *praeced.*

Kumara Medic. 1786. Theod. spec. p. 69. t. 4: nov. g. Aloarum. (Aloë disticha L.)
= Rhipidodendron Willd.

Kumbaya Endl. 1838. Gen. n. 3305*b*. p. 562; 1841. Ench p. 275: sect. Gardeniae.
Synon. Bertuchia Dennst.

Kundamannia Steud. vid. *seq.*

Kundmannia Scopoli 1777. Introd. p. 116. n. 332: nov. g. Umbelliferar. (Sium siculum L.) *Cf.* Juss. 1822. Dict. v. 24. p. 522.
DC. 1830. Pr. IV. p. 143: g. Seselinear. — Par. Rchb. 1832. Fl. exc. p. 465; 1837. Hdb. p. 220; 1841. Nom. p. 140. n. 5418. — G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 307. — Tausch 1834. Flora I. p. 355. — Meisn. 1838. Gen. p. 145 (105). — Endl. 1839. Gen. n. 4426. p. 774; 1841. Ench. p. 378. — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 139. — Steud. 1840. Nom. I. p. 851 *(Kundamannia)*. — Brongn. 1843. Én. genr. p. 111.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 778: g. Seselinidar.
Synon. Brignolia Bertol.; Campderia Lag.; Arduina Adans.

Kunthia*) Humb. & Bonpl. 1809. Pl. aequin. II. p. 127. t. 22: nov. g. Palmar. — Par. Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 522. — Spreng. 1825. Syst. II. p. 19. n. 1161; 1830. Gen. I. p. 250. n. 1303. (in Hexandr. Monogyn.) — Bartl. 1830. Ord. p. 65. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 136. — Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1063.
HBK. 1815. Nov. gen. I. p. 303: g. Cocoinar. Par. Kunth 1822. Syn. I. p. 305.
Spreng. 1818. Anl. II. 2. p. 875: g. Phoenicear.
Mart. 1824. Palm. fam. p. 15; . . . . Palm. p. 163. t. 101. 142: g. Arecinar. — Par. Schult. 1830. Syst. VII. p. LXXX. 1335. — Endl. 1837. Gen. n. 1722. p. 246; 1841. Ench. p. 135. — Kunth 1841. Enum. III. p. 175. — Rchb. 1841. Nom. p. 57. n. 2250. — Meisn. 1842. Gen. p. 355 (265).
Rchb. 1828. Consp. p. 72. n. 1641: g. Arecacear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56 *(Kuntia)*: g. Arecinear. — Par. Spach 1846. Vég. phan. XII. p. 60.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 138: g. Arecear.

Kunthia Dennstädt 1818. Schl. z. Hort. Malab. p. 22. 30: nov. g. pl. *(Katou-Kalesjam Rheede* IV. t. 33.)
Garuga Roxb.

Kuntia Dumort. vid. *Kunthia Humb. & Bonpl.*

Kunzea Rchb. 1828. Consp. p. 175. n. 4661: nov. g. Calothamnear. (Metrosideros capitata Smith.)
Rchb. 1837. Hdb. p. 253: g. Melaleucear.
Rchb. 1841. Nom. p. 176. n. 6818: g. Kunzeear.
Schauer 1844 in Lehm. Pl. Preiss. I. p. 123; g. Callistemonear. — Par. Walp. 1846. Rep. V. p. 741.
Synon. Metrosideri sect. Glaphyranthus Endl.

Kunzea Endl. Gen. p. 1245 et Ench. p. 659 in synon. Purshiae: vid. *Kunzia Spreng.*

Kunzeeae Rchb. 1841. Nomencl. p. 176: sect. Melaleucear. Gen.: Kunzea, Lophostemon.

Kunzia*) Spreng. 1818. Anleit. II. 2. p. 869: g. Rosaceis aff. *(Tigarea Pursh.)*
Spreng. 1825. Syst. II. p. 475. n. 1814: g. Icosandr. Monogyn.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 403. n. 2019: g. Spiraeacear.
= Purshia DC.

Kurria**) Hochstett. 1842. Flora I. p. 233: nov. g. Cinchonear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 360.
Hymenodictyon Wall. (teste ipso Auctore in Flora 1843. p. 71.)

Kurria Hochstett. 1847 in Rich. Fl. Abyssin. I. p. 356: nov. g. Gardeniacear.

Kurrimia Wallich 1831. Catal. n. 4334—4336 et 7200.
Meisn. 1837. Gen. p. 67 (48): g. Evonymear.?
Bhesa Hamilt.? (Endl. Gen. p. 1089.)

Kutchubaea***) „Fisch. mss." DC. 1830. Prodr. IV. p. 373: nov. g. Gardeniear. — Par. G. Don 1834. Gen. syst. III. p. 492. — Meisn. 1838. Gen. p. 161 (115). — Spach 1839. Vég. phan. VIII. p. 372. — Rchb. 1841. Nom. p. 78. n. 2969. (genuinar.)
Endl. 1838. Gen. n. 3312. p. 563; 1841. Ench. p. 275: g. Eugardeniear.
Lindl. 1847. Veg. kd. p. 765: g. Gardenidar.

Kyberia Necker 1790. Elem. bot. I. p. 42. n. 81: nov. g. Actinophytor., a Bellide L. sejunctum.
DC. 1836. Pr. V. p. 304: sect. Bellidis. — Par. Endl. 1838. Gen. n. 2348*a*. p. 381; 1841. Ench. p. 234. — Rchb. 1841. Nom. p. 84. n. 3241. 1.

*) Dicat. Car. Sigism. Kunth, tandem Berolin.

*) Dicat. Gust. Kunze, Lipsiensi.

**) Dicat. Joh. Gottl. Kurr, peregrinatori.

***) Dicat. Koutchoubeo.

Kydia*) Roxb. 1819. Pl. Corom. III. p. 11. t. 215. 216; 1832. Fl. Ind. III. p. 188: nov. g. Monadelph. Pentandr. (K. calycina et fraterna.)
HBK. 1821. Nov. gen. V. p. 313: g. Dombeyacear. — Par. DC. 1824. Pr. I. p. 500 (incertum). — Dumort. 1829. Anal. fam. p. 46. — Bartl. 1830. Ord. p. 344. — G. Don 1831. Gen. syst. I. p. 538. — Wight & Arn. 1834. Prodr. I. p. 69. — Spach 1834. Vég. phan. III. p. 456. — Meisn. 1837. Gen. p. 34 (27). — Endl. 1840. Gen. n. 5353. p. 1003; 1841. Ench. p. 520. — Wight 1844. Ic. pl. Ind. III. 2. p. 7. t. 879—881.
Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 531: g. Malvacear.
DC. 1823. Mém. Mus. X. p. 100: g. Dombeyear. (?) — Par. Rchb. 1841. Nom. p. 202. n. 7689. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 364.
Spreng. 1826. Syst. III. p. 85. n. 2428: g. Pentapetear.
Rchb. 1828. Consp. p. 163. n. 4297: g. Coccolobear.
Spreng. 1831. Gen. II. p. 550. n. 2695: g. Büttnerear.

Kylinga Röm. & Schult. vid. *seq.*

Kyllinga**) Rottb. 1773. Ic. t. 4. (ex Spreng.)
Linn. f. 1779. Gram. gen. Ed. 1790 (Amoen. ac. X.) p. 24: g. Gramineor. amentaceor.
Thunb. 1784. Fl. japon. p. 3: g. Triandr. Monogyn. — Par. Murr. 1784. Syst. p. 101. — Gmel. 1791. Syst. p. 122. — Pers. 1797. Syst. p. 103; 1805. Ench. I. p. 57. n. 117. — Vahl 1806. Enum. II. p. 379. n. 123. — Schult. 1827. Mant. III. Add. p. 546 (*Kylinga*).
Gis. 1792. Prael. p. 129: g. Calamariar.
Mönch 1794. Meth. p. 205: g. Thalamostemonis.
Hedw. 1806. Gen. p. 34. 361: g. Cyperacear. — Par. R. Brown 1810. Prodr. I. p. 218. Ed. Nees p. 74. — Spreng. 1825. Syst. I. p. 235. n. 232.
Spreng. 1817. Anl. II. 1. p. 135: g. Scirpinar.
Link 1821. En. I. p. 47; 1827. Hort. I. p. 325; 1829. Hdb. I. p. 108: g. Cyperoidear.
Spreng. 1830. Gen. I. p. 51. n. 241: g. Cyperear. — Par. Nees 1842 in Mart. Fl. Bras. fasc. III. p. 11.
= seq.

Kyllingia Linn. f. 1781. Suppl. p. 11. n. 1356: g. Triandr. Monogyn. (Rottb. Gram. t. 4. f. 4. 6.) — Par. Schreb. 1789. Gen. I. p. 40. n. 91. — Swartz 1797. Ind. occ. I. p. 121. — Willd. 1797. Sp. I. p. 256. n. 109; 1809. En. p. 69. — Elliott 1817. Sketch I. p. 54. — Nutt. 1818. Gen. I. p. 30. — Roxb. 1820. Ind. ed. Wall. I. p. 185; ed. 1832. p. 180.

*) Dicat. Colonel Rob. Kyd.

**) Dicat. botanico Dano P. Kylling.

Kyllingia Linn. cont.
Neck. 1790. El. III. p. 244. n. 1632: g. Chortodiphytor.
Batsch 1802. Tab. p. 157: g. Scirpear.
Cram. 1803. Disp. p. 5: in Monandr. Monogyn.
Michx. 1803. Fl. bor. am. I. p. 28: g. Cyperacear. — Par. Kunth 1815. Mém. Mus. II. p. 153; 1815 in HBK. Nov. gen. I. p. 211; 1822. Syn. I. p. 143. (verar.) — Röm. & Schult. 1827. Syst. II. p. 6. n. 188 (p. 236 *Kylinga*). — Poir. 1822. Dict. v. 24. p. 428. — Hamilt. 1825. Ind. occ. p. 13 (*Killyngia*). — Dietr. 1839. Syn. I. p. 129 (*Killingia*). 226.
Agdh. 1823. Aphor. p. 141: g. Cyperear. — Par. Rchb. 1828. Consp. p. 56. n. 1082; 1841. Nom. p. 41. n. 1473. Sect. (1841): Mariscus, Kyllingia. — Ritg. 1831. Marb. II. p. 119. — Nees 1834. Linnaea IX. p. 286; 1843. Nov. Act. Leop. XIX. Spl. I. p. 72. — Kunth 1837. Cyper. p. 127. — Meisn. 1842. Gen. p. 410 (313). — Spach 1846. Vég. phan. XIII. p. 144. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 119. — Steud. 1855. Glum. II. p. 66. — Miq. 1856. Ind. bat. III. p. 290.
Presl fr. 1828 in Reliq. Hänk. I. p. . . .: g. Cyperoidear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: g. Cyperinear.
Bartl. 1830. Ord. p. 33: g. Cyperinar.
Endl. 1837. Gen. n. 1003*b*. p. 119; 1841. Ench. p. 64: sect. Cyperi. Subsect.: Mariscus, Kyllingia.
Synon. Kyllinga Rottb., Linn. f.; Killingia et Thryocephalum Juss.; Thryocephalon Forst.; Hedychloa Rafin.

Kymapleura*) Nuttall 1841. Amer. phil. trans. n. ser. VII. p. 430: subg. Macrorhynchi. (M. heterophyllus.)
Endl. 1842. Spl. II. p. 50. n. $3018/_1$: g. Lactucear. — Par. Meisn. 1843. Comm. p. 363. — Lindl. 1847. Veg. kd. p. 715.
Walp. 1843. Rep. II. p. 696: sect. Macrorhynchi.
Synon. Trochoseris Pöpp. & Endl. (Walp.)

Kyphocarpa**) Fenzl 1842 in Endl. Gen. Suppl. II. p. 33. n. $1964/_1$ *a* (sphalm. *Hypocarpha*); 1843. Linnaea XVII. p. 324: sect. Sericocomae. — Par. Moq.-Tand. 1849 in DC. Pr. XIII. 2. p. 306.

Kyrstenia***) Necker 1790. Elem. bot. I. p. 81. n. 146: nov. g. Siphoniphytor., ab Eupatorio L. distinctum. *Cf.* Cass. 1822. Dict. v. 24. p. 533.
= Batschia Mönch?

Kyrtandra Gmel., Blanco vid. *Cyrtandra Forst.*

Kyrtanthus Gmel. vid. *Cyrtanthus Schreb.*

*) κῦμα, unda.

**) κῦφος, gibbus.

***) Dicat. Joh. Jac. Kyrsten, botanico.

Addenda.

Abama Adans. 1763.
Dumort. 1827. Belg. p. 182: g. Juncinear.
Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62: g. Abamear.

Abameae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 62: trib. Juncinear. Gen.: Abama.
Rchb. 1830 . . .

Abatia Ruiz & Pav. 1794.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 38. 119: g. Tiliacear.

Abelia R. Brown 1818.
Dum. 1829. An. p. 33: Linnaeacear. — Par. Rchb. 1841. . .

Abies Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 10; 1829. An. p. 79: Abietinear. Sect. (1827): Larix, Epicea, Sapinus.

Abietinae Rich. 1810.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 585: div. Coniferar.

Abietineae A. Rich. 1826.
Dum. 1827. Belg. p. 9; 1829. An. p. 11: trib. Coniferar. Gen.: Araucaria, Agathis, Cunninghamia, Larix, Cedrus, Pinus, Picea, Abies. — Par. Koch . . .

Abildgaardia Vahl 1806.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 129. 206 *(Abildgardia)*: Cyperacear.

Ablania Aubl. 1775.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 271: Polyandr. Digyn.

Abolboda Humb. & Bonpl. 1809.
Dum. 1829. An. p. 55: Xyridear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 182: Triandr. Monogyn.

Abroma Jacq. 1776.
Dum. 1829. An. p. 46: Buttneriear. — Par. Brongn. . . .

Abronia Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 21: Nyctaginear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 559. 590.

Abrus Prosp. Alp., Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Phaseolear.
Synon. Orobus Burm.

Abutilon Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 1.
Dum. 1829. An. p. 46: Sidacear.

Acacia Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 2. t. 1. 2.
Dum. 1829. An. p. 40: Acaciear.
Synon. Sussa Bruce.

Acacieae Rchb. 1827.
Dum. 1829. An. p. 40: trib. Leguminosar. Gen. fere ut Rchb.

Acaena Vahl 1805.
Dum. 1829. An. p. 79: Poteriar.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 103: Rosacear.

Acalypha Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 45: Acalyphear.

Acalypheae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 45: trib. Euphorbiacear. Gen.: Acalypha, Mercurialis, Plukenetia, Ricinus, Tragia.

Acanthaceae Juss. 1804.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: div. Personatar.

Acantheae Dum. 1829. p. 23: trib. Acanthidear. Gen.: Acanthus, Blepharis.
Nees 1832 . . . .

Acanthideae Dum. 1829. An. p. 20. 23: fam. Rhinanthariear. Trib.: Acantheae, Ruellieae, Justicieae, Elytrarieae, Tumbergieae.

Acanthodium Delile 1813.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 370. 594: Echmatacanthor.

Acanthospora Spreng. 1817.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1056: Hexandr. Monogyn.

Acanthus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 23: Acanthear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 370. 594: Echmatacanthor.

Acarna Cass. 1827.
Dum. 1829. An. p. 32: Carlinear.

Acer Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 48: Acerinear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1281: Acerum.

Aceras R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 56: Ophrydear.

Acerates Ell. 1817.
Dum. 1829. An. p. 26: Cynanchear.

Aceratium DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 46: Elaeocarpear.

Acerinae Agardh 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 589: ordo Trihilatar.

Acerineae DC. 1819.
Dum. 1829. An. p. 43. 48: fam. Sapindariear. Gen. ut DC.

Achania Swartz 1788.
Dum. 1829. An. p. 79: Malvear. — Par. Bartl. . . .

Achetaria Cham. & Schl. 1827.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 30. 64: Diandr. Monogyn.

Achillea Vaill. 1720.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.

Achimenes Vahl 1791.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 361. 522: Gratiolear.

Achnodonton Palis. 1812.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 674): Agrostidear.

Achnospathae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 62: class. Spathanthar. Ord.: Phylidrarieae, Graminarieae.

Achranthes Dum. vid. *Achyranthes Linn.*

Achras Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 27: Sapotacear.
A. DC. 1844. Pr. VIII. p. 174: sect. Sapotae. — Par. Miq.
Achyranthes Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 18 *(Achranthes)*: Gomphrenear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 865: Pentandr. Monogyn.
Achyrospermum Blume 1826.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 356. 463: Stachydear.
Acianthera Scheidw. 1842 in Otto & Dietr. Gartenz. Nr. 37. p. 292: nov. g. Malaxidear.
Acicarpha Juss. 1803.
Dum. 1829. An. p. 32: Calycerear.
Acidandra Mart., Spreng. 1830.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 5: Leguminosar.?
Acinos Riv., Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 22: Melissear. — Par. Rchb. 1841. . .
Acinula Fries 1823.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerotidear.
Aciotis Don 1823.
Dum. 1829. An. p. 38: Osbeckiear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1277: Melastomacear.
Acisanthera P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 39: Lythrear. — Par. Lindl. . . .
Aclisia E. Meyer 1827.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 176: Commelinear.
Acmadenia Bartl. & Wendl. 1824.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 827: sect. Diosmae.
Acmella Rich. 1807.
Dum. 1829. An. p. 31: Helianthear.
Acmena DC. 1826.
Dum. 1829. An. p. 38: Myrtear.
Acnida Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 17: Salsolear.
Acnospermae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: series Umbellatar. Trib. unica: Eryngieae.
Acolea Dumort. (1831. Syll.) 1835. Obs. Jung. p. 23: Acolear.
Acoleae Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 22: trib. Jungermanniotypar. Gen. ead.
Aconitum Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 129; 1829. An. p. 50: Helleborear. Sect. (1827): Lycoctonum, Aconitotypus.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 213. 282: Ranunculacear.
Acorineae „Fée" Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: fam. Typhariear. Gen.: Acorus.
Acoroideae Agardh 1822. Aphor. p. 133; 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: ordo Spadicinar. Gen.: . . . .
Acorus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 65: Acorinear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1166: Aroidear.
Acotyledoneae Agardh 1821. Aphor. p. 72: 77; 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 582. regio . . . .
Acremonium Link 1809.
Dum. 1829. An. p. 75: Gonocladear.
Acrocarpus Wight & Arn. 1839.
Wight 1840. Ic. pl. Ind. I. t. 254: Cassiear.
Acrocephalus Benth. 1832.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 351. 377: Ocymoidear.
Acrocomia Mart. 1823.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1039. 1062: Palmar.
Acrodiclidium Nees 1833.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1332. 1345: Acrodiclidior.
Acrodryon Spreng. 1825.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 419. 452: Rubiacear.
Acronia Presl 1827.
Presl 1833. Symb. bot. II. p. 9. t. 57: Malaxidear.? (phalangifera.)
Acrosanthes Eckl. & Zeyh. 1837.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 103: sect. Aizoonis.
Acrospelton Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 11: correctum pro *Acrospelion Bess.*
Acrospermum Tode 1790.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerotidear.
Acrostiche Dietr. vid *Acrotriche R. Brown.*
Acrostichum Linn. 1745.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 14. t. 2: Polypodiacear.
Dum. 1829. An. p. 67: Polypodear.
Acrostolia Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 26: nov. g. Pelliear. (Jung. fucoides et eriocaula.)
= Metzgeriae Raddi pars.
Acrostoma Didrichsen 1854. Nat. Foren. Vid. Medd. (Nov.): sect. Lasionematis. An novum genus?
Acrothamnium Nees, Link 1824.
Dum. 1829. An. p. 75: Gonosporear.
Acrotome Benth. 1838.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 355. 454: Stachydear.
Acrotriche R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 28: Stenantherear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 637 *(Acrostiche)*: Epacridear.
Actaea Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 50 *(Actea)*: Paeoniacear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Dietr. 1843. Syn. III. p. 208. 232: Ranunculacear.
Actea Dumort. vid. *Actaea Linn.*
Actiniscus Ehrenb. 1840.
Ehrenb. 1840. Ber. Berl. Ak. p. 208: sect. Dictyochae.
Actinochloa Willd., Röm. & Sch. 1817.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 678): sect. Eutrianae.
Dum. 1829. An. p. 64: Cynodonear.
Actinocladium Link 1820.
Dum. 1829. An. p. 75: Gonocladear.
Actinocyclus Ehrenb. 1840.
Ehrenb. 1840. Ber. Berl. Ak. p. 202: Bacillarior.

Actinodaphne Nees 1831.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1333. 1363: Daphnidior.
Actinodermium Nees 1816.
Dum. 1829. An. p. 74: Lycoperdear.
Actinodermum Léveillé vid. *Actinodermium Nees.*
Actinotus Labill. 1804.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 934: Saniculear.
Adamia Wall. 1824.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1627: Saxifragear.
Adamsia Willd. 1808.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1109: Liliacear.
Adansonia Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 46: Bombacear.
Adenacanthus Nees 1832.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 589: Echmatacanthor.
Adenandra Willd. 1809.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 828: sect. Diosmae.
Adenanthera Roy., Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Acaciear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1373. 1425: Leguminosar.
Adenanthera Benth. 1842.
Walp. 1842. Rep. I. p. 861; 1846. V. p. 580: Adenantherear.
Adenanthereae Walp. 1842. Rep. I. p. 858; 1846. . . . .
Adenanthos Labill. 1804.
Dum. 1829. An. p. 18: Protear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 522: Tetrandr. Monogyn.
Adenaria HBK. 1823.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1227. 1267: Octandr. Monogyn.
Adenema Don 1837.
Wight 1842. Ic. pl. Ind. II. 3. p. 8 (char.). t. 600: Coutoubear.
Adenocarpus DC. 1815.
Dum. 1829. An. p. 40: Genistear.
Adenocarpus Wittst. Etym. Handw. p. 15: vid. *Adenocarpum Don.*
Adenogramma Rchb. 1827.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 999: Pentandr. Digyn.
Adenopetalum Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 416: nov. g. plant. *(A. palmatum.)*
Adenophora Fisch. 1823.
Dum. 1829. An. p. 30: Campanulear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 755: subg. Campanulae.
Adenorrhachis Wittst. Etym. Handw. p. 16: corr. pro *Adenorachis DC.*
Adenorrhopium Wittst. Etym. Handw. p. 16: corr. pro *Adenoropium Pohl.*
Adenosacme Wall. 1832.
Synon. (add.) Bertiera Blume.
Adenosma R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 23: Elytrariear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 368. 583: Nelsoniear.

Adenostegia Benth. 1836.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 363. 543: Rhinanthear.
Adenostemma Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 31: Eupatoriear.
Adenostigmeae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 64; 1829. Anal. fam. p. 31: series II. Synantherear. (Compositar.) Trib. unica: Eupatorineae.
Adenostoma Hook. & Arn. 1832.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 4. 32: Rosacear.
Adenostyleae Cass. 1816.
Dum. 1829. An. p. 31: subtrib. Eupatorinear. Gen. ut Cass. et Ligularia.
Adenostyles Cass. 1816.
Dum. 1829. An. p. 31: Adenostylear.
Adesmia DC. 1825.
Dum. 1829. An. p. 40: Onobrychear. — Par. Bartl. . . .
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1512: Papilionacear.
Adhatoda Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 6. t. 3. 4.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 68: Acanthacear.
Adiantum Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 8 *(Adianthum).* t. 5. f. 1.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 60: Polypodiacear.
Dum. 1829. An. p. 67 *(Adianthum):* Aspleniear.
Adlumia Rafin. 1809.
Dum. 1829. An. p. 51: Diclytrear.
Adonis Rupp. 1718.
Dum. 1827. Belg. p. 127; 1829. An. p. 50: Anemonear. Sect. (1827): Consoligo, Adonidotypus.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 327: Ranunculacear.
Adoxa Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 38: Adoxear. — Par. Rchb. 1832 . . .
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1232. 1330: Saxifragear.
Adoxeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: trib. Saxifragacear. Gen.: Adoxa.
Rchb. 1832. . . .
Adrastea Spreng. 1825.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1524: Dilleniear.
Aeceolades Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 10 et in Ind. (t. 1683 *Oeceoclades):* vid. *Oeceoclades Lindl.*
Aechmanthera Nees 1832.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 591: Echmatacanthor.
Aechmea Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 55: Bromeliear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1040. 1089.
Aecidium Pers., Gmel. 1791.
Dum. 1829. An. p. 75: Uredinear.
Aegialitis R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 27: Armeriacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1024: Plumbaginear.
Aegiceras Gärtn. 1788.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 622: Pentandr. Monogyn.

Aegilops Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 161; 1829. An. p. 63: Frumentacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 140. 394: Hordeacear.

Aeginetia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 23: Aeginetiear. — Par. Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 3. t. 1421.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 373. 624: Orobanchear.

Aeginetieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 23: trib. Orobanchidear. Gen.: Aeginetia, Alectra.
Meisn. 1840 . . .
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 3: subordo Orobanchacear. Gen.: Aeginetia, Oligopholis.

Aegiphila Jacq. 1763.
Dum. 1829. An. p. 22: Viticear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 417. 429: Verbenacear.

Aegle Correa, Roxb. 1798.
Dum. 1829. An. p. 48 (*Aglaia*): Aurantiacear.

Aegopodium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 34: Pimpinellear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 944: Amminear.

Aegopogon Willd. 1805.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 673): Sparteor.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 135. 321: Agrostoidear.

Aenanthe Dumort. vid. *Oenanthe Tourn.*

Aeolanthus Mart. 1825.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 351. 385: Ocymoidear.

Aëranthes Lindl. 1826.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.

Aërides Lour. 1790.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.

Aerua Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 17: Amaranthear.

Aerva Forsk. 1775.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 864: Pentandr. Monogyn.
Synon. (add.) Ourèt Adans.

Aeschynanthus Jack 1823.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 367 (*Aeschinanthus*). 580: Cyrtandrear.

Aeschynomene Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Onobrychear.

Aesculus Boerh. 1720.
Dum. 1829. An. p. 48: Hyppocastanear.

Aesculus Linn. 1751.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1224: Hippocastanear.

Aethalium Link 1809.
Dum. 1829. An. p. 74: Spumariacear.

Aetheilema R. Brown 1810.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 592: Echmatacanthor.

Aethionema R. Brown 1812.
Dum. 1829. An. p. 51: Biscutellear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 675: Siliculosar.

Aethusa Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 34: Seselinear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 954.

Afzelia Smith 1798.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1496: Leguminosar.

Agallochum (s. Xyloaloë) Rumph. 1685. Misc. nat. cur. Dec. 2. Ann. 3. p. 74; 1741. Herb. II. p. 29. t. 10.

Agapantheae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 61: trib. Liliacear. Gen.: Agapanthus.

Agapanthus L'Herit. 1788.
Dum. 1829. An. p. 61: Agapanthear. — Par. Endl. 1837 . . . .
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1092: Liliacear.

Agapetes Don 1834.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1390: Ericear.
Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. 1. p. 3. t. 1180—1194: subg. Vaccinii.

Agardhina Nardo 1834 in Oken Isis p. 675: novum nomen pro Nulliporis propositum. (A. prototypa = Nullipora coriacea.)

Agariceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: trib. Agaricinear. Gen.: Agaricus, Schyzophyllum.

Agaricineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72. 73: fam. Fungariear. Trib.: Agariceae, Merulieae, Boleteae, Hydneae, Thelephoreae.

Agaricus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 73: Agaricear.

Agarum Bory.
Dum. 1829. An. p. 77: Laminariear.

Agassizia Chav. 1830.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 358. 497: Antirrhinear.

Agastachys R. Brown 1809.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 525: Tetrandr. Monogyn.

Agasyllis Hoffm. 1816.
Dum. 1829. An. p. 35: Silerinear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 974.

Agathaea Cass. 1815.
Dum. 1829. An. p. 31: Asterear.

Agathelpis Choisy 1824.
Dum. 1829. An. p. 22: Selaginear.

Agathis Salisb. 1807.
Dum. 1829. An. p. 11: Abietinear.

Agathisanthes Blume 1825.
Dum. 1829. An. p. 13: Myrobolanear.

Agathophyllum Juss. 1789.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1331. 1343: Cryptocaryear. (1843. III. p. 2. 25 in Dodecandr. Monogyn.)

Agathosma Willd. 1809.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 824: sect. Diosmae.

Agave Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 58: Agaveacear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1191: Asphodelear.

Agaveaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: trib. Agavinear. Gen.: Agave, Littlea, Furcraea.

Agavineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57: fam. Narcissariear. Trib.: Hemodoraceae, Agaveaceae, Doryantheae.

Ageratum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Eupatoriear.

Aggelanthus Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 18. t. 1737: nov. g. Malaxidear. (A. marchantioides.) *Cf.* Rchb. f. in Müll. Ann. bot. VI. p. 266.

Aglaia Dumort. vid. *Aegle Corr.*

Agrimonia Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 39: Agrimoniacear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 26: Rosacear.

Agrimoniaceae DC. 1805.
Dum. 1829. An. p. 39: trib. Rosacear. Gen.: Agrimonia, Aremonia, Neurada.

Agropyron Gärtn. 1770.
Dum. 1827. Belg. p. 160; 1829. An. p. 63: Loliacear.

Agrostemma Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p 108; 1829. An. p. 49: Silenear. Sect. (1827): Agrostemmotypus, Githago.

Agrostidea Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 670. 674): div. Graminum. Gen.: Achnodonton, Chilochloa, Gastridium, Polypogon. Perotis. Chaeturus, Urachne, Aristida, Stipa, Mühlenbergia, Agrostis, Anemagrostis.

Agrostideae Kunth 1815.
Dum. 1829. An. p. 63: trib. Calliflorar. Gen.: Calamagrostis, Deyeuxia, Agrostis, Apera, Anthoxanthum, Ammophila, Spartina, Gastrodium, Trichodium, Muhlembergia, Cinna.

Agrostis Linn. 1737.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 676): g. Agrostideor. Sect.: Agrostis, Trichodium.
Dum. 1827. Belg. p. 152; 1829. An. p. 63: Agrostidear. Sect. (1827): Trichodium, Vilfa.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 134. 315: Agrostoidear.

Agrostoideae Dietr. 1839 Syn. pl. I. p. 134: div. 5 Graminear. Gen. Agrostidear. Kunth.

Agyrium Fries 1821.
Dum. 1829. An. p. 74: Tremellacear.

Aidelus Spreng. 1827.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 103: Caryophyllear. (Diandr. Monogyn.)

Aidia Lour. 1790.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 759: Pentandr. Monogyn.

Ailanthus Desfont. 1786.
Dum. 1829. An. p. 40: Connarinear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1001: Rutacear.?

Aira Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 154; 1829. An. p. 63: Avenacear. Sect. (1827): Airotypus, Bostrycha. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 337.

Airopsis Desv. 1808.
Dum. 1829. An. p. 63: Poëar.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 339: Avenacear.

Aizoideae Agardh 1825. Class. pl. p. 19; 1826. Isis p. 591: ordo Succulentar.

Aizoon Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 41: Mesembrynear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 39. 128: Aizoidear. Sect.: Aizoon, Acrosanthes.

Ajuga Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: Ajugear. (restrict.) — Par. Griseb. . . .
Dietr. 1843. Syn. III. p. 357. 471: Ajugoidear.

Ajugeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Teucriear. Gen.: Ajuga, Chamaepitys, Teucrium, Scorodonia, Anisomeles, Trichostema.
Griseb. 1844 . . .

Alangieae DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 33. 34: fam. Cornariear. Gen. id.

Alangium Lam. 1783
Dum. 1829. An. p. 34: Alangiear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 211. 263.

Albuca Linn. 1762.
Dryand. 1784. Vet. Ac. n. Handl. p. 289.
Dum. 1829. An. p. 60: Asphodelear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1010. 1090: Hexandr. Monogyn.

Alchemilla Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 26; 1829. An. p. 19: Alchemillear. Sect. (1827): Aphanes, Alchemillotypus. — Par. Rchb. 1837 . . .

Alchemilla Scop. 1772.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 542: Rosacear.

Alchemilleae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 26; 1829. Anal. fam. p. 19: trib. Sanguisorbear. Gen.: Alchemilla et 1829 Aphanes. — Simil. Rchb. 1837 . . .

Aldrovanda Monti 1747.
Dum. 1829. An. p. 49: Droseracear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1019: Droserear.

Alectorolophus Hall. 1742.
Dum. 1829. An. p. 23: Melampyracear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 364. 553: Rhinanthear.

Alectra Thunb. 1784.
Dum. 1829. An. p. 23: Aeginetiear. — Par. Meisn. 1840 . . .

Alephia Dumort. vid. *Aphelia R. Brown.*

Alepida Dumort. vid. *Alepidea Laroche.*

Alepidea Laroche 1808.
Dum. 1829. An. p. 34 *(Alepida)*: Eryngiear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 935: Saniculear.

Alepyrum R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 63: Devauxiacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 28: Restiacear.

Aletris Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 60: Hyacinthear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1109: Liliacear.

Aleurites Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 45: Crotoniear.

Algae Roth 1800.
Agdh. (1824. Syst.) 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 582: class. Acotyledonear. Ord. . . . . .
Nardo 1835. Consid. gen. Alghe (Isis 1837. p. 90). Ordines: Diatomaceae, Nostochinae, Confervoideae, Ulvaceae, Titanoideae, Floroideae, Fucoideae.

Algae Nägeli 1849.
Cf. Jessen in Bot. Zeit. 1849. Nr. 41. p. 739. Nr. 48 etc.

Alibertia A. Rich. 1830.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 798: Rubiacear.

Alicterus Wittst. Etym. Handw. p. 29: vid. *Alicteres Neck.*

Alisma Adans. 1763.
Dum. 1827. Belg. p. 135; 1829. An. p. 55: Alismear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1049. 1222: Alismacear.

Alismaceae DC. 1805.
Agdh. (1822. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 584: ordo Macropodar.
Dum. 1829. An. p. 54. 55: fam. Alismariear. Trib.: Sagittarieae, Alismeae, Butomeae.

Alismarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: ordo Calytepalar. Fam. unica: Alismaceae.

Alismeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: trib. Alismacear. restricta. Gen.: Alisma, Damasonium.

Alkekengi Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 10.

Allamanda Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 26: Vincear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 657: Pentandr. Monogyn.

Allantodia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 67: Aspleniear.

Allardtia Dietr. 1852 . . . .
= Platystachys Koch.

Allasia Lour. 1790.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 503: Tetrandr. Monogyn.

Alliaceae Batsch 1802, Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 61: trib. Liliacear. Gen.: Allium, Sowerbaea, Laxmannia, Tulbagia.

Alliaria Rupp. 1718.
Dum. 1827. Belg. p. 124; 1829. An. p. 51: Erysimear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 634. 711: Siliquosar.

Allionia Löfl. 1758.
Dum. 1829. An. p. 21: Nyctaginear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 417. 428.

Allium Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 61: Alliacear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1129: Asphodelear. Sect.: Porrum, Allium, Macrospatha, Ornithogaloideum.

Allmania R. Brown (Verm. bot. Schr. V. p. 316.)

Alloplectus Mart. 1829.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 366. 579: Episciear. — Par. Endl. . . .
Synon. (add.) Orobanchia Vand.

Allosorus Bernh. 1806.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 58: Polypodiacear.

Alloteropsis Presl 1830.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 414: Triandr. Digyn.

Almeidea St. Hil. 1823.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 823: Rutacear.

Alnus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 12: Betulacear.

Aloë Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 60: Hyacinthear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1041. 1097: Liliacear.

Aloëxylon Batsch 1802.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1379. 1496: Leguminosar.

Alonsea Dietr. vid. *Alonsoa Ruiz & Pav.*

Alonsoa Ruiz & Pav. 1798.
Dum. 1829. An. p. 24: Scrophulariear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 357 (*Alonsea*). 479: Verbascear.

Alopecureae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64: subtrib. Phalaridear. Gen.: Crypsis, Cornucopiae, Lygeum, Alopecurus, Mibora, Polypogon, Lagurus, Echinopogon, Phleum, Chilochloa, Heleochloa.
Fries 1846 . . .

Alopecurus Linn. 1737.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 671): Vilfaceor. Sect.: Alopecurus, Colobachne.
Dum. 1829. An. p. 64: Alopecurear. — Par. Fries 1846 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 131. 324: Phalaroidear.

Aloysia Ort., L'Herit. 1784.
Dum. 1829. An. p. 22: Verbenear.

Alpinia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 56: Curcumacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 11: Scitaminear.

Alseis Schott, Spreng. 1827.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 724: Rubiacear.

Alseodaphne Nees 1831.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1331. 1341: Persear.

Alsine Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsinear.

Alsineae DC. 1805.
Dum. 1829. An. p. 49: trib. Stellariacear. Gen. ex DC. 1824 et Mollugo, Phaloe.

Alsodea Spreng. 1818.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 831: Violear.

Alsodeia Petit-Th. 1807.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsodinear.

Alsodineae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 49: trib. Violacear. Gen.: Alsodeia, Ceranthera.

Alsophila R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 67: Cyathear.

Alstonia Mutis, Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 27: Symplocear.

Alstonia R. Brown 1809.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 653: Contortar.

Alströmeria Linn. 1762.
Dum. 1829. An. p. 58: Alströmeriacear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1192: Hexandr. Monogyn.

Alströmeriaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. 58: fam. Iridariear. Gen.: Alströmeria.

Ampelodesmos Link 1827.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 135. 326: Arundinacear.
Ampelopsis Rich. 1803.
Dum. 1829. An. p. 48: Vitidear.
Amphicarpum Rafin. 1818.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 252: Panicear.
Amphilochia Mart. 1824.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 1. 21: Vochysiear.
Amphilophium Kunth 1818.
Dum. 1829. An. p. 23: Bignoniacear. (et p. 25 Cobeacear.)
Dietr. 1843. Syn. III. p. 364. 565: Bignoniear.
Amphipogon R. Brown 1818.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 135. 327: Pappophorear.
Amphirrhapis Wittst. Etym. Handw. p. 40: vid. *Amphirhapis DC.*
Amphirrhinum Wittst. Etym. Handw. p. 41: vid. *Amphirhinum Green.*
Amphirrhox Spreng. 1827.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 575. 837: Violear.
Amphiscopia Nees 1832.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 80: Acanthacear. (Diandr. Monogyn).
Amphisporium Link 1816.
Dum. 1829. An. p. 74: Spumariacear.
Amphochaeta Anderss. 1853 in Vet. Ac. Handl. p. 136 (Müll. Ann. bot. VI. p. 960): nov. g. Panicear. (Pennisetum pauperum Steud.)
Amsonia Walt. 1788.
Dum. 1829. An. p. 26: Vincear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 657: Contortar.
Amygdaleae Juss 1789.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 20; 1826. Isis p. 592: ordo Icosandrar.
Dum. 1829. An. p. 40: trib. Amygdalinear. Gen.: Armeniaca, Prunus, Cerasus, Amygdalus.
Amygdalineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 40: fam. Rosariear. Trib.: Amygdaleae, Chrysobalaneae.
Amygdalus Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 91; 1829. An. p. 40: Amygdalear. Sect. (1827): Armeniaca, Persica, Amygdalotypus. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 36. 41.
Amyrideae R. Brown 1818.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 590: div. Terebinthacear.
Amyrideae Kunth 1824.
Dum. 1829. An. p. 41: trib. Terebinthacear. Gen.: Amyris.
Amyris P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 41: Amyridear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1270: Terebinthacear.
Anabaina Bory 1821.
Dum. 1829. An. p. 78: Oscillariear.
Anabasis Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 17: Salsolear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 995: Chenopodear.
Anabata Willd.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 657: Contortar.
Anacampseros Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 41: Portulacear.
Anacamptis Rich. 1818.
Dum. 1827. Belg. p. 132; 1829. An. p. 56: Ophrydear.
Anacamptodon Brid. 1822.
Dum. 1829. An. p. 68: Hypnear.
Anacardeae Agardh 1825. Class. pl. p. 16; 1826. Isis p. 590: div. Terebinthacear.
Anacardieae R. Brown 1818.
Dum. 1829. An. p. 41: trib. Terebinthacear. Gen. ex DC.
Anacardium Linn. 1737.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 19.
Dum. 1829. An. p. 41: Anacardiear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1333. 1366: Terebinthacear.
Anacharis Rich. 1811.
Dum. 1829. An. p. 55: Elodeacear.
Anacheilum Wittst. Etym. Handw. p. 42: vid. *Anacheilium Hoffmsg.*
Anacolosia Wittst. Etym. Handw. p. 42: vid. *Anacolosa Blume.*
Anacyclus Pers. 1807.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Anadenia R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 18: Banksiear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 424. 526: Tetrandr. Monogyn.
Anagallideae Neck. 1770.
Dum. 1827. Belg. p. 29; 1829. An. p. 27: trib. Primulacear. Gen.: Centunculus, Anagallis, Asterolinum, Lysimachia, Trientalis et 1829 Naumburgia, Lubinia.
Anagallis Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 19. t. 9.
Dum. 1827. Belg. p. 29; 1829. An. p. 27: Anagallidear. Sect. (1827): Jiraseckia, Anagallotypus.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 563. 640: Primulear.
Anagyris Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Sophorear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1514: Papilionacear.
Ananas Pis. 1648, Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 55: Bromelicar.
Ananassa Lindl. 1827.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1040 1087: Hexandr. Monogyn.
Anantherix Nutt 1818.
Dum. 1829. An. p. 26: Cynanchear. — Par. Spach . . .
Ananthocyclus Wittst. Etym. Handw. p. 43: vid. *Ananthocyclos Vaill.*
Anarrhinum Desfont. 1800.
Dum. 1827. Belg. p. 34; 1829. An. p. 24: Antirrhinear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 358. 485.
Anarthria R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 62: Restionear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 142. 415: Triandr. Digyn.
Anasser Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 26 *(Anaster):* Loganiacear.
Anastatica Linn. 1737.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 631. 674: Siliculosar.
Anaster Dumort. vid. *Anasser Juss.*

Anastrabe Meyer, Benth. 1836.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 360. 509: Digitalear.

Anatherum Palis 1812.
Dum. 1829. An. p. 64: Andropoginear.

Anavinga Rheede, Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 18: Samydear.

Anchietea St. Hil. 1824.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 574. 837: Violear.

Anchonium DC. 1821.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 635. 728: Siliquosar.

Anchusa Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 41; 1829. An. p. 24: Anchusear. Sect. (1827): Anchusotypus, Buglossum, Lycopsidium. — Par. Koch 1837 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 605: Asperifoliar.

Anchuseae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 40; 1829. Anal. fam. p. 24: subtrib. Lithospermear. Gen.: Myosotis, Anchusa, Borago, Symphytum, et 1829 Exarrhena, Stomotechium.
Koch 1837 . . .

Ancistrum Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 79: Poteriar.

Ancylanthus Juss. 1820.
Dum. 1829. An. p. 32: Guettardear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 789: Rubiacear.

Andersonia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 28: Epacrear. — Par. DC. 1839 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 566. 689: Pentandr. Monogyn.

Andira Lam. 1783.
Dum. 1829. An. p. 40: Geoffrear.

Andrachne Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 45: Phyllanthear.

Andraea Neck. 1790.
Dum. 1829. An. p. 69: Andraeacear. — Par. Bruch, Schimp. . . .

Andraeaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68. 69: fam. Hypnariear. Gen.: Andraea.
Bruch, Schimp. . . . .

Andragraphis Wight vid. *Andrographis Nees.*

Andreaea Ehrh. 1778.
Röhl. 1814. Ann. Wett. Ges. III. 2. p. 209: Aploperistomator.

Andrewsia Spreng. 1817.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 413: Gentianear.

Androcymbium Willd. 1808.
Dum. 1829. An. p. 61: Veratrinear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1207: Melanthacear.

Andrographis Nees 1832.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 31. 82: Acanthacear. (Diandr. Monogyn.)
Wight 1841. Ic. pl. Ind. II. 2. p. 4 (*Andragraphis*). t. 467: Andrographidear.

Andromeda Linn. lapp. 1737.
Dum. 1829. An. p. 28: Ericacear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1371. 1398: Ericear.

Andropogineae Dumort. 1823. Agrost. Belg.; 1827. Fl. belg. p. 149; 1829. Anal. fam. p. 64: trib. Calliflorar. Gen. (1827 Andropogon): Andropogon, Anatherum, Sorgum, Dicctomis, Apluda, Anthristiria, Heteropogon, Ischaemum, Pharus.
Kunth 1830 . . .

Andropogon Linn. 1753.
Dum. 1827. Belg. p. 149; 1829. An. p. 64: Andropoginear. — Par. Kunth 1830 . . .
Presl 1830. Reliq. Hänk. I. p. . . .: Andropogonear. — Par. Kunth 1833 . . . — Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 402.

Androsace Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 30; 1829. An. p. 27: Primulear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 631.

Androsaemum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 47: Hypericear.

Andryala Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 30: Hieraciear.

Aneilema R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 55: Dichorisandrear.

Aneilemeae Wight 1853. Ic. pl. Ind. t. 2078: div. Commelynacear. Gen.: Dichoespermum.

Aneimia Kaulf. 1824.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 105: Rhachiospermar. (Gleicheniear. spicatar.)

Anemagrostis Trin. 1820.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 676): Agrostideor.

Anemarrhena*) Bunge (1832. En. pl. Chin. p. 66) 1835. Mém. étr. Ac. Pet. II. p. 140: nov. g. Asphodelear. (A. asphodeloides.)

Anemia Swartz 1806.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 73: Osmundacear. — Par. Dum. 1829. An. p. 67.
(Ritg. 1831 . . . deleatur!)

Anemone Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 127; 1829. An. p. 50: Anemonear. Sect. (1827): Pulsatilla, Anemonotypus.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 217. 330: Ranunculacear.

Anemoneae DC. 1818.
Dum. 1829. An. p. 50: trib. Ranunculacear. Gen. ex DC. et Pulsatilla.

Anescia Wight vid. *Aniseia Choisy.*

Anetheum Wight vid. *Anethum Tourn.*

Anethum Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 83; 1829. An. p. 35: Peucedanear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 969. — Wight 1842. Ic. pl. Ind. II. 3. p. 5 (*Anetheum*). t. 572.

Aneura Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 69: Blasiear.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 26: Pelliear.

Angelica Hoffm. 1814.
Dum. 1827. Belg. p. 82; 1829. An. p. 35: Angelicear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 962.

*) ἀ priv.; νῆμα, filum. Nomen ab antheris filamento carentibus, sessilibus.

Angeliceae Koch 1824.
Dum. 1829. An. p. 35: trib. Pterospermar. Gen. ut Koch 1824.
Angelonia Humb. & Bonpl. 1809.
Dum. 1829. An. p. 24: Antirrhinear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 358. 484: Hemimeridear.
Angraecum Petit-Thouars 1822.
Dum. 1829. An. p. 57: Malaxidear.
Anguilaria Juss. vid. *Anguillaria R. Brown.*
Anguillaria R. Brown 1810.
Juss. 1818. Dict. v. 10. p. 15 *(Anguilaria)*: Colchicear.
Dum. 1829. An. p. 61: Veratrinear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1207: Melanthacear.
Anguloa Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Anguria Linn. 1763.
Dum. 1829. An. p. 29: Cucurbitacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 32. 102.
Aniba Aubl. 1775.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1306: Octandr. Monogyn.
Anictangium Hedw. 1801.
Dum. 1829. An. p. 69: Gymnostomear.
Anigozanthos Labill. 1798.
Dum. 1829. An. p. 58: Hemodoracear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1198: Haemodorear.
Anisacantha R. Brown 1810.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 425. 541: Tetrandr. Monogyn.
Anisanthus Sweet 1827.
Dum. 1829. An. p. 58: Gladiolear.
Aniseia Choisy 1833.
Wight 1844. Ic. pl. Ind. III. 2. p. 3 *(Anesеia)*. t. 833: Convolvulear.
Anisochilus Wall. 1831.
Dietr. 1840. Syn. III. p. 351. 384: Ocymoidear.
Anisocladium Dietr. vid. *Anisosciadium DC.*
Anisodus Link 1824.
Dum. 1829. An. p. 24: Solanear — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 712.
Anisomeles R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 22: Ajugear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 358. 410: Stachydear.
Anisomeris Presl 1833. Symb. bot. II. p. 5. t. 54: nov. g. Guettardear. (A. spinosa.) — Par. Meisn. . . .
Anisopetalum Hook. 1825.
Dum. 1829. An. p. 57: Malaxidear.
Anisopogon R. Brown 1810.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 344: Avenacear.
Anisosciadium DC. 1829.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 586 *(Anisocladium)*; 1840. II. p. 934: Smyrnear.
Anixia Fries 1819.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerotidear.
Anneslea Wall. 1829.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 953: sect. Oenanthes.
Anoda Cavan. 1785.
Dum. 1829. An. p. 46: Sidacear.
Anodontea DC. 1821.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 629. 642: Siliculosar.
Anomalopteris DC. 1824.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1524: Malpighiear.
Anomatheca Bell.-Gawl. 1805.
Dum. 1829. An. p. 58: Ixiear. — Par. Spach 1846 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 130: Iridear.
Anona Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 50: Anonacear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 304: Anonear.
Anonaceae Rich. 1808.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 588: ordo Polycarpellar.
Dum. 1829. An. p. 44. 50: fam. Ranunculariear. Gen. ut Dunal. (Artabotrys loco Kadsurae et Porceliae.)
Anoplanthus Endl. 1839.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 3: Orobanchear.
Anopterus Labill. 1804.
Dum. 1829. An. p. 37: Escalloniacear. — Par. Lindl. 1847 . . .
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1038. 1050: Hexandr. Monogyn.
Anotis DC. 1830.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 421. 495: Rubiacear.
Anredera Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 17: Chenopodear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 872.
Anserina Dumort. 1827. Fl. belg. p. 21: g. Blitear. (Chenopodium Bonus Henricus.)
Dum. 1829. An. p. 17: Chenopodear.
Antennaria R. Brown 1816.
Dum. 1827. Belg. p. 69; 1829. An. p. 31: Gnaphaliear.
Anthelia Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 18: Cephaloziear.
Anthemideae Cass. 1815.
Dum. 1829. An. p. 31: subtrib. Jacobaear. Gen.: Artemisia, Iva, Humea, Soliva, Hippia, Cenia, Cotula, Tanacetum, Balsamita, Pyrethrum, Chrysanthemum, Matricaria, Athanasia, Lonas, Diotis, Santolina, Anacyclus, Anthemis, Chamaemelum, Achillea.
Anthemis DC. 1805.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Anthenantia Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 64 *(Athenantia)*: Panicear. genuinar.
Anthephora Schreb. 1779.
Dum. 1829. An. p. 64: Panicear. (genuinar.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 133. 298.
Anthericum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 60: Asphodelear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1146.
Antherylium Rohr 1792.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 1. 9: Salicariar.
Anthiarideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16: trib. Ficinear. Gen.: Anthiaris.
Anthiaris Dumort. vid. *Antiaris Lesch.*
Anthistiria Linn. f. 1779.
Dum. 1829. An. p. 64 *(Anthristiria)*: Andropoginear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 400 *(Anthisteria)*: Andropogonear.

Anthobolarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15: ordo Torosepalar. Fam. unica: Antboboleae.

Anthoboleae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 17: fam. unica Anthobolariear. Gen.: Exocarpus, Anthobolus.

Anthocercis Labill. 1806.
Dum. 1829. An. p. 30: Gesnerear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 499: Salpiglossidear.

Anthocereae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68. 69: fam. Jungermannariear. Gen.: Anthoceros.
Brongn. . . .

Anthoceros Mich. 1729.
Dum. 1829. An. p. 69: Anthocerear.

Anthocleista Afzel., R. Brown 1818.
Dum. 1829. An. p. 26: Potaliacear. — Par. G. Don 1837 . . .

Anthodiscus Meyer 1818.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 40. 205: Rosacear.

Anthodon Ruiz & Pav. 1798.
Dum. 1829. An. p. 48: Hippocrateacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 128. 179: Hippocratear.

Antholoma Labill. 1798.
Dum. 1829. An. p. 47: Marcgraviear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 207. 219.

Antholyza Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 58 (*Antholiza*): Gladiolear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 161: Iridear.

Anthonota Palis. 1805.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1381. 1515: Papilionacear.

Anthopterus Hook. 1838.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1394: Ericear.

Anthospermum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 33: Galiear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 462: Rubiacear.

Anthotroche Endl. 1839.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 501: Salpiglossidear.

Anthoxanthum Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 152; 1829. An. p. 63: Agrostidear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 33. 125: Graminear.

Anthriscus Spreng. 1813.
Dum. 1827. Belg. p. 80; 1829. An. p. 35: Scandicinear. Sect. (1827): Cerefolium, Anthriscotypus. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 586; II. p. 981.

Anthristiria Dumort. vid. *Anthistiria Linn. f.*

Anthyllis Riv., Rupp. 1718.
Dum. 1827. Belg. p. 99; 1829. An. p. 40: Genistear.

Antiaris Lesch. 1810.
Dum. 1829. An. p. 16 (*Anthiaris*): Anthiaridear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 426. 550: Tetrandr. Digyn.

Antichorus Linn. 1767.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1229. 1297: Tiliacear.

Antidesma Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 22. t. 10: nov. g. plant., cum Berberide comparatum.
Linn. 1747. . . . .
Dum. 1829. An. p. 17: Stilaginear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 578. 873: Rosacear.?

Antirrhineae Pers. 1807.
Dum. 1827. Belg. p. 34; 1829. An. p. 24: trib. Rhinanthidear. Gen.: Antirrhinum, Anarrhinum, Linaria, Kickxia. Accedunt 1829 Nemesia, Scoparia, Cymbaria, Maurandia, Vandellia, Dodartia, Lophospermum, Sibthorpia, Herpestis, Disandra, Collinsia, Torenia, Columnea, Stemodia, Mazus, Russelia, Angelonia, Schwenkia, Schizanthus.

Antirrhinum Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 22. t. 11.
= Oldenlandia Linn.

Antirrhinum Adans. 1763.
Dum. 1827. Belg. p. 34; 1829. An. p. 24: Antirrhinear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 358. 495.

Antonia Pohl 1831.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 570. 769: Pentandr. Monogyn.

Anychia Michx. 1803.
Dum. 1829. An. p. 18: Illecebrinear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 872: Paronychiear.

Aotus Smith 1805.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1380. 1511: Papilionacear.

Apactis Thunb. 1783.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 25: Dodecandr. Monogyn.

Apeiba Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 46: Tiliacear. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 209. 242.

Apera Adans. 1763.
Dum. 1827. Belg. p. 152; 1829. An. p. 63: Agrostidear.

Apetalon Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 22. t. 1758: nov. g. Arethusear. (A. minutum.)

Aphanes Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 19: Alchemillear. — Par. Rchb. 1837 . . .

Aphanizomenon Morren (1836. Bull.) 1838. Nouv. Mém. Ac. Brux. XI. p. 11 c. tab.: nov. g. . . . .

Aphanomixis Wittst. Etym. Handw. p. 61: vid. *Aphanamixis Bl.*

Aphanostemma St. Hil. 1825.
Dietr. 1843. Syn. II. p. 216. 329: Ranunculacear.

Aphelandra R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 23: Ruellicar.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 370. 595: Echmatacanthor.

Aphelia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 62 (*Alephia*): Devauxiacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 2. 25: Monandr. Monogyn.

Aphragmia Nees 1836.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 368. 585: Echmatacanthor.
= Dipterocarpi sp. (Nees in DC. Pr. XI. p. 140.)
Aphragmus Andrz., DC. 1824.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 632. 675: Siliculosar.
Aphyllanthes Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 80: Eriocaulear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1044. 1157: Juncear.
Aphyteia Linn. 1775.
Dum. 1829. An. p. 14: Cytinear.
Apicra Willd. 1811.
Dum. 1829. An. p. 60: Hyacinthear.
Apios Boerh. 1720.
Dum. 1829. An. p. 40: Phaseolear.
Apiosporium Kunze 1817.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerotidear.
Apium Hoffm. 1814.
Dum. 1829. An. p. 34: Pimpinellear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 940: Amminear.
Aplectrum Blume 1831.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1460: Miconiear.
Aplopogoni Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: series Muscor. Trib.: Dicraneae, Grimmieae, Splachneae, Tetraphideae.
Aplotrichum Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: g. Orthotrichear., post Calymperem locatum. (Nomen.)
Aplozieae Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 15: subtrib. Jungermanniear. Gen.: Pleurozia, Schistochila, Diplophyllum, Blepharozia, Jungermannia, Gymnoscyphus, Gymnocolea, Lophozia, Lophocolea.
Apluda Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 64: Andropoginear. — Par. Kunth 1830 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 414: Andropogonear.
Apocyneae Juss. 1804.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: ordo Tubiflorar. (Divis.: Asclepiadeae, Strychneae.)
Dum. 1829. An. p. 21. 26: fam. Asclepiariear. Trib.: Echiteae, Vinceae.
Apocynum Linn. 1737.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 23. t. 12.
Dum. 1829. An. p. 26: Echitear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 564. 652: Contortar.
Apodytes E. Meyer, Benth. 1841.
Wight 1846. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 14 (char.) t. 1153: Icacinear.
Apogoni Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: series Muscor. restricta. Trib. unica: Gymnostomeae.
Apollonias Nees 1833.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1331. 1336: Phoebear.
Aponogetoa Dumort. vid. *Aponogeton.*
Aponogeton Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 66 *(Aponogetoa)*: Saururear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 31: Alismacear.

Aporum Blume 1825.
Synon. (add.) Schismocerus Steud.
Appendicularia DC. 1828.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1276: Melastomacear.
Aptosimum Burch. 1824.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 359. 498: Salpiglossidear.
Aquartia Linn. 1762.
Dum. 1829. An. p. 24: Solanear.
Aquilaria Lam. 1783.
Dum. 1829. An. p. 18: Aquilariacear. — Par. Lindl. 1836 . . .
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1520: Aquilarinar.
Synon. (add.) Xyloaloë Rumph.
Aquilariaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 18: fam. Proteariear. Gen.: Aquilaria, Gyrinops, Ophiospermum.
Lindl. 1836 . . . .
Aquilarinae R. Brown 1818.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 586: ordo Epichlamydear.
Aquilegia Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 129; 1829. An. p. 50: Helleborear.
Arabis Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 125; 1829. An. p. 51: Cardaminear. Sect. (1827): Lomaspora, Alomatium.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 633. 689: Siliquosar.
Arachis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Geoffrear.
Arachnoides Wittst. Etym. Handw. p. 66: vid. *Arachniodes Blume.*
Aragoa HBK. 1818.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 418. 445: Solanear.
Aralia Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 35: Araliacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 590; II. p. 1034: Araliear.
Araliaceae Vent. 1799.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: ordo Hypodicarpar.
Dum. 1829. An. p. 33. 35: fam. Umbellariear. Gen.: Aralia, Panax, Cussonia, Hedera, Sciadophyllum.
Araliastrum Vaillant 1719. Ephem. Nat. Cur. Cent. 7 et 8; App. p. 189; 1741. Phil. Trans. IV. P. 2. p. 319: nov. g. plant.
= Panax Linn.
Ararieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: ordo Spadicatar. Fam.: Zosteraceae, Arideae, Cyclanthae.
Araucaria Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 11: Abietinear.
Arauja Brot. 1817. *Cf.* Isis 1829. p. 149 *(Araujia)*.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 909: Asclepiadear.
Arbutus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 28: Ericacear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1387: Ericear.
Archangelica Hoffm. 1814.
Dum. 1827. Belg. p. 82; 1829. An. p. 35: Angelicear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 963.

Arctium Lam. 1778.
Dum. 1829. An. p. 32: Carduinear.
Synon. (add.) Bernardia Wittst.

Arctopus Linn. 1737.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 586; II. p. 985: Smyrnear.

Arctostaphylos Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 28: Ericacear. — Par. Koch 1837 . . .
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1370. 1388: Ericear.

Arctotheca Wendl. 1798.
Dum. 1829. An. p. 32: Arctotidear.

Arctotideae Cassini 1812.
Dum. 1829. An. p. 32: subtrib. Calendulacear. Gen.: Arctotis, Arctotheca, Cryptostemma, Gazania, Berkheya, Cullumia, Didelta, Gorteria.

Arctotis Gärtn. 1791.
Dum. 1829. An. p. 32: Arctotidear.

Arcynospermum*) Turczan. 1858. Bull. soc. Mosc. XXXI. 1. p. 191: nov. g. Malvacear., Kosteletzkyae aff. (A. nodiflorum.)

Arcyria Hill 1751.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.

Ardisia Swartz 1788.
Dum. 1829. An. p. 27: Ardisiacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 615: Myrsinear.

Ardisiaceae Juss. 1810.
Dum. 1829. An. p. 21. 27: fam. Primularlear. Gen.: Maesa, Jacquinia, Ardisia, Embelia, Myrsine, Trientalis.

Arduina Mill. 1759.
Dum. 1829. An. p. 26: Carissear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 561. 623: Contortar.

Areae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 66: trib. Aridear. Gen.: Arum, Calla, Richardia, Caladium, Ambrosinia, Cryptocoryne, Symplocarpus.

Areca Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 56: Arecinear. — Par. Brongn. 1842 . . .
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1047. 1203: Palmar.

Arecineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: trib. Palmar. Gen. fere Arecinar. Mart.
Brongn. 1842 . . . .

Aremonia Neck. 1790.
Dum. 1829. An. p. 39: Agrimoniacear.

Arenaria Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsinear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1383. 1556: Caryophyllear.

Arenga Labill.
Dum. 1829. An. p. 56: Cocoinear.

Arethusa Gron. 1743.
Dum. 1829. An. p. 56: Arethusear.

Arethuseae Lindl. 1826.
Dum. 1829. An. p. 56: trib. Orchidear. Gen. ut Lindl. et Bletia, Epistephium, Pterostylis, Glossodia, Cephalanthera.
Dum. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 6: subtrib. Limodorear.

*) ἄρκυς, rete, cassis.

Aretia Hall. 1742.
Dum. 1829. An. p. 27: Primulear.

Argania Röm. & Schult. 1819.
Dum. 1829. An. p. 27: Sapotacear. — Par. G. Don 1837 . . .

Argemone Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 52: Papaverear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 207. 222: Papaveracear.

Argophyllum Forst. 1776.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 576. 857: Pentandr. Monogyn.

Argostemma Wall. 1824.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 740: Pentandr. Monogyn.

Argylia Don 1823.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 567: Bignoniear.

Argyranthes Wittst. Etym. Handw. p. 69: vid. *Argyranthus Neck.*

Argyreia Lour. 1790.
Dum. 1829. An. p. 25: Convolvulinear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 626: Convolvulacear.
Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. 2. p. 12. t. 1357. 1358: Argyreiear.

Argyrocome Cass. 1822.
Dum. 1829. An. p. 31: Gnaphaliear.

Argyrophytum Wittst. Etym. Handw. p. 69: vid. *Argyrophyton Hook.*

Argyrothamnia Wittst. Etym. Handw. p. 69.
= Argythamnia P. Browne.

Arideae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 162: fam. Glumaciae. Trib.: Orontiaceae, Arisareae.
Dum. 1829. Anal. fam. p. 65. 66: fam. Arariear. Trib.: Areae, Orontieae.

Aridifoliae Agardh 1825. Class. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: class. Phanerocotyledonear. completar. perigynar. Ordines: Epacrideae, Ericeae, Tremandreae, Pittosporeae, Myrsineae, Sapoteae, Ebenaceae, Olacinae, Ternströmiaceae, Aurantiaceae.

Aristea Soland. 1789.
Dum. 1829. An. p. 58: Ixiear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 126. 161: Iridear.

Aristida Linn. 1753.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 675): Agrostideor. Sect.: Aristida, Chaetaria.
Dum. 1829. An. p. 64: Stipacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 134. 304.

Aristolarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: ordo Gynosepalar. Fam.: Asarineae, Aristolochieae.

Aristolochia Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 32.
Dum. 1827. Belg. p. 16; 1829. An. p. 14: Aristolochiear.

Aristolochieae Juss. 1759.
Dum. 1829. An. p. 13. 14: fam. Aristolariear. (restricta.) Gen.: Aristolochia, Hocquartia, Bragantia, Munnickia.

Aristotelia L'Herit. 1784.
Dum. 1829. An. p. 41: Aristoteliacear. — Par. Link 1831 . . .
Dietr. 1843. Syn. III. p. 2. 21 (*Aristotelea*): Dodecandr. Monogyn.

Aristoteliaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. 41: fam. Rhamnariear. Gen.: Aristotelia.
Link 1831 . . . .
Armeniaca Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Amygdalear.
Armeria DC. 1805.
Dum. 1829. An. p. 27: Armeriacear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 589; II. p. 1023: Plumbaginear.

Armeriaceae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 27: trib. Plumbaginear. Gen.: Statice, Armeria, Aegialitis.
Armoracia Riv., Rupp. 1718.
Dum. 1827. Belg. p. 120: sect. Cochleariae. — Par. Dietr. 1843. Syn. III. p. 653.
Arnica Linn. 1753.
Dum. 1827. Belg. p. 66; 1829. An. p. 31: Senecionear. — Par. Less. 1831 . . . .
Arnoldia Blume 1826.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1313: Octandr. Digyn.
Arnoseris Gärtn. 1791.
Dum. 1827. Belg. p. 63; 1829. An. p. 30: Hieraciear.

Aroideae Juss. 1759.
Agdh. (1822. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: ordo Spadicinar.
Aromadendron Blume 1825.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 216. 311: Magnoliacear.
Aronia Pers. 1807.
Dum. 1827. Belg. p. 92; 1829. An. p. 39: Pyrear.
Arracacha Bancr. 1825.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 988: Smyrnear.
Arrhenatherum Palis. 1812.
Dum. 1827. Belg. p. 153; 1829. An. p. 63: Avenacear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 344.
Arrozia Schrad., Kunth 1833.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 131. 232: Oryzear.
Artabotrys R. Brown 1820.
Dum. 1829. An. p. 50: Anonacear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 299: Anonear.
Artedia Linn. 1737.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 585; II. p. 976: Daucinear.
Artemisia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 9 (bis *Artimesia).* t. 1111. 1112: Senecionidear.
Arthonia Achar. 1806.
Dum. 1829. An. p. 71 *(Arthronia)*: Graphidear. — Par. Meyen & Flot. . . .
Arthromischius Turczan. 1858. Nov. gen. Zeyl. p. 47 (Müll. Ann. bot. VII. p. 535): nov. g. Aurantiacear. (A. armatus.)
Arthronia Dumort., Endl. vid. *Arthonia Achar.*
Arthropodium R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 60: Asphodelear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1150.
Arthropogon Nees 1829.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 141. 414: Triandr. Digyn.

Arthrostemma Pav., Don 1823.
Dum. 1829. An. p. 38: Osbeckiear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1228. 1273: Melastomacear.
Arthrostyleae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 72: series 4 Synantherear. Trib.: Carduaceae, Echinopsideae.
Dum. 1829. Anal. fam. p. 32: series Compositar. Trib.: Calendulaceae, Cynaraceae.
Arthrozamia Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 66: Cycadear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Artimesia Wight vid. *Artemisia Linn.*
Artocarpeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: trib. Artocarpidear. Gen.: Artocarpus, Peribea, Pourouma.
Artocarpideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 17: fam. Urticariear. Trib.: Artocarpeae, Cecropieae.
Artocarpus Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 17: Artocarpear.
Arum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 66: Arear.
Arundenia Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 8: err. pro *Arundina Bl.*
Arundinaceae Kunth 1815.
Dum. 1829. An. p. 63: trib. Scobiflorar. Gen. ut Kunth 1815.
Arundinaria Rich. 1803.
Dum. 1829. An. p. 63: Bambusacear.
Arundo Roth 1788.
Dum. 1827. Belg. p. 153; 1829. An. p. 63: Arundinacear. (A. Phragmites.) — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 135. 325.
Asarinae Agardh 1825. Class. pl. p. 11; 1826. Isis p. 586: ordo Columniferar.
Asarineae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 13. 14: fam. Aristolariear. Gen. ead.
Asarum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 14: Asarinear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 3. 26: Aristolochiear.
Asclepiadeae Jacq. 1778.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: div. Apocynear.
Dum. 1827. Belg. p. 52: trib. Apocynear. Gen.: Cynanchum, Asclepias.
Dum. 1829. An. p. 21. 26: fam. Asclepiariear. Trib.: Stapelieae, Cynancheae, Periploceae.
Asclepiarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20: ordo Torocoronar. Fam.: Menyanthideae, Gentianaceae; Loganiaceae, Asclepiadeae, Apocyneae.
Asclepias Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 52: Asclepiadear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 898.
Dum. 1829. An. p. 26: Cynanchear.
Ascobolus Pers., Gmel. 1791.
Dum. 1829. An. p. 73: Pezizear.
Ascophora Tode 1790.
Dum. 1829. An. p. 75: Mucorinear.
Ascyrum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 47: Hypericear.
Asimina Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 50: Anonacear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 215. 304: Anonear.

Aspalathus Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 40: Genistear.

Asparageae DC. 1805.
Agdh. (1823. Aph.) 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: ordo Liliiflorar.

Asparageae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 138; 1829. Anal. fam. p. 60: trib. Asparaginear. Gen.: Mayanthemum, Ruscus, Asparagus, 1829 Asparagus, Lomathophyllum.

Asparagineae Juss. 1804.
Dum. 1827. Belg. p. 138: fam. Liliiloriae. Trib.: Asparageae, Convallarieae.
Dum. 1829. An. p. 59. 60: fam. Liliariear. Trib.: Smilacineae, Maiauthemeae, Rusciueae, Asparageae, Draceneae, Convallarieae.

Asparagus Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 36. t. 13. f. 2.
Dum. 1827. Belg. p. 138; 1829. An. p. 60: Asparagear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1042. 1117: Sarmentacear.

Aspergillus Mich. 1729.
Dum. 1829. An. p. 75: Gonocladear.

Asperococcus Lamx. 1813.
Dum. 1829. An. p. 76: Dictyotacear. — Par. Harv. 1852 . . .

Asperugo Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 39; 1829. An. p. 24: Cynoglossear. — Par. G. Don 1837 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 560. 607: Asperifoliar.

Asperula Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 33: Galiear. — Par. Kunth 1838 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 420. 472: Rubiacear.

Asphodeleae Juss. 1804.
Agdh. (1823. Aph.) 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584; ordo Liliiflorar.
Dum. 1829. An. p. 60: trib. Liliacear. Gen.: Asphodelus, Eremurus, Czackia, Phalangium, Anthericum, Arthropodium, Scilla, Endymion, Cyanella, Eucomis, Albuca, Ornithogalum, Raphelingia, Gagea, Drimia, Stypandra, Tricoryne, Eriospermum, Thysanotus.

Asphodelus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 60: Asphodelear. — Par. Dietr. 1840. Syn. II. p. 1043. 1145.

Aspidistra Ker 1823.
Blume (1834 in Hoev. & Vriese Tijdschr. I. p. 67) t. 3. 4: g. Asparaginear. *Cf.* Isis 1840. p. 342.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1230. 1311: Aroidear.

Aspidium Swartz 1800.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 28: Polypodiacear.
Dum. 1829. An. p. 67: Aspleniear.

Aspidosperma Mart. & Zucc. 1824.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 565. 657: Contortar.

Asplenieae Gaudich. 1826.
Dum. 1829. An. p. 67: subtrib. Polypodiear. Gen.: Aspidium, Mephrodium, Cystopteris, Allantodia, Athyrium, Caenopteris, Asplenium, Diplazium, Scolopendrium, Monogramma, Blechnum, Woodwardia, Struthiopteris, Lomoria, Vittaria, Pteris, Cheilanthes, Lonchitis, Adianthum, Lindsaea, Davallia.
Asplenium Linn. 1737.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 40: Polypodiacear.
Dum. 1829. An. p. 67: Aspleniear.
Asprella Willd. 1809.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 140. 393: Hordeacear.
Assonia Cavan. 1786.
Dum. 1829. An. p. 46: Dombeyacear.
Astelarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: ordo Torochlamydar. Fam. unica: Asteliaceae.
Astelia Banks, R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 61: Asteliacear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1048. 1210: g. Asphodelis et Junceis aff.
Asteliaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59. 61: fam. Astelariear. Gen.: Astelia.
Astephaneae Rchb. 1827.
Dum. 1829. An. p. 26: subtrib. Cynanchear. Gen.: Astephanus, Metastelma, Microloma.
Astephanus R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: Astephanear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 580; II. p. 909: Asclepiadear.
Aster Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 67; 1829. An. p. 31: Asterear. (Archetypar.)
Asteracantha Nees 1832.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 591: Echmatacanthor.
Asteranthos Desfont. 1820.
Dum. 1829. An. p. 29: Napoleonacear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 207. 219 (*Asteranthus*): Ebenacear.
Astereae Cassini 1815.
Dum. 1829. An. p. 31: subtrib. Jacobaccar. Gen.: Bellis, Bellium, Bellidaster, Boltonia, Amellus, Agathaea, Aster, Phalacroloma, Erigeron, Trimorphaea, Baccharis, Chrysocoma, Solidago, Grindelia.
Asteriscium Cham. & Schl. 1826.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 934: Mulinear.
Asterocarpus Eckl. & Zeyh. 1835.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 573. 817: Celastrinear.
Asterocephalus Vaill. 1722.
Dum. 1827. Belg. p. 75; 1829. An. p. 32 (*Astrocephalus*): Dipsacear. genuin.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 448: subsect. Scabiosae verae.
Asterolinum Rchb. 1827.
Dum. 1827. Belg. p. 29; 1829. An. p. 27: Anagallidear.
Astianthus Don 1823.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 365. 566: Bignoniear.

Astilbe Hamilt., Don 1825.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1231. 1313: Octandr. Digyn.
Astoma DC. 1829.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 587; II. p. 990: Coriandrinear.
Astomati Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: series Muscor. Trib.: Phasceae.
Astomospherae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 75: trib. Sphaeriacear. Gen.: Cladosphaera, Cyathosphaera, Phyllosphaera, Molgosphaera.
Astragaleae Spreng. 1818.
Dum. 1829. An. p. 40: subtrib. Lotear. Gen. ut DC.
Astragalus Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 37. t. 14.
= Indigofera Linn.
Astragalus DC. 1802.
Dum. 1827. Belg. p. 102; 1829. An. p. 40: Astragalear.
Astranthus Lour. 1790.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1385. 1627: Decandr. Decagyn.
Astrantia Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 34: Astrantiear. — Par. (Gren. &) Godr. 1848 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 583; II. p. 935: Saniculear.
Astrantieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: trib. Physospermar. Gen.: Astrantia. (Gren. &) Godr. 1848 . . . .
Astrapaea Lindl. 1822.
Dum. 1829. An. p. 46: Dombeyacear.
Astrephia Dufr. 1811.
Dum. 1829. An. p. 32: Fediear.
Astrocarpus Neck. 1790.
Dum. 1829. An. p. 49 *(Astrocarpa)*: Resedacear.
Astrocaryum Meyer 1818.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1038. 1049 *(Astrocaryon)*: Hexandr. Monogyn.
Astrocephalus Dumort. vid. *Asterocephalus Vaill.*
Astrolobium Desv., Poir. 1816.
Dum. 1829. An. p. 40: Coronillear.
Astroloma R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 28: Stenantherear.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 562. 633: Pentandr. Monogyn.
Astronia Blume 1826.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1377. 1470: Charianthear.
Astronium Jacq. 1763.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 588; II. p. 1007: Terebinthacear.
Astrotricha DC. 1829.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 582; II. p. 932: Hydrocotylear.
Astylis Wight 1853 Ic. pl. Ind. VI. p. 12. t. 1992: nov. g. Antidesmear.
Asystasia Blume 1826.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 369. 591: Echmatacanthor.
Atalantia Correa 1805.
Dum. 1829. An. p. 48: Aurantiacear.
Ataxia R. Brown 1824.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 132. 239: Phalaroidear.
Atelandra Lindl. 1839.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 354. 428: Prostantherear.
Athamanta Koch 1824.
Dum. 1829. An. p. 34: Seselinear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 584; II. p. 958 *(Athamantha)*.
Athanasia Cassini 1821.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Athenantia Dumort. vid. *Anthenantia Palis.*
Atheropogon Mühlenb., Willd. 1805.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 678): sect. Entrianae.
Dum. 1829. An. p. 64: Cynodonear.
Atherosperma Labill. 1806.
Dum. 1829. An. p. 16: Atherospermear.
Atherospermeae R. Brown 1814.
Dum. 1829. An. p. 14. 16: fam. Monimiariear. Gen.: Atherosperma, Citrosma, Laurelia.
Athyrium Roth 1800.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 39: Polypodiacear.
Dum. 1829. An. p. 67: Asplenicar.
Atractobolus Tode 1790.
Dum. (1822. Comm.) 1829. An. p. 74: Carpobolear.
Atractus Kirby 1825. Linn. Trans. Dec. (Isis 1830. p. 334): nov. g. Fungor. inter Clathrum et Phallum.
Atractylis Willd. 1803.
Dum. 1829. An. p. 32: Carlinear.
Atragene Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 50: Clematidear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 217. 349: Ranunculacear.
Atraphaxis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 18: Rumicear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1046. 1200: Polygonear.
Atriplex Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 17: Atriplicear.
Atripliceae Neck. 1770.
Dum. 1829. An. p. 17: trib. Chenopodiacear. Gen.: Atriplex, Obione, Halimus, Spinacia, Ceratospermum, Axyris.
Atropa Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Solanear. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 567. 693.
Aubrietia Adans. 1763.
Dum. 1829. An. p. 51: Lunariear.
Aucuba Thunb. 1783.
Dum. 1829. An. p. 34: Cornear. — Par. DC. 1830 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 422. 505: Tetrandr. Monogyn.
Augea Thunb. 1794.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1382. 1520: Decandr. Monogyn.
Augustea DC. 1830.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 569. 726: Rubiacear.
Aulax Berg. 1767.
Dum. 1829. An. p. 18: Protear. — Par. Brongn. 1843 . . .
Dietr. 1839. Syn. I. p. 423. 509: Tetrandr. Monogyn.

Aulaya Harv. 1838.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 4: Hyobancheear.
Aurantiaceae Mirb. 1813.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: ordo Aridifoliar.
Dum. 1829. An. p. 43. 48: fam. Citrariear. Gen.: Citrus, Atalantia, Triphasia, Limonia, Cookia, Murraya, Aglaia, Bergera, Clausenia, Glycosmis, Feronia.
Avena Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 154; 1829. An. p. 63: Avenacear. Sect. (1827): Avenotypus, Avenastrum, Avronastrum, Avronia. — Par. Dietr. 1839. Syn. I. p. 137. 341.
Avenaceae Kunth 1815.
Dum. 1829. An. p. 63: trib. Scobiflorar. Gen.: Deschampsia, Toresia, Aira, Corynephorus, Trisetum, Avena, Arrhenatherum, Holcus, Hierochloë, Danthonia, Pommereulla, Gaudinia.
Averrhoa Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 45: Oxalidear.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1384. 1616: Droserear.
Avicennia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22 (*Avicenia*): Myoporinear.
Dietr. 1843. Syn. III. p. 372. 619: Lantanear.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 16. t. 1481. 1482: Avicenniear.
Axanthes Blume 1826.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 571. 797: Rubiacear.
Axia Lour. 1790.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 127. 170: Triandr. Monogyn.
Axinaea Ruiz & Pav. 1794.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1374. 1427 (*Axinea*): Melastomacear.
Axonopus Röm. & Schult. 1817.
Dum. 1829. An. p. 64 (*Axopus*): Miliacear.
Axopus Dumort. vid. *Axonopus Röm. & Sch.*
Axylae (s. *Ananthae*) Dumort. 1829. Anal. fam. 9. 71: div. III. plant. Subdivis.: Dermosporae, Gliosporae.
Axyris Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 17: Atripliccar.
Aydendron Nees & Mart. 1833.
Dietr. 1840. Syn. II. p. 1332. 1334: Acrodiclidior.
Ayenia Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 46: Buttneriear. — Par. Brongn. 1843 . . .
Aylmeria Mart. 1826.
Dietr. 1839. Syn. I. p. 577. 871: Pentandr. Monogyn.
Azalea Desv. 1813.
Dum. 1829. An. p. 27: Rhodoracear.
Azedarach Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 40. t. 15.
Azeroë Wittst. 1856. Etym. Handw. p. 88; Fungor. (An *Aseroë Labill.*, jam suo loco explicata?)
Azolla Lam. 1783.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 81: Marsileacear.

Azorella Lam. 1783.
Dum. 1829. An. p. 34: Bolacinear.
Babiana Bell. Gawl. 1805.
Dum. 1829. An. p. 58: Ixiear. — Par. Spach 1846 . . . .
Baccharis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Asterear.
Synon. (add.) Pterocladis Lamb.? (Steud.)
Baconia DC. 1807.
Dum. 1829. An. p. 33: Pavettear.
Bacopa Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 33: Samolinear.
Bactris Jacq. 1763.
Dum. 1829. An. p. 56: Cocoinear. — Par. Brongn. 1843 . . .
Badiera DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 23: Polygalacear. — Par. Lindl. . . .
Badula Juss. 1789.
Synon. (add.) Tinus Burm.?
Baeckea Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 38: Eucalyptear.
Baeomyceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: fam. Lichenariear. Gen.: Baeomyces, Calycium.
Körb. 1846 . . .
Baeomyces Ehrh. 1780.
Dum. 1829. An. p. 71: Baeomycear. — Par. Körb. 1846 . . .
Balaniteae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: trib. Zygophyllear. Gen.: Balanites.
Endl. 1841 . . . .
Balanites Delile 1813.
Dum. 1829. An. p. 45: Balanitear. — Par. Endl. 1841 . . .
Wight 1840. Ic. pl. Ind. I. 14. t. 274: Olacinear. (Char.)
Balanophora Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 66: Balanophorear.
Synon. Sarcocordylis Wall.
Balanophoraricae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: ordo Spadicatar. Fam. unica: Balanophoreae.
Balanophoreae Rich. 1822.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: div. Urticear.
Dum. 1829. An. p. 65. 66: fam. Balanophorariear. Gen. ut Rich.
Balbisia Willd. 1803.
Dum. 1829. An. p. 31: Heleniear.
Baldingera GMS. 1799.
Dum. 1829. An. p. 64: Phalaridear. genuinar.
Ballota Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 46; 1829. An. p. 22: Marrubiear. — Par. Rchb. 1837 . . . .
Balsamea Gled. 1801.
Dum. 1829. An. p. 41: Burseracear.
Balsameaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 41: fam. Terebinthariear. Trib.: Burseraceae, Spondiaceae.
Balsamina Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 41. t. 16.
Balsamina Riv., Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 46: Balsaminear.
Balsaminaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43 (*Balsamineae*). 46: fam. Geranariear. Trib.: Balsamineae, Hydrocereae.

Balsamineae Gray 1821.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 587: ordo Brevistylar.
Dum. 1829. An. p. 46: trib. Balsaminacear. Gen.: Impatiens, Balsamina.
Balsamita Vaill. 1719.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Baltimora Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 31: Rudbeckiear.
Bambusa Schreb. 1789.
Dum. 1829. An. p. 63: Bambusacear.
Bambusaceae Kunth 1815.
Dum. 1829. An. p. 63: trib. Scobiflorar. Gen.: Bambusa, Nastus, Diarrhena, Arundinaria.
Bandura Amm. 1682.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 42. t. 17.
Bangia Lyngb. 1819.
Dum. 1829. An. p. 77: Ulvacear. — Par. Spreng. 1831 . . .
Banisteria Linn. 1740.
Dum. 1829. An. p. 48: Banisteriar. — Par. A. Rich. 1842 . . .
Banisteriae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 48: trib. Malpighiacear. Gen.: Heteropteris, Banisteria, Tetrapteris, Triopteris, Hiraea.
A. Rich. 1842 . . .
Banksia Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 18: Banksiear.
Banksieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: trib. Proteacear. Gen.: Persoonia, Hakea, Bellendena, Grevillea, Anadenia, Lambertia, Xylomelum, Orites, Telopea, Lomatia, Stenocarpus, Banksia, Driandra.
Baphia Afzel. 1825.
Dum. 1829. An. p. 40: Swartziear.
Baptisia Vent. 1808.
Dum. 1829. An. p. 40: Sophorear.
Barbacenia Vand. 1788.
Dum. 1829. An. p. 58: Haemodoracear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Barbaraea Beckm. 1801.
Dum. 1829. An. p. 51: Erysimear.
Bardanesia Dumort. vid. *Barnadesia Linn. f.*
Barkhausia Mönch 1794.
Dum. 1827. Belg. p. 60; 1829. An. p. 30: Crepidear. (foetida, etc.)
Barleria Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 23: Ruelliear.
Barnadesia Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 31 *(Bardanesia)*: Mutisiear. — Par. Less. 1830 . . . .
Barosma Willd. 1800.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.
Barringtonia Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 38: Barringtoniear.
Barringtonieae DC. 1826.
Dum. 1829. An. p. 38: trib. Myrtinear. Gen.: Barringtonia, Gustavia.
Bartholina R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 56 *(Bartholinia)*: Ophrydear.
Bartholinia Dumort. vid. *Bartholina R. Brown.*
Bartonia Sims 1804.
Dum. 1829. An. p. 42; Loasacear. — Par. Lindl. 1836 . . .
Bartramia Hedw. 1792.
Schrank 1812. Ann. Wett. Ges. III. 1. p. 74: sect. Bryi.
Dum. 1829. An. p. 69: Bryear.
Bartsia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 23: Melampyracear.
Basella Rheede 1688.
Dum. 1829. An. p. 17: Salsolear.
Bassia Kön., Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 27: Sapotacear. — Par. G. Don 1837 . . .
Batis P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 12: Ephedracear.
Batrachium DC. 1818.
Dum. 1827. Belg. p. 127; 1829. An. p. 50: Ranunculear.
Batrachospermeae Agardh 1824.
Dum. 1829. An. p. 77. 78: fam. Nostochariear. Gen.: Batrachospermum, Draparnaldia, Thorea.
Batrachospermum Roth 1800.
Dum. 1829. An. p. 78: Batrachospermear.
Batschia Gmel. 1791.
Dum. 1829. An. p. 24: Pulmonariar. (p. 77 emend. *Nonea.)*
Batschia Mönch 1794.
Dum. 1829. An. p. 31: Eupatoriear.
Battarea Palis. 1804.
Dum. 1829. An. p. 74: Clathridear.
Bauera Kenn. 1793.
Dum. 1829. An. p. 37: Cunoniacear.
Bauhinia Linn. 1737.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 44. t. 18*.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Baumgartenia Spreng. 1817.
Dum. 1829. An. p. 62: Xanthorhaeacear.
Beatsonia Roxb. 1816.
Dum. 1829. An. p. 49: Frankeniacear.
Beaufortia R. Brown 1812.
Dum. 1829. An. p. 38: Melaleucear.
Beaumontia Wall. 1824.
Dum. 1829. An. p. 26: Echitear.
Begonarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: ordo Gynosepalar. Fam. unica: Begoniaceae.
Begonia Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 14: Begoniacear.
Begoniaceae R. Brown 1818.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: ordo Micranthar.
Dum. 1829. An. p. 13. 14: fam. Begonariear. Gen.: Begonia.
Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 8. Gen.: Begonia, Diploclinium.
Bellendena R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 18: Banksiear.
Bellidaster Dumort. vid. *Bellidastrum Mich.*
Bellidastrum Mich. 1729.
Dum. 1829. An. p. 31 *(Bellidaster)*: Asterear. Conf. *Bellidiaster Dum.*
Bellidiaster Dumort. 1827. Fl. belg. p. 66: g. Bellidear.
= Bellidastrum Mich.
Bellis Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 31: Asterear.
Bellium Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 31: Asterear.
Berberarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44: ordo Toropetalar. Fam. unica: Berberideae.

Berberideae Vent. 1799.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 13; 1826. Isis p. 587: ordo Brevistylar.
Dum. 1829. An. p. 44. 50: fam. Berberariear. Trib.: Mahonieae, Epimedieae.
Berberis Nutt. 1818.
Dum. 1829. An. p. 50: Mahoniear.
Berchemia Neck. 1790.
Dum. 1829. An. p. 41: Rhamnidear.
Bergera Kön., Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 48: Aurantiacear.
Synon. Nimbo Dennst.
Bergia Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 49: Elatinidear.
Berkheya Ehrh. 1788.
Dum. 1829. An. p. 32: Arctotidear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Bernardia Wittst. Etym. Handw. p. 102 (g. Compositar.) pro *Berardia Vill.*
Berrya DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 46: Tiliacear.
Berteroa DC. 1821.
Dum. 1827. Belg. p. 119; 1829. An. p. 51: Lunariear.
Berula Koch 1826.
Dum. 1829. An. p. 31: Pimpinellear.
Beta Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 17: Chenopodear.
Betonica Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 44; 1829. An. p. 22: Betonicear.
Betoniceae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 44; 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Stachydear. Gen.: Betonica, Stachys et 1829 Zietenia.
Betula Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 12: Betulacear.
Betulaceae Agdh. 1825.
Dum. 1829. An. p. 11. 12: fam. Populariear. Gen. ut 1826.
Betulinae Rich.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: div. Amentacear.
Bidens Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 71; 1829. An. p. 31: Coreopsidear.
Biforis Spreng. 1817.
Dum. 1829. An. p. 35: Coriandrear.
Bignonia Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 23: Bignoniacear.
Bignoniaceae Pers. 1807.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: div. Personatar.
Dum. 1829. An. p. 23: trib. Rhinanthidear. Gen.: Bignonia, Tecoma, Spadothea, Catalpa, Chilopsis, Millingtonia, Jacaranda, Amphilophium, Eccremocarpus, Fieldia.
Bilderdykia Dumort. 1827. Fl. belg. p. 18: nov. g. Persicariear. (Polygonum convolvulus, dumetorum.)
Dum. 1829. An. p. 18: Coccolobear.
Billardiera Smith 1793.
Dum. 1829. An. p. 48: Pittosporear.
Billbergia Thunb. 1823.
Dum. 1829. An. p. 55 *(Bilbergia)*: Bromeliear.
Biophytum DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 45: Oxalidear.
Biscutella Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 118; 1829. An. p. 51: Biscutellear. Sect. (1827): Jondraba, Biscutellotypus. — Par. Rchb. 1837 . . . .

Biscutelleae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: trib. Siliculosar. Gen.: Thlaspi, Capsella, Lepidium, Cardaria, Iberis, Teesdalia, Hutchinsia, Senebiera, Biscutella, Megacarpaea, Menonvillea, Bivonaea, Eunomia, Aethionema.
Biserrula Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Astragalear.
Bivonaea DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 51: Biscutellear.
Bixa Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 50: Bixacear.
Synon. Orleana Herm.
Bixaceae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 44. 50: fam. Cistariear. (restricta.) Gen.: Bixa, Laetia, Prockia, Ludia.
Bixinae HBK. 1821.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Valvisporar.
Blakea P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 39: Miconiear.
Blakwellia Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 18: Homalinear.
Blandfordia Smith 1804.
Dum. 1829. An. p. 58: Hemerocallidear.
Blandovia Leman. 1816.
Dum. 1829. An. p. 69: Anthocerear.
Blasia Mich. 1729.
Dum. 1829. An. p. 69; (1831 Syll.); 1835. Obs. Jung. p. 24: Blasiear.
Blasiaceae Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 24: series Jungermanniacear. Trib.: Blasieae, Dilaeneae, Pellieae.
Blasieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: trib. Jungermanniacear. Gen.: Dilaena, Echinogyna, Aneura, Scopulina, Blasia.
Dum. (1831. Syll.) 1835. Obs. Jung. p. 24: trib. Blasiacear. Gen.: Blasia.
Blechnum Willd. 1809.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 49: Polypodiacear.
Dum. 1829. An. p. 67: Aspleniear.
Blechum P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 23: Ruellicar.
Blepharis Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 23: Acanthear.
Blepharostoma Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 18: Cephaloziear.
Blepharozia Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 16: Aploziear.
Bletia Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 56: Arethusear.
Blighia Kön. 1806.
Dum. 1829. An. p. 48 *(Bligia)*: Sapindear.
Bligia Dumort. vid. *Blighia Kön.*
Blitum Linn. 1737.
? Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 47. t. 18. (= Achyranthes?)
Dum. 1829. An. p. 17: Chenopodear.
Blumenbachia Schrad. 1825.
Dum. 1829. An. p. 42: Loasacear.
Blyxa Nor., Pet.-Th. 1809.
Dum. 1829. An. p. 55: Vallisneriacear.
Bobartia Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 58: Moracear.
Bocconia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 52; Chelidoniear.

Böhmeria Jacq. 1763.
Dum. 1829. An. p. 17 *(Bohmeria)*: Urticear.
Boerhaavia Vaill. 1718.
Dum. 1829. An. p. 21 *(Boerhavia)*: Nyctaginear.
Bohmeria Dumort. vid. *Böhmeria Jacq.*

Bolacineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: trib. Pleurospermar. Gen.: Bolax, Azorella, Fragrosa, Spananthe.
Bolax Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 34: Bolacinear.
Boldoa Cavan. 1803.
Dum. 1829. An. p. 21: Nyctaginear.

Boleteae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: trib. Agaricinear. Gen.: Polyporus, Boletus, Cladoporus, Fistulina.
Boletus Fries 1821.
Dum. 1829. An. p. 73: Boletear.
Boltonia L'Herit. 1788.
Dum. 1829. An. p. 31: Asterear.

Bombaceae Kunth 1821.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Columniferar.
Dum. 1829. An. p. 43. 46: fam. Malvariear. Gen. fere ut DC.
Bombax Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 46: Bombacear.
Bonapartea Ruiz & Pav. 1802.
Dum. 1825. An. p. 55: Tillandsiear.
Bonatea Willd. 1805.
Dum. 1829. An. p. 56: Ophrydear.
Bonnaya Link & Otto 1820.
Dum. 1829. p. 24: Digitalidear.
Bontia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 22: Myoporinear. — Par. Endl. 1839 . . .
Boopis Juss. 1803.
Dum. 1829. An. p. 32: Calycerear.

Boraginarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20: ordo Torocoronar. Fam.: Nolanaceae, Dichondraceae, Boragineae; Hydrophyllideae, Cordiaceae.

Boragineae (Auct.) Agdh. 1825. Cl. pl. p. 15; 1826. Isis p. 588: ordo Tetraspermar. Divis.: Heliotropieae, Hydrophylleae, Sebestenae.
Dum. 1829. An. p. 20. 24: fam. Boraginariear. Trib.: Heliotropieae, Lithospermeae, Cerintheae, Echieae.
Borago Gled., etc.
Dum. 1827. Belg. p. 41; 1829. An. p. 24: Anchusear.

Borasseae Mart. 1824.
Dum. 1829. An. p. 55: trib. Palmar. Gen. ut Mart.
Borassus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 55: Borassear.
Borbonia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 40: Genistear.
Boronia Smith 1798.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.
Borrera Achar. 1810.
Dum. 1829. An. p. 71: Ramalinear.
Bosaea Dumort. vid. *Bosea Linn.*
Boscia Lam.
Dum. 1829. An. p. 51: Capparear.

Bosea Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 17 *(Bosaea)*: Riviniacear.
Bossiaea Vent. 1800.
Dum. 1829. An. p. 40: Genistear.
Botrychium Swartz 1800.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 76: Ophioglossear.
Dum. 1829. An. p. 67: Ophioglossinear.
Botryopteris Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 76. t. 12. f. 1: nov. g. Ophioglossear. (B. mexicana.) — Par. . . .
Botrytis Mich. 1729.
Dum. 1829. An. p. 75: Gonocladear.
Boucerosia Wight & Arn. 1834.
Wight 1841. Ic. pl. Ind. II. 2. p. 6. t. 495; 1848. ibid. IV. 2. p. 1. t. 1286. 1287; 1850. ibid. IV. 4. p. 14. t. 1599: Stapeliar.
Bouvardia Salisb. 1805.
Dum. 1829. An. p. 32: Cinchonear.
Bovista Dill. 1719.
Dum. 1829. An. p. 74: Lycoperdear.
Brabeium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 18: Protear.
Brachistelma Dumort. vid. *Brachystelma R. Br.*
Brachypodium Palis. 1812.
Dum. 1827. Belg. p. 160; 1829. An. p. 61: Loliacear. Sect. (1827): Distachys, Dryopyron.
Brachypterum Wight & Arn. 1834.
Wight 1840. Ic. pl. Ind. I. p. 14. t. 275: Dalbergiear. (Char.)
Brachysema R. Brown 1811.
Dum. 1829. An. p. 40: Sophorear.
Brachystelma R. Brown 1811.
Dum. 1829. An. p. 26 *(Brachistelma)*: Stapeliear. — Par. G. Don 1837 . . .
Bragantia Lour. 1790.
Dum. 1829. An. p. 14: Aristolochiear.
Brandonia Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 23: Pinguiculacear.
Brassavola R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 57: Epidendrear.
Brassia R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Brassica DC. 1821.
Dum. 1827. Belg. p. 122; 1829. An. p. 51: Brassicear. Sect. (1827): Brassicotypus, Erucastrum.

Brassiceae DC. 1821.
Dum. 1827. Belg. p. 122; 1829. An. p. 51: trib. Siliquosar. Gen.: Moricandia, Sinapis, Diplotaxis, Brassica et 1829 Eruca.
Braya Sternb. & Hoppe 1815.
Dum. 1829. An. p. 51: Cardaminear.

Brevistylae Agardh 1825. Class. pl. p. 12; 1826. Isis p. 587: class. Phanerocotyledonear. Ordines: Guttiferae, Berberideae, Podophylleae, Papaveraceae, Fumariaceae, Balsamineae, Polygaleae, Marcgraviaceae.
Briedelia Willd. 1805.
Dum. 1829. An. p. 45: Phyllanthear.
Briza Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 63; Poëar. — Par. Fries 1846 . . .

Bromaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: trib. Scobiflorar. Subtrib.: Bromeae, Pappophoreae.

Bromeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: subtrib. Bromacear. Gen.: Schedonorus, Festuca, Vulpia, Bromus, Michelaria, Calotheca, Köleria, Dactylis, Sesleria, Streptogyna.

Bromelia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 55: Bromeliear.

Bromeliaceae Juss. 1804.
Agdh. (1823. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: ordo Liliiflorar.
Dum. 1829. An. p. 54. 55: fam. Bromeliariar. Trib.: Bromelieae, Tillandsieae.

Bromeliariae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: ordo Calytepalar. Fam.: Bromeliaceae, Tripterelleae.

Bromelieae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 55: trib. Bromeliacear. Gen.: Bromelia, Ananas, Bilbergia, Aechmea.

Brombeadia Lindl. 1841.
Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 18 *(Broomheadia)*. t. 1740: Epidendrear. (Char.)

Bromus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 63: Bromear.

Bronnia HBK. 1823.
Dum. 1829. An. p. 27: Fouquieriacear.

Broomheadia Wight vid. *Bromheadia Lindl.*

Brossaea Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 28: Ericacear.

Brotera Pers. 1807.
Dum. 1829. An. p. 31: Milleriear.

Broughtonia R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 57: Epidendrear.
Synon. Cyanorchis Pet.-Th.

Broussonetia L'Herit., Vent. 1799.
Dum. 1829. An. p. 17: Moridear.

Browallia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 23: Veronicear.

Brownea Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 40: Geoffrear.

Bruchia Schwägr. 1824.
Dum. 1829. An. p. 69: Phascear. — Par. Mont. 1849 . . .

Brugmansia Pers. 1805.
Dum. 1829. An. p. 24: Daturear.

Brunellia Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 40: Connarinear.

Brunfelsia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Crescentiacear.

Brunia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 35: Bruniacear.

Bruniaceae R. Brown 1818.
Dum. 1829. An. p. 34. 35: fam. Bruniariear. Gen.: Brunia, Staavia.

Bruniarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: ordo Gynopetalar. Fam.: Hamamelideae, Bruniaceae.

Brunnichia Banks, Gärtn. 1788.
Dum. 1829. An. p. 18: Coccolobear.

Brunonia Smith 1810.
Dum. 1829. An. p. 21: Brunoniacear.

Brunoniaceae R. Brown 1816.
Dum. 1829. An. p. 19. 21: fam. Globulariear. Gen. id.

Brunonieae Agardh 1825. Class. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: div. Campanulacear.

Brunsvigia Herb. 1821.
Dum. 1829. An. p. 58 *(Brunswigia)*: Amaryllidear.

Brya P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 40: Dalbergiear.

Bryeae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: trib. Dichopogonor. Gen.: Timmia, Cinclidum, Bryum, Funaria, Bartramia, Conostomum.

Bryonea Wight vid. *Bryonia Tourn.*

Bryonia Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 48. t. 19.
Dum. 1829. An. p. 29: Cucurbitacear. — Par. Wight 1850. Ic. pl. Ind. IV. 4. p. 16 *(Bryonea)*. t. 1609.

Bryophyllum Salisb. 1805.
Dum. 1829. An. p. 38: Cotyledonear. — Par. Rchb. 1841 . . .

Bryopsis Lamx. 1809.
Dum. 1829. An. p. 77: Ulvacear.

Bryum Dill. 1709.
Dum. 1829. An. p. 69: Bryear. — Par. Hampe 1839 . . .

Bubon Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 34: Selinear.

Buchnera Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Erinear.

Buchnera Dum. An. p. 32 (in Gardeniaceis): sphalm. pro *Burchellia.*

Bucida Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 13: Myrobolanear.

Buda Adans. 1763.
Dum. 1827. Belg. p. 110; 1829. An. p. 49: Spergulear. (Arenaria rubra, marina, media.)

Buddleia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24 *(Buddleja)*: Erinear.

Büttneriaceae R. Brown 1814.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Columniferar. — Par. Bartl. 1830 . . .

Buffonia Sauv. 1751.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsinear.

Bulbochaete Agdh. 1817.
Dum. 1829. An. p. 76: Ceramidear.

Bulbocodium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 61: Colchicinear.

Bulgaria Fries 1823.
Dum. 1829. An. p. 73: Pezizear.

Buliarda Dumort. vid. *Bulliarda DC.*

Bullaria DC. 1805.
Dum. 1829. An. p. 75: Uredinear. — Par. Lév. 1842 . . .

Bulliarda DC. 1801.
Dum. 1829. An. p. 38 *(Buliarda)*: Sempervivear.

Bumelia Swartz 1788.
Dum. 1829. An. p. 27: Sapotacear. — Par. G. Don 1837 . . .

Bunchosia Juss. 1811.
Dum. 1829. An. p. 48: Malpigiear.

Buniadeae DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 51: trib. Siliquastrar. Gen.: Crambe, Bunias, Neslia, Calepina.

Bunias R. Brown 1812.
Dum. 1827. Belg. p. 121; 1829. An. p. 51: Buniadear.
Bunium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 34: Pimpinellear.
Buphthalmum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Inulear.
Bupleurum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 34 *(Buplevrum)*: Buplevrear.
Buplevreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 34: trib. Pleurospermar. Gen.: Diatropa, Buplevrum, Hermas.
Burchardia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 61: Veratrinear.
Burmannia Linn. 1737.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 59. t. 20. f. 1.
Dum. 1829. An. p. 55: Tripterellear.
Bursaria Cavan. 1797.
Dum. 1829. An. p. 48: Pittosporear.
Bursera Jacq., Linn. 1762.
Dum. 1829. An. p. 41: Burseracear.
Burseraceae Kunth 1824.
Dum. 1829. An. p. 41: trib. Balsamacear. Gen.: Balsamea, Icica, Bursera, Canarium.
Bursinopetalum Wight 1845. Ic. pl. Ind. III. 3. p. 4. t. 956: nov. g. Olacinear. (B. arboreum.)
Butomeae Salisb. 1812.
Agdh. (1822. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 584: trib. Alismacear. — Par. Dum. 1827. Belg. p. 136; 1829. An. p. 55. Gen.: Butomus et 1829 Limnocharis, Hydrocleis.
Butomus Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 136; 1829. An. p. 55: Butomear.
Buttneria Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 46: Buttneriear.
Buttnerieae St. Hil.
Dum. 1829. An. p. 46: trib. Hermanniacear. Gen.: Theobroma, Abroma, Guazuma, Commersonia, Rulingea, Buttneria, Ayenia, Kleinhovia.
Buxbaumia Hall. 1742.
Dum. 1829. An. p. 69: Buxbaumiear.
Buxbaumieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 69: trib. Dichopogonor. Gen.: Buxbaumia, Diphyscium.
Hampe 1837 . . .
Buxineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: trib. Euphorbiacear. Gen.: Buxus, Pachysandra, Securigena.
Buxus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 45: Buxinear.
Byblis Salisb. 1808.
Dum. 1829. An. p. 49: Droseracear.
Byrsonima Rich., Juss. 1811.
Dum. 1829. An. p. 48: Malpigiear.
Byssaceae Agardh (1821. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: ordo Fungor.
Byssarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 73: ordo Hyphosporar. Fam.: Moniliaceae, Byssineae.
Byssineae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 73: fam. Byssariear. Gen.: Byssus, Ozonium, Racodium, Rhizomorpha, Hypha, Protonema.
Byssocladium Link 1816.
Dum. 1829. An. p. 75: Gonocladear.
Byssus Mich. 1729.
Dum. (1822. Comm.) 1829. An. p. 75: Byssinear.
Bystropogon L'Herit. 1788.
Dum. 1829. An. p. 22: Catariear.
Cabomba Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 53: Hydropeltidear.
Cacalia Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 52. t. 21.
Vernoniae sect. Lepidaploa Cass.
Cacalia Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 31: Senecionear.
Cachrys Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 34: Seselinear. — Par. Tausch 1834 . . .
Cacosmia HBK. 1820.
Dum. 1829. An. p. 31: Liabear.
Cacoucia Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 39: Combretidear.
Cactarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37: ordo Calypetalar. Fam.: Loasaceae, Grossulariaceae, Cactideae.
Cactideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 37. 42: fam. Cactariear. Trib.: Rhipsalideae, Opuntiaceae.
Cadia Forsk. 1775.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Caenopteris Berg. 1782.
Dum. 1829. An. p. 67: Aspleniear.
Caesalpinia Gled. 1749.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Caesulea Wight vid. *Caesulia Roxb.*
Caesulia Roxb. 1795.
Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. p. 8 *(Caesulea)*. t. 1102: Asteroidear.
Cajanus DC. 1813.
Dum. 1829. An. p. 40: Phaseolear.
Cakile Tourn. 1703.
Dum. 1827. Belg. p. 121; 1829. An. p. 51: Raphanistrear.
Caladenia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 56: Arethusear.
Caladium Vent. 1800.
Dum. 1829. An. p. 66: Arear.
Calamagrostidea Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 670. 677): div. Graminear. Gen.: Echinopogon, Lachnagrostis, Calamagrostis, Lagurus.
Calamagrostis Adans. 1763.
Trin. 1824. Gram. unifl. (Isis 1825. p. 677): Calamagrostideor.
Dum. 1827. Belg. p. 153; 1829. An. p. 63: Agrostidear. Sect. (1827): Calamagris, Deyeuxia.
Calamintha Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 22: Melissear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Calamus Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 55: Lepidocaryear. — Par. A. Rich. 1849 . . .
Calanthe R. Brown 1821.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Calathea Meyer 1818.
Dum. 1829. An. p. 56: Cannacear.
Calceolaria Feuill. 1725.
Dum. 1829. An. p. 24: Scrophulariear.

Calcitrapa Vaill. 1718.
Dum. 1827. Belg. p. 73; 1829. An. p. 32: Centauriear. Sect. (1827): Hippophaestum, Calcitrapotypus.

Caldasia Willd. 1807.
Dum. 1829. An. p. 25: Polemonear.

Calectasia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 55: Dasypogonear.

Calendula Neck. 1790.
Dum. 1827. Belg. p. 72; 1829. An. p. 32: Calendulear.

Calendulaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: trib. Arthrostylear. Subtrib.: Calenduleae, Arctotideae.

Calenduleae Cass. 1821.
Dum. 1829. An. p. 32: subtrib. Calendulacear. Gen.: Calendula, Osteospermum, Othonna.

Calepina Adans. 1763.
Dum. 1827. Belg. p. 121; 1829. An. p. 51: Buniadear. — Par. Link 1831 . . .

Calicioideae Agardh (1821. Aphor.) 1825. Class. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: div. Crustacear.

Calla Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 66: Arear.

Callestephus Wight vid. *Callistephus Cass.*

Callicarpa Linn. 1741.
Dum. 1829. An. p. 22: Viticear.

Callicoma Andr. 1809.
Dum. 1829. An. p. 37: Cunoniacear.

Calliflorae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: series Graminear. Trib.: Agrostideae, Phalarideae, Oryzaceae; Stipaceae, Paniceae, Ophiureae, Cynodoneae, Andropogineae, Saccharineae, Maydeae, Spinificeae.

Calligonum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 18: Persicariear. — Par. Rchb. 1841 . . .

Callisia Löfl. 1758.
Dum. 1829. An. p. 55: Dichorisandrear.

Callistachys Vent. 1803.
Dum. 1829. An. p. 40: Sophorear.

Callistemon R. Brown 1814.
Dum. 1829. An. p. 38: Eucalyptear.

Callistephus Cass. 1825.
Wight 1846. Ic. pl. Ind. III. 4. p. 7 (*Callestephus*). t. 1089: Asteroidear.

Callisthene Mart. & Zucc. 1824.
Dum. 1829. An. p. 41: Vochysiear.

Callitricharieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 14: ordo Torosepalar. Fam. unica: Callitrichineae.

Callitriche Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 16: Callitrichinear.

Callitrichineae DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 14. 16: fam. Callitricharieear. Gen. id.

Callitris Vent. 1808.
Dum. 1829. An. p. 12: Cupressinear.

Callixene Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 54: Phylesiacear.

Calluna Salisb. 1802.
Dum. 1829. An. p. 28: Ericacear.

Calochilus R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 56: Neottiear.

Calochortus Pursh 1814.
Dum. 1829. An. p. 53 (*Calocorthus*): Calocorthinear.

Calocorthineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 53: fam. Paridariear. Gen.: Calocorthus.

Calocorthus Dumort. vid. *Calochortus Pursh.*

Calodendron Lam. 1792.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.

Calogyne R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 30: Goodeniear. — Par. G. Don 1831 . . .

Calophaca Fisch., DC. 1825.
Dum. 1829. An. p. 40: Galegear.

Calophylleae Choisy 1824.
Dum. 1829. An. p. 47: trib. Guttiferar. Gen.: Mammea, Xanthochysmus, Calophyllum, Pentadesma.

Calophyllum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 47: Calophyllear.

Calopogon R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 56: Arethusear.

Calopsis Palis., Juss. 1827.
Dum. 1829. An. p. 62: Restionear. — Par. Spach 1846 . . .

Calostemma R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 58: Pancratiear. — Par. Kunth 1850 . . .

Calothamnus Labill. 1806.
Dum. 1829. An. p. 38: Melaleucear.

Calotheca Desv. 1813.
Dum. 1829. An. p. 63: Bromear. — Par. Bartl. 1830 . . .

Calothrix Agardh 1824.
Dum. 1829. An. p. 76: Ceramidear.

Calotropis R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26: Cynanchear.

Caltha Rupp. 1718.
Dum. 1827. Belg. p. 129; 1829. An. p. 50: Helleborear.

Caltha Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 52. t. 22. f. 1. (*Eupatoriophalacron Vaill.*)
? = Eclipta Linn.

Calycantheae Lindl. 1819.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 20; 1826. Isis p. 592: ordo Icosandrar.

Calycanthemae Linn. 1764.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 19; 1826. Isis p. 591: class. Phanerocotyledonear. completar. perigynar. Ordines: Salicariae, Hamamelideae, Sanguisorbeae, Onagrariae, Combretaceae, Melastomeae, Escallonieae.

Calycanthideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 39: fam. Rosariear. Gen. Calycanthear. Lindl.

Calycanthus Lindl. 1819.
Dum. 1829. An. p. 39: Calycanthidear.

Calycera Cavan. 1797.
Dum. 1829. An. p. 32: Calycerear.

Calycereae R. Brown 1817.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: div. Cynarocephalar.
Dum. 1829. An. p. 29. 32: fam. Synantherear. Gen. ut R. Brown.

Calycium Pers. 1794.
Dum. 1829. An. p. 71: Baeomycear.

Calymperes Swartz, Schwägr. 1816.
Dum. 1829. An. p. 69: Orthotrichear.

Calypetalae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 35: class. Petalanthar. Ord.: Saxifragarieae, Myrtarieae; Onagrarieae; Rosarieae, Terebintharieae, Rhamnarieae, Vochysarieae, Portularieae; Turnerarieae, Passiflorarieae, Cactarieae.

Calypogea Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 21: g. Saccogynear. (C. ericetorum et flagellifera Raddi.)
= Gongylanthus Nees.

Calypso Salisb. 1806.
Dum. 1829. An. p. 57: Malaxidear.

Calyptranthes Swartz 1788.
Dum. 1829. An. p. 38: Myrtear.

Calyptrion Ging. 1823.
Dum. 1829. An. p. 49: Violear.

Calystegia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 25: Convolvulinear.

Calytepalae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: class. Tepalanthar. Ord.: Hydrochariae, Alismariae, Bromeliariae, Commelinariae, Palmarieae.

Calythrix R. Brown 1819.
Dum. 1829. An. p. 38: Chamaelanciear.

Camarea St. Hil. 1823.
Dum. 1829. An. p. 48: Hyptagear.

Camaridium Lindl. 1824.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.

Camderia Dumort. 1829. Anal. fam. p. 80: Haemodoracear., antea (p. 58) Heriteria.
? = Heritiera Gmel.

Camelina Crantz 1769.
Dum. 1827. Belg. p. 120; 1829. An. p. 51: Lunariear. Sect. (1827): Camelinotypus, Pseudulinum.

Camellia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 47: Camelliear.

Camelliaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43. 47: fam. Hypericariear. Trib.: Ternstromieae, Camellieae.

Camellieae DC. 1813.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 18; 1826. Isis p. 591: div. Ternstromiacear.
Dum. 1829. An. p. 47: trib. Camelliacear. Gen. ead.

Cameraria Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 26: Vincear.

Campanarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: ordo Gynocoronar. Fam.: Stylidieae, Goodeniaceae, Campanulaceae, Lobeliaceae, Jasionideae.

Campanula Linn. 1837.
Dum. 1827. Belg. p. 58; 1829. An. p. 30: Campanulear. Sect. (1827): Rapnnculus, Campana, Cervicaria, Medium.

Campanulaceae Juss. 1789.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 390: ordo Subaggregatar. (Divis: Stylidieae, Lobeliaceae, Goodenovieae, Brunonieae.)
Dum. 1829. An. p. 28. 30: fam. Campanariear. Trib.: Campanuleae, Phyteumeae.

Campanuleae Spreng. 1818.
Dum. 1827. Belg. p. 58; 1829. An. p. 30: trib. Campanulacear. Gen.: Roucela, Campanula, Prismatocarpus et 1829 Canaria, Michauxia, Ligfootia, Adenophora, Wahlenbergia, Musschia, Roella.

Campbellia*) Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 4. 5. t. 1424. 1425: nov. g. Hyobancheear.

Campelia Rich. 1808.
Dum. 1829. An. p. 58: Commelinear.

Camphorosma Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 17: Salsolear.

Campyleia Spreng. 1827.
Dum. 1829. An. p. 23 (*Camphyleia*): Melampyracear.

Campynemaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 57. 58: fam. Iridariear. Gen.: Campynema.

Canarina Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 30: Campanulear.

Canarium Rumph. 1741.
Dum. 1829. An. p. 41: Burseracear.

Canavalia DC. 1825.
Dum. 1829. An. p. 40: Phaseolear.

Canella P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 47: Canellear. — Par. Rchb. 1841 . . .

Canelleae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: trib. Guttiferar. Gen.: Canella.
Rchb. 1841 . . .

Canna Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 56: Cannacear.

Cannabineae Gaudich. 1826.
Dum. 1829. An. p. 17: trib. Urticacear. Gen. unicum: Cannabis. — Par. Koch 1837 . . .

Cannabis Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 24; 1829. An. p. 17: Cannabinear.

Cannaceae Link 1821.
Dum. 1829. An. p. 56: fam. Cannariear. Gen.: Canna, Phrynium, Thalia, Marantha, Calathea.

Cannarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: ordo Gynotepalar. Fam.: Musaceae, Cannaceae, Curcumaceae.

Canthium Lam. 1783.
Dum. 1829. An. p. 33: Psychotriear. — Par. Bartl. 1830 . . .

Cantua Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 79: Polemonear.

Capnites DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 51: Corydalidear.

Cappareae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 51: trib. Capparidear. Gen. ex DC.

Capparideae Vent. 1799.
Dum. 1829. An. p. 44. 51: fam. Cruciferariear. Trib. ut DC.

Capparis Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 51: Capparear.

Capraria Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Digitalidear.

Caprifoliaceae Vent. 1799.
Dum. 1829. An. p. 29. 33: fam. Viburnariear. Trib.: caprifoliae, Linnaeaceae.

Caprifoliae Pers. 1805.
Dum. 1829. An. p. 33: trib. Caprifoliacear. Gen.: Lonicera, Xylosteon, Symphoria, Diervilla, Triosteum.

---

*) Dicat. Dr. Will. H. Campbell et ejus fratri capit. J. Campbell.

Cassythaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 16: trib. Laurinear. Gen.: Cryptocarya, Cassytha.
Gardn. 1840 . . . .
Castanea Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 12: Faginear.
Castilleja Mutis, Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 23: Melampyracear.
Casuarina Rumph. 1743.
Dum. 1829. p. 12: Casuarinear.
Casuarineae Mirb. 1810.
Dum. 1829. An. p. 11. 12: fam. Ephedrariear. Gen. id.
Catalpa Scop. 1777.
Dum. 1829. An. p. 23: Bignoniacear.
Catananche Vaill. 1721.
Dum. 1829. An. p. 30: Cichorear.
Catarieae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 47; 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Nepetear. Gen.: Satureia, Nepeta, Glecoma, Hyssopus et 1829 Pycnanthemum, Westeringia, Bystropogon, Elsholtzia, Zizyphora, Cunila, Hedeoma.
Catasetum Rich., Kunth 1822.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Catesbaea Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 32: Gardeniacear.
Catharinea Ehrh. 1780.
Dum. 1829. An. p. 68: Polytrichear.
Cattleya Lindl. 1824.
Dum. 1829. An. p. 57: Epidendrear.
Caucalideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 35: trib. Echinospermar. Gen.: Daucus, Orlaya, Caucalis, Torilis, Staphylium, Turgenia.
Caucalis Hoffm. 1814.
Dum. 1825. An. p. 35: Caucalidear.
Caudicia Hamilt. mss. ex Wight Ic. pl. Ind. IV. 2. p. 4.
= Heligme Blume.
Caulerpa Lamx. 1809.
Dum. 1829. An. p. 77: Ulvacear.
Caulinia Willd. 1798.
Dum. 1829. An. p. 66: Zosteracear. — Par. Rchb. 1841 . . .
Ceanothus Linn. 1741.
Dum. 1829. An. p. 41: Rhamnidear.
Cearia Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 58: Pancratiear.
Cecropia Löfl. 1758.
Dum. 1829. An. p. 17: Cecropiear.
Cecropieae Gaudich. 1826.
Dum. 1829. An. p. 17: trib. Artocarpidear. Gen. ut Gaudich.
Cedrela P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 48: Cedrelear.
Cedreleae R. Brown 1814.
Dum. 1829. An. p. 48: trib. Meliacear. Gen. ut DC.
Cedrus Loud.
Dum. 1829. An. p. 11: Abietinear.
Celastrineae DC. 1825.
Dum. 1829. An. p. 37. 41: fam. Rhamnariear. Trib.: Evonymeae, Staphyleaceae.
Celastrus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 41: Evonymear.
Celosia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 17: Amaranthear.
Celsia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Verbascinear.
Celtideae Gaudich. 1826.
Dum. 1829. An. p. 17: trib. Urticacear. Gen.: Celtis, Momisia.
Celtis Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 25; 1829. An. p. 17: Celtidear.
Cenangium Fries 1823.
Dum. 1829. An. p. 73: Pezizear.
Cenchreae Dumort. 1823. Agrost. Belg.; 1827. Fl. belg. p. 149; 1829. Anal. fam. p. 64: subtrib. Panicear. Gen.: Tragus et 1829 Cenchrus.
Cenchrus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 64: Cenchrear.
Cenia Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Cenomyceae „Fée" Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Cladonia, Scyphophorus.
Centaurea Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 72; 1829. An. p. 32: Centauriear. (restrict.) Sect. (1827): Cyanus, Jacea, Lepteranthus.
Centaurieae Cassini 1817.
Dum. 1829. An. p. 32: subtrib. Cynaracear. Gen.: Centaurea, Calcitrapa, Centrophyllum, Zoëgea, Cnicus, Crupina, Carthamus.
Centotheca Desv., Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 63: Poëar.
Centranthus DC. 1805.
Dum. 1827. Belg. p. 57; 1829. An. p. 32: Valerianear.
Centunculus Dill. 1717.
Dum. 1827. Belg. p. 29; 1829. An. p. 27: Anagallidear.
Cephaëlis Swartz 1788.
Dum. 1829. An. p. 33: Psychotriear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Cephalanthera Rich. 1818.
Dum. 1827. Belg. p. 134; 1829. An. p. 56: Arethusear.
Cephalanthus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 33: Spermacoccear.
Cephaloideae Agardh (1821. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 6; 1826. Isis p. 583: ordo Lichenum.
Cephalophora Cavan. 1801.
Dum. 1829. An. p. 31: Heleniear.
Cephalosporeae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 73. 75: fam. Mucedinariear. Gen.: Isaria, Cephalotrichum, Hypochnus, Epichrysium.
Cephaloteae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59. 61: fam. Veratrariear. Gen.: Cephalotus.
R. Brown 1832 . . . . .
Cephalotheceae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 68. 69: fam. Jungermannariear. Gen. ut 1822 et Dumortiera, Grimaldia.
Cephalotrichum Link 1809.
Dum. (1822. Comm.) 1829. An. p. 75: Cephalosporear.
Cephalotus Labill. 1806.
Dum. 1829. An. p. 61: Cephalotear. — Par. R. Brown 1832 . . .

Cephaloxis Desv. 1808.
Dum. 1829. An. p. 62: Juncear.
Cephalozia Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 18: Cephaloziear.
Cephalozieae Dumort. 1835. Obs. Jung. p. 17: subtrib. Jungermanniear. Gen.: Cephalozia, Anthelia, Blepharostoma.
Ceramideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: fam. Sphaerococcariear. Gen.: Ceramium, Cladostephus, Rytiphlaea, Sphacelaria, Ectocarpus, Pemphidia, Bulbochaete, Grammalia, Calothrix.
Ceramieae Bonnem. 1822.
Agdh. (1824. Syst.) 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 583: div. Confervoidear.
Trevis. 1848. Alghe coccot. p. 104: trib. unica Apolyothalamar.
Ceramium Agardh 1817.
Dum. 1829. An. p. 76: Ceramidear.
Ceranthera Palis. 1805.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsodinear.
Cerastium Seringe 1824.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsinear.
Cerasus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Amygdalear.
Ceratocarpus Buxb. 1726.
Dum. 1829. p. 17: Chenopodear.
Ceratocephalus Pers. 1805.
Dum. 1829. An. p. 50: Ranunculear.
Ceratogynum Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 26. t. 1900: nov. g. Phyllanthear. (C. rhamnoides.)
Ceratonia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Ceratopetalum Smith 1793.
Dum. 1829. An. p. 37: Cunoniacear.
Ceratophylleae DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 61: trib. Naiadear. Gen. id.
Ceratophyllum Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 165; 1829. An. p. 61: Ceratophyllear.
Ceratosanthes Schrad. 1838.
Dum. 1829. An. p. 29: Cucurbitacear.
Ceratospermum Pers. 1807.
Dum. 1829. An. p. 79: Atriplicear. (p. 17 err. *Diotis.*)
Cerbera Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 26: Carissear.
Cercis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Cercodia Murr. 1780.
Dum. 1829. An. p. 39: Haloragidear.
Ceresia Pers. 1805.
Dum. 1829. An. p. 64: Miliacear.
Cereus Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 42: Opuntiacear.
Cerinthe Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 25: Cerinthear. — Par. DC. 1840 . . .
Cerintheae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: trib. Boraginear. Gen.: Cerinthe. DC. 1840 . . .
Ceriops Arnott 1838.
Wight 1839. Ic. pl. Ind. I. 12. t. 240: Rhizophorear.
Ceropegia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 26: Stapeliear.

Cerorchideae Dumort. (1827. Fl. Belg. p. 133) 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 6; 1836. Flora . . . . .
Cervaria Riv., Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 35: Peucedanear. — Par. Rchb. 1832 . . .
Cestrineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 24: trib. Solanidear. Gen.: Lycium, Cestrum, Solandra.
Schltd. 1833 . . .
Cestrum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Cestrinear. — Par. Schltd. 1833 . . .
Ceterach Willd. 1809.
Dum. 1829. An. p. 67: Polypodear.
Cetraria Achar. 1803.
Dum. 1829. An. p. 71: Ramalinear. — Par. Rabenh. 1845 . . .
Chaenanthae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 31: trib. Trichostigmear. Subtrib.: Mutisieae, Nassauvieae.
Chaenanthera Dumort. vid. *Chaetanthera R. & P.*
Chaenanthophorae Lagasc. 1811.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 17; 1826. Isis p. 590: div. Corymbiferar.
Chaerophyllum Hoffm. 1814.
Dum. 1827. Belg. p. 80; 1829. An. p. 35: Scandicinear. Sect. (1827): Chaerophyllotypus, Chaerophyllopsis.
Chaetanthera Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 31 (*Chaenanthera*): Mutisiear.
Chaetanthus R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 62: Restionear.
Chaetogastra DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 38: Osbeckiear.
Chaetomium Kunze 1817.
Dum. 1829. An. p. 74: Sclerotidear.
Chaetophora Schrank 1798.
Dum. 1829. An. p. 78: Nostocinear.
Chailletia DC. 1811.
Dum. 1829. An. p. 41: Chailletiacear.
Chailletiaceae DC. 1825.
Dum. 1829. An. p. 36. 41: fam. Terebinthariear. Gen.: Chailletia, Leucosia, Tapura.
Chaiturus Ehrh., Mönch 1794.
Dum. 1829. An. p. 22: Marrubiear.
Chamabainia*) Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 11. t. 1981: nov. g. Urticacear. (Ch. cuspidata.)
Chamaedorea Willd. 1804.
Dum. 1829. An. p. 55: Sabalinear.
Chamaelaea Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 58. t. 24. 25.
= Chamaelea Tourn.? et Tragia Linn.
Chamaelancieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: trib. Myrtinear. Gen.: Calythrix, Chamaelancium.
Chamaelancium Dumort. vid. *Chamaelaucium Desf.*

*) Nomen ab habitu procumbente.

Chamaelaucium Desfont. 1819.
Dum. 1829. An. p. 38 (*Chamaelancium*): Chamaelaucicear.
Chamaelirium Willd. 1808.
Dum. 1829. An. p. 61: Veratrinear.
Chamaemelum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Chamaepitys Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 22: Ajugear.
Chamaerops Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 55: Coryphinear. — Par. Brongn. 1843 . . .
Chamorchis Rich. 1818.
Dum. 1827. Belg. p. 133; 1829. An. p. 56: Ophrydear.
Chaptalia Vent. 1800.
Dum. 1829. An. p. 31: Mutisiear.
Chara Agardh 1824.
Dum. 1829. An. p. 76: Characear.

Characeae Rich. 1815.
Agdh. (1824. Syst.) 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 582: div. . . . .
Dum. 1829. An. p. 26: fam. Characiear. Gen. ut Ag.

Chararieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: ordo Coccosporar. Fam. unica: Characeae.
Chardinia Desfont. 1817.
Dum. 1829. An. p. 32: Xeranthemear.

Chariantheae Seringe 1828.
Dum. 1829. An. p. 39: trib. Melastomacear. Gen.: Charianthus.
Charianthus Don 1823.
Dum. 1829. An. p. 39: Chariantheаr.
Cheilanthes Swartz 1806.
Presl 1825. Rel. Hänk. I. p. 64. t. 11: Polypodiacear.
Dum. 1829. An. p. 67: Asplenіear.
Cheiranthus R. Brown 1812.
Dum. 1827. Belg. p. 123; 1829. An. p. 51 (*Cheirianthus*): Erysimear.
Cheirianthus Dumort. vid. *Cheiranthus R. Br.*
Cheirina Dumort. vid. *Cheirinia Link.*
Cheirinia Link 1822.
Dum. 1827. Belg. p. 123; 1829. An. p. 51 (*Cheirina*): Erysimear.
Cheirostemon Humb. & Bonpl. 1808.
Dum. 1829. An. p. 46: Bombacear.

Chelidonieae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 130: trib. Papaveracear. Gen.: Chelidonium, Glaucium.
Dum. 1829. Anal. fam. p. 52: trib. Papaverinear. Gen. ead. et Römeria, Bocconia, Sanguinaria, Escholtzia.
Rchb. 1837 . . .
Chelidonium Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 130; 1829. An. p. 52: Chelidoniear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Chelona Dumort. vid. *Chenolea Thunb.*
Chelone Tourn. 1706.
Dum. 1829. An. fam. p. 24: Digitalidear.
Chenolea Thunb. 1781.
Dum. 1829. An. p. 17 (*Chelona*): Salsolear.

Chenopodarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 17: ordo Torosepalar. Fam.: Phytolacceae, Chenopodiaceae.

Chenopodeae Vent. 1799.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 586: ordo Oleracear.
Dum. 1829. An. p. 17: trib. Chenopodiacear. Gen.: Beta, Anredera, Enchylaena, Blitum, Anserina, Chenopodium, Petiveria, Ceratocarpus.

Chenopodiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 15. 17: fam. Chenopodariear. Trib.: Riviniaceae, Atripliceae, Chenopodeae, Salsoleae, Eriogoneae, Saliconiae.
Chenopodium Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 60. t. 26.
Dum. 1829. An. p. 17: Chenopodear.
Cherleria Hall. 1740.
Dum. 1829. An. p. 49: Alsinear.
Chilocarpus Blume 1823.
Dum. 1829. An. p. 26: Carissear.
Chilochloa Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 64: Alopecurear.
Chiloglottis R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 56: Arethusear.
Chilopsis Don 1823.
Dum. 1829. An. p. 23: Bignoniacear.
Chiloscyphus Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 19: Pleuroschismear.
Chimarrhis Jacq. 1763.
Dum. 1829. An. p. 33: Machaoniear.
Chimonanthus Lindl. 1819.
Dum. 1829. An. p. 39: Calycanthidear.
Chimophila Radius 1821.
Dum. 1829. An. p. 47: Pyrolear. (p. 80 Pyrolacear.)
Chiococca P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 33: Psychotriear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Chiodecton Achar. 1814.
Dum. 1829. An. p. 71: Verrucariear.
Chionanthus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 26: Lilacinear.
Chironia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 25: Gentianear.
Synon. (add.) Lysimachia Burm.
Chiropteris Rossm. 1837 in Oken Isis p. 442: g. Filicum foss. Cf. ibid. p. 494. — Haliserites Sternb.

Chlamydanthae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 57: subdiv. Exoxylar. Class.: Gynochlamydae, Torochlamydae.

Chlenaceae Petit-Th. 1809.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: ordo Columniferar.
Dum. 1829. An. p. 43. 47: fam. Hypericariear. Gen.: Sarcolaena, Leptolaena.

Chloanthes R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 22: Verbenear.
Chlora Ren. 1611.
Dum. 1829. An. p. 25: Gentianear.
Chloranthus Swartz 1787.
Dum. 1829. An. p. 66: Piperitear.
Chloridium Link 1809.
Dum. 1829. An. p. 75: Trichocladear.
Chloris Swartz 1788.
Dum. 1829. An. p. 64: Cynodonear.
Chloroxylon DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 48: Cedrelear.

Chomelia Jacq. 1763.
Dum. 1829. An. p. 32: Psathurear.
Chondrilla Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 30: Lactucear.

Chondrochideae Dumort. (1827. Fl. Belg. p. 133) 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 5 (1836. Flora I. p. 52): sect. Orchidear. Trib.: Limodoreae, Cypripedieae.
Chondrus Lamx. 1813.
Dum. 1829. An. p. 76: Sphaerococcear.
Chorisandra Wight 1853. Ic. pl. Ind. VI. p. 13. t. 1994: nov. g. Phyllanthear. (Ch. pinnata.)
Chorispora R. Brown, DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 51: Raphanistrear.
Chorizema Labill. 1798.
Dum. 1829. An. p. 40: Sophorear.
Christisonia Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 4. 6. t. 1426. 1427: nov. g. Hyobancheear.

Chrisytriceae Dumort. vid. *Chrysitriceae Lestib.*
Chrysanthemoides Tourn. 1705.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 61. t. 22. f. 2.
Chrysanthemum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Chrysiphiala Ker 1824.
Dum. 1829. An. p. 58: Pancratiear.

Chrysitriceae Lestib. 1819.
Dum. 1829. An. p. 64 (sph. *Chrisytriceae*): subtrib. Caricear. Gen.: Chrysitrix, Lepironia.
Chrysitrix Linn. 1771.
Dum. 1829. An. p. 64: Chrysitricear.

Chrysobalaneae R. Brown 1818.
Dum. 1829. An. p. 40: trib. Amygdalinear. Gen.: Chrysobalanus, Hirtellia, Grangeria.
Chrysobalanus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Chrysobalanear.
Chrysocoma Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Asterear.
Chrysophyllum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 27: Sapotacear.

Chrysoplenieae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 84: trib. Saxifraginear. Gen.: Chrysoplenium.
Dum. 1829. Anal. fam. p. 38: trib. Saxifragacear. Gen. id.
Rchb. 1837. . . . .
Chrysoplenium Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 38: Chrysosplenicar. — Par. Rchb. 1837 . . .
Chrysurus Pers. 1805.
Dum. 1829. An. p. 63: Cynosurear.
Chupalon Adans. 1763.
Endl. 1841. Ench. p. 371. n. 4333*b*: sect. Thibaudiae.
Cicca Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 45: Phyllanthear.
Cicendia Adans. 1763.
Dum. 1829. p. 25: Gentianear.
Cicer Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 40: Viciear.

Cichoreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: subtrib. Cichoriear. Gen.: Catananche, Cichorium.

Cichorieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 30: trib. Trichostylar. Subtrib.: Cichoreae, Scorzonereae, Hieracieae, Crepideae, Lapsaneae, Lactuceae, Scolymeae.
Cichorium Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 30: Cichorear.
Synon. Intybus s. Endivia C. Bauh.
Ciconium Sweet 1820.
Dum. 1829. An. p. 46: Pelargoniear.
Cicuta Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 34: Pimpinellear.
Cimicifuga Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 50: Paeoniacear. — Par. G. Don 1831 . . .
Cinara Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 32: Carduinear.
Cinchona Linn. 1742.
Dum. 1829. An. p. 32: Cinchonear.
Cinchoneae Batsch 1802.
Dum. 1829. An. p. 32: trib. Rubiacear. Gen.: Rondoletia, Pinckeneya, Mussaenda, Hillia, Outarda, Exostemma, Cinchona, Danais, Virecta, Sickingia, Portlandia, Oldenlandia, Hedyotis, Polypremum, Bouvardia, Nacibea.
Cincinnulus Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p 69: Jungermanniear.
Dum. (1831. Syll.) 1835. Obs. Jung. p. 21: Saccogynear.
Cinclidium Swartz 1801.
Dum. 1829. An. p. 69 (*Cinclidum*): Bryear. — Par. Mont. 1849 . . .
Cinclidotus Palis., Hook. & Tayl. 1818.
Dum. 1829. An. p. 69: Grimmiear.
Cinclidum Dumort. vid. *Cinclidium Swartz.*
Cineraria Linn. 1763.
Dum. 1827. Belg. p. 65; 1829. An. p. 79: Senecionear. Sect. (1827): Eriopappus, Cinerariotypus.
Cinna Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 63: Agrostidear.
Cinnamomum Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 62. t. 27. 28.
Dum. 1829. An. p. 16: Laurinear. genuinar.
Ciponima Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 27: Symplocear.
Circaea Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 88; 1829. An. p. 39: Circaecear.
Circaeeae DC. 1828.
Dum. 1827. Belg. p. 88; 1829. An. p. 39; trib. Onagridear. (1829 Onagracear.) Gen. ead.
Circinotrichum Nees 1817.
Dum. 1829. An. p. 75: Trichocladear.
Cirrhaea Lindl. 1825.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Cirsium Gärtn. 1791.
Dum. 1829. An. p. 32: Carduinear.
Cissampelos Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 50: Menispermear.
Cissus Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 48: Vitidear.
Cistanche Link & Hfmsg. 1806.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 3 (*Cystanche*). t. 1420: Orobancheear.
Cistarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44: ordo Toropetalar. Fam.: Droseraceae, Violaceae, Flacurtiaceae, Bixaceae, Cistineae.

Cistineae DC. 1819.
Dum. 1829. An. p. 44. 50: fam. Cistariear. Gen. ut Dunal.
Cistus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p 50: Cistinear.
Citharexylum Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 22: Verbenear.
Citrarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 43: ordo Toropetalar. Fam.: Olacineae, Pittosporeae, Aurantiaceae, Meliaceae, Vitideae.
Citrosma Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 16: Atherospermear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Citrus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 48: Aurantiacear.
Cladium P. Browne 1756.
Dum. 1827. Belg. p. 145; 1829. An. p. 65: Schoenear. — Par. Brongn. 1843 . . .
Cladonia Wigg. 1780.
Dum. 1829. An. p. 71: Cenomycear.
Cladoporus Pers. 1825.
Dum. 1829. An. p. 73: Boletear.
Cladosphaera Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 75: Astomospherar.
Cladosporium Link 1816.
Dum. 1829. An. p. 75: Gonosporear.
Cladostachys Don 1825.
Dum. 1829. An. p. 17: Amaranthear.
Cladostephus Agardh 1817.
Dum. 1829. An. p. 76: Ceramidear.
Clarionea Cassini 1825.
Dum. 1829. An. p. 31: Nassauviear.
Clarkia Pursh 1814.
Dum. 1829. An. p. 39: Onagrear. — Par. G. Don 1832 . . .
Clathrarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72: ordo Hymenosporar. Fam. unica: Clathrideae.
Clathrideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 72. 74: fam. Clathrariear. Gen.: Clathrus, Phallus, Junia, Battarea.
Clathrus Mich. 1729.
Dum. 1829. An. p. 74: Clathridear.
Clausena Burm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 48 (*Clausenia*): Aurantiacear.
Clausenia Dumort. vid. *Clausena Juss.*
Clavaria Vaill. 1727.
Dum. 1829. An. p. 73: Clavariacear. — Par. Corda 1839 . . .
Clavariaceae Dum. 1829. Anal. fam. p. 72. 73: fam. Fungariear. Gen.: Pistillaria, Clavaria, Typhula, Geoglossum, Mitrularia, Spatularia.
Corda 1838 . . .
Clavula Dumort. 1827. Fl. belg. p. 143; 1829. Anal. fam. p. 65: g. Scirpear. (1829 Scirpinear.) Sect.: Dichostylis, Boeotryon, Helodium, Limnochloa, Heleocharis.
Cleghornia*) Wight 1848. Ic. pl. Ind. IV. 2. p. 5. t. 1310 . . .
Clematideae DC. 1818.
Dum. 1827. Belg. p. 126; 1829. An. p. 50: Ranunculacear. Gen. (1827 Clematis) ut DC. et Atragene.

*) Dicat. Dr. Hugh Cleghorn, Madras.

Clematis Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 126; 1829. An. p. 50: Clematidear. Sect. (1827): Flammula, Viticella.
Cleome DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 51: Cleomear.
Cleomeae DC. 1824.
Dum. 1829. An. p. 51: trib. Capparidear. Gen. ut DC. (excepta Chomelia.)
Cleonia Linn. 1762.
Dum. 1829. An. p. 22: Prunellear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Clerodendron Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 66. t. 29.
Gled. 1749 . . .
Dum. 1829. An. p. 22: Viticear.
Clethra Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 28: Ericacear. — Par. Lindl. 1842 . . .
Cleyera Thunb. 1783.
Dum. 1829. An. p. 47: Ternstromiear.
Clidemia Don 1823.
Dum. 1829. An. p. 80: Miconiear.
Cliffortia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 18: Cliffortiacear.
Cliffortiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 18: trib. Sanguisorbear. Gen.: Cliffortia.
Clinopodeae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 46; 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Leonurear. Gen.: Clinopodium et 1829 Monarda.
Clinopodium Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 47; 1829. An. p. 22: Clinopodear.
Clitoria Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Clitoriear.
Synon. (add.) Flos clitorius Burm.
Clitorieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 40: subtrib. Lotear. Gen.: Glycine, Galactia, Neurocarpum, Clitoria, Indigofera, Psoralea. — Par. Meisn.
Bartl. 1830. . . .
Clusia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 47: Clusiar.
Clusiae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 47: trib. Guttiferar. Gen.: Clusia, Havetia.
Cluytia Reich. 1778.
Dum. 1829. An. p. 45: Phyllanthear.
Clypeola Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 51: Lunariear.
Cneorum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 45: Tribulear.
Cnestis Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 40: Connarinear.
Cnicus Vaill. 1718.
Dum. 1829. An. p. 32: Centauriear.
Cnidium Cuss. 1782.
Dum. 1829. An. p. 34: Seselinear.
Cobaea Cavan. 1791.
Dum. 1829. An. p. 25 (*Cobea*): Cobeacear. — Par. G. Don 1837 . . .
Cobea Dumort. vid. *Cobaea Cavan.*
Cobeaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25 (*Cobaeaceae* p. 20): fam. Convolvulariear. Gen.: Cobea, Amphilophium.
G. Don 1837 . . .
Coccocypselum Swartz 1797.
Dum. 1829. An. p. 32: Gardeniacear.
Coccoloba Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 18: Coccolobear.

Coccolobeae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 18: trib. Polygonear. Gen.: Bilderdykia, Coccoloba, Brunnichia, Triplaris.
Coccosporae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 76: class. Gliosporar. Ord.: Chararieae, Sphaerococcarieae, Fucarieae.
Cocculus Bauh., DC. 1818.
Dum. 1829. An. p. 50: Menispermear.
Cochlearia Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 120; 1829. An. p. 51: Lunariear. Sect.: Kernera, Armoracia, Cochleariotypus.
Cochlospermum Kunth 1822.
Dum. 1829. An. p. 47: Ternstromiear.
Cocoineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: trib. Palmar. Gen.: Elaeis, Bactris, Guilielma, Martinezia, Elate, Arenga, Cocos. Brongn. 1843 . . .
Cocos Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 80: Cocoinear. — Par. Brongn. 1843 . . .
Codarium Soland., Vahl 1805.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Codiaceae Nardo 1835. Consid. Alghe (Isis 1837. p. 90): fam. Ulvacear.
Codonia Dumort. (1822. Comm.) 1829. Anal. fam. p. 69: nov. g. Lejeuniacear.
Coelestina Cassini 1817.
Dum. 1829. An. p. 31: Eupatoriear.
Coelogyne Lindl. 1825.
Dum. 1829. An. p. 57: Malaxidear.
Coenogonium Ehrenb. 1820.
Dum. 1829. An. p. 71: Corniculariear.
Coffea Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 33: Psychotriear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Coix Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 64: Maydear. — Par. Miq. 1857 . . .
Colbertia Salisb. 1807.
Dum. 1829. An. p. 50: Dilleniacear.
Colchicarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59: ordo Torochlamydar. Fam. unica: Colchicineae.
Colchicineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 59. 61: fam. Colchicariear. Gen.: Colchicum, Merendera, Bulbocodium.
Colchicum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 61: Colchicinear.
Coldenia Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 24: Heliotropiear.
Collema Wiggers 1780.
Dum. 1829. An. p. 71: Collematear.
Collemateae „Fée“ Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Collema.
Collinsia Nutt. 1817.
Dum. 1829. An. p. 24: Antirrhinear.
Collinsonia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: Collinsoniar.
Collinsoniae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 22: subtrib. Teucriear. Gen.: Collinsonia, Amethystea.
Collomia Nutt. 1818.
Dum. 1829. An. p. 25: Polemonear.
Colocasia Schott 1832.
Wight 1843. Ic. pl. Ind. III. 1. p. 5 (*Colocassia*). t. 786: Aroidear.

Colocassia Wight vid. *Colocasia Schott.*
Colsmannia Lehm. 1817.
Dum. 1829. An. p. 24: Pulmonariar.
Columellia Ruiz & Pav. 1794.
Dum. 1829. An. p. 30: Columelliear.
Columellieae Don 1828.
Dum. 1829. An. p. 30: trib. Gesneriacear. Gen.: Columellia.
Columnea Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 24: Antirrhinear.
Columniferae Linn. 1764.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 14; 1826. Isis p. 588: class. Phanerocotyledonear. hypogynar. polypetalar. Ord.: Chlenaceae, Tiliaceae, Büttneriaceae, Bombaceae, Malvaceae.
Colura Dumort. 1831.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 12: g. Lejenniacear.
Colutea Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 102; 1829. An. p. 40: Galegear.
Comandra Nutt. 1818.
Dum. 1829. An. p. 13: Santalear. — Par. Spach 1841 . . . .
Comaropsis Rich. 1816.
Dum. 1829. An. p. 39: Fragariacear.
Comarum Linn. 1737.
Dum. 1839. An. p. 39: Fragariacear.
Combretideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 39: fam. Onagrariear. Gen.: Combretum, Quisqualis, Cacoucia.
Combretum Löfl. 1758.
Dum. 1829. An. p. 39: Combretidear.
Comesperma Labill. 1806.
Dum. 1829. An. p. 23: Polygalacear. — Par. Lindl. 1847 . . .
Commelina Plum. 1703.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 69. t. 20. f. 2.
Dum. 1829. An. p. 55: Commelinear.
Commelinaceae Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 54. 55: fam. Commelinariar. Trib.: Commelineae, Dichorisandreae.
Commelinariae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54: ordo Calytepalar. Fam.: Eriocauleae, Xyrideae, Commelinaceae, Dasypogoneae.
Commelineae R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 55: trib. Commelinacear. Gen.: Commelina, Campelia, Tradescantia, Cartonema, Cyanotis.
Commersonia Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 46: Buttneriear. — Par. Brongn. 1843 . . .
Compositae Vaill. 1718.
Dum. 1829. An. p. 29. 30: fam. Synantherear. Series: Trichostylae, Adenostigmeae, Trichostigmeae, Arthrostyleae.
Comptonia Banks, Gärtn. 1791.
Dum. 1829. An. p. 12: Comptoniear.
Comptonieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 12: trib. Platanear. Gen.: Comptonia.
Condylocarpus Hoffm. 1816.
Dum. 1829. An. p. 35: Tordyliear.
Conferva Dill. 1719.
Dum. (1822. Comm.) 1829. An. p. 78: Confervacear.

Confervaceae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 77. 78: fam. Confervariear. Gen.: Conferva, Lemanea.
Confervarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: ordo Thallosporar. Fam.: Vaucheriaceae, Hydrodictyneae, Conjugatae, Confervaceae.
Confervinae Spreng. 1827.
Ritg. 1831. Marb. II. p. 85: div. Spondylydronematum. Gen. ut Spreng. 1827.
Confervoideae Agdh. 1817.
Ag. (1821. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 582: ordo Algar. Divis.: Leptomiteae, Oscillatorinae, Characeae, Ceramieae, Ectocarpeae.
Congea Roxb. 1819.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 13. 15. t. 1479: Symphoremear.
Coniferae Hall. 1742.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 9: ordo Micranthar. Divis.: Taxinae, Abietinae, Cupressineae.
Dum. 1829. An. p. 11: fam. Pinariear. Trib.: Abietineae, Cupressineae, Junipereae.
Coniocarpeae „Fee" Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Coniocarpon.
Arnold 1858 . . .
Coniocarpiceae Rchb. 1841. Nom. p. 14: vid. *Coniocarpicae Rchb.*
Coniocarpon DC. 1805.
Dum. 1829. An. p. 71: Coniocarpear. — Par. Arnold 1858 . . .
Coniophora Pers. 1822.
Dum. 1829. An. p. 73: Thelephorear.
Coniosporium Fries 1825.
Dum. 1829. An. p. 49: Sclerotidear.
Conium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 34: Pimpinellear.
Conjugatae Link 1826.
Dum. 1829. An. p. 77. 78: fam. Confervariear. Gen.: Zygnema, Spirogera, Globulina.
Connaraceae R. Brown 1818.
Agdh. 1825 Cl. pl. p. 16; 1826. Isis p. 590: div. Terebinthacear.
Connarineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 36. 40: fam. Terebinthariear. Gen.: Connarus, Omphalobium, Cnestis, Brunellia, Ailanthus.
Connarus Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 40: Connarinear.
Conocephalus Hill, Neck. 1790.
Dumort. (1822. Comm.) 1829. An. p. 69 (1831. Syll.): g. Cephalothecear.
Conopholis Wallr. 1825.
Wight 1849. Ic. pl. Ind. IV. 3. p. 3: Orobancheear.
Conoplea Pers. 1797.
Dum. 1829. An. p. 75: Tuberculariaccar.
Conopodium Koch 1824.
Dum. 1829. An. p. 34: Pimpinellear.
Conospermum Smith 1798.
Dum. 1829. An. p. 18: Protear.
Conostegia Don 1823.
Dum. 1829. An. p. 39: Miconicar.
Conostomum Swartz 1806.
Dum. 1829. An. p. 69: Bryear.
Conostylis R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 58: Haemodoracear.
Conringia Link 1822.
Dum. 1827. Belg. p. 123; 1829. An. p. 51: Erysimear.
Conuleum Rich. 1823.
Dum. 1829. An. p. 18: Eleagnidear.
Convallaria Adans. 1763.
Dum. 1827. Belg. p. 138; 1829. An. p. 60: Convallariear. — Par. Endl. 1837 . . .
Convallarieae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 138; 1829. Anal. fam. p. 60: trib. Asparaginear. Gen.: Convallaria, Polygonatum et 1829 Streptopus.
Convolvularieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20: ordo Torocoronar. Fam.: Cobaeaceae, Convolvulineae, Cuscutaceae, Plantagineae; Hydrolaeaceae, Polemonideae.
Convolvulineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 25: fam. Convolvulariear. Gen.: Convolvulus, Calystegia, Ipomaea, Argyreia, Dinetus, Porana, Evolvulus.
Convolvulus Linn. 1737.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 70.
Convolvulus Medic. 1791, R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 25: Convolvulinear.
Conyza Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 31: Inulear.
Cookia Sonn. 1782.
Dum. 1829. An. p. 48: Aurantiacear.
Copaifera Linn. 1762.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Coppensia *) Dumort. 1835. Nouv. Mém. Ac. Brux. IX. p. 10 adnot.: nov. g. Orchidear., pro Oncidio bifloro indicat.
Coprosma Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 33: *(Caprosma):* Psychotriear.
Coptis Salisb. 1807.
Dum. 1829. An. p. 50: Helleborear.
Cor Indum Herm. 1687. Hort. Lugd. Bat. cat. p. 190.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 75.
= Cardiospermum Linn.
Corallodendron Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 74.
Corallorhiza Hall. 1742.
Dum. 1829. An. p. 56: Arethusear.
Corchorus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 46: Tiliacear.
Cordaea Nees 1833.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 25: Dilaenear.
Cordia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 26: Cordiear.
Cordiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 25: fam. Boraginariear. Trib.: Ehretieae, Cordieae.
Cordieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 25: trib. Cordiacear. Gen.: Cordia, Patagonula, Menais, Varronia.
Coreopsideae Cassini 1818.
Dum. 1827. Belg. p. 71; 1829. An. p. 31: subtrib. Helianthidear. Gen.: (1827 Bidens) Dahlia, Cosmos, Coreopsis, Bidens, Kerneria, Parthenium, Silphium.

---

*) Dicat. Bern. Coppens, prof. botan. Gand.

Coreopsis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Coreopsidear.
Coriandreae Koch 1824.
Dum. 1829. An. p. 35: trib. Tympanospermar. Gen. ead.
Coriandrum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 35: Coriandrear.
Coriaria Niss. 1711.
Dum. 1829. An. p. 45: Coriariear.
Coriarieae DC. 1824.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 9; 1826. Isis p. 585: div. Euphorbiacear.
Dum. 1829. An. p. 42. 45: fam. Rutariear. Gen. id.
Corideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 27: trib. Primulacear. Gen.: Coris.
Rchb. 1837 . . .
Coris Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 27: Coridear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Corispermum Juss., Dill. 1719.
Dum. 1829. An. p. 17: Salsolear.
Cornarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 33: ordo Gynopetalar. Fam.: Alangieae, Corneae.
Corneae HBK. 1818.
Dum. 1829. An. p. 33. 34: fam. Cornariear. Gen.: Cornus, Aucuba.
Cornicularia Hoffm. 1789.
Dum. 1829. An. p. 71: Corniculariear. Par. Nyl. 1854 . . .
Cornicularieae „Fée" Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: trib. Lichenum. Gen.: Cornicularia, Coenogonium.
Nyland. 1854 . . .
Cornucopiae Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 64 (sph. *Cornucopieae*): Alopecurear.
Cornucopieae Dumort. vid. *praeced.*
Cornulaca Delile 1813.
Dum. 1829. An. p. 17: Salsolear. — Par. Moq.-Tand. 1835 . . .
Cornus Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 83; 1829. An. p. 34: Cornear. Sect.: Cornotypus, Thelycrania.
Cornus Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 76. t. 30. 31.
— Memecylon et Samara Linn.
Cornutia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 22: Viticear.
Coronanthae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 19: subdiv. Endoxylar. Class.: Torocoronae, Gynocoronae.
Coronilla Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes zeyl. p. 77. t. 32. 33.
Coronilla Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 102; 1829. An. p. 40: Coronillear.
Coronilleae Spreng. 1818.
Dum. 1829. An. p. 40: trib. Hedysarear. Gen. ut DC.
Correa Smith 1798.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.
Corrigiola Dill. 1719.
Dum. 1829. An. p. 49: Corrigiolacear.
Corrigiolaceae Rchb. 1827.
Dum. 1829. An. p. 44. 49: fam. Stellariear. Gen. ead.
Cortusa Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 27: Primulear.

Corycium Swartz 1800.
Dum. 1829. An. p. 56: Ophrydear.
Corydalideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: trib. Fumariacear. Gen.: Corydalis, Capnites, Cysticapnos.
Endl. 1839 . . .
Corydalis Vent., DC. 1805.
Dum. 1829. An. p. 51: Corydalidear. — Par. Endl. 1839 . . .
Corylaceae Mirb. 1815.
Dum. 1827. Belg. p. 14: trib. Cupuliferear. Gen.: Corylus, Carpinus.
Dum. 1829. An. p. 12: trib. Quercinear. Gen. ead. et Ostrya.
Corylarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 11: ordo Julosepalar. Fam.: Quercineae, Fagineae.
Corylus Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 14; 1829. An. p. 12: Corylacear.
Corymbium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 31: Rolandrear.
Corynephorus Palis. 1812.
Dum. 1827. Belg. p. 154; 1829. An. p. 63: Avenacear.
Corynesphaera Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 74: Stigmaspherar.
Coryneum Nees 1816.
Dum. 1829. An. p. 75: Tuberculariacear.
Corypha Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 55: Coryphinear. — Par. Brongn. 1843.
Coryphineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: trib. Palmar. Gen.: Morenia, Rhapis, Chamaerops, Livistona, Corypha, Phaenix.
Brongn. 1843 . . .
Corysanthes R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. fam. p. 56: Arethusear.
Coscinium Colebr. 1821.
Dum. 1829. An. p. 50: Menispermear.
Cosmelia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 28: Epacrear. — Par. Endl. 1839 . . .
Cosmos Cavan. 1791.
Dum. 1829. An. p. 31: Coreopsidear.
Cossignia Comm., Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 48: Sapindear.
Costus Linn. 1737.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 78.
Dum. 1829. An. p. 56: Curcumacear.
Cotoneaster Bauh., Rupp. 1718.
Dum. 1827. Belg. p. 92; 1829. An. p. 39: Mespilear.
Cotula Gärtn. 1791.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Cotyledon DC. 1801.
Dum. 1829. An. p. 38: Cotyledonear. — Par. Rchb. 1841 . . .
Cotyledoneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: trib. Crassulacear. Gen.: Cotyledon, Pistorina, Umbilicus, Echeveria, Rochea, Bryophyllum, Kalanchoë, Grammanthes.
Rchb. 1841 . . .
Coulteria HBK. 1823.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.
Couratari Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 29 (*Courataria*): Zanoniacear.
Courataria Dumort., Rchb. vid. praeced.

Couroupita Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 38: Lecythidear.
Coursetia DC. 1825.
Dum. 1829. An. p. 40: Galegear.
Coussapoa Aubl. 1775.
Dum. 1829. An. p. 17: Cecropiear.
Crambe Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 121; 1829. An. p. 51: Buniadear.
Craniolaria Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: Sesamear.
Crassula Haw. 1812.
Dum. 1829. An. p. 38: Sempervivear.
Crassulaceae DC. 1801.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 19; 1826. Isis p. 591: ordo Succulentar. — Par. Bartl. . . .
Dum. 1829. An. p. 36. 38: fam. Saxifragariear. Trib.: Cotyledoneae, Semperviveae.
Crataegus Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 92; 1829. An. p. 39: Mespilear.
Crataeva Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 51: Capparear.
Crateria Pers. 1805.
Dum. 1829. An. p. 18: Samydear.
Craterium Trentep. 1800.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.
Cremanium Don 1823.
Dum. 1829. An. p. 39: Miconiear.
Crenias Spreng. 1827.
Dum. 1829. An. p. 62: Podostemonear.
Crepideae Cassini 1822.
Dum. 1829. An. p. 30: subtrib. Cichoriear. Gen.: Picris, Helmintia, Taraxacum, Crepis, Barkhausia, Hostia, Zacintha.
Crepis Vaill. 1721.
Dum. 1827. Belg. p. 61; 1829. An. p. 30: Crepidear. Sect. (1827): Crepidopsis, Crepidotypus, Phaecasium.
Crescentia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 24: Crescentiacear. — Par. Gardn. 1840 . . .
Crescentiaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 24: fam. Rhinanthariear. Gen.: Crescentia, Brunfelsia, Tanaecium.
Gardn. 1840 . . .
Cribraria Schrad., Gmel. 1791.
Dum. 1829. An. p. 74 *(Cribaria)*: Trichiacear.
Crinum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 58: Amaryllidear.
Criptocoryne Wight vid. *Cryptocoryne Fisch.*
Crista pavonis „Breyn." Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 79.
? = Poinciana Tourn.
Cristaria Cavan. 1799.
Dum. 1829. An. p. 46: Sidacear.
Crithmum Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 34: Seselinear.
Crocineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 38: trib. Iridear. Gen.: Crocus. — Par. Spach 1846 . . .
Crocus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 58: Crocinear. — Par. Spach 1846 . . .
Crossandra Salisb. 1806.
Dum. 1829. An. p. 23: Ruelliear.
Crotalaria Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 80. t. 34. 35.
Dum. 1829. An. p. 40: Genistear.
Croton Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 45: Crotoniear.
Crotonieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 45: trib. Euphorbiacear. Gen.: Croton, Crozophora, Jatropha, Janipha, Aleurites, Siphonia.
Crowea Smith 1798.
Dum. 1829. An. p. 42: Diosmear.
Crozophora A. Juss. 1824.
Dum. 1829. An. p. 45: Crotoniear.
Crucianella Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 33: Galiear.
Cruciferae B. Juss. 1759.
Dum. 1829. An. p. 44. 51: fam. Cruciferariear. Series: Siliquosae, Siliquastrae, Siliculosae.
Cruciferarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 44: ordo Toropetalar. Fam.: Capparideae, Cruciferae.
Crupina Rupp. 1718.
Dum. 1829. An. p. 32: Centauriear.
Crustaceae Agardh (1821. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 5; 1826. Isis p. 583: ordo Lichenum. Divis.: . . . .
Crypsis Ait. 1789.
Dum. 1829. An. p. 64: Alopecurear.
Cryptanthae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 66: subdiv. Exoxylar. Class.: Dermogynae, Mitrogynae.
Cryptarrhena R. Brown 1816.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Cryptocarya R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 16: Cassythacear.
Cryptocoryne Fisch., Rchb. 1828.
Dum. 1829. An. p. 66: Arear.
Wight 1843. Ic. pl. Ind. III. 1. p. 4 *(Criptocoryne)*. t. 772. 773: g. Cryptocorynear.
Cryptopus Lindl. 1824.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Cryptostegia R. Brown 1819.
Dum. 1829. An. p. 26: Periplocear.
Cryptostemma R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 32: Arctotidear.
Cryptostylis R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 56: Neottiear.
Cucubalus Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 107; 1829. An. p. 49: Silenear. (C. bacciferus.)
Cucumis Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 29: Cucurbitacear.
Cucurbarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 28: ordo Gynocoronar. Fam.: Napoleonaceae, Zanoniaceae, Cucurbitaceae.
Cucurbita Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 29: Cucurbitacear.
Cucurbitaceae Hall. 1742.
Dum. 1829. An. p. 28. 29: fam. Cucurbariear. Gen.: Cucurbita, Cucumis, Trichosanthes, Ceratosanthes, Momordica, Luffa, Anguria, Melothria, Ecballium, Elaterium, Bryonia, Sechium, Sicyos, Gronovia.
Cullenia*) Wight 1851. Ic. pl. Ind. V. 1. p. 22. t. 1761. 1762: nov. g. Bombacear. (C. excelsa.)

*) Dicat. „Major General" Cullen.

Cullumia R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 32: Arctotidear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Cuminum Linn. 1742.
Dum. 1829. An. p. 34: Pimpinellear.
Cunila Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 22: Catariear.
Cunninghamia R. Brown, A. Rich. 1826.
Dum. 1829. An. p. 11: Abietinear.
Cunonia Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 37: Cunoniacear.
Cunoniaceae R. Brown 1814.
Dum. 1829. An. p. 36. 37: fam. Saxifragariear. Gen.: Weinmannia, Cunonia, Callicoma, Ceratopetalum, Baucra.
Cupania Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 48: Sapindear.
Cuphea P. Browne 1756.
Dum. 1829. An. p. 39: Lythrear.
Cupressinae Rich. 1810.
Agdh. (1825. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 10; 1826. Isis p. 585: trib. Coniferar.
Cupressineae A. Rich. 1826.
Dum. 1827. Belg. p. 9; 1829. An. p. 12: trib. Coniferar. Gen.: (1827 Juniperus) 1829 ut Rich. excepto Junipero.
Cupressus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 12: Cupressinear.
Curatella Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 50: Delimacear.
Curculigineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 58: trib. Hypoxidear. Gen.: Hypoxis, Curculigo.
Curcuma Linn. 1737.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 83.
Curcumaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 56: fam. Cannariear. Gen.: Globba, Mantisia, Curcuma, Kämpferia, Roscoea, Zingiber, Amomum, Costus, Alpinia, Hellenia, Gethyra, Elettaria, Hedychium.
Curtisia Ait. 1789.
Dum. 1829. An. p. 27: Ilicear.
Curtogyne Haw. 1821.
Dum. 1829. An. p. 38: Sempervivear.
Cuscuta Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 25: Cuscutacear. — Par. Lindl. . . .
Cuscutaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 25: fam. Convolvulariear. Gen.: Cuscuta.
Lindl. 1836 . . . .
Cussonia Thunb. 1780.
Dum. 1829. An. p. 35: Araliacear.
Cuviera DC. 1807.
Dum. 1829. An. p. 32: Psathurear.
Cyanella Linn. 1759.
Dum. 1829. An. p. 60: Asphodelear.
Cyanotis Don 1825.
Dum. 1829. An. p. 55: Commelinear.
Cyathea Smith 1791.
Dum. 1829. An. p. 67: Cyathear.
Cyatheae Gray 1821.
Dum. 1829. An. p. 67: subtrib. Polypodiear. Gen.: Woodsia, Cyathea, Alsophila, Hemitelia.
Cyathisphaera Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 75 (*Cyathosphaera*): Astomosphærar.

Cyathodes Labill. 1804.
Dum. 1829. An. p. 28: Stenantherear.
Cyathosphaera Dumort. vid. *Cyathisphaera Ej.*
Cyathus Hall. 1768.
Dum. 1829. An. p. 74: Nidulariacear. — Par. Corda 1842 . . .
Cycadarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: ordo Spadicatar. Fam. unica: Cycadeae.
Cycadeae Rich. 1807.
Agdh. (1822. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 7; 1826. Isis p. 584: ordo Spadicinar.
Dum. 1829. An. p. 65. 66: fam. Cycadariear. Gen.: Cycas, Zamia, Arthrozamia.
Cycas Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 66: Cycadear.
Cyclamen Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 30; 1829. An. p. 27: Cyclaminear. — Par. Rchb. 1831 . . .
Cyclamineae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 30; 1829. Anal. fam. p. 27: trib. Primulacear. Gen.: Cyclamen et 1829 Dodecatheon.
Rchb. 1831. . . . .
Cyclantheae Poit. 1822.
Agdh. 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: div. Pandanear.
Dum. 1829. An. p. 65. 66: fam. Arariear. Gen. ut Rchb.
Cyclanthus Poit. 1822.
Dum. 1829. An. p. 66: Cyclanthear.
Cyclophorus Desv. 1811.
Dum. 1829. An. p. 67: Polypodear. — Par. Lindl. 1847 . . .
Cydonia Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 92; 1829. An. p. 39: Pyrear.
Cymbaria Linn. 1742.
Dum. 1829. An. p. 24: Antirrhinear.
Cymbellideae Nardo 1835. Consid. Alghe (Isis 1837. p. 90): series Diatomacear. Gen.: Cymbella, etc.
Cymbidium Swartz 1799.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.
Cyminosma Gärtn. 1788.
Dum. 1829. An. p. 45: Rutear. — Par. Meisn. 1837 . . .
Cynancheae Rchb. 1827.
Dum. 1829. An. p. 26: trib. Asclepiadear. Subtrib.: Pergularieae, Gonolobeae, *Cynancheae* (gen.: Asclepias, Exytelma, Acerates, Anantherix, Stylandra, Gomphocarpus, Cynanchum, Daemia, Xysmalobium, Metaplexis, Holostemma, Ditassa, Kanahia, Diplolepium, Sarcostomma, Eustegia, Oxypetalum, Calotropis, Podostigma), Astephaneae.
Cynanchum Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 26: Cynanchear.
Cynaraceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 32: trib. Arthrostylear. Subtrib.: Xeranthemeae, Carlineae, Centaurieae, Carduineae, Echinopsideae.
Cynodon Rich. 1805.
Dum. 1827. Belg. p. 149; 1829. An. p. 64: Cynodonear.

Cynodoneae Dumort. 1823. Agrost. Belg.; 1827. Fl. belg. p. 149; 1829. Anal. fam. p. 64: trib. Callifforar. Gen.: Cynodon et 1829 Chloris, Rhabdochloa, Gymnopogon, Triahera, Triaena, Actinochloa, Atheropogon.

Cynoglosseae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 39; 1829. Anal. fam. p. 24: subtrib. Lithospermear. Gen.: Asperugo, Cynoglossum, Mertensia, Omphalodes, Lappula et 1829 Trichodesma, Mattia, Casselia, Rochelia.
G. Don 1837. . . . .

Cynoglossum Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 39; 1829. An. p. 24: Cynoglossear. — Par. G. Don 1837 . . .

Cynometra Linn. 1741.
Dum. 1829. An. p. 40: Cassiear.

Cynomorium Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 66: Balanophorear.

Cynosureae Dumort. 1823. Agrost. Belg.; 1827. Fl. belg. p. 156: trib. Scobiflorear. Gen.: Sesleria, Cynosurus, Phalona.
Dum. 1829. Anal. fam. p. 63: trib. Scobiflorar. Gen.: Cynosurus, Phalona, Chrysurus, Elythrophorus.
Rchb. 1841 . . .

Cynosurus Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 156; 1829. An. p. 63: Cynosurear. — Par. Rchb. 1841 . . .

Cypella Herb.
Synon. (add.) Tinantia Dumort.

Cyperaceae St. Hil. 1805.
Agdh. (1823. Aphor.) 1825. Cl. pl. p. 8; 1826. Isis p. 584: ordo Glumiflorar.
Dum. 1829. An. p. 62: vid. *Cyperideae Ej.*

Cyperideae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 64 (p. 62 *Cyperaceae*): fam. Graminariear. Trib.: Cariceae, Schoeneae, Cyperineae, Scirpineae.

Cyperineae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 65: trib. Cyperidear. Gen.: Cyperus, Kyllingia, Papyrus.

Cyperus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 65: Cyperinear.

Cyphella Fries 1823.
Dum. 1829. An. p. 74: Tremellacear.

Cyphia Berg. 1767.
Dum. 1829. An. p. 30: Lobeliacear.

Cypripedieae Lindl. 1826.
Dum. 1829. An. p. 57: trib. Orchidear. Gen. id.

Cypripedium Linn. 1737.
Dum. 1827. Belg. p. 134; 1829. An. p. 57: Cypripediear.

Cyrilla Gard., Linn. 1767.
Dum. 1829. An. p. 28: Ericacear.

Cyrstostylis Dumort. vid. *Cyrtostylis R. Br.*

Cyrtanthus Ait. 1789.
Dum. 1829. An. p. 58: Amaryllidear.

Cyrtophyllum Reinw. 1823.
Dum. 1829. An. p. 26: Strychnear.

Cyrtopodium R. Brown 1813.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.

Cyrtostylis R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 56 (*Cyrstostylis*): Arethusear.

Cysticapnos Boerh. 1710.
Dum. 1829. An. p. 51: Corydalidear. — Par. Endl. 1839 . . .

Cystopteris Bernh. 1806.
Dum. 1829. An. p. 67: Aspleniear. — Par. Webb 1850 . . .

Cystoseira Agdh. 1821.
Dum. 1829. An. p. 76: Fucinear.

Cyticystus*) Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 85. t. 36.
= Helianthemum Tourn.

Cytinarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: ordo Gynosepalar. Fam.: Rafflesiaceae, Cytineae.

Cytineae Brongn. 1824.
Dum. 1829. An. p. 13. 14: fam. Cytinariear. (restricta.) Gen.: Cytinus, Aphyteia.

Cytinus Linn. 1764.
Dum. 1829. An. p. 14: Cytinear.

Cytisus Tourn. 1700.
Burm. 1737. Thes. zeyl. p. 86. t. 37.
Dum. 1827. Belg. p. 98 (*Citysus*); 1829. An. p. 40: Genistear. Sect. (1827): Laburnum, Spartopsis, Cytisotypus.

Czackia Andr. 1818.
Dum. 1829. An. p. 60: Asphodelear.

Dacrydium Sol., Forst. 1786.
Dum. 1829. An. p. 12: Podocarpear.

Dacrymyces Agdh. 1821.
Dum. 1829. An. p. 74: Tremellacear.

Dactylis Linn. 1742.
Dum. 1829. An. p. 63: Bromear.

Dactylium Nees 1816.
Dum. 1829. An. p. 75: Gonosporear.

Dactyloctenium Willd. 1809.
Dum. 1829. An. p. 63 (*Dactylotenium*): Eleusinear. — Par. Miq. 1857 . . .

Dactylotenium Dumort. vid. *Dactyloctenium W.*

Daedalea Pers. 1801.
Dum. 1829. An. p. 73: Meruliear.

Daemia Poir. 1818.
Dum. 1829. An. p. 26: Cynanchear.

Dahlia Cavan. 1791.
Dum. 1829. An. p. 31: Coreopsidear.

Dais Linn. 1762.
Dum. 1829. An. p. 18 (*Days*): Thymelinear.

Dalbergia Linn. f. 1781.
Dum. 1829. An. p. 40: Dalbergiear.

Dalbergieae Bronn 1822.
Dum. 1829. An. p. 40: trib. Leguminosar. Gen.: Pterocarpus, Dalbergia, Drepanocarpus, Brya.

Dalea Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 40: Galegear.

Dalechampia Plum. 1703.
Dum. 1829. An. p. 45: Euphorbiear. — Par. Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 23. t. 1881. 1882 (*Dalechampsia*).

Dalechampsia Wight vid. *praeced.*

Dalhousiea Wall., Benth.
Wight 1840. Ic. pl. Ind. I. 14. t. 265: Podalyriear. (Char.)

Dalibarda Linn. 1753.
Dum. 1829. An. p. 39: Rubear. — Par. Rchb. 1841 . . .

---

*) Contractum ex Cytiso et cysto.

Daltonia Hook. & Tayl. 1818.
Dum. 1829. An. p. 68: Hypnear. — Par. Mont. 1840 . . .
Dalzellia Wight 1852. Ic. pl. Ind. V. 2. p. 34. t. 1919. 1920 (*Tulasnea* in tab.): g. Podostemacear., pro *Lawia Griff.* substitutum.
= Terniola Tul.
Damasonium Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 136; 1829. An. p. 55: Alismear.
Dampiera R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 30: Scevolear.
Danaea Smith 1791.
Dum. 1829. An. p. 67: Marattiacear.
Danais Comm., Vent. 1799.
Dum. 1829. An. p. 32: Cinchonear.
Danthonia Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 63: Avenacear.
Daphne Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 18: Thymelinear.
Darlingtonia DC. 1825.
Dum. 1829. An. p. 40: Acaciear.
Dasypogoneae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 54. 55: fam. Commelinariear. Gen.: Dasypogon, Calectasia.
Dasystemon DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 38: Sempervivear.
Datisca Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 14: Datiscacear. — Par. Lindl. . . .
Datiscaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13. 14: fam. Datiscariear. Gen.: Datisca, Tetrameles.
Lindl. 1836 . . .
Datiscarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 13: ordo Gynosepalar. Fam. unica: Datiscaceae.
Datura Pers. 1805.
Dum. 1829. An. p. 42: Daturear.
Datureae Rchb. 1827.
Dum. 1829. An. fam. p. 24: trib. Solanidear. Gen.: Datura, Brugmansia.
Daucus Tourn. 1700.
Dum. 1829. An. p. 35: Caucalidear. — Par. Tausch 1834 . . .
Davallia Smith 1791.
Dum. 1829. An. p. 67: Asplenicar.
Dawsonia R. Brown 1811.
Dum. (1822. Comm.) 1829. An. p. 68: Dawsoniacear.
Dawsoniaceae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 68: trib. unica Endopogonor. Gen. id.
Days Dumort. vid. *Dais Linn.*
Decumaria Linn. 1763.
Dum. 1829. An. p. 38: Philadelphinear.
Deeringia R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 17: Amaranthear.
Delesseria Lamx. 1813.
Dum. 1829. An. p. 76: Sphaerococcear. — Par. Fries 1846 . . .
Delia Dumort. 1827. Fl. belg. p. 110; 1829. Anal. fam. p. 49: nov. g. Spergulear. (Alsine segetalis L.)
Delila „Dumort." Auct. in synon. Spergulariae: vid. *Delia Dum.*
Delima Linn. 1747.
Dum. 1829. An. p. 50: Delimacear.
Delimaceae DC. 1818.
Dum. 1829. An. p. 50: trib. Ranunculacear. Gen. ex DC.
Delphinium Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 129; 1829. An. p. 46: Helleborear.
Dendrobium Swartz 1799.
Dum. 1829. An. p. 57: Malaxidear.
Dentaria Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 125; 1829. An. p. 51: Cardaminear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Dermogynae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 9. 66: class. Cryptanthar. Ordines: Equisetarieae, Filicarieae, Pilularieae, Lycopodarieae.
Dermosporae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 71: subdiv. Axylar. Class.: Peltosporae, Mycosporae.
Deschampsia Palis. 1812.
Dum. 1827. Belg. p. 154; 1829. An. p. 63: Avenacear.
Desmanthus Willd. 1805.
Dum. 1829. An. p. 40: Acaciear.
Desmarestia Lamx. 1813.
Dum. 1829. An. p. 77: (*Desmaretia*): Laminariacear.
Desmazeria Dumort. 1829. Anal. fam. p. 63: Loliacear. (*Demazeria Dum.* 1822.)
Desmidium Agardh 1824.
Dum. 1829. An. p. 78: Diatomear.
Desmodium DC. 1825.
Dum. 1829. An. p. 40: Onobrychear.
Detarieae DC. 1825.
Dum. 1829. An. p. 40: trib. Leguminosar. Gen.: Detarium.
Detarium Juss. 1789.
Dum. 1829. An. p. 40: Detariear.
Deutzia Thunb. 1781.
Dum. 1829. An. p. 38: Hydrangeacear.
Devauxia Poir. 1819.
Dum. 1829. An. p. 63: Devauxiacear.
Deyeuxia Clar., Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 63: Agrostidear. — Par. Bartl. . . .
Diachea Fries 1819.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.
Diamorpha Nutt. 1818.
Dum. 1829. An. p. 38: Sempervivear.
Dianella Lam. 1786.
Dum. 1829. An. p. 60: Maianthemear.
Diantheae Rich. 1823.
Dum. 1829. An. p. 49: trib. Stellariacear. Gen.: Dianthus.
Dianthus Linn. 17[illegible].
Dum. 1829. An. [illegible] 49: Dianthear. — Par. Rchb. 1837 . . .
Diarrhena Palis. 1812.
Dum. 1829. An. p. 63: Bambusacear.
Diascia Link 1820.
Dum. 1829. An. p. 21: Scrophulariear.
Diasia DC. 1803.
Dum. 1829. An. p. 58: Gladiolear. (et denuo in Ixieis.)
Diatomaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77. 78: fam. Diatomariear. Trib.: Diatomeae, Frustuliaceae.
Agdh. 1830 . . .

Diatomarieae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 77: ordo Thallosporar. Fam. unica: Diatomaceae.
Diatomeae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 78: trib. Diatomacear. Gen.: Fragilaria, Diatoma, Desmidium, Meloseira, Mycoderma.
Diatropa Dumort. 1827. Fl. belg. p. 76; 1829. Anal. fam. p. 34: nov. g. Buplevrear., (Bupleurum rotundifolium.)
Dicaeoma Nees 1816.
Dum. 1829. An. p. 75: Uredinear.
Dicera Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 46: Elaeocarpear.
Dichondra Forst. 1776.
Dum. 1829. An. p. 24: Dichondracear.
Dichondraceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 20. 24: fam. Boraginariear. Gen.: Dichondra, Falkia.
Dichopogoni Dumort. 1829. Anal. fam. p. 68: series Muscor. Trib.: Hypneae, Bryeae, Buxbaumieae, Orthotricheae.
Dichorisandra Mik. 1820.
Dum. 1829. An. p. 55: Dichorisandrear.
Dichorisandreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 55: trib. Commelinacear. Gen.: Dichorisandra, Callisia, Aneilema.
Diclytra DC. 1821.
Dum. 1829. An. p. 51: Diclytrear.
Diclytreae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 51: trib. Fumariacear. Gen.: Diclytra, Adlumia.
Dicoccum Corda 1829.
Dum. 1829. An. p. 75: Tuberculariacear.
Dicoryphe Petit-Th. 1805.
Dum. 1829. An. p. 35: Hamamelidear.
Dicraneae Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 69: trib. Aplopogonor. Gen.: Dicranum, Didymodon, Tortula, Weissia, Trematodon.
Dicranum Hedw. 1782.
Dum. (1822. Comm.) 1829. An. p. 69: Dicranear.
Dictamnus Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 54: Diosmear.
Dictydium Schrad. 1797.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.
Dictyopteris Lamx. 1809.
Dum. 1829. An. p. 76: Dictyotacear.
Dictyota Lamx. 1809.
Dum. 1829. An. p. 76: Dictyotacear. — Par. Harv. 1852 . . .
Dictyotaceae Dumort. 1829. Anal. fam. p. 76: fam. Fucariear. Gen.: Dictyota, Zonaria, Asperococcus, Dictyopteris, Flabellaria, Hymanthalia.
Harv. 1852 . . .
Didelta L'Herit. 1785.
Dum. 1829. An. p. 32: Arctotidear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Diderma Pers. 1795.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.
Didymium Schrad. 1797.
Dum. 1829. An. p. 74: Trichiacear.
Didymocrater Mart. 1817.
Dum. 1829. An. p. 75: Mucorinear.
Didymodon Hedw. 1791.
Dum. 1829. An. p. 69: Dicranear. — Par. Angstr. 1846 . . .
Digitalideae Dumort. 1827. Fl. belg. p. 36: subtrib. Scrophulariear. Gen.: Gratiola, Digitalis.
Dum. 1829. Anal. fam. p. 24: trib. Rhinanthidear. Gen.: Gratiola, Digitalis, Chelone, Pentestemon (p. 79), Trevirania, Capraria, Teedia, Bonnaya.
Digitalis Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 36; 1829. An. p. 24: Digitalidear. Sect.: Dactylanthos, Dactylopsis, Pogonanthus.
Digitaria Scop. 1772.
Dum. 1827. Belg. p. 150: g. Miliacear.
Dum. 1829. An. p. 64: Panicear. genuinar.
Dilaena Dumort. 1822.
Dum. 1829. An. p. 69: Blasiear.
Dum. 1835. Obs. Jung. p. 25: Dilaenear.
Dilatris Berg. 1767.
Dum. 1829. An. p. 58: Haemodoracear. — Par. Bartl. . . .
Dillenia Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 50: Dilleniacear.
Dilleniaceae DC., R. Brown.
Dum. 1829. An. p. 50: trib. Ranunculacear. Gen. ex Dilleneis DC.
Dillwygnia Smith 1805.
Dum. 1829. An. p. 40: Sophorear.
Dimeresia Juss. vid. *Dimereza Labill.*
Dimereza Labill. 1824.
Juss. 1827. Dict. v. 47. p. 330 (*Dimeresia*): g. Sapindear. — Par. Bartl. 1830 . . .
Diodia Gron., Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 33: Spermacoccear.
Diosma Berg. 1767.
Dum. 1829. An. p. 45: Diosmear.
Diosmeae R. Brown 1814.
Dum. 1829. An. p. 45: trib. Rutacear. Gen. ex A. Juss.
Diospyros Linn. 1737.
Dum. 1829. An. p. 27: Ebenacear.
Diotis Schreb. 1791.
Dum. 1829. An. p. 17: Atriplicear. (in Add. corr. *Ceratospermum.*)
Diotis Desfont. 1799.
Dum. 1829. An. p. 31: Anthemidear.
Diplacrum R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 64: Scleriear. — Par. Nees 1834 . . .
Diplarrhena Labill. 1798.
Dum. 1829. An. p. 58: Gladiolear.
Diplazium Swartz 1800.
Dum. 1829. An. p. 67: Aspleniear.
Diplochita DC. 1828.
Dum. 1829. An. p. 39: Miconiear.
Diplolepis R. Brown 1809.
Dum. 1829. An. p. 26 (*Diplolepium*): Cynanchear. — Par. Spach 1839 . . .
Diplolepium Dumort. vid. *Diplolepis R. Brown.*
Diplosudon Dumort. vid. *Diplusodon Pohl.*
Diplusodon Pohl 1827.
Dum. 1829. An. p. 39 (*Diplosudon*): Lythrear.
Dipodium R. Brown 1810.
Dum. 1829. An. p. 57: Vandear.

Dipsaceae DC. 1805.
Dum. 1827. Belg. p. 74: fam. Fructitubiae. Gen.: Astrocephalus, Scabiosa, Succisa, Dipsacus.
Dum. 1829. An. p. 29. 32: fam. Dipsariear. Trib.: *genuinae* (gen.: Dipsacus, Scabiosa, Succisa, Astrocephalus, Knautia, Pterocephalus), Morinaceae.
Dipsacus Tourn. 1700.
Dum. 1827. Belg. p. 75; 1829. An. p. 32: Dipsacear. (1827 genuinar.)
Dirca Linn. 1751.
Dum. 1829. An. p. 79: Thymelinear.
Dircaea*) Decaisne 1848. Rev. hortic. IX. p. 465: nov. g. Gesneriar. (Gesneria bulbosa Gawl.
Ch. Lemaire 1853. Jard. fleur. III. ad t. 219. 220. (Char. emend.)
Hanst. 1853 . . . . .
Disa Berg. 1767.
Dum. 1829. An. p. 56: Ophrydear.
Disandra Linn. 1774.
Dum. 1829. An. p. 24: Antirrhinear.
Disporium Leman 1819. Dict. v. 13. p. 351: g. Gastromycetum. (D. versicolor.)
== Amphisporium Link.
Floroideae Nardo 1835. Consid. gen. Alghe (Isis 1837. p. 96): ordo 6 Algar. 1. Fructu simplici (Sphaerococcus etc.) 2. Fructu duplici. (Rhodomela, etc.)
Fungimorphae Nardo 1835. Consid. gen. Alghe (Isis 1837. p. 91): fam. Titanoidear. Gen.: Acetabulum.
Gladioli Ecklon 1827. Verzeichn. p. 31: ordo Ensatar. Gen.: Babiana, Antholyza, Watsonia, Neuberia, Gladiolus, Hebea, Beilia, Micranthus, Aglaea.

*) Nomen mythologicum Nymphae.

Appendix

ex Dumortier Florula belgica 1827.

Opus Auctoris venerabilis et post semisaeculum etiamnunc indefessi (vid. Ejus Hepaticae europaeae 1874) ipsius benevolentia (sicut antea opera: Analyse des familles et Recueil d'observations sur les Jungermanniacées 1835, quod ultimum Neesio, cum Synopsin Hepaticarum 1844—1847 elaboraret, incognitum fuisse videtur) mihi communicatum, postquam maxima Nomenclatoris pars typis jam absoluta erat, silentio praeterire non volui, cum multa nova nomina in eo deposita sint Auctoribus plerisque ignota et vix a nonnullis citata. Quare hic Appendix soli Florulae belgicae consecratus est et omnia continet quae nondum in Nomenclatore vel in Addendis reperiuntur. Numerus nomen sequens semper paginam indicat, et ubi in parenthesi legimus (1823) Auctoris Agrostographiae belgicae tentamen (mihi non visum) indicatum est. Quae nomina primum hic occurrunt asterisco notata sunt.

Absinthium 71 sect. Artemisiae.
Acer 113 g. Acerear.
Aceras 132 sect. Loroglossi. (anthropophorum.)
* *Acereae* 113 trib. Acerinear. Gen.: Acer.
Acerineae 113 fam. Thalamunguliae. Trib.: Acereae, Fraxineae, Hippocastaneae.
Acetosa 17 sect. Rumicis. Subsect.: Bucephalophorus, Rumicotypus, Acetosa (scutatus).
Achillea 69 g. Anthemear. Sect.: Ptarmica, Millefolium.
Acinos 48 sect. Thymi.
* Aconitotypus 129 sect. Aconiti.
Acorus 162 g. Orontiacear.
* Acrocystis 147 sect. Dichostachydis. (Carex umbrosa, digitata, etc.)
Actaea 126 g. Paeoniacear.
* Adenema 29 sect. Lysimachiae. Subsect.: Diastixis, Nummularia.
* Adonidotypus 127 sect. Adonidis.
Adoxa 84 g. Adoxinear.
* *Adoxineae* 84 trib. Saxifraginear. Gen.: Adoxa.
Adyseton (DC.) 120 sect. Alyssi.
Aegopodium 78 sect. Sisonis.
Aesculus 113 g. Hippocastanear.
* Aethiops 43 sect. Sclareae. (Salvia pratensis, sylvestris.)
Aetusa 80 g. Oenanthear.
Agrimonia 97 g. Agrimonidear.
* *Agrimonideae* 97 trib. Rosacear. Gen.: Agrimonia.
* Agrostemmotypus 108 sect. Agrostemmatis.
Agrostideae 152 trib. Calliflorar. Gen.: Ammophila, Anthoxanthum, Agrostis, Apera, Calamagrostis.
* Airella (1823) vid. *Airotypus*.
* Airotypus 154 sect. Airae. (caryophyllea : *Airella* Agrost. Belg.)
Ajax 136 sect. Narcissi.
Ajuga 42 g. Teucriear.

Atripliceae 20 fam. Thalamitegmiae. Trib.: Anserineae, Salsoleae, Salicornieae.
Atropa 39 g. Capsicear.
* Aulocystis 147 sect. Dichostachydis. (Carex firma, depauperata.)
Avenaceae 153 trib. Scobiflorear. Gen.: Hierochloe, Holcus, Arrhenatherum, Avena, Trisetum, Corynephorus, Aira, Deschampsia.
* Avenastrum 154 sect. Avenae. (strigosa.)
* Avenotypus 154 sect. Avenae. (nuda, sativa.)
* Avenula 154 sect. Triseti. (pratense, pubescens.)
* Avronastrum 154 sect. Avenae. (hirsuta.)
* Avronia 154 sect. Avenae. (fatua, sterilis.)
Baccharideae 67 sect. Asterear. Gen.: Chrysocoma.
Baldingera 152 g. Phleacear.
Balsamineae 112 fam. Thalamunguliae. Gen.: Impatiens.
Balsamita 71 g. Tanacetear.
Barbarea 123 g. Erysimear.
* Batidea 94 sect. Rubi. (idaeus.)
* Batotypus 94 sect. Rubi. (fruticosus, saxatilis.)
Beccabunga 35 sect. Veronicae.
Behen 107 sect. Silenes. (inflata, maritima.)
Bellideae 66 sect. Asterear. Gen.: Bellidiaster, Bellis.
Bellis 66 g. Bellidear.
* *Berbereae* 126 trib. Berberidear. Gen.: Berberis.
Berberideae 125 fam. Thalamunguliae. Trib.: Epimedieae, Berbereae.
Berberis 126: g. Berberear.
Berula (Koch) 77 sect. Sii.
* Berula 35 sect. Veronicae. (arvensis, serpyllifolia, etc.)
Beta 21 g. Blitear.
Betula 11 g. Betulear.
* *Betuleae* 11 trib. Amentacear. Gen.: Alnus, Betula.
Birolia 111 sect. Elatines. (triandra, hexandra.)
* *Biscutelleae* 118 fam. Siliculosar. Gen.: Biscutella, Senebiera, Hutchinsia, Teesdalia, Iberis, Lepidium, Capsella, Thlaspi.
* Biscutellotypus 118 sect. Biscutellae.
Bismalva 114 sect. Malvae. (Alcea, Aoschata, etc.)
Bistorta 19 sect. Polygoni.
* *Bitegmia* 131 div. Decorticaliae. Ordines: Thalamifloria, Fructifloria.
Blattaria 37 sect. Verbasci.
* Blepharocarpus 25 sect. Ulmi (pedunculata, racemosa.)
* Blepharolapathum 17 subsect. Lapathi. (pulcher, Auritimus.)
* *Bliteae* 21 subtrib. Anserinear. Gen.: Blitum, Beta, Anserina, Chenopodium.
Blitopsis 19 sect. Amaranthi. (sylvestris, Blitum.)
Blitum 21 g. Blitear. (virgatum, capitatum.)
* Boeotryon 143 sect. Clavulae. (Scirpus caespitosus, Baeotryon.)
Boragineae 39 fam. Thalamitubiae. Trib.: Heliotropieae, Lithospermeae, Echieae.
* Bostrycha 154 sect. Airae. (flexuosa, discolor.)
Botrycarpum 88 sect. Ribis.
Brachylobos 124 sect. Nasturtii.
* Brassicotypus 122 sect. Brassicae.
Briza 157 g. Poacear.
* *Bromaceae* (1823) 155 trib. Scobiflorear. Gen.: Michelaria, Bromus, Dactylis, Köleria.
* Bromium vid. *Bromotypus.*
* Bromopsis (1823) 155 sect. Bromi. (asper.)
* Bromotypus 155 sect. Bromi. (*Bromium* Agrost. Belg. — squarrosus, mollis, etc.)
Bromus 155 g. Bromacear. Sect.: Bromotypus, Pnigma, Bromopsis, Genea.
Bryonia 54 g. Bryoniear.
* *Bryonieae* 54 trib. Cucurbitacear. Gen.: Bryonia.
Bubon 79 g. Libanotidear. (Athamantha libanotis et pyrenaica.)
* Bucephalophorus 17 subsect. Acetosae.
Buceras 100 sect. Trigonellae.
Buglossum 41 sect. Anchusae. (vulgaris.)
Bugrana 99 sect. Ononidis.
Bugranoides 99 sect. Ononidis.
Bulbocastanum 78 sect. Cari.
Bulliarda 85 g. Tillaeear.
Buniadeae 121 trib. Siliquastrear. Gen.: Calepina, Neslia, Bunias, Crambe.
Bunium (Link) 78 sect. Sisonis. (flexuosum.)
Buplevreae 76 trib. Umbellatar. Gen.: Diatropa, Buplevrum.
Buplevrum 76 g. Buplevrear. Sect.: Diaphyllum, Isophyllum, Odontea.
Buxus 88 g. Euphorbiacear.
* Calamagris (1823) 153 sect. Calamagrostidis. (epigejos, etc.)
Calamintha 47 sect. Thymi.
* Calcitrapotypus 73 sect. Calcitrapae.
Calenduleae 72 subtrib. Helianthidear. Gen.: Calendula.
* *Calicifloria* 135 ordo Bitegmiae. Fam.: Hydrocharideae, Alismaceae.
* *Calicungulia* 84 ordo Unguliflorae. Fam.: Saxifragineae, Crassulaceae, Portulaceae, Illecebreae, Euphorbiaceae, Grossulaceae, Myrtaceae, Onagrideae, Halorageae, Lythrarieae, Tamariscineae, Rosaceae, Leguminosae, Rhamnaceae, Iliceae, Celastrineae.
Calla 163 g. Arisarear.
* *Calliflorae* (1823) 148 series Graminear. Trib.: Maydeae, Saccharineae, Andropogineae, Cynodoneae, Lepiureae, Paniceae, Oryzeae, Stipaceae, Phleaceae, Agrostideae.
Callitriche 90 g. Callitrichear.
* *Callitricheae* 90 trib. Halorageae. Gen.: Callitriche.
Calluna 53 g. Ericear.
Calystogia 50 g. Convolvulear.
* Camelinotypus 120 sect. Camelinae.
* Campana 58 sect. Campanulae. (rapunculoides, etc.)
Campanulaceae 58 fam. Fructitubiae. Trib.: Campanuleae, Phyteumeae, Jasioneae.
* Cania 24 sect. Urticae. (Dodartii, pilulifera.)

Colchiceae 141 fam. Liliflorae. Gen.: Colchicum.
Colchicum 141 g. Colchicear.
Comarum 97 g. Dryadear.
Coniferae 9 fam. Julitegmiae. Trib.: Cupressineae, Abietineae.
Conium 77 g. Smyrniear.
* Conoclinium 70 sect. Pyrethri. (maritimum, inodorum.)
* Conomorpha 107 sect. Silenes. (conica, conoidea.)
* Consoligo 127 sect. Adonidis.
Convolvulaceae 50 fam. Thalamitubiae. Trib.: Cuscuteae, Convolvuleae.
Convolvuleae 50 trib. Convolvulacear. Gen.: Calystegia, Convolvulus.
Convolvulus 50 g. Convolvulear.
Conyza 68 g. Inulear. Archetypar. (squarrosa.)
Coriandrum 80 g. Oenanthear.
Corispermum 23 g. Polycnemear.
Corneae 83 trib. Hederacear. Gen.: Cornus.
Corniola 98 sect. Genistae. (tinctoria.)
* Cornotypus 83 sect. Corni. (nudiflora.)
Cornulaca 22 sect. Kochiae.
Coronilleae 102 subtrib. Hedysarear. Gen.: Coronilla, Ornithopus, Hippocrepis.
* Coronopodium 28 sect. Plantaginis.
Corrigiola 86 g. Corrigiolear.
* *Corrigioleae* 86 trib. Illecebrear. Gen.: Corrigiola.
* *Corticalia* s. *Astrofibria* 9 subclass. I. Staminaciae. Divis: Simplitegmia, Tubiflora.
Corvisartia 68 sect. Inulae.
Corydalis 117 g. Fumariacear.
Cotula 71 g. Cotulear.
Cotuleae 71 sect. Anthemidear. Gen.: Cotula.
Cracca 103 sect. Viciae.
Crassulaceae 85 fam. Caliculiguliae. Trib.: Semperviveae, Tillaeeae.
Crepalia 160 sect. Lolii. (temulentum.)
Crepideae 60 subtrib. Lactucear. Gen.: Lampsana, Chondrilla, Gatyona, Barkhausia, Crepis, Taraxacum, Helminthia, Picris.
* Crepidopsis 61 sect. Crepidis. (biennis.)
* Crepidotypus 61 sect. Crepidis. (tectorum, etc.)
Crithmum 79 g. Foeniculear.
Crocus 137 g. Ixiear.
Crucianella 56 g. Rubiacear.
Cruciata 55 sect. Galii.
Cruciferae 118 fam. Thalamunguliae. Series: Siliculosae, Siliquastreae, Siliquosae.
* Ctenium (1823) 159 sect. Lolii. (perenne.)
Cucubalus 107 g. Silenear. (bacciferus.)
Cucumis 54 g. Cucurbitear. Sect.: Melo, Cucurbita, Pepo.
Cucurbita 54 sect. Cucumeris.
Cucurbitaceae 54 fam. Fructitubiae. Trib.: Bryonieae, Cucurbiteae.
Cucurbiteae 54 trib. Cucurbitacear. Gen.: Cucumis, Ecballium.

* *Cupulifereae* 14 fam. Julitegmiae. Trib.: Corylaceae, Quercineae, Castaneae.
Cuscuta 50 g. Cuscutear. Sect.: Cuscutotypus, Epithymum.
Cuscuteae 50 trib. Convolvulacear. Gen.: Cuscuta.
* Cuscutotypus 50 sect. Cuscutae. (europaea)
Cyanus 72 sect. Centaureae.
Cymbalaria 34 sect. Linariae.
Cynanchum 52 g. Asclepiadear.
* Cynorhodon 93 sect. Rosae. (rubiginosa, canina, etc.)
Cypereae 144 trib. Cyperinear. Gen.: Cyperus.
* *Cyperineae* 143 fam. Glumaciae. Trib.: Scirpeae, Cypereae, Schoeneae, Cariceae.
* Cyperotypus 144 sect. Cyperi. (longus, fuscus.)
Cyperus 144 g. Cyperear. Sect.: Cyperotypus, Pycreus.
Cypripedieae 134 trib. Chondrosorchar. Gen.: Cypripedium.
* Cytisotypus 99 sect. Cytisi. (supinus.)
* Dactylanthos 36 sect. Digitalis. (purpurea.)
Dactylis 156 g. Bromacear.
Dactylites 84 sect. Saxifragae.
* Dactylopsis 37 sect. Digitalis. (lutea, etc.)
* Dalyeum (1823) 167 sect. Melicae. (ciliata.)
Daphne 26 g. Thymelear.
Datura 38 g. Nicotianear.
Daucineae 81 subtrib. Caucalidear. Gen.: Daucus, Orlaya.
Daucus 81 g. Daucinear.
* *Decorticalia* s. *Vagifibria* 131 subclass. II. Staminaciae. Divis.: Bitegmia, Solitegmia.
* Deleptium 119 sect. Lepidii.
Deyeuxia 153 sect. Calamagrostidis.
* Dianthotypus 106 sect. Dianthi.
Dianthus 106 g. Silenear. Sect.: Armeriastrum, Dianthotypus.
Diaphyllum 76 sect. Bupleuri.
* Diastixis 29 subsect. Adenemae. (Lysimachia punctata.)
* Dichostachys 146 subg. Caricis. Sect.: Phacocystis, Porocystis, Acrocystis, Cheilocystis, Aulocystis, Rhynchocystis, Ceratocystis, Lasiocystis.
* Dichostylis 143 sect. Clavulae. (Scirpus fluitans.)
* *Dioscorideae* 137 fam. Fructauliae. Gen.: Tamus.
Diplotaxis 123 g. Brassicear.
* Discolops (1823) 154 sect. Triseti. (praecox.)
* Distachys (1823) 160 sect. Brachypodii. (maritimum, distachyon.)
* Dolathera (1823) 159 sect. Lolii. (arvense.)
Doronicum 66 g. Senecionear.
Draba 120 g. Lunariear.
Drepania 63 g. Hieraciear.
Drosera 115 g. Droserear. Sect.: Rorella, Droserotypus.